

Princeton University Library



32101 078502448



5352

LIBRARY OF PRINCETON UNIVERSITY













V I L L A E  
 IO. BAPTISTAE  
 PORTAE, NEAPO-  
 LITANI,  
 LIBRI XII:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1, Domus            | 7, Vineæ             |
| 2, Sylva cædua      | 8, Arbustum          |
| 3, Sylva glandaria  | 9, Hortus coronarius |
| 4, Cultus & insitio | 10, Hortus olitorius |
| 5, Pomarium         | 11, Seges            |
| 6, Oliuetum         | 12, Pratum.          |

*IN quibus maiori ex parte, cum verus plantarum cultus, certaq;  
 insitionis ars, & prioribus seculis non visos producendi fructus  
 via monstrantur; tum ad frugum, vini ac fructuum multiplica-  
 tionem experimenta propemodum infinita exhibentur.*

Adiecto INVENTARIO quamcopiosissimo.

M D



XC I I.

FRANCOFVRTI

Apud Andream Wecheli heredes, Claudium Marnium,  
 & Ioannem Aubrium.

Cum S. Casarea Maiestatis privilegio.









# AUTORIS, DE SVA VIL- LA, PROOEMIUM.



ONSTITVI, lector optime, ut Socrates sui gym-  
nasij vestibulo, ἀγῶνιστήριον ἰδὼς εἰσὶν, scriptum prae-  
xerat, ne illuc ingrederentur, qui secum circinum  
(quo Geometra in metiendis figuris utuntur) non at-  
tulissent, quo se ipsos metirentur intelligerent; ita  
huic meae villa ianuis,

PROCVL, PROCVL ITE PROFANI,  
invidi scilicet, obrectatores, & male feriat. Isti enim (ut videre iam mihi  
videor) vix limine ingressi, sylvas horridas, pomariū inconcinnum, hortos  
incomptos, vineam male ordinatam, segetes & pascua arida steriliaq;, ac  
deniq; totius villa incompositum dicent corpus, & nostris (proh dii im-  
mortales) floridis hortis Austrum, satis nebulas & rubigines, ac demum  
nostrae segeti diram calamitatem exoptabunt, ac nimis quàm licenter in  
alienam messim manum imponent, atraq; serpentum lingua hominem in-  
cessent, qui patefactis ianuis, eximia liberalitate libenter precatur, ut in  
eos ingradientur, & incundissimo aspectu, & quam vberrimis fructibus  
suorum hortorum utantur fruantur, quos quidem summo labore excoluit,  
concinnavit, compsit, expoliuit, & in quincuncem construxit. Nec consi-  
derant universas quas hic satas vident plantas non sine multiplici pere-  
grinatione esse conquisitas, singulari diligentia è diversis regionibus acce-  
ptas, non sine sumptu, ac summo studio quae veterum de his extarent scri-  
pta experiendo, noua inueniendo, nostro vsui accommodando, ut alienis  
laboribus frui possemus. Sed qui consimile munus obierunt, nostroq; cona-  
tui aequiori animo indulgebunt, hi nostram villulam, quantulacunque  
sit, circumeant, hortulos & viridariola considerent, nec tadeat montes  
subire, sylvas, & oliuetum, & tandem si optimè cælo terram associamus  
considerare. Sed cur tam ingens onus, nec nostris humeris par susceperim,



quum plerosque sciam tam Græcos, quàm Latinos, singulari exactaq; doctrina præditos, huic rei specialiter incubuisse, in causa fuit, me non parum facturum esse, si studiosis omnibus, ac rerum naturæ exploratoribus integram, exactamq; agricolationis historiam conscripsissem: nam ex eis, qui extant, nemo fuit, qui id attigerit. Hesiodus Bæotus Græcus, ut altius rem exordiar, qui omnium princeps de agricultura celeberrimè cecinit, de segetibus aliqua, de arboribus aut vitibus perparum, de reliquis nihil dixit. Eius interpretes Virgilius Maro, qui Romana per oppida Ascreum carmen resonare fecit, hortorum dotē aufugit, è tantisq; quæretulit, flores modo rerum decerpfit, quindecim vuarum generibus nominatis, tribus oleæ, totidem pyrorum, malo tantum Assyrio; cæteris omnibus neglectis. Theophrastus Eressius extra omnem ingenij aleam positus, ut singulari sua eloquentia diuinum nomen sortitus sit, cuius doctrinam tanti Aristoteles fecit, ut suæ academici eum principem substituerit, absolutum opus tum de historia plantarum, tum de causis conscripsit, ex quo, tanquam è vasto mari subsecuta ætatis cæteri, ingenio & scientia præcellētes, quicquid de plantis scripserunt, hauserunt, hauriendumq; censent vno ore docti omnes: & me iam à scribendo deterruisset, nisi viderem eius libros non tam idoneos esse iis, qui agrum colere volunt, quàm qui scholas philosophorum. Nos singularis cuiusque plantæ ab eo historiam variis in locis distractam, membratim collegimus, & in unum corpus coegimus, ut Absyrtus ille Medæ non tam membratim fuerit conquirendus; & obscuras cultus causas, quas ipse brevissime reddidit, nos perspicuis & quam potuimus clarioribus verbis describere conati sumus, ut non solum ingenio & arte claris, sed rudibus & rusticis clarescerent; multarumq; plantarum cognitionem, quæ iam vetustate, & in tanta nominum ambiguitate & stirpium multitudine, oblitterata erat, ex Orco reuocauimus, ut pro virili innotescerent: eumq; denique tanquam optimum præceptorem in omnibus consecrabimur. Cassianus Bassus alioquin Constantinus Cæsar, qui ex veteribus Græcis selecta agriculturæ præcepta compilauit, adeo omnia breuiter perstrinxit, ut qui auctores illos viderint superflua, qui carent illis parum utilitatis colligere possint. Ex Latinis M. Cato hominum summus in omni usu: ille triumpho & censura super cætera insignis, magis tamen etiamnum claritate literarum præceptisq; omnium rerum expetendarum datis Romano generi, inter prima verò agricolendi illius aui confessione optimus, ac sine amulo agricola: cuius doctrinam tanti Plinius fecit, ut eius dicta, tanquam o-

racula



*racula observari præcipiat: de agricultura non nisi aphorismos quosdam, breviaq; præcepta de aliquibus, multis omisissis. M. Varro philologis potius, quam rusticis librum conscripsit. Columella de vineis quam luculentius, de segetibus, hortis & arboribus aliqua, de cæteris nihil attigit. Plinius & Palladius non nisi, quæ ex his exceperunt, habent. Nec ignoro ingentem neoteritorum esset urbem, sed sine doctrina, experiëntiaq;: nil aliud nisi quæ ex his de pagina in paginam transcripserunt. Sed & illud observandum, quod in hac arte tanquam rei caput, & summa est, rei agriculturalis scriptores, non solum inter se varios & discordes esse, sed mutuo contrarios: nam ut qui in Bithynia Pergamo, vel sub æquinoctiali sunt, citoserunt, demetunt, vindemiant, condunt: cõtra vero qui sub septentrionali polo, ferissimè: in media verò regione degentes medijs sunt: sic etiam Asiani frigidis locis aliquas plantas exponunt, cõtra septentrionales æstuosiss, medianæ regiones apricis. Vnde nec idem solum, cælum idem plantis tribuunt, & tandem secundum eorum regionem quisq; regulas præscripsit, ut horum præcepta, illis è regione sint opposita, unde iis, qui eorum regulis usuri sunt maximè ansam errandi præbeant: huic defectui succurrere impossibile indicabam: sed quum cogitarem omnia à Deo sapientissime condita, nihilq; sine sua doctrina: cæpi mecum ipse sciscitari & rem animo versare, tandem novi unamquamque secum plantam suæ rationis, cultus, soli, & cæli indicia ferre, sua physiognomoniam siue partiũ compositione hac omnia indicare, ut in physiognomonicis abunde diximus: sic & unoquoque capite sui cæli, soli, & cultus suas cuiusque regulas ex se ipsa indicavimus, ac omnium primum docuimus. Prætereatum ex antiquis scriptoribus, tum ex neotericis, quos usque adhuc videre contigit flores, fructus, plantas, & quicquid pulchri, optimi, & utilis iudicavimus, extirpavimus, in hanc nostram villam plantavimus, digestimus, servimus, & inseruimus, ut nil eorum, quæ ad plantarum cognitionem ex philosophis, philologis, poetis, medicis, agricolis, & rerum naturæ exploratoribus, spectant, desiderari possit. Ex quibus non transcripta solum, sed quæ ex probatissimis authoribus collecta, de his peruigili studio, perpetua observatione, sumptu, labore, & quotidiana experiëntia periculum fecimus, & peritissimorum agriculturalium testimonio comprobata, literis mandavimus. Nec me putetis obsecro Nicandrum Colophonium illum, qui quum ex urbe nunquam discessisset, de re rustica scribere ausus sit: nam quum ab urbe, amicis, cæterorumq; consortio longius exulare contigisset, ne otio tabescerem urbis & amico-*



rum desiderium plantis ferendis, inferendis, cicurandisq; leniebam. Et ut pratorias, triumphales, & regias maiorum nostrorum manus ab aratro, ligone, & pastino non abstinuisse legimus: sic nos nostras non illibenter adhibuimus. testes sunt vineæ meæ, arbuta, horti, viridaria, & amicorum, in quibus innumerabiles visuntur plantæ, mea manu consitæ, insitæq; posteris relinquenda, nec solum solitos & suetos fructus ferentes: sed nec adhuc hominibus visos, & nostris maioribus inuisos, quos studio, arte & experientia producere didicimus. Stirpibus omnibus delineationes, si quæ ex antiquis extarent suffecturas apposuiimus, sin minus, expositam oculis plantam ex omnibus partibus representauimus, & viuis quibusdam coloribus designauimus, ut omnibus cognoscibilis esset. Nec parum opis recentioribus agricolis præstitimus, quum maiores nostri in alicuius plantæ effigie representanda, notas tam paucas, & incertas apposuerunt, ut quoduis aliud potius, quàm plantam illam representare videantur, ne uni vultum exhiberemus, quem alteri conuenire docebatur. Maximam me Medicorum gratiam consecuturum spero, quum in dignoscenda alicuius plantæ facie à Theophrasto, Dioscoride, Galeno, vel Plinio descripta, non parum insudarim: id obiter in processu Medicis profuisse de agricultura tractanti quid obfuit? Plantarum, & fructuum nomina, præsertim Campaniæ nota adiunximus, ut antiqua nostris sæculis innotescerent. Paetarum fabulas interpretati sumus, ut sub inuolucris latentes plantæ cultus & vires innotescerent, ut nil nostris in his historiis nosci dignum possit desiderari. Libros, capita, & capitum partes ita ordinauimus, ut quisque facile sciat, & inueniat quæ concupierit. Sed nollem vos ante nostræ villæ vestibulum diutius retardare. fores iam patefactæ sunt, vicina est, ingredimini hilare, & fruimini.

HÆRE.



# HÆREDES VVECHELI CAN-

DIDO LECTORI S.

**M**VIVS operis exemplar, beneuole lector, antequam ipsum prelo subiiceremus, viro cuidam erudito relegendum tradere nobis operæ pretium visum fuit, vt si qua errata in eo vel inter describendum vel alia ratione commissa forent, ea cum iudicio corrigerentur, quò opus istud quàm fieri posset emendatissimum prodiret: sicut & solemus omni conatu & opera, quantum in nobis est, curare & efficere, vt libri qui à nobis excuduntur, quàm emendatissimi in lucē prodeant, nec in eum finem vllis sumptibus parcere. Inuentum est autem exemplar istud inmendosissimū atq; infinitis erratis scatens: quod describentis incuriæ potius quàm authoris oscitantia tribuendum censemus. Primum enim Græcæ vocabula ferè vbique erant miserè deformatæ, literis vel mutatis vel transpositis vocibus integris sæpenumero corruptis & deprauatis, accentibus vel omissis vel malè collocatis. In Latinis verò innumeræ mendæ: nam præter grammaticalia errata penè infinita, sensus etiam multis in locis vel nullus, vel mutilus, vel inuersus: affirmationes pro negationibus, & negationes pro affirmationibus: distinctiones prauæ: loca citata & desumpta ab authoribus antiquis pessimè descripta, vt in singulis ferè locis consulendi fuerint authores ipsi, vt loca citata suo sensui vel nitori redderentur. Qua in re summam fidem & diligentiam ab eo, qui hoc munus à nobis rogatus in se suscepit, adhibitam esse res ipsa testatur. Cuius diligentia tamen tanta esse non potuit, vt omnia loca corrupta restitueret. Sunt enim quedam, quamuis non multa ita deprauata, vt ad eorum sensum assequendum plusquam OEdipo coniectore opus foret, quæ lectorum iudicio relicta sunt. Cætera quæ iudicio & cōiectura emendari potuere, quanta fieri potuit religione iuxta rei naturam & authoris sententiam restituta sunt. In cuius rei fidem conferat, qui volet, librū quintum & sextum, nempe pomarium & oliuetum, huius operis & editionis cum editione Neapolitana, (nam duo illi libri iam antea Neapoli seorsim fuerunt excusi) ac videbit, à quot & quantis mendis illi sint repurgati. Nec putandum alios libros huius operis manuscriptos qui nondum in lucem prodierant, emendatiores fuisse, cum potius mendosiores extitisse vere affirmari possit. Hunc ergo laborem in studiosorum gratiam susceptum speramus multis vtilem & ipsi authori gratum futurum. De hisce autem, beneuole lector, te monitum volumus, vt nostram diligentiam in curandis emendationibus librorum, quos excudimus, perspectam habeas, nosq; & nostros labores tanto æquiore & gratiore animo prosequaris. Vale.



## PRIVILEGII SUMMA.

**C**ÆSAREÆ Maiestatis privilegio cautum est, *Andree Wecheli* heredi-  
bus, *Claudio Marnio* & *Ioanni Aubrio*, ne quis **IOAN. BAPTISTA**  
**PORTE** Neapolitani **VILLÆ** libros hosce duodecim intra sacri Romani  
Imperij, & omnium regnorum ac provinciarum imperialium fines, eodem vel  
alio charactere excudere, aut ubicunque recudenda dare, aut alibi impressa im-  
portare, vendere vel distrabere palam vel occultè ausit. Idem privilegium in  
concessum, de aliis etiam auctoribus, in philosophica, medica & iuridica faculta-  
te, aliisq; disciplinis liberalibus, ad sex cuiusque editionis annos. Quod sacra Ma-  
iestatis interdictum si quis neglexerit, non modo libris expressis, verum etiam in-  
super decem marchis auri puri, imperiali fisco, fraudis vindici & dictis Wecheli  
heredibus, ex aquo soluendis, mulctabitur, ut latius in Cæsareo diplomate declara-  
tum est, dato Vienna xxv mensis Maij, anno Domini M D LXXXII.

Rudolphus.

V. Io. Bapt. Weber.

Ad mandatum sacre Cæs. Maiest. proprium

P. Obernburger.

IOAN.






IOAN. BAPTISTAE  
PORTÆ NEAPOLITANI

VILLAE  
LIBER PRIMVS  
SIVE  
DOMVS.

*De Agricultura laudibus, & necessitate.* CAP. I.



10 **S**ATIS sanè inurbanum, & rusticum videretur, si nostram villam ingressurus, in ipso statim ianux limine, ab aliqua ingentium ipsius laudum præfatione deficerem. Animo autem volutanti, quæ, qualésve fuerint Agricultura diuitiæ, delitiæque, adeo innumeræ occurrunt, ut vnde incipiam, non sat assequi possim. Nam si necessitatem considero, tanto est humano generi emolumento, ut ea carere nullo modo possis. Si utilitatem, inter primas non postrema: aut quæ nam illi poterit comparari? Si voluptatem dignitati commistam, ea est excellentia, ea authoritas, ea denique maiestas, ut non reperiās vnā ex maximarum artium numero, quæ non illi, tanquam reginæ famulari videatur. Sed in huius pomærij angustis nostræ orationis pauperiem vereor & reformido, quum linguam in eloquentiæ studiis  
20 non ita exercuerim, ut strenuas manus in eius exercitatione nauiter impenderim. Sed ita suis floribus exornari velim, ut nil ipsius gloriæ authoramento detraherem, & quæ loquar omnia, & meliora, & (ut verè sunt) locupletiora ob oculos exponerem, ac vellem, si possem, ut nouus Atlas humeris terram ad astra vsque sustollere. Quòd humano generi pernecessaria sit, euidentius est, quàm ut pluribus probari velit: sine enim rebus, quas rerum parens, & nutrix Natura edit, humana conditio subsistere nō posset, & qui id negauerit, & ma-



rem ipsam, & nutricem negabit. Arborum, herbarumq; fructibus vescimur, & iis quoque cetera vescuntur animalia, quibus & nos victitamus: iccirco plantas ante omnia animalia mundo natus Theophrastus, Porphyrius, & Eusebius enunciarunt, & ante eos verissimus Moses, qui tertia die Deum Opt. Max. pomiferum lignū, sexta verò animalia produxisse tradidit. Diuus Chrysostomus Deum scribit terræ culturam ante omnes alias artes in vitam intulisse, ac protoplasto iussit agriculturam quandam obire, non laboriosam, non ærumnosam, sed multam sibi præbentem Philosophiam. Sardi eò dementiæ venerunt, ut arbores terra antiquiores dixerint, Apollonio Tyanæo referente. Hippocrates pomis, & seminibus homines ali debere arbitrabatur, quòd iisdem per exordia usus fuisset. Idem testatur Ovidius:

Metam.  
lib. I.

*Ipsa quoq; immunis, rastroq; intacta, nec ullis  
Saucia vomeribus, per se dabat omnia tellus  
Contentiq; cibus nullo cogente creatis,  
Arbuteos fœtus, montanaq; fraga legebant,  
Cornaq; & in duris harentia mora rubetis,  
Et quæ deciderant patula Iouis arbore, glandes.*

Plato Cyclopes cibus ex fructibus spontè prouenientibus viuere scripsit. Philostratus Indos, qui iuxta flumen Indum habitant, syluestrium arborum fructibus. Plinius, & Solinus iisdem Hyperboreos, qui ultra Riphæos montes incolunt. Herodotus Aracis fluuij insularum accolas plantarum fructus maturos colligere, & ad hyemalem cibum reponere ait. Strabo Massagetæ ex syluestribus fructibus expressos succos bibere, iisque victitare. Pollux veterum cibum drupas fuisse. Plinius Astomorum Indiæ gentem sine ore, solo odore radicum, florum, & præsertim syluestrium matorem viuere, quæ manibus semper habet, eaque longiore itinere defert, ne desit olfactu cibus. Plutarchus in Artaxerxe Cadusios scribit pyris, malis, ac cæteris fructibus vesci: solo fruges denegante. Athenæus Athenienses solum ficibus nutriri, Argiuos, & Tirythios pyris syluestribus, Medos amygdalis, Indos arundinibus, Carmanos palmis, & Persas terebintho. Immo arborum nulla est, quæ plures populos alat, atque palma: nam Nasamones eius pane victitant. Arimphæi ex arbore Pontica dicta, ex Herodoto. Sunt & populi, qui ex cibo nomen adepti sunt. Libyæ populi ex loti arboris fructu viuentes, Lotophagi vocati sunt ab Homero. Æthiopes Rhizophagi, quòd cibus ex radicibus, Diodoro Siculo auctore. Speimophagi nō procul a Meroe Nili insula, quòd è seminibus panem ad victum conficiant. Arcades è glandium esu Pythiæ oraculo Balanophagi vocati sunt, Plutarcho, & Plinio referentibus: inde esculus è genere glandiferarum, ab esu nomen indepsit: cæteros ne lectores tædio afficiamus, consulto omittimus. Nutriuntur radicibus, frondibus, & fructibus animalia, quibus præcipuè nutritur homo: cerui, capræ, apri, lepores, cuniculi, & cætera. Nec solum quæ terrâ inhabitant, herbis viuunt, sed & quæ mare, & aëra, reptiliaq; In his



his authoritates Poëtarum adducemus. Maro:

*Pascitur in magna sylua, formosa iuuenca.*

——— *non, me pascente, capella*

*Florentem cythysum, & salices carpetis amaras.*

*Lenta salix fæto pecori.*

*Dulce satis humor, depulsis arbutus hædis.*

Ex frondibus fasciculos componunt agricolæ, quos sub tecto ad boues, & pecora seruant, ut iis hyeme pascantur. Et frondatores qui eas legere consueverant, canere solebant. Idem:

10 ——— *cant frondator ad auras.*

Pecus oleaster opimat, oues vlmeis frondibus, capræ fraxineis commodè aluntur. Glans bobus cibus est. Plautus in Truculento;

*Rur mane dudum hinc ire me iussit pater, ut bubus*

*Glandem prandio depromerem.*

Sed ut arbores primos hominibus cibos præbuerunt, ita & habitacula, quarum umbra, ramis, & truncis se aduersus solis, pluuiarum, imbrium, & niuium molestias tuerentur. Ouidius:

*Pro domibus frondes norant.*

Nemesianus:

20 *Sylua domus, cubilia frondes.*

Quintus Fabius Pictor, Primis hominibus non domus extructa, ornataque, sed vimina, & caua arborum ligna, in quibus tectorum vice inhabitarent. Eutropius idem, ex frondibus, & virgultis contextis casulas habitasse. Immo adhuc sunt nationes, quæ à primo more non recesserunt. Narrat Herodotus Scytharum Argippæos, eam partem ad auroram vergentem, incolentes, sub arboribus incubare. Pomponius Mela de Scythis idem scribit. Dionysius suæ Africae Massylos per syluas, & saltus errare scribit. Arimphæos Asia populos nemora pro domiciliis habere. Indorum nonnullos sub ficu, ac a stare, ob animalia venenosa, in arboribus lectos sternere, & Brachmanas sacerdotes illos 30 in syluis agere, & corpus frondibus vestire. Gallorum Magos Druidas arborum lucos eligere: Arabas arbores pro tuguriis habere, Plinio, & Solino authoribus. Ex hac antiquitus sylvarum habitatione, quum homines soli errarent per nemora, & educta secum sobole, è syluis egrederentur, ex arboribus nati existimati sunt. Ad id alludentes Poëtæ, homines ex arboribus procreatos finxerunt. Virgilius:

*Gensq, virum truncis, & duro robore nata.*

Arcadas iactari se ante astra natos, & hominum primos fuisse, primamq; originem traxisse, narrat Stadius.

*Arcades hinc veteres astris Lunaq, priores,*

40 *Agmina fida datis: nemorum vos stirpe rigenti*

*Fama satos, quum prima pedum vestigia tellus*



*Admirata tulit, nondum arua, domusq̃, nec vrbes,  
Connubiisq̃, modus: quercus, lanriq̃, ferebant  
Cruda puerperia, ac populos umbrosa creauit  
Fraxinus, & fœta viridis puer excidit orno.*

Fuerunt & sylvarum non solum hominum, sed deorum habitacula. Virgil.

——— *habitarunt Di quoq̃, sylvas.*

Hæc fuerunt numinum templa, priscoq̃; ritu simplicia rura: etiam nunc Deo præcellentem arborem dicant: nec magis auro fulgentia, atque ebore simulachra, quàm lucos, & in iis silentia ipsa adoramus. ex Plinio. Immo in campis Elisii, ubi beatorum sedes, nemora esse dicuntur. Nec solum arbores domos, sed earum trunci, & folia prima præbuerunt tegumenta. Cognata quidem res, à quibus & victum, & domos accepissent, item & vestes. Scribit Strabo Massagetarum quarundam Scythiarum populos sua arbore se vestire. Plinius Astomos ex frondium lanugine. Arabes ex Cynarum arboris frondibus vestes componere. Clemens ex Sarmatis Allobios indui plantarum corticibus, Mela Germanos iisdem corpora contegi. Fœminas quasque in calceatu suberis cortice utri videmus, & Plinius antiquitus in hyberno calceatu usus fuisse tradit. Sunt & arbores lanigeræ apud varias gentes, ut pretiosis indumentis sericorum morem dederint, plurimorum authorum testimoniis memorabiles. Seres sunt hoc lanificio sylvarum nobiles perfusam aqua depectentes frondium caniciem, apud Indos. Æthiopia illis cotermina laniferas etiam habet arbores, quæ pro fructu lanam ferunt, quæ ad vestimenta utatur. Virgilius:

*Quid nemora Æthiopum molli canentia lana,  
Velleraq̃, ut foliis depectant vellera Seres?*

Ægyptus, authore Polluce, fert plantas, è quibus lanificium contexant. In Tylo insula, arbores laniferas nasci tradit Theophrastus, ex quibus telas, ac deinde vestes, alias viles, alias pretiosas conficiant. Insula cuiusdam meminit Dioscorus in Oceano meridiem versus posita, ex cuius lanugine incolæ sibi vestes præparant. Plinius in Atlante monte plantas cupresso similes nasci tradit, quæ tenui lanugine obducantur. Atque in Co insula cupressi, terebinthi, fraxini, & quercus flores, decusso imbre, vermes generant, qui stamen ad bombycinas vestes faciunt. Et ne longius exempla repetamus, sunt & apud nos vermiculi, mori foliis sati, qui vellus conflant, ex quibus pretiosæ vestes conficiantur.

Ad alios plures humanæ vitæ necessarios usus valet Agricultura. Cicero libro de diuinatione, Arborum autem confectio, omniq̃; materia, & culta, & syluestri, partim ad calefaciendum corpus, igni adhibito, & ad mitigandum cibum utimur, partim ad ædificandum, ut recti septique, frigora caloresque pellamus. Magnos verò usus affert ad nauigia facienda, quorum cursibus suppeditantur omnes undique copiarum, plurimisque maritimis rebus fruimur, atque utimur.



*De utilitate, quæ provenit ex Agricultura. CAP. II.*

**A**RBORVM census eò certior, & quæstuosior est, quò necessitas, commoditas & frequentior vsus rerum ex Agricultura prouenientium nos magis vrget, magisque illis indigemus, vnde tam utilis, vt omnium utilitatum utilissimus sit. M. Cato Agriculturam mercaturæ præfert, quū ipsa periculosa, & calamitosa sit: præfert & ipsam fœnerationi, quum fœneratio illicita, & inhonesta sit ob maximum quæstum. Maiores nostri ita in legibus posuere: furem dupli condemnari, fœneratorem quadrupli: quanto peiorem ciuem fœneratorem existimarint, quàm furē, hinc licet existimare. Sed fœneratio, quæ  
 10 cum terra sit, licita honestaque est, & quæstus maximè pius, stabilissimusque consequitur, & minimè inuidiosus. Cicero de senectute, terram nunquam imperium recusare dixit, nec vnquam sine vsura reddere, quod acceperat, sed aliàs minore, plerunque maiore cum fœnore. Semper enim boni assiduiq; domini referta est cella vinaria, olearia, & penuaria, villaq; tota locuples est. Abundat porco, hœdo, agno, gallina, lacte, caseo, melle. Iam hortum ipsi Agricola succidiam alteram appellant. tum conditiora facit hæc superuacui etiam operis aucupium, atq; venatio. Xenophon vltra animi voluptatem, domus augmentum Agriculturam habere dixit. Aristoteles in Politicis tradens maximum Agriculturæ quæstum, exemplum affert de Thalete \* Milesio, cui quum  
 20 obiiceretur Philosophiæ studiū propter inopiam, quasi inutile, & infructuosum, prospexisse illum ferunt per Astrologiam oliuarum vbertatem futuram, quumq; coegisset pauxillum pecuniarum, hyeme adhuc vigente, emptionem fecisse olei in Mileto, & in Chio pro paruo admodum pretio, vtpote nemine plus offerente, arrasque dedisse: quum itaque postea tempus venisset, multis subito quærentibus, vendidisse oleum, quanti ipse voluit, ac magnam vim pecuniarum inde superlucraturum, ostendisse amicis, per facile esse Philosophis ditari, si vellent, sed hoc non esse illis curæ. Hoc etiam Sextius è Romanis sapientiæ affectatoribus Athenis fecit eadem ratione, vt ex Plinio habetur. Iulius Græcinus, ex Columella, ad diligentem calculi ratiocinationem expendens  
 30 quæstum, qui ex vineis excipitur, detractis impensis, quæ ex vineæ solo, pedamentis, viminibus, vinitoris mercede, impensis, & pretij vsura, dum vinea in infantia à fructu cessat, demum semper superexcedere quæstum semisse iudicat. Plinius cupressorum sylvas apud antiquos quæstuosissimas dicebat, quòd ex his asseres, & perticæ amputarentur tertio decimo anno, ac singulis denariis venirent, vt plantaria filiarum dotem appellare in more esset. Celebratur Acilius Schenelus l x iugerum non amplius vineis excultis, atq; c c c c nummum venūdatis: maxima fama Rhemmio Palæmoni in hisce x x annis mercato rus d c nummum, pastinatis de integro vineis ad vix credibile miraculum perduxit, intra octauum annum c c c c nummum emptori vendidit pendente vindemia: cucurritque non nemo ad spectandas vuarum in iis vineis  
 40 strues. Arborum vectigalia publica, priuataque, antiquiori recentiori q; xuo

\* Plinius  
Democri-  
to tribuit.



plurima fuisse leguntur. Arabas singula millia talentorum thuris annua Persarum Regibus pensasse refert Herodotus, pro quo etiam pendunt Gebanitarum Regi, cui eidem Sabæi quarra p. rrem exoluisse scribit Plinius. E balsamo Romanis Iudæi tributa pendebant. Ex cocco alteram tributi p. sionem Hispaniæ pauperes soluebant. Rhodiorum tributa fuere ficus, vinum, oleum, aliaque, quæ piger referre. Tandem nulla est ars, vt Xenophon inquit, quæ contentibus maiores gratias reddat, & auidos magis exaturet.

*De voluptate, quæ ex villa, & arborum consitione percipitur.*

C A P. III.

**D**IXIMVS de necessitate, & vtilitate Agriculturæ: ex iis simul coniunctis 10  
 parvus procreatur, qui voluptas, vel iucunditas dicitur: nec puto maius  
 vitæ oblectamentum esse, vt quum feceris, quod necesse est facias, ex eo vtili-  
 tas proneniat. Sed quæ nam maior voluptas, quàm quæ cum vtilitate coniun-  
 cta est? Inter omnia enim quæ vtilitatem simul & iucunditatem pariunt, par-  
 tes sibi primas vendicat Agricultura, vt ambiguum sit, vtilitatisne, an amœni-  
 tatis plus habeat. Deus magnam primo homini voluptatem daturus, i. hor-  
 tum deliciarum posuit, vt summa animi cum voluptate agrum coleret: non e-  
 nim credibile est, vt ante peccatum ad laborem damnaret. Sed si omnium arti-  
 um agricultura satis habet deliciarum, tunc maximas haberet, quod nil accide-  
 bat aduersi, vel celo, vel terra, vt Augustinus refert. Quod enim maius, mira- 20  
 biliusque spectaculum est, quàm positis furculis, iactis seminibus, insitis mal-  
 leolis consideratione perspicere, quia neq; qui plantat aut rigat, est aliquid, sed  
 qui incrementum dat, Deus? & si quid accedit extrinsecus, per illum accidit, qui  
 regit & ordinat, inuisibilem Deum. Dicit Xenophon nil similem præbere vo-  
 luptatem atq; ager, in quo spes sit, vt cultu melior effici possit: vnde vt ex volu-  
 ptate caperes semper vtilitatem, agros, vbi optime excolueris, vendendos, atq;  
 incultos è vestigio emendos, ob colendi iterum voluptatem. Sed quæ ex villa  
 capiuntur, variæ & diuersæ sunt oblectationes. Cicero: Agro benè culto nil  
 potest esse nec vsu vberius, nec specie ornatus, ad quem fruendum non modò  
 non retardat, verùm etiam inuitat, atq; allecat senectus. In quamcunq; enim 30  
 partem te verteris, incideritq; visus, decussatis plantarum ordinibus, ipsa loca  
 circumspiciendi libertate se extendente, oculi alliciuntur, iucundè re prospe-  
 ctu depascuntur, vt nunquam satur sis mirari: immò oculi prospectu allekti,  
 veluti ex occulto magnete ex se ipsis conuertuntur, contrahunturque, vt ab-  
 strahere eos non possis. Si ad ramos oculos sustollis, patulis frondibus, & tre-  
 mulis iactantibus Solem non excludere, sed vt potius eludere videantur. Ede-  
 ra serpens arbores amplexatur, arbores pedamenta, ipsa eas circundat, & hilari  
 cæsarie comat. Nec minus subtus ferax est graminum prouentus, qui terræ su-  
 perficiem omnem viriditate ornat amœna, ac iucundo amicit decore: varia-  
 que florum lasciuia gemmeis coloribus depingit, qui non ingrato Naturæ 40  
 certamine



cetamine dum aliud alium superare nititur, smaragdi, hyacinthi, amethystique vice terræ amictum interlinunt. Odor flores comitatur, variaque odorum fragrantia nares oblectat. Pratorum medio clari, lymphidique fontes internitent, nec solum eorum frigiditate tactum reficiunt, sed transparentia exaugent iucunditatem: nam lucidissimo veluti in speculo geminatum pratum, & nemus ostendunt, verum alterum, imaginarium alterum: supra verum, in imo falsum. satis admodum suaue dixit Tibullus, æstate in media, sub Canis flagrantia æstu arborum umbris refocillari.

*Sub canis æstiuos æstus vitare sub umbra.*

10

Et Claudianus.

*Quum post labores sub platani cubes  
Virentis umbra, vel gelido specu  
Torrentiorem fallere Syrium,  
Et membra somno fessa resolveris.*

Zephyrus præterea susurrantibus foliis, ac lasciuiantibus refrigerantem auram inspirat, ut auium cantus imitari videatur. Ausonius.

*Somniferumq; canit sepes depasta susurrum:  
Est & arundineis modulatio musica ripis,  
Incubuit foliis quoties lenis Eurys acutis.*

20

Vento enim arundines feriente, ex earum sibilo Poëta figmentum auspicati sunt, ut inde fistula reperta sit. Tum demum nonnihil est, ut variis fructibus delecteris, non tempore vno, sed diuersis, alio maturescente, alio renascente, alio decidente, ut unusquisque ex industria iucunditate te afficere sataget. Rami fructibus onerati pondere incuruantur, ac se infra decumbenti offerunt. O quam dulcissimum est fructus ex arboribus, quas seuisisti, inseruisti, & coluisti, propriis manibus colligere, & amicis, agnatisque iactabundus largiri! Est & alia in arboribus delectatio, auium scilicet modulatio: passim enim ramis insidentes, ac volantes, argutos cantus ædunt, ac ex variorum multitudinem dulcissimus efficitur concentus, auresque cantibus demulcent suis.

30

Philomela mille per discrimina vocum canit, & nunc continuo spiritu trahitur in longum, nunc variatur inflexo, nunc distinguitur conciso, copulatur intorto, promittitur reuocato, infuscat ex inopinato: interdum & secum ipsa murmurat, plenus, grauis, acutus, creber, extensus; ubi visum est, vibrans, summus, medius, imus: breuiterque omnia tam paruulis in faucibus, quæ tot exquisitis tibiarum tormentis ars hominum excogitauit. Est & in iis capiendis non minima voluptas, visco & retibus fallere. Horatius.

*Queruntur in syluis anes,  
Aut amite laui rara tendit retia,  
Turdis edacibus dolos;  
Pavidumq; leporem, & aduenam laqueo gruem  
Iucunda captat premia.*

40



Diocletianus dum ruri Salonæ agebat, testatus est soles ibi lætiores fuisse. Virgilius agricolas felices vocat.

O fortunatos nimium sua si bona norint  
Agricolas: quibus ipsa procul discordibus armis  
Fundit humo facilem victum iustissima tellus.  
Si non ingentem foribus domus alta superbis  
Mane salutantum totis vomit adibus undam,  
Nec varios inbiant pulchra testudine postes: &c.

At secura quies, & nescia fallere vita,  
Diues opum variarum: at latis otia fundis,  
Spelunca, viniq, lacus, ac frigida Tempe,  
Mugitusq, bovm mollesq, sub arbore somni.  
Non absunt illi saltus, ac lustra ferarum,  
Et patiens operum, paruoq, assueta iuventus:  
Sacra Deum, sanctiq, patres: &c.

Fortunatus & ille, Deos qui novit agrestes,  
Panaq, Sylvanumq, senem, nymphasq, sorores.  
Illum non populi fasces, non purpura Regum  
Flexit, & infidos agitans discordia fratres.  
Quos ramū fructus, quos ipsa volentia rura  
Sponte tulere sua, carpfit: nec ferrea iura,  
Insanumq, forum, aut populi tabularia vidit: &c.  
Hanc olim veteres vitam coluere Sabini,  
Hanc Remus, & frater: sic fortis Hetruvia crevit,  
Scilicet & rerum facta est pulcherrima Roma.  
Aureus hanc vitam in terris Saturnus agebat.

Horatius rusticam vitam beatos homines efficere possedit, quum in ea maxima sit voluptas, molestiis omnibus expers.

Beatus ille, qui, procul negotiis,  
Vt prisca gens mortalium,  
Paterna rura bobus exercet suis,  
Solutus omni fœnore;  
Nec excitatur classico miles truci,  
Nec horret iratum mare;  
Forumq, vitat, & superba cinium  
Potentiorum limina.  
Ergo aut adulta vitium propagine  
Altas maritat populos,  
Inutilesq, falce ramos amputans,  
Feliciores inserit,



*Vel quum decorum mitibus pomis caput*  
*Autumnus aruis extulit;*  
*Vi gaudet insitina decerpens pyra,*  
*Certantem & vuam purpura.*  
*Libet iacere modo sub antiqua ilice,*  
*Modo in tenaci gramine.*  
*Non Afra auis descendat in ventrem meum,*  
*Non attagen Ionicus,*  
*Iucundior quam lecta de pinguiissimis*  
*Oliua ramis arborum,*  
*Aut herba lapathi prata amantis, & graui*  
*Malua salubres corpori.*

Sed dum innumeras villæ illecebras numero, à qua longè fastidium abest,  
 nollem lasciuiienti calamo, nimia prolixitate fastidium legentium animis pa-  
 rere: id solùm pro coronide addam, summos nostrorum maiorum heroas, &  
 procetes viros, quoties ex labore animū relaxare vellent, tanquam ad aliquod  
 delectabile ad villam confugisse, ad huius limina molestas curas omnes reli-  
 quisse, vbi longè ab hominum discordiis, ciuium simultatibus, vicinorum in-  
 uidiis, fori & curiæ strepitu, ad animi tranquillitatem veram consequendam  
 20 quiescebant. Lucullus post imperatorias administrationes, reiectis Reipub.  
 muneribus, in villam se contulit, vt ibi quæ pars vitæ superesset, quietè transi-  
 geret. Tiberius Princeps post multas res fortiter gestas, Romam reuersus, ad  
 villam transmigravit. Gordianus senior in syluis, & villis suauissimè vixit:  
 Scipio Linternum delegit, vt relictæ patriæ ingratitude dolor leniret.  
 Homerus, qui multis ante seculis fuit, Laertem lenientem desiderium, quod  
 capiebat de filio, colentem agrum, & eum stercorentem induxit. Filiscus dum  
 Ciceroni exilium patienter ferre persuadet, vt rus colat, admonet, quod pro-  
 pinquum sit littori, quum nulla res sit, quæ agrum animū tam subleuet, quàm  
 agricultura, vt ex Dione habemus. Nec defuere Philosophi, literatiq; viri,  
 30 qui his locis animi causa secesserunt, vt mens solutior, & quietior in profunda-  
 rum causarū indagine esset. Vnde Academia locus Athenis in suburbio erat,  
 quam Cimon riguis, & vmbrosis deambulachris exornauit, vt in eius vita Plu-  
 tarchus narrat. Laydis Cyrenæi in hortis schola fuit, quos Attalus Rex ædifi-  
 cavit. Theophrastus hortū iuxta ædes collocauit, quem moriens testamento  
 philosophantibus reliquit. Democritus Abderites prope hortum cellam ha-  
 buit, & vt Hippocrates ad Damageratū scribit, illum sub platano philosophan-  
 tem inuenit. Philo Iudæus philosophus Pythagoricus iuxta maria hortos ha-  
 buit, ibiq; philosophatus est, Eusebio referente. Palæmon Atheniensis in hor-  
 tis docebat, iuxta quos discipuli tuguria, in quibus habitarent, construxerunt.  
 40 Cicero non minus Philosophus, quàm Orator, academiam suam habuit, por-  
 ticu, & nemore celebrem, littori impositam in villa, ab lacu Lucrino Putcolos



tendentibus; addiditq; Marianam quercum, & Tusculanum secessum, loca disputationibus apta, vnde quæstiones Tusculanæ à disputationis loco dictæ sunt. Habuit & M. Varro studium situm in villa, qua cogitabat, qua meditabatur iura populo Romano, quod Cicero in M. Antonium exclamauit.

*De agricultura dignitate. C A P. I I I I.*

**N** V N C de agricultura dignitate loquemur: nam si scientiæ aut artes aliquam dignitatē meruerint, ipsa vniuersas sibi arrogare videtur. Si antiquitatem rebus aliquibus nobilitatem addere suspicetur quis, quum Agricultura antiquissima sit, cæteris nobilissimam esse cognoscemus. M. Varro rusticam vitam urbana multò antiquiorē tradit, quod fuit tempus, quum rura co- 10  
lerent homines, neq; urbem habitarent: quod tempus si referas ad illud principium, quo agrū colī cœptum sit, atq; in casis, & tuguriis habitabant, nec murus, nec porta quid essent, sciebant, immani annorū numero urbanis agricolæ præstant. Nec mirum, quod dat Natura agros, ars humana ædificat vrbes. Nec sine causa terram eandē appellabant matrem, & Cererem, & qui eam colerēt, piam, & vtilem vitam agere dicebant, atq; eos solos ex reliquiis esse Saturni Regis. Mussonius de quæstu Philosopho decenti tradens, neminem esse tam effeminatū dicit, qui vllum Agriculturae opus, turpe, aut indecens bono viro dicere sit ausus. Hierocles in Oeconomico paucos esse, qui credant viro inde- 20  
cens esse rei rusticæ operam dare. Xenophon in libro de tuenda re familiari, nil ei tam regale videri dicit, quàm studium agri colendi. A quo Cicero in officiis. Omaiū rerum ex quibus aliquid exequitur, nil esse agricultura melius, nil vberius, nil dulcius, nilq; homine libero dignius. Et in Catone. Mea quidem sententia haud scio an vlla beator esse possit vita rustica: neq; enim solum officio delector, quod vniuerso hominū generi cultura agrorum est salutaris, sed ea delectatione, & saturitate, copiaq; rerū omnium, quæ ad victum humanum, cultumq; etiam deorum pertinet. Prisca etiam ætas illa ad arborum dignitatem honestandam non auro, gemmis, vel re aliqua pretiosiori, sed ex arboribus honorari debere existimauit regum magnorū coronas, & triumphantium gestamen. Sic in certaminibus, & ludis, & sacris victores insigniun- 30  
tur, sic & Poætæ. Neq; iis contenta, regiones, sinus, vrbes, & nobilium etiam familias ad perpetuam rei memoriam arborum appellatione honorauit. Alexander Magnus, qui Dariū Persarum Regē bis bello superauit, Persea arbore coronari solitus est, in atavi sui honorem, qui hanc arborem è Perside Memphim transtulerat. Casarem post ciuilia bella in urbē reuersum, vt aliqui eum regem exprimerent, eius imaginem lauro coronarunt, inde post victorias obtinuit, vt corona laurea ornari perpetuò liceret. Sic etiam qui de ludis, vel hostibus victoriam exportabant, ex lauro corona cingebantur, quod erat victo- 40  
riæ signum. Naso.

— in ducibus latis, quum lata triumphis

*Vox canet.*

Scipionem



Scipionē Carthaginensem triumphatorē, altera manu sceptrū altera laurū ramulū tenuisse scribit Appianus. Et Plutarchus, Paulū Æmiliū in triumpho dextra laurū habuisse. Papyrius de Sardis triumphans myrtea usus est corona. Cæsar in triūpho Gallico è citro, vt ex Plutarcho habetur. Fuit nō minus decertatium honos. Theseus deuictō Minotaurō è Creta rediēs, Delū appulit, & Apollū ludos instituit, in quibus victores Delia corona donarentur. Claudianus.

—— *nutant ad mutua palma*

*Fædera.*

10 Vnde prouerbio dicitur palmam dare, & præcipuè pro victoria accipitur. Qui in Olympicis ludis vinceret, oleastro coronabatur, quod primum Hercules, in cuius honorem inuenti, hanc arborem ex Hyperboreis attulerit. Æneas in naualibus ludis oliua victores coronari iussit. Virgilius.

—— *tres premia primi*

*Accipient, flauaq; caput nectentur oliua.*

In ludis Atheniensium, & Panathenæis etiam oleaginea corona cingebantur. Quinquennalia etiam fuere, in quibus victores pinea coronabantur: ob id Pythionices dicti, etsi Pindarus apio coronari referat. Poëtarum corona duplex, ex lauro, & hedera. Virgilius.

*Pastores hedera nascentem ornatæ Poetam*

20 *Arcades.*

Et de laurea Poëtarum corona etsi multæ adduci possint authoritates, Horatij sola contenti erimus.

—— *coronandis consueta Poetis*

*Laurea.*

Nec satis antiquis visum est in publicis locis arboribus victores coronasse, nisi etiam priuatim in conuiuiis frondeas coronas tribuissent, vt hilarius cœnasse arbitrarentur. Dionysium primum instituisse legimus, vt hedera conuiuæ cingerentur. Fuit etiam ex rosis. Martialis.

*Pinguescat minio madidus mihi canus amomo,*

30 *Lassenturq; rosistempora sutilibus.*

Fuit etiam corona ex philyra, vt Ouidius Fastorum quinto.

*Ebrius incinctis philyra conuiua capillis*

*Saltat, & imprudens vertitur arte meri.*

Tantum quoq; arboribus tribuit antiquitas, vt nobilium Romanorū cognomina ex iis dicerentur. Ex syluis Syluani plures cognominati, & Syluij, vt Posthumus, qui Syluius cognominatus: is fuit Æneæ ex Lauinia filius posthumus, sic dictus, quod in syluis natus esset. Ouidius.

*Posthumus hinc, qui, quod syluis est natus in aliis,*

*Syluius in Latia gente vocatus erat.*

40 Stolonum cognomen inditū fuit ex cultura diligentia. Ab hortis Hortensij cognominati. Militi etiam Frondij nomen impositum, quod frondibus re-



ferto capite Vulturum transauerit, & præclara aduersus Annibalem facinora ædiderit. Et Ciceronis liberto Laureia nomen fuit. Eodẽ etiam modo regionibus, & vrbibus arbores nomina imposuerunt. Syriæ vallis à quercu, vel terebintho denominatur, in qua David Palestinum gigantem interfecit. Mysi populi à fago nomen acceperunt, quod Lydi *μύρον* fagum vocent. A pyrorum abundantia Peloponnesum Apiam dicunt. Insula Cotiusæ, ab oleastro illic nascente, nomen habuit, qui cotinus vocatur. Cedros insula in Germaniæ littoribus, à cedro. Pityusæ insulæ in mari Balearico à pinu. Sinus Saronicus à quercu, ita antiqua Græcia quercum appellante. Buxentum Italiæ oppidum à buxo, Cyparissia ciuitas ab Homero dicta ob cyparissî multitudinem, Cerasus ciuitas Ponti à cerasis, Laurentum Italiæ oppidum à lauro: sic Daphne Asiæ vrbs Daphnitis, & Daphiusa, & aliæ innumeræ.

Præterea si dignitas agriculturæ accedit exiis, qui eam tractauerint, regalis ars, & dignissima erit. Cyrus minor Persarum Rex agriculturam curiosè admodum pertractauit: nam in Lydia apud Sardes hortos sua manu conseruit, ad quem quum Lysander Lacedæmonius veniret, admiratus arborum elegantiam dispositionemq; , magistrum vt indicaret rogatus, ille, per Iouem illicò respondit, se nō prius prandere solitū, quàm bellicum quid, aut rusticum opus absoluerit. Fueruntq; alij Asiæ Reges agriculturæ studiosissimi. M. Curius, quum de Samnitibus, Sabinis, & Pyrrho triumphasset, cōsumpsit extremum tempus ætatis in hac villa. Ad focū sedenti magna auri pōdera Samnites quum attulissent, repudiata sunt ab eo. Non enim aurum habere præclarum sibi videri dixit, sed eis, qui haberēt aurum imperare. L. Quintio Cincinnato agrum aranti nuntiatum est eum dictatorem esse factum, cuius dictatoris iussu magister equitum C. Seruilius Hala Sp. Melium Regnum appetentē, & occupare volentem interemit, ex Cicerone, & Columella. Diocletianus maior sponte imperiales fasces relinquens, apud Nicomediam, in propriis agris consenscebat, iisdemq; decem annis vacauit, quumq; ab Herculeio, & Galerio sollicitatus esset ad rursus imperium capellendum, respondit: O vrinam Salonæ possetis videre oleta nostris manibus cōsita, profectò nunquam istud tentandum iudicaretis; authore Eusebio. Abdominus è stirpe regia Sidonis, quum ei regiæ vestis insignia portarentur, inuentus est in horto steriles repurgans herbas, & quum eum admitti Alexander iuberet, percontatusq; esset, quo animo inopiam ferret, respondit: Vtrinam eodem animo regnum pari possim: Manus meæ meo desiderio sufficiunt, vt nil habenti, nil desit: ex Quinto Curtio. Alexander Magnus Arachosios populos agriculturā docuit, Plutarcho memorię mandante. Telephanes apud Cymesios regnauit, quorū terram excoluit, & arboribus cōseruit: ex Heraclide. Delphicam platanū Agamemnonis manu sacram tradit Plinius, cuius generis Dionysius maior tyrānus in eius hortis habuit apud Rhegiū. Antoninus Pius, authore Capitolino, agriculturę diligens fuit. Aelius Sparrianus ad Germanos proficiscens hortos spatiosos cōparauit, in quibus



bus parca mensa atq; humi iacens cū filiis epulatus est. Ad historias sacras trās-  
eūdo Salomon qui doctissimus & sapientissimus fuit, de cedro vsq; ad hyssopū  
differuit. Sed quid memorē Philometrū, Hieronem, Archelaū, Attalum Aliā  
Regē, qui omīllis Regni curis, de iis praeceptiones tradiderunt? Sed nō solūm,  
qui arbores coluerunt, ingentes sibi laudes, sed qui virtutes inuestigarunt, &  
nomina eis imposuerunt, immortalē sibi gloriam compararunt. Gentiana ab  
Gentio Illyricorū Rege inuenta, & culta æternū Regis nomen tenet: Lysima-  
chi Macedoniae Regis lysimachia: scordion Michridatis Ponti Regis, clymen-  
nos habet Clymeni Regis, euphorbium Iuba Regis Mauritaniae, telephium  
10 Telephi Mysiae Regis, echium & anchusa Alcibiadis Atheniensium Ducis. Id-  
que etiam mulieres affecutas tradunt esse historiae. Helenium Helenes inuen-  
tum, adhuc Helenes nomen æternum retinet. Ab Artemisia Mausoli Regis  
Cariae vxore suum nomen artemisia habet. Tanta est huius artis dignitas, &  
præstantia, vt non solūm qui imperatoria maiestate spectabiles fuere, sed He-  
roes, & Dijs à plantarum satione manus non abstinuerint. Hercules in Ponto,  
iuxta Heracleam quercum plantauit, vt memorat Plinius: Liber pater in Ni-  
sa, Indiae monte, platanum, & laurum, vt Theophrastus inquit, & fabulae ei  
fructuum inuentum tribuunt. A Venere dea punicum satum in Cypro fabu-  
lae memorant. Aristeus Apollinis, & Cyrenes nymphæ filius, vt Diodorus Si-  
20 culus memoriae mandauit, qui Deus post mortem habitus est, Sardiniam arbo-  
ribus conseruit. Nec solūm dijs suis manibus serere delectati, sed qui aliquid in  
hac arte boni ad mortalium vsum inuenerunt, inter deos sunt habiti: Ceres  
ob frumenti inuentionem inter Deos habita est. Bacchus ob vini inuentione-  
nem, Circe ob egregium herbarum munus Solis filia, & diuina potius, quàm  
mortalis habitæ est. Cybeles currui leones adiunxerunt antiqui in eius grati-  
am, quod ipsa terram sic cicurasset, vt cicures leones currum traherent. Escu-  
lus vel, vt Plutarchus placet, quercus Ioui dicata est, & sacra habita, quod mor-  
taliū vitæ causa fuerit, qui primum glandibus victitarunt. Apollini laurus  
dicata est, quod fulmine non iciatur, & diuinationem in somnis præbeat. Mi-  
30 neruæ oleam dicarunt, quod labiis nescia, & à pueris, vel virginea manu sata, v-  
beriores det fructus. Myrtus sub Veneris tutela, quod venereis remediis con-  
ducatur, sic rosa, & philyra. Hedera, ferula, & picea Baccho, cupressus Plutoni,  
pinus Cybeli, punicum malum Mercurio, populus Herculi, & perseæ Harpo-  
crati, & sic de alijs.

*De sanitate, & alijs, quæ ex Agricultura comparantur, & quod Agricola  
boni viri sint. C A P. V.*

**I**NTER cætera, quæ ex villa conquiruntur, non omittenda pretiosa res, sci-  
licet sanitas, quæ ex villæ comparatur habitatione. Omitto quod Natura tot  
aromata, ac medicatos succos, arborum fructus, & radices ad humanam sani-  
40 tatem produxerit, vt eadem quæ ad escam, & voluptatem dederat necessaria,



etiam ad sanitatem tuendam valerent, quæ quia ab Hippocrate, Theophrasto, Dioscoride, Plinio & nostris phytognomonicis tradita sunt, libenter omittenda censuimus. Viridis primum frondium color, visum relaxatum fouet, quam rem non minimum sanitati conferre iudico: nam, ut Seneca inquit, confusis oculis profunt virêria, & eiusmodi coloribus infirma acies acquiescit. Eas probat Galenus, & Celsus exercitationes ad corporis augendas, & confirmandas vires, & ad valetudinem tuendam, quæ sub vmbra mista fiunt, quam vocant Græci *ὑποσκιον*, easque vtiliores dicunt, quàm quæ sub tecto, & inter parietes fiunt. Vt plurimum enim syluæ leui vento, vel aura mouentur: nam valentes flatus folia rumpunt, & silentes auras sua leuitate excitant, nec aëris densitatem ibi sistere patiuntur. Syluas, quæ picis resinæque gratia raduntur, vtilissimas phthificis Plinius esse scribit, atque illis, qui longa infirmitate non adhuc retinent vires, & illum adiuuare plus cœli aëra, quàm Ægyptiam navigationem, plusquam lactis per montium æstiuæ potus herbidos. Profunt præterea sylvarum vmbra, & amœnitates non parum ad euitandam aëris contagionem, potissimum verò fragrantium. Quum Romæ pestis atrociter sæuieret, Commodus Princeps Medicorum consilio Laurentum secessit, quod hæc regio crebris lauri syluis opaca foret, cuius odores plurimum contra cœli malehicia prodesse omnibus notum: vt ex Herodiano habetur. Herodes, ob vxoris Mariamne mortem, quam interfici mandauerat, tanta tristitia affectus est, 20 vt in grauem corporis ægitudinem inciderit, quam tantum aër pestilens auxit, vt dein suorum Medicorum suasu sese in sylvarum secretis abdiderit: sic refuso paulatim vigore, simul & corporis, & mentis salubritatem receperit. Inter ceteros viri boni vocantur agricolæ à veteribus agricolationis præceptoribus. Cato rusticum opus proximum, ac quasi consanguineum sapientiæ dixit. Columella, sine ludicris artibus, atque sine causidicis olim satis felices fuisse, atque futuras vrbes, at sine agricultoribus neque consistere mortales, neque ali posse manifestum inquit. Est tandem rustica vita omnium fraudum expertus: vnde boni viri non nisi ex agro requiebantur. Apud Aristophanem in Pluto, quia Chremilus vir iustus Charionē seruum mittit optimos vi- 30 ros vocatum, rus eum legat ad visendum Plutum. Quid enim eo exemplo Comicus vult innuere, nisi proborum hominum ruri esse domicilium, in vrbe sophistas, parasitos, & id genus hominum reperiri? Cato. Virum bonum quum laudabant, ita laudabant bonum agricolam, bonum colonum: amplissimè laudari existimabatur, qui ita laudabatur. Minimèque malè cogitantes sunt, qui eo studio sunt occupati. Xenophon generosam artem vocat: quippe utilis prouentu, iucunda opere, hominibus grata, facilis cognitu, & exercitio quoque generosa: nam generosa vocamus animalia, quæ pulchra, vtilia & mansueta sunt. Ingenua quoque ars, nam quum cæterarum artium professores multa in eorum disciplina occultiora abscondunt, agricola magnopere gaudet su- 40 um opus ab omnibus cerni, rogatusque quomodo id egerit, libenter explicat. adeò



adeò ingenuos, & liberales hæc ars homines reddit. Insuper corpora vegetiora, ac firmitiora viribus reddit, impigros facit, & matutinosurgere, properare-  
 que ad opus, venationibus insudare hortatur. Tandem quæ amantior seruis,  
 dulcior vxori, optatior filiis, gratior amicis? Colonos ad iustitiam, officiumq;  
 acuit, ad belli tempus animo & corpore valentes reddit, instruit quoque vt  
 mutuam præstent vtilitatem: nam ad bellum conficiendum, & agrum colen-  
 dum mutuo opere indigemus, ac similitudine quadam inter se conueniunt.  
 Augustinus libro de opere monachorum agriculturam inter honestas artes  
 10 connumerat. Salomon homines ad agriculturam hortatur, vtpote ad san-  
 ctiores quæstum. Non oderis, inquit, rusticam operationem, & agricultu-  
 ram ab altissimo creatam. Et quid aliud noster seruator Christus in euangelio  
 docere videtur? Et abierunt alius in villam, alius in negociationem, nisi, vt di-  
 uus Chrysostomus ait, quia omnis humanus actus aut villa, aut negociatio est,  
 quum nostris manibus rusticum opus operamur, villam colimus: sed hono-  
 res ambire, aut mercari, negociatio est, hoc inhonestum lucrum, illud hone-  
 stum vocat.

*Quid sit Agricultura, & quis eius inuentor.* CAP. VI.

SE D videamus quidnam sit Agricultura, & qualiter ab antiquis descripta: à  
 Platone autem incipiemus, qui in Eutidemo Agriculturam nil aliud esse di-  
 20 cit, nisi alimenta è terra colligere. At M. Varro ait, Agricultura non modo ars,  
 sed necessaria & magna, eaque est scientia, quæ docet, quæ sint in quoquo a-  
 gro facienda, serendaque, quæque terra maximè perpetuo reddat fructus. Et  
 agricolæ ad duas metas intendere debent, ad vtilitatem, & voluptatem: vtili-  
 tas fructus, voluptas delectationem parit. Xenophon verò in OEconomico  
 Agriculturam esse aliarum artium parentem, & altricem, quæ bene habente,  
 cætera valent: neglecta verò, terra, marique iacent omnia. Esse præterea inda-  
 gatricem, & accusatricem hominum vitæ, quippe quum nullus ignoret citra  
 victus necessaria neminem posse degere, hac neglecta, nisi ex alia viuat arte,  
 necesse vt in furandi suspicionem veniat. Cicero libro de senectute longo &  
 30 suauiter verborum lenocinio agriculturam describit, eiusque opera. Agricultu-  
 ra est ars, quæ docet vsuram cum terra facere, & plerumque maiore cum fœ-  
 nore. Molliore terræ gremio semen sparsum excipit, occatum primo cohibet,  
 deinde tepesactum vapore, & complexu suo diffundit, vt eliciat ex eo herbe-  
 scentem viriditatem. Ex fici tantulo grano, aut ex acino vinaceo, aut ex cæte-  
 rarum frugum, & stirpium minutulis aristulis, tantos truncos, ramosque pro-  
 creat. Quomodo malleoli, plantæ, sarmenta, viuiradices, & propagines effici-  
 antur docet. Vitis, quæ natura caduca est, nisi fulta sit, ad terram fertur, palus  
 adiungitur, vt clauiculis suis, quasi manibus, quicquid nacta est, complectatur,  
 eamque multiplici, & erratico lapsu serpentem amputans coercet ars agrico-  
 40 larum, ne syluescat sarmentis, & in omnes partes nimia fundatur. Sic ineunte



vere in iis, quæ relicta sunt; oriens vna sese ostendit, quæ & succo terræ, & calore Solis augescens, maturata dulcescit. Sic adminiculorum ordines, capitum coniugationes, & religationes, propagationes, vitium, sarmentorumque amputationes, & aliorum remissiones: item irrigationes, agri fossiones, repastinationes, stercorations, quibus fit ipsa terra multo fertilior, docet. Nec segetes solum & vineas curat, sed arbuta, hortos, pomaria, & prata. Nec consitiones modò, sed etiam insitiones, quibus nil inuenit agricultura solertius. Hactenus Cicero. Sed mihi videtur nil aliud esse Agriculturam, quàm inspecta plantæ natura, ei cælum, terram, & idoneum cultum tribuere, & (vt ita dicam) cælum cum terra maritare, vel societatem perquirere cœli & terræ ad arbores. Sed 10  
quum cælum nullo modo queat flecti, oportet vt sedulus agricola situs varietate vtatur, vt cœlo facilè plâta associetur. Exemplo omnia fient clariora. Quæ in siccis serenda sunt, orientem & septentrionem spectent, & quæ in humidis, meridiem. Præcoces in frigidis seremus, vt maturitas antecedit algorem. Quæ rores oderint, orientem versus serantur, vt statim nouus exoriens Solis radius, illum quamprimum desiccet. Quæ contrà rorem exposcunt, occidentem aut Boream versus, ne tam cito à Sole desiccentur, aut diutiùs frui liceat: sic cælum terræ parere ars cogit. Ob id omnium agricolarum superiorum & nostrorum ætatem sapientissimum Democritum existimasse puto: nam solus ipse cœlo terram maritare nixus est: Vergiliatum enim ortu olearum caritatem vatici- 20  
natus est, ac vilius mercatum, carius postea vendidit. Ob id nos priuatim singulorum capitibus cœli, terræque meminimus, vt consensum cœli, terræque cognosceremus. Sed Agriculturæ inuentores tradamus. Ipsam primum inuentam ab Osiri, qui idem est cum Dionysio in Ægypto testatur Diodorus in primo, à Triptolemo in Græcia ab Atticis, & Eleusinis populis testis est Iustinus in secundo, à Saturno in Latio, authores sunt Virgilius, Macrobius, & Eutropius. Cererem, quam à gerendis frugibus Gererem appellatam alicubi Cicero prodidit, in Sicilia agriculturam reperisse, sunt qui scribant. Nabidi suo Hispani. Alij aliis agriculturæ inuentum acceptum referunt. Cyprianus sentit antiquitatem Saturno falcem tribuisse, cuius finis industriæ est, metere atque 30  
colligere fructus, quòd ipse rem rusticam docuisset: quod insigne ei lanus dederit, cui posteritas rationem inferendi, & artem faciendi surculos fert acceptas: vnde Latini Saturnum à satù vocitarint. Augustinus libro de ciuitate Dei refert Stercen prius fuisse peritissimum agricolam, à quo inuentum ferunt, vt fimo animalium agri fecundarentur, & ab eius nomine stercus dictum esse: vnde & hunc quidam Stercurium vocatum ferunt, hunc certum fuisse Saturnum, quem meritò fecerunt Agriculturæ Deum. Philostratus, Per Nili simulachrum ita Ægyptij agriculturam indicant, ait, eiusque effigiem hac lepida descriptione effingunt. Huic enim sese ab vndis attollenti pueri ludibundo blandiuntur occurso, sexdecim numero, quorū itidem cubitis ad fertilitatem facit 40  
exundatio, quorum alij humeris insident, hi à cincinnis suspenduntur, in vlnis alij cu-



alij cubitant, alij in pectore petulanter saliunt. Ipse tam ex sinu, quàm ex vlna illis flores spargit, vt ex ipsis coronas contexant, & super floribus dormiant: sinistra quatiunt alij, neque absunt qui plausum, sonitumque ab aquis excitent, applois manibus.

*De OEconomisive patrisfamilias institutione. CAP. VI.*

**V**T quicquid hoc volumine tractetur, ordinatè procedat, dicendarum rerum tabellam proponemus, vt lector diuisionem animo concipiens, finem, cui omnia ordinata sunt cognoscat. Et si veterum monumenta peruoluemus, si qui sunt qui hanc artem diuiserint, Varronem reperimus, qui initio suæ Agriculturæ id exequutus est, sed eum sequi non putamus, nisi quantum voto arrideat: nam quum in agriculturæ diuisione pecora, boues, aues, & apes, aliaq; animalia clausit, volumus, vt qui horum historias scire auent, è philosophorum, non rusticorum libris perquirant. Nos quum paulò antè agriculturam de cœlo, solo, & cultu tractare dixerimus, & has suas esse principes partes, de cultu loquemur primo, & cum Varrone dicimus, aliqua esse quæ cum solo hærent, aliqua, quæ extra fundum sunt, & hæc sunt, quæ ad culturam pertinent. Res, quibus agricoluntur, alij in duas partes, alij in treis diuidunt, vt homines, animalia, & adminicula hominum. Homines vocales vocant, animalia semiuocalia, muta, in quo sunt plaustra. Sed rationi consonum est, vt de hominibus primum loquamur. Sed hominum ratio, atque conditio vna quidem imperans, altera dicto audiens: imperans, vt paterfamilias: dicto audientes, villicus, villica, & serui: de illo prius, mox de reliquis. Paterfamilias ab Aristotele in OEconomia, & ab Xenophonte OEconomus dicitur. Et vt solent cæteri artifices, qui oratores, poëtas, & principes instituunt, ita & nos OEconomum nostrum à natiuitate instituemus, cuius iussibus villicus obediens erit, nec quicquam in villa fiet, nisi quod ab eo præceptum erit. Primò igitur nostrum OEconomum à Natura bono ingenio, & optimo iudicio nobilitatum esse oportet: nam quum multas artes & scientias callere necesse sit, quibus in agriculturæ exercitio vtatur, quomodo arte, & experientia bonus OEconomus fieri poterit, nisi illa ab ortu fuerit assecutus? Sit etiam in naturali Philosophia exercitissimus: nam quum agriculturæ principia, vt Ennius nobis scriptum reliquit, & ab eo noster M. Varro retulit, sint terra, aqua, anima, & Sol, & hæc cognoscenda potius ceseat, quia hæc in tota arte tractantur: quomodo OEconomus noster perfectus esse poterit, si Philosophiam ignoraue- rit? & quomodo difficillima monumenta Hesiodi, Ascrei, Democriti, Xenophontis, Architæ, Aristotelis, & eius alumni Theophrasti, Hieronis Siculi, & Epicharmi eius discipuli, Philoponi, Attali, Chereæ, Aristandri, Amphilochoi & Euphronis Atheniensium, & Magonis Carthagenensis percipiet, (qui Pœnica lingua duodetriginta libris res dispersas comprehendit, quos Cassius Dionysius Vticensis Græca lingua viginti libris conuertit) & aliorum, qui à Varrone, Columella, & Cassio recensentur? Et quomodo sine Philosophia tot soli qua-



lirates ex colore, sapore, & quid ex his promissum, vel abnegatū sit cognoscere valuerit, nisi saltem huius scientiæ principia delibauerit? Nam et si Natura in rebus omnibus admiranda est, in agricolationis rebus admirabilissima est. Et quomodo tot insitionis modos, sationis, & cultus cognoscer, plantarumque morbos, & medicinas, si illorum causas, & secreta nō pertractauerit? erit profectō, vt empiricus, agricola, qui casu, & experientia, & nō recta ratione medebitur. Oportet etiam Mathematicarum scientiarum, & præsertim Astrologiæ non ignarum, vt ex mundi declinationibus, syderum ortu, & occasu, felices, & infelices plantarum euentus possit præfigire: nam syderum influxus in plantis liquido, & sine vlla ambage percipiuntur, & quid negauerint, ij proprium sensum negabunt. Cassius Græcus initio suorum librorum quicquid à Didymo, Diophane, Philoparro, Arato, Zoroaste, & Ptolemæo traditur, collegit, vt his artibus agricolam instruat. Varro omne quod intra æquinoctia, & solstitia faciendum sit, docet. Virgilius non minus quàm à nautis, ab agricolis sydera obseruanda præcipit.

*Præterea tam sunt Arcturi sydera nobis,  
Hædorumq; dies seruandi, & lucidus anguis:  
Quam quibus in patriam ventosa per aquora uellis  
Pontus, & ostriferi fauces tentantur Abydi.*

Docent etiam Hesiodus primò, mox Virgilius dies felicibus operibus aptos. 20

Hesiodus. *At quintas fuge: namq; illarum pallidus Orcus,  
Tum dira Eumenidum facies toto orbe vagantur,  
Castigant si qua in terris periuria falsum  
Affirmant, qua lis alternè agitata creauit.*

Virgilius. *Ipsa dies alios alio dedit ordine Luna  
Felices operum, quintam fuge: pallidus Orcus,  
Eumenidesq; sata: tum partu terra nefando  
Cæumq; Iapetumq; creat, sæumq; Typhæa,  
Et coniuratos cælum rescindere fratres.*

Et statim suorum Georgicorum exordio Lunam & Solem, à quibus ferè omnia in agricultura proueniunt, inuocat: 30

*— Vos ô clarissima mundi  
Lumina, labentem cælo qua ducitis annum.*

Columella hanc scientiam serenitates, & tempestates prænoscere dicit, ne imbribus, ventisq; imminētibus agricola opera inchoet, laborémve frustretur. Cæli & anni præsentis mores intuetur: neq; enim semper eundem velut ex præscripto habitum gerunt, nec omnibus annis eodem vultu venit æstas, aut hyems, nec pluuium semper est ver, aut humidus autumnus. Et quomodo ex agriculturæ operibus diues fiet, nisi fructuū caritatem, aut abundantiam prænouerit, vt de Thalete Milesio diximus? Florētinus Græcus in sui OEconomii institutione clamat, necessariū esse temporū varietates cognoscere: nam maior opes-



ior operū pars ex his pendet. Vel quomodo agrū in quincuncem disponet, atq;  
 constitutis cœli partibus diriger, vel ædificia collocabit? Quomodo agros me-  
 rietur, & quæstus ad diligentē calculū expendet, si Geometriā neglexerit? Nec  
 solūm harū disciplinarum, sed quid quoquo agro faciendum consultissimū esse  
 oportet: nam malè cum domino agitur, inquit Cato, quē villicus docet. Et Co-  
 lumella: agrū pessimè mulctari, cuius dominus quid in eo faciendum sit, nō do-  
 cet, sed audit villicum. Et qui studium agricolationi dederit, sciat hæc sibi tria  
 aduocanda, prudentiā rei, facultatē impendendi, & voluntatem agendi: nam  
 is cultissimum rus habebit, qui colere sciet, & poterit, & volet. Neq; enim sci-  
 re, aut velle cuiq; satis fuerit sine sumptibus, quos exigunt opera, neq; rursus  
 20 faciendi, aut impendendi voluntas profuerit, sine arte: quia caput in omni ne-  
 gotio est nōsse, quid agendum sit, maximeq; in agricultura, in qua voluntas,  
 facultasq; citra scientiam sepe magnam dominis iacturam afferunt, quum im-  
 prudenter facta opera frustrentur impensas. Itaq; diligens paterfamilias non  
 solūm rei agricolationis peritissimus sit, sed prudentissimos agricolas de qua-  
 que re cōsulat maximè curabit, atque commentarios antiquorum sedulò scru-  
 retur. Præcipiunt etiam eiusmodi scriptores nostrum œconomum religiosum,  
 & eximia bonitatis esse debere. Ait Cato. Paterfamilias vbi ad villam vene-  
 rit, larem familiarem salutabit, Augurem, aruspicem, ariolum, Chaldaëum ne-  
 20 quem consuluisse velit. Addit his Florentinus. Sit agri præfectus pius, & con-  
 suetas religiones obseruet, non arbores dedicatas, aut consecratas, aut aliud  
 quiddam eiusmodi contumelia afficiens, verū omnes ad pietatē præparans, &  
 ferias per hebdomadā fieri permittēs, & nihil graue tunc facere permittat, sed  
 vacare cogens, & maximè in lunaribus, aut annuis festis: & tandem sit exem-  
 plum omnium in agro degentium, vt ad illum, & illius vitam & mores respi-  
 cientes, reuereantur magis, quàm pertimescant. Si igitur gentilis, & omni ve-  
 ritatē orbatī festos dies, & honorē illorum deorū reuerebantur, quanto ma-  
 iori obseruantia noster hic œconomus optimus futurus erit, quem Christia-  
 nū instituimus, euangelicaq; veritate edoctum? Si illi familiares deos saluta-  
 30 bāt, ipse ecclesiā adeat, atq; pijs orationibus à Deo felices villæ fructus depre-  
 cetur, & si illi vanis superstitionibus noxios præcauebant influxus, nos sanctis  
 deprecationibus à Deo prosperos nostræ villæ euētus auspicabimur. Horreat  
 igitur noster hic œconomus vanas superstitiones, falsasq; religiones, vt idē fa-  
 cere ceteri ab eo ediscant. Numinū aliquorū per iocū omnis attestatio elimi-  
 nanda. Dei, aut numinis cuiusuis cōtemprior è familia confestim eiiciatur, aut  
 seuerissimè puniatur, ne perniciofa ea inolescat cōsuetudo. Sit in agro assidua  
 domini præsentia. Ait Columella. Nō assiduus labor, aut experiētia villici, nō  
 facultates, aut voluntas impēdendi tātūm pollent quātūm vel vna dominipre-  
 sentia, quæ nisi frequēs operibus interuenerit, vt in exercitu quū abest Impera-  
 40 tor, cūcta cessant officia. Maximè reor hoc significantē Pœnum Magonē suo-  
 rū scriptorū primordiis. Qui agrū parabit, domū vēdat, ne malit vrbānū, quàm



rusticum larem colere: & cui cordi fuerit vrbani domicilium, rustico prædio non erit opus. Ab eo Palladius: Præsentia domini prouentus est agri. Cassius: Agrum multò præstantiorē facit assidua domini præsentia. Quod idem à Catone, & aliis præceptum est. Sed addit alia idem. Vbi ad villam venerit pater familias, fundum eodem die, si potest, circumbeat, si non eodem die, at postridie: vbi cognouerit quomodo fundus cultus sit, operaq; quæ facta, infectaq; sit, postridie eius diei, villicum vocet, roget quid operis sit factum, satis ne temporis opera sient cōfecta, quæ durare possint, quid restet, aut quæ reliqua sient conficienda, & quid factum vini, frumenti, aliarumve rerum omnium. Vbi ea cognouerit, rationem inire oportet operarum, dierum: si eius opus non appareret, dicit villicus sedulò se fecisse, seruos non valuisse, tempestates malas fuisse, seruos aufugisse, opus publicum effecisse. Vbi eas, aliasq; causas multas dixerit, ad rationem operū, operarumq; villicum reuoca. Quum tempestates pluviæ fuerit, videto quot dies, quæve opera per imbrem fieri potuerint, doli lauare, picari, villam purgari, frumentum trāsferri, stercus foras efferri, sterquilinum fieri, semen purgari, funes veteres sarciri, novosq; fieri, centones cuculionesq; familiam oportuisse sibi sarcire. Per ferias verò potuisse fossas veteres tergeri, viam publicam muniri, vepres recidi, hortū fodiri, pratum purgari, virgas vinciri, spinas runcari, cremariq;, ex piscina immūditias efferri, munditias fieri, seruis excocta cibaria non tanta dari, quanta quum sine tempestate operantur in aruis. Vbi hæc cognita æquo animo sient, quæve reliqua opera sient, curare vti perficiantur. Rationē item vinariam oleariamq;, quid venierit, quid exactum sit, quid reliquū sit, quidq; sit, quod veneat, quæ satis accipienda sient, satis accipiantur, reliqua quæ sient, vt compareant. Si qua desint in annum, vti comparentur, quæ supersint, vti veneant. Quæ opus sient locato, locentur, quæ deinde opera fieri velit, & quæ locari velit, vti imperet, & ea scripta relinquat. Vendat oleum, si pretium habeat, vinum, frumētumq; quod supersit, vendat. Boues vetulos, armenta reicula, oues reiculas, lanam, pelles, plostrum vetus, ferramenta vetera, seruum senem, morbosum, & si quid aliud supersit, vendat. Patrem familias vendacem, non emacem esse oportet. Sed quum dixerim nostrum hunc patrem familias doctissimum esse oportere, ac plurimarum scientiarum callentissimum, nollem tyronum animos ex diffidentia detertere ad hanc artem consequendam, immò vellem vt maiori cum ardore, & animi alacritate ad metam aspirarent. Fulmen eloquentiæ Demosthenis Ciceronem non perterruit ad eum imitandū, neq; fulgura Ciceronianæ eloquentiæ Brutum, Cælium, Pollionē, & Messalam deteruerunt: nec Virgilium ad summum Musarum culmen ascendisse absterruit Actium, nec Platonis philosophia Aristotelē. Vnde si pater familias non erit Philosophus sicut Democritus, aut Pythagoras, nec Astrologus, vt Meton, Eudoxus, Calippus, aut Ptolemæus, nec de terræ qualitate iudicāda peritus, vt Triptolemus, vel Aristæus, nō ob id vellem hanc artē crassa Minerva pertractaret: nam multum à veritate absunt, (vt

rudes



rudes quamplurimi putant) hanc artem facillimam, & ab omnibus pertractari posse constituentes.

*Qualem oporteat esse rusticum officio villicationis præfectum.*

## CAP. VIII.

**A**RISTOTELES, vt diximus, in Politicis ad eò miris laudibus Agriculturam extollit, vt libero homine digna faciat, mox optimam ciuitatem describendo, quasi suimet oblitus, ciuili viro indignam iudicat, eiusque operibus seruos relegat: sed qui id optimè considerauerint, maximū Philosophum non sibi cōtrariari cognoscet: nam sicut in homine videmus animā imperantem, corpus verò, vt instrumentum, ei seruiens, ita & viri sunt, qui non nisi speculari, & scire apti sunt, in quibus viget anima: sunt & alij, quibus torpet, vires verò corporis luculentas habent. Operatrices artes binis partibus discriminatæ sunt, altera modum operandi iubet, altera iussa exequitur, prima ex anima, secunda ex corpore proficiscitur. Sic ea Agriculture pars, quæ cælorum situs, tempora, & soli qualitates speculatur, liberi hominis est, & iam in ea exerceri nostrum patrem familiās diximus: quæ verò corporis vires exercet, hæc arat, fodit, pastinat, & colit: in hac rusticum villicationis præfectum instituendum proponimus, vt hic pareat, ille imperet. Sed quis docebit futurum villicum, si nullus professor est? Difficillimum putat Columella ab vno velut auctore cuncta consequi rusticationis præcepta, vnde plurimos cōsulat eius partium consultißimos oportet magistros, bonos aratores, optimos fossores, fœnisectores, arboratores, & vinitores: cōplurium igitur agrestium artibus formatus sit oportet, qui villicationis officium suscepturus erit. Is ergo à pueritia edocendus, & rusticis operibus educandus, multisq; prius experimentis inspiciendus erit futurus villicus. Ætas nec prima, nec vltima conueniet, nam serui sic tyrunculum contemnunt vt senem. quoniam ille nondum nouit opera ruris, hic exequi iam non potest: illum adolescentia negligentem reddit, hunc senectus facit pigrū: media igitur ætas à trigesimo vsq; ad sexagesimum annum officio aptissima. Xenophon hunc beneuolum, diligentem, imperio aptum, & iustū exoptat. beneuolentia facit vt obsequētes habeat operas. obsequentes equi à domitoribus delinimento aliquo demulcentur, reluctantes virga cōpelluntur. Seruos qui ventri indulgēt, gulæ illecebris, ambitiosos laudibus excitabis. In hac ætate villicus scientissimus, & robustissimus sit oportet, & vt doceat subiectos, & ipse commodè faciat quæ præcipit: siquidem nil benè sine exemplo docetur. & sit operariorum magister, non discipulus. Nec solum rusticationis, sed imperitandi scientiam habeat. Imperitandi parum prudentes aut sæuius, aut lenius agendo rem perdunt. Potissimum autem est in hoc magisterio existimare quale officium cuique iniungendum: nam nec valentissimus posset exequi quod imperatur, si nesciat quid agat, nec peritissimus, si sit inualidus. Considerare debet opera virium, tanquam promouendi onera, portandiq;: quæ minus virium plus artis, sicut putationibus, & infi-



tionibus : sic aliqua viribus & arti sociata, vt fodiendi, arandi, segetes & prata  
 secandi. Cato vigilantem probat. Primus cubitu surgat, postremus cubitum  
 eat. Columella vult vt omnium primus familiam cōstantem producat, & ipse  
 strenuus præcedat. Maximè enim referre dicit primo mane opus aggredi, vt  
 velut in aliquod præliū cum vigore, & alacritate eum, tanquam ducē sequan-  
 tur, & neminem post se relinquat, variisq̃ue exhortationibus in opere ipso ex-  
 hilarer laborantes, & interdum tanquam deficienti succursurus ferramentum  
 auferat, & ipse suo officio fungatur, moneatq̃; sic fieri debere, vt ab ipso for-  
 titer sit effectum. Quum verò rectum subierit, non in suo domicilio delite-  
 scat, sed agat cuiusque maximam curam. Si quis in opere sauciatus fuerit, vel 10  
 languidior factus, in valetudinarium deducat, & conuenientem curam adhi-  
 beri iubeat. Nullum, inquit Xenophon, est, quod plus gratiæ sit habiturum,  
 quàm seruos, vbi in morbos inciderint, curare vt curentur. Nec minor cura  
 eorum, qui rectè valebunt, vt cibus & portio præbeatur. Assuescantq̃ue circa  
 larem domini epulari, & ipse in eorum conspectu similiter epuletur. Fortissi-  
 mum quenque largitionibus prosequatur, nōnunquam suæ mensæ adhibeat,  
 & aliis honoribus dignetur. Communicandū quoq̃; cum iis quæ faciunda sunt  
 opera, quōd ita quūm sit, minus se despici putant, atq̃; aliquo numero haberi  
 à domino. Studiosiores ad opus fieri liberalius tractādo, aut cibariis, aut vesti-  
 tu largiore, aut remissione operis, cōcessionēve, vt peculiare aliquod in fundo 20  
 pascere liceat, aut huiusmodi rerum. Pro beneficio gratiā referat, vt alij rectè  
 facere discant. Si quis quid deliquerit, bono modo vindicet. Hæc Catonis, &  
 Varronis oracula à Columella dilucidata. Considerare debet quòd imperia in  
 maioribus rebus difficulter custodiuntur, ne aut crudeliùs, aut remissiùs agat  
 cum subiectis. Foueat bonos, parcat minus probis, & ita temperet, vt magis  
 eius vereantur seueritatem, quàm sæuitiam detestentur, custodiatq̃; potius ne  
 peccet operarius, quàm quum peccauerit, seuerè puniat. Et si aliquibus quid  
 grauius sit imperatum, aut animaduersum, consolando eorū restituat volun-  
 tatem, ac beneuolentiam in dominum. Nulla maior custodia, quàm quorun-  
 dam operis exactio. Verum est M. Catonis oraculum. Nihil agendo homines 30  
 malè agere discunt. Sic operarij diligenter exequentur sua munia, & post ope-  
 ris exercitationem fatigati, potius cibo, & somno, quàm maleficiis se dederint.  
 Cultā, vestitamq̃; familiā vtiliter magis habeat, quàm delicatè, id est munitam  
 diligenter à frigoribus, & imbribus, quæ vtrāq̃; prohibentur pellibus manica-  
 tis, & sagatis cucullis. Et ferialibus diebus, quibus vacant ab opere, vestes quo-  
 rūcunq̃; resarciantur, & ferramenta recognoscantur, eaq̃; semper duplicia cō-  
 paret, ne si quod in opere viciatum, à vicino petendum sit, quia plus in operis  
 seruorum auocandis, quàm in pretio rerum eiusmodi deperditur. Vini sit ab-  
 stinentissimus, quod est inimicissimum diligentiae; obliuionem enim inducit  
 vini potus. Cato. Sobrius sit semper. Ad cœnam ne quò eat. Tum etiam à Ve 40  
 neris amoribus auersus, quibus sese si dederit, non aliud quicquam possit cogi-  
 tare,



tare,quàm illud,quod diligit: ob id terminos suæ colonix egredi nō debet,nec absentia sua familiæ cessandi,aut delinquendi spatiū dare. Varro Safernæ iussu præcipit,Ne quis de fundo exeat, præter villicum,& promum,& vnum,quem villicus legat: si quis contra exierit, ne impunè abeat, si abierit, vt in villicum animaduerratur. Quod potius ita præcipiendū fuit, ne quis iniussu villici exierit, neq; villicus iniussu domini longiùs, quàm eodem die redierit, neq; id crebrius, quàm opus esset fundo. Nec solūm quæ diximus sapere oportet, sed domino fidem, ac beneuolentiā exhibere, sine quibus nihil potest villici scientia. Cato præcipit ei, Ne plus cēseat sapere se,quàm dominū. Consideret quæ dominus imperauerit, fiant. Amicos domini eos habeat sibi amicos. Iniussu domini credat nemini. Quod dominus crediderit exigat. Rationē cum domino crebro putet. Ne quid emisse velit, insciente domino, nec quid dominum celauisse velit. Alieno manū abstineat, sua seruet diligenter. Litibus familia supersedeat. Familiæ malè ne sit, ne algeat, ne esuriant, opere benè exerceat: sic facilius malo, & alieno prohibebit. Villam videat clausa vti fiet, & vti suo quisq; loco cubet, & vti iumenta pabulū habeant. Familiā ne siueris peccare. Florentinus hæc addit. Alienas rationes ne cōducatur. Non turpis lucri appetens, neq; circa vsuras inexplēbilis, sed paucis cōtentus, & semper quæ necessaria sunt vsui egērium suppeditans. Mentiri & maximè peierare formidet. Et si quid inuentum

20 melius, potius ad dominū referat, præterquā si valdè adeò vtilitas rei vrgeat, vt domini iussionē expectare nō possit. Sed pretiosissimū est, inquit Columella, intelligere quemquam se nescire quod nesciat, semperq; cupere quod ignoret addiscere: nam etsi multū prodest scientia, plus tamen obest imprudentia, vel negligētia, maximè in rusticatione. Cato. Opera omnia maturè cōficias facere: nam res rustica sic est, si vnā rem serò feceris, omnia opera serò facies. A quo Columella. Si quid perperam factū est, vel imprudētia, vel negligētia, res tamē ipsa domino decoxit, nec fieri potest, vt iacturā resarcias: nam si opus vnū tardiùs, quàm oporteat, peraētū sit, cætera quoq; quæ sequuntur, seriùs adhibentur, turbatusq; operis ordo, spem totius anni frustratur: neq; credas diem præ-

30 termissum, sed annū periisse. Venandi, & aucupandi studiū fugiendū: iis enim studiis plurimæ operæ auocātur. Aliquæ sunt quoq; rusticorū sententiæ. Officia maximè iuuenū congruunt, imperia seniorū. Genera omnia surculorū, vel frugum præclara, sed terris tuis experta cōmitte: in nouo enim seminū genere, ante experimentū non est tota spes ponenda. Locis humidis citius, quàm siccis semina degenerant. In agro periclitantur interiora, nisi colantur extrema, Necessitas feriis caret. Benè agrū colere necessariū est, optimè verò damnosum. Nequā esse agricolā quisquis emeret, quod ei præstare fundus posset. Malum esse patrem familias quisquis interdium domi faceret, quod noctu posset, nisi tantū in cœli tempestate: peiorem quoq; quod profectis diebus ageret, quod

40 feriatas deberet: pessimum verò quod sereno die potius operaretur sub domi tecto, quàm in agro. Sermonis, vel etiam per iocum omnis à cuncta fami-



lia absit turpitudine: corrumpunt siquidem bonos mores colloquia mala. Absit mendacium, nam qui mentitur vult fallere: & qui studio fallendi inuigilat, is proditor.

*Qualis villica esse debeat.* CAP. IX.

**N**E villicus noster sine iucundissima societate in villa moretur, ut si quidem necesse foret foris rusticari, operibus præesse, vel alio genere negotiari, aliam domi relinquat, ut quæ foris peracta, & congesta essent, intus custodiantur, & cætera conficere opera possit; ideo ei villicam cōstituemus. Necesse enim est, ut alteruter foris sit, qui labore, & industria res cōparet, intus verò, qui sub tecto recondat, ut si fructus, vel reliqua utensilia, quibus homi- 10  
nū genus excolitur aliturq; congerantur, habeatur, quum necesse fuerit, qui promeat: iure igitur nostro villico domesticam hanc sociam adiungemus. Itaque virum, cui frigora, & calores, & alia rusticationis opera erāt perpetienda, & victus in aperto quærendus, & iniuria propulsanda, quàm mulierem Deus fecit audaciorem, & fortio- rem. Mulieri deinceps, quòd his omnibus fecerat inhabilem, domestica negotia curanda tradidit, iccirco timidiorē reddidit, quàm virum: nam metus plurimum confert ad diligentiam custodiendi, voluitq; alterum alterius indigere, quoniam quod alteri deest, præsto plerumq; est alteri. Hæc Xenophon, à quo Cicero, & Columella. Sit ergo inter eos summa reuerentia, cum concordia, & diligentia mista. Flagret mulier diligen- 20  
tiaz æmulatione viri, negotia sua curâ, maiora, & meliora reddere. Nil sit in domo diuiduum, nihil quod maritus, aut fæmina proprium dicat, sed commune. Villica igitur iuuenis esse debet: non nimium puella propter easdem causas, quales de villici ætate diximus. Integræ quoque valetudinis, nec fœdi, nec pulcherrimi habitus: fæditas fastidiosum, nimia species desidiosum facit eius contubernalem: illa vagum villicum, & auersum suo contubernio, hæc intra tectum desidem, & complexibus adiacentem. Sit à vino, ab escis, superstitione, somno & à viris remotissima. Meminisse debet quid faciendum, & quid in posterum prospiciendum. Eundem rādem morem seruet, quem villico præcepimus. Prima eius cura sit familiam pascere. Interrogatus Caro quid 30  
in re familiari primum foret? respondit familiam pascere. quid secundum? bene pascere. quid tertium? vestire. Sit ergo primum familiæ mensa necessaria, minimè sumptuosa, minime luxuriosa, luxus inertiam gignit: nequid tamen siti, famiq; explendæ desit, ut frugalitas ubique custodiatur, ebrietas, & crapula deuitetur. Assuescat non in alto plumarum sinu sepeliri, sed aut in stramento, aut in centonibus, ita vegetior ad cuncta munia obeunda exurget. Mollities omnis arcenda, labori inuigilandū est. Tunicas lineas, siue subuculas plures habeant singuli, permutādi causa, ne dum sordescūt, triste suggerant ministerium. Deinde laboret, ut quam minimam operā villicus intra tectum impendat, cui & primo mane cum familia prodeundum est, & crepusculo 40  
peractis



peractis operibus fatigato redeundum. Cæterum munia, quæ domi capessenda, non in totum muliebri officio relinquenda sunt, sed ita deleganda ei, ut identidem oculis villici custodiatur: persuasum habere debebit, aut in totum, aut certè plurimum domi se morari debere. Xenophon apud exemplum ante oculos ponit, quarum dux haud absimile huiusmodi officio (inquit apud illum Ischomachus uxori) quod nos subituri sumus, exequi videtur. Ille quidem in orio esse apes non sinit, sed quas oportet ad opus extrà mittit, importatq; ab eis, excipit, ac seruat, donec tempus usus veniat, quæ æquè omnibus diuidit, intus fauis incubantibus præsidet, ut celeriter conficiantur. Ita ipsam  
 10 facere necesse est: si quid in agro faciendum, foras seruos emittere, si quid in villa, intra parietes continere, atque animaduvertere, ne diuturna cessatione frustrentur opera. Quæ domum inferuntur, diligenter inspicere ne delibata sint, & ita explorata, atque inuiolata recipere: tum separare, quæ consumenda sunt, & quæ superfieri possunt custodire, ne sumptus annuus, menstruus fiat. Quæ inferuntur idoneis locis recondat, ut sine noxa permaneant, curandumq; ubi quidq; reponatur, ut quum opus sit, promiatur. Vetus est proverbi-  
 20 bium, pauperiem certissimam esse, quum alicuius indigeas, uti eo non posse, quia ignoretur, ubi proiectum iaceat, quod desideratur. Itaque in re familiari laboriosior est negligentia, quam diligentia. Excelsissimum igitur conclaue pretiosa vasa, & vestes habeat: quod deniq; horreum siccum atq; aridum, frumentis habetur idoneum, quod frigidum, optimè vinum custodit, quod benè illustre, fragile supellectile, & ea postulat opera quæ multi luminis indigent. Hæc postquam secreuimus, & suo quæq; loco reposuimus, villicæ curæ relegamus, ut quodcunq; opus sit, sciat unde det, & meminerit, quid & quando, & cui dederit, & quum receperat, ut quicquid suo loco reponat. Præterea non minor cura esse debet, ne supellex, vestisve condita situ dilabatur, aut fruges aliave utensilia, sua desidia, corrumpantur. Illud perpetuò obseruandum, ut eos, qui foris rusticari debebunt, quum iam familia è villa processerit, requirat si quis contubernalis intra tectum tergiterfans fefellerit, sciscitetur desidiæ causam, an aduersa va-  
 30 litudine restiterit, & si compererit simulantem languorem, sine cunctatione in valetudinarium deducat: præstat enim opere defatigatum sub custodiam requiescere vnum, aut alterum diem, quam pressum nimio languore veram noxam concipere. Deniq; non sedentaria eius opera est, sed modo ad telam, modo ad eos, qui cibum familiæ conficiunt, inuisere, tum bubilia, & præsepia mundanda curare. Valetudinaria si vacent ab imbecillis, aperire, & immunditiis liberare, ut quum res exegerit, benè ordinata & salubria languentibus præbeantur. Nec minus interesse pastoribus in stabulis fructum cogentibus, aut foetus ouium, aliarumve pecudum subrumantibus; & consuris vellerum interesse, & lanas diligenter percipere, vellera ad numerum pecoris recensere:  
 40 tum insistere atrientibus ut ferramenta deterfa nitidentur, atque rubigine liberentur, & si refectiorem desiderant, fabris concinnanda tradantur. Præ-



terea ea cōficere addiscat, quæ variis temporibus vsu veniunt, ad famulis quotidie ad cibum necessaria suppeditandum. Videlicet vt ex vino vapido acetum fiat: Muria quomodo dura fiat. Circa vernum æquinoctium herbas has condant, & reponant, cymam, caulem, capparim, apij coliculos, rutam, olus atrum, ferulas, pastinacæ agrestis flores, & sariuæ, alparagos, ruscum, nepitam, lapsanam, & fœniculum. Æstate circa messem cœpas, corna, pruna, pyra, mala acetato, vel melle feruet. Laserem, appropinquante vindemia, condiant, portulacam, olus atrum, desiccet in Sole mala, pyra, ficus, vuas; non minima enim horum pars in rusticanum cibum assumitur. Debet & vasa vindemiæ præparare, vt decemmodias, trimodias, fiscellas texendas & picandas dare: nec minus fasciculas, & vngues ferreos quamplurimos parandos, exacuendosque, & similia vsui necessaria. Multas vini condituras, sapam & de frutum coquere. Remedia ad acescens vinum cōficere. Condere cydonia, vuas ollares, mala granata, & reliqua mala, multaq; olearum genera, eaq; præparare, quæ ad oleum cōficiendum necessaria: ante vindemiam, vt lignorum copiam, scalas, corbularum, modias, decemmodias, & similia præparet.

*Villa operarios quales esse oporteat.* C A P. X.

**N** V N c villicum nostrum edocebimus, qualis corporaturæ, & doctrinæ villæ operarij esse debeant, vt commodè iis in operibus vti possit. Non igitur eligēdi serui sunt ex vrbe, vel qui delicatas artes exercuerint, socors quidem, & somniculosum id genus hominum est, ocio, alex, popinæ, & lupanari-  
bus assuetum: nam iisdē ineptiis alios corrumpunt. Eligendi sunt ab infantia durati, & si tales obtineri non potuerint, præficiantur, qui laboriosam seruitutem tolerauerint, & primam iuuetæ ætatem transcendērint. Varro: Agri coluntur hominibus seruis, aut liberis, aut vtrisque. Grauius loca villicus noster mercenariis potius, quàm seruis colere iubeat, & in salubribus quoq; locis opera rustica maiora. Operarios parandos esse, qui laborem ferre possint, nec minores annorū viginti duorum; & ad agriculturam dociles. Mancipia esse oportet neq; formidolosa, neq; animosa, vt ex Cassio transfert. Bubulco satis est vocis, & corporis proceritas, hæ res metuendū pecoribus efficiunt: sed tēperet vires clementia, quoniā terribilior esse debet, quàm sæuior, vt & obsequantur eius imperio, & diutius perennent boues nō confecti vexatione simul operū, verberumq;. Quamuis necessaria, nō tamen satis est indoles mētis. Longissimum aratorem faciemus, quod in re rustica nullo minus opere fatigatur prolixior, quia in arando stiuæ penè rectus innititur. mediastinus qualiscunq; status potest esse, dūmodo perpetiēdo labori sit idoneus. Cassianus rationē addit Columellæ præceptis. Longum corpus fortiter incumbit stiuæ, totūq; vomerem de grauat, ne in superficie sulcus ducatur, sed & plagæ ex alto delatæ magis cōtingunt ipsos boues: nam si parui existant, boues præcedentes eos occultant, nec possunt ea, quæ ante boues ipsos sunt, contueri. Caprarios leues, & cele-  
res esse



res esse oportet, ut caprarum velocitatem assequi possint. Vineæ non sic altos, quemadmodum latos, & lacertosos vinitores exigunt: nam hic habitus fossuris, & putationibus, cæterisque earum culturis magis aptus. Minus in hoc officio quam in cæteris agricolatio frugalitatem requirit, quia & in turba, & sub monitore vinitor opus facere debet. Puerilem ætatē ad agriculturā aptitudinem maximā habere dicunt, etsi vnaquæq; ætas idonea sit: nam pueri per ætatem enutrientur ad operas, & subseruientes, & ad singula quæ fiunt, diligenter animū aduertentes, facileque flectere se potentes ad gramen euellendum, & folia decerpenda, ac frondes, & naturā terræ experientia, operaque, & industria ex senioribus addiscentes. Magistros pecoribus oportet ponere sedulos, & frugalissimos: ea res vtraque plusquam corporis statura, roburque confert huic negotio, quoniam id ministerium custodiæ diligentis, & artis officium est. Iubet Columella operarios in classes diuidendos, & non maiores quam denum hominum faciendas, quas decurias appellauerunt antiqui, & maximè probauerunt, quòd is numeri modus in opere commodissimè custodiretur, nec præeuntis monitoris diligentiam multitudo confunderet. Itaque si latior est ager, in regiones deducendæ sunt & classēs, diuidundūque ita opus, ut neque singuli, binive sint, quoniā dispersi non facile custodiuntur. Neque tamē supra decē, ne rursus ubi nimia sit turba id opus ad se pertinere singuli non existiment. Hæc ordinatio non solum cōcitatur æmulationē, sed & deprehendit ignauos. Sed qualis opportunus numerus operatorum in villa foret, Cato declarare laborauit, ad duas mortationē dirigens, ad certū modum agri, & genus sationis, exemplūque in oliueto & vinea tradidit. Oliuetū agri ducentorum quadraginta iugerū, habere oportet villicum, villicā, operarios quinque, bubulcos tres, subulcū vnum, asinarium vnum, opilionem vnum, summa hominum tredecim. Alteram formulam describit de vinearū iugeribus centis, ut dicat haberi oportere hæc, villicū, villicam, operarios decem, bubulcū vnum, asinarium vnum, subulcū vnum. Sed Varro Sæternæ opinione scribit, satis esse ad iugera octo hominē vnum, & debere eū fodere diebus quadragintaquinque, tametsi quaternis operis singula iugera possit, sed relinquere se operas tredecim valetudini, repestati, inertiæ, indulgentiæ. Sed Licinius satis, ait, dilucidè horū neuter modulos relinquit. Quod si Cato proportionē vti voluit, ad maiore fundum, & minore adderemus, & demeremus. Præterea extra familiā debuit dicere villicum, villicā. neque enim si minus c c x l iugera oliueti colas, non possis minus vno villico habere, nec si bis tanto ampliore fundum, aut eo plus colas, ideo duo villici, aut tres habendi fuere. Operatorij modo, & bubulci proportionē demendi, vel addendi ad minores, maioresve modos fundorum. Hi quoque si similis ager est: si est ita dissimilis, ut totus arari non possit, ut si sit cōfragosus, aut aridus cliuus, minus multi opus sunt boues, & bubulci. Vnde ex his, aliisve rationibus Catonis rationi non assentitur, sed potius Sæternæ, qui ait singula iugera quaternis operis vno operario ad cōficiendum satis esse. Sed si hoc in Gallia satis fuit, non continuo



idem in agro Ligustico montano. Itaq; de familiæ magnitudine, & de reliquo instrumento tria vult animaduertenda. In vicinitate prædia cuiusmodi sint, & quanta, & quot quæq; hominibus colantur, & quod additis operis, aut demptis, melius, aut deterius habeas cultum.

*De cœli electione pro villa comparanda. C A P. XI.*

**P**RÆCEPTA cœli electionis agri prosequemur. Primum est Catonis oraculo sancitum. Prædium quum comparare cogitabis, sic in animum habeto, vt ne cupidè emas, nève opera tua parcas visere, & ne satis habeas semel circumire. Quoties ibis, toties magis placebit quod bonum erit. Vicini quo pacto niteant id animum aduertito: in bona regione benè nitrere oportebit. 10  
Circumspicias vt bonum cœlum habeat, ne calamitosum fiet. Vtilissimus, inquit Vatro, is ager, qui salubrior est, quàm alij, quòd ibi fructus certus, contraq; in pestilenti, calamitas, quamuis in feraci agro, ad fructus colonum peruenire non patitur. Etenim vbi ratio cum Orco habetur, ibi non modo fructus est incertus, sed etiam colentium vita. Quare si salubritas non est, cultura non aliud est, quàm alea domini vitæ, ac rei familiaris. Duoq; in primis spectasse videntur Italici homines, colendo possent ne fructus pro impensa, ac labore reddere, & vtrum saluber locus esset, an non: quorum si alterutrum decollat, & nihilominus quis vult colere, mente est captus, atq; ad agnatos, & gentiles est deducendus. Nemo enim sanus mente, debet velle impensam, 20  
ac lûmptum facere in culturam, si videt non posse refici; nec si potest reficere: fructus, si videt eos fore, vt pestilentia dispereant. Columella eadem, quæ hi, habet. Palladius modum demonstrat aërè cognoscendi. Quatuor rebus agriculturam constare scribens, aëre, terra, aqua, & industria. Ex his tria naturalia, vnum facultatis, & voluntatis. Naturæ est quod in primis spectare oportet, vt eis locis, quæ colere destinabis, aër sit salutaris, & clemens. Et aëris salubritatem declarant loca ab infimis vallibus libera, & nebularum noctibus absoluta, & habitatorum considerata corpuscula, si eis color sanus, capitis firma sinceritas, inoffensum lumen oculorum, purus auditus, & si fauces com- 30  
meatum liquidæ vocis exercent. Hoc genere benignitas aëris approbatur, his autem contraria noxium cœli illius spiritum confitentur. Didymus. Loci marini, vt plurimum salubriores sunt, & montani, & accliues, ad Boream vergentes: qui verò prope paludes, & stagna, aut locis concauis, aut ad Austrum ventum, aut ad Occidentem inclinati, sunt morbofi. Vitruuius. Saluberrimus locus erit excelsus, non nebulosus, nō pruinosus, regiones cœli spectans neq; æstuosas, neq; frigidas, sed rēperatas. Euitetur palustris vicinitas: nam quum auræ matutinæ cum Sole oriente ad locum peruenerint, & iis ortæ nebulae adiungentur, spiritusq; bestiarum palustrium venenatos cum nebula mistos in habitatorum corpora flatus spargent, efficient locum pestilentem. Locus si 40  
secundum mare erit, spectabitq; ad Meridiem, aut Occidentem, non erit fa-  
luber,



luber, quia per æstatem cœlum meridianum Sole exoriente calescit, meridie ardet. Qui spectat ad Occidentem, Sole exorto tepescit, meridie calet, vespere feruet. Plinius contraria his habet, inquiens: Attilius Regulus ille, Punico bello bis consul, aiebat, neque fœcundissimis locis insalubrem agrum parandum, neque effœtis saluberrimum. Salubritas loci non semper incolarum colore detegitur, quoniam assueti etiam in pestilentibus durant. Præterea sunt quædam partibus anni salubria, nihil tamen salutare est, nisi quod toto anno salubre. Sed tot variæ de æris salubritate sententiæ ne legentium animos in ambiguum remorentur, ita cōciliare tentabimus. Est nobis profectò, ut vil-

10 lam in salubria ære habeamus, vehementer elaborandum: quùm viderimus maiores nostros, ne cœlum graue habituri essent, & incommodum, prudenti quidem & maxime salutari consilio, & omni penitus diligentia præcauisse: nam terram, & aquam si quid habeant in se vitij, corrigi posse docebimus: cœlum verò nulla ingenij ope, humanæve industria quit flecti: & spiritus, quo ipso vno maximè vitam trahimus, & seruamus, purissimus sit oportet, ut sani semper viuamus. Neq; est quem fugiat in nostris corporibus maximam vim habere. Acutiori ingenio præstare homines videmus, qui cœlo fruuntur puriori, quàm qui crasso, vdoque. Aëris est saluberrimus, qui purgatissimus, & quàm purissimus est, visus acie liberrimè peruius, pellucidus, leuissimus, co-

20 quabilis, & minimè varius. Sic pestiferum illum dicimus, qui nebularum, aut vaporum spissitudine concretus, & fœrulentus, ut quasi quoddam graue hæreat superciliis, atq; aciem premat. Et si alias ob causas maximè solibus, & ventis ita redditur. Aërem, qui vehementissimè efferuescit, grauem, crassumque arguunt; argumento Solis radios acrius agere si densum offendant, quàm rarum. Ægyptij perpetuo, & quasi constanti æris tenore præ cæteris à Deo donati sunt, & præsertim qui ad Libyam vergunt, quod ibi nunquam auræ variantur, & integerrima valetudine sunt, ut scribit Herodotus. Romæ aër calescit, frigescitq; illico, ob id insaluber. Ventis ex ipsa locorum facie, aërem attenuant, incrasstantque. Auræ præstantiores, quàm venti, & venti mediocres,

30 quàm immodici, & violenti. Sed hi minus molesti, quàm immobilis aër: nam immobilis, ut aqua putrescit. Aër motu hilarescit: nam surgentes è terra vapores, aut dissipat, aut motu incalescendo concoquit. Commodi venti sunt, qui obiectis mōtibus fracti, vel syluis, vel longa commigratione lassi, sed non per infecta loca pertranseunt, ne malum ad nos deferant. Idcirco vitanda viciniæ, ex qua noxium quid effluat, veluti teter odor barathri, cloacæ, vaporum palustrium, fœdarumq; aquarum: nam aqua nulla fœdior, quàm quæ nullo motu contabescit. Virandus aër ex fluuiis ortus, qui imbribus excreseunt; nam aërem frigidum, & crassum dicunt. Plinius Theophrastum, & Hippocratem sequutus, Aquilonem ait, ad restituendam, seruandamq; salutē commodum, Austrum hominū, pecudumq; generi infestissimum. Ciconia nunquam se Austris committit. Delphini per Aquilonem voces audiunt, Austro

40



tardius, & non nisi ex aduerso redditas. Spirante Aquilone, anguillam ternos dies sine aquis durare, Austro non item. Auster pituitosos reddit, Corus tussim affert. Meridianū mare improbat, quod duos pati soles videatur, vnum cœlo, alterū ab aquis inurentem. Maximam illic fieri aëris varietatem, Sole cadente, vbi frigentes vmbrae noctis adueniunt. Maturinae auræ improbantur, quod crudos surgentes vapores adferant. Homerus verissimè omnino antelucanas è flumine auras insalubres tradidit. Nullo loco indecentius villa erit, quàm quæ intra vallem abdita sit: nam omni prospectus amœnitate intercepta, sine vlla dignitate delitescit: nam & imbrium ruinis obruitur, & circumfluentibus aquis infunditur, & modico imbibito humore, continuò madescit, & vaporem valerudini noxium semper effumat. Ingenia hebetatis spiritibus non valebunt, nec corpora durabunt. Si ingreditur Sol, reciprocatis vndique radiis torrebuntur, si nō illustrantur Sole, torpescunt, & recrudescunt. Adde, si ventus in ea penetrat, quasi canalibus coactus, molestius quàm par est furit: si non ingreditur, concretus illic aër putrescit. Conuallem istam non indecenter aëris lacunam, stagnūmve vocare possumus. Itaque locus vbi aër amœnus sit, neque humilis, & quasi immersus, neque celsus, & supereminens, sed mediis collibus, optimus vocabitur: in eo enim lætissimus aër assiduo spiritu mouebitur. Arbores in vnam partem inclinatae, aut refractae, infestis ventorum motibus cecidisse ostēdunt. Saxa locis innata si summotenus putria fuerint, aëris intemperie nunc ardescens, nunc torpentis ostentant. Vitanda igitur loca, in quibus vehementes eiusmodi tempestates grassantur: nam hominum corpora caloris, aut acri vi frigoris si vexantur, tota coagmentatio labefactatur, adq; morbos, & immaturam senectutem compellitur. Crasso aëre non famelices, sicco sities.

*Quomodo cœli vitia emendari possint.*

C A P. XII.

**S**ED Columella dicit. Quum sapientis sit patrisfamilias non vbique emere, aut vbertatis illecebris, aut deliciarum concinnitate: sic verè industrii est, quicquid aut emerit, aut acceperit facere vtile, & fructuosum, quoniā & grauioris cœli multa remedia priores tradiderūt, quibus pestifera lues minigetur. 30 Varro. Salubritas, quæ ducitur è cœlo, non est in nostra potestate, sed in Naturæ, vt tamen multum sit in nobis, quod grauiora, quæ sunt, ea diligentia leniora facere possumus; etenim si propter terram, aut aquam, odorēve, quem aliquo loco eructat, pestilentior est fundus, aut propter cœli regionem ager calidior sit, aut ventus nō bonus flet, hæc vitia domini scientia emendari possunt, ac sumptu, quod permagni interest vbi sint posita villa, quo spectent, porticibus, ostiis, ac fenestris. An non ille Hippocrates Medicus in magna pestilentia, non vnum agrum, sed multa oppida, scientia seruauit? sed quid necessum est illum vocari ad testimoniū? quum Varro ipse, quum Corcyrae esset exerci-



exercitus, ac classis, & omnes domus repletæ essent ægrotis, ac funeribus, immisso nouis fenestris Aquilone, & obstructis pestilentibus, ianuaq; permuttera, ceteraq; eius generis diligentia, suos comites, ac familiam incolumes reduxit? Si aer pestifer ex vicinia palustrium locorum erit, remedium à Vitruuio peremus. Si paludes excelsiores fuerint mari, hac ratione emendabimus. Fossis enim ductis, sit aquæ exitus ad litus, & ex mari tempestatibus aucto, in paludes redundantia motionibus concitatur, amarisq; mixtionibus non patitur bestiarum palustrium genera ibi nasci, quæque de superioribus locis nato proxime litus perueniunt, in consuetam salitudine necantur. Sic etiam  
 10 de terræ infœcunditate considerare debemus.

*De sita villa eligendo.* CAP. XIII.

**D**IXIMVS de cœlo, subiungemus de situ non minus necessaria, quàm quæ de cœlo dicta sunt. Potest enim optimus situs cœli malignitatem emendare, & bonitas à situ rependi potest: contra qui situ abutuntur, poterunt peruertendo damnosum reddere: ideoque non segniter maiores nostri de eius electione non prætereundas admonitiones reliquerunt. Varro tria agrorum genera tradidit, campestre, collinum, & montanum, è quibus infimis alia cultura aptior, quàm summis, quòd hæc calidiora, quàm summa; sic collinis, quòd ea tepidiora, quàm infima, aut summa. Itaque vbi lati campi,  
 20 ibi magis æstus, & eò in Apulia loca calidiora, & grauia. Et vbi montana, vt in Vesuuio, quòd leuiora, & ideo salubriora. Qui colunt deorsum, æstare magis laborant, qui sursum, magis hyeme: verno tempore in campestribus maturius eadem illa feruntur, quàm in superioribus, & celerius hîc, quàm illic coguntur. Nec non sursum, quàm deorsum tardius feruntur, ac metuntur. Propter hæc tria fastigia formæ, discrimina quædam sunt sationum, quòd segetes meliores esse existimantur campestres, vineæ collinæ, syluæ montanæ. Campester locus is melior, qui totus æquabiliter in vnam partem vergit, quàm is, qui est ad libellam æquus, quod is quùm aquæ non habent delapsum, fieri solet vliginosus, eò magis si quis est inæquabilis, eò deterior, quod sit propter  
 30 lacunas aquosus. Igitur optimum villæ situm describit Cato, qui sub radice montis fiet, & in Meridiē spectet. Columella item referente, Peritissim rusticarum rerū tria genera terreni esse dixerunt, cāpestre, collinū & montanum. Campū non æquissima sitū planitie, nec perlibrata, sed exiguè prona, collem clementer, & molliter exurgentem, montē non sublimem, & asperū, sed nemorosum, & herbidum maximè probauerunt. Mox perfectā describens villæ formā, ait. Agrum habeas salubri cœlo, vberigleba, parte campestri, parte aliâ collibus, vel ad Orientem, vel ad Meridiem molliter deuexis, terrenisque aliis cultis, atque aliis syluestribus, & asperis. Palladius verò omnia colligens satis absolutè eum describit. Situs verò terrarum, neq; planus, vt stagnet, neque præruptus, vt defluat, neque obrutus, vt in imum deiecta valle subsidat,  
 40



neque arduus, vt tempestates immodicè sentiat, & calores. Sed ex his omnibus utilis semper est æquata mediocritas, & vel campus apertior, & humorem pluuium cliuò fallente subducens, vel collis molliter per latera inclinata deductus, vel vallis cum quadam moderatione, & aëris laxitate submissa, vel mons alterius culminis defensus obiectu, & à molestioribus ventis aliquo liber auxilio; vel sublimis, asper, sed nemorosus, & herbidus. Didymus: ad sanitatem & speculationem, & regionis collustrationem locus aptissimus existit in altioribus locis ædificatus. Sed situs si eligendus, sit in frigidis prouinciis Orienti, aut meridiano lateri oppositus, ne alicuius magni montis obiectu, his duabus partibus exclusis, algore rigescat, aut per partem Septentrionis remoto, aut per Occidentem in vespertinam Sole dilato. In calidis verò prouinciis pars potius septentrionis optanda est, quæ & utilitati, & voluptati, & saluti æqua bonitate respondeat. Plinius eadem. Spectare in æstuosis locis septentrionem debet, Meridiem in frigidis, in temperatis exortum æquinoctialem.

*De villa solo idoneo eligendo. CAP. XIIII.*

**A**GRICULTURÆ omnes optimi præceptores iubent non minorem curam in soli electione, quam in cœli esse impendendam. Ob id ad eius bonitatem inuestigandam quamplurima signa docuerunt. Nos omnium sententias ad trutinam expendemus. Et si quibuscunque huius villæ partibus, utpote vinea, segete, pomario, horto, & reliquis peculiare solum descripsimus, lubet hic de vniuerso villæ solo verba facere, quum plurimum intersit, quo solo, quam arborem seueris: neque omnes arbores omni terra gaudent, sed vnaquæque suam peculiarem exposcit, quam si adipiscantur, multo longiores radices felicius depromunt, altius hærebunt, vberioremq; fructum largientur. Arbor enim eo fecundior, quo terram propriorem nacta fuerit. Inter tot terrarum genera aliquod est, quod hæc arbor feligat, & magis amet, & hæc alio potius delectatur, & est aliud, quo plures gestiant. Xenophon multò facilius terræ ingenium, quam hominis, vel equi experiri posse dicit: nam in promptu esse, facilemq; se ad cognoscendum omnibus præbere. Signa sunt a sapore, odore, colore, pondere, ab ea nascentibus, aliisque signis, quæ recensemus. A gustu incipiemus. Virgilius in Georgicis.

*Salsa autem tellus, & quæ perhibetur amara,  
Tale dabit specimen. Tu spisso vimine qualos,  
Colla q; prælorum fumosis deripe testis.  
Huc ager ille malus, dulcesq; a fontibus vnde  
Ad plenum calcentur, aqua eluèbitur omnis,  
Scilicet & grandes ibunt per vimina gutta.  
At sapor indicium faciet manifestus, & ora  
Tristia tentantum sensu torquebit amaror.*



Columella ab eo excipiens ait. Sapore quoque terram sic cognoscemus. Si ex ea parte agri, quæ maximè displicebit, effossæ glebæ, & in fictili vase madefactæ dulci aqua permisceantur, ac more faculenti vini diligenter colatæ gustu explorentur: nam qualem traditum ab eis retulerit humor saporem, talem esse dicemus eius soli. Idem Palladius, & Anatolius. Possumus & tactu terræ pinguedinem experiri, Virgilio docente.

*Pinguis item qua sit tellus, hoc denique pacto*

*Discimus: haud unquam manibus iactata fatiscit,*

*Sed picis in morem ad digitos lentescit habendo.*

- 10 Columella hæc declarans. Itaq; considerandum erit, si solum, quod excolere destinamus, pingue sit, quod expedita satis nobis ratione contingit discere: nam per exigua conspergitur aqua gleba, manuq; subigitur, ac si glutinosa est, & quouis leuissimo tactu pressa inhærescit, & picis in morem ad digitos lentescit habendo, eademque illi sa humo non dissipatur, ea res admonet nos, inesse tali materiæ naturalem succum, & pinguedinem. Eadem Palladius. Cognoscitur & ab odore. Anatolius ita nos admonet. Effodiunt in altum, indeque aliquid terræ extrahunt, & ab olfactu quidem meliorem experiuntur. Sed Plinius Ciceronis autoritate exactius docet. Certè Cicero lux doctrinarum altera, meliora, inquit, vnguenta sunt, quæ terram, quàm quæ crocum
- 20 sapiunt. Hoc enim maluit dixisse, quàm redolent. Ita est profectò: illa erit optima, quæ vnguenta sapiet. Quod si admonendi sumus qualis sit terræ odor ille, qui quæritur, contingit etiam sæpè quiescente ea, sub occasu Solis, in quo loco arcus cælestis deiecerit capita sua; & quum à siccitate continua immaduit imbre, tunc emittit illum suum halitum diuinum è Sole conceptum, cui comparari suauitas nulla possit. Is esse odor in commota debebit, reperusq; neminem faller, ac de terra odor optimè iudicabit. Talis ferè est in noualibus cæsa vetere sylua, quæ consensu laudatur. Nec desunt alij odores, ex quibus terræ bonitatem experiri quis possit. Sed vt sciamus quale densum, vel solum solum fuerit, Virgilium audiamus.

30 *Nunc quo quamque modo possis cognoscere dicam,*

*Rara sit, an supra morem si densa requiras.*

*Antè locum capies oculis, atq; inbebis*

*In solido puteum demitti, omnemq; repones*

*Rursus humum, & pedibus summas aquabis arenas:*

*Si deerunt, rarum. Sin in sua posse negabunt*

*Ire loca, & scrobibus superabit terra repleis,*

*Spissus ager, glebas cunctantes, crassaq; terga*

*Expecta, & validis terram proscinde iuuentis.*

- Sed Columella hoc experimentum ponit ad dignoscendam pinguem terram, hoc modo. Sed & si velis scrobibus egestam humum recondere, & recalcare, quum aliquo quasi fermento abundauerit, certum erit eam esse pinguem;
- 40



quum defuerit, exilem; quū æquauerit, mediocrem. Palladius eadem iisdem refert verbis. Diophanes verò: Scrobem fodiunt, & bonam terræ partem extrahentes, postea rursus terram in foueam iniiciunt, & si quidem injecta terra foueam expleuerit, aut redundauerit, optimam terram iudicant; si verò injecta terra fouea non expletur, non bonam esse terram pronunciant. Idemque Poëta docet pondere posse leuem, & grauem experiri.

*Quæ gravis est, ipso tacitam se pondere prodit,*

*Quæq; leuis.*

Sed optimā terræ qualitatē ex signis cognoscere docet doctissimus Theophrastus, princeps agricolarum, qui naturā arborum, & terrarum considerans, ro omnia ad mediocritatē reduxit, ut omnibus aliquo modo cōueniret; atq; hoc modo decernit. Solum quod mediam continet confusionem contrariorum, id est, soluti & spissi, sicci & humidi, leuis & pōderosi, & quī ima summis cōueniant modice, hoc omnium optimè consulit omnibus ferè arboribus, atq; frugibus: id enim proprius quodammodo aëris habitui, quàm cætera conuenire videtur. Cæterum inter hæc ipsa, quod ad alterā partem declinat, in proxima commendatione est, ut quod solutum, leue, atq; humectū est. id enim alimentum in se continet, hiat, ut radicibus facilem cōmeatum suppeditet, ut se facile prolatate possint: sunt enim radices penora & prœmi. Spillum, ponderosum, ac sitiens cōtrarium præstat. Hoc idem illi sentiunt, qui solum nigrū commen- 20 dant, ut Leophanes. Causam enim illic reddere tentat, quod genus id excipulū vtriusq; facile esse potest, imbriū & squallores, utpote quod capax tam estus, quàm humoris nimium sit. Beneficius ab eo. Optimum solū nigræ terræ est, & ab omnibus præ illis laudatū: nam & in brem fert, & siccitatem. Consequens est terra fulua, quæ & flumine rigatur, limosa & vliginosa appellata, item dulcis & calida: hæc enim ad vites, & ad arbores, & ad sata aptitudinē habere cognita sunt. Sed & profunda terra laudatur, maximè si friabilis sit, & tractabilis, operiq; non repugnans, ad solam tamen arborum fertilitatem apta existit. Quin & rubra ad reliqua optima est, ad arbores tamen producendas ineptè habet. Palladius ex his eligendam terram his verbis docet. Sit gleba putris, & 30 ferè nigra, & ad tegédum se graminis sui crate sufficiens, aut misti coloris, quæ et si rara sit, tamen pinguis soli adiunctione glutinetur. Quæ protulerit, nec scabra sint, nec retorrida, nec succi naturalis egentia ferat. Color nanque non magnopere quærendus est, sed pinguedo, atq; dulcedo. Tandem eligendus est pinguis, & resolutus ager, qui minimum laborē poscit, & fructum maximum reddit. Secundi meriti est spissus, qui labore quidem maximo, tamen ad vota respondet. Sed pulla terra maximè à Catone laudatur. De qua sic Plinius. Terra tenera quæ vocatur pulla, erit optima, & operi satior. Intelligere modò libeat dictam mira significatione teneram, & quicquid optari debet, in eo vocabulo inuenitur. Illa temperatæ vbertatis, illa mollis, facilisque culturæ, nec 40 madida, nec sitiens, illa post vomerem nitescens, qualem fons ingeniorū Homerus



merus in armis à Deo calatam dixit, addiditq; miraculum nigrescentis, quamvis fieret in auro: illam, quam recentem exquirunt improbae alites, vomerem comitantes, coruiq; aratoris vestigia ipsa rodentes. Virgilius ita cecinit.

*Nigra ferè, & presso pinguis sub vomere terra,  
Et cui patre solum. (nanque hoc imitamur arando.)*

Aspectu fieri posse probationem Anatolius refert. Si in squallore non valdè rumpitur, neq; si imbres vberes, impetuosiq; deciderint, & cœnosa fiat, verùm omnem pluuiarum aquam in suum sinum excipiat, & si non frigoris tempore dorsum ipsius testaceum appareat. Hec enim, vt plurimum, bona poterit iudicari. Pulcherrimum & alium modum probationis veteres inueniunt, iridè oculis subiacentem. Si nanq; magnæ & syluosa sunt arbores syluestres ex ipsa nascentes, absolutissima pronunciari potest, si mediocres media, si verò spinas & sarmēta tenuia producat, & herbam breuem, imbecilla hæc est, & non multi pretij. Virgilius ex aspectu humidam cognoscere docet.

*Humida maiores herbas alit, ipsaq; iusto  
Latior: ab nimium ne sit mihi fertilis illa,  
Nec se præualidam primis ostendat aristis.*

Varro ex Diophanis Bithynij autoritate dicit signa sumi posse aut ex ipsa, aut ex iis, quæ nascuntur ex ea: ex ipsa, si sit terra alba, si nigra, si levis, quæ quum  
20 fodiatur faciliè frietur, naturaq; non sit cineritia, nè ve vehementer densa. Ex his autem, quæ enata sunt fera, si sunt prolixa, atq; ea, quæ ex his nasci debent earum rerum feracia. Columella satis admirari non potest cùm alios, tùm Cornelium Celsum non solum agricolationis, sed vniuersæ naturæ prudentem virum, sic & sententia, & visu deerrasse, vt oculis eius tot paludes, tot etiam campi salinarum non occurrerent, quibus ferè cōtribuuntur prædicti colores. Nullum videmus locum, qui modò pigrum contineat humorem, non eundem vel nigri, vel cinerei coloris, nisi in eo fortè fallor ipse, quod non putem aut in solo limosa paludis, & viginis amaræ, aut in maritimis atque salinarum gigni posse læta frumenta. Sed est manifestior hic antiquorū error, quàm  
30 vt pluribus argumentis conuincendus sit: non ergo color, tanquam certus author testis est bonitatis aruorū. Sed Plinius omnino negat ex signis terræ bonitatem præfagiri posse. Pulla, qualem habet Campania, nec vbiq; optima vitibus, aut quæ tenues exhalat nebulas. Nec rubrica multis laudata. Cretam in Albensium Pompeianorum agro, & argillam cunctis ad vineam generibus anteponunt, quāquam præpingues: quod excipitur in eo genere. Inuicè sabulum album in Ticinensi, multisq; in locis nigrū, itemq; rubrum etiam pingui terræ permistū, infæcundum est. Argumenta quoq; iudicantium sæpè fallunt. Non utiq; latum solum est, in quo proceræ arbores nitent, præterquā illis arboribus. Quid enim abierte procerius? aut quæ vixisse possit alia in loco eodè?  
40 Nec luxuriosa pabula pinguis soli semper indicatiū habent: nam quid laudatius Germaniæ pabulis? & tamen statim subest harena tenuissimo cespitem corio.



Nec semper aquosa est terra, cui proceritas herbarum, non hercule magis, quam pinguis adhærens digitis, quod in argillis arguitur. Scrobes quidem regeſta in eos nulla complet, vt denſa, atque rara ad hunc modum deprehendi poſſit, ferroque omnis rubiginem obducit. Nec grauis, aut leuior iuſto deprehenditur pondere. Quod enim pondus terræ iuſtum intelligi poteſt? Nec fluminibus aggeſta ſemper laudabilis, quando ſeneſcant ſata quædam aqua.

*De ſolo in agri electione fugiendo. CAP. XV.*

**D**IXIMVS terras amplexandas, comparandasque, nunc fugiendas ex ſignis cognoscere docebimus à contrariis cauſis. Quibuſdam in terris, inquit Theophrastus, ima arborum pars optimè conſtat, ſuperna verò vitioſa 10  
eſt, quod in ſolo harenoso, tophoso, aduſtoque euenit. Sabulū enim alimentocaret, ob id germina ſubminiſtrare haudquaquam valet: vnde infelix germinatio: ſuntq; in eo diſſitæ partes, ob id facilem radicibus commeatum præſtare poſſunt, vt in profundum effundantur: & ob partium raritatē item nocumenta æſtus & frigoris ad radices admittunt. Sic in paluſtribus, & luculentis. Fugendum quoq; frigidum, denſum, ſaluſumq; ſolum, quia incommodum conſtat, denſitas enim ſtrangulat ſua vehementi co hæſione. Cato inquit, Terrā caue carioſam tractes. Addit Plinius, Néve pluſtro, néve pecore impellas. Quid putamus hac appellatione ab eo rãto opere reformidari, vt penè veſtigiiſ quoq; interdicit? Redeamus ad ligni cariē, & inueniemus illa, quæ in tantum 20  
abhominatur vitia, arida, fiſtuſoſa, ſcabra, caneſcētis, exeſa, & pumicoſa. Plus dixit vna ſignificatione, quàm poſſit vlla copia ſermonis enarrari. Eſt enim interpretatione vitiorum quædam non ætate (quæ nulla in ea intelligi poteſt) ſed natura ſua, anus terra, & ideo infœcunda ad omnia, atque imbecilla. Virgilius frigidam ex naſcentibus herbis exquirere docet.

— at ſcleratum exquirere frigus  
Difficile eſt, picea tantum, taxiq; nocentes,  
Interdum aut hedera pandunt veſtigia nigra.

Improbantur à Varrone lapis, marmor, rudus, arena, ſabulo, argilla, rubrica, puluis, creta, glarea, carbunculus, id eſt quæ Sole perferuet, ita, vt radices ſa- 30  
torum comburat. Palladius. Ne alba, & nuda ſit gleba, ne macer ſabulo ſine admiffione terreni, ne creta ſola, ne arenæ ſquallentes, ne ieiuна glarea, ne auroſi pulueris lapidoſa macies, ne ſalſa, vel amara, ne vliginoſa terra, ne tophus arenofus, atq; ieiunus, ne vallis nimis opaca, & ſolida. Plinius. Terram amaram, ſiue macram ſi quis probare velit, demonſtrant eam atræ degeneresque herbæ: frigidam autem retorridè nata. Item vliginoſam triſtia, rubricam oculi, argillamque operi difficillimas, quæque raſtros, ac vomeres ingentibus glebis onerent: quanquam non quod operi, hoc & fruſtui ſit aduerſum. Anatolius ſalſam terram fugiendam eſſe ab omnibus dicit: & hic veterum conſenſus. Quum enim in ſtercore ſalem fugiamus, & amurcā ex oliuiſ ſale non con- 40  
ſperſis,



spersis, arborum radicibus affundere rerum experti præcipiant, & sterquilinia dulci, non salsa aqua rigemus. Manifestum est quòd salسام terram improbent, ad omnia ineptam, præterquam ad palmæ fructus, quos optimos producit, immò vitare oportet falsi stercoris vsum ad dulcis terræ misturam. Præterea fœtidam terram fugere oportet, vt quæ omnibus inutilis existat.

*Quomodo terra vitia emendari possint.* CAP. XVI.

**S**E D si nobis fundus non erit eligendus, sed hæreditate contigerit, quid sciendum docebimus. Dicebant enim maiores nostri non malum agrum, sed malum colonum reperiri. Immò id innuentes in hieroglyphicis Cybeleio  
 10 curru duos leones domitos adiungere hac consideratione, vt leo terræ symbolum esset, quum genus id animalium in longinquis, & à nobis remotissimis regionibus inueniatur: nullam enim dicunt esse terræ partem tam remotam, quæ coli, subigi quæ non possit. Considerandus ergo est syluestris & incultus, siccusne sit, an humidus, nemorosus stirpibus, an saxis confragosus, iuncône sit an gramine vestitus, aut filicibus, aliisve frutetis impeditus. Si humor redûdarit, vligo ea exiccanda, nemorosi, frutetosi quæ tractus, extirpandæ radicibus arbores: aut quæ succisæ fuerint, incendendæ, dein arandæ. Saxosus lapidibus expediendus est. Iunci & graminis pernicies repastinatione frequenti inter-  
 20 necanda, filix assiduè extirpanda, ferunt quæ; filicem sationibus, & stercoratione interimi, vt subinde nascens succidatur, intra biennium; sic eius viuacitas absumitur. ex Columella. Plinio hæc displicent: ait enim. Terram terra emendari (vt aliqui præcipiunt) super tenuem pingui iniecta, aut gracili, bibula quæ super humidam, ac præpinguem, dementia operæ est. Quid enim potest sperare qui talia colit? Si ager ad cultum seu siccitate, vel aquarum nimietate & molestia aptus nequicquam sit: hoc pacto emendabimus. Vineam in prato, & humecto loco facies sic. Infodies ab oriẽte in occasum lineis directis & æquidistantibus foueas, quàm maximè id liceat profundas, latas pedes nouem, distantes inter se pedes quindecim, & quàm exemeris ex fossa tellurem accumulabis in area interualli, vt accliuitate meridianum excipiat solem. Istiusmodi  
 30 colliculis factis manu, vitis tutior & feracior. Contrà in colle sicco pratum facies sic. Fossam oblongam non decursoriam, sed stagnantem in parte superiore facies, margine ad libellâ collibrato, & coræ quabili, in eâ deriuabis aquam ex proximis fontibus, & superfluens à latere continua parilitate substitutum corrigabit agrum. In campestri Veronensi saxis rotundis referto, nudo, & penitus infœcundo, crebra effecere irrigatione, vt cutis obduceretur cespiticea, & pratum excreuit latissimum.

*De aqua villa eligenda.* CAP. XVII.

**N**EXTIMVS de aëre & terra, sequitur tractatio de aquis, non minus cæteris necessaria. Referemus prius quæ à maioribus relata sunt, mox nostra  
 40 subnectemus. M. Varro in villa exædificanda hoc potissimum querit, vt intra



septa villæ habeat aquam, si non quamproximè. Primùm quæ ibi sit nata. Se-  
 cundùm, quæ influat perennis. Si omnino aqua non est viua, cisternæ faciun-  
 dæ sub tectis, & lacus sub dio: ex altero loco vt homines, ex altero vt pecus vt  
 possit. Columella iubet maximè probatam haberi aquam, sine qua nemo no-  
 strum vel prosperæ, vel aduersæ valetudinis vitam proroget. Quæ sit vel in-  
 tra villam, vel extrinsecus inductus fons perennis. Si deerit fluens, putealis  
 quærat in vicino, quæ non sit haustus profundus, non amari, aut falsi saporis.  
 Si hæc quoque defecerint, vastæ cisternæ hominibus, piscinæ pecoribus in-  
 struantur, colligendæ aqua pluuiæ, quæ salubritati corporis est accommoda-  
 tissima. Huic proxima fluens aqua è montibus oriunda, si per saxa præceps de- 10  
 uoluitur. Tertia putealis, vel collina, vel quæ non infima valle reperitur. De-  
 terrima palustris, quæ pigro lapsu repit. Pestilens, quæ in palude consistit. Hic  
 tandem humor quamuis nocentis naturæ, temporibus tamen hyemis, edo-  
 mitus imbribus mitescit, ex quo cœlestis aqua maximè salubris intelligitur.  
 Plinius ab Hippocrate, & aliis, stagnantes, pigrasque damnat, vtiores quæ  
 profluunt existimat, cursu enim procursumque ipso extenuari, atque profice-  
 re: eoque miratur cisternarum ab aliquibus maximè probari, rationem at-  
 ferentibus, quod leuissima sit imbrum aqua, vt quæ subire potuerit, & pendē-  
 re in aëre. ideoque & niues præferunt imbribus, niuibuscque etiam glaciem, 20  
 velut ad infinitum coacta subtilitate. Leuiores enim hæc esse, & glaciem mul-  
 tō aqua leuiorem, quorum sententias refellit. In primis leuitas illa depre-  
 hendi aliter, quàm sensu vix potest, nullo pene momento ponderis aquis  
 inter se distantibus. Nec leuitatis in pluuiæ aqua, argumentum est subisse  
 eam in cœlum, quum etiam lapides subire appareat, cadensque inficiatur ha-  
 litu terræ, quo sit, vt pluuiæ aquæ sordium inesse plurimum sentiat, citis-  
 simeque ideo calefiat aqua pluuiæ. Niuem quidem, glaciemque subtilissi-  
 mum elementi eius videri miror, appposito grandinum argumento, è quibus  
 pestilentissimum potum esse conuenit. Nec verò pauci inter ipsos è contra-  
 rio ex gelu, ac niuibuscque insaluberrimos potus prædicant, quoniam exuctum  
 sit inde, quod tenuissimum fuit. Minui certè liquorem omnem congelatio- 30  
 ne deprehenditur, & rore nimio scabiem fieri, pruina vredinem, cognatis  
 ex niuis causis. Pluuias quidem aquas celerrimè putrescere conuenit, mini-  
 meque durare in navigatione. Epigenes autem aquam, quæ septies putrefa-  
 cta, purgata sit, perhibet amplius non putrescere: nam cisternas Medici etiam  
 confitentur inutiles, alio duritias facientes, faucibusque: etiam limi non aliis  
 inesse plus, aut animalium, quæ faciunt tædium, confitendum habent. Nec  
 statim amnium vtillimas esse, sicuti nec torrentium vllius, lacusque pluri-  
 mos salubres maximè. Limus aquarum vitium est, si tamen idem amnis an-  
 guillis scateat, salubritatis indicium habetur, sicuti frigoris, tineas in fonte gi-  
 gni. Aquam salubrem aëri quam simillimam esse oportet, cuius sapor odor- 40  
 ve nullus esse debet. Quidam statera iudicant de salubritate, frustrante dili-  
 gentia,



gentia, quando perrarum est, ut leuior sit aqua. Inter pares melior quæ calefit, refrigeraturque celerius: quin exhaustam vasis ne manus pendeant, depositisq; in humum tepescere affirmant. Ex Rufo. Potabilium aquarum quinque sunt differentia, pluuia vel cisternina, fontana, putealis, fluuiialis, & palustris: quarum pluuia leuissima, facillimeque mutabilis perhibetur: multis languoribus optima, quod statim euadat. Fontanarum quæ fontes ad septentrionem è saxis stillantes scaturiunt à Sole auersi, duri, & tardi motus inuehunt aquas, tardius incalescunt, & refrigerantur: quæ verò ad orientem emanat, per angustias, vel puram terram dilabitur, calefcit, & frigescit celerrimè: optima esset, nisi conductibus fieret deterior. Putealis frigida difficulter excernitur. Fluuiialis difficulter operatur, arefaciendo, præcipuè quum per mala diffluit loca. Præstant quæ perennibus fontibus fluunt, & aliis non ammiscetur fluuiis. Palustris omnino mala, præter Niliacam, quia cænosa, lutosa & grauis est, ob statum, moramque est tanquam mortua, & putrida. Quæ cito coquit edulia, etiam in ventre alios cibos coquit. Quæ crassitudinem, pondusque obtinet, & subsidet, & facile coit, calculosa est. Aqua quæ difficulter penetrat, difficulter coquibilis. Ex Athenæo hæc excerpimus. Homerus aquas, quæ è saxis scaturiunt, insalubres vocat. Fontanam, quæ per longa terrarum spatia fertiliū deducitur, bonitate cæteras antecellere dixit Hesiodus. Quæ fluit è Pangæi fodinis, cotyla nonaginta sex drachmas hyeme pendet, æstate sexaginta sex. Spissat enim & contrahit magis illā frigus, quàm cæteras: quapropter in horarum indicibus quum fluit, horas non reddit certas, & pares æstiuis, sed inæquales, exitu ob crassitiē tardiore. Diophanes dicit. Præ omnibus aquarum curam habere oportet, non solum propter aquæ fructum, sed etiam quod temperatissimum aërem faciat, siccitatibus obortis. Fortunatum estigitur valdè, fontanam aquam habere, quæ si desit, pluuias colligantur in nostrum, totiusque familiæ vsum sufficientes, non velut quidam facere solent in stabulum, vbi pecus ouillum & reliqua animalia stercorebus locos cortis, ac stabulorum replent, sed in domibus in quibus etiam diligenter easdem purgare, & assiduè oportet. Puram verò aquam in puteos per ligneos canalium ductus conuehere. Palladius ex his aquæ salubritatem cognoscere docet. Primum ne à lacunis, aut palude ducatur, ne de metallis originem ducat, sed sit perspicui coloris, neq; vllò aut sapore, aut odore vitietur, nullus illi limus insidat, frigus tepore suo mulceat, æstatis incendia frigore moderetur. Sed quia solet occultio rem noxam tectior seruare natura, ipsam quoque incolarum salubritate noscamus. Si fauces bibetium puræ sint, si saluo capite, in pulmonibus, ac thorace, aut nulla est, aut rara causatio: nam plerunque has noxas corporis ad inferiorem partem, quæ supra sunt, corrupta demittunt, ut vitio capite ad pulmones, vel stomachum morbi causa decurrat: tunc culpandus aër potius inuenitur. Deinde si venter, intestina, vel latera, vel renes nullo dolore, aut inflatione vexetur. Si vitia nulla vesicæ sunt. Hæc & his simi-



lia, si apud incolas pro maiori parte constare videris, de aquis aliquid ne suspiceris. Nos illam dicemus sapore optimam, quæ saporem habet nullum, & colore commodissimam, quæ omni sit colore penitus vacua, quæ lymphida, pellucida, & tenuis, quæ in candidum linteum intusa, non commaculat, quæ feruefacta faciem non dimiserit, quæ muscosum alueum, quo perfluat, & præsertim saxa coinquinata non reddiderit. Ex optima aqua multæ commoditates exoriuntur. Indiam inquit Diodorus multa ex parte habere homines proceros, & validos, ingenioq; præditos acri, quod saluberrimas aquas bibant. Est animantibus aqua, veluti caloris pabulum, vitaq; alimentum, sic plantarum, cæterorumq; quibus mortales vtuntur. Vnde quæ in terris crescunt, & adolescunt omnia, si aquam ademeris, fore, vt futura sint nulla.

*De hydrophantica. C A P. XVIII.*

**S**ED si regio aquis careat, oportet eam, vbi sit, inuestigare, vt puteos excavemus: nos hydrophanticam docebimus, sic enim Græci vocant artem aquam inuestigandi; eamq; ex Democriti scriptis colligemus. Campi, & planities, vt plurimum, aquis carent, & maiores magis minoribus, & si in eis reperiuntur, plerunque salæ sunt. Naturalis causa est. Solent semper quod tenuissimum, ac leuissimum est attrahere, quare quum campos per totam diem Sol occupet, humorem ex ipsis emulgere, & in vaporem dissolvere: vnde sæpe cõtingit, vt aquis careant: nam si aliquid relinquitur, salsum reperitur, quemadmodum & in mari euenit. Ex montibus plerosq; aquosos esse, & imas ipsorum partes humidiores, quàm summas, & densas, & vmbrosas magis humidas esse, quàm nudas. Aquæ montanæ nõ salæ, quum non per totam diem Sole exurantur, & obliquè non rectè feriat, vnde montes, qui ad septentrionem declinant, aquosiores pronunciant ad Meridiem inclinatis, & eos, qui ad orientem, & occidentem minus quidè aquosos, quàm qui ad septentrionem vergunt, at plus quàm vergentes ad Meridiem. Et densos arboribus plus aquosos, quàm nudos, propterea quod arborum densitate adumbrentur. Imæ montium partes aquosæ sunt, ob id quod aquarum naturæ est ad infernam partem deferri, & quod quæ in altis sunt, ad humiles cõgerentur, & plures fontes reperiuntur, in quibus magni montes semper incumbunt, alti, ac densi, concauos & conualles locos habentes. In talibus enim imbres per annum collectos, & per terram excolatos ipsos fontes augent. Quasdam verò aquas circa has imas montium partes non apparere, verum vbi intra terram aliquatenus subductæ cursum perfecerint, tum demum in apertum prodire. Quædam verò in mare per terram in venis productæ ad multum loci spatium scaturiunt, qualis fons in Arado, & Heraclia Ponti. Quemadmodum enim in animatis corporibus totum corpus venis, & arteriis interstinctum est, sic etiam in terra aquas habentes, vel inter se implexas, vel rariores, quas sapissimè offendunt puteorum fossiores. Quapropter fontes maximè augeri circa solstitium hybernium, Sole quidem nõ similiter



liter urgente, imbris augescentibus: sub æstiuum verò solstitium, & Canis exortum contrarium accidere. Sed Aquileges ex signis tùm soli, tùm terris nascentium, aquas subterraneas, & latentes vestigant, ex iuncis, butomo, rubis, cypero, gramine pingui, † arundine, malacocisso, cucumere sylvestri, hip-  
 10 puri, quinquefolio, & batrachio: vel heliotropio, calamintha, callitricho, meliloto, oxilapatho, sanguinali, solano, stratiore, chamæleuce (bechion vocat Plinius) chamæleone: & vbi plures herbæ densæ, & virides, agnus castus, coniza, trifolium. Plinius his addit potamogeton. Quin & vbi ipsarum aspectus marcidus apparet, propius pauimento aquas indicant inualidas, & non per-  
 20 manentes, quæ verò luxuriantis aspectus & viuidiore, aquas subesse altissimas & durabiles. Nunc soli genera dicamus, quæ aquas habent. Argillofi, & pumicosi generis, & squaliente fluxu prædita omnino aquosa. De glutinosis, lutosi, nigra terra, pingui, & calculosa desperandum. Sed vestigator hoc modo scrutabitur aquas ex Democrito. Habeat vasculum plumbeum semisphæ-  
 30 ricum, congi capacitate, accipiatque lanæ floccos molles duos, aut tres lotos, & probè carptos, eosque lino obliget; ipsum verò lini filum, intra vas ad fundum eius cum cera cōglutinet. Sed & oleo vas illinatur, & in loco, vbi aquam speramus, coniectura facta, puteus effodiatur altitudine trium cubitorum, in quo inuersum vas ponatur, & circumpositis harundinum foliis, rursus ad cu-  
 40 bitum mensuram terra aggeratur; id ipsum Sole occidente faciendum. manet terra auferatur, & herbis amotis, vas subuertatur, & consideret, si fuerint fontes lanam aqua plenam reperiet, & vasculum bullarum plenum. Aquæ qualita-  
 tem cognosces, si lanam ipsam gustaueris. Quod si multa erit humiditas, ut lachrymæ distillent, propè aquam sperato, si autem humiditas simpliciter apparuerit, adest quidem aqua, sed in alto: si nullum horum signorum appare-  
 bit, idem periculum in alio, atque alio loco facere oportebit, consideratione habita, ne disparatos locos tentemus. Alio modo etiam cognoscere docet, vbi subsit aqua. In altiore locum progrediuntur, & priusquam aër albescat, primum Solis radium obseruant, & si quid nebulosum in ipsum adtrahi, ante-  
 50 quam rareseat, appareat, aquam expectare conuenit. Obseruabis etiam in primo Solis splendore culices sursum in directum volantes, seq; ad trabis similitudinem contorquentes: nam hi aquam potrendunt. Insuper ex altiore loco animaduersionem habere: æstate in meridie, quando aër purus, & terra siccissima erit, tunc in aquosis locis vapor sursum eleuatur, & parua nebulae simili-  
 tudine, hyeme verò suffumigationem quandam & halitum eiusmodi locus remittit, similem eis, qui ex fluminibus, stagnis, & puteis efferuntur. Plinius alia addit. Aquarum sunt notæ iuncus, harundo, aut herba, de qua dictum est, multumque alicui loco pectore incubans rana. Salix enim erratica, & alnus, aut vitex, aut hederæ spontè proueniunt. Certior multò nebulosa exhalatio,  
 64 ante Solis ortum longius intuentibus, quod ex edito quidā speculantur, pro-  
 ni terram mento attingente. Est & peculiaris æstimatio, peritis tantum nota.

† calamo  
Indico,



quam fruentissimo aestu sequuntur, diciq; horis ardentissimis, qualis ex quoque loco percussus splendeat. Nam si terra sitiente humidior est ille, indubitata spes promittitur; sed tanta intentione oculorum opus est, ut indolescant, quod fugientes ad alia experimenta decurrunt. Loco in altitudine pedum quinque defosso, ollisq; è figlino opere crudis, aut peruncta pelui creta cooperto, lucernaq; ardente cōcamerata frondibus, dein terra. Si figl. num humidum ruptumve, aut in ære sudor, vel lucerna sine defectu olei restincta, aut etiam vellus lanę madidū reperiatur, nō dubiè promittunt aquas. Quidā & igne prius excoquunt locum, tanto efficaciore vasorum argumēto. Terra ipsa promittit candicantibus maculis, aut tota glauci coloris. In nigra enim scarurignes non sunt perennes. Figulari creta semper adimitur spes. Aqua semper dulcis in argillosa terra, frigidior in topho: dulces enim leuesq; facit, & colando cōtinet sordes. Sabulum exiles limosasq; promittit. Glarea incertas venas, sed boni saporis. Sabulum masculum, & arena carbunculosa, certas stabilesq; & salubres. Rubra saxa optimas, & spei certissimæ. Radices montium saxosæ, & simplex, hoc amplius rigentes. Hæc Plinius ex Vitruvio, & Palladius.

*Quæ in aquarum electione fugienda.* CAP. XIX.

**R**ESTAT fugiendarum aquarum exponamus signa. Columella deterrimam palustrem dicit, quæ pigro lapsu repit. Pestilens, quæ in palude semper consistit. Plinius. Ante omnia damnantur amaræ, & quæ scrobem statim implent. Damnantur fontes, qui cœnum faciunt, quiq; malum colorem bibentibus: refert &, si vasa ære inficiunt, aut si legumina tardè percoquunt, si liquata leniter terram relinquunt, decocta q; crassis obducunt vasa crustis. Est etiam nū vitium nō fœtida modo, verum omnino quicquā resipientis. Athenæus. Quæ gelidior, durior, & ad staterā grauior aqua est, ob eandē rationem deterior: nempe quia propter nimiam frigiditatē, & multam quam habet terrenā crassitiem, laboriosius à ventriculo conficitur. Aqua gelida, quoniā magis terrena durior est: nam quæ corpulētior, calefacta calidior, refrigerata frigidior est. Sed aqua si quid viscosi, mucidi, crudive in se admistū habet, bibentes guttosos, & calculosos reddit. Extrat Hippocratis sententia: aquam non depuratam, sed grauē, & indecenti sapore bibentes, estuosi, & remulenti fient, & cætera corporis membra, cubiti, spatula, facies, reddetur penitus extenuata, & gracilia, & vitio splenis male concreto sanguine, in morbos incident varios & pestilentes, æstate profluuiū ventris, fluente bile, & dissolutis humoribus deficient, tum aqua intercute, præcordiū angustia, & laterum anxietatibus laborabunt. Iuniores atra bile insanient, senes humorum incendio flagrabunt, fœmina agrè concipient, & perquàm difficiles partus enitentur. Omnis deniq; ætas, & lexis morte immatura intempestiuè cadet, acta atq; absumpta morbis, & dies istorū erunt semper tristes, & coinquinati malis humoribus, atq; omni perturbationum genere vexati, & animo exagitati erunt in mœrore, & tristitia. Cœlestes aquas interest, quo tempore, qua hora, quo vento flante collegeris,



geris, quove loco asseruentur. Aquas post brumâ grauiiores putant, quæ per æstare colliguntur minus dulces quàm quæ per hyemē. Primæ post Caniculam pluriæ amaræ & pestilentes sunt: adustis enim terræ mistionibus inficiuntur, & terrâ quidem ob eam rem sapere amaritudinē, quòd solibus adusta sit. hinc est quòd è tectis delapsam, quàm è terra collectâ salubriorē putant. Pœni philosophi inquiunt pluuiâ per æstatem cum tonitru collapsam impurâ, & falsedine nocuam. Nocturnū imbrem præstare diurno Theophrastus dicit, & salubriorem eum, qui flante Aquilone ceciderit. Pluuiam aquam probant, quæ purissimis è locis euaporata sit: nam plerumq; senties fœtentem, atq; forassis amarâ ex loci infectione, vnde primū is sudor euaporarit. Excoctę Sole aquę salinosę & lentosæ fiunt. Stagnantium pessimam dicunt, quæ sanguifugas alar, quæ tela superinducta pigruerit, quæ fœtore nauseam cicit, quæ colore atro & liuenti, quæ spissitudinem in vase multam asseruet, quæ mucosa grauitate lentescat, quæ si manus ea laueris, tardè siccescat.

*Aquarum vitia quomodo emendantur.* CAP. XX.

**N**ARRAT Plinius: Nitrosas atq; Salmacidas, in desertis mare rubrū petētes, addita polēta, vtilis intra duas horas faciunt, ipsaq; vescuntur polenta. Neronis Principis inuentum est, decoquere aquâ vitroq; demissâ in nives refrigerare: ita voluptas frigoris cōtingit sine vitiiis niuis. Omnem utiq; decoctam vtiliorē esse cōuenit, item calefactâ magis refrigerari subtilissimo inuento. Vitiosæ aquę remediū est, si decoquatur ad dimidias partes. Paxami hæc sunt remedia. Aquarum amaritudinē corallio contruso iniecto emendabimus, aut ordeum cōtūsum, & linteolo illigatum in aquas ponimus. Hirudines perdunt anguillæ, & cancri fluuiales aquis iniecti. Aqua nitrosa sic curanda ex Diophane. Infundatur in dolia, & sub diuū exponatur, donec resederit, & leniter in alia vasa diffundatur, relicta fœce subfidente. Florētinus. Si verò & aqua nō sit bona, neq; potabilis, sed morbosâ, coquatur donec decima ipsius pars insumatur: deinde refrigeretur, atque ita innoxia erit. Sic enim & marina aqua decocta dulcis redditur. Ne cisterninæ aquæ putrescant, hæc sunt adinuenta remedia. Sunt qui putent vitreum vas plenum sale si bene obturaueris calce subacta oleo, ne quid aquæ in vas penetret, idq; immiseris vt medias inter aquas cisternæ pendeat, fore vt aquæ illic nulla putrescant mora. Addunt aliqui etiam argentum viuū. Nonnulli putant, si vas nouum fictile acri plenum aceto, vt diximus, bene obturatum immiseris, mucosam ocrys aquam instaurari. Pisces enim aquæ mucore, terræque vligine, ali, atque depasci arbitrantur: ob id in puteum, cisternamque pisciculis iniectis reddi aquam purgatiorem. Quæ putrescere cœpit aqua, vehementer subagitata, iterum atq; iterum translata, & cōmora fœtorem amittet. Quum incidisset, inquit Iosephus, in aridū locum Moyses, & nō adesset alia nisi puteus amaræ aquæ, & sordidæ, infit exauriri, id quū fecisset miles excussione, exagitationeq; istiusmodi, potabilis reddita est. Marina aqua, inquit Solinus, argilla si percoleretur, dulcescit:



& salem adimi compertum est, vbi tenui torrentis arena iterum, atque iterum coletur. Vas fictile benè occlusum si habueris immersum mari implebitur dulci. Vbi turbulentam Nili fluminis aquam posuere. Si quid supra limbum, & marginem aquæ amygdalam perfricaueris, è vestigio clarescet.

*Reliqua, quæ ad perfectum fundi solum eligendum valde conducunt.* C A P. X X I.

**A**LIA quoque villæ sunt ad eligendum solum necessaria. Xenophon putat cultum agrum nō esse emendum, quòd bene cultus ager magno veniret, ac minimi esset reditus, sic nec vllō modo similem præberet voluptatem, atq; ille, in quo spes sit, vt cultus melior effici possit, scilicet qui ob domini sui negligentiam, siue tenuitatem incultus esset. Varro dicebat. Alia in ipsa villa sunt, vt cœlum, solum, alia extra, sed valdè ad villam necessaria. Primum ne sit vicina regio infesta: multos enim agros colere non expedit, propter latrocinia vicinorum. Secundum, quæ vicinitatis inuectos habeat necessarios, vt quæ ibi nascuntur, ibi vendât, & illinc inuectos opportunos ad ea, quæ in fundo opus sunt. Multi sunt habentes prædia, quibus frumentum, aut vinum, aliudve quid desit importandum: contra non pauci, quibus aliquid sit exportandum. Tertio eundem fundum fructuosiorem faciunt vecturæ, si viæ sunt, qua plaustra agi facilè possint, aut flumina propinqua, quæ nauigari possit, quibus vtrisque rebus euehi, atq; inuehi ad multa prædia scimus. Quarto refert ad fructus quemadmodum vicinus in confinio consitum agrum habeat: si enim ad limitem quercetum habet, non possis rectè secundum eam syluam ferere oleam. Sic iuglandes magnæ, crebræ finitimæ, fundi oram faciunt sterilem. Columella à Varrone, & aliis excipiens, aliqua addit, reliquis non minus intuenda, aquam, viam, vicinum. De aqua diximus. De via, multum conferre agris iter commodum. Primò quia domini præsentia assidua, qui libentius commeaturus sit, si viæ vexationem non reformidet; seruos quoque, qui sequuturi patrem familias sint, non agrè iter pedibus ingredi. Deinde ad vehenda, & exportanda utensilia, quæ res frugibus auget pretium, & minuit impensas inuectarum rerum. Vicini incommoditas non quidem certa, nam mors, aliæve causæ mutare solent, vnde sunt, qui Catonis sententiã damnent. Sed is non errat: nam sicut sapientis est casus magno animo sustinere, ita demeritis est ipsum sibi malam fortunam facere, quod facit, qui malum vicinum suis nummis parat. Et prouerbio fertur, Aliquid mali propter vicinum malum; sed multi prætulere carere penatibus, & propter iniurias vicinorum, sedes suas profugerunt, Achæos dico, Hiberos, Alanos quoque, nec minus Siculos, Pelasgos, Aborigines, & Arcadas, & priuatos in regionibus quibusdam, vt Autolicum, Caccum, detestabiles vicinos fuisse memoria tradidit. Traditque idem Columella vicinum suum, à se non nominari, qui nec inuiolatum seminarium, nec pedamenti quicquam adnexum vineæ, nec pecudes pasci negligenter

Plautus in  
Mercatore.



gligentius sinebat, ob id talem pestem vitandam censeret. Ad cætera præcepta illud adiecit *μέτρον ἔχειν*, rebus omnibus adhibendum modum, mensuramque. idq; non solum aliud acturis, sed & agrum paraturis dictum intelligatur, ne maiorem, quam ratio calculorum patiatur, emere velit. Virgilius.

— *laudato ingentia rura,*

*Exiguum colito.*

Pœni dicere solent imbecillio rem agrum, quam agri colonum esse debere, quoniam quum sit colluctandū cum eo, si fundus praualet, allidi dominum. Nec dubium quin minus reddat lusus ager non rectè cultus, quam angustus eximiè. Tantum ergo obtinendum est, quantum est opus, ut emissè videamur quo potiremur, non quo ipsi oneremur. Non rectè est possidere velle, si colere non possis. Modum agri in primis seruandum antiqui putauere, quippe censebant, inquit Plinius, satius esse minus serere, & melius arare. Apud Xenophontem habetur: ad villam eundem exercitij causa, redeundum equo: ergo villa non remota penitus ab vrbe: sitque via non difficilis, sed hybernis, æstiuisque itionibus, & subuectionibus apta, seu pedibus, seu reda ire lubet. Villamq; habere condecet, qua matutini radij oculis proficiscentium non sint infesti, & vespertini soles domi redeuntes non molestant.

*De rusticorum adificiorum situ. CAP. XXII.*

20 **P**RIVS QUAM ad rusticas domos constituendas descendamus, patrisfamilias, rustici, aliorumq; operæ pretium erit, de earum situ aliqua præfari. Cato iubet prima adolescentia patrem familiæ agrum statim conferere studere, ædificare diu cogitare: quare conferere cogitare non oportet, sed facere. Vbi ætas accessit ad annos triginta sex, tum ædificare oportet, si agrum cōsitum habeat. tūm ita ædificet, ne villa fundum quærat, néve fundus villam. Patrem familiæ villam rusticam benè ædificatam habere expedit, ut dicemus. M. Varro potissimum sub radicibus montis syluestris villam ponit, ubi pastiones laxæ sint, ita ut contra ventos, qui saluberrimi in agro flabunt, posita sit. Ad exortus æquinoctiales aptissima, quod æstate habeat umbram, hyeme  
30 Solem. Sin cogare secundum flumen ædificare, curandum ne aduersum eum ponas, hyeme enim sit vehementer frigida, & æstate non salubris. Aduertendum etiam si qua erunt loca palustria, & propter easdem causas, & quod are-sunt, & quod in iis crescunt animalia quædam minuta, quæ non possunt oculi consequi, & per aëra intus in corpus per os, & nares perueniunt, atque efficiunt difficiles morbos. Nec in eas partes spectet villa, ex quibus ventus grauior afflare soleat, néve in conualle caua, & ut potius in sublimi loco ædificet, qui, quod perflatur, si quod est, quod aduersarium inferatur, facilius discutitur. Præterea quod à Sole toto die illustretur, salubrior est, quod & bestiolarum si quæ propè nascuntur, & inferuntur, aut efflantur, aut aritudine cito pereunt.  
40 Nambi repentini, & fluuij, & torrentes, periculosi illis, qui in humilibus, aut:



cauis locis ædificia habent, & repentinæ prædonum manus, quòd improuiso  
 facilius opprimere possunt. Columella his sua addit commenta. Villa domus  
 in editiori situ superponatur, vt à tergo potius, quàm præ se flumen habeat, &  
 vt ædificij frons auersa sit ab infestis eius regionis ventis, & amicissimis aduer-  
 sa: quum pleriq; amnes estate vaporantes, hyeme frigidis nebulis caligent, quæ  
 nisi vi maiore inspirantium ventorū summoventur, pecudibus, hominibusq;  
 conferunt pestem. In salutaribus igitur locis ad orientem, vel ad Meridiem,  
 grauib; ad septentrionem villa conuertitur, eademq; semper mare rectè  
 conspiciat, quum pullatur, aut fluctu respergitur, nunquam ex ripa, sed pau-  
 lum summoa à littore. Nam præstat à mari longo potius intervallo, quàm  
 breui refugisse, quia media sunt spatia grauioris halitus. Nec paludem vici-  
 nam esse oportet ædificiis, nec iunctam militarem viam, quòd illa caloribus  
 noxium virus eructat, & infestis aculeis armata gignit animalia, quæ in nos  
 densissimis examinibus inuolant, tum etiam naticum, serpentumq; pe-  
 stes, hyberna destitutas vligine, cœno, & fermentata colluue venenatas e-  
 mittit, ex quibus sæpè contrahuntur cæci morbi, quorum causas ne Medici  
 quidem perspicere queunt; sed & annitoto tempore situs, atque humor in-  
 strumentum rusticum supellectilemq; & inconditos, conditosq; fru-  
 ctus corrumpit. Hæc autem prætereuntium viatorum populationibus, & as-  
 siduis diuertentium hospitibus, infestat rem familiarē. propter quæ censeo eius-  
 modi vitare incommoda, villamq; editiore situ condere, vt frons eius ad o-  
 rientem æquinoctialem directa sit: nam temperatum libramentum hyema-  
 lium ventorum, & æstiuorum tener, quantoq; fuerit ædificij solum pronius o-  
 rienti, tanto & æstate liberius capere perflatus, & hyemis procellis minus in-  
 festari, & matutino regelari ortu poterit, vt cōcreti rores liquecant, quoniam  
 ferè pestilens habetur, quod & remotum, ac sinistrum Soli, & apricis flatibus.  
 Palladius enim postulat in loco fieri aliquanto editiore, & sicciore, & propter  
 iniuriam fundamentorum, & vt læto fruatur aspectu. Sed totius fabricæ tra-  
 ctus vnus lateris longitudine, in quo frons erit, meridianam partem respiciat,  
 in primo angulo excipiens ortum Solis hyberni, & paululum ab occidente a-  
 nertatur hyemali. ita proueniet, vt per hyemem Sole illustretur, & calores  
 eius æstate non sentiat. Didymus etiam necessarium autumat in altioribus  
 locis ædificare. ad sanitatem enim, & speculationem, & regionis collustratio-  
 nem hic locus aptissimus existit. Cæterum tota figura domus ad orientes ex-  
 truida est, itemq; fores: venti enim ex orientis partibus spirantes, salu-  
 berrimi sunt, & Solis calor citius irrumpens attenuat, & dissipat omnem aeris  
 crassitudinem, ac caliginem. Nec verò humiles domos, aut arctas facere oportet,  
 sed spatiosas, & amplas, & altas. Quidam ad Meridiem domum extruere  
 consulant, vt pote plurimum Solem diutissimè habentes, verum ipse ad ori-  
 entem pronunciat, propterea quod Auster à Meridie spirans humidus & in-  
 qualis morbosissimus existit. Sed mihi non videtur vbique locorum ædifican-  
 dam



dam villam, ut æquinoctium orientem Solem spectet; nam ista, quæ de solibus & aura feruntur, pro regionum sorte mutari in promptu est, ut non semper Aquilo lenis, nec Auster ubique insalubris. Perdoctè quidem Celsus omnes ventos asserbat, qui à mari caderent, esse densiores, qui autem à mediterraneis veniant, nunquã non esse leniores. Et vitandas ventorum gratia primas valliũ fauces censeo: nam illic venti nimium frigentes sunt, si per umbrã veniunt, aut minus æstuosi, ubi per constratum, & collustratũ ab multo Sole applicent.

*De rustica urbana patrisfamilias domo. CAP. XXIII.*

10 **Q**UONIAM antiquos agricolas in rusticæ domus constitutione varios, & discordes video, ac satis inperspicuè nō solū domum, sed eius membra describere: nec minus recentiores aliqui architecti falluntur, hi quia rustica nō intelligunt, illi non urbana: nos igitur ex sententia villicam urbanā domum describemus. Diximus villam hominibus, animalibus, & instrumentis indigere, aliisq; necessariis, & homines diuidi in patremfamilias, villicũ, & seruos, ob id primo patrisfamilias domum construemus, siue rusticam urbanam, mox rusticam, in qua villicus & operarij se recipient, tertio instrumentorum, & rerum necessariarũ, ut torcularia vini, & olei, aliorumque Columella vnā urbanam, alteram rusticam, tertiam fructuariam vocat, nos de singulis peculiariter loquemur. Idem ait. Urbana domus in hyberna, & æstiuā sic digeratur, ut spectent hyemalis temporis cubicula brumalem orientem; cœnationes  
20 occidentem æquinoctialem Rursus æstiuā cubicula spectent meridiem æquinoctialem, sed cœnationes eiusdem temporis prospectent hybernũ orientem. Balnearia occidenti æstiuo aduertantur, ut sint post meridiem, & vsq; in vespertinũ illustria. Ambulationes Meridiano æquinoctiali subiectæ sint, ut & hyeme plurimũ solis, & æstate minimũ recipiant. Xenophon: Non tam varietate ædificiorũ, atq; ornatu illustretur, quàm vili suppellectili ac habitantibus necessaria, cuius gratia facta est. Palladius. Ædificium pro agri merito, & domini fortuna oportet institui, quod plerunque immodicè sumptum, difficilius est sustinere, quàm condere. Ita igitur æstimanda est eius magnitudo, ut si ali-  
30 quis casus incurrerit ex agro, in quo est, vnus anni, aut ut multũ biennij pensionem reparetur. Forma tamen eiusmodi ut ad habitationẽ breuiter collectas, & æstati, & hyemi præbeat mansiones. Quæ hyemi parantur, ita sint constitutæ, ut possit eas hyberni Solis totus prope modum cursus hilarare. Sed si æstiuæ mansiones sunt, orientem solstitialem, & partem septentrionis aspiciant. Didymus. Balnea facere oportet, ut non ad Boream, & septentrionem aspectum vertant, sed ad occasum hybernũ, aut meridiem. Sint autem ampla, & purũ aërem suscipientia. Etenim sterquiliniũ, & cœno fœtentibus locis in vicinia non existentibus purus aër ingreditur. Fornaces in his esse debent ad terram formatæ, introspectantes, inclinatæ, deorsum tendentes, ut  
40 cõiecta in ipsas ligna intro procedant, neque exitum habeant, verũ flamma



intus delitescens, multam caliditatem cellæ, ac vasis de se præbeat. Hæc antiquorum doctrina est. Sed ego vellem œconomi domum animi gratia cōstru-  
ctam, rusticam verò emolumentum. Herilis altera æstiuæ, altera hyberna. Cubi-  
cula hyemis spectent brumalem orientem, cœnatio occidentem æquinoctia-  
lem, cubicula æstiuæ Meridiem, cœnatio hybernum occidentem, ambulatio  
ad meridianum æquinoctium exposita sit: & sic pro cœli, regionisque consti-  
tutione alibi, atque alibi aliter habenda censeo, quoad frigida calidis, & vda  
siccis contemperentur. Occupet rectum non feracem agri locum, sed alio-  
quin dignissimum, inde omnis auræ, solis aspectusque commoditas, & volu-  
ptas capiatur. Venientem hospitem honestissimis excipiet spatiis, spectabi- 10  
tur, spectabitque urbem, oppida, mare, fusamque planitiem, collium & montium  
prospectum, horrorum delicias, piscationum, venationumque, illecebras in o-  
culis expositas habeat. Tuis non desint ambulationes porticis, quibus ad gra-  
tos per brumam soles senes confabulentur, & familia diem agat festum, æsta-  
te fruatur umbra. Primaria ædis pars atrium est, proximè cœnacula, subinde  
singulorum cubilia, postremo conclavia. In atrium cætera membra, velut in  
forum publicum ædis confluant, ex quo non aditus modo, sed luminum et-  
iam commoditas importetur, cuius spatium amplum, apertum, & dignum. Et  
voluerunt alibi recto opertum, alibi sub dio, alibi partim apertum, partim nu-  
dum, alibi vno latere, alibi pluribus, alibi lateribus porticum adiungere. In eo 20  
cōmoditatis gratia adhibeatur, ut frigenti regione acerbitas Boreæ, in æstuo-  
sa plaga molesti soles excludantur, cœli gratissimus spiritus admittatur, & lu-  
cis iucundissimæ copia undique influat: patebitque in medio ipsius vestib-  
ulum, & aditus non arduus, nō obscurus, non arctus. Porticum veteres ad Me-  
ridiem ponendum censuere, quod æstate Sol sublimiore ambiens cyclo non  
immittat radios, hyeme submittat. Æstiuis cœnaculis aquam in primis, & hor-  
torum viridia exposcunt, hybernis teporem, & focum. In utrisque amplitu-  
do, hilaritas, & lautities optatur. Cœnaculis adiunctæ sint coquina, & cella  
obsonaria, ubi reliquias cœnæ, vasa, & mantilia referantur. Coquina nō tam  
longè semouenda, ut quæ calida conuiuiis exiguntur, inter portandum refri 30  
gescant, nec tam propè, ut patellarum, & cortinarum odor, & strepitus exau-  
diatur. Conclavi puellæ & coniuges contineantur. Sed hæc pro rustica urba-  
na domo sat sint. aliam reperies à Plinio nepote descriptam.

*De rustici domo, seruorum, & animalium.* C A P. XXIIII.

**D**IXIMVS de herili domo, nunc ad rusticam transeamus, quam nō lon-  
gè ab herili esse oportet, ut quæ quisque agat, & quæ factum opus sit, in-  
telligat. Huius munus erit fructus seruare, homines, & instrumenta. Varro  
præcipit providendum ubi familia versetur, si fessi opere, vel frigore, vel ca-  
lore, ubi commodissimè possint sese quieti recipere. Villici prope ianuam  
cellam esse oportet, eumque scire, qui introeat, aut exeat noctu, quidve ferat, 40  
præser-



præsertim si hostiarius est nemo. In primis culina videnda, vt sit admota, quòd ibi hyeme antelucanis temporibus aliquot res conficiuntur, cibus paratur, & capitur. Columella aliquanto distinctius tradit. In rustica parte, alta & magna culina ponetur, vt & contignatio careat incendiij periculo, & in ea commodè familiares omni tempore anni morari queant. Optimè solutis seruis cellæ Meridiem æquinoctialem spectantes fient, vinctis quam saluberrimum subterraneū ergastulum plurimis, sitq; id angustis illustratum fenestris, atq; à terra sic æditis, ne manu contingi possint. Villico iuxta ianuam fiat habitatio, vt introeuntiū, exeuntiumq; conspectum habeat. Procuratori supra ianuam  
10 ob easdem causas, vt is tamen villicum obseruet ex vicino. Bubulcis & pastori-  
bus cellæ ponantur iuxta sua pecora, vt ad eorum curam sit opportunus ex-  
cursus. Omnes tamen quamproximè alter ab altero debent habitare, ne villi-  
ci diuersas partes circumeuntis sedulitas distendatur, & vt inter se diligentia,  
& negligentia cuiusque testes sint. Hæc ita ordinauit, quia præmonuerat Ca-  
to, villicum providere debere, vt suo quisque loco cubet, & vti iumenta pa-  
bulum habeant. Descriptis hominum habitationibus, subnectemus & anima-  
lium. Varro in villa faciunda iubet stabula, ita vt bubilia sint, vbi hyeme pos-  
sint esse calidiora. Columella. Pecudibus fiant stabula, quæ neq; frigore, ne-  
que calore infestentur: domitis iumentis duplicia bubilia sint, hyberna, atque  
20 æstiuæ: cæteris autem pecoribus, quæ intra villam esse conuenit, ex parte recta  
loca, ex parte sub dio, parietibus altis circumsepta, vt illic per hyemem, hic per  
æstatem sine violentia ferarum conquiescant. Sed omnia stabula sic ordinen-  
tur, ne quis humor influere possit, & vt quisq; qui ibi conceptus fuerit, quàm  
celerrimè dilabatur: vt nec fundamenta parietum corrumpantur, nec vngu-  
læ pecudum. Lata bubilia esse oportebit pedes x, vel minimum i x. quæ men-  
sura & ad procumbendum pecori, & iugario ad circumeundum laxa ministe-  
ria præbeat. Non altius ædita esse præsepia conuenit, quàm vt bos, aut iumen-  
tum sine incommodo stans vesci possit. Palladius. Stabula equorū vel bouum  
meridianas quidem plagas respiciant, non tamen egeant septentrionis lumi-  
30 nibus, quæ per hyemem clausa nihil noceant, per æstatem patefacta refrige-  
rent. Ipsa stabula propter vngulas animalium ab omni humore suspensa sint.  
Boues nitidiores fient si focum proximè habeant, & ignis lumen intendant.  
Octo pedes ad spatium standi singulis bouum paribus abundant, & in porre-  
ctione xv. Planæ roboreæ supponantur stationibus equorum cum strami-  
ne, vt iacentibus molle sit, stantibus durum. A quibus Vitruuius. Culina con-  
iuncta habeat bubilia, quorum præsepia ad focum, & orientis cœli regionem  
spectent, ideo quòd boues lumen & ignem spectando horridi non fiunt. Item  
agricolæ regionum imperiti, non putant oportere aliam regionem cœli boues  
spectare, nisi ortum Solis. Bubiliū autem debent esse latitudines nec mino-  
40 res pedum denum, nec maiores quindenum, longitudo vti singula iuga nec  
minus occupent pedes septenos. Ouilia & caprilia ita magna sunt facienda, vt



singula pecora, areæve, minus pedes quaternos, & semipedem, ne plus senos possint habere. Equilia maximè in villa, vbi loca calidissima fuerint, constituantur, dum ne ad focum spectent: quum enim iumèta proxime ignem stabulantur, horrida fiunt. Item non sunt inutilia præsepia, quæ collocantur extra culinam in aperto, contra orientem. Quum enim in hyeme anni sereno cœlo in ea traducuntur, matutino boues ad Solem pabulum caprantes fiunt niri-diores. Columbarium ita construere docet Palladius. Illud accipere potest sublimis vna turricula, in prætorio constituta, læuigatis, ac dealbatis parietibus, in quibus à quatuor partibus (sicut mos est) fenestellæ breuissimæ fient, vt columbas solas ad introitum, exitumque permittant. Nidi figurentur interiorius. Quintilij ita exactiùs docent. Locus, in quo columbarium construendum est, non habeat domos propinquas. Statuantur columnæ pro magnitudine extruendi operis, eæque circulariter. Deinde supra columnas capita imponantur, & supra columnarum capita aliæ columnæ ligneæ ponantur, & supra columnas in circuitu duæ domunculæ extruantur, altitudine cubitorum septem. Fiatque in parietibus ab occasu fenestra lucis gratia, ab ortu alia, in qua custos collocetur, qui columbas cohibeat, & vnde ad pascua exire oportet. A meridie ianua construatur, per quam ingreditur is, qui auium curam gerit. Sic ab reptilibus illæ sæ conseruabuntur, neque est possibile reptilia per columnas ascendere, quum sint diligèter oblitæ, & rectorio inducto explanatæ. Neque feles insidiari possunt, quum domus longè absint; nidi intus construendi à pavimento vsque ad fastigium. Apponantur singulis nidis asseres, vt per ipsos transitus fiat. Effodiatur in domo lauacrum, quo & bibere, & lauari possint, ne occasione præbendæ aquæ, homo eas frequenter perturbet. Verrere domum, & sterCUS euehere necessariū, & si quid intus resarciendum;

*De rustica fructuaria domo, & de horreo.* C A P. XXV.

**N** V N c de fructuaria domus parte loquemur, quæ in horrea, apothecas, cellam oleariam, torculariam, vinariam, scenilia, paleariaque diuiditur. Dicemus primò de horreis, quæ & locorum, & situs diuersitate, varia fiunt. Nam sunt & locorum peculiaria quædam, quæ vim maximam conseruandi frumenta habent. In Cappadocia, loco quodam Petra vocato, vel quadragenos annos frumenta fœcunda, & ad sementem percōmoda durare proditū est à Theophrasto, sexagenos autem, & septuagenos ad vsum cibariū seruari posse idonea. Locum autē istum cū aliàs excelsum, tum flatibus & auris esse apertum, & ab exortu, & occasu, Meridieq; æditum. Feruntq; in Media, & reliquis excelsis tractibus condita diu perdurare valere. Sunt & alij qui granaria habent sub terris, ait Varro, vti speluncas, quas Syros vocant, vt in Cappadocia, & Thracia, alij, vt in Hispania citeriore, puteos, vt in agro Carthaginensi, & Olcenfi. Horum solum paleis substernunt, & curant ne humor, aut aër tangere possit, nisi quum promittitur ad vsum: quò enim spiritus non peruenit, ibi non



non oritur curculio. Sic conditum triticum manet vel annos quinquaginta, milium verò plus annos centum. Nec me præterit, inquit Columella, quibusdam videri horreum camera contactum sedem frumentis optimam, (idque in sicca positione villæ: nam quamuis granum robustissimum corrumpitur situ) cuius solum terrenū, prius quàm cōsternatur, perfossū, & amurca recenti, non salsa madefactū, velut signinum opus pauculis cōdensatur. Tum deinde quum exaruit, simili modo pavimenta testacea, quæ pro aqua receperint amurcam mistam calci & arenæ, supersternuntur, & magna vi pauculis inculcantur, atq; expoliuntur, omnesq; parietum atq; soli iuncturæ testaceis pulvis fibulantur: nam ferè quum his partibus ædificia rimas egerunt, caua præbent, & latebras subterraneis animalibus. Sed locis, quæ redundāt vligine, positio illa pensilis horrei probatur ab omnibus agricolarum magistris. Varro: Triticum condi oportet in granaria sublimia, quæ perflentur vento ab exortu, ac septentrionum regione, ad quæ nulla aura humida è propinquis locis aspi-  
 10 ret. Granaria supra terram sublimia factitantur in Hispania citeriore, & in Apulia. Columella præcipit, vt sicca res congerantur in tabularis, vt frumentum, fœnum, frondes, paleæ, cæteraq; pabula. Sed granaria scalis adeantur, & modicis fenestellis Aquilonibus inspirentur: nam ea cœli positio maximè frigida, & minimè humida est, quæ vtraq; perennitatem conditis frumentis af-  
 20 ferunt. Plinius. Horrea supernè impleri, nec ad flatus admittere, aut fenestras habere vllas. Alij ab exortu tantum æstiuo, aut septentrione. Alij contra suspendunt granaria ligneis columnis, & perflari vndique malunt, atque etiam à fundo. Alij omnino pendente tabulato extenuari granum arbitrantur, & si tegulis subiaceant, subferuescere. Columella & Fauonium ventum conferre frumento dicit, de quo quidem miratur, siccissimum alioqui. Vitruuius granaria sublimata, & ad septentrionem, aut Aquilonem spectantia disponit; ita enim frumenta non poterunt cito concalescere, sed afflatu refrigerata diu seruari: nam & cæteræ regiones procreant curculiones, & reliquas bestiolas, quæ frumentis solent nocere. Ideo granaria, quæ ad Solis cursum spe-  
 30 ctant, bonitatem cito mutant. Palladius. Horreorum situs ipsam septentrionis desiderat partem, & superior, & longè ab omni humore, & latamine, & stabulis ponendus est, frigidus, ventosus, & siccus. Ab horreis tamen Auster debet esse auersus. Tarentinus Græcus: probè frumentum concludi in locis suprà terram, qui lumen ab oriente habeant. Adspiretur locus item moderatè à Boræa, & Fauonio, & auertatur ab Austro, & eiusmodi ventis. Non habeat humiditatem, aut graueolentiam aliquam, aut halitum iniucundum; maximè autem ab equorum, & boum stabulis aliisque eiusmodi, atque omni caliditate procul absit. Alij alias situs condiciones addidere. Nunc de materie, ex qua construendum horreum differemus. Theophrastus parietes calce læ-  
 40 uigatos putrefactionis initia præbere dixit, quia hæc calorem auget, & quum pulvis calidus & siccus sit, & illimētum calcis calorem susceptum vtriq; seruat:



nam & quum vniuersum, altumque aceruatum est, putret: sic enim plus calor  
 ris exoritur. Hæc Theophrasti verba. Omnes admonent ex variis rebus, & a-  
 murca tectorium parietibus horrei inducere. Plinius ab eo. Granaria sine cal-  
 ce constructa, quum sit frumento infestissima. Varro. Parietes & solum tecto-  
 rio marmorato loricandi, sin minus ex argilla, misto acere è frumeto, & amur-  
 ca, quod murem, & vermem nō patitur esse, & grana facit solidiora, & firmio-  
 ra. Columella. Parietes oblinuntur amurca, subacto luto, cui pro paleis admi-  
 sta sint arida oleastri, vel si ea nō sint, oleæ folia. Deinde quum prædictum te-  
 ctorium inaruerit, rursus amurca respergitur, qua siccata frumentum infer-  
 tur. Ea res ab noxa curculionum, & similium animalium commodissimè vi-  
 detur conditas fruges defendere, quæ nisi diligenter repositæ sint, celeriter ab  
 iis consumuntur. Palladius. Solum omne bipedis sternatur, vel minoribus la-  
 terculis, quos suffuso testaceo pauimento debemus imprimere. Sed factis gra-  
 nariis amurca luto mista parietes linantur, cui arida oleastri, vel oleæ folia pro  
 paleis adiiciantur: quo tectorio siccato, rursus amurca respergatur: quæ vbi  
 siccata fuerit, frumenta condentur. Hæc res curculionibus, & cæteris noxiis  
 animalibus inimica est. Tarentinus aliqua addit. Illinantur parietes luto, vti  
 pro paleis pili ammisti sint, deinde argilla alba intus, & foris obducantur.  
 Post hæc cucumeris syluestris radices & folia ad biduum aqua macerato, &  
 cum aqua calcem arenariam subigito, indeque internas partes diligenter ob-  
 linito. Quidam etiam ad calcem pecorum vrinam admiscunt, tanquam quæ  
 animalia necet. Sed & testaceam calcem, quæ pauimento inducitur, lotio ma-  
 cerant. Quidam cinerem sarmentorum quercus eadem gratia frumento in-  
 spergunt, alij bouum sterminus aridum. Alij absynthij, aut abrotoni arida virgula  
 imponunt, ampliusque folia semperuiui aridæ. Præstat autem calcem arenariam  
 amurca subigere; hæc enim bestiolas omnes corrumpit, & frumentum soli-  
 dius, & densius facit. Quapropter alij amurcam ad dimidias decoctam parie-  
 tibus aspergunt, atque vbi inaruit, fruges inferunt, ac deponunt. Varro. Eo mo-  
 do construenda granaria sunt, vt non solum à lateribus per fenestras, sed et-  
 iam subtus à solo ventus regere possit. Plinius etiam monet, vt à fundo per-  
 flari possit. Tarentinus, vt per medium habeat densos & frequentes canales,  
 per quos & calidus vapor expiret, & aura refrigerans inspiret. Columella la-  
 cubus distinguere granariâ perhibet, vt separatim quæque legumina ponantur.  
 Palladius. Tunc diuisas cellas (si magnus sperabitur seminum modus) grano  
 cuique tribuamus, & si terræ pauperies minora promittit, vel craticis podiis  
 erunt discernenda granaria, vel vimineis vasculis reclusis tenues colligemus.  
 Columella non ventilanda frumenta censet: nam multos esse scribit opinan-  
 tes, curculiones ventilatione arceri posse, si exesa fruges ab eis fuerint, & qua-  
 si refrigerentur, quod falsissimum existimat: neque enim hoc facto expel-  
 luntur animalia, sed immiscuntur totis acervis: qui si maneant immoti, sum-  
 mis tantum partibus infestantur, quoniam infra mensuram palmi non nasci-  
 tur cur-



tur curculio, longēque præstat id solum, quod iam vitiatum est, quàm totum periculo subiicere: nam quum exigit vsus, facilè est, eo sublato, quod vitiatum erit, integro inferiore vti. Quod idem à Plinio, & Palladio excipitur. Sed addit. Nihil tamen diu custodiendis frumentis commodius erit, quàm si ex areis in alterum locum vicinum transfusa refrigerentur aliquantis diebus, atque ita horreis inferantur. Aliqua nunc addemus remedia, à maioribus tradita ad frumenti diuturnitatem. Plinius. Sunt qui rubetam ranam in limine horrei pedè longioribus suspensam inuehere iubeant. Varro. Quidam ipsum triticum conspergunt, quum addant circiter in m modium quadrantalem murcæ. Item  
 10 alius aliud affirmat, aut aspergit, vt chalcidicam, aut caricam cretam, aut absynthium, absynthiivē decoctum. Item huius generis alia. Palladius. Aliqui corianni folia frumentis miscunt ad seruandum profutura. Herba coniza sicca (vt Græci affirmant) substrata frumentis, addit ætati. Tarentinus. Omnibus porrò præstat terram perfrigeratam, argillosam, aut mali punicæ folia arida, & cribrata antea præparata habere, & quum frumentum deponitur, ad singulos frumenti medimnos, argillosæ terræ chænicem, aut foliorum tantundem inspergere. Vtilissimum porrò conizam semifrigefactam in pauimentum frumento substernere, & post diffusos decem medimnos rursus conizam integere, & rursus frumentum super ingerere, donec totum deponatur. Quod  
 20 enim hoc modo depositum fuerit nō solum in multos annos à putredine immune perseverat, verum etiam idem pondus seruabit in panificio.

*De cella vinaria, torculari, & vasis subtorcularibus.* CAP. XXVI.

**L**OQUEMUR de cella vinaria. Columella in plano cellas statuendas dicit, quæ custodiam recipient rerum humidarum, vt vini, olei, cæterarumque. Varro villam laudari ait, quæ vinariam cellam habeat, ad modum agri aptam, & quæ fenestras habeat, vt dolia aërem frigidiorē excipiant. Palladius eius situm describens, septentrioni oppositam esse debere, frigidam, vel obscuræ proximam, longè à balneis, stabulis, furno, sterquiliniis, cisternis, aquis, & cæteris odoris horrendi, ita instructam necessariis, vt non vincatur à fructu. Vitruuius ad septentrionem habere oportere luminaria fenestrarum, quum enim alia parte habuerint, qua Sol calefacere possit, vinum, quod erit in cella, confusum ab calore, efficietur imbecillum. Plinius. Latus cellæ vinariæ, aut certè fenestras obuerti ad Aquilonem oportere, vel vsque in exortum æquinoctialem. Florentinus. In regionibus calidis ad orientem, & septentrionem fenestram habeat, in frigidis ad Meridiem. Sed Columella. Cella procul esse debet submota à balneis, furno, & sterquilinio, reliquisque immunditiis, retrum odorem spirantibus, nec minus à cisternis, aquisve salientibus, ex quibus qui extrahitur humor vinum corrumpit. Florentinus. Procul à torculari,  
 30 & ab omni graueolentia remota, nihilque prorsus fætidum cellis vinariis con-



cludendum est, velut coriacea graueolentia, caseus, allium, oleum, ficus, vasa inutilia. Omnia enim huiusmodi humiditatem de vino attrahunt, & putrescunt, rursusq; ad vinum ipsum graueolentiam referunt. Submouenda est etiam à lacu, stabulo equorum, loco secessus, stabulo palearum, pistrino, balneo: si verò reperiuntur circumsitæ arbores, excidantur. Radices enim in se circumplectentes eam corrumpunt, & odorem ad se adfricant, maximè fici, & punicæ. Plinius. Sterquilinia & arborum radices procul abesse, omniaque odoris euitandi, facillimo in vina transitu, ficos vtique, & caprificos. Nunc eius constructionem aggrediamur. Varro inquit. Sit pavimento procliui in lacum, in quo, si contigerit, defluens vinum excipietur, ne pereat, quod sæpè, 10  
vbi conditum vinū nouum, orca, vt in Hispania, feruore musti ruptæ, nec non & dolia in Italia. Palladius cellam vinariam ita dispositam esse iubet, vt basilicæ ipsius forma calcatorium loco habeat altiore constructum, ad quod inter duos lacus, qui ad excipienda vina hinc inde depressi sint, gradibus tribus ferè, aut quatuor ascēdatur. Ex his lacubus canales structi, vel tubi fictiles circa extremos parietes currant, & subiectis lateri suo doliis per vicinos meatus, manantia vina defundant. Si copia maior est, medium spatium cupis deputabitur, quas ne ambulacra prohibeant, basellis altioribus impositas, vel supra obruta dolia possumus collocare spatio inter se largiore distantes, vt (si res exigat) curantis transitus possit admitti. Quod si cupis locum suum deputabi- 20  
mus: is locus ad calcatorii similitudinem podiis breuibus, & testaceo pavimento solidetur, vt etiam si ignorata se cupa diffuderit, lacu subdito excipiantur non peritura vina, quæ fluxerint. Florentinus. Dolia locanda esse vt vicissim & se mutuo non contingant, pedali mensura in medio relictæ, quo & hi, qui cellæ vinariæ curam gerunt, facilem habeant ad interiora dolia ingressum, & si vnum dolium acescat, propinquum sibi non simul peruertat: nihil enim adeò velociter contagionem percipit, velut vinum, præsertim mustum. Cæterum dolia in siccis locis locanda sunt, vt in terra sint duæ ipsorum partes, si regio infirmum & tenue, & nullius nutrimenti vinum ferat. Si verò potens, & crassum, dimidia ipsorum pars. Subiicienda vnicuique dolio are- 30  
na crassa, & sicca: super hanc verò insternendus est iuncus vnguentarius mediocri copia: reliquum terra egesta explendum, quæ commo- tē sit ad Solem exassata. Arena enim, & terra sicca omnem humorem in se ipsas attrahunt, tum ex terra, tum eum, qui in ipsis doliis consistit, ampliusque dulce vinum facit. At verò vim ipsius hoc modo coniectare licet. Si namque nouam sportulam arena expleueris, vinumque acescens infuderis, percolabitur purum, & sine odore: si verò non sit arena, terra oblata vtendum prius insolarata. Plinius etiam doliis intervalla dari præcipit, ne inter se vitia serpent, contagione vini semper ocysima. Nos autem cellam probamus subterraneam: hæc enim loca frigida sunt. Vina tandiu recta manebunt, quandiu frigida sunt. 40  
Sint enim occlusa, ne ventis infestentur; nam qui à Sublano, Meridie, &



ab occasu veniunt, præsertim bruma & vere, profectò perturbantur. Ad Canicula autem sydus etiam à Borëa commouentur. Solis radio arescit, Luna hebescit: ob id eius latus, & lumina à Subsolano in Aquilonem obuertito. Motu fracescit, elanguescit que, ob id positio eius loco stabili, & à curruum cursu immuni. Odoris rapax vinum est, vt alibi diximus, & fermè eneruatur, soluitur que: ob id sordes, & malè odorata omnia, vliginem, crassum vaporem, fumum, horti spiramenta, ex cepe, brassica, fico & caprifico, expurgato, longè abigito, penitus que excludito. Dolia quò capaciora, eò vinum erit acrius, & fortius. Dicto de cella vinaria, nunc de torculari, & subtorculari dicendum. quam curam Florentinus assumpsit describendi. Torcular itaque iuxta multitudinem apportandorum fructuum adificandum est, quo habeant operarij locum, in quo commodè diuersari queant, & vt ipsæ vix habeant spatium commodi situs, vt & tempore vrgente fructus maiore compendio afferri possint, & ne operarij odore suffocentur. Oportet autem totum torcularium vndiquaque leuissimo tectorio oblitum esse, neque minus tabulata superna, vt nihil terreum, neque animalium vllum in ipsis generatorum delabens, vinum inquinet. Sit amplius torcular calidum, & lumen habeat vndiq; plurimum. At locus & vas subtorcularium sit ampli oris, & post vsum lauetur aqua marina, & spongia detergatur. Relinquatur autem sine operculo, ne computrescat, & quia mures aliquando in subtorcularium vas incidentes, multam graueolentiam inducunt, lignum latius imponendum, per quod euadere queat mus, si casu illabatur. Quando eo quis rursus vsurus est, similiter lotum, & detersum suffumiget. Cortinale, vbi defrutum fiat, iubet Columella, nec obscurum, nec angustum sit, vt sine incommodo minister, qui sapam decoquet, versari possit.

*De cella olearia, & torculari eius.* CAP. XXVII.

**C**ELLA oleariam Varro ad modum agri aptam, & pauimento procliu in lacu construendam, in quo si contigerit defluat oleum, excipiat: fenestras habeat, vt aërem calidiorem recipiat: loco plano, & potius arido, quam humido. Columella, Torcularia, cellæq; olearia calida esse debet, quia cōmodius omnis liquor vapore soluitur, ac frigoribus magis constringitur. Oleum, quod minus prouenit, si cōgelatur, fracescit: sed vt calore naturali est opus, qui contingit positione cœli, & declinatione, ita non est opus ignibus, aut flāmis, quia fumo & fuligine sapor olei corrumpitur: propter quod torcular debet à meridiana parte illustrari, necesse, ne habeamus ignes, lucernamq; adhibere, quum premetur olea. Vitruuius. Olearia autem ita est collocanda, vt habeat à Meridie, caldisque regionibus lumen. Non enim debet oleum congelari, sed tepore caloris extenuari. Magnitudines autem earum ad fructuum rationem & numerum, & doliorum sunt faciendæ, quæ quum sint culearia, per medium occupare debent pedes quaternos. Ipsum autem torcular,



si non cocleis torquetur, sed vectibus & prælo premitur, ne minus longum pedes quadraginta constitutur: ita enim erit vectiario spatium expeditum. Latitudo eius ne minus pedum senum denum: nam sic erit ad plenum opus facientibus libera versatio, & expedita. Sin autem duobus prælis loco opus fuerit, quatuor & viginti pedes latitudini dētur. A quibus Palladius. Olearis cella meridianis sit obiecta partibus, & contra frigus munita, ut illi per specularia debeat lumen admitti: ita & operas, quæ hyeme futuræ sunt, nullus algor impedit, & oleum quum premetur, adiutum teporibus, frigore non valebit astringi. Trapetis, & rotulis, & prælo nata est forma, quam consuetudo dictauit. Receptacula olei semper munda sint, ne novos saporēs, infecta veteri rancore corrumpant. At si quis maiori diligentia studet, subiectis hinc inde cuniculis pauimenta suspendat, & ignem suggerat fornace succensa: ita purus calor, olei cellam sine fumi nidore vaporabit, quo sæpe infectum colore corrumpitur, & sapore.

*De oporothecis. C A P. XXVIII.*

**D**IXIMVS de horreis, cella vinaria, oleariaque, nunc de oporothecis. Vocabant antiqui ὀπωρεῖν autumnales fructus, qui adseruabantur: erit ergo oporotheca pomorum reconditorium, ab ὀπωρεῖν, ut diximus, & ἡκμῃ repositio, quod & ὀποροφυλάκιον, vel oporophylacem quoque dicunt. Varro oporothecas iubet loco arido, & frigido exadificare, ut ad Aquilonem fenestras habeat, atque ut ea perflectur curare, nec tamen sine foriculis, ne quum humorem amiserint, pertinaci vento vieta fiant. Ideoque in iis cameras marmorato, & parietes, pauimentaqué; laudabiliter faciunt, quo frigidior sit locus. A quo eadem Plinius. In vniuersum de pomis seruandis præcipitur. Pomaria in loco frigido, & sicco contabulari, septentrionalibus fenestris sereno die patere, Austros specularibus arcere. Aquilonis quoque afflatu poma deturpari rugis. Vitruuius. Poma, quæ non in ea cœli parte ponuntur, quæ est auersa à Solis cursu, non diu seruantur. De quo etiam rationem affert. Nam semper calor quum excoquit, aëribus firmitatē eripit, & vaporibus feruidis exugendo naturales virtutes, dissoluit eas, & feruore mollescentes efficit imbecillas, ut etiam in ferro animaduertimus, quod quauis natura sit durum, in fornacibus ab ignis vapore percalefactum ita mollescit, ut in omne genus formæ faciliter fabricetur. Et idem quum molle & candens est, si refrigeretur tinctum frigida redurefcit, & restituitur in antiquam proprietatem. Licet etiam considerare hæc ita esse ex eo, quod æstate non solum in pestilentibus locis, sed etiam in salubribus, omnia corpora calore fiant imbecilla, & per hyemem etiam quæ sint pestilentissimæ regiones, efficiuntur salubres, ideo quod à refrigerationibus solidantur. Sed quo modo in oporothecis fructus asseruentur, indicabimus. Varro supra paleas positos seruari rectè putat, & satis cōmodè in tabulatis, ut in opere marmoreo, vel substratis floccis. Plinius: Colligi mala post  
40  
aqui-



æquinoctium autumnale, neque ante xv lunam, neque ante primam horam. Cadiua separari, stramentis, storeis, paleisve substerni, rara componi, vt limites peruij spiritum equalem accipiant. Nos autem tabulatum laudamus in gelido & calidissimo loco, omni excluso spiritu: aëris enim inconstantia putrescunt omnia. Nam, vt diximus, ex Aquilonis flatu poma rugis deturpantur: & Aristoteles turgefactis vtribus poma per integrum annum seruari promittit. Talis fortasse locus erat in Micalesia Boëriæ secundum mare vrbe, Cereris templo, ante cuius simulachri pedes, si autumnales fructus expositi essent, integerrimi per totum ferè anni spatium perdurabant, vt ex Græcis authoribus  
 10 habetur.

*De sterquiliniis, area, nubilario, fœnili, paleario & lignario. CAP. XXIX.*

**D**IXIMVS quæ intra villam fieri debebant, nunc quæ extra, & primò de sterquiliniis. Varro inquit: Secundum villam duo habere oportet sterquilinia, aut vnum bifariam diuisum, alteram enim in partem ferri oportet è villa nouum fimum, ex altera veterem tolli in agrum: quod enim infertur recens, minus bonum, id quum flacuit, melius, nec non sterquilinium melius illud, cuius latera, & summum, virgis & fronde vindicantur ab Sole: non enim  
 20 succum, quem quærit terra, Solem ante exugere oportet. Itaque periti (qui possunt) vt eò aqua influat, eo nomine faciunt. sic enim maximè retinetur succus in eo. Columella his aliqua addit. Sterquilinia quoque duo sint, vnum, quod noua purgamenta recipiat, & in annum conseruet, alterum, ex quo vetera vehantur, sed vtrumq; more piscinarum deuexū leni cliuo, & extractum, pauitumq; solum habeat, ne humorem transmittant. Plurimum enim refert non assiccato succo fimum vires continere, & assiduo macerari liquore, vt si  
 30 qua interiecta sint stramentis, aut paleis, spinarum vel graminum semina intereant, nec in agrum exportata, segetes herbidas reddant. Ideoq; periti rusticique quid ouilibus, stabulisq; conuersum progesserunt, superpositis virgeis cratibus regunt, nec arefcere ventis sinunt, aut Solis incurſu patiuntur exuri.  
 40 Palladius, Stercorum congestio locum suum tenere debèbit, qui abundet humore, & propter fœtoris horrenda à prætorij conuertatur aspectu. Humor abundans hoc præstabit stercore, vt si qua insunt spinarum semina putrescant. Sequitur area, & nubilarium. Columella ait. Area si competit ita constituenda est, vt vel à domino, vel certè à procuratore despici possit. Ea q; optima è siliice constrata, quod & celeriter frumenta deteruntur, non cedente solo pulsibus vngularum tribularumq; & eadem euentilata mundiora sunt, lapillisq; carent, & glebulis, quas per trituram ferè terrena remittit area. Palladius ita perbelle aream construere docet. Area longè à villa esse non debet, & propter  
 50 exportandi facilitatem, & vt fraus minor timeatur, domini vel procuratoris vicinitate suspecta. Sit in loco sublimi, & vndecunque perflabili, longè tamen



ab hortis, vineis, & pometis: nam sicut radicibus virgultorū profunt letamen & paleæ, ita insidentes frondibus eas perforant, atq; arere compellunt. Sit autem vel strata silice, vel saxo montis excisa, vel sub ipso tritura tempore vngulis pecorum, & aquæ admistione solidata: clausa deinde, & robustis munita cancellis, propter armenta, quæ quum teritur, inducimus. Sit circa hanc locus alter planus, & purus, in quem frumenta transfusa refrigerentur, & horreis inferantur, quæ res in eorum durabilitate proficiet. Didymus. Aream in alto loco construere oportet, quo promptè ventum susceperet. Præ omnibus cauendum ne secundum ventum domorum, aut hortorum constituatur: etenim venti tenuissima quæque ex paleis citra animaduersionem hominum oculis inferentes, pupillas perurunt, ut ex eo multi altero, alij utroq; oculo sint privati. Lædunt etiam paleæ fructus autumnales foris non lignosos, & maximè vires. Quemadmodum enim sterces, sic paleæ radicibus conferunt, ramulis vero & foliis nocētissime existunt. Neq; verò minus ipsa olera lædunt, adherentes enim folia perforant, & perforata statim comburuntur. Oportet aream assidua amurca conspergere, & madefacere, insuperq; cylindro læuigare. Sic enim formicæ non iniuriabuntur. Virgilius.

*Area cum primis ingenti est aquanda cylindro,  
Et vertenda manu, & creta solidanda tenaci:  
Ne subeant herba, neu puluere victa fatiscat.  
Tum varia illudunt pestes, sape exiguus mus.  
Sub terris posuitq; domos, atq; horrea fecit:  
Aut oculis capti fodere cubilia talpa:  
Inuentusq; canis bufo, & qua plurima terre  
Monstra ferunt, populasq; ingentem farris acervum  
Curculio, atque inopi metuens formica senecta.*

Plinius. Aream ad messem præparare oportet, Catonis sententia amurcæ temperata, Virgilij operosius. Maiore ex parte a quant tantum, & fimo bubulo dilutiore illinunt. Id satis ad pulueris remedium videtur. Post aream nubilarium trademus. Varro. Ædificium facere oportet, sub quod rectum totam fundi subicere possis messem, quod vocant quidam nubilarium. Id secundum aream faciundū, vbi triturator sis frumentū, magnitudine pro modo fundi, ex vna parte apertum, & id ab area, quo & in triturā prouere facile possis, & si nubilare cœperit, inde ut rursus celeriter reiicere. Fenestras habere oportet ex ea parte, vnde commodissime perflari possit. Columella. Area applicari debet nubilarium, maximeq; in Italia propter incōstantiam cœli, quo collata semitrita frumenta protegantur, si subitaneus imber inceserit: nam in transmarinis quibusdam regionibus, vbi æstas pluuia caret, superuacuum est. Palladius quoq; nubilarium describit. Fiat deinde vndecunq; proximum rectum, maxime in humidis regionibus, sub quo propter imbres subitos (si coegerit necessitas) raptim, vel munda, vel semitrita ponantur. Dicemus de fœnili, paleatio, & ligna-



ignatio ex Palladio. Fœni, palearum, ligni, cannarum repositiones nil refert in qua parte fiant, dummodo siccæ sint, atq; perflabiles, & longe remoueantur à villa propter casum furripientis incendij.

*De chorte, piscinis, & pistrino. CAP. XXX.*

**F**ACTVNDVM etiam, inquit Varro, plaustris, ac cætero instrumēto omni, quibus cœlum pluuiū inimicum, in chorte, vt satis magna sint tecta. Hæc enim si intra clausum in consepito, & sub dio, furem modo non metunt, sed aduersus tempestatē nocentem nō resistunt. Chorres in fundo magno duę aptiores. Vna, vt interius compluuiū, habeat lacū, vbi aqua saliat, qui intra stylobatas cū venit, sit semipiscina. Boues enim ex aruo æstate reducti hīc bibūt, hic perfundūtur, nec minus ē pabulo quā redierūt anseres, sues, porci. In chorte exteriorē lacū esse oportet, vbi maceretur lupinum, item alia, quæ demissa in aquam, ad vsum aptiora fiant. Chors exterior crebrò operta stramentis, ac paleis, obculcata pedibus pecudū, sit ministra fundo, ex ea quod eucharur. Vitruuius. Chorres, magnitudinesq; earū ad pecorum numerum, atq; quot iuga bouum opus fuerit ibi versari, ita finiantur. In chorte culina quā calidissimo loco designetur. Palladius. Chors ad Meridiē pateat, & obiecta sit soli, quo facilius hyeme aliquē teporem cōcipiat propter ea, quæ insunt animalia, quibus etiam ad æstatis temperandum calorē porticus furcis, asseribus, & fronde formari debent, quæ vel scandulis, vel (si copia suppetit) regulis, vel si facilius, & sine impensa placuerit, regentur caricibus, aut genistis. Columella piscinas minimū duas faciendas censet, alteram, quæ anseribus, ac pecoribus seruiat, alteram, in qua lupinum, vimina, & virgas maceremus. Palladius. Piscinæ duæ, vel solo impressæ, vel cæso lapide circa villā esse debebunt, quas facile est aut fonte, aut imbre suppleri, vt vna ex his vsui sit pecoribus, vel auibus aquaticis. Alia madefaciat virgis, & coria, & lupinos, & si qua rusticitas consuevit infundere. Columella postulat etiam furnum, & pistrinum circa villam, quantus futurus numerus colonorum postulauerit. Palladius. Si aquæ copia est, futura balnearum debent pistrina suscipere, vt ibi formatis aquariis molis, sine animalium, vel hominum labore fragmenta frangantur.

*De septis, quæ villam tuandæ causa fiunt. CAP. XXXI.*

**R**ELIQVVM est villā septis cingere, vt eā à furibus tutā reddamus, aut, vt Varro inquit, ne familia cū vicinis rixetur, ac limites ex limitibus iudicem quarant. Earum rutelarū genera quatuor. Vnum naturale, alterū agreste, tertium militare, quartū fabrilē. Horum vnumquodq; species habet plures. Primum naturale sepimentū, quod obseri solet virgultis, aut spinis, quod habet radices viuæ sepi, ac viatoris ceterereuntis lasciuī nō metuit facē ardentem. Secunda sepes ex agresti ligno, sed nō viuit. Fit aut palis statutis crebris, ac virgultis implicatis, aut latis perforatis, & per ea foramina traiectis longuris ferē bis, aut ternis, aut ex arboribus truncis demissis in terram, deinceps cōstitutis.



Tertium militare sepimentum est fossa, & terreus agger. Sed fossa ita idonea fiat, ut omnem aquam, quæ de cælo venit, recipere possit, aut fastigiū habeat, ut exeat è fundo. Aggeris, qui intrinsecus fit, iunctus fossæ, ita arduus sit, ut eum transcendere nō sit facile. Hoc genus sepi fieri solet secundū vias publicas, & secundum amnes. Aggeres qui faciunt sine fossa, vocant muros. Quartum fabrilè sepimentū est notissimum, maceria. Huius species quatuor, quod fit è lapide, quod è lateribus coctilibus, quod è lateribus crudis, quod ex terrâ & lapillis compositis in formis. Fines verò prædij sine septis, ne familiæ rixentur, serunt alij circum pinos, alij cupressos, alij vltimos, & ubi est campus nulla potior arbor seritur, quod maximè fructuosa, quod & sustinet sepem, ac collit aliquot corbulas vuarum, & frondem iucundissimam ministrat ouibus, ac bubus, ac virgas præbet sepibus, & foco, ac furno. Palladius diligentius docet. Munitionis multa sunt genera. Alij luto inter formas clauso, parietes figuratos ex lateribus imitantur. Quibus copia suppetit, macerias luto, & lapide excitant. Plerique sine luto congesta in ordinem saxa componunt. Nonnulli fossis præcingunt, quod vitandum est, quia horto subducit humores, nisi fortè locus palustris colatur. Alij spinarū plantas, & semina in munitione disponunt. Sed melius erit, rubi semina, & spinæ, quæ rubus caninus vocatur, matura colligere, & cum farina erui ex aqua macerata miscere, funes de hinc sparteos veteres hoc genere munitionis sic inducere, ut intra funes semina recepta seruentur usque ad verni temporis initia. Tunc ubi sepes futura est, duos sulcos, tribus à se pedibus separatos, sesquipedis altitudine faciemus, & per utrosque, funes cum seminibus obruemus leui terra. Ita trigesima die procedunt sentes, quos teneros adminiculis opus est adiuuare, quibus inter se sentes per spatia vacua relicta iungentur. Diophanes aliqua addit. Scrobem cubitali effodito altitudine, in eamque palos depangito, & funiculum per scrobem extendito, præcedente autem die eruum molitum in promptu habeto, & rubi semen, ac paliuri, & oxyacanthæ, omnia ad mellis crassitudinem macerata: postea verò extentum funiculum rubi & paliuri semine cōfricato, & oblinito, & locum cremore irrorato, ac modico tempore finito. Deinde terram ex scrobe egestam superiniicito, & post dies vigintiocto germina producent pedalis altitudinis, quæ transplantabis in scrobem pede non altiorem, & intra duos menses cubitalem magnitudinem excedent. Hæc facienda sunt sub æquinoctiū vernum. Facile autem sepem parabis si funem rubi semine cōfricaueris, & in terram defoderis, & harundines crassas contusas plantaueris modica profunditate, ita ut obliquas imponas, & non rectas, stercore vnâ cum terra aggesto. Quidam sepem hoc modo faciunt. Virgas rubi in segmenta conscindunt, eaque in sepibus posita palmari altitudine obruunt, irrigantque, donec germen erumpat. Aliqui cum moris, hoc est fructibus rubi maturis funiculum per manus cōfricant, deinde stercore & terra obruunt, rigant donec germen fundat. Democritus porrò tradit, inchoante vere usque ad quindecim dies sepem probè planta-



plantari hoc modo. Funem nauticum in marinis operis detritum, & de cetero putrefactum, rubi semine, & aliis prædictis spinosis, admixto cruo confricato, inde in scrobe defodito, & si fieri potest, singulis diebus irrigato, sic enim citò, & perfectè sepes nascetur. Plinius. Spinæ sepes causa ferunt, tomice moris spinarum circumlita.

## IOAN. BAPTISTAE

## PORTÆ NEAPOLITANI

## VILLÆ

## LIBER SECVNDVS

## SIVE

## SYLVA CÆDVA.

## PROOEMIUM.



Ci o rigidos censores aliquos nō de fore, qui nostram villulam visendi gratia hucusque peruenerint, qui domo egressi præcipitem hunc montem, horridisq; has sylvas videbunt, syluestrem, ac inurbanum me hominē existimabunt, cur nō eis floridos hortos, ac si uctiferum potius pomarium exposuerim. Sed qui rationes nostras æquo animo expēdent, pleniori obsequio fortasse nobis indulgebunt. Semiramis Persarum Regi-

20

na, etsi sexu mulier, præclaris verò facinoribus vir, altissimo & prærupto loco amœnissimos hortos conferendos curauit, ut qui hos visendos accederent, longo itinere per arduum, & decliue montis dorsum, valles, & salebrosos saltus defatigati, post hortos ingressi, elegantiores, & floridiores conspicerentur. Nos huius præclara imitatione, post sylvas, & horrida montium nemora, ubi eos in nostrum pomarium introducemus, vberiores, ac gratiores futuros speramus. Præterea priora fuisse syluestria satius euidentiùs est, quàm ut debeat enarrari. Syluestres plantæ naturæ ope gignuntur, urbana humana vi, ac labore, earum prædomita feritate, in hortis mansuescunt, unde syluestres urbanas  
30 præcedere debent. Sed Hippon nullum putat discrimen inter syluestre, & urbanum: nam alterum ab altero sola cultura differre dixit, quod falsum putat Theophrastus: nam differentiam inter urbanum & syluestre naturalem esse dixit: siquidem alia sunt, quæ sine cultu vivere nequeunt, cetera illa, quæ coli so-



lica, alia cultū nullum admittunt, ut verè syluestria, immò cultu deteriora red-  
dūtur, ut abies, pinaster, celastus, & reliqua, quæ hoc libro claudemus, quæ in  
sua naturali feritate semper manēt, nullòve ingenio cicurari possunt, sed spōtè  
in incultis, & immixtis locis nasci volunt, sicuti animalium plura genera, quæ  
mitescere, & mansuescere nullo artificio, nullòve ingenio possunt. Sylua igitur  
apud antiquos duplex fuit, cædua vna, glandaria altera. Cæduam, de qua hic lo-  
quimur, vocamus eam, in qua arbores generantur, quæ quum ad iustā magni-  
tudinem creuerint, cæduntur, ut eius materies igni, vel ædificiis, pedamentis,  
peticisve vinearum aliisve vsibus nobis cōmodum præstent, ut succisa rursus  
ex stirpibus renascantur. De glandaria posterius dicemus: nam Cato agricul- 10  
turæ primus, quæstuosiorem, magisq; villæ necessariam dicit: cæduam septi-  
mo loco, glandariam nono statuit. Nos arbores cæduas in resiniferas, & non  
resiniferas diuidemus. resinifarum alia coniferæ æterna coma pubentes, ut  
cedrus magna, abies, cupressus, pinaster, & picea, vel decidua coma, ut larix: nō  
coniferæ verò, terebinthus, iuniperus, lentiscus, betula. Quæ non resiniferae,  
cōtinuoq; virentes, aquifolium, alaternus, coluthea, taxus, buxus, sabina, lau-  
rus, & tamarix: quibus decidunt folia, fraxinus, ornus, tilia, acer, carpinus, opu-  
lus, platanus, populus, vlmus, alnus, & salix.

*Sylua quid, sylvarumq; dij.* C A P. I.

**S**YLVÆ dicitur quasi soliva: alij verò à silendo dicunt: Græcis ὕλη, id est 20  
materia: nam sylva ad vsum habetur, ut ex ea materies cædatur. Soliti sunt  
Latini, Festo Pompeio auctore, uti S, quum Græci aspiratione, ut quum hi  
ὕλη, nos syluam infinitam arborum indiscriminatim nascentium multitudine  
dicimus. Apud Poëtas pro incondita rerum cōgerie recipitur. Iuuenalis.

—— *vultus grauis, horrida sicca*

*Sylua come.*

Virgilius quoque herbarum multitudinem confusam syluam vocat,

—— *primæ aspera sylua*

*Lappæq; tribulq; absint.*

Aphrodiseus febrium differentias, multitudinemq; febrium syluas dixit. 30  
Statius sua carmina Syluas vocauit, quod ibi variae, & multæ materiæ explica-  
rentur. Non parui facienda est sylva, quum prima communis ciuitas fuerit, &  
antequam epularum esset vsus, glandes, & syluestria poma nobis iucundissimo  
cibo fuere. Aristoteles in Politicis syluarū custodes necessarios dicit, ne com-  
pingendis nauibus vnquam deesset materia: néve qui lex his præterquam ad  
opera publica succideretur, quæ sylvæ consulares dicebantur. Nec dedignati  
sunt dij syluas habitare. Virgilius:

—— *habitarunt Dij quoque syluas.*

Plinius: Summum munus homini datū, arbores, sylvæq; intelligebantur. 40  
Hæc fuere numinum templa. Arborum genera numinibus suis dicata perpe-  
tuò



tud seruantur, vt Ioui esculus, Apollini laurus, Mineræ olea, Veneri myrtus, Herculi populus. Quin & Syluanos, Faunosq; & dearum genera syluis, ac sua numina, tanquam & cœlo tributa credimus. Vana antiquorum religio syluanum deum Pana Gorgonis filium existimauit, quem alij Syluanum vocant, cæteri Inuum. Hunc Arcades maximè venerabantur, vt *τὸν τῆς ὕλης κύριον* nuncuparent, non sylvarum modo, sed vniuersæ naturæ dominum. Virgilius.

*Pan Deus Arcadia.*

Et Ausonius.

*Nec cultor nemorum reticere Mœnalide Pan.*

Ilithia sylvarum dea fuit.

*Qua loca, quæue regiones syluis abundant, & quomodo in aquis nascantur. C A P. II.*

**N** V N C vbi syluestres arbores libentius oriantur, viuant, & procerius adoleſcant, explicare tentandum. Est omnibus in confesso montuosas regiones, vel mōtes ipsos syluosos esse: etenim collibus, planisq; locis frigidiores sunt, habentq; alimenti copiā: nam receptos imbres ac niues ob arborum vmbra diutiùs conseruant, quæ postea liquefactæ locum humectiorē reddunt, & præcipuè auersi Solis cursui: nam vbi Solis radij ad terrā directi sunt, prohibent ne humorē radices sugere possint. At locis, vbi diuturniores, longiorēsve vmbra, ac propterea frigidioribus, humores longiusculè adseruantur, quibus maximè ali arbores cōstat, & inter hæc loca, quæ ad septentrionē spectant. At qui ad Solem orientē positi sunt, & ad Meridiem, rari syluosi mōtes sunt: nam ardentes soles humorem exhauriunt. Theophrastus hæc habet. Vbiq; autem vniuersæ syluæ pars ad septentrionē spectans, ligna spissiora, pulchrioraq; profert, & summatim meliora, atq; omnino robustiora in Aquiloniis exeūt, augētur, atq; proficiunt, densa in longitudinem potius, ideoq; enodes, rectæ proceræq; fiunt. Apricis autē in profunditatem, & crassitudinem distēduntur, propterea obliquiores, nodosiores, atq; in totū solidiores, spissioresq; assurgunt. Has easdē differentias habent quæ opacis afflatuq; permotis nascuntur, nodosiores enim, breuiiores, minusq; rectæ, quæ apricis, quàm quæ flatibus expositis exeant. Alibi verò. Omnis autem materies amplior, procerior, obedientior, solidior atque in totum melior, copiosior, quæ partibus aquiloniis exit, & ipsius arboris partes, quæ Aquilonem aspiciunt, spissiores adulescentioresque constant, quæ verò ab latere, aut in orbe perflantur, hæc vertuntur, contorquunturq; Aquilone, vt medulla earum contraria sit, nec in rectum porrecta. Est & circa hæc Vitruuij sententia de materie loquentis, quæ in Apennino monte nascitur. Eius montis iugum se circumagens, & media curuatura propè tangens oras maris Adriatici, pertingit circuitionibus contra fretum. Itaque citerior eius curuatura, quæ vergit ad Hetruriam, Campaniaque regiones, apricis est potestatibus: namque impetus habet perpetuos à Solis cursu.



Vltior autem, quæ est proclinata ad superum mare, septentrionali regioni  
 subiecta, continetur vmbrosis & opacis perpetuitatibus. Itaque quæ in ea par-  
 te nascuntur arbores, humida potestate nutritæ, nō solum ipsæ augentur am-  
 plissimis magnitudinibus, sed earum quoq; venæ humoris copia repletæ tur-  
 gentes liquoribus abundantia, saturantur. Quum autem excisæ, & dolatæ vi-  
 talem potentiam admiserint, venarum vigorem permutantes siccescēdo pro-  
 pter raritatem fiunt inanes, & euanidæ, ideoq; in ædificiis non possunt habere  
 diuturnitatem. Quæ autem ad Solis cursum spectantibus locis procreantur,  
 non habentes interuentorum raritates, siccitatibus exuictæ solidantur, quia  
 sol non modo ex terra lambendo, sed etiam ex arboribus educit humores. Ita-  
 que quæ sunt in apricis regionibus spissis venarum crebritatibus solidatæ, non  
 habentes ex humore raritatem, quum in materiam perdolantur, reddunt ma-  
 gnas vtilitates ad vetustatem. Hucusque Vitruuius. Sed mihi firmiores quæ in  
 montibus nascuntur videntur, vtpote quæ validioribus ventis perflentur. In-  
 genita enim natura, tanquam aduersus hostes sese obfirmant. Quod testatur  
 Seneca. Non est arbor solida, nec fortis, nisi quam frequens ventus incurrat:  
 ipsæ enim vexatione cōstringuntur, & radices alcius figunt: fragiles verò, quæ  
 aprica valle creuerint. Chiron Achillis hastam in Pelio monte, vt esset præ-  
 stantior, excidit. Varro in montanis prolixiora, & firmiora nasci scripsit, pro-  
 pter frigus, & montanas syluas aliis præstare. Apuleius montem syluosum in  
 villa copiosum habere oportere dixit, sponte naturæ productum, qui si non  
 contingat, non difficile est etiam montes syluosos plantare. Etenim sylue-  
 strium arborum semina sunt, quæ disseminata syluam producere possunt. Sed  
 in siccis locis non valdè succedit. Nos vt sylua in palustri concresecat, ita cura-  
 bimus. Agrum aratro versabimus, omnemq; cespitem radicibus extirpabimus,  
 post id ad exortum semina quæ sita spargemus: hac satione locus plantarum  
 copia refertus reddetur, quibus maxima ex parte humor exuberans exhauri-  
 tur, tunc & radicum accretione, caducorumq; foliorum, & surculorum pullu-  
 latione, in dies solum reddetur subleuatius, & siccior. Arbores præterea, quæ  
 spontè nullaque adhibita cura nascuntur, in humidioribus locis frequentius,  
 vberiusque nascuntur. Quod Virgilius ostendit.

*Spontè sua veniunt, camposq; & flumina latè  
 Curua tenent.*

De humidis syluis & ad septentrionem vergentibus maximis copiosisque  
 multa adsunt Poëtarum testimonia. Lucanus de Hyrcania.

*Vidit ab Hyrcanis, Indoq; à littore, syluis.*

De Hybla Scythiæ prouincia Valerius Flaccus.

*Densior haud vsquam, nec celsior extulit vllas*

*Sylua trabes, fessaq; prius rediere sagitta,*

*Arboris ad summum quam peruenere cacumen.*

Est in septentrionali plaga Hercynia sylua, cuius miracula Plinius recenset:

quæ



quæ omnia miracula excedunt. Theophrastus sylvestres esse arbores, quæ maximè aquosis gaudent, vt populus, salix, & omnia denique, quæ secus fluuios nasci solent: de quibus posterius loquemur.

*De stirpium diuisione, & dicendorum ordine. CAP. III.*

**A**NTE QVAM rusticæ rei tractationem aggrediamur, visum est, vt quæ dicenda sunt, suis locis digesta pertractentur, totius operis diuisionem meo more ordinatim quasi in tabellam expictam legentium oculis proponere spectandam. Naturale omnium stirpium discrimen, & quod omnia præcedere debet, si Aristoteli, Theophrasto, cæterisq; credendum est, urbanum erit & sylvestre: ob id de sylvestribus prius. Sylvestres, aut feras arbores, vocamus eas, quæ cultum horrent, quibus si adhibueris, non solùm non mitescunt, sed deteriores redduntur: ope non gignuntur humana, sed sui cuiusque ingenij semina ferunt. Urbanæ autem, quæ absque cultu viuere nequeunt. Plinius. Quæ mites fructu, vel aliqua dote umbrarumve officio humaniùs viuunt, non improbè dicantur urbanæ. Hæc cura mortalium eueniunt. Et hæc iterùm Theophrasto authore diuidemus. E stirpibus quas terra edit, quædam in arbores attolluntur, aliæ in frutices exiliunt, sunt quæ humiliori statu contentæ solùm exeunt in herbam. Arborem appellat Theophrastus quicquid ab radice statim simplici caudice brachiatum ramis, surculosum, dissolutumq; contumax  
 20 assurgit, quemadmodum olea, & ficus. Fruticem verò (seu mauius dicere cremium) quod ab radice multiplici, ramosumq; sese profert: qua nobis appellatione rubus, & hederæ continetur. Herbam quod ab radice foliatum, sine caudice proueniat, sæpiusq; semen caule ferat, vt frumenta, & olera. his tribus veluti summis fastigiis omnes stirpes comprehenduntur. Ex herbarum genere porrò quædam fruticantur, quæ ramulis compluribus, surculisq; lignosis sca-  
 30 rent, sed minutis constant foliis, has veluti fruticum rudimenta quædam, suffrutices aliqui appellare maluerunt. Græci φρύγανον vocant. Possunt tamè quædam cultus mangonio à sua natura desciscere, vt ad aliud genus permeare videantur, vt malua, quum senis septenisq; mensibus tanta crassitudine, longitudineq; proficiat, vt instat arboris grandescat, & ad vsus baculi veniat. Frutices quoque nonnulli vetustate in arbores degenerant, vt virex & hederæ. Arbusculæ itidem quædam si dimittantur syluescere, in frutices transeunt. Hoc naturarum germanitas præstat, vt vna in alteram se facillè vertat. Nos hunc ordinem sequèdo in Syluis sylvestres arbores describemus, in Pomario, & Oliueto domesticas, in Vineæ & Arbusto vitem, fruticem, in Horto, coronario suffrutices, in olitorio herbas, in Segete, & Pascuis herbacea.

*De syluestrium arborum genitura, natura, morbis, & physionomia. CAP. IIII.*

**N**UNC de syluestrium arborum genitura loquemur. Arbores, Theophrasto authore, sponte, radice, semine, auulsione, ramo, surculo, & cæteris



generantur, ut latius in quarto libro dicitur. Quæ femine, radice, & sponte nascuntur, naturales maximè sunt, & ideo syluestrium generi accommodantur: reliquæ hominum arti & electui destinatae. De his dicitur, quum de urbanis loquemur. Est syluestrium arborum natura urbanae similis, breuioribus tamen foliis, ramis, radicibus, & tota forma: quippe scabriora, spissiora, duriora, contortiora tam ipsa fieri solent, quàm vniuersa natura, sicciora enim, & tenuiora, atq; etiam spinosiora. Florent, sed parum durat florum prouentus. Præueniunt germinatione urbanas, plus fructus præmonstrant, minus maturant. Fructus producant, quorum semen, siue os, pinguius, pulpa verò macilentior. Semina maxima crusta munita præferunt, sapore acri vehementi quæ. Fructus odoratiores. Sunt spinosa, horrida quæ, quod ex nimia siccitate prouenit. Vitæ longæ, diutius quæ; perennant. Radices lignosas habent, longas, & procurrentes, etsi sint, qui dicant summæ cuxi telluris in hære. Fructificatio sera. Sunt plerumque sterilia, & parum fructificat, propter spissitudinē, & virium bonitatem, & molis totius largā nutritionē infœcunda redduntur. Euenit namque ut huiusmodi arbores alimentum ad se nutriendas absumant: quum enim fructificatio partem alimenti superuacua desideret (ex hac enim fructus exoritur, sicut in animalium genere semen effici solet) si se aliorum assidue pars illa conuertat, absumatur quæ, tolli generationem necesse est: haud enim natura utriusque parti satisfacere potest, quum alimentum, quantum suffecturum sit, capere nequeat. Omnes ferè, quæ magnitudine maiore se attollunt, minorem generant fructum, ut ficus indica: hæc enim & si mira quadam sit magnitudine, fructum exiguum admodum, eundem quæ fert paucum, ut quæ ad generandum totum absumat alimentum. Indoles, ex qua syluestribus arboribus cælum & solum conuenientia distribuemus, ex his pendere videtur. Ne nimia frigoris acerbitate, & ventorum agitatione, oculi, & tenera pullulantium germina torperent, obrigerent quæ, natura eas perpetua fronde vestiuit & decorauit. Et quia eas ventosis locis, & frigidissimis amandauerat, ne perpetuis gelu & niuibuscum cælo decidentibus earum coma onerarentur, nè diutius insidgere, & in hære possent, folia, pectinum modo dissecta, promissa, & capillamenti modo angusta, prætenuia quæ largita est. Et quia ventosis locis permansuræ, ne eadem ampla folia ventos concipientia eas deturbarent, aperta dedit, ut vndique venti peruij dilaberentur, & euaderent. Altis firmis quæ radicibus etiam obfirmavit, ut quantum ad æthera extollerentur, tantum radices ad ima terræ demergerentur, ne maxima turbinum procella, vel quando Boreas proteruo spiritu furit, radicitus euellerentur. Quia frigorum, & siccitatum in montibus incolæ futuræ erant, ne earum succus exiccaretur, absorberetur quæ flatribus, oleosum, pingue, piceum, & resinofum succum eis contribuit, ut diutius contra eos tutarentur: & ne ventus etiam nimis earum proceritati officeret, caudicem neruosum, rectum, firmum quæ; dedit, quod cederet, non frangeretur, aut dum agitantur, commouentur quæ, deturbarentur ab



eis. Morbos syluestribus arboribus accidere negant, quibus intereant, tamen quoque eas malè affici dicunt, perspicueque, præcipuè quum germinare incipientes, vel paulò post germinationem, vel florentes, grandine vexantur, quumq; flatus frigidus, feruidusque his eisdem temporibus successerit: tempestiuis autem hyemibus, nec si excedant quicquā offendi, quinimmo omnibus algorem prodesse volunt, quippe nisi alserint, deterius germinare. Sed violenta affectio syluestres & urbanas interimere potest, ut corticis in orbem detractio, excepta adrachne, & subere, immò hanc iuari potius dicunt. Decacuminatio etiam quibusdam affert mortem, ut pino, abieti, piceæ, & palmæ: quidam cedro & cupresso referunt. Hæ nanque detracta coma, decisoque cacumine, totæ intereunt, nec quicquam germinant, sicut nec si adusta aut tota, aut aliqua pars fuerit.

*Decadenda materie & conseruanda. CAP. V.*

**Q**UONIAM sylvæ institutæ sunt ad cadendam materiem, ideo de eius ratione tractandum. Multum enim refert si arbores tempestiuè cæsæ fuerint: nam firmiores, diuturniores, & æternæ fiunt magis, neque à carie, & tinea prærodentur, & hac ratione ædificia in longius tempus permansura sunt, ut nō solum nobis, liberisq; nostris, & reliquis successoribus, cōsulamus, sed publicis rebus, ut diutius perennent. Optimi materierum cæsores antiquitus magno pretio habiti sunt, quum magno Reip. usu esse cognoscerentur. Vnde his munerū vacatio tributa fuit, authore Callistrato iureconsulto. Sidonij cæsores maximè laudati sunt. Salomon ex ædificaturus Dei molem, ad Iro-mum Sidoniorum Regem literas misit, ut suorum cæsores opera uti liceret, qui in monte Libano cedros, cupressos, & abietes cæderent. Nos primū quæ à maioribus nostris narrata reperimus, referemus, quæ summa diligentia ratione q; adnotarunt, mox sequemur & nostra, si quæ ipsi ex maioribus experti sumus, aut peritiorum artificum monitis adnotauerimus. Theophrastus ma-  
 teriem quidem rotundam tempestiuū cædi dicit, & omnem quæ decorticanda accipitur, quum germinare incipit: tunc enim cortex extricatu perfacilis est, quod turgere appellant, scilicet ratione humoris, qui sub eo cortice fieri solet. Postea inextricabilis redditur, materiesq; nigrescit, in formisq; fit. Quadratam autem post turgorem, securis autem deformitatē aufert: deniq; omne, quod pro valido capi oporteat, tempestiuus cæditur, non solum quum germinare desierit, sed etiam quum fructum percoxerit. Quæ aptæ obrui sunt, aliquando post messem, aliquando post vindemiam & arcturum caduntur. Robur ferissimè cadendum, scilicet hyeme post autumnum: quod si sub turgore cadatur, citissimè omnium ferè cōputrescit, seu cum cortice, seu sine cortice capiat. Potissimum quæ primo turgore, proxima quæ secundo, tertia quæ tertio. Quæ autē post fructuum maturitatē caduntur, quāuis nō turgida sint, incorrupta perdurant, præterquā quod sub cortice vermiculi quidā nascētes, caudi-

*Theophr.  
de hist.  
plant. lib.  
5. c. 1.*



Plin. lib.  
16. c. 39.

cem per summa inscribunt. A quo Plinius. Cædi tempestiuum quæ decortice-  
centur, vt teretes, ad templa, ceteraq; vsus rotundi, quum germinant, aliàs cor-  
tice inextricabili, & carie subnascenre ei, materiaq; nigrescente. Tigna ex qui-  
bus aufert securis corticem à bruma ad Fauonium, aut si præuenire cogamur,  
Arcturi occasu, & ante eū Fidiculæ. Nouissima ratione solstitio. Caro de ma-  
terie cædenda hæc habet. Materies pro ridica, vbi solstitiū fuerit ad brumam,  
semper tempestiua est. Quæ materies semen habet, quum maturum semen  
habet, tunc tempestiua est: quæ materies semen non habet, quum glubet, tunc  
tempestiua est. Ea quæ semen viride & maturum habet, vti est semen de cu-  
presso, & pino, quisuis anni temporibus legere possis. Item quisuis anni tem- 10  
poribus matura est, & tempestiua, ibi dum sunt nuces bimæ, inde semen exci-  
det, & anniculæ, vbi primū incipiunt hiascere, tum legi oportet, tum primū  
per semen incipiunt maturæ esse, postea vsque adeò sunt menses octo. Vitru-  
uius hæc addit. Materies cædenda à primo autumno ad id tempus, quod erit  
antequam flare incipiat Fauonius. Vere enim arbores omnes prægnâtes sunt,  
& vires omnes suas in frondes, & anniuersarios fructus effundunt: quum er-  
go temporum necessitate inanes sint, ratione constat euandæ, & imbecillæ  
esse. Quod in mulieribus videre est, vt à conceptu vsque ad partum, neque sa-  
næ, neque validæ iudicentur: nam in corpore præseminatio crescens ex cibo  
detrahit alimentum in se, & quo firmior efficitur ad maturitatem partus, eò 20  
minus patitur esse solidum. Editio fœtu alimentum quod prius detrahebatur,  
nunc inanibus, & patentibus venis in se recipit, solidescit, & redit in pristinam  
naturæ firmitatem. Eadem ratione arbores fructum maturantes, humorem  
effundentes, raræ, & languentes fiunt: vbi fructum emisierint, succum in se re-  
tinent, & quiescentes reficiuntur, & restituuntur. Mox hyemis vis compri-  
mit, & consolidat eas: ergo si eo tempore cædantur, materies erit tempe sti-  
ua. Cassianus ex Varrone. Ianuario mense ligna ad ædificandum, & operas cæ-  
di dixit, & si necessitas postularit, Iulio. Hesiodus post autumnum arbores se-  
candas iubet.

*Tunc operum multò ante memor discinde securi  
Sylvam incorruptam, tunc germina desinit arbor  
Fundere, datq; suas volitare per aera frondes.*

30

Nunc syderum ratio declaranda est. Infinitum referre aiunt ad materiæ se-  
candam lunæ æstates, cum anni temporibus. Luna in syluis Diana vocitata est,  
Deaq; nemorum habita, quod hæc arboribus succum inculcet. Rei agrestis do-  
ctores materiem non nisi decrescenre Luna secari debere dicunt: vnaq; sen-  
tentia consenserunt omnes. Theophrastus duritiæ causa cædi post Lunæ occa-  
sum præcipit, quasi duriora, & computrescere peruicaciora forent. Plinius. In-  
ter omnes verò conuenit vtilissimè in coitu eius sterni, quem diem alij interlu-  
nium, alij silentis Lunæ appellant. Sic certè Tiberius Cæsar concremato pon- 40  
te naumachiario, larices ad restituendum cædi ex Rhetia præfiniuit. Quidam  
dicunt



dicunt, vt in coitu, & sub terra sit Luna, quod fieri non potest nisi noctu. At si competant coitus in nouissimum diem brumæ, illa æterna sit materies; proximè, cum supradictis syderibus. Quidam & Canis ortum addunt, & sic cæsas materies in forū Augusti. Cassianus addit suis præceptionibus cædendorum lignorum Luna sub terris latente, & in coitu existente, additque rationē: quia Lunæ lumen ligna molliora facit. Quod idem & Diophanes confirmat. Hesiodus post decimum septimum diem Lunæ.

*Septima post decimam Cereris terat hordea sacra,*

*Ingentemq; licet ferro discindere syluam,*

*Ac varias aptare trabes, quibus ardua tecta*

*Moliri, ac structam possis agitare carinam.*

10

Cato hominū summus in omni vsu de lunaribus diebus hæc ait. Materiem omnem, quam effodies, Luna decrescēte eximito, post meridiem sine vento Austro. Caueto ne per rorem trahas, aut doles. Idemque mox. Nisi intermestri Luna, atque dimidiata ne tangas materiem. Tunc ne effodias, aut præcidas abs terra: diebus quatuor proximis, quibus Luna plena fuerit, optimè eximitur. Omnino caueto nigram materiem doles, néve cædas, néve tangas nisi siccam, néve gelidam, néve rorulentam. Tiberius idem & in capillo tondendo seruauit interlunia. M. Varro aduersus defluuia præcepit obseruandum id à pleniluniis. Columella à vigesima vsque ad trigessimam dixit. Vegetius à  
20 quintadecima vsq; ad vigesimam quintam ad naues fabricandas. Hoc modo innocentius secatur nitidior, solidiorq; materies, & immunis à carie conseruabitur. Huiusmodi rei Astronomi rationem dicunt, quod in Lunæ motu omnis rerum humor commoueat: ergo humore Lunam versus ad vltimas radicis fibras aut retracto, aut destituto; cætera materies purgatioꝝ relinquitur: Inde deficiente, exhaustam tunc dicunt arboris crassam illam pituitam, quæ quidem ad citam illam putredinem imbuendam prona erat. Constat etiam frondes arborum Luna decrescēte preparatas non putrescere. Contra  
30 verò crescente Luna, ac eius plenilunio præcisa, inepta fabricis operibus per humoris conceptionem erit, & marcescet, vt eo ipsomet anno vermium labe exesa, in puluerem fatiscat, quod omnium Architectorum quotidiana opera perdocer: nam augescēte Luna, corpora ipsa implentur, humoreq; exuberant, porro humidū ipsum sua natura parua temporis intercapedine corrumpitur. Nunc cædendi modum exponemus: nam multo fideliores putant futuras si non statim prosternantur. Modum Vitruuius docet. Cædi autem ita oportet, vt incidatur arboris crassitudo ad mediam medullam, & relinquatur, vt per eā exsiccescat stillando succus, vt qui inest in his inutilis liquor effluens per torulum, non patiatuꝝ emori in eo saniem, nec corrumpi materiaꝝ qualitatem. Tum autem quum sicca, & sine stillis erit arbor, deiiciatur, & ita erit  
40 optima in vsu. Hoc autem ita esse, licet animaduertere etiam de arbutis. Ea enim quum suo quæque tempore ad imum perforata castrantur, profundunt



è medullis quem habent in se superantē & vitiosum per foramina liquorem,  
 & ita siccescendo recipiunt in se diuturnitatem. Qui autem non habent ex  
 arboribus exitus humores, intra concrecentes putrescunt, & efficiunt inanes  
 eas & vitiosas. Ergo si stantes, & viua siccescendo non senescunt, sine dubio  
 quum eadem ad materiem deiiciuntur, cum ea ratione curatæ fuerint, habe-  
 re poterūt magnas in ædificiis ad vetustatem vtilitates. Eadem Plinius, & Pal-  
 ladius: & omnes iubent stantes arbores, vsq; ad medullam concidi, vt sanies &  
 malus succus stillando effusus depleatur. Sunt insuper qui tradant, arborem  
 facilius cædi, ac celerius inarescere, si manu prius palpetur, quàm securi feria-  
 tur. Mirum profecto est, quod Anaxilaus, & Nicander Græci authores pro-  
 didere. Hic enim minimè algere cædentes, alligata ad arborem amphibœ-  
 na serpente. Ille verò arborem linteo, & asbestino lino circumuolutam sur-  
 dis ictibus, qui non exaudiantur, scindi. Sed cæsa materies custodienda est, nec  
 temere negligenda, diutius duratura. Eam conditam habere oportet loco, vbi  
 graues soles, & acres ventorum afflatus non appellant, sed vmbra penitus cō-  
 tectam esse oportet. Veteres architecti huius gratia fimo maxime ouillo il-  
 linire obseruauerunt: rationem assignat Theophrastus, quod obturatis egres-  
 sibus, concreta pituita, immodicaque vis vaporum per medullam sensim in-  
 stillat, atque respirat, quo fit, vt reliqua ligni siccitas siccando coaqualibus  
 condensetur. Stantes autem cacumine inuerso commodius sicari dicunt. I-  
 dem defossam materiem multo densari arbitratur. Cato iubet cæsam mate-  
 riem amurca illiniri, quo à tineæ & carie sit immunis. Præterea in succidenda  
 sylua hoc duximus animaduersione dignum: nam materies si vel ignis gratia,  
 vel aliorum operum cæditur, alia atque alia ratio erit. Eo modo sylua secetur,  
 vt arboribus & reliquis radicibus consulatur, aliter pœnitenda iactura seque-  
 tur. Itaq; multi ante Fauonium, & ipsam germinationem cædi tempestiuum  
 arbitrantur, alii post Brumam. quod ex loci natura prospiciendum est: nam in  
 calidis regionibus minus innocuè fit. Quod si contra in frigidis, sequens vis  
 hyemis stipites supernè exurit, adfertque non minimam, propter vniuersita-  
 tem, calamitatem futuris germinibus. Verum qui in iisdem locis factitant, hoc  
 etiam præcauent, ne in syluis ad Septentrionem, & ipsum Boream versus, sed  
 tantum ad Meridiem, & apricis expositis: sed ne etiam in cæteris festinantiùs  
 peragant, ne frigus intempestiuus nonnunquam adueniens nouella germi-  
 na propter festinatam cætionem præcocia adurat. Quidam autem longè post  
 germinationem propter corticis vsum secant. Qui stantibus adhuc plantis  
 corticem eximunt, maximè verò roboribus, & quercubus, & vlmis, ligni qui-  
 dem & corticis duplex lucrum captantes, quod quum sibi ipsis satagere cupi-  
 unt, sibi tamen præuident nequaquam. Enimvero hoc modo germinationem  
 retardant, tum etiam caudices maiori lachrimarum vi exiccantur, vt infernè  
 etiam tardius, minusq; vberim & prosperè regerminant.

*De cedro magna. CAP. VI.*

*Accedro*



**A** CEDRO incipiemus. quum nulla in historiis celebrior, & tot tantisq; authorum præconiis illustrior: imitabimurq; Salomonem sapientissimum illum loquutū à cedro, quæ in Libano, vsq; ad hyssopū, quæ exit ex pariete minima. Tā vastæ magnitudinis est arbor, vt non coniferas modo, resiniferasq;, sed omnes, quas terra gignit, amplitudine superet. Erat apud antiquos æternitatis, & nobilitatis symbolum: æternitatis quod eius materies nō putrescat, nec cariem patiatur: & cedro digna loqui dicebantur illi, qui ea scribunt, quæ nulla temporis iniuria sit abolitura. Nobilitatis: legitur in Ezechiele aquilam passis alis minabundam ad Libanum applicuisse, cedriq; medullam & furculos abstulisse, & Babylona transtulisse, interpretatum est ab Adamantio Nabuchodonosora Babylonix Regem ad Libanum, id est Iudææ claritatem peruenisse, abstulisseq; medullam cedri, id est nobilitatem extirpassē.

Græcis *κέδρος*, Latinis cedrus. Sed magnā cedrū, de qua hic loquimur, Græci *κεδρελάτῃν* vocant, composito nomine ex cedro, & abiete, quæ *ἐλάτῃ* iis dicitur, quasi cedrabies. Plinius à Græcis cedrelatē vocari dixit. Refert Moses Deum mandasse Noe, vt ante cataclysmi diem arcam conderet, qua humanum genus, cunctaq; animantia includerentur, vt ab imminente morte defenderet ex lignis gofer, quod cedrum interpretantur, tum Philo Iudæus in libello biblicę antiquitatis, tū Talmutistę omnes, quū arca eximię magnitudinis futura esset.

**20** Italici *cedro*. Ex Theophrasto describemus. Inter sylvestres perpetuò viret folio, angusto, & in extremitate pungēti. Caudice procero, leui, & enodi. Radice per summa vaga. Mutilatione, seu decacuminatione posse interire refert in causis, ratione siccitatis, rectitudinis ac radicis simplicitate: de super enim incūbens pestis caloris, frigorisve, facile ad ima vsq; trāsmittitur, quia recta. Dioscorides tū libro primo, tum quinto magnā cedrū iuniperi baccas ferre scripsit. Et etiā cedri magnæ baccarū meminit, in qua fœdissimè hallucinatus est. Plinius de magnæ cedri generibus loquens ait. Quæ floret, fructū non fert: fructifera nō floret, & in ea antecedente fructus nouus occupat. Quę verba è Theophrasto trāstulit, libro tertio, de iunipero loquēte: Iuniperi duo genera, quæ floret fructū non fert, fructifera nō floret; cedro insulsè tribuēs, quæ Theophrast⁹ iunipero ascripserat. Folio capillato, & pūgenti. Radice maxima spatio & plenitudine. Decacuminatione perit, vel cacumine ignibus adusto. Nos relatione Petri Negroni, totius orbis peragratione insignis, ita describemus, quas in Libano monte se vidisse fatebatur: ferebatq; secū conos multos, quos habuimus. Arboris facies turbinata à summo, caudice excelssimo, cuius pars ima scabra, superna glabra, à terra ramosa. Rami trāsuerſi herent, vt arte infixi videātur ad scandendū. Conos ad cœlū tendētes gerit, abiegnis similes, crassiores, maiores, durioresq;, quinq; aut sex digitorū longitudine, colore ex cinereo fuluos, pertinaciter hærentes ramis, cōpactili squamarū, ceu cupressorū, congerie coag-

**30** mētatōs, atq; obtrusos. Coni post duos annos hiantes paulatim, vēris, & pluuiis decidunt, relicto in ramo pediculo firmo, quo per mediū coni traducebantur.

Nomen

Descriptio



Horum meminit Plinius libro sextodecimo, Quorum & hastula infixæ est. Semen abieti simile, dulce, ut pineæ, retinens oleolum quoddam odoratissimum.

Calum.

Theophrastus de cedro loquens. Quæ locis argentibus valent perdurare, hæc plus caloris sortiri, ut cedrum: super hac enim nec niuem posse durare autumant, ratione caloris. Et ex loci proprietate Syriam cedros ferre scripsit. Plinius scripsit in Creta, Africa, & Syria laudatissimam nasci. Cedrum natura æstuosis partibus dederat, at in Lyciis, Phrygiisq; montibus nascitur. Sed præcipue in monte Libano nascitur, teste contra Appionem Iosepho, toties sacris literis commemorata: Quasi cedrus exaltata sum in Libano. Vitruvius nasci scribit in Creta, Africa, & nonnullis Syriæ regionibus. Cedros insula in littoribus Germaniæ est, quod cedri arbore referta sit, sic appellata. 10

Materies.

In Syriæ montibus eousq; crassescit latitudine cedrus, ut quatuor hominum vlnis cingi nequeat. Adde his pulchriores in hortis comperiri, ita quod in Cypro Reges tum ex imperitia, tum ex transuehendi difficultate nunquam materiem cæciderunt. Longitudo his, quæ ad vndecimem Demetrii Regis cæsa sunt, \* passuum tredecim, quod Herodotus primum, mox Theophrastus, & eum secutus Plinius scripsit. Syri ad triremes utuntur. Simulachra ex cæsi solent: nam rimas non capit, & carnis æqualitate quodammodo constare videtur. Eius materies nata est humorem emittere, & in plenum omnes, quibus oleosus est humor: quamobrem deorum statuarum visæ sunt aliquando sūdasse: ex hac enim condere consueverunt. Plinius. Materiarum verò ipsi æternitas, itaq; & simulachra deorum ex ea factitauerunt. Cedrinus est Romæ in delubro Apollo Sosianus Seleucia aduectus. Cedrum æternum putant clare de omnibus materiis indicio in templo Dianæ Ephesiæ, utpote cum tota Asia extruente, quadringentis annis peractum sit. Conuenit rectum eius esse æ cedrinis trabibus. Memorabile & Vricæ templum Apollinis, ubi Numidicarum cedrorum trabes durant ita, ut posite fuerint prima urbis eius origine, annis mille, centum, octoginta octo. Vitruvius, Ephesi in æde simulachrum Dianæ, & etiam lacunaria ex ea, & ibi, & in cæteris nobilibus phanis propter æternitatem sunt facta. Ex cedrinis etiam lignis domus Davidis Regis in Hierosolyma civitate erat, quæ illi Iramus Rex Tyri miserat. Templum illud Salomonis, quod nil unquam in rerum natura mirabilius visum est, columnis & trabibus cedrinis stetit, ut libro Regum scribitur. Et dirutum iterum trabibus cedrinis reedificatum, permittente Cyro Persarum Rege. Arca fœderis, quam Deus Moysi iusserat ædificari, ex materie sittim compacta fuit: est autem sittim, ut interpretes voluerunt, electissimum cedri genus. Virgilius Laurenti regiam describens, in eius vestibulo auro effigies, Latini Regis æ cedro fuisse scribit. 20 30

*Quin etiam veterum effigies ex ordine auro  
Antiqua ex cedro, Italusq; paterq; Sabinus  
Vitisator, curvam seruans sub imagine falcem,  
Saturnusq; senex, Ianiq; bifrontis imago,*

40

Vesti-



*Vestibulo astabant.*

Cedro sunt tubera, sicut sunt in carne glandia: in iis nec vena, nec pulpa, quodam callo carnis in se conuoluto. Sectilis quoq; in laminas: cuius operimento vestitur alia materies. Clauum non tenet, ex Plinio. Apud Homerum Caliphus ad nocturna lumina odoratam cedrum comburit. Ex quo Virgilius.

*Proxima Circe raduntur littora terra,*

*Dives inaccessos ubi Solis filia lucos*

*Affiduo resonat cantu, tectisq; superbis*

*Vrit odoratam nocturna in lumina cedrum.*

10 Ex cedro laudatissima resina, vt Plinius inquit, cuius pix cedria vocatur. De- Resina.  
functa corpora incorrupta æuis seruat, viuentia corrumpit. Mira differentia, quum vitam auferat spirantibus, defunctis pro vita sit. Crassio rem resinam, & ad picem faciendā cedrus fundit. Eo liquore peruncta materies nec tineam, nec cariem sentit. Ideo cedratos olim Numæ libros Hemina tradit, quod eos nulla attrigisset tineæ, nec etiam vetustatem experti essent: miraculo quod tot infossi durauere annis; quippe DXXXV. In quibus scripta erat philosophia Pythagorica. Virgilius eius nidore serpentes abigi cecinit:

*Disce & odoratam stabulis accendere cedrum.*

#### *De minoribus cedris. CAP. VII.*

20 **E**T SI de coniferis primū scribere proposuissem: quum cedri species plures sint, exq; bacciferæ, ne perirent, visum est ei subiungere. E Theophrasti verbis quisque conicere poterit maiores cedros à minoribus diuersas esse. Plinius maiores à minoribus distinxit. Galenus magnam cedrelarem vocauit, minorem fruticosam, & iunipero similem. Theophrastus minoris cedri Genera.  
duas species ponit, Phœnyceā alteram, Lyciam alteram. Idæi simplicē dicunt: sed alteram ab altera differre, ob foliorum acutorum differentiam; quam oxycedron vocant. A quo Plinius. Duo eius genera, Lycia, & Phœnicea. Differunt folio: nam quæ durum, acutum, spinosum habet, oxycedros vocatur, ramosa, & nodis infesta. Altera odore præstat. Auicenna de genere pini esse dicit, Descriptio.  
30 habere fructum similem cupressi fructui, sed eo minorem, & habere spinas. Et est duarum specierum, quarum vna longa, altera brevis. Theophrastus minorem cedrum describens ait. Arbor iunipero nō ab similis, sed cedro folium acutum, spinosum, & durum, subsistens infra iuniperi magnitudinem. Caudice contorto, nodoso, & frequentibus alis. Materie æterna, ne cariem quidem yllam sentiente, corde referta, rubea, & odorata. Sed fructus odoratus, ruber, & esculentus, iunipero similis, durans annum: prius non decidens, quàm subnascatur alius. Arcades fructus in eo ternos eodem haberi tempore confirmant, id est anniculos, qui nondum maturescant, & bimos, maturos quidem, sed qui gustu respuantur, trimos, qui mandi possint. Satyrus vtramque sibi à Theophr. paulo altior.  
40 rusticis allatam sine flore, cupresso similem, scabriore tamen cortice. Radices



soluta, summa telluris cute hærent. Serotino fructu: nam quæ perpetuò virent, tardè fructificant. Est præterea fructus pinguis, & lentitia quadà gliscens, unde quamuis non magnus, confici tamen difficilè possit. Quoniam talis est. Plinius ultra prædicta, quæ retulimus verba, dicit fructum ferre myrti magnitudine, sapore dulcem. Phœniceam describemus, quæ nobis ab Istria affertur. Gaza Punicam vertit, quæ ab aculeorum ingenti asperitate, oxycedros omnibus dicta. Caudice cute potius, quàm cortice vestito Folio perpetuo, astate alacriori, acuto, fere trigono, ramis diffusis & contortis. Non floret, nisi florem dicere mauis foliola lena, quæ fructum circumsepunt. Fructu semper grauida, anniculo succedit nouus, qui singulares sunt bacca granula alba intus copiosa cōtinentes. Dioscorides, & Plinius cedridem vocant. Edulis, vere viridis, mox fuluus, demum rubescens. Lycia altera à prouincia nomē habet, ab obtrusis foliis retusa dicta, folio obtusiori & frequentiori, tamarisci similitudine. Caudex subruber, virigineo cortice obductus: in reliquis iuniperū refert. Folio quasi squamulis compactilibus coagmentato, digitorum attritu suauem odore spirante. Bacca per initia viridis, mox flauescens, postremo ad rubrum declinans, gustu subamara, odorataque. Theophrastus saxosis locis, & frigidis nasci, & solum eiusmodi quærere dixit.

Cælum, folium.

#### De abiete. -CAP. VIII.

**D**E abiete, eadem conifera, resiniferaq; scribemus, quæ nec longitudine, 20  
amplitudineq; magnæ cedro cedit. Macrobius inter felices arbores annumerauit. Græcis ἐλάτη, ab ἐλάω id est impello, & prolongo: nam in præcellam proceritatem assurgit. Hæc etiam ratione à Latinis abies dicta est, quod in cælum abeat. Italis *abete*. Ελάτη etiam inuolucrum, calycemve fructus palmarum adhuc florentium significat, vt etiam appellari dixit Dioscorides. Vnde in causa fuit, vt Plinius turpiter erraret: nam de vnguentis loquens, ait: Est præterea arbor ad vnguenta pertinens, quam alij elatem, alij abietem, alij pal-  
mam, alij spatham vocant. Nos descriptionem à Theophrasto diuissim tradi-  
tam, & dissectam, in vnum corpus coaptabimus. Primò quæ in vniuersum, 30  
mox quæ cuique generi conueniant, declarando. Surgit arbor recta, & magnitudine excelsa, totaq; forma decora. Corpus, capæ instar multiplici cortice tunicatur, assiduæ nanque tunicæ compactæ, subditæ aliam gerunt, atq; ex iis tota constat. Rami plures, duri, vel ramorum omnium durissimi, spissi, cornu sanè imitantes, colore flauo, tædæ similes, ordinati, vtrinque miro ordine inuicem sibi respondentes, nodosi. Folio semper virenti, raro, ac pectinatim insecto, in extremitate pungenti. Flore croceo, specioso, paulò ante solstitium se aperienti. Fructu autem post Vergiliarum occasum. Radice neruosa, singulari, ad ima descendenti, multis hirsuta capillamentis. Arcades non in profundum radices agere dicunt, vt radicibus flatu euertatur. At Idæi abietem altius quam lubet, radice descendere volunt, verùm radice simpliciore, ac meatu re-

Descriptio.



Etiori. Quum germinat, ter germinationem intermittit, ternaque germina  
 edit, ideo *τρίσπον* appellatur. Fit prima germinatio Februario ineunte, quam-  
 quam in Ida monte serius, ac ferè Idibus. Iterum germinat intermissis trigin-  
 ta diebus, aut paulò pluribus: sic fit, vt dum prima cacumina propelluntur, se-  
 cutis aperiat geniculato incremento, velut articulatim, vel sursum, vel in la-  
 tera fundentibus surculis, idque fieri solet exitu Martij. Tertia germinatio  
 Aprili mense, diebus scilicet quindecim intermissis, nec diutiùs senis, aut se-  
 ptenis diebus durat: clariùs tunc cernuntur incrementa non in longitudi-  
 nem, sed in corpus incrementa vertuntur. Arborum germinationes cum in  
 20 plerisque, tum maximè in abiete conspiciuntur, quum genicula in versus re-  
 ctos porrigantur, ramique ex æquo conditi procedant. Auctio, ac germina-  
 tio reliquis incerta est, tum modo, tum germine, sed abieti certa, continua, at-  
 que præpostera. Quum enim primùm scissum de caudice fuerit, rursusque  
 de eo alterum finditur, idque assiduè factitatur post quemque germinationis  
 superuentum. Amentifera est, autumnò enim postquam folia decidere, pecu-  
 liare eius cōfestim gignitur, quasi grauidæ intumescat, vt germina pariat, duret-  
 que per hycmem vsq; ad ver. Præciso caudice reuiuiscunt omnes, abies verò  
 inarescit omnino anno eodem, etià detōso cacumine. Euenit peculiare quid-  
 dam abieti, quum enim præcisa, vel vento aliave re quapiam, afflicta fuerit cir-  
 30 ca maiorem partē trunci, (habet enim aliqua ex parte lauem & enodem & æ-  
 qualē) vel perquā ingens quidpiam redundans paulo deterius adnascitur circa  
 fastigium, quod quidā circumauctionē, alij circumagnationē appellant, colo-  
 re quidē nigrum, duritia verò præpollens, ex quo crateres conficiunt Arcades.  
 Crassitudo talis, qualē arborem esse contingit, quò scilicet robustior, vegetior-  
 que, eò crassior. Illud quoq; peculiare hac eadem in re abieti accidit: quū enim  
 ramis omnibus ablaris, cacumen decideris, mox emoritur, quū verò inferiora  
 euersa sunt, quod restat, viuit, & agnatio, quam modo dixi, circum id fieri as-  
 solet, scilicet quia vegetius ac viridius est, attamen non renascitur. Si medul-  
 la detracta sit, moriendum omnino est, Arcades aiunt, nec abies seruari po-  
 30 test: causa est, quòd medulla pars humidissima, & vitalis præcipuè sit: cuius  
 rei argumentum, quòd materies, quæ medulla viduata est, peruertitur, recur-  
 uaturq; iam cōfecta, vsq; dū penitus resiccetur. Quapropter abietis materiem  
 filo scindunt, nec quicquā medullæ relinquunt. Perit etiam decacuminatione,  
 scilicet si arboris extremitas præcidatur, nō absq; ratione, quū sicca natura sit,  
 meatuq; cōdatur rectissimo, & vnica radice inhæreat. Vlnus enim infestat,  
 facitq; vt & frigus, & ardor faciliùs subeat, præsertim quum vndiq; infertur, &  
 ex proceritate, & meatu rectitudine non pigrè ad radices deueniat. Negata  
 est eis à natura neporum procreatio; tam siccitate radicis, quàm quod impetu  
 suo toto sursum contendant, atq; etià quia radice singulari nitantur, alteq; de-  
 40 scendant. Nusquā enim alimonix quicquā superfluit, nec verò dimotū alior-  
 sum se vertit: itaq; fit, vt nullū sit exurgendæ prolis initiū. Ab vlcere ampliori



altioriꝫ; non interit, quum tæda descinditur, immò ex infœcundis fœcundæ,  
 & ex pauciferis multiferæ redduntur. Corticis circumablatio in germinatione  
 abietis necat: quum enim cortice sit turgido, mense Februario, vel Martio, si  
 quis detraxerit, statim moritur, hyeme diutiùs tolerat. Hyphear, & stelis in  
 abiete nascuntur, & hæc differre inter se volunt, argumentumque adducunt,  
 quòd non solum in congeneribus erumpant, verum in eadem arbore plura di-  
 uersis partibus exeant, ut hinc stelis, inde hyphear, nec modò formas, sed fru-  
 ctus dissimiles ferant. Et hæc validiora sunt, quæ in abiete nascuntur, quàm  
 aliis: plus enim alimenti, & idem pinguius subministrant. In abiete quædam  
 nascuntur, quæ augures lucinas vocant, aëre nanque eblandito atq; remisso, 16  
 hæc erumpere potissimum solent, ubi intestinus humor collectus, & exterus  
 quoq; occurrens concreuerint, atque in rotundum conglobati fuerint. Hæc  
 Plinius ab eo transfert. Folia Abieti non decidunt, insecta, pectinum modo,  
 pungentiaq; . Flore croci colore circa solstitium. Semen reddit post Vergilia-  
 rum occasum. Germinationem tripartito intermittit, ac germina terna edit,  
 & ideo inter squamas corticum spargit, quod omnibus arboribus in germina-  
 tione euenit, quoniam pręnantium rumpitur cortex. Est autem prima earum  
 incipiente vere, circiter quindecim diebus. Iterum germinat transeunte Ge-  
 minos Sole: sic fit, ut prima cacumina impelli sequutis appareat, geniculato  
 incremento. Tertia est ad solstitium breuissima, nec diutius septenis diebus, 20  
 clareq; tunc cernitur crescentium cacuminum articulatio. Rami statim ab ra-  
 dice modici, velut brachia lateribus inhaerent. In ea ramorum ordo, & subre-  
 cta diuifura, ramiq; in cælum tendentes, non in latera proni. In lōgitudinem  
 excrefcit. Cortex multiplex tunicis. Radix singularis. Cortice in orbem de-  
 tracto, necantur arbores, sed quædam tardiùs, quædam citiùs moriuntur. Re-  
 fert & tempus anni. Abieti, si quis detraxerit Sole Taurum vel Geminos trans-  
 eunte, quum germinat, statim moritur, eandem iniuriam hyeme passa diu-  
 tiùs tolerat. Nec in ultimis ponendum, quando quibusq; satis vmbra aut nu-  
 trix, aut nouerca est, abietis, quæcunq; attigerit, non dubie venenum est. Fert  
 & cachryn: ita vocatur pilula, in medicina vrendi yim habens: gignitur post-  
 quam folia decidere, hyeme durans, continet nucleum pineis similem. Is cre-  
 scit hyeme, aperitur vere pilula tota, cadit, quum folia cœperint crescere. Sed  
 verbū *πίσιλιν* Gazater squamosum interpretatus est, quum pręgnans cor-  
 tex rumpitur, squamas spargere videtur, quum ter inchoatum opus, intermis-  
 sumq; repetat, & puto *πίσιλιν* legisse. Abietum quædam mascula, quædam  
 fœmina est, Theophrasti autoritate. Masculula folio pungentiori, acutiori, &  
 magis flexo, vnde arbor intuitu crispior videtur. Huius nucibus parui quidem  
 nuclei insunt, materies versicolor, latior, durior, medulla refertior, atq; in to-  
 tum aspectu deterior, nodosiorque. Fœmina folio pinnato, summo mucrone  
 rigenti assurgit, vsq; eò densum, ut facile, quasi concameratum imbres arceat, 40  
 nec tamen pluuiam transmittat, simileque potissimum cyathis Bœororum.



Illarum nucibus nulli quidem nuclei insunt. Materies mollior, candidior, operibusq; facilior, & in totum procerior caudex. Est & aliud genus, quod nascitur in Creta super lapides, & testacea (*ὀσπράκως*) carens radicibus, modo patellarum adhærens, folio carnosio, oblongo, crasso, frequenti, nec leguminum siliquis absimili. Concauum intus, nec aliquid intra se continens, colore accedens ad purpuram, forma erecta, multicaulis, rami longi, recti, solutiq; magnitudine cubitali, vel maior. Plinius ab eo. Abies è cunctis amplissima est, & fœmina etiam proluxior, materie mollior, viliorq;, arbore rotundior, folio pinnato densa, ut imbres non transmittat, atq; hilarior in totum. E ramis panicularum modo nucamenta, squamatim compacta dependent. Hæc abietis masculæ, primori parte nucleos habent, non item fœminæ.

Gaudet abies locis vmbrosis, in quibus longè pulchrior, quàm in apricis exurgit, itaq; in Arcadia circa Cranam, loco quodâ concauo, & silente à ventis, quem nunquam solem attingere aiunt, abietes tum longitudine, tum crassitudine cæteris præstant, non tamen frequentes, neque pulchræ cernuntur, quamobrem ad lautiora operum, ut fores cæteraq; magnifica, hisce minus videntur, sed ad nauigia domosq; duntaxat, quippe trabes, & antennas ex his optimas faciunt, atq; etiam malos, præstantissima longitudine, sed non similiter validas atq; ex his, quæ Soli expositæ starent, sed ex breuitate densiores illis robustioresq;. Si in montibus nascitur, non in excelsum excurrit, sicut circa Cyllenum promontorium euenit. Mnestheus propter calorem abietem posse durare locis argentibus, neque super hanc niuem posse durare autumat. Tortuosaq; prouenire ob calorem medullæ asserit. In Latino agro abietes tum magnitudine, tum pulchritudine inter omnes Italias præstant, tamen adeas, quæ Corsica gignit, pro nullo certè habentur. Macedonica præstantior, quàm Parnasia, cæteraq; spectantur: nam suo loco manens, amplior, pulchriorq; extat. Hæc Theophrastus. Varro: In montanis quædam proluxiora, & firmiora nascuntur, propter frigus, ut abietes, & sappini. Plinius. Situs in excelso montium, ceu maria fugiant. Romæ infernas abies supernati præfertur. Est & per gentium quoq; regiones in iis differentia. Alpibus, Apenninoque laudatissimæ. In Gallia Iura ac monte Vogeso: In Corsica, Bithynia, Ponto, Macedonia. Deteriores Æneatica, & Arcadica. Pessimæ Parnasia, & Euboica: quoniam ramosæ ibi, & contortæ, putrescētesq; facilè. Montes & vales diligit abies. Apuleius humidis gaudere ait. Vitruuius. Abietes, quas in Apennini parte, quæ ad Hetruriam vergit, infernates vocant, & quia perpetuos habent Soles, siccitatibus exuētæ solidantur. In ædificiis ad vetustatem perdurant. Quæ Septentrionali regioni subiectæ vmbrosis perpetuitatibus non solum augentur amplissimis magnitudinibus, sed earum venæ humore saturantur, quum exciduntur, siccescendo inanes fiunt & evanidæ: ideoq; in ædificiis diuturnitate carent, ideo supernates improbat. Quod à Plinio etiam excipitur. Robustiores aquiloniæ partes, & in totum deteriores ex humidis, o-

Calumnia



pacisq; spissiores ex apricis, & diuturnæ: ideo Romæ infernas abies supernati præfertur. Nos ex foliorum scillura & tenuitate, caudicis scabrositate, frigidis locis, algidis, & perpetuis niuib; obstitis nascituram iudicamus.

*Satis.*

E semine tantum, ut omnes coniferæ nascitur. Cultum aspernatur, nã hominum diligentia degenerat. Crescit, quoad libero sole fruatur, neq; interim crassescit, neq; fruticat, at ubi in iustam magnitudinẽ excreuit, in profundum latumq; dilatur: sic ramorum exortus, & laterales germinationes sequuntur, ut ex Theophrasto habetur. Nos autem ei profundum solũ destinamus, argumẽto quod vnica, eaq; profunda ad ima descendẽte radice firmeretur, ut firmitus ventis exagitata inhaerescat solo. Et quia in tantam crassitudinẽ, & materiem 10 crescit, non nisi ex humido solo tantum alimentum haurire potest.

*Materies.*

Abies expetita nauigiis, ut ex Theophrasto habemus: quum excelsa, proceraque sit, malos & antennas ex ea facere solent. Præterea quum multiplici tunica constet, qui remos dolant, singulatim æquabiliterq; auferre conantur: nam si ita auferatur, remus validus relinquetur, sin autem permutauerint, nec omninò pariter dempserint, infirmus reddetur, hoc enim modo ictus, illo demptio sit. Triremes, atque longa nauigia ex abiete leuitatis causa faciunt. Quercui conglutinari non valet; quũ altera spissa altera rara sit. Affectus autẽ similis esse oportet, quæ societate conflari debeant, non contrarii, cœu si ligno lapidem coniungere velis. Nauibus, propter flexum, humidior capiatur necess 20 se est: alioqui ad conglutinationem quidem siccior apta est: naus enim compacta, & extra mare fidelior constat, & in mare protracta humore imbibito, se vndiq; protinus comprimit, atq; coniunctis rimis omnibus continuat, nisi penitus exaruerit. Tunc enim gluten aut omnino aspernatur, aut non æquẽ recipit. Tectis commodior est, usque optima quæ vetustissima, modo immunis à carie sit. Neruosa est & rigida, ita ut vtrumque habeat è contrario neruos validos, mollem carnem, & raram, qua de causa leuis est. Habet neruos venasque omnium nobilissimas. Pondus sustinere validè potest: nil enim ponderi cedit, sed renititur, argumento quod nunquam rumpatur, sed potius quàm viribus, carie, aliisve deficiat. Materies nodosa, nodique reli 30 quis omnibus ferè duriores, densissimi, solidissimi, patentes, colore, tade proximi, & maximè sui generis, & si lignum molle sit. Nodi recti, & ramis quodammodo infixi, quamobrem validissima est. Fissilis est, propter meatuum rectitudinem. Tradunt abietis, dum germinat, decorticatam materiem aquis inoffensam durare nimium posse. Patuit id apud Phneum Arcadiæ, cùm obstrusis faucibus, campus in lacum redundauit: tum enim ductis pontibus ex abiete, quum amplius extumesceret aqua, aliis super aliis fabricatis, posteaquam exstrusis obturamentis vnda erupit, discessitque, vniuersa materies incorrupta comperta est. Eius materies etiam quadripartita est: quadripartitam appellant, quibus in vtramq; partem medullæ bini venarum 40 cursus naturæ contrarij perpendunt, atque per vtrumq; cursum adigunt, ictus cursu-



cursibus contrarios inferentes, dum in vtramque partem medullæ securis re-  
 meat, ita enim eueniat necesse est naturæ venarum ratione, paucaq; sunt qua-  
 dripartitæ. Si primo turgore cæditur, materies coloratior redditur: nam &  
 corticem detrahunt: vere cæduntur, tunc germinant. Plinius ab eo. Abies ad-  
 mirationis præcipuæ visa est in mari, quæ ex Ægypto Caij Principis iussu o-  
 beliscum in Vaticano circo statutum, quatuorq; truncos lapidis eiusdem ad  
 sustinendum eum adduxit, quæ naue nil admirabilius visum in mari certum  
 est. Arboris eius crassitudo quatuor hominum vlnas complectentium imple-  
 bat. Succisa abiete humor diu defluit. Hæc omnium arborum altissima, re-  
 10 altissimaque. Nauium malis, antennisque propter leuitatem præfertur. Qua-  
 dripartitos venarum cursus, bifidosque habet, vel omnino simplices. Ad fa-  
 brorum intestina opera medulla sectilis. Optima quadripartitis materies, &  
 mollior, quàm cæteræ. Intellectus in cortice protinus peritis. Abietis quæ  
 pars à terra fuit, enodis est: hæc qua diximus ratione decorticatur fluuiata,  
 atque ita sapius vocatur: superior pars nodosa, duriorq; susterna. In ipsis au-  
 tem robustiores aquiloniæ partes, & in totum deteriores ex humidis, opa-  
 cisque, spissiores ex apricis, & diurnæ: ideo Romæ infernas abies supernari  
 præfertur. Proximum medullæ habet quod Græci leuson vocauerunt. Tradunt  
 abietem circa germinationem decorticatam, qua dixi Luna, aquis non cor-  
 20 rumpi. Pondus sustinere validè potest. Fortissima ad tectum abies, eadem val-  
 uarum repugulis, & ad quæcumq; libeat intestina opera aptissima, siue Græ-  
 co, siue Campano, siue Siculo fabricæ artis genere spectabilis, ramentorū cri-  
 nibus pampinato semper orbe se voluens ad incitatos runcinarum raptus. Ea-  
 dem & curribus maximè sociabilis glutino, in tantum vt findatur ante, quàm  
 solida est. Cortex in magno vsu agrestium: vasa, corbesq; ac patentiora qua-  
 dam mellebus conuehendis, vindemiisq; faciunt, atque prætexta tuguriorum.  
 Vitruuius de abiete hæc habet. Abies aeris plurimum & ignis habet, mini-  
 mumq; humoris, & terreni, leuioribus rerum naturæ potestatibus compa-  
 rata, nō est ponderosa. Itaq; rigore naturali contenta, non citò flectitur ab o-  
 30 nere, sed directa permanet in contignationibus. Sed ea, quod habet in se plus  
 caloris, procreat, & alit termitem, ab eoq; vitiatur. Etiamq; ideo celeriter ac-  
 cenditur, quod quæ inest in eo corpore raritas aeris, patens accipit ignem, &  
 ita vehementem ex se mittit flammam. Ex ea antequam est excisa, quæ pars  
 est proxima terræ per radices excipiens ex proximitate humorem, enodis &  
 liquida efficitur, quæ verò est superior, vehementia caloris eductis in aëra per  
 nodos ramis præcisa altè circiter pedes xx, & perdolata propter nodationis  
 duritiem dicitur esse susterna. Ima autem quum excisa quadrisflunius dispa-  
 rat, eiecto torulo ex eadem arbore ad intestina opera comparatur, & sapinea  
 vocatur. Quod extruendis nauibus apta sit abies, etiam testimoniis Poëtarum  
 40 probare licet. Ex abiete Idæa Paridem naues præparasse, quibus ad raptum  
 Helenæ profectus est Eurpides tradit. Claudianus idem.



*Apta fretis abies.*

Eam, qua Iason cum Græciæ heroibus in Colchidem vectus est, Ennius ex abiete structam fuisse asserit.

*Vtinam ne in nemore Pelio securibus  
Casa cecidisset abiegna ad terram trabes:  
Néve inde navis inchoanda exordium  
Cœpisset, qua nunc nominatur nomine  
Argo.*

Ovidius.

—— *Et casus abies visura marinos,*

Homerus malum in naui ex abiete fuisse, qua Telemachus Pylum nauigauit, dixit,

*Ἰσὼν δὲ εἰλάπνον κοίλης ἐντὸς μεσόδρου  
ᾗσαν ἀείχνης.*

Hercules apud Apollonium Rhodium ad remum abietem euulsit. Hastæ ad præliandum etiam ex abiete fabricatæ sunt. Virgilius.

—— *Cuius apertum*

*Aduersi longa transfuerbat abiete pectus.*

*Resina.*

In abiete resina fit, cum lignis degustatis vulnus infertur, haud enim quæq; secretionē modo eodem agimus est. Succus illius resinaceus, ut omnium coniferarum: nec ampliori altiori; vulnere interit, ut omnes, ex quibus resina colligitur. Abietis lachrimæ sponte cōcrescunt. Sincerè olet, & sapit. Hæc Theophrastus. Ab eo Plinius. Resina ei vitium. Succis humor diu defluit.

### *De Cupresso. CAP. IX.*

**D**IDYMVS Græcus prodit Eteoclis fuisse filias, Charites dictas, siue Grætiæ, quæ dum tripudio dearum subsiliunt, extra choream deuolutæ, in puteum deturbantur; dolens earum vicem tellus, arbores frondosas puellis similes ad oblectamenta, & rei memoriam edidit. Sed Lactantius Placidus scribit: Cyparissus puer speciosus Telephi filius, dū venaretur, in amorem sui Apollinem compulit, à quo mirum in modum adamatus, in Chio insula, ut scribit Probus, ceruum habuit pulcherrimum & mansuetissimum, quo ab Apolline donatus, quem enixè dilexit. Alij dicunt Nymphis sacrum. Per sylvas verò errans, & lassus sub arbore & in herba obdormiuit, strepitu autem à somno excitatus à se longè ceruum vidit, & sylvestrem credens, iaculo imprudens traiecit, quòd ubi agnouit, tanto affectus est dolore, ut nec Phœbi consolatione, nec Medicinæ viribus ab huiusmodi luctu ac planctu retrahi potuerit, ut cibo etiam, & potu abstineret. Sed illud tandem supremum munus à Deo petiit, ut omni tempore ei flere liceret. Itaq; Apollo eius misertus, in arborem sui nominis conuertit, ex qua lachrima deflueret. Sic Apollo apud Ovidium:

*Tristisq;*



—— *Tristisq; Deus, lugere nobis,  
Lugebisq; alios, aderisq; dolentibus, inquit.*

Seruius autem à Sylvano deo adamaturn dicit, cuius ceruam inscius occidit, ut præ dolore postea puer contabuerit, verum ab amatore deo in arborem sui nominis conuersus est, quam hic pro solatio portare dixit. Virgilius.

*Et tenerum ab radice ferens Syluane cupressum.*

Diti ob varias & multiplices causas cōsecrauit antiquitas, sed omnes ex ipsius arboris natura. nam eius generis arborescisa, cum minimè rediuiua sit, humanæ conditionis sortem referre videtur: nam ex ea recisa, nil magis, quàm ex mortuo sperandum sit. Quamquam Herodotus solam pinum ex arboribus putet minimè repullulare, vocatq; eam *πανόλεσπον*, nimirum quòd recisam cupressum in Creta insula repullulare audierit, quod de pinu nusquam obseruatur. Et mortuorum animas ad inferos descendere dicunt, quorum deum Ditem arbitrantur, vnde eius arboris ramis sepulchris affixis, diis Manibus commendari defunctos dicant, atque arborem nullam hominem ad inferos sequi legas, præter cupressos. Horatius.

*Neque harum, quas colis, arborum,  
Te, præter inuisas cupressos,  
Vlla breuem dominum sequetur.*

20 Diti sacra est, inquit Plinius, ideo funebri signo ad fores posita. Apud multas gentes in cœmiteriis feri cœpta. Valentiis vidimus in patibulo multas confitas. Alia etiam ratione portis affigebatur, quod pollutionis, aut incestari de alicuius morte loci, aut funeris signum fuit, ne quisquam pontifex per ignorantiam domum ingrediens pollueretur. Feralis à Virgilio dicta.

*Ingentem struxere pyram, cui frondibus atris  
Intexunt latera, & ferales ante cupressos  
Constituunt.*

Petronius Arbitr.

*Gaudent ferali circum tumulata cupressu.*

30 Erat & vrendis funeribus apta. Virgilius.

*Ergo instauramus Polydoro funus, & ingens  
Aggeritur tumulo tellus, atraq; cupresso.*

Sed M. Varro pyras cupresso circumdari dixit propter odorem vstrinæ grænem, ne ea offenderetur populi circumdantis corona, quæ tamdiu stabat respondens fletibus præficæ, quamdiu consumpto cadauere, collectisque cineribus, dicebat nouissimum verbum Ilicet, id est ire licet. Sed alia ratione Asclepiades cupressum luctuosam dicit. Boream enim Celtarum Regem, quum filiam Cyparissam nomine haberet, & eam amisisset, arborem hanc in eius tumulo seuisse, à qua nomen inditum cyparisso, & mox à satu illo luctuosam fetalemq; haberi cœptam. Non immerito magno habitum ostento, quum ar-  
40 bos cupressus altitudine præexcelsa in Vespasiani auito agro sine vi vlla tépe-



statis radicitus euulsa repente prociderit, ac sequenti die viridior eodem vestigio surrexerit, grande prosperumque, & summa claritas Vespasiano iuveni ab aruspiciibus promissa, ex Tacito. Fuit & mortis ostentum Imperatori Severo, cui Æthiops scurra occurrens obuiam cum corona ex cupresso, quæ quum illo ab eius oculis remoueri iussisset, paucis post diebus est vita functus. Cupressus inimica viti. Nam Varro scribens, quæ cœli parte ridicæ figi debeant, ait: Si cupressos viuas pro ridicis inserunt, alternos ordines imponunt, neque eas crescere amplius quàm ridicas, patiuntur, neque propter eas adserunt vites, quod inter se hæc inimica.

## Nomen.

Didymus Græcus duplici nomine cupressos vocari solitas dixit, *κυπάρισσος*, & *χάρις*, hoc vltimū propter Charites Eteoclis filias, vt diximus. Charites, hoc est Gratiæ, appellantur ob delectationem. *κυπάρισσος*, ἀπὸ τοῦ κύβητος καὶ φύβης παρὶς τὴν κλάδους, καὶ τὴν καρπὸς, id est à parilium ramorum partu, & fructuum, quod ex æquo ramos & fructus creent. Dicuntur etiam Festo Pompeio Cyparissæ ignes prodigiosi, qui noctu apparere solent cupressorū similitudine. A Poëtis etiam *κωνοειδὲς* dicuntur, quod in conum hæc arbores attollantur. Latinis cupressus, cyparissus, & cypressus dicitur. Italis *cipresso*.

## Descriptio.

Sic à Theophrasto describitur. Arbor longo, subrectoq; sustollitur caudice. Folio angusto, carnosio, & indeciduo. Semine perexiguo, & obscuro. Huius enim fructus, non id totū est, quod pilæ speciem gerit, sed quod in cono nascitur, prætenue, & exile: quasi laticis (*πυλωδης*) semini proximū, quod pilula dehiscēte diffilatur, & euolat, neq; facillimè colligitur, præterquā à pericis. Conis pendentibus exilit, vasaq; ipsa relinquit inania. Crescit morosa, quod ex densitate, & siccitate euenit. Materie macilenta. Fructum serò perficit. Constat ligno tam fructus, quàm fructus ambientia. Radicibus summatae adhærentibus. Dempta coma, rescissoq; cacumine interit, nec ex ea quicquā, quasi esset ambusta, repullulat, quum natura sicca sit, & meatu condatur altissimo, vnicāq; radice inhæreat. Negata his omnibus sobolē radicibus pullulandi, tam radicis siccitate, quàm quod sursum cōtendat, vt diximus. Plinius ab eo. In lōgitudinē excrefcit, vt vni stirpia. Folio carnosio. Floret post autumnū. Radice per summa cespitum. Trifera est, nam eius bacca colliguntur mense Ianuario, & Martio, & Septembri, ternasq; earū gerit magnitudines. Natu morosa. Fructu superuacua, baccis torua, folio amara, odore violenta, ac ne vmbra quidē gratiosa, materie rara, vt penē fruticosi generis: metæ demum aspectu non repudiata. Nullum stillicidiū cupressi, vmbra minima, & in se conuoluta, ea etiā detracto cacumine, aut ignibus adusto iaterit. Sed mihi videtur Theophrasti verbum *πυλωδης* Theodorus non rectē vertisse laticem, quum laticem neq; Theophrastus, neq; Græci nonerint, sed potius *πυλωδης* legendum, quod fuit fures significat: nam nil propiūs fuit furis faciem, quàm semen illud demonstrat. Varro à Theophrasto mutatus de cupressō hæc habet. Cupressi radices angustius diffunduntur. In crescendo tarda. Semina ad oriendū sunt ad eò parua, vt sint ob-  
lura:



Scuta: nō enim galbuli, qui nascuntur, tanquā pilæ parvæ corticeæ id semē, sed in his intus primigenia semina dedit natura. Spectatu quidem iucunda est cupressi proceritas, effigiesq; illa metas imitata. Sed quū fructu supernacua sit, cessit ea res in prouelbium, *καπερί τις κάρπος*, de re speciosa quidem visu, sed prorsus inutili. Quare Phocion, quum Leosthenes Athenienses in bellum impulisset, illius verba dicebat cupressis esse similia, quæ quū speciosæ essent, fructum tamen non haberent. Dioscorides pilulas eius fructus vocat. Virgilius conos.

*Aeria quercus, aut conifera cyparissi.*

Veluti sylvestris cupressi Theophrastus meminit, quū Thuiam memorat: *Genera.*  
 10 nam forma cupressio similis, ceu sylvestris cupressus dicit. Præterea in genere cupressi mas omnino infœcundus est, fœminæ pleræq; fructu viduæ cōstant. Plinius duo earum genera nominat. Meta in fastigium conuoluta, quæ & fœmina appellatur, mas spargit extra se ramos, deputaturque, & accipit vitem. Didymus. Mas est sterilis.

Cupressum loca feruida habere magis dixit Theophrastus, vt Creta, Lycia, *Calura.*  
 Rhodus. In Creta circa agrum Idæum exuberat. Sed in Creta quocūque loco mouerit quispiā, hæc gignitur, protinusq; emicat. In Creta insula, in montibus Idæis, Leucisq; vocatis, super summa quibus nix nunquā deest, cupressum cōperiri affirmat: nam id genus syluæ plurimū & in montibus, & omnino in insula  
 20 la est. Plinius ab eo. Huic patria insula Creta, quanquā Cato Tarentinam eam appellet, credo quod primum eō venerit. Et in Aenaria insula succisa regerminat, sed in Creta, quocunque loco mouerit quispiam, hæc gignitur, protinusque emicat. Illa verò etiam non appellato solo ac sponte, maximeq; in Idæis collibus, & quos albos vocant, summisq; iugis, vnde niues nunquā abfunt, plurima quod miremur alibi, non nisi in tempore proueniens, & nutricē magnopere fastidians. Primum aduena, & difficillimè nascentiū fuit. Herodotus, vt diximus, solū in hac insula recisam repullulare dixit. Vnde quod Cretæ id præcipuū concessum, vt renascentes, quæ præsectæ fuerint, cupressos videāt, Cretā per eiusmodi arborē significant. Cupresseta porrò Gnosiorū Plato celebrat,  
 30 in quib. æstiuo die à Megillo, & sociis de legibus cōmentatum tradit. Didymus: Gaudet humidis magis, & opacis, ac protectis locis. Virgilius Idæas vocat.

— *nec Idæis cyparissis.*

Nascitur propè Orontem fluuium, vt Iuuenalis, & Claudianus, ad Simoim.

*Tollebant gemina capita inuiolata cupressus*

*Cespite vicino, quales non rupibus Idæ*

*Miratur Simois, quales non diuite ripa*

*Lambit Apollinei nemoris nutritor Orontes.*

Plutarchus Ammoniam, Chiam, Cyrenaicam laudat. Halcyone mons cupressis abundat. Milesiæ cupressus à multis laudatur. Cyparissia Græciæ ciuitas dicitur à cypressis, ibi multis nascentibus, vt Homerus.

Cupressus nascitur semine & trunco. Marē ex fœmina puenire affirmat Theo- *Satis.*



phrastus. In Creta nascitur etiam trunco, præsertim in montosis Tarræ, ubi  
 cadua est, & cæsa regerminat, modo ab terra, modo à parte media, modo sum-  
 ma, raro ab radicibus. Cato satis accuratè eius sationē docuit. Quomodo cu-  
 presseta feri oporteat, Memius Percenius Nolanus ad hunc modum monstra-  
 uit. Semen cupressi Tarētina per ver legi oportet, maturum est ubi hordeum  
 flarescit. semen ubi legeris, in Sole ponito, id purgato, id aridū condito, ubi ari-  
 dum expositū fiet, per ver serito in loco, ubi terra tenerrima erit, quam pullam  
 vocāt, ubi aqua propter fiet, cum locum stercoreato primum benè stercore ca-  
 prino, aut ouillo, tum vortito bipalio, & terram cum stercore benè cōmisceto,  
 depurgato ab herba graminibusque. Bene terram comminuito, areas facito 10  
 pedes latas quaternos, subcauas facito, uti caua aquā continere possint, inter  
 eas sulcos facito, qua herbas de areis purgare possis. Vbi area facta erunt, se-  
 men serito crebrū, ita ut linum feri solet, eo cribro terram incernito, dimidia-  
 tum digitum terram altam succernito, id benè tabula, aut manibus, aut pedi-  
 bus complanato. Si quando non pluer, uti terra sitiāt, aquam irrigato leuiter  
 in areas. Si non habebis unde irriges, gerito inditoque leuiter. Quotiescunq;  
 opus erit, facito, uti aquā addas. Si herbae natæ erunt, facito, uti ab herbis pur-  
 ges quā tenerrimis, & quoties opus erit per æstatem. ita, uti dictum est, fieri  
 oportet, & ubi semen satum fiet, stramentis operiri oportet: ubi germen nasci  
 cœperit, tum stramenta demi. Alibi alia addit, quæ hic omiserat, referre non 20  
 pigebit. Semen cupressi ubi seres bipalio vortito, vere primo serito, porcas pe-  
 des quinos latas facito, eò sterco minutum addito, & confarrito, glabasq; cō-  
 minuito. Porcam planam facito, paululū concavam. Tum semen serito crebro  
 tanquā linum, & eò terram cribro incernito altam digitū transversum, eā ter-  
 ram tabula aut pedibus complanato, furcas circum offigito, eò perticas inten-  
 dito, eò sarmenta, aut crates ficarias imponito, quæ frigus arceant & Solem,  
 uti subtus homo ambulare possit, facito, crebro runcato, simul ac herbae ince-  
 perint nasci eximito: nam si herbam duram velles, cupressos simul euelles.  
 Ab eo Plinius. De cupresso verbosius, sæpiusque, quā de omnibus aliis pro-  
 diderit Cato. E cupresso scæmina pilula collecta, quibus docui mensibus, sic 30  
 cantur Sole, rupta; emittunt semen formicis mirè expetitur, ampliato et-  
 iam miraculo tantuli animalis cibo absumi natalem tantarum arborum. Se-  
 ritur mense Aprili, area æquata cylindris, aut volgiolis, densum, terra; cribris  
 supercernitur, pollicis crassitudine; contrā immane pondus attollere se nō va-  
 let, retorqueturq; sub terra, ob hoc parcitur vestigiis. Leuiter rigatur à Solis oc-  
 casu in trinis diebus, ut æqualiter bibat, donec erūpant. Differuntur post annū  
 dodrantali filo, custodita temperie, ut viridi cœlo serantur, ac sine aura. Mirūq;  
 dictu: periculū eo tātum die est si rorauerit quantulūcunq; imbrē, aut si affla-  
 uerit. De reliquo tutæ sunt perpetua securitate, aquasq; postea odere. In satū  
 omnino nō degenerat quoquomodo seratur. Aquam aspernatur. & simū, & 40  
 circūfossurā amputationēq; & omnia remedia odit, quin etiā necatur. Nunc  
 verò.



verò consilis facta in densitate parietum coercitaque gracilitate perpetuò tenera. Trahitur etiam in picturas opere historiali, venatus, classesq; & imagines rerum tenui filo, breuiq; ac virente superueftiens. Immittitur in perticas, afferésve amputatione ramorum, qui xiii anno denariis singulis veneunt. Questuosissima in satus ratione sylua, vulgoq; dotem filiarum antiqui plantaria appellabant. Didymus. Cupressi semen colligitur quidem post calendas Septembris. Seritur postea in sulcos à nona Calendarum Nouembrium vsq; ad hyemem. Vnà autem cum cyparissorum satu hordeum rarum seminato, & sæpe eodem anno cupressus plena longitudine augetur; tantum enim cre-  
 10 scit, quantū hordeum ipsum: & transplantabis eam. Sed & stolones sua sponte producti, qui fiunt ex iactis seminibus cupressi, eodem modo transferuntur. Democritus intra septem ac muros plantari debere cupressum tradit, vt ad delectationem, & sepimentum totius ædificii, ac quasi munimentū nascatur.

Insitionem non recipere, nec alterius sobolem educare inquit, & vt ge-  
 20 neralius dicam, quæ pingues, quæve picem, & resinam illachrimant: nam hæc diffisso libro hiant, quasi de proprio lare saniem contrahunt, oleosumq; exudant liquorem, nitetq; circumquaq; pinguedo: quocirca cum aliis generibus immisceri recusat, perinde quoq; ac ipsum oleum.

Insitio.

Simulachra è cupresso sculpere solent, rimas enim non capit, & carnis æ-  
 20 qualitate quodammodo constare videtur. Eius materies diuturna, siue perpetua: itaq; in Epheso cupressina materies, ex qua valua templi Dianæ, quatuor ætates reseruata durauit. Sola hæc nitorem etiam recipit, ideoque ex hac condere opera lautiora cōsueuere. Aliquando ex hac statuæ exudat: cælo etiam austrino, humectoq; ita afficitur, quum in ea aliquid sit pinguedinis. Hæc Theophrastus. Sed Plinius. Aduersus cariem, vetustatemq; firmissima. Tere-  
 30 dines nasci prohibet amaritudo. Rimam, fissuramq; non capit. Valuas templi Dianæ Ephesæ è cupresso esse, & iam quadringentis propè annis durare materiam omnem nouæ similem. Id quoq; notandum valuas in glutinis compage quadriennio fuisse. Cupressus in eas electa, quoniam præter cætera vno  
 30 in genere materiei nitor maximè valeat æternus. Nón ne simulachrum Veio-  
 uis in arce è cupresso durat à condita vrbe quingentesimo quinquagesimo anno dicatū? Cur verò diis simulachra è cupresso fieri solerent, in causa erat tum  
 40 materiæ perpetuitas, tum odoris suauitas, quæ thymiamatis loco esse videtur. Gn. Cornelio Lentulo, P. Licinio coss. cupressæ simulachra Iunonis Reginae posita per virgines viginti septem, quæ urbem lustrauerunt. Erat in Lebethris. Orphei simulachrum ex cupresso, quod quum Alexandri temporibus sudorē multum emisisset, pro prodigio habitum; responsum est ab Aristandro Philo-  
 40 sopho, benè sperandum. Siquidem opus, quod tunc Alexander aggrediretur, ob rerum magnitudinem maximum sudorem esset historiographis allaturū.  
 Vitruuius, Quia cupressus habet humoris abundantiam, æqualemq; cætero-  
 rum mistionem, propter humorem solet esse panda. Sed in vetustatem sine:

Materies.



vitiis conseruatur, quòd is liquor, qui inest penitus in eius corpore, saporem habet amarum: quapropter non patitur cariem, neq; eius bestiolas, quæ sunt nocentes. Ideoq; ex eo genere quæ opera conficiuntur, permanet ad egregiã diuturnitatem. Pythagorei, authore Laertio, cupressino ligno abstinebant, quòd ex hac arbore Iouis sceptrum fabricatum esset. Columella tertium locũ obtinere dicit cupressũ pro stabiliendis vitibus pro ridicis. Varro etiam cupressis pro ridicis vtitur. Ex cupresso Aristotele, Aristobolo, Vegetio, atq; Arriano in Syria fieri naues vulgatum, alterius materiei inopia.

*Resina.*

Resinam fundũt cupressi acerrimam sapore, post terebinthinã, & lentiscinam bonitate, liquidam. Fit quoq; ex cupresso oleum, vt habetur ex Plinio.

*De Pinu. CAP. X.*

**D**E pinu loquemur, quod & magnitudine conos omnes superet, & perpetuo vireat folio, & syluestris sit: nam per se in syluis nascitur, montibusq; horret transpositionem, cultum, & insitionem, quæ omnia domesticis familiarissima, vnde improprie mihi videtur inter urbanas connumeratam à Theophrasto, Plinio, & Virgilio.

*Fraxinus in syluis, pulcherrima pinus in hortis.*

Nos item ne genera conturbemus, peruertamusq; è pomatio, hic consereamus. Pinus, vt Græci fabulantur, puella fuit, olim perquã illustris, quam vnicè Pan adamabat. Contra hanc deperibat Boreas. Vtriq; adducta, potius puella Pani adhaesit: propterea zelotypia stimulatus rivalis Boreas, Pityn in saxa propulsans neci dedit: cuius vicem tellus condolens, in sui nominis arborem commutauit, mutatoq; vitæ genere apud eos mansit. Pana virenti ramo coronat, lugetq; indignum facinus arbor collachrimans, quod Boreas eam immeritam proteruo spiritu impulerit. Huius fabulæ inuolucro Poëtæ miram arboris naturam innuunt: nam flet arbor, vbi Boream afflantem percipit. Cybele Deorum matri pinum dicauit antiquitas, vnde pini nuces à Martiali, Cybeles pomã dicuntur.

*Poma sumus Cybeles, procul hinc discede viator,*

*Ne cadat in miserum nostra ruina caput.*

Cybele iccirco sacra propter Arym ab ea adamatum, atq; in hanc arborem transformatum. Fuit Arys speciosus puer, qui sacris magnæ matris præfuit, à suæ ciuitatis Rege perditè dilectus, qui quum ab eo sibi vim inferri intelligeret, in syluas ad Cybelem perfugit. Rex autem inuento quum vim inferre conaretur, dea stupratoris verenda abscidit, qui moriens, & facinus vlcisci cupiens, puero eadem præscidit, quem quum sub pinu semianimem iacentem Cybeles antistites inuenissent, in templum deportarunt, & nixi sunt, verum frustra, reficere, mortuumq; sepelierunt. Pinum arborem, sub qua ille iacebat, tutelæ suæ dea ascripsit: sed vt eius in perpetuum memoria remaneret, edixit deorum mater, vt singulis annis defleretur, suiq; cultores castrarentur.

Ouidius.



Ovidius. ——— *mollesq; ministri*

*Cedunt iactatis vilia membra comis.*

Alii Atym, quum per mare Phrygium nauigaret, ad flumen Gallum vsque peruenisse memorant, cuius potu ad insaniam versus, silice testes sibi amputasse. Iuuenalis.

*Semivir obscæno facies reuerenda minori,*

*Mollia qui rupta secuit genitalia testa.*

Sed Arnobius hanc fabulam aliter describit. Fuit Atys Nanæ Sagarîi amnis natæ filius, hæc autem illum hircino lacte nutriuit. Phryges hircum atagum  
10 vocant, vnde Atys nomen. Hunc deorū mater ardēter adamauit, sed perditissimè Acdestis, quod Midas Rex sentiēs, vt illū à nefanda coniūctione tutū faceret, filiam suam ei matrimonio destinauit, & ne quis nuptialia munia violaret, intra oppidū eōs recludit, illudq; muris, turribusq; circummunit. Cybeles Atys nesciēs fatum, ciuitatē ingreditur, turribusq; spoliat, vnde postea turrita cognominata. sciebat enim nō aliter inter mortales liberū quemquā esse, quādiu matrimonii fœdere vinctus esset. Acdestis verò amore & ira æstuans propter puerum à se alienatum, conuiuantibus furorem ingerit, vnde orta est inter eos nō parua rixa. Postremo Atys sub pino arbore se proiciens, genitalia sibi defecat, quæ in Acdestin iaculatur, & cum sanguine vitam efflat; ab-  
20 scissa autem deū mater veste inuoluit, & in terra recondit. Flos viola è sanguine nascitur, ex qua arbor redimitur, cœptumq; postea est, sacras pinos hoc flore velarier, ac coronarier. Acdestes enim Iouem deprecatus, vt Atys reuiuisceret, non obtinuit, tamen assecutus est ne putresceret, sed semper in virides comas cresceret, & minutissimis foliis. Ovidius in sua Metamorphosi.

*Et succincta comas, hirsutaq; vertice pinus,*

*Grata Deum matri, siquidem Cybeleius Atys*

*Exiit hac hominem, truncoq; induruit illo.*

Ida mons Phrygiæ pini refertissimus est: quamobrem matri magnæ attribuunt. D. Ambrosius Naturæ imaginem pinum referre dixit, quippe semina  
30 quadam veluti annorum vice referat, neque nisi vi caloris admota excludat: eademq; nux flammæ speciem imitatur. Fraudi verò cōsecratam pinum Seruius dicit, quod eius poma per fraudem interimant. Panes, & Satyri è pino comas factitatas gerunt, rationemque affert Pharnutus, quod montanum quid, & syluestre hæc habeat. Lucretius.

————— *Cum Pan*

*Pinea semiferi capitis velamina quassans.*

Et Propertius.

————— *Et Arcadico pinus amata Deo.*

Plinius author est apud Isthmos pinea corona coronari victores. Erant ve-  
40 rò Isthmia in Melicertæ memoriam instituta, & Pausaniæ adhuc temporibus pius apud aram Melicertæ germinabat, quem puerum à Delphino dela-



tum, Sisyphus rei miraculo motus, in Isthmo sepelisse fertur, & certamen illud instituisse. Apud Sicyonios Æsculapius, eodem referente, cum sceptro, & nuce pinea in manu altera, sculptus est. Erat & antiquitus mortis symbolum, quod excisa nunquam suppullulasceret, & apud Homerum βέλος ἔχει πινυῖς telum ex pinu, letale exponunt interpretes doctissimi. Alii ad solam referunt arboris acerbicatem, & amaritudinem, quandoquidem amaritudo morti affinis est, & viceversa mors pro amaritudine proferatur. Staphylus Poeta πύκης βό-πω, id est, in morem piceæ dixit. Cræsus per caduceatorem Lampfacenis interminatus est eos, ut pinū exterere, nisi Miltiadem missum facerent; quum-  
que Lampfaceni quæterent, quid illud esset, quod Rex ut pinum diceret ex-  
triturum, à doctiore edocti sunt, arborem semel excisam nunquam suppul-  
lulascere: illi tale excidium veriti, Miltiadem è vinculis soluerunt.

Nomen.

Theophrasto, πύκη dicitur, quum omne, quod de πύκη tractat, pino adapta-  
ri possit. Theodorus etiam optime pinum vertit. Bellonius, quia viros etiam  
acutissimos πύκη, & πίτυς dictionum affinitas fefellit, litem dirimere gestiens,  
πύκην piceam vocat, πίτυν, pinum; magisq; tenebras offundit. Idemque sentit  
Leoniceus. Sed hi mea quidem sententia Plinium sequuti facile lapsi sunt.  
Plinius πίτυν pinum vertit: nam πιτυκάμπαξ Græcè, Latinè pinorū erucas ver-  
tit, ac toto suo volumine πίτυν nunc pinū, nunc piceam indifferenter vertit. At  
quomodo Dioscorides vocauerit, vix paucis ex suis verbis elici potest. Theo-  
phrasto pini nuces σρόβιλοι dicuntur, sic Pindaro. Galenus κώνον commune fa-  
cit pino, piceæ, & pinastro. Simeon Sethi κωνάκια vocat strobilos. Mnasitheus  
Atheniensis pinearum nucleos, & conos ὀσράκιδας vocat. Ab Hippocrate id  
totum κακχάλον dicitur, ex Athenæo. Ex hac Miletus vrbs Cariæ Pityusa dice-  
batur, cuius incolæ φθαῖρες, vel φθειρῶν ὄρον, quod pinorū fructibus abundarint,  
quarum fructus, vel flores, ut multis placet, φθαῖρες dicuntur. A pinu etiam Pi-  
tyodes, & Pityusæ insulæ in mari Balearico dicuntur, & aliæ eiusdem appella-  
tionis in sinu Argolico. Lampfacus Hellesponti vrbs Troianis temporibus  
Laumedontea, & Pityusa, & Homero Pitys dicebatur. Latini pinum vocant  
à pinnato foliorum cacumine, cuius lignosos fructus frequenti nucamento  
in turbinatam effigiem compactiles, conos & strobilos vocant. Itali pinno.

Descriptio

Ex Theophrasto hæc est excerpta descriptio. Pinus assurgit procero, &  
recto caudice, nodosoq; Folio perpetuo, in extremitate pungenti. Medulla  
carnosa. Succo pingui, & resinaceo. Radice singulari, & prægrandi, & vnica  
descendente, parvæ autem complures ab illa exeunt, sed ex ea nulla soboles  
procreari potest. Pinum vecte sollicitatam, quo transferetur, longiorē quàm  
octo cubita radicem habere quidam vidisse retulit, quanquam non totam re-  
fossam, sed abruptam. Auctu difficilis. Amentum profert. Hypear, & stelis in  
ea nascuntur. Quidam florere existimant, alii minimè, sed nucamentum pro-  
portione præciduis grossis respondere. At Macedoniæ incolæ ne illas quidem  
florere arbitrantur. Eius germinatio intermissa, ter turgens, terye germina  
edens,



edens, ideo id genus arborum *πρίσκιον* dicunt, quod rer inchoatum opus, intermissumq; repetat. Prima germinatio Februario ineunte, quamquā in monte Ida seriū, ac ferē idibus. Secunda mense Martio, germinans ab extremo surculo vsq; ad proximum antecedentis, & quēdam sursum, quādam in latera circumquaq; emittunt, veluti geniculo factō surculo primi germinis, vt fieri prima germinatio solet. Tertia Aprilimense, diebus circiter quindecim interiectis: fortē id diebus sex, vel septem absoluitur: quo quum ventum sit, non amplius in longitudinem, sed crassitudinem incrementa verruntur, & si omnium germinationes conspicuæ sint, in pino maximē videtur: nam germina in ver-

10 sus rectos porriguntur. Ramiq; ex arquo conditi spectantur. Semina profiliunt, conis adhuc pendentibus, vasaq; ipsa relinquunt inania, et si semen nucem sit. Decacuminatione interit, quod non sine ratione accidit: quoniam humore non abundat, & meatu conditur rectissimo, & singulari radice inhaeret. Vulnus infestat, facitq; vt frigus & ardor facilius subeat, praesertim quum vndique inferatur, quum meatuum rectitudine non pigre ad radices deueniat. Cortex in orbem detractus in pino mors est: sed refert anni tempus, scilicet in germinatione. Quum enim cortex turgēt Februario, vel Martio mense, si quis ei detraxerit, morietur, hyeme diutius durat. Aduitis radicibus nunquam regerminat. Pinus benigna omnibus esse putatur: quū enim

20 radice simplici, altaq; nitatur, circa se non fugit, eaq; altē descendens, ē profundo sibi haurit alimentum, non defraudat superficiarias aditarum arborum radices: vnde patitur myrtos, & lauros propē satas benē habere. ex quo manifestatur, maius incommodum radices afferre, \* quā vmbra, quippe \* Gr. τῆς  
quum pinus vmbra amplissimā reddat. Plinius ab eo. Pinus habet folium *ανίδας*.  
capillamenti modo praetenuē, longumq; & mucrone aculeatum. Ramosa in vertice. Perpetuō viret. Larix vltis radicibus non repullulat, vt in Lesbo accidit, incenso nemore Pirrheo (quod Theophrastus de pinu, ipse de larice trās-

30 tulit.) Fructus grandissimus, pineis nucibus, altissimeq; suspensus, intus exiles nucleos lacunatis includit toris, vestitos alia ferruginis tunica, mira naturā solertia molliter semina collocandi. Abies semen reddit post Vergiliarum occasum, pinus autem, & picea germinationem quindecim ferē praueeniunt diebus, semē verō post Vergilias & ipsae reddunt. In maxima admiratione tamen est; habet fructum maturescētem, habet proximo anno ad maturitatē venturū, ac deinde tertio: nec vlla arborū auidius se promit. Quo mense ex ea nux decerpitur, eodem maturescit alia, ac sic dispensatur, vt nullo nō mense maturescat. Quae se in arbore ipsa diuisere, Zamiae vocantur, laeduntq; ceteras, nisi detrahantur. Pinus nullo flore exhilaratur, natalēsve pomorū recursus annuos versicolori nuntio promittunt. Pino si quis detraxerit corticem, Sole Taurum, vel Geminos transeunte, quum germinat, statim moritur, eandem iniuri-

40 am hyeme passa diutius tolerat. Quod si angusta decorticatio fuerit, non nocet. Quibusdam debilibus sterilitatem, non necem affert, vt si quis pino ca-



cumen auferat: sterilefcit enim, nec moritur. Necat vmbra sua germīna pī-  
nus. Eius stillicidia ponderosissima: nec fastidienda hęc quoque scientia, ne-  
que non in vltimis ponenda, quando quibūve satis vmbra aut nutrix, aut no-  
uerca est. Pinorum quidem vmbra quęcunque atrigere non dubiē venenum  
est. Quod contra experientiam & Theophrastum est: nam videmus arbores  
sub pinu latē fructificare. Et Palladius: pinum prodesse creditur omnibus, quę  
sub ea feruntur.

**Genera.** Theophrastus pinorum alteram vrbānam, alteram sylvestrem dicit. Nunc  
de vrbāna, postērius de sylvestri. Plinius: vrbāni generis alteram Tarentinam  
digitis fragili putamine, auium quę furto in arbore. Apud nos duo obseruan- 1  
tur genera, sylvestris, & vrbāni. Vrbānum duplex: duri, & mollis discrimi-  
ne. Durum contumaci tegmine occluditur, vt nisi lapidis ictu frangatur,  
vesci non possis. Alterum fructus fert adē molles, vt digitorum compressu  
aperiantur, vulgō *pigne mollesce*. Hoc genus Plinio Tarentinū dicitur. & coni ra-  
mis affixi, Solis aestu debiscentes, nucleos emittunt, qui ab auibus deuorātur.

**Calida.** Frigida loca Theophrastus concupiscere scripsit, montibus latari. Mnestor  
calidam esse asserit, argumento quōd locis argentibus valeat perdurare, & sui  
caloris ratione nec niuem super eam durare posse. Etiam tam sensu, quā ra-  
tione eius caliditas percipi potest, quod pinguis, acris, odorata, & quā quū sic-  
ca, spissa, & putredine immunis durat, & succum pinguem, acrem quę reddit. 2  
Calida quoque quod faciliē ignem concipiat. Gaudet enim pinus apricis, opa-  
cis, aut nullo modo aut prauē exurgit. Calida & humida est: argumentum vel  
ex generatione picis duci vtiq; potest. tum etiam vbertati humoris locus Solis  
expositus conuenit, licet enim excoctio confici amplius possit. Tam loca frigi-  
da amat, vt feruidis prouenire non posse nulli dubium sit. Plinius. Resiniferę  
montes amant.

**Solida.** In Latini agri montosis passim obuiam pinus vt retulit Theophrastus, &  
magnitudine, & pulchritudine omnes Italicas pręstat. Apuleius in arenosis  
locis prouenire dixit. Palladius locum gracilem amare, & sapē maritimū scri-  
psit. Inter montes & saxa vastior, & procerior inuenitur. Ventosis & humi- 3  
dis, arborum fiunt incrementa latiora, sed siue montes conferere velis, seu  
spatia quęcunque, hęc huic generi deputabis, quę alteri vtilia esse non pos-  
sunt. Ob id M. Varro prædij finibus seri iubet, ne familię rixentur cum vicinis,  
ac limites ex litibus querant iudicem, vt eius vxor habebat in Sabinis. Nos ste-  
rilibus, & inutilibus locis passim serimus, sed profundis: ostendit vnica, pro-  
cera, & recta radix se in profundum seri debere, quo si defraudetur, nec proce-  
ra, nec læta videbitur vnquam.

**Satio.** Id genus nō nisi seminio nasci, vt omnes coniferę, prodidit Theophrastus:  
soliq; non degenerans satū. Et alibi. Pinus conifera, & picea, tineosa maximē  
(vt sic loquar) persistere in totum videntur. Didymus legi strobilos iubet lu- 4  
nio, antequam Etesia spirare cęperint, & debiscentes tegumento exiliant, &

ab Octo-



ab Octobri mense vsque ad Ianuariū vt amygdalus suis feri nucleis. Cato, nuc-  
 ces pineas feri, vt cupressi, & ad eundem modum tanquam allium. Plinius, nu-  
 cleis septenis ferè in ollas perforatas additis. Tempore, à calēdis Marrij ad Idus  
 eiusdem. Palladius siccis regionibus mense Octobri, vel Nouembri, frigidis,  
 & humidis Februario, & Martio. Exarabis ea loca diligenter, atque purgabis,  
 & frumenti more semētem asperges, ac leui sarculo curabis operire: nec enim  
 plusquam palmo debet abscondi. Defendenda est tenera arbor à pecore; ne  
 calceretur inualida. Proficiet, si nucleos aqua triduo macerabis. Dicunt pineum  
 fructum translatione mitescere: sed plantas hoc modo procurant, vt prius  
 20 multa semina in caliculis, terra & fimo repletis obruant, quæ vbi proefferint,  
 relicto eo, quod solidius est, auferunt alia: vbi iustam cœperit incrementum,  
 trimam plantam cum ipsis caliculis transferunt, quibus fractis in scrobe in-  
 dulgent radicibus largitatem. Terræ tamen equæ stercus admiscunt, facientes  
 straturam alterno ordine, subinde crescentem. Seruandum est tamen, vt radix  
 eius, quæ vna, & directæ est, vsq; ad summitatem suam possit integra & illæsa  
 transferri. Frigidis locis, & humectis possunt Februario mense pineta semina-  
 ri. Vbi semel lata est pinus, transplantari non patitur, nam si quis fibrillas ali-  
 quas fregerit, exarescit, vnde qui agris, vel pomariis serere eam cupiunt, vascu-  
 lis primò, inde scrobibus confractis deponunt. Nos & si maxima diligentia  
 20 transplantare conati sumus, rarò concepit.

Palladius expertus est nouellas pini arbores putationē promouere, vt quæ *Cultus.*  
 speraueras incrementa duplicentur. Omnes, neglectam viuere, nec cultu in-  
 digere putarunt; tamen quæ campis seruntur, & coluntur, in vastam am-  
 plitudinem crescunt, & conos maiores, vberiores, & sapidiore proferunt.  
 Crebri rami interlucandi sunt, & vt melius arbor increseat, & vt ordinata, spe-  
 ciosior videatur. Pini morbus est, vt Idæi incolæ tradunt ex Theophrasto, vt *Morbi, &*  
 teda fiat, tam parte caudicis externa, quàm corde. Id quod ex abundantia suc- *remedia.*  
 ci, & vbertate larga luxuriantis naturæ prouenit: isque morbus naturalis est.  
 Non enim vlllo morbo afflictata moritur, sed optimæ habitudinis causa mori-  
 30 tur: radices enim crassescētes in tedam abeunt ex succi copia, ac nutritionis  
 excessu, quum alimentum, quia pinguedine obstructæ sunt viæ, transmittē-  
 re nequeant, sicut animalia quædam, quæ supra modum crassescunt: quum e-  
 nim auram attrahere nequeant, nec spirationis vsu frui possint, quoniam  
 venarum oscula pinguedine sunt angustata, obductæque suffocantur. Idcirco  
 non ineptè rustici de pino tradunt. Pinum obesitate strangulati: omnia nanq;  
 spirituum egent solutione & meatuum libertate. Alibi verò. Quum tota ra-  
 dix abierit in tedam, pinum morituram. Ratio est, quia alimenti pars excocta  
 purissimaque insidet, ex eo in sessu pinguedo fit: quod verò cæteris partibus  
 peculiare est, sursum fertur ad earum alimentum non per pingues partes, sed  
 40 per alios meatus. Cùm verò tota radix in tedam conuersa est, tum non am-  
 plius suppeditare alimentum cæteris partibus potest, sed occupatis aditibus,



obsessisque viis, à pinguedine illa intercluso sic spiritu, ut amplius commeari non possit, arbor extinguitur. Aliis autem arboribus, quibus nulla pinguedo, aut si inest non multa, id non euenturum. Pinus detracta teda seruari potest, pinguedo enim huic pro morbo habetur, sed hæc non nisi benè adulta sufferre potest, & hinc antequam putruerit, seruari ac viuere potest: nam non semper redificare consuevit, sed quum viget, & ætate adulta est. Nouella teda caret, quum alimentum ad germina, incrementaque altitudinis absumit, & quum dilatare cœperit, statim tedæ habitudo consequitur. Plinius ab eo. Aliæ verò obesitate, ut omnia, quæ resinam ferunt, nimia pinguedine in tedâ mutantur, & quum radices pinguescere cœpere, intereunt, ut animalia nimio adipe.

*Coditura.* Nuces pineæ, Palladius ait, usque ad mensem Nouembris in arbore esse possunt, & maturiores legentur, prius tamen legendæ sunt, quàm patefiant. Nuclei nisi purgati durare non possunt, tamen alij in vasis fictilibus nouis, & terra repletis, in testis suis missos asserunt custodiri.

*Materies.* Pini materies expetita nauigiis, ex Theophrasto. Rotunda fiunt, quoniam non putrescunt: & onerariis carinæ pineæ subiguntur, ut quum in terrâ extrahunt, resistere possint. Quercui conglutinari non potest, quia natura dissimilis: affectus autem similis ea esse oportet, quæ societate conflare debeant, non contrarij, ceu si ligno lapidem coniungere velis. Pondus sublinere validè potest, argumento, quod nunquam rumpatur. Sed priusquam viribus, carie, alijsve deficiat, quippe cum reliquæ omnes in inferiora flectantur, pinum re-niti affirmant. Pinus ferè omnium maximè viribus valet, & ad vsum ædificatorium spectabilis eadem potissimum est laxitatis, rectitudinisque meatuum causa. Hanc enim nec findi quidem vlllo pacto posse affirmant, si glutine muniat. Excusores carbonem pineos potius quarunt, quàm quernos, quâquam infirmiores sint: ad flatum enim respondent commodius, quoniam minus marcescant, extinguanturque. Habet & quadrifidos venarum cursus, ideò ad opera vehementer probant, quadriparritâque appellant. Materies carnosâ, neruisque paucis, materiem spississimam præstat; & ægidem gignere solet meliorem quàm abies. Nodi plures, & reliquis omnibus duriores, densissimi, solidissimi, patentioresque, colore tedæ proximi, maximeque sui generis. Dicunt pinum plusquam abietem comedi à teredine posse: nam pinum dulcedinis non nihil habere, eoque magis, quò fuerit teda refertior. A quo Plinius. Pinus aduersus cariẽ, tincasque firmissima, ad aquarum ductus in tubos cauatur. Obruta terris, plurimis durat annis: eadem si non immergatur, cito senescit, mirum in modum fortior, si humor extra quoque supersit. Ex eadem malleos fieri. Sed Theodorus Theophrasti terrazoos, & monozoos manifesto errore quadriuium, & biuium interpretatur. Virgilius nauigiis aptam cecinit.

— dat utile lignum

*Nauigis pinus.*



Palladius. Pinus nisi in siccitate non durans, cui contra celerem putredinem comperi in Sardinia hoc genere prouideri, vt excisa trabes eius, aut in piscina qualibet anno toto mersæ laterent, post operi futuræ, aut arenis obruerentur in littore, vt aggestionem, qua tectæ essent, alternis æstibus reciprocans fluitus allueret. Attalus apud Strabonem tradit: Ida mons Phrygiæ pinis refertissimus, quam ob causam mari magnæ tribuunt. In eo enim fuit ingens pinus, quæ à magnitudine, & speciositate, pulchra nominata est. Ambitus eius fuit pedum viginti quatuor, altitudo à radice sexaginta & septem: tota eius altitudo duorum iugerum, & quindecim cubitorum spatium amplectebatur.

10 Pinum cædendam post germinationem affirmat Theophrastus. illius cæsuræ non annua, sed post plus temporis fieri solet: vbi iam vulnerata arbore, teda detracta est, resinam hauriunt, sic enim in vulnus inuectum humor copiosior confluit; copiosissima, ponderosissima, & picosissima quæ ex pino, teda enim pinus referta est. Portatur vtribus liquida, dein sponte, quo nunc ceritur modo spissatur. Plinius. Pinus fert minimum resinam, interdū & nucibus ipsis, vix vt ascribatur generi. Resina sicca in pinu fit, nec magnopere in vsu.

Resina.

Terebinthum & picem quidam apud Syros largiri affirmant, quidam & picem, & cedrum, & palmam addunt, sed hoc, quia rarum, pro contingenti accipi debet: nam qui Macedoniam incolunt, ne pinum quidem picis gratia v-  
 20 runt, præterquā marem. Sterilem enim marem nuncupant, fœminæ enim radicem tantū accipiunt. omnis enim pinus tedam radice ingerit. Pix optima, purissimaq; quam loca admodum aprica, & aquilonia præbent, contra, quàm opaca, horridior limumq; referens. Est præterea sterilitas quædam fertilitasq; tum copię, tum bonitatis, quippe quum mediocri hyeme copiosa, & bona, & colore candidior reddatur, asperâ verò, pauca, atq; deterior. Quæ quidem copiam & bonitatem picis definiunt: non larga fructificatio pinorum. Idæi qui pinos discernunt, & aliam Idæam, aliam marinam cognominant, picem fieri aiunt ex Idæa largiorem, nigriorem, dulciorem, in totumq; faciliorem, & odore gratiorem, dum cruda sit, decoctâ enim in minus cōtrahi, quoniam plus  
 30 habet seri. Quamobrem tenuiorem hanc esse addunt. Ex marina autem flauio-rem, & crassio-rem, scilicet crudam, ita vt decocto minus auferat, sed tedacio-rem Idæam tradunt: (vtq; simplicius loquar) tantundem tedæ plus picis & dilutius pluuiosa tempestate, quàm sicca reddere volunt: & ex hybernis, opacisq; locis plus, quàm ex apricis, serenisq;. Hæc igitur ita Idæi, atq; Macedones asserunt. Replentur caua plagarum, videlicet in tantum, vt iterum pix extra-hipossit, frugalis pini, anno proximo; mediocris secundo; vitiosæ, tertio. repletio non coitu ligni, sed incremento picis conficitur, lignum enim in hac arbore coire, iterumq; vnum refici nequit. sed confectio quidem picis reddi post tantum temporis solet: necesse autem ligni agnationem fieri quandam: si qui-  
 40 dem detracta teda deustaq;, effluuium euenire picis solitum est. Id igitur accipi ita decet. Idæi vbi arboris caudicem cortice dispoliarint, quod parte solari

Pix.



binis aut ternis à terra cubitis facere consuevere, confluxum istuc fieri non sine teda vno cum plurimum anno affirmant. Idq; quum securi detraxerint, secundo iterum anno teda locum expleri, & tertio pari modo. Posthac ob eam paulatinam incisuram arborem extenuatam, putrefactamq; humi facile à flatu prosterni, tum eius cor extrahi: (hoc enim teda maxime refert) extrahi autem ex radice. Hanc enim in omnibus teda constare, vt diximus, sed hac in re probas quidem crebrius vulnus accipere, deteriores verò longiori tempore post: & parte aliqua reseruata, plus temporis resistere posse: tota verò detracta, minus, consentaneum prorsus est: ternas tamen detractiones eiusmodi maxime arbores tolerare posse videntur. Non simul fructificat, & 10  
tedificat pinus, sed protinus nouella fructificat, multò autem post facta, vetustior tedificat. Picem hunc in modum vrere consueuerunt. Quum locum æqualem præparauerint, & veluti area facta concursum habente, in medium, diligenter pauimentarint, truncos persillos componunt, proximè sanè compositioni carbonum facientium, præterquam quòd sine fossa opus perficiunt, lignis erectis, & inter se coherentibus, ita vt altitudinem assidue pro multitudine capiant. Fieri autem aiunt, vt compositio sit circuitu centenorum octuagenorum cubitorum, altitudine verò quum plurimum sexagenorum, aut centenorum, & quinquagenorum ambabus, si teda pinguisima sit. Quum igitur teda ita construxerint, & materiam pertexerint, aliqua terra 20  
superinfusa vndique, summa cum diligentia occultant, vt ignis nulla ex parte emicari possit. Pix enim peribit, si id acciderit. Succendunt autem per aditum relictum, dein eam quoque partem stipant materie, & obstruunt terra, reliquasque omnes obseruant, & quacunque fumum protrudi viderint, scalis scandentes, terram assidue infundunt, quò nullo pacto flamma erumpere possit. Canalis verò per medium structus aceruum, picem fluentem in foueam ducit, cubitis circiter quindecim ab aceruo. pix efluens tactu frigida sit: vritur duos dies, & totidem noctes cum plurimum. Sæpe enim postridie ante Solis occasum exusta iam est, rogasque cessit, id enim euenit, quum nihil reliquum est, quòd amplius fluat. Totum autem tempus, quo teda vritur, 30  
vigilanter obseruant, ne quid ignis erumpat, sacrificant atq; concelebrant, precantes, vt pix sibi copiosa, bonaque fiat. Plinius ab eo. Pix non aliud est, quàm combustæ resinæ fluxus. Picis vitium adustio. Experimentum si fragmenta subluceant, ac sub dente lentescant acore iucundo. Asia picem Idæam maxime probat, Græcia Piericam, Virgilius Naritiam. In Macedonia laricem masculam vrunt, fœminæ radices tantum (quòd Theophrastus supra de pino retulit.) Pix optima ubiq; ex apricis, Aquilonis situ. ex opacis horridior, virusq; præferens, frigida hyeme deterior, ac minus copiosa, & decolor. Quidam arbitrantur in montosis, copia præstantiorem, ac colore, & dulciorem fieri, odorem quoq; gratiorem dum resina sit: decoctam autem minus 40  
picis reddere, quoniam in serum abeat, tenuioresq; esse ipsas arbores, quàm in planis,



planis, sed has, & illas serenitate steriliores. Fructum quædam proximo anno ab incisu largiuntur, aliæ secundo, quædam tertio. Expletur autem plaga resina, non cortice, nec cicatrice, quæ in hac arbore non coit. Pix liquida in Europæ coquitur naualibus muniendis, multosq; ad alios vsus. Lignum eius concisum furnis vndiq; igni extrâ circumdato, feruet: primus sudor aquæ modo fluit canali. hoc in Syria cedrium vocatur, cui tanta vis est, vt in Ægypto corpora hominum defunctorum eo perfusa seruentur. Sequens liquor crassior iam, picem fundit. Hæc rursus in cortinas areas coniecta, aceto spissatur, & coagulata brutæ cognomen accepit, doliis duntaxat, vasisq; cæteris utilis, lentore ab alia pice differens. Item colore rutilante, & quod pinguior est. Eteda omnia illa fiunt. Picis duo genera, spissum, liquidumq; spissarum vtilissima medicina brutia, quoniam pinguisima, & resinosisima vtrasque præbet utilitates: ob id magis rutila, quàm cætera.

*De Pinastro. C A P. X I.*

**D**IXIMVS de vrbana, nunc de syluestri, siue de pinastro dicemus. Plinius, pinafter, ait, nil aliud est, quàm syluestris pinus.

Theophrastus *πίυκν ἀγρίαν* vocat, quasi syluestrem pinum dicas. Theodorus nescio qua ductus causa in Theophrasto vertendo *πίυκν* nunc pinum, nunc pinastrum vertit, Plinium sequutus. Dioscorides videtur *σπόβιλον* vocasse, quū prius pinus & piceæ, postea *σποβίλιν* meminerit. Latini pinastrum vocant, Plinio auctore, vt diximus. Itali *pino seluaggio*.

*Nomen.*

Diximus è Theophrasto: pinorum alia vrbana, altera syluestris. Syluestrium binum statuunt genus, quorum alteram Idæam, alteram maritimam vocant. Alii in marem, & fœminam diuidere solent. Macedones in marem, & fœminam, & sterilem diuidunt.

*Genus.*

Theophrastus ita describit. Idæa recta, celsa, materie crassa, nuce oblonga, viridi, minimeq; dehiscenti, tanq̃ syluestriori, ramosa, tedacior, picem largius præbens, nigrâ, dulcem, tenuē, odore grauem, vtiq; cruda, quoniã decocta deterior propter serū, quod in ea cõtinetur abundanter. Perpetuò viret. Maritima folio tenui, imbecilloq; cortice læui, molli: vtilis ad coria, nuce rotunda, breui, aperiēda: Materie valida, robusta: Picē præbens flauentiozem, crassam quādam crudam, ita vt decoctio minus auferat. Macedones verò etiã genus quoddam pini sterile dicūt, & marem sic describunt. Caudice breuiori, folio duriori, ligno duro, circumacta medulla, fabili opere cõtorto, colore nigriori. Subnascitur quiddā colore rubidius teda, odore grauissimo, neq; tedā redolēs, neq; fragrās, sed ab igne diffiliens. Fœmina procerior, folio pingui & molli, simplici, sed non videnti, ligno molli, ac omnino tractabili securibus. Gignit quod Græci vocant *αγίδα*, id est, cor eius, quum sit minus tedacea, quàm mas, læuior, ac meatu cursu probior, id est, quum grandiu arborem nonnullis securis adigitur, quibus prostratis cādida partes, ambiētesq; computruerunt. Græcè *ἰυγόν* colore vehemēter abiecto & neruo prætenui, sicū vocant Idæi tedarii.

*Descriptio.*

Plinius.



Calum.

Plinius ita describit. Pinaſter habet folium capillamenti modo prætenue, longumq; & mucrone aculeatum. Mira altitudine, à medio ramaſa: copioſiorẽ dat hæc reſinam. Alia in generibus ipſis, etiamnum in ſexu differentia. Maſ breuior, & durior, fœmina procerior, pinguioribus foliis, & ſimplicibus, atq; non rigentibus. Lignum maribus durum, & in fabrili opere obtortum, fœminæ mollius, publico discrimine in ſecuribus. Hæ in quocunq; genere deprehendunt marem, quippe reſpuuntur, & fragoſius ſidunt, ægrius reuelluntur. Ipſa materies retorrida, & nigrior maribus radix. Circa Idam, & in Troade: & alia differentia eſt montanæ maritimæque: nam in Macedonia, & Arcadia, circaq; Elin permutant nomina, nec conſtat authoribus, quod cuique generi attribuant. nos iſta Romano diſcernamus iudicio. Pinaſtro eſt ſylueſtrium genere non decidunt folia. Nuceſ pinaſtri pytidẽs vocant. Tedam mares duntaxat ferunt, & eam, quam Græci Sycen vocant odoris grauiffimi. Theophrastus in montibus naſci dixit.

## De Picea. C A P. XII.

**F**ABVLO SV M Plutarchus exiſtimat, quod Praxireles aſſerit, inuentum Melicertæ corpus picea ſcaturiſſe à mari, eſſeq; Megaris locum, qui Callidromos cognominatur, quod puerum fruticibus huius arboris onuſtum remeſſe viderint in mare, ſic vt communi populi iudicio picea Neptuni coronamentum exiſtimetur, etſi Libero patri, vt Lucanus putat, ſacra dicatur. Quapropter ob honores Melicerti contributos, Neptuno, & item Libero patri, veteres, nec ab re, conſecrarunt, quod vterq; humentiſ, fœcurdi, fertilisq; principii dominus habeatur. Cæterum Neptuno priuatim nuncupatur, non vt Apollodorus exiſtimat, quod maritima arboſ ventis, aut mare lætetur, eorumq; diſſantes ſpiritus amet, ſed quod fabricis nauigiorum picea expetatur. Germanæ quin potius ſorores habentur picea, pinus, ſtrobili: nanque materiam nauibus præbent, ſuamq; picem ac reſinam funditus oblinendam ſubminiſtrant, ſine quibus in mari parum fidelis compaginum eſſet commiſſura. Libero patri piceam fecere ſacram, quod vina reddat ſuauiora, quippe vitæ locis picea ſcatentibus, iucundius ac gratius vinum proferre produnt. Ex calore cauſari Theophrastus dicit, argillam calidam eſſe, & non niſi argilloſis piceam naſci. Dolia pice & reſina cerari, vina multis regionibus picari, non ad ſuauitatem modo conciliandam, ſed vt prætinus nouitatem, aquoſumq; humorem vinum calore iutum exuat. In Iſthmo victores picea coronabantur. Plinius. Picea feralis arbor, & funebri indicio ad fores poſita, ac rogiſ virens, iam in domos recepta, conſili facilitate. A picea, quæ *Padeſ* Gallicè vocatur, Septius Metrodorus apud Plinium, & M. Cato in libris originum Padum vocatum ſcribunt, quod hæc arboſ plurima circa eiſ fontem adnaſcatur.

Nomen.

Vocat Theophrastus *πίτυς*, Pindarus *πίτυς* frondibus coronari victores Iſthmios. optimè igitur Theodorus in Theophrasti verſione picem vertit. Latinis Picea, Plinio authore. Itali *Pino ſelua* ggio.

Theophra-



Descriptio.

Theophrastus ita suam *πίτυν* describit. Caudice paruo, humiliori, graciliori, minusq; alto, minusq; recto, quàm pinus assurgit. Cortice spissiori quàm platano. Folio pinguiori, pauciori, squalidiori, tenuiori q;, sed capillato. Perpetuo viret. Negât aliqui florere, sed vice floris esse nucamenta, grossis præciduis fici proportionem respõdentia. Fit enim veluti foliorũ conceptus inter antecedentẽ obstrusionẽ, & sequentem exortum, medius. At ex proprietate autũni, postq̃ folia decidẽre, peculiaria eius confestim gignuntur, quasi grauida intumescat, vt germina pariat, duretq; per hyemẽ vñq; ad ver. Conos fert pino minores, magisq; algẽtes, resinaq; perfusos. Germinatione præuenit abietis florẽ, quia paulò ante solstitiũ erumpit, diebus ferè quindecim post Virgalias. Serò suum fructum perficit, vt perpetuò virẽs. Ligno autem tam fructus, quàm fructum ambientia constant. Aduſtis radicibus repullulat, vt in Lesbo accidit, incenso Pyrrhẽi montis nemore, quod piceis scatebat. Peculiare de picea proditur, de mutilatione nõ interire, sed sterileſcere. Causa quòd principio alterato imbecilliori q; reddito vires deficiunt, & fructus iccirco, vtpote vltimus creari minimẽ omniũ potest. Plinius ita suam piceam describit. Piceæ folia breuifera, & crassiora, duraq; ceu cupressis. Rami statim penè ab radice modici, velut brachia lateribus inhærent. Perpetuò viret. Nec facile inuicẽ discernuntur: tanta nataliũ mistura est. Sed picea minus alta, quàm larix est. folia, quàm larix sicciore, & tenuiora, ac magis argentia. totaq; humidior est, & perfusa resina. Lignum abieti simillimum. Larix vſtis radicibus non repullulat, picea repullulat, vt in Lesbo accidit, incenso nemore Pyrrhæo. Picea verò (quàm abies) totis paniculis, minoribus, gracilioribusq;, minimos ac nigros nucleos habet. propter quod Græci phthiophoron eã appellant. In eadem nucamenta cõpressiora maribus sunt, ac minus resina roſcida. Tristis est, nec sentit gaudia annorum, nec vllò flore exhilaratur, natalẽsve pomorum recursus annuos versicolori nuncio promittit. Folia insecta pectinum modo piceæ, & pungentia. Picea abietem præuenit germinatione xv diebus ferè. Semen verò post Vergalias & ipsa reddunt. Piceæ vmbra quæcunq; attigere, non dubiẽ venenum est. Picea detracto cacumine, aut ignibus aduſto interit. Similis & depaſtio animalium. In piceis ramorum ordo. Decisis cacuminibus moritur, totis verò detruncatis durat, & si infra, quàm rami fuere, præcidatur, quod superest viuit: si verò cacumen tantũ auferatur, tota moritur. Inter syluestria Theophrastus piceam refert, *πίτυν ἀγρίαν*, scilicet syluestrem nominans. Præterea *φθιρόφορος*, id est, tineosa, & pediculosa dicitur. Plinius satiua pineæ meminit. Tertium è picea satiua sapinium, nucleorum verius cute, quàm putamine, adeò molli, vt simul mandatur.

Genera.

In montibus nasci pineã scribit Theophrastus, quæq; in planis nasci recusat. Nascitur in Arcadia parua, sed circa Elim agrũ multa. In Ponto nõ nascitur, & omnes quæ tædam inferunt. Cyprii hanc habent, videturq; pino præstantior. Plinius. Montes amat, atq; frigora. Virgilius in Georgicis:

Cælum.



— *Aut sceleratum exquirere frigus  
Difficile est, picea tantum, taxiq; nocentes.*

Satio.

Solo semine prouenire tradidit Theophrastus.

Materia.

Cyprii omnia ex piceis conficiunt: sunt, qui ex picea triremibus leuitatis causa tornandum statuunt firmamentum. Domibus, & nauibus piceæ usus, sed maximè ad nauale, sed putrere celeriter incipit. Malleos magnos ex picea faciunt. Quibusdam enim operibus molliores expeti solent, vt argenteis carbones, qui ex picea confecti sunt. Tempus cadendi piceam, quum vua eius florere incipit. Hæc Theophrastus. Plinius. In magno vsu agrestium, vasa, corbesq;, ac patentiora quædam messibus conuehendis, vindemiisq; faciunt, atq; prætexta tuguriorum. Piceæ ad aquarum ductus in tubos cauantur: obruta terris plurimis durat annis: eadem si non integatur senescit: mirum in modum fortior, si humor quoq; extra supersit.

Resina.

Humor piceæ lachrimæ modo gignitur. In picea degustatis lignis vulnus inferunt, & inde resinam hauriunt, sic enim humor copiosius confluit, haud enim quamq; secretionem modo eodem agi mos est. Secundum bonitatis locum obtinet, leuior enim quàm quæ ex pinu. ex Theophrasto. At Plinius, Picea plurimum resinæ fundit, interueniente candida gemma, tam similis thurri vt mixta visu discerni nequeat, & inde fraus seplasiæ.

Pix.

Picea picem euidentiore, paucam item, & amaram fundere dixit Theophrastus. Plinius. Aperitur picea à parte solari, non plaga, sed vulnere ablati corticis, quum plurimum bipedalî hiatu, vt à terra cubito cum minimum absit. Nec corpori ipsi parcitur, vt in cæteris, quoniam astula in fructu est, verum hæc terræ proxima laudatur, altior amaritudinem affert. Postea humor omnis è tota confluit in vlcus. Quum id manare desit, simili modo ex alia parte aperitur, ac deinde alia, postea tota arbor succiditur, & medulla eius vititur.

### De Sappino. CAP. XIII.

**S**VNT inter scriptores, qui sappinum abietis inferiorem partem vocitent: sunt alii, qui sappinum arborem peculiarem, & ab aliis specie diuisam dicant, vt demonstrabimus. Vitruuius de abiete loquens: Superior pars perdolata propter nodationis duritiem dicitur esse fusterna, ima autem quum excisa quadrifluuiis disparatur, eiecto torulo ex eadem arbore ad intestina opera comparatur, & sappinea vocatur. Ab eo Plinius. Abietis pars, quæ à terra fuit, enodis est, hæc qua diximus ratione fluuiata decorticatur, atque ita sappinus vocatur: superior pars nodosa, duriorque fusterna. Ex his authoritatibus sappinum videtur abietis esse partem. Nunc videbimus arborem sui generis descriptam, ac piceæ speciem esse. Vitruuius libro primo ait. Namque non omnibus locis arenæ fossilitæ, nec cementorum, nec abietis, nec sappinorum, nec marmoris copia est, sed aliud alio loco nascitur. Inopia abietis, aut sappi-  
norum



porum vitabitur vrendo cupresso, populo, vlmo, pinu. Plinius de picea, larice, & resiniferis loquens ait. Inter hæc genera proprium quidem fecere sapinum, quoniam ex cognatione earum feritur, qualis dicta est in nucleis. Eiusque arboris imas partes tedas vocât, quum sit illa arbor nil aliud, quàm picea, feritate paulum mitigata satu. Alibi. Tertium sapinium è picea sativa, nucleorum cute verius, quàm putamine, adeò molli, vt simul mandatur. M. Varro arbores inter se differentes facit, ait enim: Quædam in montibus prolixiora nascuntur, ac firmiora propter frigus, vt abietes, ac sappini. Columella etiam eas differre dicit. Tum enim exceptis nucleis ipsas nuces pineas vacuas numero quinq; vel sex incendunt, & ardentes eodem demittunt. Alii nucibus sapineis ardentibus idem faciunt. M. Cato prælum sappino atra faciundum iubet. Vnde mihi videtur sapinum domesticam esse piceam.

*De Larice. CAP. XIII.*

**D**IXIMVS de coniferis, resiniferisq;, quibus folia non decidunt, nunc de coniferis, & resiniferis perdifoliis, inter quas larix est. Theophrastus inter pini genera recenset. Ideo monebat ordo, vt post pini genera & resiniferarum, de ea aliquid scriberemus. Meminit eius Theophrastus quum dixit: Viret ex urbanis perpetuò olea, palma, laurus, myrtus, & pini genus quoddam. Ex quibus verbis datur intelligi non omnes pinus perpetuò virere, sed aliquas hyeme caluescere, quod nulli inter pinuum genera conuenit, nisi larici.

Græcis *λάεξ* dicitur, vt ex Dioscoride colligitur, inquirente. A Gallia subalpina resina liquida conuchi solet, quam vernaculo nomine *λαείνα* appellant incolæ. Et paulò post. Resinæ inter se distant, siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei coloris similitudine, vt *λάεξ*. Plinius quæ Theophrastus de *πίνω* dixit, nunc de larice, nunc de picea interpretatus est, ex quo anceps Theodorus nunc laricem, nunc piceam vertit, illiusq; erroris causa fuit. Latinis larix, & larex. Italis *larice*.

*Nomen.*

Plinius laricem ita pingit, cuius verba è Theophrasto mutuatus est de pinu, & picea loquente. Quinto generi situs idem, eadē facies: larix vocatur: materies præstantior longè, incorrupta vis, emori contumax, rubens præterea, & odore acrior. Plusculum huic erumpit liquoris, colore melleo, atq; lentiore, nunq̃ durescentis. Perpetuò viret, nec facile discernitur à cæteris in fronde, etiam à pericis, tanta nataliū mistura est, sed picea minus alta, quàm larix; illa crassior, leuiorq; cortice, folio villosior, pinguior & densior, meliorq; flexu, at picea rariora sicciora q̃ue folia, & tenuiora, ac magis argentia, toraq̃ue horridior est, ac perfusa resina. Larix vltis radicibus non repullulat, picea repullulat, vt in Lesbo accidit incenso monte Pyrrhæo. Folio pungenti. Nullo flore exhilaratur, nec annorum gaudia sentit. Germinū incrementum tripartito, ac terna germina edit, ideo & inter squamas corticū spargit, quod omnibus arboribus in germinatione euenit, quoniam prægnantium ruinpitur cortex.

*Descriptio.*



Est autem prima eius germinatio incipiente vere, circa xv diebus. Iterum germinat, transeunte Geminos Sole: sic fit, vt prima cacumina impelli secutis appareat, genicularo incremento. Tertia est eiusdem ad solstitium breuissima, nec diutius septenis diebus, clareq; tunc cernitur excrecentium cacuminum articulatio. Larici humor diu defluit. Hæc omnium arborum cum abiete altissima, rectissimaq;. Conuenit his, pinoq;, vt quadripartitos venarum cursus, bifidosq; habeant, vel omnino simplices. Nos autem ita describimus. Foliis plurimis puber, sed deliciarioribus, per exortus quosdam manipulatim, & penicilli in morem deciduis. Triplici excremento nota, manna nẽpe, agarico, & resina: quæ Venetiis Larigna dicitur. Caudex crasso corticis callo cõstat, rimis profundis, & hiulcis liratim patẽtibus: rami ex cinereo albicant, forma in mucronatũ turbinẽ abit. Coni tam pertinaciter adhærent ramis, vt perpetuò nouelli cũ veteribus videantur: sed quũ folia exuit pandũtur, & semẽ excidit. Rami graciles, ac flexiles, colore melino, odore iucundo. Coni vt cupressi pilule, sed paulò lōgiore, breui pediculo ramis annexi, sed è cõtrario positi: nã arbore versus iacẽt, squamis cõpacti, cõtinentesq; squamæ binos nucleos foliatos.

*Cælum.*

Plinius montes amare dixit. Vitruuius notam esse arborem municipibus, qui circa Padi ripam, & maris Adriatici littora habitant. Dioscorides in Gallia Alpibus contermina gigni. Nos frigore oblectari scimus, & boreali cælo, vbi maximè sauit hyems. In Alpibus vidimus.

*Materies.*

Plinius. Amplissima arborum ad hoc aui existimatur Romæ visa, quam propter miraculũ Tiberius Cæsar in eodem ponte naumachiario exposuerat, aduectam cum reliqua materie, durauit quæ ad Neronis principis amphitheatrum. Fuit autem trabs è larice longa pedes cxx, bipedali crassitudine æqualis. Quo intelligebatur vix credibilis reliqua altitudo fastigium ad cacumen æstimantibus. Fuit & memoria nostra in porticibus septorum à M. Agrippa relicta, æquæ miraculi causa, quæ diribitorio superfuerat viginti pedibus breuior, sesquipedali crassitudine. Larix fœmina habet, quam Græci vocant ægida, mellei coloris. Inuentum est pictorum tabellis immortale, nullisq; fissile rimis hoc lignum. Proximum medullæ est, in abiete Græci leuson vocauerunt. Inter omnes conuenit vtilissimè in Lunæ coitu sterni, quem diem alii interlunium, alii silentis lunæ appellant. Sic certè Tiberius Cæsar conremato ponte naumachiario, larices ad restituendam cædi ex Rhetia præfiniuit. Materia rubet. Pondus sustinere potest. etiam in transversum posita renititur, nec temerè rumpitur, priusquam carie, quàm viribus deficit. In humore præcipua. Nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis vi consumitur, quàm lapis. Vitruuius ad hæc. Larix nõ solùm ob succi vehementẽ amaritatem ab carie, aut tinea non nocetur, sed etiã flammam ex igni non recipit, nec ipse potest per se ardere, nisi (vtri saxum in fornace ad calcem coquendã) aliis lignis vratur, nec tamen tunc flammam recipit, nec carbonem remittit, sed longo spatio tardè comburitur, quod est minima ignis & aëris è principis tempera-

tura.



rura. Humore autem & terreno est materie spissè solidata, non habens spatia foraminum, qua possit ignis penetrare, reiicitq; eius vim, nec patitur ab eo sibi citò noceri. Propter pondus ab aqua non sustinetur, sed quum portatur, aut in nauibus, aut supra abiernas rates collocatur. Ea autem materies, quemadmodum sit inuenta, est causa cognoscere. D. Cæsar quum exercitum habuisset circa Alpes, imperauissetque municipiis præstare commeatus, ibique esset castellum munitum, quod vocatur Larignum, tunc qui in eo fuerunt naturali munitione confisi noluerunt imperio parere. Itaque Imperator iussit copias adiuuari. Erat autem ante eius castelli portam turris ex hac materia alternis  
10 trabibus transuersis (vti pyra) inter se composita altè, vt posset de summo subdibus, & lapidibus accedentes repellere. Tunc verò quum animaduersum est, alia eos tela, præter sudas, non habere, neque posse longius à muro, propter pondus iaculari, imperatum est fasciculos ex virgis alligatos, & faces ardentes, ad eam munitionem accedentes mittere. Itaque celeriter milites cõgesserunt. Postquam flamma circa illam materiam virgas comprehendisset, ad cælum sublata effecit opinionem, vti videretur iam tota moles concidisse. Quum autem ea per se extincta esset, & requieta, turrisq; intacta apparuisset, admirans Cæsar iussit extra telorum missionem eos circumuallari. Itaque timore coacti oppidani quum se dedidissent, quæsitum vnde essent ea ligna, quæ ab igni non  
20 læderentur, tunc ei demonstraerunt eas arbores, quarum in his locis maxime sunt copię, & ideo id castellum Larignum, item materies larigna est appellata. Sed ignari sanè est hominis putare resinofum lignum inustum flammis stare, quippe si pingui resina lapides perungantur, ardent. Continuaque videtur experientia non solum accolas his vti lignis in hypocaustis, sed eius carbonibus vtuntur argentarij, & ferrarij fabri. Palladius. Larix utilissima, ex qua si tabulas suffigas tegulis in fronte, atq; extremitate tectorum, præsidium contra incendia retulisti: neq; enim flammam recipiunt, aut carbones creare possunt. Resina laricis sincerius olet, vt abietis, pini, & cupressi. ex Theodori versione  
30 Theophrastus. Plinius. Pluisculum huic erumpit liquoris, melleo colore, atq; lentore, nunquam durescentis. Succisa humor diu fluit. A Gallia subalpina, quam vernaculo nomine larica, hoc est larignum appellant incolæ, mellei liquoris similitudine, ex Dioscoride.

Resina.

## De terebintho. CAP. XV.

**R**ELIQUVM videtur de resiniferis historiam tradere, quæ coniferæ non sunt, & occurrit omnium præstantissima resinâ fundētium terebinthus, & ex syluestribus arboribus. Palladius ex terebintho mel colligere apes dixit.

Græcis *τέρμινθος*, vel *πρέστινθος*, vt Democritus habet in Geoponicis Græcis. Nomen.  
 men videtur ex bacculis ciceri similibus desumpsisse, nam *πρέστινθος* Græcis cicercum est. Latinis terebinthus. Itali *terebinto*. Surrentini siliquam syluestre vocant,

40 quod frondes, & folia instar siliquæ proferat.



*Centra.*

Theophrasto mas sterilis, fœminę fœcundæ. Fœminarum alię fructum rubentem, magnitudine lentis edunt, qui concoqui non potest, alię viridem, pallidumve, demum rubentem, nouissimè cum vua maturefcentem, & nigrescentem, amplitudine fabæ, interim maiorem, & resinofum, furfurosumq; tactu. Est & altera Indica terebinthus, vel similis terebintho, cui folia, & rami, & reliqua omnia terebintho similia, fructus autem diuersus: nam & in Bactris terebinthum hanc esse, ferreq; nuces amygdalarū magnitudine, quoniam non magnas, sed visu similes, & suauitate amygdalis præstantiores, & ideo loci illius incolæ his potius vti. De his in nostro pomario dicemus. Plinius ab eo. Ex his mascula, quæ est sine fructu. Fœminarū duo genera, alteri fructus ruber, lentis magnitudine, alteri pallidus. In Surrétino tractu plures sunt terebinthi species. Altera sterilis, altera vindemiis fructum ferens, & huius plures item species.

*Descriptio.*

Ex Theophrasto hæc habemus. Materies admodum lenta. Radicibus validis actisq; in profundum. fidelis ad vetustatem. Flos racemosus oliuæ modo, sed rubens. Folium numerosum ab eodē pediculo, figura lauri, digesto in versus, vt sorbo, vnicū ad cacumen exit, & numerum parem conturbat: minus tamen angulata sunt, quàm sorbo, & similitiora per ambitū laurinis videntur, oleosaq; vt fructus. Fert & nucamenta quædā caua ceu folliculos vlmis exemplo, in quibus animalia, quasi culices erumpūt, & resinofus lentor, qualis è ligno, vnde fit resina. Fructus quandiu maturus nō est, in aqua ferè supernatat, niger subsidit. Perpetuo folio viret. Vere cœpturo germinat. Messibus reddit semē. Viscus in ea nascitur. Dioscorides variis locis eā depingit. Terebinthus folia habet elaphobosci. Acinum sambuco similē, magnitudine rhois. Plinius ex Theophrasto. Fructus quum vere maturefcit, non grandior faba, odore iucundus, tactu resinofus circa Idā Troadis. Flos racemosus oliuæ modo, sed rubens, folia densa. Fert & folliculos nutrientes quædam animalia, ceu culices; lentoremq; resinofum, qui è cortice erumpunt. Vere cœpturo terebinthus germinat. Messibus reddit semen. Apud nos frondes erumpunt lentisci positu, colore, & odore, sed magnitudine satis maiore. Acinuli quàm lentisci maiores, coccinei, purpurantes, maturefcētes, veluti in cæruleum abeunt. Flore lentisci. Folliculi veluti cornua cartilaginei, vnde culices ex fuliginoso excremento euolant. Vulusculis inflatis æstate in Tiburtinis collibus, vidimus resinam optimam residare, quam latrabundi collegimus. Sed folium autumnno perdit, & nuda hyeme frig. oribus exposita est, quod non paruam admirationem ingessit.

*Celum.*

Syluestris arbor, montes amat, ex Theophrasto. In Troade circa Idā, & Macedoniam, breuis, & fruticosa contorraque. Damasco Syriæ insignis, copiosa, decoro aspectu, vbi monsterebintho, nec alia sylua scatens. Plinius. Syriæ & terebinthum habet. Fruticosa circa Idam Troadis, sed in Macedonia breuis arbor hæc, atque fruticosa in Damasco Syriæ magna. Montes amat. Terebintho fertilis Arabia, authore Diodoro Siculo, & Oricos Epiri ciuitas, vt narrat Seruius.

Vnde Virgilius. *Oriciaterebintho lucet ebur.*

Dio-



Diophanes terebinthos suo hospitio cerasa non respuere dicit, ea enim recipit insitione. Tarentinus trunco pyros recipere dixit. Surrento fœcundâ sterili inserunt pro aucupiiis. Martio mense in trunco recipit siliquam eadem regione. Sed optimè etiam recipit pistacea, vt dicemus.

Dixit Theophrastus non nisi fructu, resinâve vtilem. Resina ei in lachrimæ modum gignitur. Cædendam post germinationem affirmat, earumque cæsurâ non annua, sed post plus temporis fieri solet. Vulnerantq; vtraque parte, & caudice, & ramo, sed melior, copiosiorq; quæ ex caudice defluit. Optimaq; omnium est, spissa nanq; & leuissima, & odore gratissima est, verum pauca.

10 Terebinthum etiam apud Syros picem largiri affirmant. Est enim mons, vt rerulimus, ingens, terebinthis amplissimis totus repletus, ibique vrunt. Vulneribus profundis, vt etiam abies, & quæ resinam, tedamq; ingerunt, fœcundior efficitur, contra quàm cæteræ arbores. Plinius. Optimam, tenuissimamq; terebinthinam fundunt in Oriente. Sic & in Syria terebintho detrahunt cortices: ibi quidem & è ramis, ac radicibus, quum resina damnetur ex his partibus.

### De iunipero. CAP. XVI.

**I**UNIPERI tractationem aggrediemur. Eadem resinifera, & baccifera. Somnum afferre dicitur: ideo à Flacco lethæa dicitur propter obliuionem, quæ fit è somno, Argonauticon octauo.

20 *Contraq; lethæi quassare silentia rami.*

Scribit enim Medeam draconem ad somnum incantantem Apollonius libro quarto.

Ἡ δ' ὄφιν ἀρκέουσι νεῖον περικύβητα πάλῳ  
Βαπτίζ' ἐκ κυκεῶνος, ἀκχεῖτα φάρμακ' αἰοιδᾶς  
Εἰσκαλεῖται ὀφθαλμῶν.

Hoc est. Medea iuniperi scisso ramo, serpentem portione Cyceone tingens, incorruptibilia pharmaca cantibus inuocabat circa oculos. Iuniperi grauis umbra, præsertim cantantibus: vt Virgilius in Gallo testatur. Et Plinius. Serpentes, vbi earum squamæ obtorpuere, spinis iuniperi se scabunt.

30 Græcis ἀρκέως, & ἀρκέως dicitur. Latini iuniperum vocant, videturq; ita dici, quòd iuniores, & nouellos fructus pariat. Sola enim ferè arborum fœtus suos in biennium prorogat, qui nec maturefcit quidem nouo superueniente. Itali ginebro.

Iuniperum minoribus cedris Theophrastus assimilât, sed excelsior quidem, quàm cedrus. Folium simplicius, ac mollius, materies spissior, cæsa putrescens; fructus baccarū myrti magnitudine, hilaris ac niger, acerbus, ingustabilis, durans in annū, prius non decidens, quàm subnascatur alius. Germinat vere, quàm serius fructificet. Plures fructus gestat, alium perfectū, alium imperfectū, alium subnascentē habet, vt aliis quoq; contingit: quoniā concoctio lenta,

40 & fructus abfolui difficile potest. Radices summa telluris cute dispersa hæret.



Auctu facilis, perpetua virens coma. Cortex spontè detrahitur: nam disrumpitur. In his enim natura ipsam rem, quæ commoda sit, videtur ostendere, quum corticem disgreger, & tanquam alienum reiiciat. Damnosum est omne alienum, sicut quod est aridum. Plinius. Spina pro folio est. Semen post Vergilias reddit. Non floret. Non amittit folia. Nos aliqua addemus. Iuniperi cortex membranaceus, qui sponte rumpatur: facies horrida. Martio germinare incipit quasi florum conceptum. Spina potius quàm folio, rosmarino simili, sed breuiori, ceruleis baccis, vel rufescentibus nigris.

*Genera.*

Duo iuniperi genera cōstituit Theophrastus, vnum quod florem edat, nec fructificet, alterum, quod protinus fructum, vt præcidua poma fici præmonstret, nec tamen floreat. Itaque penè fieri, vt sola hæc arbor fructum in biennium habeat. Dioscorides duorum generū dicit, nempe maius, & minus. Baccæ & iuglandem nucem, & Ponticam æquare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamaræ, quæ arcentides nuncupantur. Plinius iuniperos non florere dicit. Quidam earum duo genera tradunt, alteram florere, nec ferre: quæ verò non floreat, ferre protinus baccis subnascentibus, quæ biennio hæreant. Sed id falsum, omnibusque iis dura facies semper, sic & hominum multis fortuna sine flore est. Eius duo genera, altera maior, altera minor. Apud nos in proceram magnitudinem adolescunt, & aliæ humiliter fruticant. Genus est, cuius fructus cerasi penè magnitudinem æquat.

*Cælum.*

In montium cacuminibus, & algentibus locis prouenit: verum non in excelsum emicat, sicut circa Cyllene promontorium euenire tradit Theophrastus. Plinius. Vasta hæc in Hispania, maximæque eius baccæ. Montes tamen amat. Sed calidis, & temperatis locis etiam libenter prouenit. In insula Pontia, & in nostra Campania crebra.

*Solum.*

Qualicumque solo etiam natam vidimus. In arenoso soluto, facile sterili, in litoribus maris, non autem in vallibus, & aquosis.

*Materies.*

Materies fabricis conuenit, tam futuris sub dio, quàm terra obruendis, ex Theophrasto. Cariem vetustatemque non sentire dixit Plinius. Et in Hispania Saguntia iunt templum Dianæ à Zacyntho aduectæ cum conditoribus, annis ducentis ante excidium Troiæ, vt author est Bochus, infraque oppidum ipsum id haberi, cui pepercit religione inductus Annibal, iuniperi trabibus etiã nunc durantibus. Medulla vbicunque solidior, quàm cedrus. Varro robustum pedamentum, quod ridicas dicit, vitibus adhibendum ex iunipero dixit. Columella ab eo. Tertium etiam locum obtinet pedamentum teres: idque maximè probatur ex iunipero. Apud nos quia materia fulua, & odorata est, ex ea conficiuntur coclearia: si vestes reponantur in arcis ex iunipero factis odorem recipiunt, & à tincis vindicantur. Si iuniperino veru carnes assentur infixæ, mirum in modum odor commendat eas.

*Resina.*

Humor in iunipero ad lachrimæ modum concrescit, inquit Theophrastus. Fluit gummi ex iunipero ad nihil vtile, ait Plinius. Et alibi, Iunipero eadē virtus,



tus quæ cedri oleo, quo peruncta materies, nec tineam, nec cariem sentit. Materies dum igni crematur, non iniucundum fumum spirat, odorisq; suauitate grassantia pestis contagia depellit. Eius resinam officinæ vernicem dicunt. Ex iunipero gummi, & oleo ex seminibus lini pressio fit vernix liquidus, cuius vsus ad illustrandas picturas. Gummi scriptoribus in vsu est multo. Eo raso carthas perfricant, ne sint bibulæ.

*De lentisco. CAP. XVII.*

**E**ST etiam lentiscus resinifera, bacciferaque. Arbor fuit, sub qua Iudæorum accusantium alter iuuenem Susannam adulterantem inuenisse Daniël falso testificatus est. Palladius ex lentisco apes mel conficere dixit.

Græcè *χένω* dicitur, quasi *χένω*, id est fissile, quod facillè findatur, ut experientur, qui ad dentiscalpia, & ad dentiū nitillam alboremq; frequenter findunt. Latini lentiscū à Lenteo verbo, quasi lentus fio, propter eius virgultorū lentitudinem deducunt. Præterea lentorem quendam quilibet foliorum attrectatu percipit. Itali *lentisco*.

Thuris arborem Theophrastus lentisco similem prodidit, & fructū quoq; *lentiscino*. Cicero Aratum interpretatus, ter lentiscum florere prodidit.

*Iam verò semper viridis, semperq; granata*

*Lentiscus, triplici solita grandescere fœtu,*

*Ter fruges fundens, tria tempora monstrat arandi.*

**A** quo Plinius. Est & alia manifestior ratio, mirabiliore natura prouidentia, in qua Ciceronis sententiam ipsius verbis subsignabimus. Ergo hæc aratio has habebit notas lentisci, primum fructum ostendentis, erit & tertia in bulborum satū scillæ, item in coronamentorum narcissi. Namque & hæc ter florent, primoque flore primam arationem ostendunt, medio secundam, tertio nouissimam. Didymus. Aiunt lentiscum ter fructum ferre, & si quidem primus fructus bonus fiat, primam seminationem probè fructum allaturam promittit. Similis significatio etiam aliorum existit. Sed causa tantorum virorum erroris dictio *χένω* fuit, quo nomine scilla dicta est ab antiquis, ut ex Aristophane habetur, deq; ea scriptum ab Arato, non de lentisco: non enim lentiscum ter florere, sed scillam ex Theophrasto habemus. Et genus vnum scillæ, aut bulbum eius omnem ab Hippocrate schœnum vocari Galenus est author. Nos autem ita describimus. Lentiscus fruticat stolonibus, & caudice cōcolore, & simili terebintho, sed botris ex fuluo purpurascens, maturescendo nigricantibus acinis. Flores similes racemosi, muscosi que, quos primo vere Aprilis mense promit. Vtriculi, folliculive oblongi nascuntur in ramis, incurui, teretes, quibus insunt culices.

Optimam lentisci resinam ex Chio insula Dioscorides prouenire dixit.

*Calum.*

Et ruderibus, & maritimis lætius emicat, ut in conflagratis Vesunij saxis. Didymus humidis locis nasci scripsit. Plutarchus Charoneus in hortis Socrari, quos Cephisus amnis ambiebat, vidit.

*Solum.*



**Satio.** Didymus à Calendis Ianuarij. plantari dixit. Plinius. Quædam pœna emendantur, aut morfu excitantur, vt palmæ, & lentisei, falsis enim aquis aluntur.

**Insitio.** Plutarchus, vt diximus, se in hortis Socleri ex lentisco oleas pullulantes vidisse scripsit.

**Materies.** Dentiscalpia è vitentibus surculis fiunt, quod vis eius dentibus cōferat, Dioscoride authore: emendatq; oris dolorem. Quod & Martialis annotauit.

*Foditq; tonsis ora laxa lentiscis.*

Hinc quibus dentiscalpium semper in ore est, prouerbium quadat, *quæ se-  
rit*, id est lentisci arrosiores, quod nimio studio corpus curent.

**Resina.** Consistit in lentisco lachryma, quam mastichen dicit Theophrastus. Lentiscus resinam gignit, quæ lentissima cognominatur, & ab aliquibus mastiche. Optima in Chio, nite dulcæ modo splendens, candore Tyrrenicæ ceræ similis, ex Dioscoride. Sed Galenus nigrâ ex Ægypto prouenire dixit. Palladius oleû ex ea extrahere docet, vt docebimus in Oliuero.

*De betula. C A P. X V I I.*

**P**RIVS QUAM resiniferarum arborum tractationi finem imponamus, de betula subiungemus. Est autem resinifera, siue bituminosa, nostrisq; tractibus frequens.

**Nomen.** Theophrasto *σημίδα* est. Latinis betula, melius quàm betulla. Matthiolus betulam dici putat, quod bitumine scateat falso: nam betula à batuendo dicitur: batuere enim cædere est: sic batula, leui mutatione betula, quum olim ex ea fascium virgæ conficerentur. Pueris nota, & infesta. Apud nos vulgò dicta, *candolice*.

**Descriptio.** Folio caria est, ex Theophrasti descriptione, præterquâ quod paulo angustiori, cortice versicolore. Quid verò sit caria, ipse idem nono libro, decimo capite declarat. Thapsiæ, & cariz, quam alij pyrum appellant. Sed Matthiolus capite De populo, quid sit caria ignorat. Addit Plinius. Betula arbor est Gallica, mirabili candore, atq; tenuitate, terribilis magistratuum virgis. Addimus nos. Trunco enodi est, & candidissimo. Folio pyri per ambitum serrato deciduo. Lulos fert, sicut corylus. Virgultorum eximia tenuitate.

**Calum.** Betula Theophrasti tempestate non nisi Pyrenicæ familiaris, Italiæ omnino ignota. Plinius Gallicam vocat, & frigidis gaudere dixit. Nobis in Surrentino tractu videre licuit, locis opacis & frigidis.

**Materies.** Materie læui, non nisi ad baculos utili, dixit Theophrastus. Plinius. Terribilis magistratuum virgis. Eadem circulis flexilis, item corbium sportulis. Leuissima: ideo scutis faciendis aptissima, quorum plaga contrahit se protinus, clauditq; suum vulnus: & ob id contumacius transmittit ferrum. Ad cistas, quæq; flexilicrate constant, habet candorem, vigorem quæ, & in sculpturis facilitat. Etiam ligaminibus apta. Nunc etiam vt olim Romanorum magistratum fascibus minax, & hodie virgis paedagogorum sceptris pueros terret.

**Summa.** Bitumen ex ea Galli excoquunt. Nobis faces ad nocturna lumina parantur,



tur, quoddam bituminosa pinguedine redundat, redæ modo conflatur, & resinosum quiddam resudat.

*De aquifolio. CAP. XIX.*

**H**ACTENVS de coniferis, resiniferisque: sequitur vt alias, & syluestres arbores describamus cæduas. exordiumq; sumemus ab iis, quæ æterna pubent coma. Et primùm de aquifolia. Macrobius infelices arbores vocat, & in suam sententiam adducit Veranium testem. Sic enim Tarquinius Priscus apud eundem, Quæ inferum deorum, auertentiumq; in tutela sunt, inter quas aquifolium, quod sterilis sit.

70 Nomen vagum est, & ad ilicis speciem, quam infra describemus, & ad præsentem. Theophrasto ἀγρία est. Falsò enim putauit Plinius esse Theophrasti ἀγρία, quum hæc syluestris mespili species sit, vt suo loco dicemus. Plinij verba. Theophrasto authore genus intelligi voluit cratagon, siue crategona, quam Itali aquifolium vocant. Latinis aquifolium dicitur, quòd aculeata sit. Olim enim aquus pro acus dicebant. Nos *agrifoglio* vocamus.

Theophrastus perpetuo folio virere dixit. Plinius folio pungenti. Est enim ambitu aculeatum. Vere cœpturo germinat. Nos autem ita describemus. Perpetuo viret, sed lætius hyeme. Spinis horrido folio in margine multilatero, leniter sinuato, lauri æmulo, carnosio, & solido. Virgis viridi colore vestitis, lentis, 20 flexibilibus, baccis rubeis, rotundis, oxyacanthæ, rusci aut asparagi æmulis, racematim coaceruatis, nucleo intus simili, albo, crasso, flore albo, odore, cortice læui, & herbaceo, ad gluten aucupatorium apto, sed solo, quod ei nō conueniat, nactio, infrugifera.

Montes amare, & in planis nasci recusare scribit Theophrastus. Plinius: 30 montes amat. In montibus perpetuo gelu obsitis nos nasci vidimus.

Apud nos mas, & fœmina est, quæ latiori folio prædita, & minus aculeato. 40 Locis frigidis acuminum genus non nascitur. Sed super hanc plantam infusum, frigidissimis locis perennat.

Plinius de aquifoliis hæc habet. Si quæuis aquifolia in villa nata est, veneficia arceat. Flore eius aquam glaciari Pythagoras scribit. Item quæ iaculum ex ea factum in quoduis animal missum, etiam si citra deciderit defectu mittentis, ipsum per sese recubitu propius adlabi, tam præcipuam esse arbori naturam. Catovectes aquifolios heri habet. In laminas secatur, cuius operimento vestiatur alia materies. Nobis scopis nascitur, suspenditurq; circa funes, è quibus salte carnes pendent: arceat enim mures suis aculeis. Fit ex ea viscus ligandis auium pennis. Corticem vere detrahunt, frondibusq; arborum inuoluentes, factio humi serobe vliginosis locis maxime obruunt, & ibi putrescere patiuntur, quod fieri solet duodecim ferè diebus: tum marcidam eruant, & raris per pila contundunt, donec in viscum lentescat, demum in profluente, vt adherentes corticum reliquæ sordesq; fluitent, proluunt, & adiecto iuglandis olei momento, fictilibus recondunt.



## De alaterno. CAP. XX.

**P**V BESCIT & alaternus perpetua fronde, & è sylvestribus est, Theophrasti autoritate, Verannius inter infelices arbores, & nefastas alaternum connumerat.

Nomen.

A Theophrasto φιλύρα dicitur, à Dioscoride φιλυρέα. Latinis, vt Columella, & Plinio, alaternus. Neapolitanis *lanterno*.

Descriptio.

Hæc habet de sua philyra Theophrastus. E sylvestribus perpetuo viret. Incunte vere germinat. Post Vergiliarum occasum fructificat. Obedientissima est, cãdorq; ei celastri modo. Suus honos in alendo pecore: nam semper fronde abundat. In montibus nascitur, in planis nasci recusat. Columella de alaterno loquens ait: Caprinũ pecus asperis locis, à sylvestribus optimè pascitur, arbutusculis, frutetisq; maximè gaudet, ea sunt arbutus, alaternus, cytisus agrestis, qui in altitudinẽ non prosiliunt. Plinius. Alaternus habet frondẽ inter ilicem & oliuam, infelix, damnataq; religione, quæ neq; seritur vnquã, neq; fructum fert. Nos autẽ alaternum nasci dicimus frutice potius quàm arbore, fronde perpetua, cuius honos est in alẽdo pecore. Germinat incunte vere, fructificatq; Vergiliarũ occasu, baccula rotunda, nigra, racematim coeunte, subdulci, qua turdi hyeme allecti retibus capiuntur. Et si Plinius in frugiferã censcat. Celastri modo ei cãdor, et si nobis celastrus incognitus sit, Theophrasti tamẽ autoritate albus est, & alaterni lignum album est. Nascitur in asperis, & montibus, in planis nasci recusat. In montibus ciuitatis Equensis frequentissima, è mediis lapidibus surgens. Foliis est oleæ nigrioribus, & latioribus, Plinius dixit, inter ilicẽ & oliuã, quod in alaterno optimè videre est. E sua materie pilæ apud nos conficiuntur, quæ ligneo malleo in ludis longè traiciuntur, grauitate & firmitate insignes. Potest suspicari esse Dioscoridis philyram, nam quæ scribit omnia ferè è Theophrasto desumit: nam est ligustri magnitudine, foliis oleæ nigrioribus, fructu lentisci, subduli, racematim coharẽte: nascitur in asperis, & astringens est: nam stiptici est saporis.

## De colytea. CAP. XXI.

**C**OLYTEAM apponemus nobis frequentem, et si Theophrastus raram inuentu dicit, & solum Idæ concessit: fronde enim perpetua est.

Nomen.

Græcis κολυτῖα, Theodorus colyteam vertit.

Descriptio.

Colytea arbor circa Idam prouenit, alioqui rara inuẽtu, fruticosa, tamosaq; & multis alis concava, folio vlmi, longiore, satis ad latifolia lauri folium accedente, sed ampliusculo, & rotundiore, supra viridi, infra cano, neruosoque, prætenuibus neruulis, fibrisq; de medio callo in costarum speciem adductis, materie solida, cortice nõ leui, sed quasi vitigineo vestitur. Radicibus per summa gracilibus, & solutis, ceterũ fibratis, & mirum in modũ flauis, sterilibus, & flore vidua, surculos tamẽ gemmasq; circa folia pingues, leues, cãdidos, amẽracea facie fundit: præcisa, vel ignibus adusta, ab imis rediuiua resurgit. Eadẽ est, quã Matthiolus pro Dioscoridis philyrea depinxit. notẽ à Theophrasto appositẽ ad amulũ



amissim respōdent, nec præcisius vnquam ab eo depictum est. Flore caret, sed surculi illi, quos amentacea facie repræsentat Theophrastus, fructus proferūt lentiscinos: & si Theophrasto in Ida sterilis erat, apud nos latè fœcunda; si ibi rara, in syluis nostris frequentissima montosis.

## De Taxo. CAP. XXII.

**F**l taxo obuiam taxus, syluestris, & perpetuæ frondis arbor. In inferni opacis nasci fingunt Poëtæ. Seneca in Hercule furente.

*Horrent opaca fronde nigrantis coma*

*Taxo imminente.*

10 Et infernales furia ex hoc ligno faces gerere finguntur, authore Placido. Vnde Statius Thebaidos octauo.

*Nec dum illum, aut trunca lustrauerat obuia taxo*

*Eumenis.*

Quod non aliam ob causam ita Poëtæ finxerunt, nisi quia latifera sit. Plinius à taxo toxica appellata putat, quasi taxica venena, quibus sagittæ tinguntur. Vasa etiam viatoria ex ea vinis in Gallia facta mortifera fuisse compertum est. Et Sextius dixit in Arcadia præsentis esse veneni, vt qui obdormiant sub ea, cibumve capiant, moriātur. Repertumq; innoxium fieri, si in ipsam arborem clauus æreus adigatur. Quod Plutarchus in symposiacis commentariis adserit, præsertim id iis euenire, scilicet qui morentur sub eius vmbra, quum nouis floribus turgens sit: vniverso enim corpori frigiditatem facit, strangulationes etiam, celeremq; mortem adfert. Cæsar commentariorum libro sexto de bello Gallico, Catiuulcus omnibus precibus detestatus Ambiorigē, qui eius consilii author fuisset, taxo cuius magna in Gallia & Germania copia erat, se exanimauit. Dioscorides scribit, auriculas, quæ in Italia taxi baccas deuorent, denigrari, & qui edant eas hominesalui profluuium corripere, & Narbonæ homines lædi, qui sub ea cubent, & sæpenumero necari. Theophrastus veterinariis latifera, non item ruminantibus. Sunt tamen homines, qui baccas edant suauicibo, & innocuas esse dicant.

30 Theophrasto *μίλος*, & *μίλιπς* dicitur. Dioscoridi *σμίλαξ*, Paulo thynion. Plinius à Sextio milacem vocari dixit. Latinis taxus. Italis *tasso* & *nasso*. Nomen.

Theophrastus simplex genere esse dixit, Plinius maris & fœminę meminit. Genera.

Taxus procera arbor, facillimeq; augetur, similis abieti, sed minus excelsa, alis crebrioribus, folio abietis, sed pinguiori, mollioriq; ligno, quæ in Arcadia nascitur, nigro, aut puniceo, quæ autē in Ida, flauo, & cedro simili, propter quod vendentes fraudantes, tanquam cedrum vendant. Cortex cedro per similis, tum scabritia, tum colore, quo detractō totum subesse cor cernitur. Radices ei graciles, per summa cespitem breues, rotundo fructu, & paulo ampliore, quàm faba, colore ruffo, tactu molli. Folio æterno. Floret paulo ante solstitium,

40 um, maximè serotino germine, &, vt Archades volunt, omnibus serior, et si



fructum nudum ferat. Hæc Theophrastus. Plinius ab eo. Similis abietis & piceæ, minus virens, gracilisq; , & tristis, & dira, nullo succo. Ex omnibus sola baccifera, mas noxio fructu, letalis quippe baccis. Nicander, quia taxus similis abietis, *ἰλαρίς* vocat.

*Celum.*

In montibus nasci Theophrastus dixit. Circa Idam rara. In Macedonia, & Arcadia frequentior. Galenus eam probat, quæ in OËta Æthiopiæ monte nascitur. Alii vmbrosissimis locis prouenire dicunt, vt nos sæpe vidimus. In Corsica plurima nascitur Diodoro auctore, vt ex illis mel collectum amarum sit. Virgilius.

*Situa Cyneas fugiant examina taxos.*

Nam Corsica Græcè Cyar dicitur, vnde Cyneæus deducitur.

Et alibi Virgilius.

*— Aquilonem & frigora taxi.*

*Materies.*

Theophrastus, Materie soluta & tenera in operibus est, & præsertim in Arcadia. Ex ea conglutinenta, siue subscudes seriniis, capsis, & subscelliis parantur, atq; in totum similibus præstat. Apud nos ex ea arcus, & scorpiones parantur: vt antiquitus. Virgilius.

*— Ithyreostaxi torquentur in arcus.*

Valer ad viperæ morsum. Claudius Cæsar, Tranquillo referente, vno edito proposuit: nil æquè ad viperæ morsum facere, quàm taxi succum.

### De buxo. CAP. XXIII.

**E**SYLVESTRIBVS etiam perpetuò viret buxus: myrti æmula obfrondium nitorem: è syluis erepta in viridariis viret, parietū ambulachris plurimis formis conspicitur: nam topiario operi accommodatissima est, nec, vt myrtus, frigida hyeme aut gelu læditur. Cauebant antiqui ne buxum Veneri offerrent, ne palæstram venericam expiarent. Buxentum in Italia oppidum à buxo dictum est, & à Græcis propriam significationem seruat, nam illis *πύξος* vocatur.

*Nomen.*

Græcis *πύξος* dicitur, & quæ ex ea tabulæ ad scribendum fiebant, *πύξια* dictæ. vnde & pyxides. Latinis buxus. Italis *bosso*.

*Genera.*

Plinius tria recenset genera, Gallicum, quod in metas emittitur, amplitudinemq; proceriorem. Oleastrum in omni vsu damnatum, grauem præfert odorem. Tertium genus nostrate vocant, sylvestre, vt credo mitigatū satū, diffusius, & densitate parietum virens semper, ætonfile.

*Descriptio.*

Theophrastus ita describit. Arbor proceritate non excellens, folio myrti, immortali virens coma. Paulò ante solstitium florer, germine omnium ferè serotino, serò fructificat, vt Arcades volunt, omnium tardissimè. Fructu omnibus animalibus inuiso. Auctu facillima. Plinius autem hoc modo. Buxus concauo folio. Plurima fert: nam & semen suum, & granum, quod carthægon vocant, & à Septentrione viscum, à Meridie hypear. Interdum pariter res quaternas



quaternas habet. Fructu omnibus animantibus inuiso. Addimus nos. Præden-  
his & rigidis virgultis, & ramis admodum foliosis, graueolentibus: Baccular  
tripodes coronula denticulata insigniuntur, myrto non absimiles. Flore  
herbaceo.

Aquilonaribus regionibus vigere, & locis, scripsit Theophrastus, argenti- Calum.  
bus, & asperis, ut in Cithæra, ubi plurima. In Olympo Macedoniae gracil-  
lis, & brevis, qui etiam frigidus est. Maxima, pulcherrimaque crassamento, &  
proceritate cæteris præstans in Cyreneâ prouenit, ideo meli ibi insuaue est, &  
buxum olens. In Media, & hortis Babyloniis hospitari nequit, vix summo  
10 conatu recipit: nam his & cultores hortorum vehementer laborant. Locis  
feruidis prouenire non posse nulli dubium est. Plinius Pyreneis, & Cytho-  
so montibus plurima, & Berecynthio tractu crassissima. In Corsica flore  
non spernendo, quæ causa amaritudinis mellis. Nascitur in montibus.  
In Olympo Macedoniae gracilior, sed brevis. Amat frigida, & aprica. Si-  
milis naturæ Cythorus Paphlagoniæ regionis Asiæ mons est, de quo Vir-  
gilius.

*Et inuat undantem buxo spectare Cythorum.*

Catullo buxifer. Berecynthius mons Phrygiæ buxo etiam abundat, ut di-  
ximus. Virgilius Æneidos nono.

26 *Buxusq; vocat Berecynthia Matris*

*Idea.*

Didymus humidis locis etiam gaudere dixit.

Plinius eius docet sationem. Surculis etiam quibusnam sit articula- Satius.  
tio arboris, non omittendum videtur. Nanque buxi tenuissimis quinis, se-  
nisve colligatis depacti proueniunt. Quondam in obseruatione erat, ut de-  
fringerentur ex imputata buxo, aliter viuere non crediri: detraxere hoc  
experimenta. Didymus. Buxus plantatur auulsione, clauis, & ramis, de-  
positis in plantario post Idus Nouembris. Idem. A ramis, & taleis tantum  
plantatur, nequaquam verò auulsione, propterea quòd neque ex radicibus  
30 stolones emittunt. Nos stolonibus plantamus, quum multos è caudicibus  
emittant, & semine, & radicibus solis depositis: nam viuax est admodum,  
et si aspero solo, & gracili gaudeat. In viridariis, ubi latissimum solum, optimè  
quoque prouenit.

Materies buxi, ut ex Theophrasto habetur, ex omni materie densissima, Materies.  
durissimaque eademq; grauiissima. Simulachra ex eo sculpere quidam solent,  
rimas enim non capit, & carnis æqualitate constare quodammodo videntur. Na-  
tura ei perpetua, vermibus innoxia, quum eius materies amara, duraq; sit, nec  
erodere valeant: quia medullam paruum incertamq; gerit, nec distincta spe-  
ctatur: ea carere quidam putant, sed constat eam habere, argumento, quia  
40 ex ea sumptuosarum valuarum cardines facere artifices solent, quos archite-  
cti faciundos ex medulla præcipiant: quòd item vel omnis medulla distrahi



possit, etiam durissimarum materierum, quas nonnulli corda appellant, argumento sanè accipi potest. Sunt qui non in medio, sed per totum lignum dispersam esse affirmant. Ad plaustrorum axes, & aratorum buras utilis. Quæ in Olympo, brevis, & frequentia nodorum incommoda. Ad malleos etiam, & terebellos valens. Ob suam spissitatem enodis habetur, aut paucissimis nodis. Plinius. Buxo materies honorata, raro crispanti, nec nisi radice; cætero lenis quies materiæ silentio quodam, & duritie, ac pallore commendabilis. In igne quoq; duritia, quæ ferro, nec flamma, nec carbone utili. Spississima ex omni materie, ideoq; & grauissima iudicatur buxus: gracilis natura, in aquis non fluitat: materie æternam putant. Tineam nasci prohibet buxus duritia sua. In 19 laminas secatur, cuius operimento vestiatur alia materies. Terebris vaginas ex buxo faciunt. Nec adipem, nec carnem habet, nec medullam, minimumque etiam sanguinis. Facile corno conglutinator. Arida omnia ligna facilius ferris cedunt, præter buxum, quæ pertinacius resistit, serrarumque dentes replet æqualitate inertis, qua de causa alterna inclinatione egerunt scobem. Sacrificæ Tuscorum tibiæ è buxo fiunt. Ennius buxum amaro corpore dicit.

— *Longeq; cupressi*

*Stant duris foliis, & amaro corpore buxum.*

Turbo etiam puerilis fit è buxo. Persius satyra sexta.

*Nec quis callidior buxum torquere flagello.* 20

Præcipua pectinum dote commendatur. Martialis

*Multifido buxus qua tibi dente datur.*

Iuuenalis:

*Sed caput intactum buxo.*

Torno materies probatur, cui non omnis apta est, verùm ea tantum, quæ prædura, atq; solida, & minime crispa, cuiusmodi buxi est, ut nulla alia torno utilior, præstantiorve. Virgilius

— *Aut torno rasile buxum.*

Antiquitus veteres è buxo elementa formabant ad pueros literis imbuedos, & hæc tabula pyxion dicebatur. Herodoto deltion. Pictores etiam artes 30 in buxo docebant. Liquidis medicamentis è buxo etiam pyxides fiunt, quod maximè Dioscorides probat. Quare quia frequentius ex ea materie fieri solitæ sunt, sic vocantur. Apud nos ex ea fiunt tibiæ multiforatiles, & pyxides, quibus nomen dedit. Commendantur tabellæ pictoriæ, cocleares, & scachi.

#### De Lantro. C A P. XXIII.

**E**T si Theophrastus laurum inter urbanas commemoret, & Plinius, quòd umbræ officio humanius uiuat, nos inter syluestres reponemus, quū eius fructus vescus non sit. Laurus triumphis propriè dicatur, vel gratissima domibus, ianitrix Caesarum, pontificumq; quæ sola & domos exornat, & ante limina excubat. Ipsa pacifera, ut quam prætendi etiam inter armatos hostes 40 quietis



quietis sit indicium. Romanis præcipuè lætitiæ, victoriarumq; nuncia addi-  
 tur literis, & militum lanceis, pilisq; , fascesq; imperatorum decorat. Ex his in  
 gremio Iouis optimi maximi deponitur, quoties lætitiâ noua victoria attu-  
 lit, idq; non, quia perpetuò viret, nec quia pacifera est, præferenda ei vtraque  
 olea, sed quia spectatissima in monte Parnaso, ideoque etiam grata Apollini,  
 assuetis eò dona mittere iam & Regibus Romanis, teste L. Bruto. Fortassis e-  
 tiam in argumentum, quoniam ibi libertatem publicam is meruisset, laurife-  
 ram tellurem illam osculatus ex respòso. Et quia manu satarum receptarumq;  
 in domos, fulmine sola non icitur. Ob has causas equidem crediderim, hono-  
 rem ei habitum in triumphis potius, quàm quia suffimentum fit cædis hostiũ,  
 & purgatio, vt tradit Massurius. Adeoq; in profanis vsibus pollui laurum, &  
 oleam fas non est, vt ne propiciandis quidem numinibus accēdi ex his altaria,  
 aræve debeant. Laurus quidem manifesto abdicar ignes crepitu, & quadam  
 detestatione, interaneorum etiam vitia, & neruorum ligno torquente. Tibe-  
 rium principem tonante cælo coronari ea solitum ferunt, contra fulminum  
 metus. Hæc Plinius. Laurum comitatur hæc historia, à Graiis rei rusticæ au-  
 thoribus tradita, quæ fabuloso verborum inuolucro non nihil etiam veri præ-  
 tendit. Formosissimam Lanoui fluminis filiam Apollo deperibat, dans operam,  
 vt ea, tanquam amasia potiretur, ab eo tamen capta, matrem precatur tellu-  
 rem, se in suum reciperet gremium: subscribens votis tellus, confestim arbo-  
 rem edidit. Re conspecta deterritus Apollo, arborem gentilis virginis nomine  
 donauit, & vulso ramo sese coronauit, fuitq; diuinationis signum arbor. Idq;  
 non incongruum, quippe puellam sapientiam appellent, facultasque oracula  
 dandi ab sapientia proficiscitur, quòd plena sit ignis arbor, Apollo ignis ipse,  
 vtpote Sol, vnde lemures & laruas odit, & si qua laurus astiterit, eminus abi-  
 guntur in fugam fusi. Porro qui eam in vaticiniis cremant, prædictionis ra-  
 tionem creduntur iniuisse. Apollinis simulachra lauro coronantur, ob rē me-  
 dicam. Columba quoties ægrotare cœpit, lauri folio decerpto, sibi ipsa mede-  
 tur, neque verò palumbes tantum, sed & graculæ, merulæque, & perdices  
 lauri folio annum fastidium purgant. Coruus quoque occiso chamæleonte,  
 lauro infestum virus extinguit. Vnde apud Græcos frequēs adagium, laureum  
 scipionem gestare, de his, qui in aliquas insidias lapsi, vitæ periculum euase-  
 runt. Ob etiam vim igneā Apollini dicarunt, & ob id, vt Eusebius ait, à dæmo-  
 nibus maximè odio habetur. Quòd vsta sonet, quandam vim prædicendi ha-  
 bere dixerunt. Empedocles qui animam igneam statuebat, lauri natura con-  
 siderata, dicebat, si homini sit in arborem transmigrandum, in nullam com-  
 modius, quàm in laurum subeundum. Est & alia ratio vt Apollini sacra arbor  
 dicatur. Laurus capiti dormientium apposita vera videri somnia facit, vt in Se-  
 rapione legimus. Id ipsum Antiphonem, Philocrum, & Artemonem asseue-  
 rasse comperimus. Laurum tradunt secundam valetudinem adferre, proinde  
 folia principibus à populo & caricæ die Ianuarii mensis donabantur, quippe



quum nec sacer morbus, nec malus genius negotium exhiberet, ubi laurus ad-  
fuiſſet. Quin & Æſculapii caput laurea redimitum, non alia de cauſa dicunt,  
niſi quia ea arbor plurimorum ſit remediorum.

Veteres præterea laurum tutelæ ſactarunt, quòd in locis, vbicunq; vel ſa-  
ta, vel affixa fuerit, incolumitatem præbeat, cuius rei non ignarus Ouidius:

*Postibus angustis eadem ſidiſſima cuſtos,*

*Ante fores ſtabis, mediamq; tuebere quercum.*

Fuit & Romæ palatium, quod à lauri cognomento daphne fuit appella-  
rum. Præterea Latinum commemorant Ciriæ filium, & ſocerum Æneæ, an-  
tequam illuc Æneas aduentaffet, arcem condidiſſe, inibiq; laurum inueniſſe, 10  
(acropolim, id eſt, arcem nominant veteres, Regum tabernaculum, quod mu-  
nitionis, ſecuritatisque gratia ſummis vrbiũ cacuminibus ſit extructum.)  
Laurentum Italiæ oppidum antè Lauinium & Lauinia dictum, authore Ser-  
uio, ſic dictum, quòd quum Latinus Telegoni frater, & Circes filius, & Æ-  
neæ ſocer, poſt Lauinii fratris mortem, Lauinium amplificaret, in arce laurum  
reperit. Sic canente Virgilio.

*Laurus erat tecti medio in penetralibus altis,*

*Sacra comam, multosq; metu ſeruata per annos:*

*Quam pater inuentam, primas cum conderet arces,*

*Ipſe ferebatur Phæbo ſacraſſe Latinus,* 20

*Laurentisq; ab ea nomen poſuiſſe colonis.*

Erant Pythia certamina à Pythone ſerpente, quem Apollo interfecerat, di-  
cta. Vnde Ouidius.

*Nè ve operis famam poſſet delere vetuſtas,*

*Inſtituit ſacros celebri certamine ludos,*

*Pythia perdomita ſerpentis nomine dictos.*

Præmium Theſſalonica laurus erat, vt Lucano placuit.

*Vnde & Theſſalia veniant ad Pythia laurus.*

Pindarus & Callimachus, Græci Poëtæ, Ouidio longè antiquiores, Apol-  
linem poſt deuictum draconem lauream induiſſe teſtantur: ratio quòd A- 30  
pollo Daphnem adamauit, quæ mutata in laurum fuit, ex Pauſania in Pho-  
cenſibus. Romæ ludi Apollinis fiebant, quos Romanus populus laureatus  
ſpectabat. Virgilius:

*Phæbo ſua ſemper apud me*

*Manera ſunt lauri.*

Ob hanc rem Eurotam fluuium, qui Spartam præterfluit, quòd lauris ab  
vtraque ripa parte obſitus ſit, Apolliniſ ſacrum Poëtæ dixerunt. In Sileno.

*Omnia quæ Phæbo quondam mediante beatus*

*Audiſt Eurotas, inſiſtiq; ediſcere lauros.*

Parnaffus mons, quòd laurus in eo ſpectatiſſima proueniret, Apollini et- 40  
iam ſacer eſt. Lucanus.



*Cardine Parnassius gemino petit aethera colle,  
Mons Phæbo, Bromioq; sacer.*

Templum, quod primum Apollini erectum apud Delphos fuit, tantum è lauri ramulis in terram, in specus morem defixis, ex Pausania. Sed dedicationis ratio hæc est: Diodorus dicit, quòd ille primùm hanc plantam inueuerit. Alii quòd fulmine non iciatur. Pharnutus, quòd facile incendatur, & ad purificationes idonea, ob id deo mundissimo & flagrantissimo dicatur. Lactantius propter vim diuinandi triplicem, præteritorum, præsentium, & futurorum. Ideo maximè illi Delphicam deuoueri, quòd hanc radices tres habere existiment. Romanorum principum corona è lauro fuit. Appianus inquit, lulium Cæsarem post ciuilia bella in urbem reuersum, multi vt Regem salutarunt, eiusq; imaginem lauro coronarunt. Scribit Dion post victorias obtinuisse, vt corona laurea ornari perpetuò sibi liceret, cuius rei causam afferebat, quòd caluus esset. A ludis & eorum victoriis, qui de hostibus victoriam adepti essent, ex lauro coronam cingebant. Ouidius.

— *Tu ducibus latis cum lata triumphis  
Vox canet.*

Scipionem de Carthagenensibus triumphantem altera manu sceptrum, altera laurum tenuisse scribunt Plutarchus, & Appianus. Suetonius refert aquilam præteruolantem gallinam albam, & lauri ramulum rostro ferentem apprehensam, in Liuiæ gremium, post Augusti nuptias, quum Veientanum suum tenuisset, dimisisse, quem quum pangi placuisset, postea adnatum lauretum, ex quo deinde triumphaturi Cæsares, laureas decerperent, & alias eodem loco sererent. In aruspicina laurus victoriam etiam præmonstrauit, vt ea, quæ in domo Alexandri Seueri iam infantuli nata iuxta persicum arborem, intra vnum annum persicum ipsam incremento mirabili superauit, vnde aruspices futurum prædixere, vt puer is olim Persas euinceret: quod euentu est postea comprobatum, sub eo enim primùm Persæ serui apud Romanos fuere. Adeò laurus triumphantium propria fuisse videbatur, vt obseruatum sit in laureto Cæsarum, sub cuiusq; obitu arborem ab ipso institutam elanguisse. Iulii Cæsaris eadem præmonstrauit, quum pridie Idus Martias auis regaliolus cū laureo ramulo Pompeianæ curiæ sese inferens, à varii generis volucris ex proximo nemore persequentibus ibidē discerpta est. Nouissimo verò Neronis anno, in quo Cæsarum progenies defecit, sylua illa Veientana radicitus omnis exaruit. Tali portento fuit Alexandro Severo laurus alia ingens, & antiqua, quæ in palatio cuiusdam ciuitatis, à qua proficiscebatur ad bellum, quod contra Germanos parauerat, subito collapsa, mortis iti dem eius indicium habuit. Contrà non temere boni ominis laurus fuit, quæ circa Pompeii fasces alligata fuit, quæ quū longo itinere exaruisset, in vico Galatiæ cū Lucullo in colloquium descendenti, reuiruit, quod gloriâ rerū à Lucullo gestarū ad



Pompeium transituram interpretatum est, & paulò post subsequutum. Fuit & laurea Poëtarum insigne, & hac ratione coronandos Poëtas antiquitas censuit, quòd hæc Apollini, qui Musis præficitur, sacra fuit. Hesiodus in sua Theogonia scribit, ad se iuxta Heliconem montem nouem Musas venisse, & ratum Heliconiæ laurus manducandum porrexisse, quem quum degustasset, repentrè poëtica doctrina repletus sit. Est & lauro perennitas, & vitæ diurnitas, quòd nil magis à Poëtis expetitur: aliorum enim scriptorum auctoribus, non tam fama, quàm utilitas etiam quæsitæ: sola Poëtis gloria, & victuri nominis cupiditas insita est; ob id eleganter Ouidius, *Petitnr sacris nisi tantum fama Poetis*. Diximus ex Hesiodo datum sibi laureum sceptrum à Musis, indicando laborem & scriptoris diligentiam: nam veluti sunt amara lauri folia, ita virtutis sudor amarus, & laboriosus. Frequens quoque fuit huius arboris vsus in deorum coronis, maiorque in sacrificiis, vt nulla communior, sanctiorque apud gentiles fuerit. Lauro, inquit Nicander, Thesalica Apollinis coma primum redimita. Æsculapium laurea corona vinciri solitum, scribit Plutarchus. In sacrificiis vsus fuit propter vim diuinandi, indicabatur enim euentus rei ratione crepitantis lauri: si enim abunde, & sonantius crepuisset, felix auspiciū æstimabatur: vt intellexit Tibullus illo versu,

*Laurus ubi signa dedit, gaudete coloni:*

E diuerso autem si tacita deflagrasset, inauspicatissimum rebatur, quod etiam Propertius expressit.

*Et tacet extincto laurus adacta foco.*

Quamplurima sunt quoque authorum exempla, quæ omittimus. Pro sunt insuper non parum ad euitandam aëris contagionem, sylvarum vmbra & amœnitates, potissimum verò fragrantium. Quum enim Romæ pestis saureret, Commodus Princeps Laurentum secessit, vt diximus, quòd hæc regio lauri crebris syluis opaca foret. Contra pestilentiam valet hæc arbor foribus affixa, authore Aristophane. Columella cubili gallinæ incubantis lauri ramulos subiicit, quòd credat aduersus tonitrua remedium fore. Quidam etiam doliis lauri folia imponunt, ne tonitrua peruertant. Idem refert rubiginem à segetibus lauri folio abigi, transireq; ex aruis in earum folia.

Nomen.  
Genera.

Græcè *δαφν*, & *δαφνίς* dicitur, quasi duophne: frondes enim igni iniectæ fragorem edunt salis strepitu. Latine laurus. Itali *lauro*, & *allor*. Quia vibana arbor est Theophrasto, ex ea multas differentias noscit, sensusque earum communior. In Heroo sinu laurus est, parte aquis extante lapidea, similis tamen virenti. Magnitudo frutici bipedalis. In mari quoque rubro viuere eam affirmant. Cato duas species commemorat, Cypriam, & Delphicam. Plinius tredecim genera recenset. Duo eius genera tradit Cato, Delphicam, & Cypriam, Pompeius Lenæus adiecit, quam mustaceam appellauit, quoniam mustaceis subiiceretur. Hanc esse folio maximo, flaccidoq; & albicante, Delphicam æquali colore, viridiorem, maximis baccis, atque



atque è viridi rubentibus. Hæc victores Delphis coronari, & triumphâtes Roma. Cypriam esse folio breui, nigro, & per margines imbricato, crispam. Tinum in sequenti dicemus. Accessit & regia, quæ cœpit & augusta appellari, amplissima & arbore, & folio, baccis gustatu quoque non asperis. Aliqui negant eandem esse, & suum genus regię faciunt, longioribus foliis, latioribusque. Iidem in alio genere baccaliam appellant hanc, quæ vulgarissima est, baccarumque fertilissima. Sterilem verò earum (quod maximè miratur Plinius) triumphalem, eaque dicunt triumphantes uti, nisi id à Diuo Augusto cœperit, ut docebimus ex ea lauru, quæ ei missa è cœlo est, minima altitudine, folio crispo, ac breui, inuentu rara. Reliqua genera in sequenti dicemus. Aliam etiam Plinius laurum recenset. In tractu Ponti circa Heracleam portus est, Amyco Bebrycum rege interfecto clarus. Eius tumulus à supremo die lauro regitur, quam insanam vocant, quoniam si quid ex ea decerptū inferatur nauibus, iurgia fiant, donec abiiciatur.

Sed describamus laurum ex Theophrasto. Arbor læui, & tenui cortice vestitur. Caudice procero, nodis perquam paucis. Perpetuo virens folio. Succo scatens pingui. Radicibus non minoribus alni, obliquis, & inæqualibus, quæ spontè naturæ recto tramite non progrediantur. Germinat post Fauonium, carne in nucleo concepta. Fert vuam tam fœcunda, quàm sterilis, sed copiosius sterilis, quam marem aliqui vocant, quamquā non omnis, sed genus quoddam. Brevis est vitæ, quum materie soluta, proximaque putredini sit, infirmitateque facilè perit, et si non copiose fructificet. Sed & si citò perit, facilè suo latere germinat. Et si meatuum rectitudinem habeat, difficilis tamen est actus, quod suæ siccitati, vel imbecillitati ascribendum est. Vitis eius odore læditur, quod ex germinatione liquet: quum enim germen propinquum lauro, retrorsum parte sua postrema flectitur, quasi odoris vehementiā fugiēs. Gelu non læditur, ut cæteræ, quamuis rara sit, quum resistat, perduretque sui caloris potentia. Plinius. Pingui succo scatet. Baccas fert. Non amittit folia. Primo Fauonio germinat. Floret post prunum vere. Suas vuas fert, maximeque sterilis, quæ non gignit aliud: ob id à quibusdam mas existimatur. Cortice tenui. Radices crassiores, & inæquales, recto meatu incedētes, superficie viuaciores. Senescit velociter, sed è radicibus repullulat. Addimus: flore flauescente, baccis maturis nigrescentibus.

Theophrastus. Latinus ager aquis totus abundat, & plana habent laurum: Calum. Circæum verò, quod vocant, excelsum quoddā promontorium tradunt frequentissimum arborum & lauro maiori ex parte scatens. In Propontide laurus in montibus, & multis locis habetur. Umbras adamant quibus fructus siccissimi, nucleosi que sunt, quæque suapte natura soluta, sicca, & breui stirpia sunt, ut laurus. Ex Plinio habetur lauro frigus inimicum. In Olympo copiosior nulla est. Circa Bosphorum Cimmeriū in Penticapeo vibe, omni modo laboravit Mithridates Rex, & cæteri incolæ, sacrorum certè causa, laurum habere,



& non cōtigit, quum teporis arbores abundant ibi. Notatū antiquis nullū genus lauri in Corsica fuisse, quod nunc satū & ibi proyenit. Subit & in mōtosa

Solum.  
Satis.

Locis siccis & humidis prouenit, vt in agro Latino, dixerat Theophrastus. Seritur laurus semine ex Theophrasto, sed interdum præstat, interdum degenerat magna ex parte, nec suum seruat colorem, adeo vt fructus è rubro niger eueniat, sicut in Antandro notatum est. Et hoc modo laurum orrā in platano dixit, quod tanquā ostentum interpretatur. Crebras deponere non plus nouenis pedibus distantes præcipit; sic enim suam infirmitatem tuentur: nam protectū desiderant, quo se à frigore æstūve possint defendere. Nullus enim radicum implexus, mutus decursus, rixatūve improbus infestat, quum breuem agant radicem. Plinius. Lauri bacca mense Ianuario Aquilonis afflatu siccante leguntur, expandunturq; rara, ne calefiant aceruo. Postea quidam fimo ad serendum paratas, vrina madefaciunt. Alij in quallo pedibus in profluente deculcāt, donec auferatur cutis, alioquin vligo infestat, nec patitur nasci. In sulco repastinato palmi altitudine vicenæ ferè aceruatim ponuntur mense Martio. Hoc modo etiā seritur baccalis augusta & tinus. Natura & plantaria demonstrauit, multarū radicibus pullulāte sobole densa, & patiente matre, quas enecet, eius quippe vmbra turba indigesta premitur, vt in lauris. Densiores seri iusserunt, in pedibus tamē nouenis, & si vmbra enormis, magnaque. Palladius Februario mense seminaria lauri facit, vel facta excolit. Didymus semine seri laurū dixit. Diophanes baccas suadet legi circa Calendas Decembres, seri post Idus Martias, viuiradices transferri mense Octobri, & deplantari. Boni genij plantam laurum Romani vocant, & cōmodam ad vitiū sepes. Nasci & laurum auullione affirmat Theophrastus, si quis sublaris surculis serat, sed quod auellitur, radicis, aut stipitis aliquid habeat oportet. Didymus auullione quoque plantari dixit. Virgilius etiam suadet, quòd ab imis maxime plantigera sit.

*Pullulat ab radice alius densissima sylua*

*Vt cerasis, vlmisq;, etiam Parnassia laurus.*

Surculo autem seri posse Theophrastus inficiatur. Extrema verò eiusdem sicca ex tenuitate, nec ad edurandum valida superextant, vnde pullulare ob eandem causam nequeunt, præterquam si quid rarò, contraque naturæ ritum eueniat. Ob id auullione non nisi difficilè nascitur. Causa quoq; eius siccitas, atq; raritas. Quod enim raro, laxoq; corpore cōstat, infirmius est, quàm vt humorem, caloremve seruare diutius possit: (et si contrà prius dixerat. Causa est cōtrarietatis, quod in sterili Græciæ solo omnia difficillimè proueniebāt: apud nos concipit, & pullulat.) Est quoq; historia Liuiæ Drusillæ, quæ postea Augusta matrimonij nomen accepit: quum pacta esset illa Cæsari, gallinam conspicui candoris sedenti aquila ex alto abiecit in gremium illæ sum. In tripideq; miranti accessit miraculum, quoniam teneret rostrq; laureum ramū onustum suis baccis. Conseruari alitem & sobolē iussere aruspices, ramumq; cum seri, ac rite custodiri. Quod factū est in villa Cæsarium, fluuio Tiberi impolita, iuxta

nonum



nonum lapidē Flaminia via, quæ ob id vocatur ad gallinas, mireq; sylua prouenit. Ex ea triumphans postea Cæsar, laurum in manu tenuit, coronamq; capite gessit, ac deinde Imperatores Cæsares cuncti. Traditusq; mos est ramos, quos tenuerunt, ferendi: & durant syluę nominibus suis discretæ, fortassis ideo mutatis triumphalibus. Durat & in vrbe nomen impositū loco, quādo Lauretum in Auētino vocatur, vbi sylua lauri fuit. Hæc Plinius. Ab occasu aquilę ad occasum sagittę feri iubet. Eędē & propagine feruntur. Triumphalis talea tantum.

Quintilij in se ipsam inferi tradūt, & in sorba, & in fraxinos. Laurus in malū *Infitia* inferitur ex Diophane. Recipiūt cerasa, & ingrata magnitudinis eas pducunt.

10 Pro ignariis ad ignem excitandum conceptaculum ex atragena. terebrum *Materies.* verò è lauro faciunt, non enim ex eodem quod agat, quodq; patiat, sed è diuersis accipiūt, & aliud efficiendi aliud patiendi vim obtinent. Ceterum vel ex eodē nonnunquā conficiunt, nec desunt, qui nil referre arbitrentur. Terebrū pertinacius esse debet, qua de causa laureū faciunt, id enim pro sua acrimonia valentiùs resistit, & quia valida est. A Theophrasto hæc Plinius. Calida sunt è quibus ignaria faciunt, exploratum hoc vsus in castris pastorumque reperit, quoniam ad excutiendum ignem non semper lapidis occasio est. Sed nil hedera præstantius, quæ teratur lauro, laurumque terat. Aratti temonem docet Hesiodus ex lauro fieri debere.

20 *Temonem ex ulmo viridi, seu confice lauro.*

Columella pedamenta pro vineis ex lauro facit. Plinius vestes laureos.

*De aliis lauri speciebus, tino, lauro Alexandrina, & hippoglossa. CAP. XXV.*

**D**IFFERENS Plinius de lauri generibus, meminit tini, inquiens. Postea accessere genera: tinum, hanc syluestrem laurum aliqui intelligunt, nonnulli sui generis arborem. Differt colore, est enim ei cærulea bacca. Augusta, baccalis, & tinus simili modo ferūt. Planta hæc vulgò *tricino* dicitur, est enim viridariis familiaris. Pumila est planta, foliis inodora, admodum florida, etiam hyeme, quo tēpore maximè expetitur opere topiario. Flos in umbella corymbacea, ex albo purpureus, semine vt terebinthi, gigartis vuarum ex argento incæruleum luridis. Hyeme seminibus scater, quibus maximè veltuntur turdi. Alliosa est, multisq; locis hospitari nescia, nisi radices testa, lapide circumposito, atq; obruto mūniantur: & ita lætè prouenit. Totus noster Surrentinus tractus eis abundat. Sunt qui Theophrasti *φύλον* putent, sed repugnant multa, quæ in hac absunt. Ego potius celastrum dicerem Theophrasti. Inquit enim. Celastrus è syluestribus perpetuo niter virore. Omnium tardissimè suos fructus perficit, & quoq; ob hyemem fructum amittere proditur. Summis gelidissimisq; prouenit locis. Ligno candido. Vfus ad baculos. Quæ omnia huic nostræ plantę congruunt. Viret perpetuò locis gelidissimis. Ex caudicibus mænobria sunt malleorum. Ignorum ad traiciendum per aëra lusorias pilas ligneas, ligno candido. Octobri suos maturat fructus.



Taxa.

Hippoglossus.

Accedit in opere topiario taxa, excrecente in medio folio paruulo, veluti lacinia folij, ex Plinio. Dioscorides hanc vocat *ἰππόγλωσσον* (vel melius vt Gale-  
nus *ὑπόγλωσσον*) frutex folia habens rusci, tenui figura, & spinosam comam in summo, ceu linguas è foliis exeuntes habens, cuius coronā comis impositam, capitis dolorem imminuere dicunt. Hodie *Bislingua* dicitur, quod interius fo-  
liis, veluti lingua promineat: ab alijs bonifacia, propter bonū, & multiplicem

Laurus A-lexandri-  
na.

in medicina vltum. Hæc laurus Alexandrina est Theophrasti, quippe ita eam describit. Illa propria esse circa Idam fertur, laurus Alexandrina cognomi-  
nata, &c. Lauri proprietas, quod fructum super folia gignat, quemadmodum myrtus sylvestris, quippe fructum ambæ super dorsum folij gerunt. Et alibi. 10  
Laurus Alexandrina folium super folium gerit. Dioscorides, & Plinius hippo-  
glosson nomināt. Alia est Dioscoridis, & Plinij Alexandrina laurus, & in Dio-  
scoridis errorem Plinius impegit, quippe Theophrastus solas ruscum, & Ale-  
xandrinam laurum fructus super folij dorsum ferre scripsit, quod etiam anim-  
aduertit doctissimus Fuchsius. Sed nimis ineptè a Matthiola carpitur, quum  
Fuchsius laurum Alexandrinam Theophrasti, non illam Dioscoridis scribat.  
Aliam lauri speciem, quam Dioscorides, & ab eo Plinius Alexandrinā vocant,  
ille sic describit. Laurus Alexandrina folio rusci maiore, molliore, candidio-  
reque, semine inter folia rubro, ciceris magnitudine, ramos spargit in terra  
dodrantes, interdum longiores, radice sylvestri simili, maiore, molliore, odo- 20  
rata, inuenitur in montosis. Plinius autem. Est & Alexandrina, quam alij hip-  
poglosson, alij Idæam, alij daphnitim, alij carpophyllon, alij bipelatam vocant:  
ramos spargit à radice dodrantes, topiarij accoronarij operis, folio acutiore,  
quàm myrti, molliore, ac candidiore, maiore semine inter folia rubro. Pluri-  
ma in Ida, & circa Heracleam Ponti, nec nisi in montosis.

## De Sabina. CAP. XXVI.

**S**ABINA etiam perpetua viret coma, ob id è syluis in viridaria translata, &  
topiaria facta.

Nomen.

Græcè *βέβαιος*, & *βάειος*. Latinè sabina, vel sauina. Plinius quia cupresso si-  
milis est, Creticam cupressum vocat. Itali *sabina*. 30

Genera.

Descriptio.

Altera sterilis, fructifera altera, quam bacciferam sabinam vocant.

Dioscorides. Prima cupressi folio similis, spinis horridior, grauiter olens,  
acris & feruens. Arbor coactæ breuitatis, quæ se magis in latitudinem fundit.  
Altera tamarici folio similis est. Plinius, Herba sabina duorum generum est,  
altera tamarici similis folio, altera cupresso. Apud nos crescit thamarisci foliis  
vulgò, sed rigidioribus & pungentioribus, tetrū odorem halantibus, baccarum  
expertibus. In Surrentino tractu apricis, ventosis, petrosisque locis nascitur,  
baccifera, baccas fert oxicedri, quæ maturantes subpurpuralcunt, resinosa o-  
dorataque. Planta, quàm superior minus fœter, foliis cupressi, minus aspera,  
pungentiorque. Frutex vtraque non herba, vt Plinius dicit. 40

Sabina



Sabina herba propagine feritur, & auulsione, quia semine caret. Tradunt fœ- Satid.  
ce vini, aut è parietibus latere rufo, mirè ali. Ex Plinio.

*Detamarice. CAP. XXVII.*

**I**N EST & myricæ inter syluestres perpetuū folium. In Lesbo Apollo my-  
rica ramos tenet, vnde Myriceus cognominatus, vt Archeus meminit. An-  
tiquissimam verò plantam tamaricem, quæ & myrice dicitur, esse, Metrodorus  
ait. At Nicander tamaricem speciosum fruticem; ideo *μάρτυρ*, id est vatem voca-  
ri scribit, quòd ab eo vaticinia exquirantur. Quamobrem Magi apud Medos &  
Scythæ ad sua vaticinia tamaricis virgis utebantur, quod genus diuinationis ab  
10 aliis quoq; gentibus obseruatum. Nam Herodotus sæpè in diuersis nationibus  
ramulis tamaricis vaticinia fieri testatur. Ægyptij verò sacerdotes in louis pōpa  
myrica coronari, authore Plinio. Cappadociæ Magi, quos Pyrethos vocant,  
comprecationes non sine myricæ virgis faciunt. Visus enim in myricæ ramis  
in somnis Apollo decorus. Plinius inter steriles numerat: ob id Macrobius in-  
ter infelices.

Græcis *μυρίκη*, myricem & Italia, quam alij tamaricē vocant. Achaia autem Nomen.  
bryam syluestre, tamaricem vocat Lenæus. Corinthus, & quæ circa est regio,  
bryam appellat, vt ex Plinio habetur, quod *βρυώδης* id est muscosus sit flos: et si  
falso textus bryoniā dicat. Palladi⁹ tamariscū vocat. Itali *tamarisco*, & *tamarigie*.

20 Dioscorides duo obseruauit genera, syluestre omnino sterile, fructiferum Genera.  
alterū in Ægypto. Plinius ab eo. Corinthus eius duo genera facit, syluestrem  
planè sterilem, alteram mitiorē, hæc in Ægypto Syriaq; etiā fert abundanter  
lignosum fructū, maiorem galla, asperū gustu, quo medici vtuntur vice gallæ.

Myricem Theophrastus inter syluestres frutices locat folio carnosio, & in- Descriptio.  
deciduo. Dioscorides fructum, quasi florem ferentem, compage muscosum.  
Ægyptus Syriaq; alterum gignunt mitiorem syluestri, cætera similē. Fructum  
parit gallæ proximum. Eadem Plinius, vt diximus. Infeliciaq; eius ligna vocat,  
quum & infelicia sint Græciæ. Infelix existimata, damnataq; religione, quæ  
neq; seratur vnquam, neq; fructum ferat. Folio carnosio. Fructum non fert, ne  
30 semen quidem. Apud nos sub arboris magnitudine subsidet, exilior, humilior-  
que. Flores fert tomentosos, pappososque, quasi sericeos floccos, qui vnà cum  
semine defluunt, ex albo punicantes. Floret initio Maij, exili odore flore.

Hæmus tamarice scater, ex Theophrasto. Dioscorides nasci prope paludes Calum.  
scripsit, Syria, & Ægypto. Idem ab eo Plinius. Apuleius humidis locis gaude-  
re ait. Apud nos riguis & marinis spontè frutescit.

Tamaricis lignum Theophrastus in insula Tylo nasci, non, vt apud nos, im- Materia.  
becillum affirmat, sed validum, veluti iligneum. Plinius scopis amerinis simi-  
lem dicit. Ad lienem præcipua est, adeoq; mirabilem eius antipathiam contra  
solū hoc viscerum faciunt, vt affirmēt, si ex ea alueis factis bibant sues, sine lie-  
40 ne inueniri: & ideo homini quoq; splenetico cibum, potumve dant in vasis ex



ca factis. Grauis author in Medicina, virgam ex ea defractam, vt neq; ferrum, neq; terram attingeret, sedare ventris dolores asseuerauit impositam, ita vt tunica cinctuq; corpori apprimeretur. Columella autē. Dum sues dulcedinem pabuli confectantur supra modum, astate splenis incremento laborant, cui succurritur, si fabricentur canales ex tamaricis trunco, repleanturq; aqua, & dein sitientibus admoveantur. Quippe ligni succus medicabilis epotus intestinum tumorem compescit. Apud nos ex huius caudice ad splenem detornantur pocula, & doliola concinnantur.

De fraxino. CAP. XXVIII.

**D**IXIMVS de syluestribus aterna coma virētib; nunc de iis, quibus coma decidit, & primum de fraxino. Finxit antiquitas hominū primum genus ē fraxino procreatū, quod Palefatus ad rem gestā reducens, Fraxinum hominē fuisse scribit, cuius liberi fraxini dicti sunt, & meliē fēminē à Melio viro. Eius folia iumentis mortifera, ceteris ruminantibus innocua Græci prodiderunt in Italia nec iumentis nocent. Sed hæc Plinius erranter fraxino tribuit, quæ Theophrastus de taxo prodiderat, vt diximus. Vocum affinitas *μαλία*, & *μίλος* taxus, Plinio fraudi fuit, nō *αμύλα*, vt Matthiolus dicit. Contra serpentes verò succo expresso ad potum, & imposita vlcerebus opifera, ac nil æquē reperitur. Tanta vis est, vt ne matutinas quidē, occidentalesve umbras, quāuis sint longissimæ, serpens arboris eius attingat, ideo ipsam procul fugiunt. experti prodimus. Si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius, quā in fraxinum fugere serpentem. Mira naturæ benignitas, priusquā hæc prodeant, florere fraxinū, nec ante conditas folia dimittere. Hæc Plinius. Sed nunquam tam insigne mendacium dictū fuit, vt nunquam alibi libentius serpētes stabulētur, quam sub fraxinis, vt in nostris syluis sæpissimē vidimus. Græci *μαλία*, & *μυλία* vocant, & *τείοξον*, hoc est trinodē cognominant, quod ramos prægrādes, ordinatos, & numero pares habeat. Latini fraxinū vocant, quod in fragosis locis libenter nascatur. Cuius semē lingua auis dicitur, quod auis linguas imiteretur. Itali *frassino*. Duo fraxini genera docet Theophrastus, quorū alterū excolsum procerūque, ligno candido, crassiuenio, neruato, molliori, enodi, crispioriq; bubula dicta in Macedonia. Alterū humilius, minus auetile, scabrius, durius, flauius, fraxinū dictum. Sed Theophrasti *βουμαλία*, Theodorus bubulā interpretatur. sed bumeliā dici puto grandē, quippe bu, intentionis nota est, quæ magnis rebus præponi solet, quasi magna fraxinus, vt Plutarchus in Sympsiacis docet, non bouem, sed magnitudinē intelligens. Rectius igitur Plinius. Græci duo eius genera fecere, longam, enodem, alteram breuem, duriorē, fuscioremq; laureis foliis. Bumeliā vocant in Macedonia, amplissimam, lentissimamque. Alij sic diuisere: campestem enim spissam, montanam crispam.

**Descriptio.** Sequitur Theophrastus. Folio lauri latifolia, acutiore, leniterq; per ambitū serrato, subsidenti, ramulū totum, ceu folio singulari credas cōstare, quoniam ab pediculo vno folia simul iuncta cōponunt, & per ampla versum interualla, tanquam



tanquam per genicula continentur, ordineq; pendent, perinde vt in sorbo, internodia latiora, candida, coniugationesq; plures, & folia longiuscula, & magis angusta, coloris herbacei, cortex læuis, spissus, & tenuis, rubro colore, radices crebræ, sublimes, & crassæ. Carere hanc fructu, & flore in Troadis Ida credunt falsò, etenim fructum fert minusculum, in siliquis nucis modo qualem amygdalæ, gustu subamarum. Fert & lauri modo fraxinus muscum, & alia quædam adstrictiora gustu, circinataque, vt pilulæ platani. Hæc partim circa fructum emergunt, partim multo semota, & sic quæ plecta, siue plicamenta, siue inuolucra dicuntur. Radix numerosa, densa, alta. Perfectè parit, & excoquit.

10 Auctu facilis. Semē reddit æstate. Plinius ita vertit. Procera hæc & teres. Pennata & ipsa folio. Prima germinat, nouissima nudatur. Messibus reddit semen.

Fraxinus læuis, cauis, & madentibus gaudet. Scabra sitientibus & saxosis. *Colum.* contrà cæterarū arborum mos in planis, tum fructu, tum materie præstat. In plana quoq; descendit. In Nilo fraxinus, & quæ bumelia fraxinus cognominatur, plurima est. Hæc Theophrastus. Sed Plinius a quosis montibus gaudere dixit. Descendit in plana. Apuleius humidis locis gaudere dixit. In frigidis, & calidis nos viuere vidimus, sed optimè in temperatis, solo etiam gypso, & calculoso, sed pingui, & humido melius: in montibus planis, & conuallibus. *Solum.*

Fraxinos, quia festinantius germinant, disponi quoq; maturius cōuenit, hoc *Satio.*

10 est ab Idibus Februariis, plantis & ipsas nascētes. Altius dimittatur, vt quæ summatellure gaudeant. Hæc & similia quaternos pedes dimitti oportet. Possunt & auulsi stolones viuere, quo in genere cum perna sua euelluntur, partemq; aliquā è matre auferunt secum. Ex Plinio. Quintilij verò mense Martio fraxinum plantari debere dicunt. Columella de fraxino. Post vlmū, vel populum fraxinus est, quæ ouibus, & capris gratissima est, nec inutilis bubus: locis asperis & montosis, quibus minus lætatur vlmus, rectè feritur. itaque cui arbustum nouum instituere cordi erit, seminarium fraxinorum pareretur earatione, vt vlmorum. Igitur qui arbustum cōstituere velit, ante annum scrobes faciat quatuor pedum quoquoersus, dein circa calendas Martias in eandem scrobē vlmum,

30 & fraxinum deponat, vt si vlmus defecerit, fraxinus locum obtineat, si vtraq; vixerit altera eximatur, & alio loco deponatur.

Theophrastus tradit fraxinum post vindemiam, & Arcturum cædi optimum. Materie humidissima, fabrisq; lectulorū utili. Malleis, & terebro nō improbanda. Tornatus ex ea nauibus rotundis: lentitiam enim firmitatemq; retinet fraxinus. Testudinē & auriculas ex eo fabricant, nam valida esse oportet. Plinius. Materie causa natura copiosissimā fraxinum genuit, quæ quidem est ad plurima utilis. Ea, quæ sit in Ida Troadis, tantū cedro similis, vt emētes fallat, cortice ablato (sed hæc ex Theophrasto excepit, quippe nō de fraxino, sed de taxo dixit, iterū nominis ambage falsus.) multū Homeri præconio, & Achillis

40 hasta nobilitata. obediētissima in opere, eadēq; hastis corylo melior, cornu lævior, sorbo lentior. Gallica verò etiā ad currus flexibilis: ad rotarū axes lentore



fraxinus utilis. Sic terebris vaginas ex fraxino utilissimas fieri proditum: ex eadem & malleos. Palladius, Fraxinus si siccetur rigescit, ante curuabilis: catenis utilis habetur. Vitruvius. Fraxinus maximos habet humores, minimumq; aëris & ignis, terreni mistione temperata. Est in operibus lenta quum fabricatur, & sub pondere propter humoris abundantiam non habet rigorem, sed celeriter pandat, simul autem vetustate arida facta, aut in agro perfecta, qui inest ei liquor stanti, emoritur, fitque durior, & in commissuris, & in coagmentationibus ab lentitudine firmas recipit catenationes. Cato trapetum ex fraxinea materie facit. Apud nos fiunt circuli doliorum ingentes, & fiunt optimæ ridicæ pro vitibus sustinendis. Ad militaria instrumenta præcipua est: sui firmitate, & rectitudine maximè hastis accommodata. Poëtæ testantur.

Statius.

— en infandos belli potura cruores

Fraxinus.

Ovidius.

— & fraxinus utilis hastæ.

Philostratus in Heroidibus Achillis hastam è fraxino fuisse autumat, scilicet longitudine, quæ nulli alij hastæ: cuius lignum adeo rectum erat, adeoque validum, ut minimè frangi posset. Fingunt Poëtæ Pelei, & Thetidis nuptias in Pelio monte Thessaliæ celebratas fuisse, ad quas dii deq; omnes inuitati, singuli Peleo dona tulerunt, Chiron floridam fraxinum, in eo monte defectam, ex qua hasta fabricata est; hanc Minerua expoliuit, Vulcanus absoluit, Peleus primò portauit, post filius Achilles: acies ex adamante, quæ omnia penetraret. Fuit postea in Mineruæ templo suspensa: ut Pausanias in Laconicis refert.

### De Orno. C A P. XXIX.

**S**UNT qui ornum & fraxinum idem putent, Alij verò diuersum genus, alij verò, ut Columella fraxinum urbanam, & ornum sylvestrem putant.

*Nomen.* a Latinis ornus dicitur, ut Virgilio, Columellæ, & Plinio, ceterisque. Itali orno.

*Descriptio.* Columella. Orni sylvestres fraxini sunt, paulo latioribus tantum foliis, quàm ceteræ fraxini. Arbor non tam procera, ut fraxinus, caudice tereti, læui cortice, ramulis utrinque pinnatis, folio fraxini paulo profundioribus crenis per ambitum serrato, bacculis racematim coactis, ab adolescentia rubescentibus, secundum maturitatem ex purpura nigricantibus, sapore ex acido in amarum degenerante, mespilaceo quasi concretu, multo graciliore habitu, reliquo tota effigie fraxinum æmulante.

*Colum.* Plinius. Montes amant, descendunt etiam in plana orni. Columella. Si arbusta in asperis & siticulosis locis obserenda sunt, neque vlmus, neq; populus tam idoneæ sunt, quàm orni. Virgilius.

Nascuntur steriles saxosis montibus orni.

Iuuenalis:



Quantas iaculetur Monychus ornos.

Recipit pyrum. Virgilius.

Insitio.

Ornusq; incanuit albo

Flore pyri.

Ad modum digitalis recipere vidimus pyrum, & malum.

Fiunt ex eis ridicæ ad vites: eis enim indissolubili cōnubio copulatur, & ar-  
bustiūam suo fulcit adminiculo. Si pro hastis conficiendis seruatur, spissius  
plantentur. Rami ex inferiori parte frangantur, abradantur circumcirca, ne  
nodos efficiant, nam ibi rumpuntur.

Materia.

De tilia. CAP. XXX.

SEQUITVR tilia, philyra Græcis dicta. Saturnum Philyram Oceani fili-  
am adamasse Seruius scribit, quam nonnulli in florem commutatam aiūt,  
alii in arborem, cuius liber philyrinus vocetur, ex quo coronæ colligātur. Pal-  
ladius apes ex syluestri tilia mel colligere scripsit.

Hæc locis publicis plantatur, vbi rustici vicissim coeunt, vel ante sacras æ-  
des, propter eius amplitudinem, foliorum laram vmbra, iucundam opaci-  
tatem, & iucundam odoris florum gratiam. Ad chartarum & membranarum  
vsum philyræ cortex, quæ tilia dicitur, vt plurimum selectus. Martianus Ca-  
pella. Rarò verò libri philyræ cortice subnotati. E philyra fieri libros tenuis-  
simos, atq; in vtramq; partem replicabiles, in Commodio Herodianus author  
est, & Vlpianus iureconsultus librorū appellatione contineri ait, siue in phi-  
lyra, siue in tilia conscribantur, vt propterea philyræ vocatæ sint omnium  
arborum tuniculæ ad scribendum aptæ. Nomina coniuratorum in tabulis ti-  
liaceis, eisdemq; duplicibus conscribi solita, Ioannes Xiphilinus author.

Græcis φιλύρα, siue φιλύρα, Latinis tilia. Italis reglia. Plinius vocum simili-  
tudine deceptus tribuit vires τῆς φιλύρας, Dioscoridis tileæ. Theodorus quoq;  
hallucinatur vertendo Theophrasto: nam tilia tribuit, quæ Theophrastus  
φιλύρα.

Nomen.

Duo habentur tilia genera à Theophrasto descripta, mas, & fœmina, quæ  
distant tum materie, tum totius corporis forma. Et ab eo Plinius. In tilia mas,  
& fœmina, differunt omni modo.

Genus.

Mari materies senticosa, dura, nodosa, rufior, cortex crassior, ac detractus,  
statim inflexibilis, sine semine, sine flore. Fœminæ materies candida, cortex  
candidior, flexibilior, ex quo cunæ fiunt, eo odoratior, florifera, fructiferaq;  
est. Flos calyculaceus, pediculo quisq; suo annexus, viridis quandiu calyculo  
includitur, dehiscens verò flauescit, florer pariter cum vitibus, & urbanis.  
Fructus oblongus, ad fabæ magnitudinem, rotundus, similis acino hederæ:  
maiusculus, angulis quinis, ceu neruis quibusdam in acutum depressis extube-  
rat: partitionem hanc exilior indigestam, & omnino confusioem habet: ma-  
ior si scabitur semina emittit pusilla, & prætenuia. Folium hederæ, nisi quod

Descriptio.



in acutiorem angulum se rotundat; incuruum, qua pediculo innectitur, & medio sui prodit in acutum, crispum per orbem, ac molliter ferratum. Peculiare obtinet, foliis dulcibus, esculentis pecori, sed fructu animalibus omnibus ingustabili. Paulò ante æquinoctium germinat. Perdifolia est, (etsi Theodorus in sua interpretatione, vocis ambiguitate deceptus perperam scripserit: æterna pubescere fronde) Amentifera est, æstiuo solstitio partes obuertit foliorum supernas, facileque in ea conspiciere est, quum ampliora, candidiora; folia gerat; ergo, folia circumaguntur æstiuo solstitio, quum illo potissimum tempore folia decidant. Quum igitur foliorum agatur profluvium, aliquantisper affici necesse est, & quæ infirma, & quasi confecta sunt, exarescunt, ac decidunt, reliqua circumaguntur tantummodo. Omnibus id euenit, magis vel minus, conspectius in tilia & olea & ulmo est, quia summo coloris discrimine pars prona discrepat à supina. Cortice in orbem detractò tardius interit tilia, quippe ei detrahatur, ex quo funes, sed non vitalis, neq; princeps, sed summus, qui plerumq; subnascente alio decedit. A Theophrasto Plinius. Mari odorator cortex quàm fœminæ, ut Theophrastus tribuit. Inter corticē, & lignum tenues tunicæ sunt multiplices membrana, è quibus vincula tiliæ vocantur: tenuissima earum philyræ, coronarum lemniscis celebres, antiquorumq; honore. Proceritate perquam modica. Paulò ante æquinoctium germinat. Cortex tenuis, multiplex tunicis. Cortice in orbem detractò non of-

**Calum.** Tiliam in locis feruidis prouenire posse difficillimè putat Theophrastus. ratio ex calore petitur, quia ignis igni additur sine moderatione, Plinius montes & valles, & aquosos montes diligere dixit.

**Insitio.** Plinius omne pomorum adulterium gestire putat. Diuersis modis vidit arborem insitam iuxta Tiburtes tiliam, omni genere pomorum onustam: alio ramo nucibus, alio baccis, aliunde vite, ficis, pyris, punicis, malorumq; generibus, sed huic brevis vita fuit.

**Materies.** Tiliæ materies medullam exiguā continet, nec multo reliquo molliorem corpore. Cæditur autumnò. Ad nauium longarum tabulata, ad arcas mensurarumq; structurā utilis est, habetq; corticem funibus percommodum. Est enim materies eius tota mollis, ut inter carnosas mollissima, calidissimaq; dicatur, quoniam aciem ferri maximè hebetat, tincturam eius vi sui caloris resolvens. Materies mollis, & omnium præcipuè. Terebrum etiam è tilia fieri solet. Obedientissima inter cæteras præcipuè est, & in totum præfacilis operibus præ sua mollitie. A Theophrasto Plinius. Eius materies leuissima, scutis faciendis aptissima, quorū plaga contrahit se protinus, clauditq; suū vulnus, &



ob id contumacius transmittit ferrū. Cortex in magno vsu agrestiu, vasa, cor-  
besq; , ac patentiora quædam messibus conuclendis, vindemiisq; , faciūt, atq;  
prætecta tuguriorum. Teredinem non sentit. Mollissima tilia, eadem videtur  
& calidissima. argumentum afferunt, quod citissimè ascias retundat. Palla-  
dius. Tilia in sculpturis necessaria. Ouidius eius mollis materiæ meminit,

*Nec tilia molles.*

Cinesias Poëta Græcus flagitiosissimus olim fuit, in quem Lisiæ oratoris ce-  
lebratissimi conuiciorum & stomachi plena legitur oratio: tam enim gracilis  
ille fuisse perhibetur, vt tiliaceis asseribus corpori circūdatis imbecillitatē suā  
10 fulciret. Quare Aristophanes illum philyreum vocitabat. Tiliaceis etiam ta-  
bulis fasciatur Antoninus Pius, authore Capitolino, quum longus esset, &  
incuruaretur. Columella arculastiliaceas laudauit. Virgilius læues dixit.

*Nec tilia lænes, nec torno rasile buxum.*

*De Acere. CAP. XXXI.*

**N** V N C de acere dicemus. Plinius. Acer eiusdem amplitudinis, ferè tiliæ,  
operum elegancia & subtilitate cedro secunda.

Græcis præcipuè Theophrasto σπένδαμνος, aliud genus κλινόρροχον. Latinis acer, Nomen.  
vel aceris, vt Solinus, sic quibusdam dicta, quòd acria artificū ingenia propter  
eius præstantiam exerceat. Vel acer, ab acutie foliorum. Italis *acero*.

20 Aceris alii bina alii terna statuūt genera, inquit Theophrastus. Primū, quod Genus.  
cōmuni generis nomine acer vocatur. Secundum carpinum, tertiū κλινόρροχον,  
videlicet vt Stagiritæ distinguere solent. Plinius ab eo. Album præcipui cado-  
ris vocatur Gallicū in Traspadana Italia, trans alpes nascēs. Alter ū genus crispo  
maculatum discursu, quæ quū excellentior fuit, à similitudine caudæ pauonū,  
nomen accepit. In Istria, Rhetiaq; , præcipuū. E viliori genere crassiueniū voca-  
tur. Græci situ discernūt. Campestre γλαινον vocāt, candidum esse, nec crispum,  
montanū verò crispus, duriusq; , etiamnum è mascula crispus ad lautiora o-  
pera. Tertium genus zygiā, rubentem, fissili ligno, cortice liuido, & scabro.  
Hoc alii genus propriè esse malunt, & Latine carpinum appellant.

30 Theophrastus ita describit. Materies ei candida, atque neruata, ampla. plā- Descriptio.  
tano in findendo similis, venis longioribus fluctuans, sed gracilis, macilen-  
ta, mollis. Omnia eius fissi in acutum compressa abscinduntur, nec ita se-  
mifissa, sed summum potius præfissa, multinerua minus sunt, quàm pro  
sua magnitudine esse debeant. Cortice paulò scabriore, quàm tilia vesti-  
tur, subliuido, crasso, spissiori que picea, inflecti que contumaci. Radicibus  
paucis, sublimibus, crispisq; , magna ex parte. Riguis potissimè nascitur, vt Idæi  
volunt, inuentu que rara est. De flore nasci aiunt fructum, non valdè oblon-  
gum, paliuro similem, verū oblongiorem assignant. At verò Olympi inco-  
le carpinum montanam esse volunt: Acerem in planis nasci, candidam, rari-  
40 rem corpore, minus crispā, quam nonnulli Gallicā vocāt, non acerem, in arisq;  
materiem crispiorē esse, atq; contortā, & in planis potius nasci, germinareq;



maturius. In monte nascentem flauam, gratè coloratam, crispam & solidam esse, qua ad opera lautiora vtuntur. Semen reddit æstate. Macedonia incolæ quidem nec illas florere arbitrantur. Facile capeffit incrementum. Summa solifacie gaudens. Ab eo Plinius. Germinat paulò ante æquinoctium. Mares prius florent. Flos coloris herbacei, messibus reddit semen.

*Solum.*

Riguis potissimum nasci tradidit Theophrastus. Plinius aquosis montibus gaudere dixit.

*Materies.*

Ceditur post vindemiam, & Arcturum. Spissa & crispa materies. Hæc pauca Theophrastus. Sed Plinius, Acer operum elegantia, & subtilitate cedro secunda. Pulcherrimum verò est bruscum, multoq; excellentius etiam molluscum, tuber vtrumq; arboris eius: sed bruscum intortius crispum, molluscum simplicius sparsum. & si magnitudinem mensarum caperet, haud dubiè præferretur cedro. Nunc intra pugillares, lectorumq; silicios, aut laminas raro visu spectatur. E brusco fiunt & mensæ nigrescentes. Eriamnum in siccis natæ præferuntur aquaticis. In laminas secatur, quarum operimento vestiatur alia materies. Dat & suber sectile. Mediaq; pars arborum crispior, & quo propior radici, minoribus, magisq; flexilibus maculis. Hæc prima origo, luxurie arboris alia integri, & viliores ligno preciosiores cortice fieri, vt vna arbor sæpius veniret. Excogitatæ sunt & ligni bractæ, nec satis. Sic lectis prætia quæruntur, sic acer decipit. Ex acere eximia mēsa fiūt, quæ ob id acernæ dictæ sunt. Horatius. 19

*Hic ubi sublatis puer altè cinctus acernam*

*Gausape purpureo mensam perterfit.*

Fiebat & olim ex acere sceptrum Iouis, vt testatur Laertius in Pythagoræ vita. Ouidius imparem coloribus vocat.

*— Acerq; coloribus impar.*

### *De carpino. CAP. XXXII.*

**M**ONTANVM acerem Theophrastus carpinum esse inquit, ex aliorum traditione: campestem verò acerem Gallicam vocari, & esse alios, qui carpinum diuersum genus aceris dicant. Nos de eo separatim tractabimus. vel tertium aceris genus, vel carpini genus. Equidem admiramur horum doctorum tam crassam vel supinam distinctionem; nam ita carpinus ab acere distat, vt homo à Leone, quum carpinus vltimum simulet, acer platanum. 30

*Nomen.*

Græcis *ζυζία* est, quòd ex ea materie, vt Vitruuius inquit, iuga in mentis comparentur, quæ apud eos *ζυζία* dicuntur. Latini ex Columellæ, & Plinii auctoritate, carpinum dicunt. Itali *carpino*.

*Descriptio.*

Carpino, ex Theophrasti descriptione, materies flaua, crispâq; ampla, platano in findendo similis, sed gracilior, & macilentior, longior, atque mollior. Radices paucas sublimes, crispasve ferè magna ex parte habet. Auctu facilissima. Ex Plinii verò, materie rubenti ligno, fissili, cortice liuido, & scabro. Apud nos vltimi effigie surgit, vt ei congener videatur, follicosa sobole seminis, simili 40  
les



les fauagines in caudatis lupulorū floribus videre est. Caudice procero, cortice subalbicante, modice scabro. Ramos fundit copiosos, robustos, in latitudinem sese diffundentes, foliosos, vmbralesq;: ex iis per æstatem petioli quidam pendent, in quibus triquetra quædam folia subpallida & crassa, folliculari specie circumquaque racematim dependent, quorum medius apex cæteros lōgitudine superat, & inter hos pauca quædam capitula exeunt ciceris magnitudine, in quibus semen concluditur. Radicibus nititur firmis, crassisq;.

Olympi montis incolæ carpinum montanum potius esse volunt, dixitque *Colum.* prius Theophrastus montes amare, & in plana descendere, ex Plinio.

10 Theophrastus post vindemiam, & Arcturum cædi dixit. Carpinus spissa, *Materis.* & crispa, durissimaq; est, hanc itaque prius quàm terebrum experiatur macerant, quò facilius mollescens perforari queat. Lectis, sumptuosioribus fabricis, iugisq; iumentorum apta. Plinius, Facibus nuptiarum familiarissima. Higinius manubria rusticis carpineæ optima dicit. Vitruuius. Est minima ignis, & terreni mistione, aëris autem & humoris summa continetur temperatura, non est fragilis, sed habet vtilissimam tractabilitatem. Palladius vtilissimam materiem habere dixit.

### De Oppulo. CAP. XXXIII.

10 **S** VNT qui montanam oppulum Theophrasti acerem dicant. Dicemus de oppulo, quæ arbusculo Gallico faciendo multum laudatur à Columella, quod vocant rumpotinum, quum maximè vitem alere videatur. At quia rarā neq; idoneam frondem pecori præbet, à plerisq; repudiata est.

Oppulus à Varrone, & Columella dicitur. Ab Italis *oppio.*

*Nomen.*

Columella oppulum similem orno arborem dicit, humilem, & non frondosam. Infra vlni proceritatem subsidet. Caudice recto, enodi, rarioribus ramis brachiato, frondibus ferè virigineis, sed raris & angustioribus, baccis racematim dependentibus, prima pubertate viridibus, à maturitate puniceis. Semina vt alæ locustæ.

*Descriptio.*

Aspera, & siticulosa horret, ex Columella. Nos in frigidissimis vidimus.

*Colum.*

10 Qui arbusculum constituere velit, annum ante, quam deponat arbores, scrobes faciat quatuor pedum quoquouerfus. Dein circa Calendas Martias, in eandem scrobem, vlinum, & oppulum, vel fraxinum deponat, vt si vlinus defecerit, oppulus, vel fraxinus locum obtineant, si autem vtraque vixerit, altera eximatur, & alio loco deponatur. Arbusculum inter quadragenos pedes disponas, vt & arbores & vites conualescant, & segetes vmbra minus laborent. Depositam arborem sæpius circumfodito, nec citra triennium ferro tetigeris. Completis sex & triginta mensibus, ad recipiendam vitem formabis, & superuacuos ramos amputabis, alterna brachia in modum scalarum relinquens, alternisq; annis. Sexto anno si iam firma videbitur, mar-  
40 tabis hoc modo. Ab ipso arboris crure pedale spatium intermittito, deinde

*Satio.*



fulcum in quatuor pedes longum, in tres altum, in dupondium & semissem latum, cum feceris, patiēre minimē duobus mensibus eum tempestatibus verberari: tum demum circa Calend. Martias vitem de seminario, ne minorem quidem decem pedum sternito, & adminiculato, & reliqua, ut dicemus suo loco.

*Matris.*

Lignum album aceri simile. Fiunt ex ea patinæ incisoriæ mensarum, & olarum coclearia.

*De Platano. CAP. XXXIIII.*

**A**D aquaticas sylvestres arbores descendemus. De platani præconio multa apud Plinium. Sed quis non miretur iure arborem umbræ gratia tantum ex alieno petitam orbe? Platanus hæc est, per mare Ionicum in Diomedis insulam eiusdem tumuli gratia primum inuecta, inde in Siciliam transgressa, atque inter primas donata Italiæ, & iam ad Morinos usque peruecta, ad tributarium etiam pertinens solum, ut gentes vectigal & pro umbrâ pendant. Dionysius prior Siciliæ tyrannus Rhegium in urbem transtulit eas, domus suæ miraculum, ubi postea factum gymnasium: nec potuisse in amplitudinem adolescere, & alias fuisse in Italia, ac nominatim Hispania, apud authores inuenitur. Hoc actum circa capræ urbis ætatem, tantumque postea honoris increuit, ut mero infuso nutritur. Comperit id maximè prodesse radicibus, docuimusque etiam arbores vina potare. Commendatio arboris eius non alia maior est, quam solem æstate arcere, hyeme admittere. Inde in Italiam quoque ac suburbana sua Claudio Principe Marcelli Eseruini libertus, sed qui se potentia causa Ca faris libertis adoptasset, spado Thessalicus prædiues, ut meritò dici posset is quoque Dionysius, transtulit id genus. Durantque etiam in Italia portenta terrarum, præter illa scilicet, quæ ipsa excogitavit Italia. Sub eius umbrâ delectatum Xerxem Herodotus scribit diem integrum cum exercitu consumplisse, atque ut capti amore solent, donasse muneribus, & quod ridiculo proximum est, tanquam pellici Melendonium quendam custodem reliquisse. Extat Themistoclis Athenarum Principis de platano præclara, quæ circumfertur sententia: nam postquam amplissimè patriam suam promeritus esset, quum sapius à ciuibus conuicio incesseretur, dixisse, Quid negotium facillitis iis, qui nobis fuere benefici? seque consimilem platano dicebat, ad quam decurrunt, quos imber insectatur, mox serenitate reddita, velletur ab eisdem. Ælianus de animalium naturis scribit noctuas miras quasdam & ingente solertia à ciconiis submoueri à nido longius, platani foliis ingestis, quorum contactu stuporem contrahunt noctuæ, ita ut oblationis quidpiam inferre deinceps nequeant. Scribunt & hoc genus animalis à stabulis abigi, si in eis folia appendantur. Vespertilionis tactu ciconiarum oua sterilia redduntur, verum ad illatum maleficium hoc natura facere remedium



edocuerunt: platani folia suis niſis ingerunt, vt aduolantes veſperſiliones natura torpore comprehenſa perniciem afferre nequeant. Iucunda eius vmbra, quamvis craſſa. Licet gramine credere non ſoli, haud alia latius operiente toros. Ex Plinio. Genialis dicta, vt pote ad delicias nata. Vnde Genius eius foliis coronatur. Socrates non aliam ob cauſam à Mileſiis reprehendus, quàm quòd per platanum iuraret, ex Maximo Tiro. Tradit Plinius Laodiceæ Xerxis aduentu, platanum in oleam mutatam, & eiſmodi oſtentis Ariſtandri apud Græcos volumen ſcatere. Peloponneſum platani folii figura eſſe Geographi prodiderunt, propter eius reſceſſus, & prominentias.

10 Græcis *πάτανος*, & *πλατύνισ*, dicitur, à *πᾶτος*, quod latum eſt. Vnde qui- Nomen.  
dam Platoni diuino Philoſopho nomen inditum fuiſſe ſcribunt, quòd is latis humeris præditus eſſet. Platanitoſ etiam Græci ſpatioſa loca vocant, longè lateq; parentia, à platani foliorum amplitudine. Hactamen voce pro platano uſus eſt Homerus. Hippocrates ſaxum mari extans platamonem vocat. Vnde locus in ſuburbio Neapolitano vulgò platamone vocatur. Ingens ſaxum mari præceps. Latini platanus. Itali *piatano*.

Theophraſtus ita deſcribit. Folio amplo, pediculo longo, propendenti, Deſcriptio.  
tremulo, & deciduo. Sed in Creta inſula ad Cortyniam platanum fuiſſe fertur apud fontem quendam, quæ folia hyeme non amitteret, ſub qua à Ioue  
20 compreſſam Europam indigenæ fabulantur. Semen manifeſtum producit. Radice prælonga, & ſi ſedem naſta ſit expeditam, ſubire quantumvis, & euagari poteſt, modò ne aliquid obſtet, & aquæ ſupperant, qualis in Lycia Athenæ fuiſſe traditur, quæ iuxta aquæductū nouella adhuc in dodrantes ferè centum progreſſa eſt. Auſtu facilis, vt aquatica omnes. Cortex diſrumpitur. Vitæ longitudo à fabularum authoribus tradita patet. Sunt qui Delphicam platanum, & alteram in Caphyis Arcadiæ ſtantem, ſaras Agamemnonis manu dicant. Dioſcorides, & Nicander meminere pilulatum platani ſcabrarum, lanuginofarumque. Varro à Theophraſto, Platani radices latius fundunt, vſq; eò vt Theophraſtus ſcribat Athenis in Lyceo, quum etiamnum  
30 platanus nouella eſſet, radices trium, & triginta cubitorum egiſſe. Itemque Cretæ ad Cortyniam dicitur platanus eſſe, quæ folia hyeme non amittat. Itemque in Cyprio, vt Theophraſtus ait, vna. Plinius. Cortice rimofa. E radice ſoboleſcit. Eſt amplitudo, & magnitudo ingens. Memoratur quæ in ambulatione Academia Athenis fuerat cubitorum xxxvi: & quæ in Lycia gelidi fontis ſocia amœnitate, itineri appoſita, domicilii modo caua, lxxx atque vnus pedum ſpecu, numeroſo vertice, & ſe vaſtis protegens ramis arborum inſtat, agros longis obtinens vmbriſ, ac ne quid deſit ſpeluncæ imaginis ſaxea intus crepidinis corona muſcoſos complexa pumices, tam digna miraculo, vt Licinius Mutianus ter coſ. & nuper prouinciæ eius legatus pro-  
40 dendum etiā poſteris putarit, epulatum intra eam ſe cum duodeuiceſimo comite, largè ipſa toros præbente ſponde, ab omni aſſlatu ſecurū, optantē im-



brium per folia crepitus, latiore, quàm marmorum nitore, picturæ varietate, laquearium auro, cubuisse in eadem. Aliud exemplum Caii Principis, in Veliterno rure mirati vnius tabulata, laxisque ramorum trabibus scamnapatula, & in ea epulati, quum ipse pars esset vmbrae xv conuiuarum, ac ministerii capace triclinio, quam cœnant appellauit ille nidum. Vinax admodum est. longitudo vitæ fama à fabularum authoribus tradita testimonio pater. Delphicam platanum, & alteram in Caphis Arcadiæ stantem Theophrasti adhuc ætate satas Agamemnonis manu prædicant. Cito germinat. Maxima ei radix à cedro est. Hæc Plinius. Iuxta Amymonæ fontem, & prope Lernam paludem, alia enata, Græcorum fabulis etiam memorabilis, quòd 10 sub ea hydram serpentem educatam ferant, authore Pausania. Sed verè cortice crasso est platanus, & subalbicante, folio amplissimo, ticini modo diuiso, rubro pediculo, pilulis scabris, lanuginosisque, flosculo pallido, minuto. Fructus Dioscoridi *σπαειον*, Plinio pilula dicitur. De arboris altitudine Horatius in odis:

*Cur non sub alta vel platano?*

Et Ouidius:

*Nobilior pomis, platano conspectior alta.*

**Genera.**

Plinius dum platani meminit, ait: Sunt & chamæplatani coactæ breuitatis, quoniam etiam arborum abortus inuenimus. Hoc quoque ergo in 20 genere pumilionum infelicitas dicta erit. Fit autem, & serendi genere, & recidendi. Primus Cn. Marius ex equestri ordine, Diui Augusti amicus, inuenit nemora consilia intra hos l x x x annos. Platanus nullo sexu distinguitur, sed quasi vidua degens, vt omnis vel mas, vel fœmina dici possit: nil enim de earum sexu constat. Vnde ab authoribus vidua vocatur. Martialis,

*Viduaq; platano.*

**Locus.**

Platanum Theophrastus palustrem, & aquarum præzuidam dicit. In Nilo prouenire, at in Adria negant, præterquã circa Diomedis delubrum, inq; vniuersa Italia esse raram affirmant, quamquam multi, magnique fluiui vtro- 30 biq; diluunt, sed locus sanè recusare videtur. Dionysius tyrannus maior ambitiosius contendens in Rhegio conseuit in hortis eas, quæ nunc in gymnasio stant, nec vllam magnitudinem capere possunt. Contrà alia loca platanum habent plurimam. Aquas amare Ouidius ostendit.

*Quàm platanus riuo gaudet, quàm populus vnda,  
Et quàm limosa canna palustris humo.*

In sacris literis, Quasi platanus exaltata sum iuxta aquas.  
Nobis in Sarni fluuiio videre contigit, & Romæ locis aquosis.

**Satio.**

Platanum feri semine demonstrat Theophrastus: nam & manifestum producit, eoque gignitur, quod tum aliis, tum illo præcipuè indicio constat, etenim in tripode anco platanus aliquando prouenisse narratur. Quod ex 40 aliquo



aliquo latitante primordio exoriri putandum est, putredine, vel aliqua mutatione facta, si semen delapsum excipiat in arbore, comprehendaturq; putredine aliqua subiacente tenera. Sic aliud in alio nasci, & adolescere potest. In platano laurus aliquando orta, quod tanquã ostentũ interpretantur. Quum enim in partem arboris conuersam penè in terram putredine semẽ deciderit, pullulat, viuitque, subinde alimentum ex subiecta capiens arbore. Nascitur etiam auulsione, quam etiam si quis prãgrandem, eamque cum arbore se exquantem transtulit, perdurare optimè potest. Didymus semine, & auulsione nasci tradidit. Plinius, Ex ea primum latæ in Creta (vt est natura hominum nouitatis auida) regenerauere vitium. Apud nos taleis feritur, & optimè comprehendit, & in amplam magnitudinem auctam vidimus. Mero radicibus affuso maximè ali tradidit Plinius, compertumq; prodesse, docuimusq; etiam arbores vina potare.

Capacissima omnium insitione platanus, authore Plinio, verum saporẽ *insitio.* corrumpit. Virgilius malos recipere dixit.

*Et steriles platani malos gessere valentes.*

Palladius cerasos recipere.

*Umbrantes platanos, & iniquam robore prunum*

*Compellit gemmis pingere membra suis.*

20 Diophanes recipere ficum & malum, à qua rubicunda eueniunt mala. Africanus rhodacenum recipere, à qua etiam rubicunda rhodacena fieri.

Platani materies lentore non caret, sed maximè humida est. Indicium, quod *Materies.* post casuram, erecta materies multum humoris emitit. Tornatus nauibus rotundis etiam ex platano, lentitiam enim firmitatemq; adesse oportet; sed deterimus, celeriter enim putrescit. Dum comburitur fumosa est, quia humida. Vna hæc securim tolerat, & subuersa flatu ab radicibus reponi solet, viuitque, quod in Antandro euenit. Quum enim platanus procidisset, ramis amputatis, truncoque securi luxato, surrexit noctu, leuata onere, atque reuixit, & cortex iterum circumtexit: erat duobus lateribus circumdolata, longitudi-  
30 ne decem cubitis maiori, crassitudine, vt quatuor viri non facile amplecterentur. Causam hanc esse putarunt, quod arbor prostrata parte altera, plurimum terræ euulserit, mox status noctu ingens aduersusq; secutus, eam promouerit, ramisq; occurrens, seque insinuans, erexerit. Non solum plagã tolerat, sed etiam lignis detractis caudici indomita manet, probeque germinat, quum humida sit, quod & facit pars magna earum arborum, quæ iuxta aquas assurgunt. Plinius quæ à Theophrasto accepit habet. Antandro etiam platanus circumdolatis lateribus, restibilis sponte, tacta, vitæque reddita, longitudine x v cubitorum, crassitudine quatuor vlnarum. Est lentitia platano, sed madida, sicut alno. Inopia cogit aliquando luminum causa oleum fieri è platani baccis, aqua  
40 & sale maceratis.



## De populo. CAP. XXXV.

**P**OPULVS arbustis notissima, necessariaque. Inter infelices, damnatasque; religione recensetur à Plinio, quod neque feratur unquam, neque fructum ferat. Apud aliquos feralis habita; nam Rhodij ludos funebres in honorem Tlepolemi à pueris impuberibus populo coronatis celebrari faciunt. Per eam quoque antiquitus tempus indicabatur, tum quod bicoloribus foliis prædita sit, præsertim alba, nam ex vna parte niuei, vel cerussati est, ex altera, porracei viridissimi coloris, ex quibus præcipuas temporis partes, quippe diem, ac noctem referre videtur, tum quod hoc quoque habet commune cum tempore, quod eius folia post solstitium circumaguntur, nec alio argumento certius intelligitur sydus confectum. Ideoque Probus Herculi dicatam dicit, quod Phisici tempus per Herculem interpretantur. Virgilius. *Populus Alcida gratissima.*

Idem in iuuentute fronde populnea velatam dicit ἥβη, id est Heben Herculis vxorem, siue iuuentutem. Salij ad Herculis aram sacra facientes populnea fronde coronabantur.

— *Herculea bicolor quum populus umbra  
Velantq; comas, foliisq; innexa pependit:  
Tum Salij ad cantus incensa altaria circum  
Populeis adsunt cunctis tempora ramis.*

Alij ad fabulas referunt. Pausanias albam populum acheroidem vocat, (contra Aristoteles nigrā) quod is nempe Hercules primū Acheronte Thesprotidos amne genitam ad Græcos transtulerit. Homerus verò acheroidam appellauit, propter Acherontem inferorum fluuium. Quum enim apud inferos Hercules descenderet, & labore defatigaretur, corona ex hac arbore contexta caput propter sudorem velasse dicitur. Vnde foliorum pars altera, quæ temporibus adheerebat, sudore abluta exalbuit, pars verò exterior, propter fuliginem tetri fumi obscura facta est, qui colores in ea permanserint, ut bicolor postea fuerit. Alij volunt eum ab inferis redeuntem primū arborem istam cōtemplatum, atque se inde coronasse, conueniente plantæ colore ab eo huius euentui, quum è tenebris in lucem commearet. Inde quū ex inferis euassisset, & eos surculos in Acherontis ripam scuisset, seminum id latē propagatum.

## Nomen.

Alba populus Græcis λεύκη dicitur, nigra Homero αἴχμπος, & αἴχμων, sic enim Aristoteli dicta, ob dictā causam. Libyca Theo, hrasto, & κερκίς. Latinis populus. Neapolitani albam *allano* vocant iuxta Capuam, nigram verò *proppo*.

## Descriptio.

Theophrastus ita depingit. Arbor altissima, ingentiq; magnitudine exurgit. Caudice procero, erectoq;. Cortex constat carne, & nervo. Foliorum figura mutatur, nam in iuuenta sunt circinata rotunditatis, in senecta angulosa. Habetque cum paucis hanc proprietatem, quod eius folium circumagatur æstiuo solstitio, hoc est supinas foliorum partes conuertat, eoque argumento rustici solstitium confectum intelligunt. Auctu quā facilis, maturè germinat, & ante æquinoctium. Vtrum ferat fructum varia sententia est. Arcades sterilem



sterilem putant. Ex radicibus facile germinant alba, nigraque populus: nam vinaces, & steriles sunt, quod nulli ex reliquis datum est.

Theophrastus tria genera recenset. Populus alba corpore erecto, excelsior, Genera. læuiorq; nigra, figura foliorum simili. Lignum, quum ca dicitur, albedini simile est. Florem habere nō existimant. Et libro de causis: fronde latiore, cortice læuiore, atq; omnino succo latiore, quā nigra est, sed eadem in senecta ob alimenti inopiā haud procul est à ratione, vt & frondem angustiorē, & corticem scabriorem habeat, & quicquid euenire iis solet, quæ nō æquē alimento abundant. Omnino fortasse mirū non est, quod in hac euenit, quum in proximum, 10 atq; simile quodāmodo transeat. Nam & in animalibus mutationes eiusmodi plerasq; videmus, alias in generatione, vt quum in cæteris, tum in iis, quos papiliones vocamus. Et oleagnum describens dicit esse flore populi albæ, verum minori. Hæc vetustate in nigram degenerat, tum fronde, tum tota specie: rotius arboris mutatio spontē exoriri videtur. Nigra cum alba vniformis, corpore erecto, sed humiliori, scabrioreque. Albæ figura foliorum similis, sed angustiorum scabriorumque. Cortice in totum strigiosi. Ligno utiq; par candor, neq; florent. Arcades steriles putauere. At in Creta & populi nigræ complures fructificant, vna apud aditum speluncæ Idææ, qua munera deo dicata conseruantur, altera parua ab ea proxima stat, & vltcrius duodecim plurimū 20 stadia ad fontē quendam Sauri dictū pleræq; sunt, & in mōte proximo ab Ida, cui Cedrio nomen, nec nō & circa Tiresiam. Alpina populo albæ nō absimilis est, tum magnitudine, tum verò quod ramis albicantibus spargitur, folio hederæ, sed parte altera sine angulo, altera oblongo, inq; angulū exeunte acutū. Colore parte resupina, pronaq; ferè simili, pediculo prolixo, tenuiq; annexo. Quā obrem nō erecto sed inflexo, cortice asperiori, quā populus alba, scabrioreq; vt pyrus syluestris. Plinius ab eo. Populi tria genera, alba, nigra, & quæ Libyca appellatur, minima folio, ac nigerrima, fungisq; enascētibus laudatissima. Alba folio bicolor, supernè candicans, inferiori parte viridi. Huic, nigræq; vt 30 crotoni, folia in iuuenta circinata rotunditatis sunt: vetustiora in angulos exeūt. Populorum foliis grandissima lanugo. Euolat candida (tradita folio numero flore candida) vt iulus. Mirū quod populo albæ euenit: circūaguntur enim folia eius post solstitiū, nec alio argumēto certius intelligitur sydus confectum. Alibi bryon vocat vnam populi albæ. Et alibi vuarum populi albæ meminit in vnguentis vsus, & seminis populi nigræ. Dioscorides semen populū proferre dixit. Sed nigra populus apud nos in arbuſtis frequentior. Folio rotundo, oblongo, supernè acuto, initio claro, mox atrouirente, pediculis oblongis. Vere in pediculis oblongis racemam nascitur vua, acinuli rotundi, piperis ritu, intus lanuginem continet in pappo euanescentem. Radice vaga per summa cespitum. Alba flauiorū, rignorumq; allecha. Folis supernè virentibus, subrus incauis, tuſilaginistritu. Iulos, siue foliorum exortum, salicis modo profert. Libyca minus frequens, minore, & breuiore folio, duriore, obtusiore, circumcristato, sinuatoque. Cortice crasso, læui, primū viridi, mox cineritio.



Colum.

Populos in plana descendere Theophrastus inquit. Varro tepidiora amare scripsit. Plinius montes amare dixit. Diximus nos in senecta cortice scabro, crassoque esse, ob id quodcunque cœlum substinet, tepidum, frigidumque.

Solum.

Populus rigua, & flumina sequitur. Ovidius.

*Quam platanius riuo gaudet, quam populus unda.*

Et Virgilius.

*Populus in fluminis.*

Sed iuxta Nilum nulla populus, etsi fluminum amantiſſima. Cortice laui, ob id aquosa arbor. Radice per summa cespitem vaga, ob id leue solum quaerit. Horret siccum, arenosum, & præcipue gypsosum, in eoque languida, breuique durans. Latius in cauis, quam planis, & in iis melius, quam collibus germinat. Vulturnus albas, Campania reliqua nigras, & Libycas alit.

Satio.

Plinius semine feri dixit. Populis eadem ratio semine, qua vltimos ferendi, transferendi quoque è seminariis easdem & syluis. Mutantur arbores & colore, fiuntque ex nigris candidæ, non semper prodigiosè, & maximè quæ ex semine nascuntur: vt populus alba in nigram transit. Recentiorum aliqua semine feri putant, quoniam populi semen perfectum est, colore subalbicati, prius quam frondes pullulent, feratur loco humido ac cœnoso, quumque enatum fuerit, transferatur. Sed hæc insana opinio videtur, quum populorum semen sit imperfectum, idque ex aspectu liquido videtur, alio modo natura eius fatum demonstrante. Diximus radices summa telluris cute spargi: ob id facillimè radicibus feri, & pullulare posse videmus. Theophrastus celerrimè & pulcherrimè nasci ex auulsione dixit, si locum idoneum, cultumque congruum adipiscatur, quemadmodum quæ lucos, & aquas desideret: si quis enim eam prægrandem, & arbori se exæquantem transtulerit, perdurare optimè posse. Populos quia festinantius germinant, disponi quoque maturius cōuenit, hoc est ab idibus Februarij, plantis & ipsas nascentes. Plinius. Quintilij Octobri mense ferunt. Nasci quoque ex trunco idem protulit, cuius pars defixa feri non recusat, ram alba, quam nigra. Ex suis etiam ramulis nasci dixit, quia cortex nitidus, crassus, succosus. Sed modus ramo ferendi Neapoli frequentissimus est, quum singulis annis in complendo arbusto, vento tempestatibusque deturbatas restituimus. Ex nouella populo eligantur rami nitidissimi, laues, recti, non ramosi, ætate duorum vel trium annorum, prægnantes & germine turgentes, silente vel finiente Luna. Ramosos ideo reiicimus, ne quum emundetur ramuli ex crebris plagis, frigori & Soli sint obnoxij. Signetur pars, quæ Boreæ obiecta erat in arbore, vt in scrobibus feratur, vt in ipsa arbore steterant. Imum crus in vngulae bovis formam resceemus, immuni cortice, ne saucietur, repliceturque, ex ea enim parte radículas speramus. & pars illa, quæ scrobibus immergetur, acuta cultri acie vulneretur pluribus locis vsque ad lignum, vt inde facilius radícula eliciantur. Dein scrobes trium, vel quatuor pedum altitudine excauentur in plano, quatuor, vel quinque in cliuo, in ea-

rum me-



rum medio bipalio trium vel quatuor pedum profunditate foramen excauetur, & eiusmodi hiatu populeus ramus mergi debet, obuertasq; partem illam Boreæ, quam signaueras. Sic iniecta paulatim terra querno palo, vel graui spissius calcetur: ne laxitas inter excipiens foramen & hospitem truncum interceptiatur, sic donec foramen expleatur, mox tota scobs repleatur, calceturque. Optimè feceris, si prius quàm leueris, denis vel quindenis diebus aquis immeretur truncus. Si tamen ventus validus, & vehemens fuerit, vt ex concussione foramen hiet, denuò calcetur, immuni semper cortice, ne obtundatur: post triennium, vel quadriennium decacuminentur, & rami in tabulata disponantur, vt dicemus. Sunt qui truncos sine cacumine ferant, sic minus à ventis conuelli sperantes. Plinius. Eiusdem rei causa populus alba seritur, bipedaneo pastinatu, taleæ sesquipedali, biduo siccata, palmipede intervallo, terra superiniecta, duorum cubitorum crassitudine. Eiusmodi taleæ ramiq; verno tempore plantantur, priusquam pullulent. Sunt qui dicant ram viuaci natura populum constare, vt scobes, & ramenta corticum, ramorumque in terrâ proiectorū, cōcipiant, & radicientur, & in syluam excrecant. Sed Dioscorides memorix prodidit, corticē nigræ, & albæ populi cōcisum in partes minimas, & sulcistercoratis insparsum, edules, innoxiosq; toto anno restibiles creare fungos.

Theophrastus. Populi materies, dum cæditur, albicat. Lignum dum vritur, *Materies.*  
 20 multum eructat fumum, vt humidum, & palustre. Vitruuius, Populus alba, nigraque, ignis & aëris satiatè, atq; humoris temperatè, parum terreni habentes, leniori temperatura comparatæ, egregiam habere videntur in vsu rigiditatem. Ergo quum non sint duræ terreni mistione propter raritatem sunt candidæ, & in sculpturis commodam præstant tractabilitatem. Plinius, Frigidissima quæcunque aquatica, vt populus: lentissima autem, & ideo scutis faciendis aptissima: quorum plaga contrahit se protinus, clauditq; suum vulnus, & ob id contumacius transmittit ferrum. Contra omnia inferiora pandatur. In laminas secatur, quarum operimento vestiatur alia materies. Palladius. Populus vtraque in sculpturis necessaria.

30 Dioscorides resinam effundere aut lachrimam populos commemorat, quæ *Resina.*  
 in Padum amnem defluat, dicunt coire in succinum, quod electrum vocant, alij chrysopho. Id attritu iucundum spirat odorem, & aurum colore imitatur. Plinius rusticas transpadanas ex electro monilia gestare affirmat. Phaerontis fulmine icti sorores fletu mutatas in arbores populos, lachrymis electrū omnibus annis fundere iuxta Eridanum amnem, quem Padum vocamus: & electrum appellatum, quoniam Sol vocitatus sit Elector, plurimi Poëtæ dixere, primi q; vt arbitror, Æschylus, Philoxenus, Nicander, Euripides, Saryrus. quod esse falsum Italiæ testimonio patet. Ouidius fablatur Phaerontem Solis, & Clymenes filium, quum ipsi obiiceretur ab Epapho illum nō de Sole, sed adul-  
 40 terio procreatum, ad patrem venientē petiisse, vt vnius diei sui currus regimen haberet: patrē, tamen si egrè, tandem illi concessisse. itaq; consensu curru,



solitam viam aberrauisse, cœpisseq; cœlum, & maximam orbis partem incendio conflagrari. quod videns Iuppiter, cum fulmine icit, qui in Eridanum lapsus est, quem sorores Heliades lugentes, deorum commiseratione, in populos versæ sunt, quarum lachrymis sit electrum.

*Inde fluunt lachryma, stillataq; solerigescunt*

*De ramis electra nouis, qua lucidus amnis*

*Excipit, & nurius mittit gestanda Latinis.*

Sed Lucianus huius rei scrutandi gratia ad Padum se cōtulit, serioq; faterur, neq; populos ibi esse, neq; succinum ibi de fluere, nec deniq; reperiri. Scripsit Zoroaster, Electrum lapis, siue succinū omnia paleosa & leuia ad se ipsum trahit, præter ocymum.

*De ulmo. C A P. XXXVI.*

**S**EQVITVR ulmus syluestris arbor, & aquarū alumna. Plinius materie, vitiumq; amicitia ulmū præstare dixit. Cato ulmos circū vias feri debere præcipit, vti frondē ouibus & bubus habeas, & materia, si qua opus erit parata sit. Varro in septis prædij ferit, ne familiæ rixetur cum vicinis, nā & sustinet sepē, & colit aliquot corbular vuarū. Narrat Virgilius frondē bubus p̄bere iucundā:

*Vminibus salices fecunda, & frondibus ulmi.*

Nomen

Græcis *ῥαλῖα*. Latinis ulmus. Italis *olmo*.

Genera.

Theophrastus duo ulmi genera constituit, alterum *ῥαιῖα* vocat, quod Theodorus montiulmum interpretatur, quasi montanam ulmum dicas: alterum, ulmum. Virgilius plura ulmi genera esse dicit,

*Præterea genus haud vnum nec fortibus ulmis,*

*Nec salici.*

Columella duo ulmi genera facit, gallicū, & vernaculū: illud atinia, hoc nostras dicitur. Plinius quatuor genera facit, duo Græcorū, quæ ex Theophrasto excepit. Græci duo eius genera fecere, montosam, & campestrē. Italia attineas vocat excellissimas, alterum genus gallicas, tertiū nostrates, quartū syluestre.

Descriptio.

Theophrastus ita sua genera describit. Ulmus fruticosior est, montiulmus auctior. Folium indiuiduum, leniter circumferratum, oblongius quàm pyro, scabrum non laue. Præstat hæc arbor & amplitudine, & altitudine, sterilis putatur. Gummi in petiolis gignit, & animalia quædam culicea, & amenta peculiariter gerit. Autumno multa minuta, nigra, ceteris verò temporibus quid ferat, minus animaduersum est. In ulmo cradē gignuntur, quæ si asperis, aridis, ventosisque locis steterit, ita omnino fiat necesse est. Deniq; qui proximus terræ, & quasi iuxta caudicis caput conuenerit, hic fenescens crassior redditur. Vnas affert, & folliculos quosdam. Folium insectum. Illud sanè peculiare, quod ulmo accidit: vertit enim partes supinas mox post solstitium æstiuū, eoq; argumento rustici solstitium confectum intelligunt. Et in caulis. Folia circumaguntur æstiuo solstitio, quod eo potissimum tempore folia decidant. quum igitur foliorum agatur profluvium, cuncta aliquantulum affici necesse est, & quæ infima, & qua si



quasi senio confecta, exarescunt, & decidunt, reliqua circūaguntur tantummodo. Semen habet, sed latitat. Protus absurdū simul, & mirandum apparet, siqua ex imperfectis valeant generare, præsertim arborū naturas steriles, ceu vlmī. Columella, Atiniam vlmū Tremellius Scrophā nō ferre samarā (quod est semē eius) falso est opinatus. nam rariore sine dubio creat, & iccirco plerisque sterilis videtur, seminibus inter frondē, quam prima germinatione edit, latentibus. Est autē vlmus longē latior, procerior, quā nostras, frondemq; iucundiorē bubus præbet. Plinius. Montosa amplior, campestris fruticosa, Italia attineas vocat excellēssimas, & ex iis siccanas præfert, quæ nō sint riguæ. Alterum <sup>10</sup> genus, gallicas. Tertium genus nostrates densiore folio, & ab eodem pediculo numerosiore. Attineæ nō ferunt samara: omnesq; radicum plantis proueniunt, reliquæ semine. Ex eo fluit gūmi, & culices ibi nascuntur. Vlmus atinia semen nō fert, infelix existimatur, damnataq; religione, quæ neq; seratur vquam, neque ferat fructum. Folia ramulosa. Inter primas germinat. Ab radice brachiata nascitur. Corticis humor saluosus.

Lucos, aquasq; desiderat. Ex Theophrasto *ὀρενία* gaudet montibus, in <sup>Carum.</sup> plana etiam descendit. Apuleius vlmū humectis locis gaudere ait. Plinius. Abit & in montosa vlmus. In Ida Troadis raram vlmū Theophrastus dixit, et si aliis arborū generibus fertilissima sit. Col. in nebulosa. Columella pingui solo, & <sup>Solum.</sup> modice humido, variisq; soli generibus prouenire dixit. Theophrastus semine prouenire scripsit: nam illud indicium affertur, quum enim flatibus delatum semen in loca proxima fuerit, nasci arborē aiunt. Columella vlmarium ex semine faciendū docet, ut in arbusculo emortuas, aut senio, & tempestate afflictas nouellā sobolem substituere possis: quod facile eueniet, si vlmorū seminarium paratum habeas, quod & quale, & quomodo faciendū sit, ita præcipit. Igitur bipalio primò terrā pastinabimus, ac diligenter occatam, & resolutam verno tempore in areas cōponemus. Samarā deinde, quæ iam rubicundi coloris erit, & compluribus insolata diebus iam erit, ut aliquē tamen succum, & lentorem habeat, iniiciemus areis, & eas totas seminibus spisse cōtegimus, atq; in cribro <sup>30</sup> putrem terrā duos alte digitos incernemus, & modicē rigabimus, stramētisq; areas cooperiemus, ne prodeuntia cacumina seminū ab auibus prærodantur. Vbi deinde prorepserint plantæ, stramēta colligemus, & manibus herbas carpemus, idq; leuiter, & curiosē faciendū est, ne adhuc teneræ, breuesq; radiculę vlmorū conuellātur: atq; ipsas quidē areas ita anguste cōpositas habebimus, ut qui roneaturi sunt, medias partes earū facile manu cōtingant: nā si latiores fuerint ipsis seminibus, quæ proculcata erunt, noxā capient. Æstate deinde prius quā sol oriat, aut ad vespērū, seminaria cōspergi potius, quā rigari debēt, & quū tertium pedū plantæ fuerint, in aliud seminariū transferri, ac ne radices altius agant (quæ res postmodū in eximendo magnū laborem affert, quū plan- <sup>40</sup> tas in aliud seminariū transferre volumus) oportebit nō maximos scrobiculos sesquipede inter se distantes fodere. Deinde radices in nodum si breues, vel



in orbem coronæ similem, si longiores erunt, inflecti, & oblitæ fimo bubulo scrobiculis deponi, ac diligenter circumcalcari. Possunt etiā collectæ cum stirpibus plantæ eadem ratione disponi, quod in atinia vlmō fieri necesse est, quæ non feritur è samera. Sed hæc vlmus autumnī tempore melius, quàm vere disponitur, paulatimq; ramuli eius manu detorquentur, quoniā primo biennio ferri reformidat ictum, tertio demum anno acuta falce abraditur, atque ubi translationi iam idonea est, ex eō tempore autumnī, quo terra imbribus permaduerit, vsque in vernum tempus, antequam radix vlmī in eximēdo delibretur, rectè feritur. Igitur in resoluta terra ternū pedum quoquouerſus faciendi scrobes; at in densa, sulci eiusdem altitudinis, qui arbores recipiant, præparandi, & deinde vlmī conferendæ, ut earum rami ad orientem, & in occidentem dirigantur, quo plus solis mediæ arbores, quibus vitis applicata, & creligata innititur, accipiant. Sed Plinius breuius docet. Vlmorū, priusquam folio vestiantur, samara colligēda est circa kal. Martias, quū flauescere incipit, deinde biduo in umbra siccata, serēda densa in refracto, terra super minutatim cribrata crassitudine, quæ in cupressis. Pluviæ si non adiuuent, riganda. Deferendæ ex arborum venis post annū in vlmariā, intervallo pedali in vnamquamq; partē. Maritas vlmōs autumnō serere vtilius, quia carent semine, nam eę è plantis feruntur. In arbuſtū quinquennes sub vi be transferunt, aut (ut quibusdam placet) quæ vicenum pedū esse cœperunt, sulco qui nouenarius dicitur, altitudine pedū trium, pari latitudine, & eo amplius circa positas pedes terni vndiq; è solido adaggerantur. Et alibi. Hoc genus similiter natura monstrauit, auulsiq; arboribus stolones vixēte. Quintilij docent Aprili mense semē vlmī colligi debere, & collectū statim serere. Apud nos Aprili mense vlmī samara onerata videntur, illicoq; decēdit, satumq; non prouenit: nam dum contemplatur, videtur sine spe future prolis. Theophrastus, Quæ semē ferunt, tā ex radicibus, quàm ex ipsis prodire nimirum possunt: nam eas quæ steriles esse arbitrantur, generare affirmant, ut vlmū. argumētumq; capiunt, nō solum quod pleraq; procul suis radicibus erumpāt, verum etiā quod in Phineo Arcadiæ quū aqua obstructis faucibus extumuit, demū erupisse, & ubi in loco inundato vlmī steterant, anno secundo solō resiccato iterum vlmōs surrexisse affirmant. Vlmus celerimè & pulcherrimè prouenit ex auulsione, quæ si quis prægrandem, eamq; cum arbore se exæquantem transtulit, perdurare optimè potest. Plinius. Quæ carent semine, plantis serere vtilius, ut vlmus. E radicibus est genuinus vlmorum satus, nam à radicibus suis longè repullulat. Virgilius.

*Pullulat ab radice aliis densissima sylua,*

*Ut cerasis, vlmisq;.*

Cato exactius plantas ponere docet. Vlmōs quum seres, benè cum radicibus eximito, cum terra sua quā plurima, circumligato uti ferre possis, in alueo aut corbula ferri iubeto. Caueto autem ne quum ventus fiet aut imber, effodias. In scrobe quum pones, summam terram subdito, postea operito terra, & calcato



calcato pedibus. Frigus non admittit, vt syluestris sterilisq;: nam densa & valida est, & si admiseric statim expellit, transmittitq; nec vsquā retinet. Plagam non solum tolerat, sed lignis detractis caudici, indomita manet, vt quæ humida sit, & probè germinet.

Post vindemiam & arcturum cæditur. Rigorem quoq; fortissimè seruat *Materies.* vlmus: ob id vlmeos cardines valuis adiungunt, nam si ipsi firmi permaneant, valux quoq; stare intortæ possint, alioquin torqueantur necesse est. Faciunt eos ligna permutâtes, quod radicem versus, quodq; in cacumine fuit: sic enim inter se coarctata vtrumq; impletum alterius prohibet, quum suapte natura  
 10 aduersetur: nam si alterum per naturam eodem tendat, quò momentum est, ruina vtriq; eodem sequi facile possit. Valuas non statim apponunt, sed compactas statuunt. Nonnulli anno tertio confecere, lautioris operis desiderio: namq; æ stas calore exiccata dehiscunt, hyemis verò humore oppletæ coherent. Ratio, quòd rara, carnosaq; facile attrahant humorem. Tornatus nauibus rotundis ex vlmo, lentitiam enim, firmitatemq; adesse oportet. Testudines, & auriculas ex vlmo etiam fabricant, valida enim hæc esse oportet. Vtilis etiam ad fores, præla, & torcularia, quin & ad carpentarium opus, sed mediocriter. Malleus & terebra ex vlmo optimè fiunt. Lentore non caret, sed natura humidior, indicium quòd post cæsuram erecta materies humorem emit-  
 20 tit. Ad summum quæ in montibus nascuntur coloratæ valdè, candidæq; asurgunt, quæ plano rariores corpore, pallidiores, deterioresque. Hæc Theophrastus. Cato, Vlmeâ materiem omnem quum effodies, Luna decrecente eximito, post meridiem, sine vento Austro. Tum erit tempestiua, quū semen suum maturum erit. Vento Austro caueo ne quam materiem tractes, nisi necessario. Orbem intorculari ex vlmo facito, intrinsecus cuppam materia vlmea facito. Et vectes vlmeos. Plinius ab eo eadem, & à Theophrasto. Est lentitia vlmo, sed siccior. Rigorem fortissimè seruat vlmus, ob id cardinibus, asfamentisq; portarum vtilissima, quoniam minimè torquetur, permutanda tantum sic, vt cacumen ab inferiore sit cardine, radix superior. Vlmus in perfla-  
 30 tu firma: Lenta, sed facile pandatur, flexilis tamen, stansq; à circumcissura siccata, fidelior. Terebris vaginas ex vlmo vtilissimas fieri, & eadem malleos. Cato vectes vlmeos fieri iubet. Factum hoc populi Rom. quiritibus ostentum Cymbricis bellis Nuceriæ in luco Iunonis, vlmo postquā etiam cacumē amputatum erat, quoniam in aram ipsam procumbebat, restituta sponte, ita vt protinus floreret. A quo deinde tempore maiestas populi Ro. resurrexit, quæ antè vastata cladibus fuerat. Vitruuius eadem de vlmo habet, quæ de fraxino dicimus. Palladius. Vlmus si siccetur, rigescit, ante curuabilis, catenis vtilis habetur. Hesiodus temonem ex vlmo in aratro facit.

*Temonem ex vlmo viridi, seu confice lauro.*

40 Virgilius ab Hesiodo describens aratrum etiam vlmum ad temonem cedit.  
*Continuo in syluis magna vi flexa domatur*



*In burim, & carui formam accipit ulmus aratri.*

*Infusio.*

Virgilius cerasum in ulmum inferi posse dicit, & quercum.

*Glandesq; suis fregere sub ulmis.*

*De Alno. CAP. XXXVII.*

**S**YLVESTRIS est arbor, & apud rigua nascens alnus. Sunt Poëtae, qui fabulentur Phaëthontis sorores nō in populos, sed alnos mutatas. Virgilius,

*Tum Phaethontiadæ musco circumdat amara*

*Corticis, atq; solo proceras erigit alnos.*

*Nomen.*

Græcis *αἰθέρα*, Latinis alnus, quod amine alatur, Itali *alno*, anno *oni* 20. Neapolitani *altano*.

*Descriptio.*

Theophrasti alnus sterilis, & vnigena est. Recto caudice, ligno medullaque molli, aded vt graciles virgæ concaventur, folio pyri, sed ampliore, ac neruo siore, cortice squaroso, rustove intus, qua de causa coria tingit. Radice summa, nec quàm laurus maiore, tenui, ac per summum cespitem. Folio auellanae simillimo, sed arctiori. Quædam fructifera, quædam sterilis, vtraq; tamed florescit. Germinat post Fauonium. Autumno reddit semen. Auctu facilissima. Plinius alnum nullum fructum ferre prodidit, scopis tantum nascentem, quare infelicem existimari, damnatamque religionem. Folio crassissimo, cuius umbra pinguis, sed pascens sara. In ea tuber nascitur vt in acere, tanto deterius, quanto ab acere distat, sectile, sicut cedro: nec aliarum tubera in pretio. Et nigræ quoq; meminit. Sed putat Matthiolus Theophrastum sibi contrarium, quum dixerit sterilem esse, & autumno fructum proferre, quū non legerit caput quintum tertii libri historiarum, quandam esse fructiferam, & quandam sterilem, vt dicemus. Apud nos fructifera est. Flos paulum rubescit, semē exiguum in compactili callo, colore in nigrum flauo, qui nucis magnitudinē æquat, & mori figuram. Profert & iulum autumno, qui mox aperitur vere, vt in nostris villis obseruauimus. Cortex rufescit ex fusco, cuius potissimum vsus ad infectoria.

*Celum.  
Solum.*

Vdos locos, riguasq; crepidines sequitur ulmus. Theophrastus haud alibi, quàm in aquaticis nasci tradidit. In aquis occultatur radix, & aliquid caudicis, reliquum corpus extrà patefcit. Sed si quis arctius inquirere velit, contrariam & quasi ancipitem vitam agere inueniet. Virgilius.

*Fluminibus salices, crassisq; paludibus alni.*

Vitruuius perpetuò in fluuiis generari. Plinius non nisi aquosis alnos provenire dixit. Aristoteles inter miracula in Creta insula alnos non esse steriles dixit. Theophrastus etiam in plana descendere.

*Satio.*

Depactis virgis, & truncis natam vidimus.

*Materies.*

Vitruuius. Alnus quæ proxima fluminum ripis procreatur, & minime materies utilis videtur, habet in se egregias rationes: etenim aëre est, & igni plurimo temperata, non multum retreno, humore paulo. Itaque quia non nimis

habet



habet in corpore humoris in palustribus locis infra fundamenta ædificiorum palationibus crebrò fixa recipiens in se, quod minus habet in corpore liquoris, permanet immortalis ad æternitatem, & sustinet immania poudera structuræ, & sine vitiis conseruat. Ita quæ non potest extra terram paulum tempus durare, ea in humore obruta permanet ad diuturnitatem. Est autem maximè id considerare Rauennæ, quod ibi omnia opera & publica, & priuata sub fundamentis eius generis habeant palos. Plinius. Licet alni sepibus muniant, contraque erumpentiam amnium, impetus riparum muro in tutela ruris excubent, in aqua saturæ, cæcæque densius in numero hærede profunt. Alni ad aquarum ductus in tubos cauantur, obrutæ terra, plurimis durant annis. Eadem si non integantur, cito senescunt, mirum in modum fortiores, si humor quoque extra super sit. In palustribus æterna, onerisq; quantilibet patiens. Est & in ea lentitia, sed madida. Palladius. Alnus fabricæ inutilis, sed necessaria, si humidus locus ad accipienda fundamenta palandus est. Materies à Virgilio ad naualia commendatur:

*Tunc alnos primum fluuij sensere cauatas.*

*De Salice. C A P. XXXVII.*

**E**ST & salix ex prædictarum genere syluestris, & aquarum alumna, & in villa non solum utilis sed necessaria. Nullius quippe, inquit Plinius, tior redditus, minorisve impendii, aut tempestatis securior. Tertiumque locum ei in æstimatione ruris Cato tribuit, prioremq; quam oliuetis, quamq; frumento, aut pratis, non quia desint alia vincula, siquidem optima præbent genistæ, populi, ulmi, sanguinei frutices, betulæ, arundo fissa, vitis, recisisq; aculeis rubi. Alligat & intorta corylus, sed salicis præcipua dos. Erat salix antiquitus sterilitatis, & castitatis symbolum, siue quod amerina salix lectis, accubitisq; imposita, castitatem inducat, siue quod folia huius arboris contrita, & pota, intemperantiam libidinis efficaciter frenent, & sæpius sumpta vsum in totum auferant: ob id lasciuissimo quem fingunt hortorum deo salignam falcem in manu donauit antiquitas, scilicet ut Veneris pruritum, & impudicas cogitationes castitatis falce refecandas admoneremur. In sacris literis, vbi Dei populus iubetur tabernaculorum festa celebrare, quippe in tentoriis habitantes fabris frondes manibus prætendebant, nimirum per salicem continentiam imaginamur. Salix porro sterilis est, quippe Maro inter infelices plantas commemorat, vbi Seruius semen salicis esum infœcunditatem mulieribus gignere dicit, quippe apud Pliniam prius legerat, semen salicis mulieri sterilitatis medicamentum esse. Iudæi captiui tracti, vbi propter flumina Babylonis descendissent, captiuitatemq; suam deplorarent, in salicibus suspenderunt sua organa, vbi Eurhymius per salices oria interpretatur, quod ignauam vitam per captiuitatem traherent, tum ob eius sterilitatem inutilem, tum ob  
40 vnam sub qua desides ociari soliti sunt.



**Nomen.** Græci *ἰλιά* vocant, Latini salicem. Verrius ita dictam putat, quod ea celeriter crescat, ut salire videatur, quam opinionem Festus Pompeius irridet, damnatq; nimis seuera & grammaticali censura, quod eam arborem potius, quam virgulti genus appellarit. Itali *salce*.

**Genera.** Virgilius plura salicis genera putat. ob id in Georgicis,  
*Præterea genus haud unum nec fortibus ulmis,*  
*Nec salici.*

Columella tria genera facit, Græcæ, Gallicæ, & Sabinæ; quam plurimi vocant amerinam, Varro Græcam salicem nominat. Plinius plura genera dicit, Nam quædam & in proceritatem magnam emittunt iugis vinearum pertricas, pariuntq; baltheo corticis vincula: & aliæ virgas sequacis ad vincituras lenticis. Aliæ prætenues viminibus texendis spectabili subtilitate. Rursus aliæ firmiores, corbibus ac plurimæ agricolarum supellectili, candidiores ablato cortice, leuiq; tractatu vilioribus vasis, quam ut è corio fiant; atq; etiam supinarum in delicias cathedrarum aptissime. In Asia tria genera observant. Nigram, vtiliorem viminibus: candidam agricolarum vlibus: tertiam, quæ brevissima est, helicem vocant. Apud nos quoq; multi eorundem generibus nomina imponunt. Vimineam vocant, eandem purpuream. Alteram vitellinam à colore, quæ sit tenuior, tertiam Gallicam, quæ tenuissima.

**Descriptio.** Theophrastus ita describit. Salix brevis, & contorto caudice confurgit, auctu perquam facili, brevisque vitæ est, quod apud aquas assurgat. Mature germinat, quia sterilis, lucosaque sit. Celeriter fructum amittit, antequam in plenum crassetur percoquaturq;, dimittere assenerant, quam obrem Homerum haud improbè frugiperdam hanc appellasse inquiunt. Et alibi de salice ambigitur utrum semen habeat. Siccæ levis est. Plinius ab eo. Salix longis foliis pullulat. Circumaguntur enim post solstitium. Nec alio argumento certius intelligitur sydus confectum. Ocyssimè autem amittit semen, antequam omnino maturitatem sentiat: ob id dicta Homero frugiperda, secutaq; ætas scelere suo interpretata est hanc sententiam, quando semen salicis mulieri sterilitatis medicamentum esse constet. Vnà tantum proditur ad maturitatem perferre solita in Creta insula, ipso descensu Iouis speluncæ, toruum, ligneumque, magnitudine ciceris. Citò crescit, moriturq;. A Virgilio flexibilis describitur, & folio glauci coloris, unde & oculi ab eiusmodi colore glauci dicuntur: Amaraque.

*Lenta salix*

*Et glauca canentia fronde salicæ.*

*Florentem cythisum, & salices carpetis amaras.*

Porphyrius in his, quæ circa Homerica philosophatur, salicem ob id *ἀλγίστη* vocari tradit, quod semen prius, quam mature scat, in arenam abeat, vel hac potius de causa dictum putat, quod semen illud ex vino propinatum sterilitatem faciat, seminali omni vi protinus labefactata. Apud nos tamen surgit



pit trunco, ab eius extremo, veluti à capite prodeuntibus ramis, lentis, flexilibus, foliis subrus incauis, supernè virentibus, flore, seu nucamento squamatum compactili, lanuginoso propendente. Citissimè ramorum constipata densitate crescit vt mirè adultâ in arborem præmaturo incremento conspicias.

Præmadida ac palustris omnino spectatur salix, & si quis arctius inquirere velit, communem & quasi ancipitem vitam agere inueniet. Radix & aliquid corporis in aqua manet, reliquum verò extra patescit. In lacu Orchomenio frequens. Hæc Theophrastus: sed Columella, salicem, dicit, rigus ager, vel vliginosus optimè recipit, non incommodè alit planus, & pinguis. Varro salicetum humido loco facit. Virgilius flumina sequi dixit.

Celum.  
Solum.

*Fluminibus salices, crassiq; paludibus alni.*

Didymus cœnosa, & aquosa terra gaudere, aëre humido & frigido dixit.

Salix ex anulsione celeriter nascitur, quæ etiam si quis prægrandem eamq; cum arbore se exæquantem transtulerit, perdurare optimè potest: argumentumque capiunt, quòd procul radicibus suis erumpat. Summis ramulis provenire etiam potest, quod aquarum præauida sit. Sed Columella salicetum cōstituere ita exactissimè docet. Debet bipalio conuerti (ita enim præcipiunt veteres) in duos pedes & semissem salicto destinatum solum: nec refert cuius generis vimen seras, dum sit lentissimum. Salices vel cacuminibus, vel taleis ponuntur. Perticæ cacuminum modicæ plenitudinis, quæ tamen dipondiarum orbiculæ crassitudinem non excedant, optimè panguntur, eo vsq; dum ad solidum demittantur: taleq; sesquipedales terreno immersæ, paululum obruuntur. Rigus locus spatia laxiora desiderat, eaq; senum pedum per quincuncem rectè faciunt, siccanus spissiora sic, vt sit facilis accessus colentibus ea: quinum pedum interordinia esse abunde est, vt tamen in ipsa linea consitionis, alterna vacuis intermissis bipedaneis spatiis consistant semina. Satio est eorum prius, quàm germinent, dum silent virgæ, quas arboribus detrahi siccas conueniet: nam roscidas si recideris, parum prosperè proueniunt, ideo pluuii dies in exputanda salice vitantur. Fodienda sunt primo triennio salicta crebrius, at nouella vineta, quum deinde conualuerint, tribus fossuris contenta sunt, aliter culta celeriter deficiunt: nam quâuis adhibeatur cura, plurimæ salices intereunt, quarum in loco ex propinquo mergis propagari debent, curuatis & defossis cacuminibus, quibus restituantur quicquid intercidit: Anniculus deinde mergus decidatur à stirpe, vt suis radicibus tanquam vitis ali possit. Alibi id Februario mense fieri debere docet, vel facta deputare, runcare, & fodere. Plinius ab eo. Salicum satio fit loco madido, tamen refosso duos pedes & semipedē, talea sesquipedali, vel pertica, quæ utilior, quo plenior. Intervallo esse debet pedes seni, trimæ pedibus binis à terra putatione coercentur, vt sic se in latitudinem fundant, ac sine scalis tondentur. Salix enim facundior est, quo terræ proprior. Has quoq; omnibus annis cōfodi iubet, mense Aprilis. Hæc est viminalium cultura. Perticalis & virga & talea, feritur fossura eadē.



Perticas ex ea cædi iustum est quarto ferè anno. Ex autem senescentium propagatione sarciant locum, pertica immersa, & post annum recisa. Ocyssimè salix amittit semen. Sed in hoc quoq; prouidens Natura, facilè nascenti, & depaëto surculo, incuriosius semen dedit. Varro inter Fauonium, & æquinoëtium vernum salicæta ferit, cædit verò inter æquinoëtium vernum, & Vergiliarum exortum. Democritus eas plantat Februario mense ex claua, & taleis.

*Infirio.*

Palladius in insitione malum recipere dixit, & castaneam.

*Stipitibus gaudet nomen mutare salignis,*

*Et gratum nymphis spargere flore nemus.*

*Flumineam salicem fecundant ardua membra*

*Castanea, & multo pasta liquore vigent.*

10

*Infirmi.*

Quædam securim ita tolerant, tam stantes, quàm à flatu prostratæ, vt resurgant, viuant, germinentq; , vt salici in Philippis euenerat. Fuit quidem detruncata, sed non circumdolata. Aruspex tum quidem persuasit, vt sacrificarent, custodirentq; arborem, vtpote factam ostento fausto.

*Materies.*

Humida, inquit Theophrastus, quæ palustria, viridia, fumosa sunt dum vruntur. Ad scuta, cistellas, canistra, & eiusmodi reliqua valet. Lenta salix, qua de causa scuta ex ea facere solent. Icta enim protinus plagam contrahit: sed salix leuior, rariorq; , ob id ea magis vtuntur. Plinius ab eo. Lentissima salix, & ideo scutis faciendis aptissima, quorum plaga contrahit se protinus, claudique suum vulnus, & ob id contumacius transmittit ferrum. Lentissima salix, ideoq; vtilissima ad cistellas, quæq; flexibili crate constat, habet & candorem, rigoremque, & in sculpturis facilitatem. Palladius. Salix in sculpturis necessaria. Vitruuius ea de salice dicit, quæ superius de populo alba diximus. Plinius. Nec in fruticum, nec in veprum, cauliúmve, nec in herbarum, aut alio vllò, quàm suo genere numerentur iure scirpi fragiles, palustrésve, ad tegulum, tegetesq; , è quibus detractò cortice, candelæ luminibus, & funcribus seruiunt. Firmior quibusdam in locis earum rigor: namq; iis velificant non in Pado tantùm nautici, verùm & in mari piscator Africus, præpo-

20

stero more vela intra malos suspendens. Et mapalia sua

30

Mauri tegunt, proximeq; æstimanti hoc videantur esse, quo inferiore Nili parte papyri sunt vsu.



## IOAN. BAPTISTAE

PORTÆ NEAPOLITANI

## VILLAE

LIBER TERTIVS

SIVE

SYLVA GLANDARIA.

PROOEMIUM.

10 **D**IXIMVS iam de cæduis arboribus: proximum est vt narrem glandiferas quoq; , quæ primæ victum mortali-  
bus subministrarunt , nutrices inopis ac feræ sorris. Glandes opes esse nunc quoq; multarum gentium, et-  
iam pace gaudentium constat. Nec non & inopia fru-  
gum ex arefactis molitur farina , spissaturq; in panis v-  
sum. Quin & hodie per Hispanias secundis mensis glās  
inferitur. Dulcior eadem in cinere resta. Cautum est  
præterealege XII tabularum, vt glandem in alienum fundum procidentem  
liceret colligere. Glandariam syluam nono, & vltimo loco in villæ censu vetus  
Cato locauit. Dicemusq; vnâ de pomiferis syluestribus, quibus ferè & alites  
vescuntur, quod vbi absoluerimus, de syluestribus arboribus tractatui finem  
20 imponemus. Plinius Latinum sermonem glandiferas omnes arbores vnus  
generis vocabulo amplecti omnino posse negat, quod nullum inuenit, quod  
illi Græcorum generi responderet, quod *ἀμυγδαλέα* dicitur. Sed Theodorus pro  
communi omnium genero robur capitis aptè licere faslus est. A Macrobio  
inter felices arbores glandiferæ annumerantur, vt quercus, ilex, esculus, fa-  
gus. Nos de glandiferis primùm, iisq; æterna coma pubentibus, ilice, altera  
ilice aquifolia, subere, & phellodri: mox de caluescentibus, quercu, robore,  
Græcorum fago, cerro, esculo, haliphæo, farno, & Latinorum fago. Inde de  
pomiferis semper virentibus, siliqua, arburo, secundò de frondem remittent-  
ibus, loto, calabrice, & reliquis syluestribus.

30 *De Illice. CAP. I.*

40 **E**GLANDIFERIS igitur prima æterna vires cæsarie, quæ occurrit, ilex  
erit. Plinius scribit ciuicam coronam ilignam primò fuisse, postea magis  
ex esculo placuisse. Ioui sacra. Traditur ab Æliano, quod leo ilicis foliis calca-



tis, illicò torpore teneatur : confirmatur id etiam à Zoroastre in geoponicis Græcis. Palladius ex minori ilice apes mel conficere scripsit. Arbor frequenter igitur fulmine. Persius id innuit.

— *At sese non clamat Iuppiter ipse?*

*Ignouisse putas : quia cum tonat, ocys illex*

*Sulphure discutitur sacro, quamtuq, domusq,?*

In eos protulit, qui quum inhonestam vitam ducant, sibi ipsis ignotum putant, quoniam Iuppiter in ilicem, non in eos fulmen iaculatur. Arbor ipsa infausti ominis antiquitus semper habita. Virgilius.

*Ante sinistra caua monuisset ab ilice cornix.*

Seneca in Thieste.

*Nullaq, latos solet*

*Præbere ramos arbor, aut ferro coli,*

*Sed taxo, & cupressu, & nigra ilice*

*Obscuranutat sylua.*

Imposuit & oppido illex nomen Præneste Italię, non longè ab vrbe, *ἡ πόλις* *ἡ πόλις*, id est, ab ilicibus, vt Seruius notat. Illex quum caua, id est, vitiosa est, vitium agrorum demonstrat. Est & futurę vbertatis prænuncia anni. Si illex multum fructum ferat, tradit Didymus, fructuosum annum futurum portendit. Cassianus ex Arato refert, ilices & quercus multum fructum ferentes, diuturniorem hyemem fore significare. Arati versus sunt,

*Induit immodicis cum semet floribus illex :*

*(Indigana nam succi ligno natura rigenti est)*

*Et cum flore nono, cum brachia glande grauantur,*

*Vrentis cæli subnutrimenta latenter*

*Sponte operata docet.*

Nomen.

Græcis *ἡ πόλις*, fortasse quia propter duritiem serra secanda foret, vel à folio circumferrato. Latinis illex, Italis *elce*, *elice*. Neapolitanis *licina*. Sunt qui hanc *αἰλιά* Theophrasti dicant.

Genus.

Est illex Columellæ gemina, minor apibus quæ sita, proluxa ab omnibus improbata mellificio. Estq; eadem aculeata, & aculeis vacans. Nam de fronde bobus ministrâda loquens, ait. Iligna melior est quærnea, sed eius generis, quæ spinas non habet : nam id quoq; , vt iuniperus, respuitur à pecore, propter aculeos. Plinius. Ilcis duo genera. Ex iis in Italia folio non multum ab oleis distant, similaces à quibusdam Græcis dictæ, in prouinciis aquifoliæ. Masculas ilices glandes ferre negant.

Descriptio.

Describimus Italiæ notissimam, & fortasse Theophrasto ignotam. Arbor spectatæ proceritatis, & quærneæ elegantia. Cortice in rufum nigricante. Folia sunt lateribus sinuata, ac per ambitum denticulis aspera, perpetuò virescentia, externè candicantia, scabraq; , internè læuia, nigricantiaq; in virore. Ob id Poëtæ nigram appellant. Virgilius.

*Ilce*



*Ilice sub nigra pallentes ruminat herbas.*

Et Horatius. *Duris ut ilex tonsa bipennibus,  
Nigra feraci frondis in Algido.*

Nidosa est, ut quoque Lucanus annuit:  
—— *nodosa impellitur ilex.*

Glandes profert quernis minores, ex reliquis minus præstat. Plinius ilicis stillicidia ponderosissima dicit.

Columella conuenienter nemora ilicibus vestiri dixit, Plinius valles diligere, & in montosa subire. Colum.

10 Didymus ante Calendas Martias plantari præcipit. Satio.

Materies eius densa est, & robusta, in atrum rufescens. Diutius viuere Plinius protulit. Vetustior autem vrbe in Vaticano ilex, in qua titulus æreis literis Hetruscis, religione arborem iam tunc dignā fuisse significat. Tiburtes quoque originem multo ante urbem Romam habent, apud eos extant ilices tres, etiam Tiburto conditore eorum vetustiores, apud quas inauguratus traditur. Fuisse eum tradunt filium Amphiarai, qui apud Thebas obierit, vna ætate, ante Iliacum bellum. Vicina luco est ilex, & ipsa nobilis xxxv pedum ambitu caudicis, x arbores mittens singulas magnitudinis visendæ, syluamque sola facit. Pons Romæ olim supra Tyberim Sublicius dictus est, quod ilicis materie Materies.  
20 structus esset: nam sine ferro, sine clauo, sine futuris, contignatione ita dispositus, ut trabes per bella eximerentur, ac postea reponerentur. Quod, ut sic fieret, religiosum fuit, posteaquam Horatio Coclie defendente, agrè reuulsus sit, ut postea ilicis materie confici solitus sit. Cato vectes iligneos, & aquifolios facit. Materies se frangit, & dissilit sponte sua; ob id Pericles Bæotios dixit ilicis similes, quod ipsi se intestinis discordiis conficerent. Virgilius apum examina ex ilice fieri dixit.

—— *nec non & apes examina condunt,  
Corticibusque canis, vitiosaque ilicis aluo.*

*De ilice aquifolia. CAP. II.*

30 **A**LTERA est aquifolia ilex coccifera; quam nouisse videtur Theophrastus, quamque à pecoribus respui Columella propter aculeos dicit.

Hæc Theophrasto *ωπίος* dicitur. Plinius milacem à Græcis dici, & ab oleis Nomen.  
folio non multum distare, in prouinciis aquifolias vocari scribit. Sed Plinius errare videtur: nam milax alia erit, ut in sequentibus videbimus. Latinis ilex aquifolia.

Theophrastus alteram sterilem, alteram fructiferam, ambas tamen floriferas dicit. Genera.

40 Ilex arbor Theophrasto assurgit roboris magnitudine, si solum adipiscatur idoneum, sed folio minori, aculeatoque, cortice etiā læniori. Radice multiplici, ut syluestrium altissima. Glanduloso fructu, sed glans ipsa pusilla est: veterem fructum nouus præuenit, nam serò maturescit, quamobrem bifera à non- Descriptio.



nullis existimata est. Fert præter glandem granum quoddam puniceum, hyphæar, & viscum: quapropter quaternos parit fructus, binos peculiares, binos alienos, à septentrione viscum, à Meridie hyphæar. Fructum nonnulli acylon vocant. Perpetua frondet coma. Germinat vere, omniū tardissimè suos perficit fructus. Arcades semen anno perficere dicunt, simul enim fructum antecedentem maturat, & nouum demonstrat: quamobrem ex his euenit, vt assiduè fructum habeat. Si corticem circumcideris, interit, sed hyeme tardius, vt pote robustissima. Plinius ab eo. Illicis glans vtriusque breuior, & gracilior, quam Homerus acylon appellat, eoq; nomine à glande distinguit. Iligna suem angustam, nitidam, strigosam, & p. vnderosam facit. Tentantur ea sues, nisi paulatim detur. Et hanc nouissimam cadere. Nullo flore exhilaratur. Folio breui pediculo dependenti. Annifera est, nouusq; fructus in his cum annotino pendet. Si decorticetur interit, sed si hyeme acciderit, diutiùs durat. Sed omnes roborum dotes ilex solo prouocat cocco. Granum hoc, primoque ceu scapum fruticis parua aquifolia ilicis, cuscillum vocant. Pensionem alteram tributi pauperibus Hispaniæ donat. Est autè genus ex eo in Attica ferè, & Asia nascens, celerrimè in vermiculum se mutans, quod ideo scolecion vocant, improbantque. Color paludamento imperatorum dicatus. Dioscorides surculosum fruticem coccum afferre dixit, quo infectores vtuntur. Est apud nos ilex magna, folio aculeato, prægrandi, quam describit Theophrastus, sed coccum ferre non vidimus. In montosis verò Hispaniæ, & sterilibus locis paruas ilices conspeximus, exiguis, densis, crispisq; foliis, angulosis, rigitisque spinulis armatis, horridiore aspectu. Flore muscoso, herbaceo, quem Marr. ostendit. Coccum ferunt, non semen, aut fructum, sed excrementum nobile, & visendum, intus sanguineo & miniato cruore scatens, admirandum solertis naturæ opus.

*Cælum.*

Montibus lætari, & in planis non nasci scripsit Theophrastus. Dioscorides optimum in Galatia, & Armenia, deinde Asia, & Cilicia, vltimum ex omnibus Hispanicum. Plinius ab eo. Coccum Galatiæ rubens granum, aut circa Emeritam Lusitaniæ in maxima laude est. Gignitur & in Galatia, Africa, Pissidia, Cilicia, pessimum in Sardinia.

*Materies.*

Ilex medullam magnam, & perspicuam habet, corno duriores, spissiorumque, qua valuarum sumptuosarum cardines facere solent artifices, faciundosque architecti præcipiunt medulla, quam cor nonnulli vocitant. Hos ilici ad axes plaustrorum, & iuga lytarum, psalteriorumque. In ignariis terebrum ex ilice fieri solet, quod pati pertinacius esse debet. A quo Plinius. Secatur in laminas prætenues ilex, colore quoque non ingrata, sed maximè fideliis, quæ teruntur, vt rotarum axibus, ad quos duritia utilis. Terebris vaginas utilissimas fieri tradunt, ex eadem malleos. Hyginus. Manubria rusticis iligna. Tota olsea est ilex, eadem & sine medulla.

*Desu-*



## De subere. CAP. III.

**S**UBER etiam glandifera arbor, & perpetuæ frondis, & si Theophrastus (textus lapsu vi spero) deciduæ dicat. Pausanias in Arcadicis, vnum ex tribus glandiferarum arborum generibus dixit.

Græcis *φειλός* est. Iones, reliquique & Hermefinax elogus Poëta *φειλόν* & ipsum corticem nominant. Vocant & *Ἰφὸν* à cortice, quasi aquis immerfabilis, & altipedus. Latinis suber. Italis *fonero*. Nomen.

Arbor suber, vt à Theophrasto describitur, est admodū procera, auctu insignis, parum ramigera, ligno robusto, cortice præcrasso, & in senectute asperius, vt in picea disrumpi solito, verūm prægrandioribus segmentis, folio fraxinī longiore, crassiori que, deciduo, glande aquifoliæ. Corticem detrahere oportet, ne deterior fiat arbor, qui triennio post subnascitur. Cortice in orbem detractō, omnis arbor interit, excepto subere, quæ sic etiam iuuatur, tam externo, quàm interno carni propinquo. Tardissimo ferè omnium germine. Plinius ab eo. Suberi minima arbor. Glans pessima & rara, cortex tantum in fructu præcrassus, atque renascens, atque etiam in denos pedes vndique explanatus. Vfus eius anchoralibus maximè nauium, piscantium que tragulis, & cadorum obturamentis: præterea in hyberno fœminarum calceatu. Quamobrem eas nō infacerè Græci corticis arborem appellant. Cortice carnosō. Cortice in orbem detractō necantur arbores, excepto subere, quod sic etiam iuuatur: crassescens enim præstringit, & strangulat. Folio indeciduo. Tardissimo germine. Ex eius glande fungosam suam carnem fieri. Descriptio.

Arbor suber Pyrrheni familiaris ex Theophrasto. Pausanias in Arcadicis nasci ait syluis. Plinius nec in Italia, nec in Gallia nasci ait. Nos in Campania vidimus, & qua itur Romam via, in syluis copiosissimam. Calum.

Lignum, ex Theophrasto, rigidum est. Simulachra diis ex subere primū factitata sunt, sed successit in eius locum palma. Columella. Si regio suberis ferax est, fabricanda apibus aluearia ex eius corticibus, quia nec hyeme rigent, nec cadent æstate. Pausanias scribit in Arcadicis suberem tam exucco, & leui cortice esse, vt ex eo anchorarum in mari indices, & fundarum faciant. Plinius. In subere tempestiuè cæso euenit, vt neq; pandatur, neque vicatur, aliàs obnoxium, etiam vt torqueat sese, findat que. In aquis non fluitat lignum, si dematur cortex. Tardissimè vetustatem, cariem que sentit, aut saltem ex reliquis tardissimè. Sunt qui fœminam ilicem vocent, atque vbi non nascitur ilex, pro ea subere vtantur, in carpentariis præcipuè fabricis, vt circa Elin, & Lacedæmonem. Sed falsò hæc verba Plinius suberi tradit, quæ Theophrastus phellodri tribuerat, vt inferius videbimus. Vitruuius de eius materie. Suber pariter habet mixtionem humoris, & ignis, & terreni, aëris plurimum, per uia raritate humores penitus recipiendo, celeriter mucescit. Ex suberis natura, quod in aqua non sedit, sed alijs alligatur. ne submergi possit, tractum est Materies.



vulgare adagium, ut apud Pindarum, *ὡς φέμος*, id est tanquam suber, de his, qui dissimulare, aut mergi aduersis fortunæ procellis nesciunt.

*De suberiquercu. CAP. IIII.*

**D**IXIMVS de subere, dicturi de quercu, dicemus nunc de suberiquercu, quæ ex utraque componitur arbore: nam ut nomen, sic ab utroque parente imaginem refert.

*Nomen.*

Theophrastus *φαιμόδρον* appellat, ex nomine *φέμος*, id est suber, & *δρὺς*, quercus, quasi Latinè suberiquercum dicas. Arcadibus etiam *smilax* dicitur eodem authore. Itali etiam Græcos imitati, *Cerroscuaro* vocant.

*Descriptio.*

Ita phellodris à Theophrasto describitur. Arbor ilici similis, folio nō aculeato, molli, profundo, differentiis pluribus distincto. Materie soluta, tenera, mediæ naturæ inter robur, & ilicem. Sunt qui aliud negent esse quàm ilicem fœminam, ut ilex ubi desit, utantur hac in carpentariis præcipuè fabricis, quod Lacedæmone faciunt, & Elide. Dore agrestem eam appellant. Lignum eius quàm ilicis candidius, & fuluius, quàm roboris. Materie quoque durior, sed quàm ilicis solutior in opere. Foliū ambobus simile, sed iligno maius, & quercu minus. Speciosior medulla, quàm ilicis. Fructus minimis glandibus æqualis, acylon vocant, quemadmodum & roboris. Plinius ab eo. Sunt qui fœminam ilicem vocent, atque ubi non nascitur ilex, pro ea subere utantur in carpentariis præcipuè fabricis, & circa Elim, & Lacedæmonem.

*De quercu. CAP. V.*

**S**EQVUNTUR glandifera, quæ caluitium patiuntur. Plutarchus Chero-neus inter arbores sylvestres quercum fructu bellissimā, & fertilissimam dicit. Arborum prima nata dicitur: unde Arcades cum hac cognationē quandam habere dicti sunt, quoniam omnium primi ex terra homines fuisse perhibentur, immò ante lunam & astra. Statius.

*Arcades hinc veteres astris, lunaq; priores,  
Agmina fida datis: nemorum vos stirpe rigenti  
Fama satos.*

Pelasgus vir magnus ac sapiens, primus Arcadas glandium cibum docuit, à quo & ipsa regio Pelasgis dicta est: prius enim herbis ac stirpium frondibus vescebantur, ideoq; *βαλανοφάγοι* dicti. auctore Pausania in Arcadicis. Plinius, Ciuica corona iligna primo fuit, postea magis placuit ex esculo Ioui sacrā. Variatumque & cum quercu est, ac data ubique quæ fuerat, custodito tamen honore glandis. Plutarchus in Coriolano, Propterea Ioui sacram quercum dixerunt, quòd ex ea ciuica corona, quæ ei dabatur qui ciuem seruasset, contexeretur. Sed cur ciuicas coronas ex quercu fieri sit institutum à veteribus, plures imaginari possunt causæ. Alij honorem hunc Arcadibus attribuunt, quod eos oracula solita sint ob vetustatis honorem glandifagos appellare. Alij quod

quercus



quercus facilem & expeditum cibū militibus afferat. Alij quòd Ioui sacra sit, in cuius tutela sunt ciuitates: vnde congruebat, vt qui ciuem seruasset, ea fronte coronaretur, quæ ciuitatum omnium tutelari deo dicata esset. Sunt qui tradant plantam omnium primam genitam, & populorum altricē fuisse. In nummis antiquorū multipliciter inscripta apparet, ad has proprietates designandas, quas longū esset recensere. Fortitudinis, & diuturnitatis, antiquitus symbolum fuit. Mos enim fuit veteribus fortitudinē, validasq; vires per quercum significare: viri enim viribus præstantes, robusti à robore nuncupantur. robur verò quercus dicebatur à robo, colore rufo, quòd ea materia plurimas rufas venas habeat. Quercus etiā ea quidem est vis, vt in seros vsq; annos suam diuturnitatem proroget, præcipuè si defossa, vel aquis macerata aliquantisper fuerit: eius enim materia incorrupta in ædificiis diu perennat. Significabant etiam quercus glande obscenitatem, ob eam scilicet, quam cum pudendi virilis mucrone similitudinem habet, & ob id Arcades, qui βαλανοφάροι dicebantur, obscenitate incessebantur. Extrat Cynici dictum de hac re, qui interrogatus de puero quodam lasciuo quisnam esset, respondit, Tegeates; ludens ex ambiguo: nam Tegea ciuitas est Arcadiæ, & regos interdum pro lupanari ponitur. Socrates in deorum sui temporis contumeliam per quercum deierabat, hac ratione, quod deum vnum, qui mundum, cælumque regeret, esse existimaret, qui ante foret, quàm quercus crearetur, & nasceretur. Fuit & iuxta Dodonam quernum nemus, in quo vocalis quercus responsa de dubiis dabat. Virgilius,

— atq; habita Graiūm oracula quercus.

Palladius ex glandiferis roboribus etiam apes mel conficere scripsit. Plinius stillicidia ponderosa habere. Cassianus, Multum fructū ferentes quercus longiorem hyemem prænunciant, dixit.

Græcis δρὺς est, sed Theophrasto ἡμελὶς, id est placita dicitur, vt ab Idæis acceperat, Macedones verò eam ἱτυμόςδρῳ, quasi veram quercum dixerunt. Sic & μύδιον. Nomen δρὺς videtur inditum à δρῦω, quasi erumpo, & impello, quod dictum genus celsius & procerius in altum excurrat, vel quod excrementitia quædam adnataque proferat, vt fungos, muscum, vellera, agaricum, & similia. Antiquitus saronos dicebatur, à qua Saronicus sinus, querno nemore redimitus, & Saron in Arcadia nemus trans Ladonem fluuiū, et si Pausanias à Saronē, qui post Anthipum regnavit, dictam vult. Latinis quercus. Italis *quercia*.

Theophrastus quercum ab hemeri non distinguit, inquiens. Quæ glandem dulcissimam fert alij quercum, alij hemerim vocant. Plinius aliter diuidit. In ipsis verò arboribus, quæ maximam glandem fert, hemeris vocatur, breuior, & in orbem comosa, alasq; ramorum crebro cauata. Fortius lignum quercus habet, & incorruptius, ramosa & ipsa, procerior tamē, & crassior caudice. Et paulò superius in marem, & fœminā quercum distinxerat, sed in querna glāde: alia dulcior molliorque fœminę, maris spissior. Quæ ex Theophrasto prauè inter-



pretatus est: nam quam Theophrastus hemerim, nos quercū quam ipse syluestrem quercum vocat, nos robur, de quo in sequenti. est quercus hemeris, sed nobilior hemeris fagus est, hanc nos mitiorem quercum, & dulcissimam dicimus. Nunc de hemeri quercu, mox syluestri, tandem de fago dicemus.

*Descriptio.*

Ita suam hemerim Theophrastus describit. Neq; recta, neq; laevis, neq; procera est, comatur in orbem, contorqueturq; in alas, crebro ramorum sinu cauata, materies valida, sed infirmior, quā fago (scilicet Græcorum.) Dulcissima ei glans post fagū. Fert gallas ad coria vtilēs. Fronde decidua, sed in agro Thuriō, vbi Sybaris perspicua, quercū fuisse traditur perpetua fronde, nec vnā cum aliis germinantem, sed post ortum Caniculæ. Radice in profundū acta. Grandior ætate, fecundior redditur. Causa est, quod viribus detractis alimēti quoque nimia vbertas detrahitur, atq; ita reliquum pabulū percoqui, dispensariq; facile potest. A quo Plinius. Maximam glandem fert hemeris, breuior, & in orbem comosa, alasq; ramorum crebro cauata. Fortius lignum quercus habet, & incorruptius. Ramosa & ipsa, procerior tamen, & crassior caudice. In Thuriō agro, vbi Sybaris fuit, ex ipsa vrbe prospiciebatur quercus vna, nunquam folia dimittens, nec ante mediam ætatem germinans. Idq; mirum est, Græcis auctoribus proditū, apud nos postea siliari. Inferiori sui parte fertilior. Radix carnosā, copiosaq; eamq; in profundū agit. A Vergiliatū occasu glandiferæ semen reddunt. Diuturnioris vitæ. Iuxta urbē autem quercus in illitumulo tunc satæ dicuntur, quū cœpit illium vocari. In Pentō circa Heracleā aræ sunt Iouis Stratiij cognomine, ibiq; quercus duæ ab Hercule satæ. Sed Varro à Theophrasto habet. Item Sybari, qui nunc Thuriij dicuntur, quercus simili esse natura, quæ est in oppidi conspectu. Quercus deorsum (de vallibus loquitur) fertiliores, quod Plinius de infera arboris parte protulit. Ipse Italiam querno folio assimilauit: multo proceritate amplior, quā latitudine in læua se flectens cacumine. Pat fuerat vt terra omnium terrarum alumna, eadem & parens, numine deorum electa, quæ cælum ipsum clariū faceret, sparsa congregaret imperia, ritusq; molliret, & tot populorum discordes ferasq; linguas sermonis commercio contraheret ad colloquia, & humanitatem homini daret, breuiterq; vna cunctarum gentiū in toto orbe patria fieret, arboris frondem omnium pulcherrimam, & nobilissimam æmularetur.

*Celsum.*

Apuleius humidis locis gaudere ait. Nasci quercus in rubro mari glandiferas tradunt, nasci quoque in alto propiores terræ. Theophrastus prodidit, super lapides atq; restas fictiles sine radicibus, sed patellarum modo adherescentes, folio carnosō, crasso, atq; oblongo, miricæ simili, accedentis ad purpuram coloris. Forma ei flexuosā, atq; in latitudinem diffusior, ramis breuib; contortis, spissis, magnitudo arboris tota paulo sesquipede amplior. Hæ mulieribus lanæ tinguntur. Ramis earum annexę pendunt conchæ quardam, & cauti-  
bus parte ima, vbi millepedes, & aliæ generis eiusdem bestiolar, quodq; polypi  
speciem gerit, populantur. Alia ram quercū in mari nascentem refert glandi-  
feram.



feram, cuius fructus sit cōmodus. Item alias magnitudine insignes: sed ea nau-  
fragis & vrinantibus comperta sunt. Scribit Athenæus in Lulitania profundo  
mari quercus esse glandiferas, vnde thunni vescantur, ob id thunnos qui di-  
cant marinos esse porcos, minimè discedunt à vero. Cauchis, circa duos præ-  
cipuè lacus, vt Plinius est author, littora ipsa obtinent quercus, maxima auidi-  
tate nascendi, suffossæque fluctibus, aut propulsæ flatibus, vastas complexu  
radicum insulas secum auferunt, atq; ita libratae stantes nauigant ingentium  
ramorum armamentis, sæpe territis Romanis classibus, quum velut industria  
fluctibus agerentur in proras stantium noctu, inopesq; remedij illæ, prælium  
10 nauale, aduersus arbores inirent.

Dumosos, glareososq; montes glandē postulare retulit Columella. Plinius *Solum.*  
in plana descendere dixit. Horatius querceta Gargani pluris facit, & sacra scri-  
ptura quercus Basan. Glandifera & Arcadia.

Seritur semine quercus, & deterior euadit. Itaq; quum pleriq; ex iis, quæ in *Satis.*  
Epyro nascuntur, seuissent, nullo pacto prouenire similis potuit. The. Cassianus  
Oëtobri mense omne semen spargi posse admonuit. Virgilius plantis serere  
docuit.

*Plantis & dura corylina nascuntur, & ingens  
Fraxinus, Herculeaq; arbor umbrosa corona,  
Chaoniq; patris glandes.*

20 In consuetudine animaduertendum, quod ab aliis adnotatum est. Quercus &  
olea tam pertinaci odio dissident, vt altera in alterius scrobe depacta moria-  
tur. Quercus verò & iuxta nucem iuglandem. Ex Plinio. Quercus etiam ex-  
cisa radices noxias oliueto relinquit, quarū virus enecat oleam. Ex Columel-  
la. Hinc ortum symbolum, vt quum iracundiam, & inexorabilem animi aspe-  
ritatem sese ad lenitatem dedisse significandum sit, quercus cum olea compli-  
ceretur: nam quum quercus insignis sit asperitate, atque adeo inimica oleæ, vt  
iuxta se positam extinguat, & olea parisi, & lenitatis indicium, iis simul com-  
plicatis, feritatem mansuetudine delinitam ostendimus. Apud nos transplan-  
30 tata ægrius concipit.

Quercus pyros ferre Plinius est author. Sed M. Varro quercum non reci- *Institu.*  
pere dixit. Insetitur & in vlmum. Virgilius.

— glandemq; suos fregere sub vlmis.

Carinas naualibus quernas subiici præcepit Theophrastus, maximè triremibus: *Materia.*  
abieti, aut pino ferrum unari non potest quercus insociabili natura, q̃ hæc spissa  
corpore sit, illa tenui raro. Palladius durabilē ait, si terrenis operibus obruatur,  
& aliquatenus palis. Et de panimētis loquens ait. Axes quernæ cū æsculeis non  
misceantur: nam quercus humore concepto, quū se cœperit siccare, torque-  
bitur, & rimas in panimēto faciet. Sed si quercu suppetere æsculus desit, subti-  
40 liter quercus sicceatur, & trāsuersus, atq; directus duplex ponatur ordo tabula-  
rum, clavis frequentibus fixus. Lucinæ deæ simulachrum è quercu factū prodidit



Eusebius. Vitruuius. Quercus terrenis principiorum societatibus abundans, parumq; habens humoris, & aëris, & ignis, quum in terrenis operibus obruitur, infinitam habet eternitatem, ex eo, quod quum tangitur humore, non habens foraminum raritates, propter spissitatem non potest in corpore recipere liquorem, sed fugiens ab humore resistit, & torquetur, & efficit in quibus est operibus, earimosa. Hesiodus de materia aratri.

— *dura dentalia quercus.*

Nec pretereundum duco Alexandri Macedonis inuentum seruanda niuis, in serobes, vbi ea sit, coniectis è quercu ramis.

### De robore. CAP. VI.

**D**IXIMVS de quercu, nunc de robore, quasi de miti ad syluestrem. Sunt enim qui robur & quercum nil differre putent, nos tamen authorum testimonio, & experientia quercum domesticam, robur syluestrem arborem esse demonstrabimus. Columella inter eas differentiam facit. Vacerra, genus ciatorum fabricatur ex robore, quercu, vel subere. Et de pedamentis vinearum loquens: Quercus, suber, ac si qua sunt similia robora. Plinius. Probatissimos fungos quercus producit, robur, cupressus, & pinus noxios. Glandè propriè fert robur, quercus, esculus & ilex. Robur montes, & valles amat, quercus in plana descendit. In quercu glans optima, & grandissima, in robore parua, & suibus caro ex roboris glande fungosa. Alibi. Vulgò robur, quercum que nasci videmus. Hæc demonstrant quercum à robore differre. Refert Pampphilus quod serpens moritur quercinis foliis iniectis. Fimeta palo roboris adacto fieri iubet Plinius, ita forte ne innascantur his serpentes.

*Nomen.*

Theophrastus *αζελαν δρυὸν* vocat. Latini robur, antiqui authores, Festo Pompeio authore, robosenum pro robore dicebant, ratione, quod plures rufi coloris venas habeat. Alij à robore, seu à diurnitate dictum malunt. Vulgò *ronece*, *quercia*, *seluaggia*.

*Descriptio.*

Ita describente Theophrasto. Cortice crasso, carnosio, & scabro, & maximè in senecta. Materie carnosæ. Ramos habet incòditos. Medullam nigram præsertim quod nigrum cognominant. Lignum durum, quamobrem flexum non recipit. Folio toto ambitu sinuoso. Radicibus multis longisque, quippe si locum habeant expeditum, subire quantumvis facilè possunt, carnosæ, & albis. Alij florere putant, alij negant, sed muscum floris loco edi autumant. Fructificant post Vergiliarum occasum. Germinatione terna parturiunt corticemq; inter squamas spargunt, ac deinde rumpunt, ob id trislepri, aut trillipi vocatæ, hoc est intermissariæ, vel triquamia. Germinationis tempore omnis galla quoque nascitur tam nigra, quàm candida, magna ex parte noctu vniuersa. Inque diem aucta excepta resinacea, si ab æstu occupetur, inarescit, augeri que amplius nequit, aliàs amplitudine maiore grandesceret, qua de causa eorum aliquæ non minores fabis euadunt: nigra si pluribus diebus vi-

ret,



ret, mali amplitudinem capeffit. Robur omnium copioſiſſimè, præter fructum alia gignit: nempe gallam paruulam, atque alteram reſinoſam, & nigram, quin & aliud ſpecie veluti morum, ſed durum, & fractu admodum difficile. Id tamen rarum. Ad hæc aliud effigiem colis repræſentans. Quum verò perficitur, durum quid parte emicâte, & perforatum, & tauri caput quodammodo æmulans profert, quòd præruptum, nuclei oleæ ſpeciem intus oſtendit. Fert & quod quidem pilum appellant. Id pilula eſt comam gerens lanaceam, mollem, nucleo durior, qua in lucernam luminibus vtuntur. Flagrat enim probè, vt galla nigra. Fert & alteram comigeram pilulam, cæterum quidem inutilem, verno autem tempore ſucco melligeno inficientem, tum tactu, tum guſtatu. Inq; ramorum alis pilulam aliam gignit ſine pediculo, concauoq; ſellilem, peculiarem certè, verſicoloremq;ue. Nam eminentes quosdam vmbilicos candicantes, vel paſſim variantes nigris maculis habent. Partem mediam grani tinctura infectam, ſplendidamq; oſtendit, aperta, nigra, & putricans cernitur. Lapillum quoq; puniceum magna ex parte gignit, quamquam raro. Item aliam eo ratiorem pilulam è foliis conuolutam, compreſſam atq; oblongam. Super foliis verò tergo adherentem pilulam fert candidam, aquoſam, dum tenera eſt. hæc enim muſcas interdum intus continet, venienſq; ad incrementum iuſtum, in modum levis paruulæ gallæ indureſcit.

Robur, tot præter fructum producit. Fungos omitto, qui è radicibus, & iuxta radices erumpunt, communes enim eos cum cæteris habent arboribus: quin etiam muſcū taceo, quippe quum in aliis quoque proueniat, ſed nihilominus ferax hæc arbos habetur rerum plurimarum. Sin autem, authore Heſiodo, mella apesq; ferat, magis quoq; illud confirmatur. Ergo naſcitur hic melleus humor cælo cadens, nec aliis magis inſidens frondibus. A quo Plinius. Robur folia toto ambitu ſinuata habet, emicantia etiam ex caudice ipſo. Germinationem intermittit tripartito, ac terna germina edit, ideo & inter ſquamas corticum ſpargit, quòd omnibus arboribus in germinatione euenit, quoniam prægnantium rumpitur cortex. Eſt autem prima earum incipiente vere, circiter x v diebus. Iterū germinant, trāſeunte Geminos ſole. Sic fit vt prima cacumina impelli ſequutis appareat, geniculato incremento. Tertia eſt earūdem ad ſolſtitium breuiſſima, nec diutius ſeptenis diebus: clareq; & tunc cernitur excreſcentium cacuminum articulation. Cortice craſſo, ſcabroq;, radicibus carnoſis, eisq; in profundum actis, maximis, ſpatioſisq;. Tota oſſea. Galla deterrima ex robore: ſignum eius quòd cauernæ tranſlucent. Robur præter fructum plurima & alia gignit: namq; fert & gallæ vtrumq; genus, & quædam veluti mora, ni diſtarent arida duritia, plerunq; tauri caput imitantia, quibus fructus ineſt nucleis oliuæ ſimilis. Naſcuntur in eo & pilulæ, nucibus non abſimiles, intus habentes flocculos molles, lucernarum luminibus aptos: nam & ſine oleo flagrant, ſicuti galla nigra. Fert & aliam inutilem pilulam cum capillo, verno tamen tempore melligeni ſucci. Gignunt & alæ ramorum eius



pilulas corpori non pediculo adhaerentes, candicantes umbilicis. Cætera nigra varietate dispersa. Media cocci colorem habent. Apertis amara inanitas est. Aliquando & pumices gignit, nec non & è foliis conuolutas pilulas, & in folio rubente aquosos nucleos candicantes, & translucidos, quamdiu molles sint, in quibus & culices nascuntur, indurescunt in modum gallæ. Ferunt robora & cachryn, ita vocatur pilula in medicina vrædi vim habens. Gignitur postquam decidere folia, hyeme durans. Continet nucleum piceis similem. Is crescit hyeme, aperitur vere pilula tota, cadit quum folia cœperint crescere. Tam multifera sunt, & tot res præter glandem pariunt robora. Sed & boletos, suillosq; , gulæ nouissima irritamenta, quæ circa radices gignuntur. Robora ferunt & viscum, & mella, ut author est Hesiodus. Constantq; rores melleos è cœlo, ut diximus, cadentes, non aliis magis insidere frondibus. Galliarum glandiferæ maximè arbores agaticum ferunt. Est autem fungus candidus, odoratus, antidoris efficax, in summis arboribus nascens, nocte relucens. Signum hoc eius, quo in tenebris decerpitur. Virgilius ad mel alludit in Pollione.

*Et dura quercus sudabunt roseida mella.*

Sed nos quam robur vocamus, in syluis passim spectatur, folio latebrarum anfractibus sinuosissimo, paruo, duroq; , glande exigua, aspera, & ingustabili, materie durissima.

**Solum.** Solum profundum quarrit, quia radice omnium altissima insidet; durum, & montanum, vel montano proximum, sed solutum, humidum, & sabulosum respuit. 20

**Calum.** Circæum, quod vocant excelsum, promontorium tradit frequentissimum roborum Theophrastus. Montes & valles diligere dixit Plinius. Locis frigidis, septentrioni obiectis, & apricis passim ubiq; vidimus.

**Satis.** De robore diuersam sententiam esse scribit Theophrastus: quidam enim ex semine tantum eam produci statuunt, alii ex radice quoq; , sed lentè, nonnulli etiam ipso caudice detruncato. Auulsione & radice, nihil ex his, quæ ab imis plantigera non sint, exoriri posse arbitrantur.

**Insitio.** Robur insitionum omnium capacissimam dixit Plinius, verum corrumpit saporem. Nos castaneam recipere vidimus. 30

**Materia.** Robur durum simul, & ponderosum est. Antequam terebrent madescent, quod scilicet mollius reddant. Natura perpetua, æternaq; , sed defossam, atq; in aquis demersam: putredine quippe immune hoc omnino videtur: ob id fluuiis, lacubusq; naues hac etiam materie condunt, sed mari putrescit, quamquam reliquæ magis durare valeant, quod quidem & ratio vult, utpote quum sale macerata, conditaq; sint. In opere difficillima, quod crispa sit, nodosa, circumuolutionibus perplexa. Medulla spissa eius, quod atrum cognominat. Ponderi nil cedit, ut reliquæ terrenæ, sed renititur: argumentum quod nunquam rumpitur, sed prius quam viribus carie, aliasve deficiunt. Tam nauibus, 40 quam domibus commodum, nec non & in terra obrutum durat. Carborescunt è robore



è robore nouello & annoso damnant, media ætas in pretio est. Carbones optimos spississimæ materies faciunt, vt aria, robur, arbutus: solidissimos enim ita, vt diuturniores, efficacioresq; sint, qua de causa in metallis argenteis hisce ad decoctionem primam vtuntur, sed deterrimi inter eos roboris, quòd terrestriores. Tardissimè cæditur, hyeme ineunte, ante quàm turgēt: tempestiuè cæsum, neque cariem sentit, sed prædurum ad cornus similitudinem spissatum edurat, totum enim cordis specimen præfert. Serissimè ergò cæditur, videlicet hyeme post autumnū: quòd si sub turgore cædatur, citissimè omniū ferè cōputrescit, seu cū cortice, seu sine cortice capiatur, potissimū, quæ primo turgore, proxima quæ secūdo, tertia quæ tertio. Quæ autē post fructuum maturitatē cæduntur, quāuis non turgida sint, incorrupta perdurant, præterquam quod sub cortice vermiculi quidam nascentes, caudicem per summa inscribunt, quibus signis pro sigillis nonnulli vtuntur. Non desunt, qui tempestiuū putant vere, quum amentum, id est, cachryn suam gerit. A quo Plinius. Robori tanta duritia est, vt terebrari nisi madefactum non queat, & ne sic quidem adactus auelli clauus. Robori exalburnato nigricans color. Robur sub pōdere incuruatur, ceditq; ponderi. Viride ferris cedit, aridum enim pertinacius resistit, ferrarūq; dētes replet æqualitate inertī, qua de causa alterna inclinatione egerunt scobem. Glutinum abdicat, & inter se, & cum aliis inso-

ciabile glutino. Vere cæsum teredinem sentit, bruma autem neq; vieatur, neque pandatur, alias obnoxium, etiam vt torqueat sese, findatq;. Cariem vetustatemq; tardissimè sentit, defossū diuturnius, sed marina aqua corrumpitur. Apud nos robur quia neruosum, & densum est, pro columnis validissimè constituimus. Supra terram inconstans, contorqueus sese, & rimosum fit, dulcibus aquis demersum nulla marcoris tabe cōficitur, sed mari maceratum, conditumque putret, quasi dulcibus gaudeat, & salas horreat aquas: nisi sal humida, non sicca à corruptionis vitio vindicer.

## De Fago. CAP. VII.

30 **D** V. o sunt glandiferi fagi genera, vnum à Græcis, alterum à Latinis descriptum, quæ etsi glandiferis annumeretur, fructū nil glandibus similem habet, de qua posterius dicemus, nunc de Græcorum fago quercui simillima; nec aliud differt, nisi quòd rotundam, & dulcissimam glandem affert. Pausanias in Arcadicis inter diuersa quercuum genera fagum annumerat.

Græcis *φάγος* dicitur, vt M. Varro libro de gente Romana existimauit, Sossipatro referente. Seruius *ἀνὴρ τὸ φάγειν*, quod est comedere, dici voluit, loco enim φ Græci, prisci Latini s ponebant. Latinis fagus, Neapolitanis *quercia castagnara*, quod castanearum saporem æmuletur.

Masculini & fœminini generis meminit Theophrastus. Peculiare fago, & *Geneta*. haliphlaro, quòd ambabus in genere dicto virili glādes parte postrema vtrinq; lapidesunt. Est & syluestris, & urbana, est & quæ glandem amaram ferat.

40 Urbana fagus ligno lauiore constat. Peculiare, quòd in genere virili *Descriptio*.



glandes postrema parte lapidescunt utrinque; aliis in putamine, aliis in carne ipsa, ideoque detractis lapillis, cohaerent perinde atque in animalibus relinquuntur. Materie robustissima, putredinique nulli obnoxia, sed nec ipsa recta, quamquam minus torta, quam quercus, caudice verò crassissimo constat, ut tota quoque brevis specie reddatur. Nam eius etiam corpus in orbem comosum, minimeque erectum est. Glande rotunda. Germinat paulò ante æquinoctium. Aucta facillima. Sylvestris dulcissimum fert glandem, ligno plus scabro. Apud nos in triuiis, & syluis cuique obuia, nec ab aliis, nisi rotunda, & dulcissima glâde cognoscitur, cruda, tosta, elixaque; satis commodè editur, ut castaneæ videantur.

*Calum.*

Urbana in cultis prouenit, sylvestris montibus nascens.

19

### De Cerro. CAP. VIII.

**I**DÆI, & Macedones, ut Theophrastus refert, cerrum roboris speciem faciunt. Plinius è glandiferis propriè dixit.

*Nomen.*

Græcis ἀγίλωψ, ut & Latinis ægilops, & cerrus Plinio. Italis *cerro*.

*Descriptio.*

Cerrus ægilops rectissima, excelssima, lauiissimaque; ligno per longitudinem robustissimo. Panum sola fert, longitudine cubitali, branchiarum similitudine, canum, muscosum, ceu villum lintei prolixum. Nascitur è cortice non surculo, unde glans, nec ex gemma, sed à supernorum nodorum latere. Cerrus ἀστεύς, ut Macedones putant, aut sterilis, aut adeò improba glande, ut nullum animal, præter suillum genuse ea vescatur, quòd ingustabilis sit, ac ne suis quidem, si pabulum aliud nanciscantur, eaque; caput tentat mandentium. Hæc Theophrastus. A quo Plinius. Cerrus propriè fert glandem, sed tristem, & horridam, echinato calyce ceu castaneæ. Excelssima ægilops, sola è glandiferis fert panos arentes, muscoso villo canos, non in cortice modo, verum & è ramis dependentes cubitali magnitudine, odoratos inter vnguenta. Ceream glandem proximam quernæ tradit Nigidius, nec ex alia solidiorem carnem, sed duram. Apud nos cerrus procera admodum exurgit, recta, minusque; ramosa. Calyce glandis echinato, carne intus amarissima, quæ à suis gustata, respuitur, nec nisi in caritate annonæ caducam depascuntur. Abdicata quoque fabricis, ut quæ flexu, fractuque; inauspicata, in terris autem recipitur. Est altera species cuius glandes prægrandes habent calyces echinatos, ambitu spinis prædito sibi incumbentibus, magnitudinem ferè echini marini æmulatur.

20

30

*Solum.*

Nunquam in cultis, aut rarenter nasci scripsit Theophrastus. Incultis amica. Plinius. Apud nos quibuscunque; locis obuia, & vulgaris.

*Materies.*

Cerri materies elaborata ædibus construendis inauspicata, quòd facillimè rupta fathiscat, eaque; fultæ domus facillè ruinam sentiunt, casumque; citò minantur, ob id rudi & indolata ad intestinum opus, & utensilia vtuntur. Damnata etiam in carbone, quoniam exiliat, & scintillas ei aculetur: ærariorum tantum officinis compendio, quia flatu desinente protinus emoritur, parumque; absumptus, tardè recidit in fauillam. Ab eo Plinius. Minus utilis ædificiis; at

40

quæ



quæ carbone dotata, vitiis obnoxia est. Quamobrem solido vtuntur carbone, ætatorum tantum officinis compendio, quoniam desinente flatu, protinus emoriens sæpius recoquitur. Cætero plurimis scintillis. Hyginus manubria rusticis cerrea. Celerrime marcescēs. Vitruvius, Cerrus pariter habet mistionem humoris, & ignis, & terreni, aëris plurimum, peruia raritate humores penitus recipiendo celeriter marcescit.

*De Esculo. CAP. IX.*

**M**ACROBIUS inter felices arbores esculum adducit. Ciuica coronai-  
ligna primò fuit, postea magis placuit ex esculo, Ioui sacra: dixit Plini-  
10 us. Eius fructu primæ ætatis homines vescebantur, & ab esca nomen traxisse  
volunt, quòd ante cerealem frugem, & vsum frumenti, mortalibus arbor vi-  
ctum subministrabat. Et ob id Ioui sacram dicebant. Ouidius,

*Et quæ deciderant patula Iouis arbore glandes.*

Theophrastus *παιτύρμαρον* vocat, Theodorus latifoliam vertit, quoniam in- *Nomen.*  
ter glandiferas arbores folii latitudine præstet. Latini esculum vocant. Serui-  
us ab esu dictam vult, et si obtinuerit vsus, vt per æ diphthongum scriberetur.  
Neapoli vulgò *eschia*.

Proximè ab ægilope latifolia rectissima, excelssissimaq; post haliphlaum, *Descriptio.*  
ædificiis verò deterrima. Carbone inutilis, quin & maximè post illam putre-  
10 scit. In glandium censu tertia latifolia. Galla eius haud absimilis quernæ, nisi  
quòd leuior, sed ad rem nullam utilis. Fert & alteram nigram, qua lanæ infici-  
untur. Macedones esculum amaram glandem ferre inquiūt. Plinius ab Theo-  
phrasto. Glandem propriè fert, post quercum optimam. Fungosam carnem  
feri ex esculo tradit Nigidius. Minus utilis est ædificiis, at quæ carbone dotata,  
vitiis obnoxia est, quamobrem solido vtuntur carbone, ætatorum tantum of-  
ficinis compendio, quoniam desinente flatu, protinus emoriens sæpius reco-  
quitur, cætero plurimis scintillis. Galla similis quernæ sed leuior, multoq; mi-  
nus probata. Fert & nigram: duo enim genera sunt, hæc tingendis vtior. Ra-  
dices in profundum agit: Si Virgilio quidem credimus, esculus quantū corpo-  
30 re eminet, tantum radice descendit. Autumno reddit semen. Virgilius,

*Esculus in primis, quæ quantum vertice ad auras*

*Æthereas, tantum radice in tartara tendit.*

*Ergo non hyemes illam, non flabra, neq; imbres*

*Conuellunt: immota manet, multosq; per annos*

*Multa virum voluens durando secula vincit.*

Gallam habet esculus cæteris longiorem, lineis quibusdam per longitudi-  
nem ductis. Cadit Octobris medietate. Suum carnem grauem facit. Omnium  
maximè viuens putrescit, & concuatur.

Nullum terræ delectum habet, sed in quacunq; feri posse, dixit Plinius.  
40 Incultis amica.

*Solum.*

*Calum.*



Satio.

Plinius nasci è balano dixit, sed non nisi esculi: serobe dodrantali, interval-  
lis duorum pedum feritur leuiter quater anno. Nimis morosa nasci. Virg.

*Pars autem posito surgunt de semine, ut alta  
Castanea, nemorumq; Ioui quæ maxima frondet  
Æsculus, atq; habitæ Graiis oracula quercus.*

Materies.

Æsculus caesura triennio serior, nimis morosa nasci. Hoc pedamentum mi-  
nimè putrescit, latumq; maximè fruticat. Humoris impatiens. Hæc Plinius.  
Sed Vitruuius. Æsculus verò quod est omnibus principiis tēperata, habet in æ-  
dificiis magnas utilitates, sed ea quum in humore collocatur, recipiens penitus  
per foramina liquorem, eiecto aëre & igni, operatione humida potestatis vi-  
uiatur. Palladius in fundamentis sine vitio durare dixit.

*De Haliphlæo. CAP. X.*

**I**NTER quina roboris genera haliphlæum annumerant Idæi, authore  
Theophrasto.

Nomen.

Cui ἀλίφλοιος, & εὐδύφλοιος dicitur. ἀλίφλοιος ab ἀλῆς & φλοῖος, quasi crassicorti-  
cem dicas. Theodorus falsicorticem vertit. & εὐδύφλοιος quasi recticorticem.  
Latinis, ut Plinio, haliphlæos dicitur.

Genera.

Duo videtur habere genera ex Theophrasto, quum dicat, quòd ambo, id  
est, fagus, & falsicortex in genere virili glandes postrema parte vtrinq; lapide-  
scunt, aliis in putamine, aliis in carne ipsa, ideoq; detractis lapillis, concava per-  
inde, atq; in animalibus relinquuntur.

Descriptio.

Theophrastus ita describit. Crassissimus huic caudex, & plerunq; cauus,  
aut fistulosus magna ex parte cernitur. Ædificiis damnaur, breui putrescit,  
quod ex arboris natura euenit, concava inanisq; redditur. Sunt qui corde hæc  
volunt carere. Fulmine frequenter icitur, quamuis altitudine non excellat, a-  
dèd neq; ad sacrificia vti fas erat apud Æoles. Panum etiam producit, sed ni-  
gricans, pusillum que, ideo in glandium censu quartum ei gradum tribuunt.  
In genere virili postrema parte lapidescit, ut diximus. Materies ædificiis inuti-  
lis, nec non carboni. Item ad axes, & ad eiusmodi similia utilis est. A quo Pl-  
nius. Pessima & carboni, & materia haliphlæos, cui crassissimus cortex, atq;  
caudex, & plerunque cauus fungosusque, nec alia putrescit ex hoc genere,  
quum viuit. quin & fulmine sæpissime icitur, quamuis altitudine non excel-  
lat, ideo ligno eius nec ad sacrificia vti fas habetur. Eidem raro glans, & quum  
tulit amara, quam præter sues nullum attingat animal, ac ne ea quidem, si  
aliud pabulum habeant. Sed postrema verba; Glans rara, & quum tulit ama-  
ra, quam præter sues nullum animal attingat, & ne ea quidem si aliud pabu-  
lum habeant, non recte Plinius haliphlæo ascribit, quæ Theophrastus ascrip-  
di, id est, Macedonica cerro tribuerat.

Materies.

Cæditur eo tempore, quo robur, id est, hyeme post autumnum, ex Theo-  
phrasto.



## Farno. CAP. XI.

**E**ST & aliud glandiferæ arboris genus, farnum vocant, cuius Latini non meminere, quod sciam.

Latini farnus, Itali *farno*, Neapolitani *fargna*.

Nomen.

Descriptio.

Arbor brevis, & in orbem comosa, ramorum alis crebro caua, glandem maximam, & dulcissimam affert, omnium glandiferarum præcoccissimam. Initio Octobris cadit. Sæpe carnem pinguem, & leuem reddit. quum ipsa cadere desit, aliæ incipiunt. Folio maiori, quàm quercus, sed cacumine reru siori, nec tam profundioribus crenis cauo. Trunco aspero, & hiulco. Glandes multas, & simul congestas affert. Scinditur in laminas ad tectorum & tuguriorum operimenta. Altera eius species serior est, nam quum aliæ cessant, ipsa parere incipit. Vocant *verdesca*. Glans mediocriter magna, & dulcis.

*De Latinorum fago, siue Theophrasti oxy.*

## CAP. XII.

**I**NTER glandiferas arbores Latinorum fagus annumeratur, & si eius fructus parum, aut nil glandi similis sit, vt inter cognatas potius, quàm eiusdè generis arbores connumeretur. Plinius. Sylvarum certè distinguebatur insignibus, Fagutali Ioui etiam nunc, vbi lucus fageus fuit. Plutarchus in Symposio ait. Vipera fagi ramulo tacta, confestim obstupescit. Macrobius inter felices arbores fagum annumerat.

Theophrasto ὀξύνη, vel ὀξύν dicitur. Lydis *μύσι*. Theodorus scissimam vertit, quasi in laminas sectilem. Latini fagum vocant. Itali *fagio*.

Scissima nullas penitus differentias habet, sed genere simplex. Plinius cædam notauit, & rufam, & pro generum differentia folia longiora, breuioraq;

Genera.

Surgit arbor recta, læuis, & enodis, proceritate crassitudineque ferè parabiæti, & in cæteris non absimilis. Materie colorata, robusta, nervosa, corticelæui. Folio crasso bifido, longiore quàm pyro, per extrema aculeato. Fructus glandea effigie, læuis, includitur caliculo echinato quidem, sed placido, & blando, nec vt castanea hispido, similis tamen illi dulcedine & succo. Radices nec multas, nec altas agit, sed summorenus sparsas. Nasceitur in montibus candida materie, quæ ad multa perutilis est, quippe ad carpentaria, lectos, subsellia, mensas, & nauigia. Campestris nigra, ad hæc minus expetita. Fructus vtrique similis. Macedones syluestrem scissimam non florere existimant. Plinius de sua fago hæc habet. Fagi glans nucleis similis, triangula cute includitur. Folium tenue, ac leuissimum, populo simile, celerrime flauescens, & media parte plerunq; gignens supernè paruulam baccā viridem, cacumine aculeatam. Fagi glans muribus gratissima est, & ideo animalis eius vnà prouentus, glires quoq; saginat. Expetitur & turdis. Arborum fertilitas omnium ferè alternat, sed maximè fagi. Glans fagea suam hilarem facit, carnem coquibilem ac leuem, & utilem stomacho. Glans dulcissima omnium fagi, vt qua

Descriptio.



obsessos etiam homines durasse in oppido Chio, tradat Cornelius Alexander. Apud nos visendæ magnitudinis exurgit arbor, fronde alni, glande triquetra, pusilla, acuminata, vnde ἰξύα Theophrasto nominata videtur. Flore ex pluribus foliolis conglobato, herbacei coloris, longiusculo. Ligno quàm robur minus robusto, compactoque, cuius nucleus pro esca, & oleoso condimento à pauperibus expetitur.

Locus.

Lydi in suo monte Olympo copiosum habent, Strabone & Eustathio authoribus. Prouenire in agro Latino solitam author est Theophrastus, tanta longitudine, vt nauibus Hetruscis pro carina satisfaceret. Plinius in plana descendere ait. Nos in frigidissimis montibus, & conuallibus in Surrentino tractu altissima fageta vidimus. 10

Materia.

Humidissimam esse tradit Theophrastus, quamobrem è duabus iis lectulæ qui fierent, incuruatur cedentes ponderi. Minoribus nauibus cõmendatur ad carinas, itẽ ad testudinẽ plaustrorum, vectabulorumq; vilem fabricã. Cædenda mateties post messem, & exitũ vindemiarũ. In aquis durat incorrupta, madefactaq; firmior redditur. Plinius. Scådula è fago, & cortex in magno vsu agrestiu, vasa corbesq; ac patentiora quedam mellibus conuehendis, vindemiisq; faciunt, atq; prætexa tuguriorum. Scribit in recenti ad duces explorator, incidens literas à succo. Nec non in quodam vsu sacrorũ religiosus est fagi cortex. Pectines quoq; transuersi in pulpa apud antiquos factitabantur, inde & 20 valis honos. In pretio habita est ad sacrificum guttum: Marcus Curius iurauit, se ex præda nihil attigisse præter guttum faginum, quo sacrificaret. Lignum in longitudine fluctuatur, at quæ pars fuerit ab radice validius sedit. Non improbat & fagus in aqua, hæc quidem in his, quæ defodiuntur, principalis. Facilis & fagus quamquam fragilis, & tenera. Eadem scetilibus laminis in tenui flexilis, capsisq; ac scriniis sola utilis. Vitruuius de fago eadem dicit, quæ de cerro, & subere supra retulimus. Fagus in sicco utilis, in humore corrumpitur ex Palladio. Claudianus de vsu in nauibus.

*Sic qui vecturus longinqua per aquora merces*

*Obiectare parat, fagos metitur, & alnos.* 30

Pocula etiam è fago antiquitus fiebant, vt & temporibus nostris. Virgilius.

*Pocula ponam*

*Fagina, calatum diuini opus Alcimedontis.*

*De Siliqua. CAP. XIII.*

**I**AM ad alteram syluæ partem deuentum est, scilicet pomiferam. Nemora conuenientissimum esse, tradit Columella, vestiuntur quercu, fago, ceris, ilicibus, oleastris, tamaricibus, corylis, pomiferisq; syluestribus, vt sunt albæ spinæ, græcæ siliquæ, iuniperus, lotos, pinus, cornus, arbutus, prunus, paliurus, atq; achrades pyri. Vinum ex ea fieri docet Plinius. Nos ab iis incipiemus, quæ æterna cæsarie decorantur. 40

Nomen.

Græcis ξαρπία est, κίεξ enim cornu dicitur, κίεξιν cornicula, quod siliquæ



quæ seu vaginæ cornu formam incuruam arcus instar præferant. Galenus *καρυνίαν* arborē, καρύον fructū dicit, & post eū Paulus. Hippocrates *ὀπκίεας*, recētiore Græci *ξυλοκίεας*. Theophrastus hanc siliquam, vt Iones, *καρυνίαν* nominat, & *συκὴν αἰγυπτίαν*, sed errāter, nulla enim in Ægypto, sed in Syria nascitur, & in Ionia circa Cnidum Rhodumque. Varro siliculam vocat. Columella siliquam græcam, & addidit græcam, vt à fœno græco distingueret, nam absolute siliqua dicitur. Plinius siliquam, & syriacam. Arabes caraba. Ob id Itali ex his nominibus deflectunt eorum vernacula nomina, alij enim *carobole*, *Carietæ seleccole*, à siliculis.

- 10 Theophrastus ita suam Ægyptiam ficum describit. Caudice maxima ex parte suum fructum producit, ramis enim paucum fert. Folii semper comantibus, flore candido, & grauissimè olente, leniter radice sublimi, atque omnino plantigera imis partibus, superius tamen subarescens. Fructum anniculum simul, & nouum habet, altero nanque detracto post Canis ortum, protinus alterum gigni patescit: gignitur enim vix modo indiscretus, atque vniformis, auctus circa Arcturum & æquinoctium floret, dehinc hyeme exacta durat vsque ad Canis ortum. Ab eo Plinius. Similis his siliqua, quam Iones *cerauniam* vocant, trunco & ipsa fertilis, sed pomo siliquæ. Ob id quidam Ægyptiam ficum dixere, errore manifesto. Non enim in Ægypto nascitur, sed in
- 20 Syria, Ioniaque, & circa Cnidum, atque in Rhodo, semper comantibus foliis, flore candido cum vehementia odoris, plantigera imis partibus, & ideo superficie flauescens, succum auferente sobole. Pomo antecedentis anni circa Canis ortum detracto, statim alterum parit, postea florem per Arcturum hyeme fœtus enutrente. Alibi verò de vulgari nostra siliqua loquens, oblitus eorum quæ scripserat: Alia siliquis gignuntur ipsis dulcibus, semenque cõplexis amarum, quum in pluribus semina placeant, in siliqua damnentur. In siliquis quod manditur, quid nisi lignum est? Non omittenda seminis earum proprietate: nam neque corpus, nec lignum, nec cartilago dici potest, neque aliud nomen inueniat. Haud procul à castaneis abesse videantur & prædulces siliquæ, nisi
- 30 quod in iis cortex ipse manditur. Digitorum hominis longitudo illis & interim falcata, pollicari latitudine. Strabo de arboribus Indiæ loquens ex Aristoboli autoritate, dicit arborem esse non magnam, neque magnas siliquas habentem, vt faba, denorum digitorum longitudine, mellis plenas, quas qui ederint, non facile euadant. Arbor apud nos procera exurgit, ramis in latitudinem potius, quàm in longitudinem diffusis, corticis colore albo fusco, folio fraxini duriore, rariore, ac magis circinato. Frondes enim pari interuallo exoriuntur, ternæ aut quaternæ, quæ in cacumine est, parem numerum conturbat, pediculo palmari longitudine, flore surculoso, floret æstate vsque ad hyemem, vel appetente vere: fructificat æstate, vel autumno ex trunco à radicibus paulò
- 40 distant: truncus siliquis totus operitur, sic & maiores rami, minores parum, aut nihil. Radice sublimi, vt vento sæpius deturbetur.



*Calum.* Palladius loca maritima, calida, sicca, & cāpestria amare dixit, tamē, vt ipse expertus est, in locis calidis fœcundior fiet, si adiuuetur humore. Caietę maximē pubet, & in Surrētino tractu. In frigidissimis nō viuit, in frigidis vsq; ad florem.

*Solum.* Siccum solum amare nobis videtur, & callosum.

*Satio.* Columella ab idibus Februarij vsq; in æquinoctiū vernum rectē feri putat. Plinius: siliquas Græcas per autumnum ante brumam. Palladius, Febuario & Nouembri semine, & plātis, & si adiuuetur humore, potest & taleis poni. Scrobem desiderat largiorem. Beritius vt oleæ plantat, humidis tamen locis à nona Calendarum Ianuarij die, vsque ad quartam Calendarum Februarij.

*Infitio.* Palladius inferi posse mense Febuario credit in pruno, vel amygdalo, & omnes fructus recipere posse. In versibus.

*Assuescunt siliquæ viridi mollescere succo,  
Et gremio pascunt cætera poma suo.*

Nos supra terebinthum inseruimus, & optimē apprehendit, & profecit.

*Cōdiura.* Siliquæ seruantur diutissimē: si extendantur in cratibus, ex Palladio.

*De Arbuto. CAP. XIIII.*

**P** V B E T etiam in syluis æterna fronde arbutus. Virgilius in syluis nasci testatur:

*— cum iam glandes, atque arbuta sacra  
Deficerent syluæ.*

*In Ecloga. Dant arbuta syluæ.*

Est & arbor hœdis fronde expetita, vt idem.

*Dulce satis humor, depulsis arbutus herbis.*

Fructu etiam delectantur merulæ, turdi, aliæq; aues, vbi fructus hyeme maturi sunt, & alij defunt, vnde visco, retibus, aliisve decipulis capiuntur.

*Nomen.* A Theophrasto κόμαρος dicitur arbutus, & νηλεία, & fruct⁹ οἶναρος. Immo sunt, qui diuersum esse dicant apud Theophrastū vnedonem & arbutum. Inquit in primo. De fluo cortice sunt vnedo, & arbutus. Plinius id considerans ait. Duobus nominibus vocant Græci, comaron & memecylon, ex quo apparet totidem esse genera & apud nos: alio nomine arbutus vocatur. Et alibi. Arbutus, siue vnedo. Dioscoridi arbor κόμαρος, fructus verò μυμάγκυλος dicitur. Galenus verò & Paulus fructum epimelidis vnedonem vocant, non arbuti, quasi mespili, nam Dioscoridis δῆμυλις mespili genus dicitur. Is nanq; sexto simplicium plantarum, δῆμυλις, inquit, acerba planta est, vt dicere possis, syluestris malus: appellatur autem à multis in Italia οἶνεδον, cuius fructus acerbus. Vnde vnedo fructus epimelidis, inemecylon arbuti. Inde secundo de alimentis, comaron vocat, cuius fructus memecylon. Plinius quatuor nominibus vocat, comaron, arbutum, vnedonem, & memecylon. Virgilius arbutū pro fructu neutro genere dicit, arborem fœminino. Horatius fructum fœminino. Virgilius

*— dant arbuta syluæ,  
Et qua vos rara viridis tegit arbutus umbra.*

*Hora.*



Hæc ratiū. *Impanētutum per nemus arbutos*  
*Querunt latentes.*

Pamphilus apomelida pyri genus arbitrat, quod amamelida quidam vocant, alij omomelida, frequentem in Ionia, & biteram, fructu pyri, sed sui generis, omnino prædulci, & sine nucleis, ac prælato pyris. Hipomelides, siue epimelides, vt Martialis asserit, poma fert sorbo similia, mediocri arbore nascētia, flore cādido: sapor ex acri dulcis, ita vt fructui insit dulcedo cum acrimonia commista. Latini arbutum, & vnedonem vocant. Itali *corbezolo*, Neapolitani *sorbo peloso*.

- 10 Ita describit Theophrastus. Arbor magnitudine nō nimium præstat, corticem tenuem tamarici similem habet, folium inter ilicem, & laurum. Floret mense Iulio. Flores singulari appendice parte postrema racematim coherant, similes baccis longioribus myrti, non foliati, sed concavi, ceu ouum pertuso vertice, quū deflorescit, parte, qua sunt annexi, perforantur, & quod defloruerit in pediculum relabendo, verticilli instar circa fusum tenue apparet. Fructus anno integro maturescit, vt simul hunc haberi, atque alterum flore sponderi contingat. Folia inferiora dimittit, cacumine perpetuū viret, ramisq; præposito alliduè gignit. Quia fructus humidus, ideo frigoris excessu concoqui non potest. Dioscorides. Arbor cotoneæ malo non dissimilis, tenui folio, cuius  
 20 fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo. Maturus autem flauet, aut rubescit, in esu acetosus. Virgilius hyeme suos fructus maturare dixit.

*Venit hyems, teritur Sicyonia bacca trapetis,*  
*Glande sues latere redeunt, dant arbuta sylva.*

Plinius. Aliud corpus est terrestribus fragis, aliud congeneri eorum vnedoni, quod solum pomū simile fructui terræ gignitur. Arbor ipsa fruticosa. Fructus anno maturescit, pariterq; floret subnascens, & prior coquitur. Pomum in honorem, vt cui nomē ex argumento sit vnum tantum edendi. Iuba author est, quinquagenū cubitorum altitudine in Arabia esse. Cortex ei cadit. Ouidius fructus ruboris meminit.

- 30 ——— *pomoq; onerata rubenti*  
*Arbutus.*

Apud nos hyeme fructu superbit, coccineo aspectu micanti, numeroso, cæteris arboribus tunc suis priuatis, acetosis conflato partibus, ac guttur exasperantibus, alioquin alio tempore respueretur: flore luteolo.

Mas sit an fœmina sterilis inter authores non conuenit, inquit Plinius.

Frigori resistere posse dixit Theophrastus. In Arabia Plinius nasci dixit. Palladius amare loca tepida, aprica, maritima, & statum rigidum reformidare. Æschyllides in Ceo insula prouenire fructus, quos vocant amamalidas, sine nucleo, grati saporis. Sed terram qualemcunque non respuere.

- 40 Palladius ex Martiale mēse Decembri feri nucleis in vasculis positis. Mense autē Februario hypomelidis plāta, sed pollicis magnitudine robusta trāsfertur

Genera.  
 Cælum.

Solum.



breuissimo scrobe, soluta terra, plurimo stercore. Sed munienda est, quia cito arefcit, si radices eius ventus afflauerit. Apud nos in syluis nascuntur, hominum artem & opera aspernantur, solo naturæ genio contentæ, quas si colueris deteriores euadunt, & interdum moriuntur. Arbutus, ex Propertio, laborem omnem veretur.

*Aspice quos summittat humus formosa colores,*

*Et veniant hedera sponte sua melius:*

*Surgat & in solis formosus arbutus antris.*

**Institio.**

Inferi non posse dixit Palladius. Sed in versibus de nuce idem sic scribit.

*Arbutæ frondes vasta nucis occupat umbra,*

*Pomaq; sub duplici cortice tuta refert.*

*Inferitur verò ex fœtu nucis arbutus horrida.*

Idem confirmavit Diophanes inquiens: Nux in arbutum solum inferitur.

**Materies.**

Carbones optimos spississimæ materies faciunt, vt arbutus, ita vt diuturniores, efficacioresque sint. Qua de causa in metallis argenteis hisce ad decoctionem primam vtuntur.

**Conditum.**

Poma eius aut in picatis, & munitis vrceolis, aut scrobe populi, aut in ollis inter vuas vinaceis obruta seruabuntur. Ex Palladio.

#### De Loto arbore. C A P. X V.

**Q**UONIAM & in syluis lotus arbor, Columellæ autoritate pubet, nos & de ea inter syluestres bacciferas arbores conscribemus. A Macrobio inter felices arbores numerata est. Ferunt nympham sui nominis in hanc arborem conuersam, quam Priapus fugientem comprimere conquisisset, nomen dedisse. Ouidius.

*Haud procul à stagno Tyrios imitata colores,*

*In spem baccarum florebat aquatica lotos,*

*Lotus in hanc nymphe fugiens obscæna Priapi,*

*Contulerat versos seruatò nomine vultus.*

Lori arboris fructus Homerus, princeps vatum, suis carminibus nobilitauit, quum missis exploratoribus, qui incolas eius terræ discerent, reditu illorū destitueretur Vlysses. maluerunt enim apud Lotophagos remanere, vt mellitum arboris fructum comederent, quàm in patriam redire, vt penitus reditus obliuiscerentur.

**Nomen.**

Græcis λωπὸς δένδρον, lotus arbor, nam & herbae sunt hoc nomine complures. Græcorum vulgus anacacabeam arborem, & anacacabon fructum dicit, author est Aëtius. Latinis verò faba græca dicitur, & ob id ita dici putauerim, quod fructus tuberculo fabæ similis sit, & sui dulcedine in cibis placeat. Seruius fabam Syriacam dici autumat à nymphæ sui nominis in hanc arborem versa, vt diximus. Padi incolæ fabam græcam vocant. Afri celtim, Neapolitani melo fiocco, Zafaracchio.



Suam lotum ita depingit Theophrastus. Lorus pyri magnitudine surgit,  
 aut paulò infra. Incisuræ in folio crebriores, alioquin ilicis viderentur. Ampli-  
 tudo fabæ pomo, color croci, sed ante maturitatem alius, atq; alius sicut in vuis.  
 Nascitur in ramis densum myrti modo, inter sese aduersum. Manditur inter  
 Lotophagos innocua dulcedine suauitateque, nec ventris sentire morbos fe-  
 runt, qui eo subinde vescantur: iucundius, meliusq; quod sine interiori nucleo  
 est, qui in altero genere osseus videtur. Tanta verò fructus & arboris copia  
 narratur, vt exercitum Ophelli Carthaginem petentis in comneatuum defe-  
 ctu pauerit. Non desunt qui fruticosam, ramosamq; arborem esse dicant, cau-  
 dice firmo, ac fideli, fructu qui nuce obducitur, foris minimè carnosso, sed pel-  
 lulari, & cuticulaceo, nec cibo tam dulci, quàm gustu aliàs iucundo. Vinum  
 quod ex eo conficitur, vltra binos, ternosve dies negant durare, à quo tempo-  
 re statim acorem contrahit: suauioreni itaq; fructu apud Lotophagos haberi.  
 A quo Plinius. Eadem Africa, quæ vergit ad nos, insignem arborem lotongi-  
 gnit, quam vocant celtin. Magnitudo quæ pyro, quanquam Nepos Cornelius  
 breuem tradat. Incisuræ folio crebriores, alioquin ilicis viderentur. Magnitu-  
 do fructui fabæ, color croci, sed ante maturitatem alius, atq; alius, sicut in vuis.  
 Nascitur densus in ramis myrti modo, non vt in Italia cerasi: tam dulci ibi cibo,  
 vt nomen etiam genti terræq; dederit, nimis hospitali aduenarum obliuione  
 patriæ. Ferunt ventris non sentire morbos, qui eum mandunt. Melior sine in-  
 teriore nucleo, qui in altero genere osseus videtur. Vinum quod exprimitur  
 illi, simile mulso, quod vltra denos dies negat durare idem Nepos, baccasque  
 contusas cum alica ad cibos doliis condi. Quin & exercitus pastos eo accepi-  
 mus, vltro citroq; comneantes per Africam. Alibi verò. Lotos siue faba Græ-  
 ca, quam Romæ à suauitate fructus syluestris quidem, sed cerasorum penè na-  
 tura, loton appellant. Præcipuè domibus experitur ramorum petulantia, breui  
 caudice, latissima expatiantium vmbra, & in vicinas domos sæpè transilientium.  
 Nulli opacitas breuior, nec aufert Solè hyeme, decidentibus foliis. Nulli cor-  
 tex iucundior, aut oculos excipiens blandius. Nulli rami longiores, validioresq;,  
 aut plures, vt dixisse totidem arbores liceat. Viuax arbor, & æquæua quibus-  
 dā vrbibus. Romæ verò lotos in Lucinæ area, anno qui fuit sine magistratibus  
 ccc lxxix, vrbis æde condita, incertum ipsa quanto vetustior. Esse quidem  
 vetustioreni non est dubium, quum ab eo luo Lucina nominetur. Hæc nunc  
 circiter annum ccccl habet. Antiquior illa est, sed incerta eius ætas, quæ  
 capillata dicitur, quoniam Vestalium virginum capillus ad eam defertur. Ve-  
 rum altera lotos in Vulcanali, quod Romulus constituit ex victoria de decu-  
 mis, æquæua vrbi intelligitur, vt author est Massurius. Radices eius in forum  
 vsque Casaris per stationes municipiorum penetrant. Durauit, vt fertur, ab  
 vrbis æde condita (incertum quantum ipsa fuerit vetustior) longissimo arbo-  
 rum æuo, ad Neronis incendia, adhuc iuuenis viridisque, victura, nisi princeps  
 ille arboris mortem accelerasset. Sunt, qui breuem tradant arborem, vt Poly-



bis, qui & vidisse se testatur, spinis asperam, folio virenti, quale rhamno, tantum profundiore latioreq; fructu, candidæ myrti per initia, processu puniceo, magnitudine oliuæ, sed rotundo. Eum cibo familiæ tundi cum nucleo, qui per exiguus ei est, seruari conditū, eundem nucleum herilibus mensis eximi. Saporē fici, & Etnicobalani inesse pomo, sed præstantiori odore. Vinum & acetum inde fieri. Dioscoridi lotus magnitudine iustæ arboris adolescit, fructu maiore, quàm piperis, dulci, graueolente, qui edendo fit, & utilis stomacho.

**Genera.** Genera eius plura, dicit Theophrastus, fructibus inter se discreta produuntur. Vnum est genus sine interiori nucleo, & vinum eo exprimitur. Plinius, Differentiæ plures, eaq; maximè fructibus sunt. Melior sine interiori nucleo, qui in altero genere osseus videtur. Vinum quoq; exprimitur illi.

**Cælum.** In Africa celtis plurima, optimaq; gignitur. Est in insula Lotophagia Phari-de vocata larga copia, cæterum non minor in continenti, sed longè largior est, plurima enim hæc omnino in Africa. Plinius à Theophrasto. Africa parte, qua vergit ad nos, loton gignit, & ipsam Italiæ familiarem. Præcipuè circa Syrtes, atq; Nasamonas.

**Materia.** Materia Cyrenaicæ præfertur, nam tractum Lotophagorum feruidiorem confirmât. Radici nigritia maior, quàm ligno, sed minus spissa, & ad pauciora cōmodior, quippe quum tantū ad pugiones, & glutinamenta vsui sit. Lignum tibiis, & aliis plerisque expetitur. Spissitate & grauitate, & coloris nigredine, post buxū & ebenum ei primatus indubie datur. Simulachra ex ea sculpere solent, rimas enim non capit, & carnis æqualitate quodāmodo constare videtur. Natura perpetua. Medullā habere loton, quā multi carere putant, constat argumēto, quòd ea valuarū sumptuosarū cardines factitare solēt artifices. Propter nimiam spissitatē enodis est, aut paucissimis nodis. Ab eo Plinius. Ligno collos niger, ad tibiarū cantus expetitur. E radice cultellis capulos, breuesq; alios vsus excogitat. Post ebenū, & buxū durissima, & siccissima. Cariē & vetustatē non sentit. Cortice pelles tingūt, radice lanas. Tota ossea est, & sine medulla.

#### De azadarat Arabum. CAP. XVI

**S**ÆPE monachorum claustris, & templorum vestibulo visitur hæc arbor, ea Cisalpinæ Galliæ nemora abundare vidimus, lenem & perpulchram umbram parit, & flores odoratos.

**Nomen.** Auicenna eam appellat azadarat. Hispani ex florum, foliorumq; speciositate arborem paradisi vocant. Apud nos innominata viuít. Sunt qui albam zizipham velint.

**Descriptio.** Arbor spatiosa surgit, folio fraxini, cortice subuiri, albis punctulis cōsperso, rami fragiles, baccas profert oleæ, vel cerasi magnitudine, vt ex eis globulos faciant, quibus mulieres & monachi suas numerent preces, fructus loti arboris instar, flore suaueolente racematim congesto, stellato, purpureoq;.

**Cælum.** Cælum calidum, vel temperatum diligit, rigidum horret.

Seritur semine, quatuor digitis in terra conditur; rigetur sæpius, & nascitur.



terminatio veris. A bimatu transplantetur. Seritur etiam sobole, ex his, quæ radicibus pullulant. Seritur etiam trunco, dummodo omnis terra abscondatur, ut solum cacumen supersit, veris initio, et si agrè concipiat.

Poma multa recipit in insitione, odorataq; reddit, ut pyra, sed in oculatione non finditur lignum, quia fragile, & fissura ultra quàm velles descendit. Insitio.

*De Caprifico. CAP. XVII.*

**D**ICEMVS de ficu in pomario, hic de caprifico, etsi in aliarum arborum historia, ubi de sativa, eodè capite & de sylvestri dixerimus ob cognationem, & affinitatem quandã, quæ erat inter utrãq;: at ficus, & caprificus longo distat intervallo, euidentissimamq; & summã differentiã habent, ut sativa ficus urbana dicatur, caprificus sylvestris. Theophrastus dux erit. Et si multa ex sylvestribus mansuescant cultu, & alia ex urbanis transcant in sylvestres neglectu, tamẽ neq; caprificus, neq; oleaster, & pyra, ficus, olea, pyrus fieri possunt. Sed si vnq; ex caprifico ficus, aut ex ficu caprificus fieret, aruspices præ ostento haberet, tanq; prodigia, & præter Naturæ normã accidere arbitrarentur. Plinius, Prodigio sunt fici ex caprifico, & contra, graui ostento, quum in deteriora mutantur. Caprificus tauros quamlibet feroces collo eorũ circumdata in tantũ mirabili natura compescit, ut immobiles præstet. Plutarchus de fico refert, & eius rei causam affert, ut videbimus. Vnde Ægyptii quum hominem à priori petulantia sibi modestius consulentem ostendere vellent, pro istiusmodi homine taurum caprifico collum, caput, & armos vestientem proponebant. Visitur sæpissimè caprifici ramus Iunonis simulacro suspensus, cuius causam ex Varrone non reticebimus, quod non apud Romanos erant Caprotinæ nuncupatæ, quibus matronæ sub ficu Iunoni sacra faciebant, & ex caprifico virgã adhibebant ob memoriam seruatae pudicitia. Philotis enim ancilla senatui persuasit, ut pro matronis, & virginibus, quas hostes dari sibi obsides petebat, ipsa cum ancillis aliis habitu matronali cultis submitteretur, cuius laudata sententia, quum omnes hæ secum portiones meracasin lætitiæ signũ attulissent, conuiuiumq; simulassent, hostes lætabundi, comestatione & potu gaudentes post iocos quiescere dederunt. Hic Philotis signum dedit ex caprifico, quæ de mœnibus propendebat. Romani exenti imperum in dormientes faciunt, eosque cadunt, potitq; victoria sacrum instituere, ut ancillæ matronis æquatæ, Iunoni, quam à caprifico Caprotinam appellauere, sacrificaret. Ad id Ovidius.

*Porrige, & ancilla, qua pœnas luce pependit*

*Lusa maritali gallica veste manus.*

Bubulas etiã carnes additi caules caprifici magno lignorũ compendio coquunt, ex Plinio. Contra autẽ chamæleon circa caprificos ferus, alioquin innoxius. ex eodè. Tanta est differens erga diuersa animalia vnus plantæ virtus.

Græci vocant *τεφρόν*, ut Pausanias ait in Messeniis, quòd in Erino Thessaliæ, vel ut alii volunt Achaïæ, municipio primũ apparuerit, ut Phocioni placet. Alii, ut Phauorinus, fici speciem ab Erino vrbe Dorica. Tzezes Lyco-

*Nomen.*



phronis interpretres ficum fatuam vocat, nonnulli *ἀλώεζα*. Messenii *τράγον*, quòd Apollo Aristomeni, & Theoclinati de salute consultantibus significauit, *ἵε τράγος πίνοντι νέδης ἐλικάρρον ἵδωρ, ἐκέντισται πρὸς ἡμᾶς*. Est Neda fluius, cuius fontes in monte Lyceo visuntur, in Arcadiam fluens; eo oraculo tragus arbor caprificus, non hircus intelligitur, quæ in Nedæ ripa enata, in fluuium deflexa excreuit, vt solis humorem quodammodo haurire videretur: hanc autē Theocles conspiciens, caprificū, capri nomine intelligere voluisse Apollinē, è Neda bibentē coniecit: quū itaq; iam Messeniis impenderet fatale malū, reliquos celauit, Aristomenē ad caprificū perduxit, & rē omnem aperuit, & sic interpretatus est oraculū: Ipse Nedes dum hircus bibat alta fluēta, nec vltrā, Messenien seruo: Propē enim instant tristia fata. Hæc Pausanias in Messeniis. Latini caprificum à carpendo dictam volunt, quòd muros, ac parietes carpat. Martialis,

*Marmora Messaba findit caprificus.*

Plinius. Caprificus vocatur è syluestri genere ficus nunquam mature scens: *Italifico seluaggio.*

*Genera.*

A colore, & fructificatione generum discrimen sumit caprificus, nempe alba, & nigra. Theophrastus tradit caprificos potissimū laudari nigras, ob rationē, quòd permulta hæ grana contineant. Eadē Plinius. Caprificorū laudantur maximè nigra, & in petrosis, quum frumenta plurima habeant. Aliud discrimen quòd alia bifera, alia trifera est. Plinius, In Cea insula caprifici trifera sunt, primo fœtu sequens euocatur, sequenti tertius: hoc sic caprificantur. Athenæus scribit Theophrastum secundo libro plantarum notare, caprificum esse biferam, alii triferam sicut in Ceo.

*Descriptio.*

E Theophrasto decerpitur descriptio. Viuacior fico, longeq; validior, spissior, fructu fœcundior existit. Eadem etiā nodo sior. Earū lac minime coit, aut prauē. Ersi ex syluestribus, fœcunda tamen. Celerius germinare incipit, vt inculta. quia germinat ineunte vere. Neglecta nō putatur, non pastatur, non ablaqueatur: idē non exhalat foras calor pastinatione & ablaqueatione, sed intus cohibetur, qui author est germinationis; & si putatione superioribus partibus allata fuerint plagæ, earum vulnere laborat arbor, friget contrahiturq;. Præterea in agrestibus remanent incolumes ramusculi pusilli, quos cultura auferre iubet, qui exiguitate eorum facile mutationem patiuntur, & ab ambiente aëre ad germinationum principia citantur. Accedit etiam siccitas: nam vbi humoris minus, operæ minus est. Plinius autem. Caprificus lactis minus habet, surculo quoq; eius lac coagulatur in caseum. Exceptum id, coctumq; in duritiā, suauitatem carnibus affert. Tristis est, quum non sentiat annorum gaudia, quia nullo flore exultatur.

*Solum.*

Theophrastus nemoribus gaudere dixit, & laudari ex locis ortas saxosis, ob rationem, quòd permulta hæ grana contineant, & vbi plurimus sit puluis, ibi plurimæ, validissimæq; caprificus exeunt.

*Satio.*

E ficario grano sato prouenire tradidit Theophrastus.

Syluestris,



Syluestris, seu fera ficus, vt testatum reliquit Africanus, mansuescet, si tuis *Art.*  
& vino & oleo maceratis ramis, eo septem diebus irroraueris imbre.

Caprificus nullis ferè vitiis obnoxia, vermiculationem nō patitur, lac enim *Infir. tem.*  
eius acerbius est omnino. Neque radicationem, syderationem, vel scabiem,  
neque radices vermiculantur, quædam nec suos grossos amittunt, etiam si fi-  
co inserantur. Plinius etiam tradit, eam omnibus morbis immunem esse,  
quos recensuit Theophrastus.

*De malo syluestri. CAP. XVIII.*

**N** VNC syluestre malum attingemus, habet enim multa, quæ sine reli-  
quorum confusione dici non poterant, ideo hîc digestissimus.

Græcis ἀγρίομυλλα generale nomen est malorum in syluis degentium, quæ *Nomen.*  
citra sationem & cultum proueniunt. Theocritus ὄρειμαλιδας, id est montana  
mala vocauit. Cato syluatica mala. Latinis malū syluestre. Italis *melo seluaggio.*

Syluestria, vt plurimum nomine vacare Theophrastus dixit, quum perpau- *Genera.*  
ci sint, qui eorum naturam experiantur. Nos & si inter se magnitudine, odo-  
re, colore, & facie differant, inutile existimamus per genera recensere, no-  
men tamen vnum syluestribus omnibus accommodabimus.

Theophrastus syluestria mala sui generis mitioribus odoratiore esse scri- *Description.*  
psit, ipsorumq, malorum tam agrestium, quàm satiuorum, quæ sunt acerbis-  
sima, suauissimè olere. Cuius rei suo de causis libro rationē affert. Atqui quum  
odor coctura quadam cōtrahatur, quæ maximè cocta fuerint, ea melius ole-  
re putandum est. Verùm odoris ratio in coctione minus absoluta, quàm sapo-  
ris versatur, argumento, quod mala, pyraque plus reddunt odoris, si in ple-  
num cocta non sint: plus tamen sapiunt, quum perfectam assequantur con-  
coctionem, quod in primis succorum mutationibus deprehendi non fuerit  
difficile: nam quum flatilis quædam sit odoris conditio, excelsus iam succus  
pauciorum halitum ac auram potest expirare, tum ergo minus odoris eiccta-  
bitur, quum concoctu crassior exultat, dulcedinem verò sensui gratam usur-  
pabit. Syluestre genus itaque priori concoctione contentum, vehementem  
30 concipit odorem. Urbanum quod perfectiorem adipiscatur cocturam, ali-  
mentoque saturetur, succos in dulcedinem vertit, sed odoris ignauiam ac he-  
betudinem colligit. Porro non parum refert in odoribus, si siccitas, si alimen-  
ti parsimonia, difflatio commoda præcesserit, quandoquidem quæ siccaneis  
erumpunt, pauciore contenta nutrimento; item quæ placido perflantur spiri-  
tu, proculdubio nascuntur odoratiore: etenim humor sese largius immiscens,  
odorem obtundit, & eius hebetat acrimoniam, ideo quæ dilutis & opacis tra-  
ctibus degunt, inodora percipiuntur. Caterum genus syluestrium aridius cer-  
nitur, ieiuniore donatum habitu, nec silens à flatu, sed magis, atque magis au-  
ra patens, hinc feruētior natura, quæ prospirat, tenuiorq; succus, halitui faci-  
40 le cedens, quum nec succum urbani modo carni permistum gerat: quæ qui-



dem omnia iunant ad odorem efficiendum. Præterea sylvestria mala marurius germinant mitibus, cuius spe in libro de causis affert rationem, quod foris calor non exhalatur, sed intus cohibetur, non enim pastinantur, neque ablaqueantur, calor enim est germinationis author. Adde quod vulneribus non laborant, non enim deputantur rami, aut decerpuntur fructus: demum quod incultis arboribus, & agrestibus ramusculi sint incolumes, in quibus propter exiguitatem, & facile cidentur principia genitalia ab aëre ambiente, & facile submouent materiam suam. Dioscorides hæc adstringentis esse succi dixit. Plinius, Sunt & mala parua, grati saporis, at enim acutiora odore sylvestria. Id peculiare improbitatis & acerbis conuiuium, & vis tanta, ut acie gladii perstringat. Præterea ipse Plinius sylvestres malos etiam biferas esse dixit. Nos ita describemus. Poma affert multò vrbani minora, improba, & acerba, colore quum maturuerint luteo, succo aspero. A pharimacopæis expetuntur ad succos eliciendos.

*De sorbo torminali. CAP. XIX.*

**P**V B E T etiam in syluis sorbi genus sylvestre torminale dictum, fructusq; affert feris, admodum à satiuo nostro diuersum.

*Nomen.*

Plinius torminale vocat, remedio tantum probabile, quod torminibus medeatur, ob id ad vsum medicum magis, quàm ad escam hominum natum. Neapolitani *ardicagna* vocant.

*Descriptio.*

Plinius ita describit. Minimo poma, assiduo prouentu, arbore à sorbo dissimili, foliis penè platani. Nos ita describimus. Surgit arbor non differens à nostrate sorbo magnitudine, & pceritate, cortice leui, materie valida, folio vitigineo siue platani, leui & neruoso, baccis oblongis, exiguis, sorbis similibus, in umbellâ coeuntibus, ex longis pediculis dependentibus, colore in nigro rufescentibus, sapore acido, & austero. Floret cū cæteris sorbis. Fructus maturat Nouembri.

*Locus.*

Nascitur frigidis in locis, nemoribus, syluisque, prope Capuam vidimus.

*Satio.*

Seritur sobole, & semine.

*Insitio.*

Tubera optime recipit, inter alia & fructificat.

*De Calabrice. CAP. XX.*

**N**V N C æquum est nostræ calabricis meminisse, à Columella inter bacciferas connumeratæ, tum quod nostro pomario, ob varios, quos recipit diuersorum arborum surculos, multiplicem præstat utilitatem, tum quod suorum nominum varietate non minimam inter doctos parit ambiguitatē, quum à diuersis, & ab eisdem diuersè etiam nominetur.

*Nomen.*

Græcis *ὄξυάκιστος*, & *ὄξυάκιστος* dicitur, ab *ὄξυς* id est acuta, & *ἀκίστος* id est spina, quasi acutam spinam dicas. Columella albam spinam vocat. Nemora conuenienter vestiuntur pomiferis sylvestribus, ut spina alba. Plinius spinam vocauit, siue sylvestrem spinam, & calabricem: quū dixit, Tuberes inferi possunt in calabricem, ea est spina sylvestris. sed ignorat esse Dioscoridis *ὄξυάκιστος*: nam quæ



quæ huic Dioscorides tribuit, ipse paliuro refert. Dicitur ab eo & spina appendix. Spina est appendix appellata, quoniâ bacca puniceo colore in ea appendices vocantur. Hæ crudæ per se, & aridæ in vino decoctæ aluum citam, ac tormina compescunt. Et spina nuptialis, vt coniicio. In eisdem situs (id est montosus, & frigidus) comitatur & spina nuptiarum facibus auspicatissima, quoniam inde fecerint pastores, qui rapuerunt Sabinas, vt auctor est Massurius. Ouidius in Fastis: quod maleficiorum esset amuletum.

*Ius pro concubitu nostro, tibi cardinis esto,*

*Hoc pretium posita virginitatis habe.*

*Sic fatus spinam, quæ tristes pellere posset*

*A foribus noxas (hæ erat alba) dedit.*

*Virgaq; Ianalis de spina sumitur alba,*

*Qua lumen thalamis parua fenestra dabat.*

Palladius spinam vocauit, quû myxa in spinis inseri posse dixit, & quû spinam sorbum recipere posse scripsit. Vocauit & calabricem, quû tubera ab ea recipi iusserit. Hermolaus crespinum, Ruellius berberim, nos *calabrice* vocamus.

Theophrastus eius meminit. Arbor medica aculeos habet qualis acuta spina. Fructificat post Vergiliarum occasum. Dioscorides. Arbor est pyraastro similis, spinosa valdè & minor, baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum, radicem multifidam, altè descendentem. Crebris diuisuris diffusa folia (vt capite de mespilo habet, quam nos *arouiâ*, siue *azareli* vocamus) quæ apij effigiem imitatur. Nos autem dicimus *azacolo* vocato tam similis folio, & fructu, vt idem existimemus, non nisi feritate ab ea distans. Baccis racemopendulis, sine succo, flore albo, odorato. Ab occasu Vergiliarum fructifera. Fructus tota hyeme durans, myrto similis, sed cum nucleo intus, pendens longissimis pediculis. Rustici nostri ad sepimenta ruris ea vtuntur, ad quæ nulla alia diuturnitate, spinarum hirsutie, firmitateq; magis valeat.

Solum arenolum, & solutum quærit. Ex montibus in plana descendere dicit Theophrastus.

Seritur sobole ex his, quæ sponte in syluis nascuntur, & seminibus ex arbore deciduis, & post biennium transplantatis.

Plinius. Neq; omnia insita misceri fas est, sicut nec spinas inseri, quando fulgura expiari non queunt facillè, quotq; genera insita fuerunt, tot fulgura vno ictu pronunciantur. Alibi. Tuberes melius inseruntur in pruno syluestri, & malo coroneo, & in calabrice, ea est spina syluestris. Quæcunq; optimè & myxas recipit, vtiliter & sorbos. Palladius recipere ait sorbû, & pyrum. De sorbo.

*Hæc arbor spina duos macronibus artus*

*Exiit, ac libris mitibus arma tegit.*

*De pomo, Et steriles spinos, & inertem fatibus ornum*

*Dotat, & ignotum cogit amare decus.*

Sic etiâ myxa docet recipere Aprili mense, tuberes Septembri, malû Februariis.

*Descriptio.*

*Solum.*

*Satio.*

*Insitio.*



nos cotoneum, mespilum, malum, & cerasum nō infelici successu inseruimus. Immo si sæpius suo surculo inseratur, tuberes proferre.

*De Persea. C A P. XXI.*

**D**E persea dicemus, & si peregrina arbor, & peregrinari nescia; ob nomen quod cum persico commune habet, de quo in pomario dicturi, multam doctis peperit ambiguitatem: ut quæ dicenda sunt, distincta videantur, de ea hic aliquid tractabimus. Plutarchus libro de Iside, & Osiride habet perseam Iliidi fuisse sacram, quod pomum eius cordis figuram, folium verò linguæ præseferret. Vnde Ægyptij quum pomū piangebant vno tantum folio adhaerescete, significabant linguam cordi coniunctam. Arborem & Harpo-  
crati dicarunt, quasi sermonem, qui fructus est intelligentiæ, sedem in corde, non in lingua habere deceat. Scribit Diodorus Siculus perseam in Æthiopia primū nitam, mox à Persis deuicta Æthiopia, ad se delatam, apud quos erat venenata, & cum cruciatu primum genita. Postea verò pœnarum causa à regibus in Ægyptum translata, terra hospitali mirigata. Ferunt autē Persas hanc arborem apud se lethalem habentes, in Ægyptum transmississe, plurimos ab eo perituros credentes, quæ contrario euentu ab his in cibos recepta,

*Nomen.* Theophrasto *πέρσια*, & *πέρσιον* dicitur, nomen est à vernaculo solo, nō quod à Perseo Memphi fata sit, ut Plinius refert. Latinis persea, Italis incognita.

*Descriptio.* Arbor persea dicta, ex Theophrasto, magna, aspectu grato, folio, flore, & ramo, totaq; figura potissimum pyro vicina: nisi quod huic caluescit coma, illi verò perpetua. Fructum semper parit, quippe nouus anniculum occupat. Maturitas Etæsiarum afflatu: alio tempore crudiuscula decerpitur & reponitur. Magnitudo longioris pyri, amygdalæ putamine clauditur, & corio coloris herbidi. Nucem intus habet, ut prunum, sed minorem multo mollioremque. Suauitas carnis prædulcis, & innocua etiam largiorem mandentibus, concoctu & deiectu facilem, radice prægrandi, longitudine, latitudine, & copia. Alibi. Quædam igitur ne germinare quidem possunt locis quibuldam, quædam germinare quidem, sed fructum nullum parere queunt, ceu persea Ægyptia in Rhodo: & si per loca ita procedas, fructificare quidem eam comperies, sed parcissimè, nec alibi, quàm in Ægypto largè, suauiterque fructum progenerat. Alibi. Persica in Ægypto, & locis proximis fructificat, quamquam in Rhodo vsque ad florem duntaxat perueniat. Plinius ab eo. Ægyptus & persicam arborem sui generis habet, similem pyro folia retinentem. Fertilitas assidua ei, subnascete crastino fructu. Maturitas Etæsiarum afflatu. Pomum longius pyro, inclusum amygdalæ putamine, & corio, colore herbido, sed vbi nuxilli, huic pomum, differens breuitate, ac mollietie, & quamuis blandiatur prædulcis suauitas, innocuum. Sed Columella hallucinatus putat nostrum vulgare persicum è Persia aduectum, & primò venenosum, nunc deinde mutata regione innocuum:



*Stipantur calathi & pomis, quæ barbara Persis  
Miserat (ut fama est) patriis armata venenis.  
At nunc expositi paruo discrimine leti,  
Ambrosios præbent succos, oblita nocendi.*

Plinius eum redarguens ait. Persicæ arbores serò, & cū difficultate transie-  
re, ut quæ in Rhodo nihil ferant, quod primum ab Ægypto earum fuerat ho-  
spitium. Falsum est, venenata cum cruciatu in Persis gigni, & pœnarum causa  
à regibus translata in Ægyptum, & terra mitigata. Id enim de perseæ diligen-  
tiores tradunt, quæ in totum alia est, myxis rubentibus similis, nec extra ori-  
entem nasci voluit. Eam quoque eruditiores negauerunt ex Perside propter  
supplicia translata, sed à Perseo Memphi satam. Et ob id Alexandrum illa co-  
ronari victores ibi instituisse in honorem atavi sui. Semper autem folia habet,  
& poma subnascentibus aliis. Galenus in Alexandria perseam se vidisse testa-  
tur, magnis arboribus cōparandam, cuius, ut tradunt, pomum in Perside tam  
præsentis est veneni, ut vescentes interimat. In Ægyptum verò translata, &  
peregrinata, poma ferre cibus idonea, turbinata pyri facie. Strabo, Persicus  
in Æthiopia, & Ægypto solum nascitur, arbor magna, fructu dulci, & grandi.  
Dioscorides. Perseæ arbor est in Ægypto, fructum ferens cibo idoneum, sto-  
macho utilem. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse,  
translatamq; in Ægyptum, mutata natura in cibum receptam.

Theophrastus de eius materie. Materies bonitate, firmitudine, nigritia Materies.  
quoque nil differens à loto. Simulacra ex ea factitauere, mensas, & reliqua  
eiusmodi. Plinius. Materies bonitate, firmitudine, nigritia quoque nil diffe-  
rens à loto. Simulacra ex ea factitauere, non eadem gratia quàm fideli  
materie, ut ex arbore, quam balanum appellauimus,  
magna ex parte contorta.



# IOAN. BAPTISTAE

## PORTÆ NEAPOLITANI

### VILLAE

#### LIBER QVARTVS

#### SIVE

#### INSITIO ET CVLTVS.

#### P R O O E M I V M.



ACTENVS de syluis, vbi quicquid, natura duce, generabatur, affatim prosequuti sumus, nunc autem quæ sationis, cultus mangonio, humanæve gignantur ope, operæpretium est enarrare. Sed mirari vos nollem, quum in superioribus libris nostrum pomarium ingredi perstrepesponderim, nunc in eius limine ianuam (vt ita dicam) ob oculos clauseram. Decentius nobis visum est ante pomarij vestibulum fructiferas & nouas arbores percipienda videndi ingenia aliquantisper molestè morari, dum in vniuersum aliqua paucis perstringendo loqueremur, quàm in singulorum priuatim capitibus importuna inuasiōe eadem sapius iterata præceptione legentium animos vexare, nusquam alioquin opportuniorem locum nacturi in vniuersa agriculture historia. Nec sunt quæ hoc libro clausimus contemnenda, sed sanè digna, admirabilia, & agricultura partium nobilissima, scilicet de insitione, vt arbores syluestri habitu exuta à sua natura desciscere, earumque domita feritate in hortis nobiscum mansuescere cogantur, vt non solum meliores fructus, nobilioresque, sed novos, ac prioribus seculis non visos producant. Sed iam negotium ipsum auspicemur.

#### *Quot sint plantarum generationes.* CAP. I.

**D**V o sunt in vniuersum agricultura munera, ferere, & colere, sed quum non habeat quis, quod colat, nisi prius seuerit, ideo prius sationē, demum cultum edocebimus. Plantarum sationes multifariæ sunt, quas demonstrare tentabimus: nam non omnes omnibus competunt, sed vnicuique natura suam insituit peculiarem generationem. Aliæ enim tam miti humanæque ingenio sunt, vt omnibus modis satæ nascantur, aliæ tam fero, agrestique, vt paucis, vel vix vno contentæ. Hæc planta, illa trunco, alia vtraque natura fruitur, ita  
vt si



ut si quæ uni conuenit, alteri tribues, & degeneres fructus habeas, & in crescendo remoreris: idemque esset ac cum natura luctari, & tandem cum maxima temporis, laboris, & impensarum iactura voti compos nunquam fies. Circa hoc opus, & labor, huic insistendum, huic animaduersio & cura est adhibenda. Optimi enim est agricolæ non solum plantas procreare, sed properantius nobiliores fructus producere, præsertim qui huic studio utilitatis gratia nauant operam. Sed quid Græci, Latiniq; maiores nostri de variis plantarum generationibus, & modis senserint, indicemus. Theophrastus in historiis plantas exoriri spõte, semine, radice, auulsione, ramo, surculo, trunco, aut ligno minutatim conciso tradit. Et in Causis etiam lachrymis herbas nasci posse ait. Didymus semine, auulsione, talea, & ramo dixit. Virgilius in Georgicis sponte, semine, radice, auulsione, surculo, trunco, & propagine. Plinius ex iam dictis Theophrasti excipiens, semine, plantæ radice, aut propagine, aut auulsione, aut surculo. Omnium diuisio manca est, nos ex omnibus vnā conflabimus, addentes ea, quæ recens ætas adinuenerit, ita ut apertè suus cuique arbori reddatur sationis modus. Plantarum generationes aliæ naturæ, aliæ artis, vel electus sunt. Arbores, quas naturæ debemus, tribus modis nascuntur, sponte, semine, & radice, reliquas hominum artificiosa industriæ debemus. Sed quas ars ferit, vel integra est planta, vel à matrice plantæ recisæ pars. Integra parte ferimus auulsione, & propagine. Quæ plantarum partibus prærogantur primis, sunt radice, trunco, ramo, & surculo, secundariis verò folio, & lachryma. Serimus enim partium partes, & caulium incisiones, & truncorum cortices. Surculos verò vel in terram, vel in confectum arboris truncum inserimus. De quibus omnibus suis capitibus singulatim cōscribemus, & primo de iis, quæ spontè nascuntur.

*Sponte nascentium generationes. CAP. II.*

**P**LANTARVM Spontaneas generationes aggrediemur, quæ naturæ beneficio attributæ sunt: sine enim origine seminis pleraque plantæ tum minutæ, tum maiores spontè concrescunt. Virgilius in Georgicis.

*Namq; alia nullis hominum cogentibus, ipse  
Sponte sua veniunt, camposq; & flumina late  
Curua tenent, ut molle siler, lentaq; genista,  
Populus, & glauca canentia fronde salicta.*

Theophrastus ea facile exire existimauit, quæ minora sunt, & maximè quæ annua, herbaceaq; natura consistunt, & sterilia potius spontè creati, quæ neque planta, neque semine gigui existimantur. Virgilius etiam ab eo.

*Sponte sua quæ se tollunt in luminis auras,  
Infœcunda quidem, sed læta & fortia surgunt,  
Quippe solo natura subest.*

Quorum rationes, quum nobis occultissima sint, nō parum admirationis,



ac disquirendæ occasionis ingerunt. Quis enim non miretur, quum terra, quæ in antiquorum ædificiorum eruitur fundamentis, non centenùm modo, sed millenùm annorum, aëri exponitur, illico herbas producere? Præterea steriles herbas, semine carentes omnino, soli faciem & parietũ continuo vestientes, quis seuit vnquam, vt variis in locis nascantur? Varias è naturæ interpretibus rationes Theophrastus refert, quas & nos referre nō pigebit. Semina, quæ spontè nascuntur, vel sensum nostrum latent, vel aperta sunt: quod ad ea, quæ nostrum sensum latent, Anaxagoras aërem semini principia habere dixit, quibus vnà cum imbre delatis gigni omnia asseueravit. Diogenes ex aqua putrescente, misturamq; cum terra capeßente plantas nasci existimauit. Cleodemus ex iisdem non solum plantas, sed animalia constare putauit. Semina verò quorundam aperta sunt, vt quum amnis exundauerit, aut alueo egressus fuerit: vt in Abderensi agro tum fit, vt pars, quæ vacua remansit, syluescat. Imbres hoc idem faciunt, quum semina secum pleraq; deferant: & peculiarẽ syluam exortam prodiderunt, piceo imbre compluto: agrum Libycum quoq; causa quadam eiusmodi edidisse laserpitium ferunt. Amnium ergo colluiones, aquarumque eruptiones, tum arborum, tum minorum stirpium semina inuehunt, sed has herbas non esse inter spontaneas connumerandas censemus, sed fortuito seminio suam ab aliis plantis originem habere. Imbres enim putredinem quandam aquæ, terræque committunt, nam & ipsa terræ Ægyptiæ mistura materiam quandam gignere videtur. Nonnusquam, modo subegeris mouerisq; solũ, familiaria protinus illius terræ emergunt, vt in Creta insula cupressi. In semina defactis segetibus, si submouentur, tribulum emergere aiunt. Igitur hæc quidem mutationem consequuntur telluris, siue seminibus præiacentibus, siue ipsa terra modo quodam affecta, præparataq; ad gignendũ, humoribus simul interclusis, quorum vis magna est, siue proprietate aliqua in cælo, terræve consistente. Itaque quantũ in vniuersum exprimi liceat generationes eiusmodi fieri necesse est, terra sufferuefacta, coactaq; humore admisto, commutatoq; ex solis ardore, quemadmodũ & animalia generari videmus. Plinius quæ ab eo excepit habet. Nec terræ tantũ natura circa has refert, aut perpetua cæli, verũ & quadam temporaria vis. Imbres aliqua plerunq; semina afferunt, & certo fluunt genere, aliquando etiam incognito, quod accidit Cyrenæicæ regioni, quum primum ibi laserpitium natum est. A Theophrasto Varro. Semen, quod est principium oriendi, duplex est, vnum quod latet nostrum sensum, alterũ, quod apertũ. Latet si sunt semina in aëre, vt ait Physicus Anaxagoras, & si aqua, qua influit in agrum inferre solet, vt scribit Theophrastus.

*Quod omnia semine generentur. CAP. III.*

**G**ENERATIO, quæ semine fit omnium plantarum semẽ producentium communis est, illudq; à natura eis tributũ est, vt sui cuiusq; ingenij seminatera: ad earum speciem propagandam, perpetuandamque, nam id & sensu  
expe-



experimur, & rationi quoq; est congruum. Natura enim, inquit Theophrastus, nil vnquam frustra facere solita est, & maximè in iis, quæ prima, & potissima sunt, finem inspectat, semen autem primum est, & potissimum; si igitur non regeneraret, frustra sit necesse est; idq; propterea prouidens rerum natura, tanta cura, diligentiaque cauit, vt ea in pomorum abstrusiore parte, tantum tutiore gremio abderet, & præcipuè arborum: nam non solum callo, & membrana, putamine, crusta, osse, sed etiam trigemina natura, carne, deinde ligno, & intrus ligno semen muniuit, vt quod pluribus erat obnoxium, pluribus propugnaculis sit custoditum, non solum aduersus cœli molestias, sed etiam animalium iniurias sit defensum. Ex semine primum arborum ortum fuisse, nemo est, qui dicere vereatur. totius arboris potentiam Demetrius Phalereus in semine ponebat, sine quo & arbores interirent, & animalia. Fingunt Poëtæ Saturnum suos filios deuorasse, ea ratione, interpretatur Varro, quod semina iterum in terram reciderent, ex qua orta sunt. Natura primum semine seri debere docuit, ostenditq; quum semē ex arboribus decidens, terra exceptum repullulasceret. Vnde Lucretius,

*At specimen sationis, & insitionis origo,  
Ipsa fuit rerum primum Natura creatrix.  
Arboribus, quoniam bacca, glandesq; caduca,  
Tempestiua dabant pullorum examina subter.*

Demonstrarunt id etiam animalia, ab auibus enim & plerisq; animalibus semen sub terra, tanquam in horreis ad annonam repositum pullulauit, & in arborem frugēve excreuit. Quæ semine nascuntur Virgilius expressit.

*Pars autem posito surgunt de semine; vt alia  
Castanea, nemorumq; Ioui quæ maxima frondet  
Esculus, atq; habita Graiis oracula quercus.*

Sed aliqua est in satione seminum diligentia, nam aliquorum simul plura semina seri debent, vt latius, & felicius assurgat planta, aliqua nouo, aliqua ex veteri semine: nam plerunq; accidit ex veteri semine sata in aliam stirpem degenerare, quorum exempla suis locis dabuntur.

*Contra Theophrastum, non omnia semine nata degenerare.*

#### CAPVT III.

**S**ED vetus est agricolarum opinio, omnia ex semine orta degenerare & malos fructus producere, eaq; sic inualuit, vt etiam à recentioribus agricolis creditum sit. Sed non possum satis mirari maximum Theophrastum, cuius doctrinam sequimur, & admiramur, nec possumus tam admirari, quin etiā maiori admiratione non indigeat, id tam pertinaciter affirmare, omnino semine sata degenerare, deterioraq; fieri. quod etsi in aliquibus verum sit, in omnibus omnino affirmare tanti philosophi indignum videtur, quum permulti fructus extiterint semine orti, & optimi. non tamen inficior insitione me-



liores fieri posse. Nec puto aliam rationem induxisse tam excellentem virum  
hæc asserere, nisi quod sterili Græciæ solo sic nascerentur. Virgilius,

*Nam quæ feminibus iactis se sustulit arbor*

*Tarda venit, seris factura nepotibus umbram.*

*Pomaq; degenerant, succos oblita priores,*

*Et turpes anibus prædam fert vna racemos.*

Palladius dicit, Quæ feruntur, nasci quidem necesse est suam originem re-  
fouere natura, cuius æternitati nulla tarditas potest asserere fastidium, sed ho-  
mini longa ab his expectatio superest, & à generis nobilitate decedunt. Pyri  
femina sata, & serò venire, & seminis nobilitate degenerare. Florétinus, Plan- 10  
tæ à semine omnibus plantis sunt deteriores. Sed stirpes semine sata diuersas  
in species mutari ex mille repetitis Theophrasti locis colligimus. Sed ut ea,  
quæ scribimus clarius intelligantur, primùm meo more omnia, quasi in tabella  
depicta oculis spectanda proponam. Stirpium semina terræ commissa quum  
nascuntur, vel omnia mutantur, vel partim mutantur, partim non mutan-  
tur. Mutantur omnia semine sata cæli, regionisq; mutatione, scilicet cælo  
inidente, solo repugnante. Quod si à solo nonnunquam impetratur, ut alie-  
nas aduenasque alat plantas, cælum nullo modo quit flecti: si verò cæli cle-  
mentia fauet, solo reluctante, quæ nascentur, aut inuita parient, aut fructu- 20  
um, arborumque mutatio eneniet. Et aliquando aut ex deteriori in melius  
mutatur, aut ex syluestri in vrbani, ut punica in Ægypto acida tum semi-  
ne, tum planta, in Cilicia in dulcem quodammodo, & vinolentam conuer-  
titur. Et circa Solos iuxta amnem Pinarum omnes sine nucleo surgunt. Ali-  
quando verò ex meliori in deterius, ut fructiferæ in steriles mutantur. Pal-  
ma ex Babylone, & Syria translata in Græciam sterilefcit, ac prorsus germi-  
nis infœcunda redditur. Sic persica in Ægypto largè, suauiterq; fructum pro-  
generat, in Rhodo, aliisq; locis procedens fructificare paucissimè competi-  
tur. Sic etiam fici in Ægypto, & omnibus eius tractibus bonæ frugis non sunt.  
Et Cypriæ brassicæ semen ad nos aduectum si feratur, solùm primo anno cau-  
liculos teneros profert, postmodum degenerat in nostrates, clareq; hæc mu- 30  
ratio omnibus manifesta est. Diximus de translatis seminibus, nunc verò de iis,  
quæ loco in quo orta sunt, sata, in arbores exeunt, quæ sui similem ferant, &  
hæc partim mutantur, partim non mutantur. Arbores quæ non mutantur,  
sed sui generis amantissimæ sunt, illæ sunt, quas robustissimas vocamus,  
diutiusque naturæ contumacia permanent, ut palma, pinus, picea, abies,  
& reliquæ, quum in deterius mutatio accidere non possit: ferocitas enim  
vltimum est. Nec probè putatur eas posse degenerare, quæ solo semine nasci  
possunt. Ex quo Plinius. Ex his quibusdam natura non degenerandi quoque-  
modo ferantur, ut cupressis, lauris, & palmis. Possunt etiam & regiones a-  
liquæ arboris naturam susceptam seruare, aliæ statò tempore, aliæ semper. 40  
Omnes fructus quum loca idonea nacti sunt, melius seruare sua genera pos-  
sunt,



sunt, præcipuè si arbores vigent, fructumque laudatum præstare suapte natura possunt. Ob id apud nos multas arbores eodem seminio natas, eadem semina semper reddidisse vidimus, nec aliam ob causam, quia solum tam fecundum, colles tam aprici, cælum ita clemens, ut merito maiores nostri & felicè, & beatam Campaniā vocitarint. Persica suo osse serimus, eademque; proueniunt, nam & serotina, & præcocia, duracina & nucipersica, vti deposuimus, sic & suis radicibus nata surgunt, ut è proximis cāpis videre licet, qui ad explenda Neapolitana pomaria quotannis innumeras myriadas mittunt. Arantia suo semine sata eosdem fructus reddidisse vidimus, dulces, acidos, & eiusdem  
10 formæ, & magnitudinis, ut continuò in Stabiarum plantariis videre licet. Nec laurus, & myrtus apud nos sata degenerant, ut ex iis, quæ virent in nostra villa vidimus: nata sunt ex seminibus, quæ ex eisdemmet arboribus ceciderant, quanquam & Plinius in Campania eiusmodi genera baccis seri confirmet. Pini, & cupressi semina, quæ ex fathiscentibus conis cadunt, eiusdem generis creant arbores. Sic & nos quæ fætilibus vasculis serimus, & duros fructus, & tarentinos producant, ut eorum sata semina. Quercus ex decidu-  
20 tibus glandibus semetipsa serit. Idemque de ficario grano dicimus, quod non caprificum, sed ficum tantum producit. Et M. Varro transmarinas ficus, Chias, Chalcidicas, & Lydias, & Aphricanas, cæterasque; in Italiā semine perlatis tradit. Palladius se expertum refert, sorbos suomet semine natos optimos fructus præbuisse, multasque; arbores ex pomis sponte progenitas, & in crescendo, & in ferendo exitisse felices. Pamphilus Græcus testatur omne genus suo semine satum suum genus producere, præter oleam, quæ oleastrum producit. Columella feraciores arbores ex semine satas esse, quam quæ plantis, utpote ramo producantur. Vnde nō possum non mirari summum philosophum, eiusque; alumnum Theophrastum, cuius doctrinam admiror, hæc tam pertinaciter defendere. Quæ verò mutantur, vel naturæ, vel artis opera mutantur. Dicemus primò, quæ naturæ opera mutantur, ut arbores, & herba, & hæc vel in congeneres, vel longè diuersas. Arbores quæ in congeneres, & deteriores  
30 mutantur, numerosa est earum ubique; gentium multitudo, omnibusque; perspicua. Immo Theophrastus omnia semine sata deteriora nasci scripsit. Is namque in historiis. Ex grano ficario nullum penitus genus, sed caprificum tantum erumpi, ac colore discrepare, & ex nigra ficu candidam, & ex candida nigram gigni. Ex vite nobili ignobilè, & sæpè diuersam exire: nonnunquam inurbanum quoddam, nec fructum quippe perficiens, ut ex oleæ nucleo oleastrum nasci, & ex acinis glaucis mali punici vilia exire, & ex enuclearis dura, & plerumque; acida, & ex pyro pyastrum, & ex malo dulciterum deterius, tum acidum, ex struthis cotonea, amygdalatum sapore, tum mollitie degenerare, quercum deteriorem exire. Itaque; quum plerique; ex ea, quæ in Epyro nasceretur, leuissent, simile provenire non potuissent. In Antandro colore laurum, & myrtum degenerare, ex fructu nigro rubrum fieri, & ex femina cupressi marem puenire affirmat. Palmam,



pinum coniferam, tineosam maximè nasci. Euenit quoq; fructuum mutatio, non solum in congenerem, sed in speciem longè diuersam, quod admirabile est profectò: nam multo maius est speciem amittere, quàm in specie similitudinem. Tuberum semina si serantur, in calabricem degenerant, & armeniaca, & præcocii fructus, qui nobis *almarges* dicuntur, si serantur in prunum degenerant, sic nuciperfica in persica, & similia passim euenire videntur ab omnibus, qui seminariis curam impendunt, sed id non semper, sed quum pluuia incesserint, cuius causam veteres omnes tum Græcos, tum Latinos, ne dicam Theophrastum latuisse video, idq; ex insitione euenit. Apud nos tubera in calabricem, siue oxyacantham dixeris, inseruntur, quum raro, vel nunquã apud nos semine sata videantur, sic armeniaca, præcocia in prunum, & dulces amygdalæ, in amaras inseruntur. Semina fructus sata subditi trunci aliquando naturam referunt. Murantur non solum arbores, sed herbe, & si frequentius arbores, cuius ratio est, quòd vegetiorum arborum semina imbecilliora sunt, quòd antequam hient, multa est eis opus mora, interpollationeq; in nascendo, ob id duro contumaciq; tegumento natura se pfit, largioremq; alimenti copiã attrahunt, ob id facilius mutantur. Contrà annigena uin semina cito prodeunt, ob id nuda, aut non multum amicta, amictumq; illud prætenue, paruumque alimentum attrahunt, sic non primo sato sed tertio anno degenerant. Affectus is mutationis plantis, & animalibus est communis, sed tertio anno mutantur, omnia enim ex momento alterantur, & sua natura migrant. Contrarium in plantis, quia quum plantantur, eò imbecilliores sunt, quo magis semine feruntur. Herbe etiam altera in alteram mutantur, primò quæ mutuas inter se accessiones, & vicissitudines habent, formarumque affinitatem, postremò quæ in longè diuersas. Sisymbrium in mentam mutatur. Nos è semine mentæ sato, forma mentam, odore nepitam æmulantem habuimus, ut omnibus mirum videretur. Transeunt etiam herbe semine satæ in longè diuersas species, nam videmus triticum, & linum loliascere. Semen vetus tantum valet in quibusdam rebus, ut naturam commutet: nam ex semine brassicæ vetere sato nasci aiunt rapam, & contrà ex raporum, brassicam: ex M. Varrone. Mutantur etiam aliqua spontè, & de specie in speciem transmigrant, ut candida populus in nigram com meat, tum fronde, tum tota specie. Quæ verò semina arte mutantur, non ad hanc pertinent speculationem, fit enim agriculturæ opere, plâtas corroborando, aut debilitando. Debilitamus ablatione, & deprauatione: ablatione, quum putamus, aut abscindimus radicis partes: deprauatione, quum affigimus trunco clauum, aut ficum scatificamus. Corroboramus quum adaquamus, aut stercoreamus, aut ridicas apponimus. Triticum fit ex tipha paratu quodam, & arte, sicut etiam ea, quæ præmacerata fructus dulciores afferunt. Sed de his latius in singulorum historiis loquemur.

*Generationis modus ex radice.* CAP. V.



**G**ENERATIONIS modus à radice duplex, vel sponte naturæ, vel artis opere. Quæ radice natura feruntur, vel integra planta radix feritur, vel sola radix sine stipite, quod idem in herbis demonstrabimus. Est autem per radicem generatio maximè naturalis, & ob id syluestrium generi accommodata. Est autem radice ferere, quum viui radix planta feritur: diciturq; viui radix, quasi viuam radicem habens, ad differentiam ramorum, paxillorumq;, qui sine radicibus feruntur. Viui radices plantæ non ex omnibus, sed ex prolificis tantum arboribus sumuntur. sunt autem plantigeræ arbores, quæ non solum iuxta truncum, sed è longinquo proliferant. Theophrastus enumerat pyrum, 20 punicam, prunum, & vlnum. Pyrus verò, & punica non solum è proximo, sed è longinquo sobolescent, utpote, quæ proluxa radice subeant. Contra verò abieti, pino, larici, palmæ, cedro, & cupresso negata est nepotum procreatio. Virgilius alias arbores pullulantes nominat.

*Pullulat ab radice aliis densissima sylua,  
Vi cerasis, vlmisq;, etiam Parnassia laurus  
Parua sub ingenti matris se subiicit umbra.  
Hos Natura modos primum dedit, his genus omne  
Sylvarum, fruticumq;, vires, nemorumq;, sacrorum.*

Has omnes è radicibus extirpandas esse iubent agricolæ, quum matres la- 20 dant, quod idem quoq; præcipit Poëta.

*Nec non & sterilis, qua stirpibus exit ab imis,  
Hoc faciet, vacuos si sit digesta per agros:  
Nunc alte frondes, & rami matris opacant,  
Crescentiq;, adimunt fetus, vruntq;, ferentem.*

A quo Plinius. Natura & plantaria demonstrauit, multarum radicibus pul-  
lulante sobole densa, & pariente matre, quas enecer. Eius quippe umbra tur-  
ba indigesta premitur, ut in lauris, punicis, platanis, cerasis, prunis. At radi-  
ces, quæ sine stipitibus panguntur, in multas partes diuidemus, ut ex vna plu-  
res fiant, quod in olea optime prouenit. Theophrastus oleam radice optime  
30 prouenire scripsit, quod Columella nos docuit. Quidam melius existimant  
ex radicibus syluestrium olearum hortulos excolere, sed post verum æqui-  
noctium feri debent. Ex eo Palladius. Scio plerosq;, quod facilius atq; vtilius,  
radices olearum, quæ in syluis plerumq; sunt, aut in locis desertis, in cubitalem  
mensuram recisas solere disponere, & admistione stercoreis adiuuare. In  
fruticibus quoque Theophrastus tradidit, & herbis. Quæ radice geniculata  
proueniunt, è singulis geniculis germinem sursum, & radix subrus erumpit, ut  
gramen, & arundinum quoddam genus, si quis in obliquum colos præcisas  
fimo, terræq; abscondat. Columella etiam arundines bulbis optime feri tra-  
dit: quos alii bulbos, alii colos vocant: unde arundinibus radicem confectam  
40 disponunt. Nos in Sicilia & Brutiis præcisas arundinum colos sacchariferarum fe-  
rimus, & sic earum segetes instituimus. Rosa enim ex ocellis radicis feritur.



In herbis verò, quæ tenui & diluto cortice integuntur, quemadmodum rapæ, raphani, betæ, ari, integram radicem serimus: partes verò bulborum, qui radices suo latere promunt, non solum hortensium, sed sylvestrium, vt cepæ, gethyi, allii, scillæ, aliorumq; . Dioscorides heleni agnatas propagines, aut liliorum, aut ari modo feri scripsit: asparagi radices, mentæ, armoraciæ, napunculi, cæterorumq; . Diximus generationes, quæ naturæ sunt, nunc quæ artis, vel electus: & primò dicemus eas, quæ naturales sunt, postmodum quæ arte impetrantur in propagatione. Auulsio ocysissima generatio est, auclūq; facilis, similesq; fructus affert, vt mater vnde auellitur. Auulsio est plantarum ablatio cum radicis parte, vt sationi sit idonea. Plinius ait, Et aliud genus simile 10 natura monstrauit, auulsiq; arboribus stolones vix ère. Quo in genere, & cum parui sunt auelluntur, partemq; aliquam è matris quoq; corpore auferunt secum, fimbriato corpore. Plantæ, quæ auelluntur, stolones dicuntur, Græcis *μόχοι* quasi vituli plantarum; Latinis stolo, quasi stolidi fruticatio ex arborum radicibus. nomenq; à Stolone viro traxit, qui, M. Varrone referente, propter diligentiam culturæ, Stolonū confirmauit agnomen, quod nullus in eius fundo reperiri poterat stolo, quod estodiebat circum arbores, è radicibus, quæ nascerentur è solo, quos stolones appellabant. Plinius item, Stolonum cognomen Licinię genti; ita enim appellatur in ipsis arboribus fruticatio inutilis, vnde & pampinatio inuenta primo Stoloni dedit nomen. Didymus ab his, Sto- 20 lones appellari ait, qui arboribus vñiti, & agnati sunt, ex ipsisq; auelluntur vnà cum conspicua radicis parte. Differt à stolone verò viuiradix: stolo enim est qui nascitur circa stipites & auellitur cum radice, & corporis parte, & sic scribitur. Viuiradix verò est, quæ integra ex arboribus longinquo extrahitur. vnde auulsionem non admittunt, ait Theophrastus, nisi quæ fruticosa sunt: nam arbores, quæ vñi stipites sunt, carent eo, quod auellere possis. Est & auulsio duplex, plantarum & herbarū. Laurum auulsione nasci difficile putat Theophrastus: sed si auellitur, radicis, & stipitis aliquid habere oportet, fieri tamen potest, vt absq; eo tam punica, quàm malus verna exoriat. Plinius, Hoc modo plantantur punica, coryli, mali, sorbi, mespili, fraxini, fici, in primisq; vites. 30 Cotoneum ita satum degenerat. Sabina auulsione etiam seritur. Didymus. Malum, cerasus, ziziphon, nux parua, chamedaphne, myrtus, & mespilum. Virgilius in Georgicis.

*Hinc plantas tenero abscindens de corpore matrum  
Deposuit sulcis.*

Herbæ autem quoq; auulsione nascuntur, vt ruta, & brassica, vt Theophrastus tradit. Semper enim aliquid radicis accipitur.

*Plantatio ex radice per propagationem. CAP. VI.*

**S**EQVITVR propagatio auulsionem, altera per integram plantam satio: nam vbi natura in minime fruticosis arboribus viuiradicem fieri negat, 40  
ars,



ars, quò ramus radicem submittat, propagationem adinuenit, quò aliò transferri possit. Propago Festo Pompeio authore à propagando dicta. Rustici enim vetulam vitem per inflexos arcus supprimunt, vt ex vna plures emergant. Dicta est propagatio, quòd porrò pangatur, id est, longè figatur, Huiusmodi arborum generationis modi Græci scriptores non meminerunt, Plinius naturam propagines docuisse scribit. Rubi nanq; curuati gracilitate, & simul proceritate nimia defigunt rursus in terram capita, iterumque nascuntur ex sese, repleturi omnia, ni resistat cultura, prorsus vt possint videri homines terræ causa geniti. Ita pessima, atq; execranda res propaginem docuit, atque radicem acquiri viridem. Eadem autem natura est ederis. Propagatio duplex, arborum, & herbarum. Arborum duo sunt modi, alter ramo ab arbore in scrobem depresso, alter ramo in arboris cacumen manente, sed vel per vasa fictilia, vel qualos trajecto, terraq; compacto. Arborum propagatio, qua ramus deprimitur, quadruplex est: hanc Columella in vitibus docet, in aliquibus nos vti possumus. Prima quum virga à matre edita sulco committitur, altera quum ipsa mater prosternitur, atque in plures palos per suas virgas diuiditur, tertia quum mater in duas vel tres partes scinditur, si diuersis locis diducenda est, quarta quum brevis virga depressa obruitur, ac post triennium amputatur. Propagationis modos Cato docuit, Propagatio pomorum, cæterarumq; arborum. Arboribus abs terra pulli qui nascuntur, eos in terram deprimito, extollitoque priorem partem, vt radicem capiant, inde biennio post effodito, seritoq; Ficum, oleam, malum punicum, cotoneum, aliaq; mala omnia, laurum, myrtum, nuces prænestinas, platanum. Mala struthæa, laurum cypriam, delphicam, prunum, myrtum coniugulum, & myrtum album, & nigrum, & nuces auellanas. De ramis, quæ diligentius propagari volles, in aullas, aut in qualos pertusos propagari oportet, & cum his in scrobem deferri oportet. In arboribus, vbi radices capiant, calicem, aut qualum pertundito perfundum, ramum, quem radicem capere volles, scarificato, traicitoq; Eū qualum, aut calicem terra impleto, calcatoq; bene, in arborem relinquito: vbi ita fuerit, & radices egerit, ramum sub qualo præcidito; qualum incidito ex vna parte perpetuum: si verò calix erit, conquassato, cum eo qualo, aut calice in scrobem ponito. Eodem modo vitem facito, eam anno post recidito, seritoq; cum qualo. Hoc modo quodq; genus volueris propagabis. Plinius è Catone transcribens sic ornatè loquitur. Propagationum duo genera. Ramo ab arbore depresso in scrobem quatuor pedum quoquò, & post biennium amputato flexu, plantaq; translata post trimatum: quas si longius ferre libeat, in qualis statim, aut valis fictilibus defodere propagines apertissimum, vt in iis transferantur. Alterum genus luxuriosius, radices in ipsa arbore sollicitando, traiectis per vasa fictilia vel qualos ramis, terraque circumcompactis, atque hoc blandimento impetratis radicibus inter poma ipsa & cacumina (in summa enim cacumina hoc modo petuntur audaci ingenio) arborem aliam



longè à tellure faciendi, eodem, quo supra biennii spatio, abscissa propagine, & cum qualis illis fata. Sabina herba propagine feritur, & rhododendron. Sic salices & castaneæ. In herbarum propaginibus Theophrastus caulem rosæ, & lilii prosterni iubet, & sic rosa & lilium nascuntur. Palladius confirmat. Virgilius de propagine ita canit:

*Sylvarumq; alia pressos propaginis arcus  
Expectant, & vina sua plantaria terra.  
Sed truncis olea, melius propagine vites.*

*Arborum satio per truncos. CAP. VII.*

**D**IXIMVS integras arbores serendi modos, & per radicem, nunc ad alteram generationis partem traducamus stylum, scilicet quomodo truncus, ramo, & surculo nascantur: nam arboris partes maximæ, & primæ quatuor sunt, radix, truncus, ramus, & surculus; & primùm videamus, quæ arbores truncis nasci possunt. Truncus, ex Theophrasto, est in quē defertur alimentum, simplexq; supra terrā assurgit. in arboribus caudicē appellare solemus, in herbis caulem. Sed feruntur arbores truncis, itē herba caule, vel integro, vel in partes confecto. Integro truncis Theophrastus oleam nasci scripsit, ratioque huius generationis est, quod prægrandes rami oleæ, olestri, & myrti, succolenti sunt, scilicet pinguedine & densitate, proinde exiccatur difficiles: suorum enim corporum spissitas, & præsentis vitæ sedes est & futuræ auspici-  
cia, non ramen sine naturali calore, nil enim densitas illa facit, si comes est siccitatis, & inepta ad nepotum procreationem. Virgilius in olea talem serendi modum sic expressit.

*Sed truncis olea, melius propagine vites  
Respondent, solido Paphia de robore myrtus.*

Theophrastus etiam palmæ huiusmodi satum vitalem esse ait, quippe qui si eius truncus inuersus pangatur vdo solo, & germina supernè cieri, & infernè copiosas radices comparari, quod nos in populis, salicibus, sambucis, aliisq; quotidie videmus. Nee solum integro truncis oleam nasci Theophrastus scripsit, sed etiam ligno. Quid verò per lignum intellexit, nisi truncum per longitudinem scissum, & in partes confectum? Talem serendi modum per lignum mirè etiam Virgilius expressit.

*Quin & caudicibus sectis (mirabile dictu)  
Truditur è sicco radix oleagina ligno.*

Sed quum lignum feritur, monet Theophrastus subitus se indendum, ac in iecto lapide serendū. Sic oleæ, fici, reliquorūq; satio fieri debet. Sed non solum trunci partes, sed partiū partes serendas docet Græci, scilicet cortices. Dioscorides namq; corticē albae populi & nigrae cōcisum, & stercoretis fuleis inditū, edules fungos dare. Quod etiā Tarentinus Græcus affirmavit. In herbis verò caulis est trunci loco. Ideo herbam conciso caule nasci operæ pretium est dicamus.



Theophrastus liliorum, & rosarum caules concisos, & germen citare, & radicare posse scribit. Sic arundines præ fissâ stirpe enasci, germinarique. De rosa, M. Varro, Plinius, aliique referunt.

*De satione per truncos, & de talea, & claua.* CAP. VIII.

**S**EQVITVR vt per ramos ferendi modos doceamus. Rami dicuntur, qui in caudice fissi multiplices sparguntur, & vt caudex radice, sic rami caudice fulciuntur. Multis modis ramos ferere maioribus nostris mos fuit. Nam aut integrum ramum, aut eius partes, sic & diuersa nomina indiderunt, nam recensum in plures partes ramum nunc clauam, nunc taleam vocitarunt. Τάλα vox Græcæ est, sed Latini in suum usum conuerterunt, vt taleare pro incidere rustica usurpet simplicitas. Nonius scissiones lignorum, vel præsegmina taleas vocat. M. Varro, Intertaleare, rusticorum voce, diuidere est, vel ex vtraque parte æquabiliter præcidere, & excidere. Alibi verò ramum ex vtraque parte æquabiliter præcisum, claucolam & taleam appellat, facitq; circiter pedalem. Sed inter authores rami, taleæ, & clauæ nomina confunduntur. Varro clauam & taleam idem esse putauit, vt diximus. Palladius videtur inter ramū & clauam, & taleam differentiam fecisse: nam de citriis loquens ait. Ramus non amplius sesquipede debet immergi, ne putrescat: claua sit manubrij crassitudine, longitudine cubitali, omnisq; obruatur: sed talea gracilior & breuior esse potest, quæ etiam mergetur, sed palmis duobus super sit. Didymus ramum & taleam maximè differre putat. Hanc sationis inuentionem Plinius casui ascribit. Inquit enim, Casus ingenio suo excogitauit, ac defractus ferere ramos docuit, quum pali defixi radices cepissent. Taleæ nobis non paruam commoditatem præstant, nam vbi arbores semine careant, natura nos docet, vt iis vtamur, vel si cupiditas nos stimulet citius arborum nascendarum. Varro, quia ex semine fici, aut oleæ ad crescendum tardæ sunt, surculos, & taleas in seminariis expedit obruere, ait. Præterea quæ taleis feruntur, sapidiores fructus afferunt, & ex vilibus optimos, sed cito pereunt, cōtra verò in arboribus, quæ ex semine prodeunt. Nos ferendi modum à Catone, seminum verò qualitatem à Theophrasto desumemus. Ramos ab arboribus vegetæ ætatis non prouectioris petendos censet. Quæ verò iuuenili ætate sunt, & pleno corpore constant, & melius germinant. Sint nitidi læuissimi que: quod enim læue & nitidum, incolume inoffensumq; constat, contra scabrum, obsitumq; nodis præsertim cæcis, euanidisque, incolumitate orbatū est. Ad hæc læuitas, & rectitudo ad succi sorbitionem facilem meatum expeditumq; præstat, vt incrementa celeriter sequantur. Rectè etiam animaduersum, vt ex simili solo, vel saltem non deteriori semina petenda: nam imbecilli cuiq; mutatio molestiam affert, imbecille enim amissis natalibus suis. Præterea cum loci mutatione, ne situm mutet, sed quam cœli partem respexere apud parentes, in eam iterum vergant, vt nil naturæ, morisq; immutetur. Taleam à ramis abscindunt, ne vires ad excitand-



dum germen euanescent. Partem ab inferiori arboris parte petendam, utpote robustiorem, exceptis vite, & fico, & quicquid humidum est. Quum ponitur, erectæ ponendæ sunt, nec multum terra extent, lenta enim incrementa capit planta, quum pars, quæ supra terram, maior subterranea fuerit. Celsura sit prope terram: nam celerius redeunt, quàm quæ altius fuerint obtruncatæ. Postremo plagas obteges, ne sol, nève imber eò se induat, ob id alij oblinunt luto, alij imponunt scillam plagæ, ac scillæ fictile. Scilla seruat pristinum arboris vigorem, seruat ea à luto, à fictili lutum. Triplex in satione differentia, siue scrobibus, siue seminariis, siue sulcis seras. Cato hoc modo docet. Taleas quas in scrobe saturus eris, tripedaneas decidito, diligenterque tractato, ne liber laboret, quum dolabis, aut secabis, quas in seminario saturus eris, pedales facito, easque sic inserito. Locus bipalio subactus fiet, beneque glutus fiet. Quum taleam demittes, pede tantum opprimito, si parum descendit, malleo, aut mateola adigito, cauetoque ne librum scindas, quum adiges. Palo prius locum si feceris, quo taleam demittas, & si ita seueris, utilis fiet talea, meliusque viuet. Taleæ ubi trimæ sunt, tum denique tibi curæ sint, ubi liber sese vertet. Si in scrobibus, aut in sulcis seres, ternas taleas ponito, easque diuaticato supra terram, ne plus quatuor digitis transuersis emineant, gemma, vel oculo seruato. Plinius de taleis hæc habet. Seruandum in eo ante omnia, ut taleæ ex feracibus fiant arboribus, ne curuæ, ne scabræ, aut bifurcæ, nève tenuiores quàm ut manum impleant, ne minores pedalibus, ut illibato cortice, atque ut sectura inferior ponatur semper, & quod erit ab radice; accumulaturque germinatio terra, donec robur planta capiat. Sed animaduertendum erectam taleam dici, cuius pars ima terram spectat, summa cælum, inuersam verò, quæ cacumine infosso deorsum spectat, cælum celsura. Columella oleæ rectam taleam deponere iubet, nam inuersa sterilitatem minatur. Plinius, ut secuta semper inferior ponatur, & quod erit ab radice. Theophrastus de ficu, olea, & myrto loquens, Ficus à ramo seritur vastiore, qui debet exacutus percuti malleo, quoad supra terram exiguum relinquatur, ac deinde arena superiniecta operiatur, easque plantas meliores effici volunt, quandiu nouellæ extant. Oleam verò & myrtum quæ trunco, præcisaque seruntur, deorsum versus sectura inuersa serere oportet, nec palmo minora præcidere, corticemque minimè detrahare. Seruntur autem ex his rami, quibus germinantibus terram semper assidue accumulandam, quoad satis corroborentur. Quod contrarium sentit Theophrastus de inuersa talea, puto ex Theodori interpretatione errorem contigisse, quod inuersam taleam non rectè interpretatus fuit, quum rectam dicere deberet: repugnat enim experientia, & tantorum virorum autoritatibus. Sed apud nos citria inuersa talea seruntur. Multa taleis seruntur, ait Plinius, in primisque ficus, omnibusque aliis modis nascens, præterquam talea, optimè quidem si vastiore ramo, pali modo exacuto adigatur altè, exiguo super terram relicto capite, eoque ipso arena cooperto. Ramo seruntur & punica palis laxato prius meatu.



meatu. Item myrtus. Omnium horum longitudine trium pedum, crassitudine minus brachiali, cortice diligenter seruato, trunco exacuto. Myrtus & taleis feritur. Morus & talea tantum. Mespilus & taleis. Didymus talea, & ramis plantari ait amygdalam, pyrum, morum, citrium, malum, oleam, cotinea, populum albam, & nigram, hederam, ziziphum, myrtum, castaneam, & transplantata meliora reddi. A ramis & talea tantum plantari vitem, salicem, buxum, & cistum, quum auulsione nasci prohibeantur: propterea quod à radicibus nepotum exortia sunt. Virgilius de taleis hæc cecinit.

— hic stirpes obruit aruo

*Quadrifidasq; sudes, & acuto robore vâllos.*

Theophrastus ait. Si quis in Græcia palmæ ramos supernè recisos serat, radix dimittitur, & gerimen non solum crebro nasci, verum etiam subtus radicali largiùs asserunt. Itemq; è ramis malum & pyrum rarò nasci.

*Quomodo surculo plantentur, sine cacumine, & de virga. CAP. IX.*

**I**AM ad surculi sationem ventum est, qui à matre detractus terræ gremio ad alias iterum arbores procreandas figitur. Hic in terram, & in truncum figitur, vt inferius demonstrabimus, quum de insitione agemus. Græcis καύδος, ab inflectendi facilitate, vel ἀκρόμυον à fastigio, & mansionem dicitur. Latinis surculus, & est quod ex ramis simplex, & indiuiduum oritur, quale est gerimen an-  
 20 notinum, frondesq; gerit. Plinius de eius inuentione, Ex eodem inuentum est surculos abscissos serere. Hoc primùm sepis causa factum, sambucis, cotoneo, & rubis depactis, mox & culturæ, vt populis, alnis, salici, quæ vel inuerso surculo feritur. Hic generationis modus & plantis, & herbis communis est: nam vtræque cacumine scisso facilè germinant. Dicamus nunc de plantis, dicturi postmodum de suffruticibus, & herbis. Theophrastus ait. Non omnes surculi ex omnibus arboribus dempti, & defixi germinare possunt, sed ij tantummodo, qui non solum moderatum humidum, caloremque habent, sed vtrunque  
 30 retinere valent & seruare, vt ficus, vitis, & inter steriles & aquarum præuidas salix sambucus, & vtræque populus: sed natura siccis penitus negatum est. Nam ex arbore dempti quamprimum diffiantur, euaporanturque, innatumque calorem amittunt. Ficus enim & vitis quum summa habeant tenera, humectaque, facilè germinare possunt, sic & salix: at contra oleæ extrema, quia sicca ex tenuitate, ad edurandum invalida sunt, sic de pyro, & amygdala, lauroque asserere licet. Contra tamen sentit in historiis, nam ficum omnibus modis exurgere posse inquit, præterquam ramo & surculo, quod vel textus Græci corruptione, vel mala Theodori interpretatione contingere potest, aliter & sibi ipsi, & experientiae contradiceret. Exoritur item paxillo tam punica, quam malus verna. Virgilius surculum cacumen appellat.

*Nil radice egent alie, summumq; putator*

*Haud dubitat terra referens mandare cacumen.*



Nos in Surrentino tractu quum in vineis vires propagamus, simul cum vitibus, ficus, mori, mali vernæ surculos ap. onimus, optimeque proueniunt. Virgis oleam exoriri posse etiam tradit Theophrastus: nam si extrema ramorum ob insitam siccitatem satanequeunt germinare, contra id nobis natura negatum remedium, est adiuuentum ab agricolis. Surgit etiã punica ex virga. Cæterum inter sicca, simplicia & nepotum exortia sola palma præter ex semine ortum alios proueniendi modos sortitur. Inter cæteros ex tenerrimis virgis Babylonij viuiradices efficiunt, adultasq; transferunt, quod ex soli vbertate, & nascendi facilitate prouenit: tenerrimæ enim virgæ petuntur, quia tales humidissimæ sunt. Columella cacumina ficorum, pyroliumve, & malorum depangeremonet. Palladius cerasum virgula nasci scripsit: nam pro adminiculis per vineam positam, in arborem proliluisse confirmat: sic & punicam: curandumque ne inuersa ponatur. Sed diximus de arboribus, nunc verò ad suffrutices, & herba transeamus. Theophrastus docuit idem fieri in suffruticibus, vt in ruta, viola (leucoium intelligo) serpillio, helenio, & in coronariis, vt abrotano: hæ enim radices è germinibus suis emittunt, non secus ac hedera. Proximum inter olera ocimum est: hoc enim seri pro parte superiore optimè potest, quanquam lignosum sit. Abrotanum lignosum est, verum spissitate acoreque suo seruari aliquantulum temporis potest, modo hedera: nam hæc defixa quoque nimirum erumpere valet. Plinius mentam inuerso ramo seri scripsit. Nos & mentam, & marum cacuminibus continuò serimus.

*Quòd folij etiam satio fieri possit. CAP. X.*

**Q**UIA sequuntur folia surculos, (nam surculos folia ferre diximus) declarabimus nunc an foliis satio fieri possit. Admirabile est naturæ opus arbores etiam posse natales suos foliis exercere. Plinius demiratur Trogum scripsisse palmarum folia apud Babylonios seri, atq; in arborem prouenire. Theophrastus admirabile quodammodo videri posse inquit, si quid è foliis radicem dimittat, qualem circa Opuntem herbam quandam enarrarunt. A quo excipiens Plinius. Item circa Opuntem opuntia est herba, etiam homini dulcis. Mirumque è folio eius radicem fieri, ac sic etiam nasci. Item Theophrastus laserpitij ortum describens, ait. Radix cubitalis, aut paulo maior, in medio extuberat in caput supra terram, vnde lac erumpit, dein caulis assurgit, ex quo magydatis, & quod folium dicitur, exeunt; folium id semen est, quod quum Auster ingenuè post Caniculam flauerit, discutitur, atq; ita laserpitium nascitur, eodemque anno radix consummatur, & caulis. Ab eo Plinius. Alij tradunt laserpitij radicem fuisse maiorem cubitali, tuberq; in ea super terram, hoc inciso profluere solitum succum ceu lactis, supernato caule, quem magydarim vocarunt: folia aurei coloris pro semine fuisse, cadentia à Canis ortu, Austro flante. Et ex his laserpitium nasci solitum annuo spatio, & radice, & caule consummantibus sese. Sed huiusmodi admiratio cessare debet, quum apud nos ficus  
ex oc;



ex occidentali India allata hoc modo nascatur, cuius folium si pangatur, illicò radicatur, atq; in magnam arborem excrescit, vt nō solum si terræ figatur germinet, sed si in solum ceciderit, illicò radículas emittat. Sed nequeo non mirari Matthiolum, quū apud Theophrastum, & Plinium legisset de opuntia herba, lapsum, credidisse hanc vulgarem Indicam ficum esse opuntem, quum paulò supra nostra tempora ex occidentalibus Indiis allata esset, eiusque apud antiquos nullam prius memoriam extitisse.

*De satione per lachrymam. C A P. XI.*

10 **S**ED quid mirabilius? ex gummi fieri posse generationem, ac in eo genitale seminium vigere posse? Theophrastus in historiis inquit, Peculiaris maxima generatio, quæ ex lachryma fit, quippe lilium ita exortum videtur, quum id quod defluerit sole exaruerit. Lachrymā quoq; equapij, vim eandem sortiri volunt, etenim lachrymam id quoq; emittit, cuius rationem libro de causis assignat. Sed peculiaris maximè generatio, quam lachrymæ præbent, vt equapij, liliorum, & aliorum quorundam, nec ratio abest, nam caulibus gummi planè respondent: nil etenim aliud, quàm quod illorum fœcundum principium coactum esse oportet: non enim sine calore, humoreq; generatio talis consequitur. Cur autem non omnes succi, lachrymæque generandi vim obtineant, causam ad superiores, prioresque rationes reduci par est, id est quod neque  
20 caules, neq; radices vim eiusmodi sortiuntur. Equapij lachryma myrrhæ similis constat, quam obrem quum quidam hic nasci myrrham audiuisent, equapium apud se prouenire putarunt. Seritur equapium etiam lachryma sua, vt lilium & alia quædam. Lachryma ex eo myrrhæ similis effluit, quidam in totum myrrham id esse affirmarunt. Facit & lachryma lilij cæcū quoddam confluuium, quod etiam serunt. Dioscorides, Smyrnion vocant semine tam myrrham æmulante proximè, vt myrrha sata, alterum quoque nascatur. Ab eo Plinius. Sed præcipuè olusatrum miræ naturæ est, hipposelmon Græci vocant (Theophrastum intelligit) alij smyrneum (Dioscoridem) è lachryma caudicis sui nascitur, aitque Theophrastus myrrha sata natum.

30 *De internallis plantarum. C A P. XII.*

**P**OST QVAM plantarum generationes affatim demonstrauiamus, instat nunc ratio quonam modo feri debeant, quum de ea re nō pauca antiquorum præcepta extrent, ac priusquā loca arboribus repleamus, quincunciali ordine metari docebimus, & eo prius quomodo mediæ cuiusque arboris intercapedines destinandæ sint doceamus oportet, quod in re arboraria necessarium iudicamus, quum variabilis, & diuersissima sit: facit enim diuersitas plantarum, vt ad iustam magnitudinem adolescere non possint, & altera alterius vmbra prematur, & semper mutua alimenti rapina necentur, nec ramos, nec fructus spatij carentia proferre possint. Nil fœdius est agricolis, inquit Plinius,  
40 quàm gestæ rei pœnitentia, multò iam vt præstet laxitate delinquere, quàm



adultas interlucare iusto plus, & in senectam præcipitare, aut (plerunque ipsis qui posuere coarguentibus imperitiam suam) totas excidere. Has intercapedines arborum Pompeius antras vocat. Columella id iam monuit, Arbores paribus interuallis ferito, ut quæ creuerint, spatium habeant, quo ramos extendant, nam si spissè posueris, neq; infra quicquā ferere poteris, nec ipsæ fructuosæ erunt, nisi eas interraseris. Sed exequamur doctrinam. Theophrastus, cuiusque arboris in quacunq; terra vicinia docet plantarum interualla, tum plantarum, tum loci natura distribuenda. Nos prius secundum stirpium naturam, postmodum locorum exequemur: nam in interuallis non tam locorum naturam querere oportet, quàm ipsarum arborum mutuū respectum, arborumque naturas, quæ scilicet umbras ament, vel fugiant, vel quæ longo, vel breui sint radice, quæ umbræ opacæq; sint, & umbris carentes, quæ mutuo coniugio deuinciantur, vel simultate dissideant, quæ eodem, vel diuerso tempore concipiant, & pariant, & tandem quæ stillicidio infestent. Primò considerandum quæ umbras ament, quæve solem requirant, alteræ enim breui interuallo ferendæ sunt, alteræ amplo, ut quæ solē requirunt, apertiores sint, quæ umbris gaudent, mutua opacitate consequantur illas. Quorum fructus nucleosi, & sicciores sunt, opacitatis amatrices sunt, ut punicæ, & myrti, quarum fructus si plusculū Solis excipiant, asperi fiunt. Item cui texturæ laxitas, & radicum breuitas, ut laurus, unde propter suam imbecillitatem præsidio opus habet aduersum æstum & gelu. Præterea quibus radices longiores, quia plus capiunt loci, maioribus interuallis disponantur, quibus verò breuioribus, modicis limitibus separentur: radicum enim propinquitas, mutuis offensis infesta erit. Pinus omnibus innoxia esse putatur, idque manifesta causa, quum radice singulari altaque sit, patitur enim myrtos, & lauros propè satas bene se habere: unde apparet plus incommodare radices, quàm umbras, pinus exemplo, quū ei umbra tanta sit, ut nocere queat, nec noceat. Amygdalum in vineis aliqui ferunt, tãquam innocentissimā, quia modico eget nutrimento, nec serotina est, nec multum opacans. Sed falsa est eorū opinio, quippe valida est, comitemq; habet radicum multitudinē, & prolixitatem, nec quia serò parit, radicum noxam aufert. Sed punica & malus veras habent innocentiae conditiones, quum numerosis radicibus non nitantur, nec hauriant viciniae succum, & quum cito senescant, non diu infestant. Vnde punicas, myrtos, & lauros crebras ferere, nō plusquam nouenis pedibus distantes præcipit, malos distantes paulo plus, pyros amplius, & prunos, amygdalas, & ficos multò amplius. Accedit umbrarum consideratio, ampla enim umbra, ampla querit interualla, ut ficus, & olea, unde molestæ sunt tam viti, quàm cæteris. Plinius ait. Internalla diiudicabunt ramorum amplitudinis ratio, locorumque, & umbræ cuiusque arboris, quoniam has quoq; obseruari oportet. Breues sunt, quamuis magnarum arborum, quod in orbē ramos circumferunt, ut in malis, pyrisque. Eadem enormes cerasis, lauris. Cupressi umbra minima, & in se conuoluta, ficorum leuis, quamuis sparsa: ideoq; inter vineas feri



seri non vetantur: vlmorum leuis. Attico hæc quoque videtur è grauiſſimis, nec dubito ſi emittantur in ramos: conſtrictæ quidem vلمي noxiam eſſe non arbitror. Iucunda & platani, quamquã crassa: licet gramini credere, non ſoli, haud alia leuius operiente toros. Populo nulla ludentibus foliis. Pinguis alno. Vitis ſibi ſufficit mobili folio, iactatuq; crebro, ſolem vmbra temperans, eodem graui protegens in imbre. Omnium ferè leuis vmbra, quorum pediculi longi. Non fastidienda hæc quoq; ſcientia, atq; nō in vltimis ponenda, quando quibuſq; ſatis vmbra aut nutrix, aut nouerca eſt. Iuglandium quidem, pinorumq; & picearum, & abietis quæcunq; attrigere nō dubie venenum eſt. Iu-  
30 gladium grauis & noxia, etiã capiti humano, omnibuſq; iuxta ſatis. Necat germina & pinus, ſed ventis vtraq; reſiſtit, quoniã & protecta vinearum ratione egent. Vlmorum nutriens quæcunq; opacat, alni paſcens ſata. Eſt & ſtillicidij incōmodum. ſtillicidij breuis diffinitio eſt. Omnium quæ proiectu frondis ita diffunduntur, vt per ipſas nō defluant imbres, ſtilla ſæua eſt. ſtillicidia pinus, quercus, ilicis pōderoſiſſima, nulla cupreſſi. Palladius cydonia largiùs ponēda ſuadet, ne alteram quatiente vento ſtillicidium tangat alterius. Nec ſpernenda eſt conſideratio plantarum, ſcilicet quæ vicinia lædunt, quæ ſe mutuo amicitia cōiunctu aſſociant, vt oleæ, & myrti. Androtione authore tanquã coniugium radicum fieri, & mutuas amplexationes, ac myrteas virgas inter oleæ ra-  
20 mos ſubire, quibus à Solis violentia caueatur opacatione, neq; tentetur ventis, vnde oliua tenerior fit: exucta nanq; à vëto & ſole fit durior. Sic oleæ à cuiuſq; arboris vicinia abſtinendum. Præterea quæ non eodem tempore germinant, fructumq; inchoant, faciliùs aſſociantur, alternantibus enim per vicē temporibus, ac mutuo cedentibus nil penitus ſibi auferunt. Conſideranda ſunt demum loca, vt aptè ſpatia deſignentur, in montanis enim propinquioreſ, quàm planis conſerantur, montibus enim radices, comæq; minus augeſcunt. Plinius plurimū intereſſe dicit in hac quæſtione, terra, in qua ſeremus, in quantū arbores quaſq; alar: ventoliſ locis etiã crebrioreſ ſeri conducit, nam crebritate ſeſe aduerſus ventos facilè tuentur: quæ ſolæ ſunt aduerſus ventos deſertæ, & in-  
30 firmæ ſunt, turba enim valebunt, vt ſi nō magnitudine, atq; robore, ſaltē multitudine, ac cohorte ſe defendant. Nulla enim re magis arbores infeſtantur, quàm ventis. Quod & Virgilius in Bucolicis demonſtrauit,

*Arboribus venti, nobis Amaryllidis ira.*

E locorum etiam natura largiùs, vel breuius interualla metiri debent, quod ex diuerſis ſcriptoribus in olea fiet manifeſtum. M. Cato genus quoddam oleæ in vigintiquinque, aut triginta pedes conſerit. In Africa Mago ſeptuagintaquinque pedes interuallo dedit vndique etiam in macro ſolo, ac duro, atque ventoso, quum minimum quadragintaquinque. Non alia maior in Bœtica arbor, nec cui maiora interualla largiri debeant. Palladius conſiderat ſi ſolum macrum, vel frumentarium fuerit: nam ſi ager, quem oliueto  
40 conſerimus, frumentarius fuerit, quadragenis inter ſe pedibus diſtent: ſi



verò macer, vicens quinis. Sic salices in riguis spatia largiora desiderant, sic caneis arctiora.

*De ordine quincunciali.* CAP. XIII.

**I**AM superius plantis interualla designauimus, sequitur ut vulgatā, & à paucis intellectam quincuncialē rationem tradamus, circa quam non sēgnis optimi agricolæ cura, & studiū esse debet, tum propter delectationem, quam ipsa metata & ordinata arborū dispositio pariet, tum etiā vtilitatem, ne dicam necessitatem. Plotinus pulchritudinē esse ait sitam in partium cōmensuratione adinuicem ad totū omnium. Nam quid profectò aspectu gratius isto, nempe quocunq; modo intueare in ordinē se porrigente versu? Quintilianus de orationis ornatu differit ab arboribus similitudine capta. Quid, inquit, illo quincuncē speciosius, qui in quācunq; partē spectaueris, rectus est? Cicero in Catone maiore scribit, Quū Lisander Lacedæmonius ad Cyrū venisset, & ei Cyrus consēptū quendam agrum diligenter consitum ostendisset, fertur Lisandrū admiratū proceritates arborū, & directos in quincuncē ordines, dixisse, mirari se nō modo diligentia, sed etiam solertia eius, à quo illa essent dimensa, & descripta. Si de vtilitate nos loqui velimus, est & in ipso multiplex, siue ad plātārū incrementum, siue diuturnitatem, & multitudinem prospexerimus. Varro, Pleraq; non solūm fructuosiorē agrum faciunt, ut quum in ordinem fuerint consita arbuta, atq; oliueta, sed etiam vendibiliorē, ut quæ adiciant ad fundi pretium. Nemo enim eadem vtilitate nō quod est formosius, emerere mauult pluris, quā si est fructuosius turpe. De formæ cultura hoc dico, quæ specie fiant, verustiora sequi, ut maiore quoq; cum fructu sint, ut qui habent arbuta, si sata sunt in quincuncem propter ordines atq; interualla modica, plus fructus inde auferant. Itaq; maiores nostri ex aruo equè magno male cōsito, & minus multum, & minus bonū faciebant vinū, quod quæ suo quoq; loco sunt posita, & minus loci occupant, & minus officit aliud aliq ab Sole, ac Luna, & vento. Hoc licet cōiectura videre ex aliquot rebus, ut nuces integras, quas vno medio cōprehenderis, quod putamina suo loco quæq; habet natura composita, easdem si fregeris, sesquimodio contipere possis. Præterea quæ arbores in ordine sata sunt, eas æquabiliter ex omnibus partibus Sol ac Luna coquūt, quo fit, ut vix, & oleæ plures nascantur, & celerius coquantur, quas res duas sequuntur altera illa duo, ut plus reddant musti, & olei, & pretij pluris. Columella ait. Arbores disponere vtile est, ne imbecilla à valentiore prematur, quia nec viribus, nec magnitudine par est, impariq; spatio temporis adolefcit. Plinius, In disponendis arboribus, arbutisq; ac vineis quincuncialis ordinum ratio vulgata, & necessaria, non perflatu modo vtilis, verum & aspectu grata, quocunque modo intueare in ordine se porrigente versu. Virgilius mira carminum elegantia depinxit in Georgicis.


*Nec secius omnis in vnguem  
Arborilurpositis secto via limite quadret.*

*Vix saepe*



*Ut saepe ingenti bello, cum longa cohorteis  
 Explicuit legio, & campo stetit agmen aperto,  
 Directaq; acies, ac late fluctuat omnis  
 Ære renidentis tellus, nec dum horrida miscent  
 Prælia, sed dubius mediis Marserrat in armis;  
 Omnia sint paribus numeris dimensa viarum,  
 Non animum modo uti pascat prospectus inanem,  
 Sed quia non aliter vires dabit omnibus aquas  
 Terra, nec in vacuum poterunt se extendere rami.*

- 10 Sed antiquis cur dictus sit quincuncialis ordo, declaretur. Litera X apud eos decussis dicebatur. Antiqui enim, ut nos quoq;, huiuscemodi figura denarium numerum significabant. Erat decussis decem asses vnciæ, quod si X litera per medium seces, relinquitur V, quæ figura denarii dimidium, id est, quinarium numerum demonstrat, unde etiam Latini eam figuram quincuncem vocauerunt. Constat autem decussis ex duabus quincuncibus appositè collatis. Quincunx enim ex quinque & vncia nomen compositum, unde arbores in ordine quincunciali digestæ putantur, quando secundi ordinis arbores paribus intervallis sic disponuntur, ut quincuncialem figuram servare adinvicem videantur. a distet à b decem pedibus, sic b c, & d e, primus hic erit ordo. Secundus vero f g h i, quæ itidem decem pedibus distent, & sit f in medio, a & b, g in medio b c collocetur, sic h, & i. Sit tertius ordo l m n o p, qui primo directè opponitur, & l æquidistat ab f, & m ab f g. Sic n o p, ita ut g in centri exagono videatur, æquidistans ab b c h n m f: cuius subiecta hæc erit figura.



- Hic erit verus quincuncialis ordo. Videmus hunc à natura in omnibus suis rebus observari ob creaturarum rerum commoditatem. Sic frondes in pinu, myrto, erica, cæterisq; dispositæ sunt, & rami in multis arboribus, ut lumine Solis, ventis, aëreque fruerentur, ne altera alteri subdita hac commoditate defraudare-
- 40



tur, æqualeq; à stipite rami, & frondes alimentum absq; vicinię noxa haurirēt. Sed ex his, quæ adhuc videre contigit arbusta, & viridaria, nunquam me hoc ordine vidisse memini, ob magnam, quam affert secum hic ordo difficultatē. Apud nos ordo vsitatus est in quadratum dispositus. Sed videamus nunc modum disponendi à Columella edoctum. Hæc in quincuncem vinearum metatio expeditissima ratione conficitur, quippe linea per totidem pedes, quot destinaveris interordiniorum spatii purpura vel quolibet aliquo conspicuo colore visitur, eaq; sic denotata per repastinatum intenditur, & iuxta purpurā calamus defigitur, atq; ita patibus spatii ordines diriguntur, quod deinde, quū est factum, fossor insequitur, scrobemq; alternis omissis per ordinem spatii, à calamo ad proximum calamum fodit. Sed neq; à Columella planè ratio data est: nam vsitatissimum apud nos docet. Ego verò sic instituere ordines soleo. Sit primus ordo spatiorum dimensus *a b c d e*. Capiatur deinde linea & à puncto *a*, spatio verò *ab*, signetur semicirculus. Inde apposita in puncto *b*, spatio *b a*, alius signetur, vbi se secabunt erit *f*. eodem modo ex *d e* signabis *i*, ac inter *i* & *f*, protracta linea, signabis *g h* æqualibus spatii. Eodemque modo alii inferiores ordines describuntur. Sed ordines disponendi sunt, vel secundum solis rationem vel ventorum, quod in vniuscuiusq; particulari historia describetur.

*De scrobibus faciendis.* C A P. XIII.

**V**BI interualla constitueris, ac ordines duxeris, insequitur fossor, ut scrobes aperiat, qui priusquam seras longo tempore ante effodiendi sunt. De quibus antiquorū præcepta audiamus. Theophrastus. Quia tellus vda & petuia esse debet, tum ut erumpētibus radicibus cedat, tum ut admittat madorē, & aërem, effodiuntur scrobes anno ante, quàm eo arbores adigantur, ut soles & hyemes patiantur, incipiendumq; ab æstiuo solstitio ad Arcturū, tunc enim terra ab omni officio vacat. Idem sentit Columella. Ante annum, quàm disponere voles scrobes fodito, ita sole pluuiaq; macerabuntur, & quod posueris cito cōprehendet. Sed si quo anno scrobes feceris, etiam semina ponere voles, minimum ante duos menses fodito scrobes, postea stramentis eos cōpleto, & incendito. Plinius. Præfodere scrobes ante (si fieri possit) tanto donec cespitate pingui obducātur. Mago ante annum iubet, ut solem, pluiasq; combibant, aut si id conditio largita non sit, ignes in medio fieri ante menses duos, nec nisi post imbres in his feri. Didymus. Quædam tamen maximè ante plantationem scrobes sibi effodi postulant, quò à sole, & ventis, & imbribus terra friabilior reddatur, & plantę radicem agere facilius queāt. Si verò plantare festinemus, duobus mensibus antea, aut minimū vno sarmenta, & arundinem, & quę facile cōburentur in scrobibus ad multos dies cōburemus. Theophrastus scrobes non pari altitudine faciendas censet, quū aliæ plantæ in profundum radices agant, aliæ verò superficialiæ serpant. Oleis ergo & ficibus, quibus radices minus profundę, minus item profundis scrobes. Lapides inde supponunt, quibus hyema-



hyemales aquę receptæ siccis temporibus refundi queant, vel sarmenta subiciunt, eademq; ratione fictilia, neq; sine aqua, aut paxillum adigunt, quę deinde eximunt, vt cauerna facta sit futurę aquę lacuna. Exigitur enim exhalatio, vnde tellus excipiat humiditatē, ita vt imbres sese applicare queant, sol subire, & sese aër induere, ex quibus alimēta, incrementaq; p̄ficiscuntur. Scrobes alius semper defodiendi sunt iis, quę telluri summæ adhærent: radicem autem nullam alius descendere ternis semipedibus quidam volunt: nanq; illorum consilium improbant, qui alius serunt. Sed haud rectè id affirmasse in plerisq; videtur: nam si solum altum, aut regionem cōmodam, aut etiam terrā facilem  
 10 nanciscantur, multò longiorem radicem impellunt, quę scilicet apta sit stirpe alta adhære. Columella: Quò latiores, patentioresq; scrobes feceris, eò laxiores erunt, vberioresq; fructus. Scrobs clibano similis esse debet, imus quàm summus patentior, vt laxius radices euagentur, ac minus frigoris hyeme, minusq; æstatis vapores per angustum os terræ admittant. Tum etiam cliuosis locis terra quæ in eum congesta est, pluuiis non abluitur. Virgilius,

*Quod superest, quacunq; premes virgula per agros,  
 Sparge simo pingui, & multa memor occule terra.  
 Aut lapidem bibulum, aut squallentes infode conchas,  
 Inter enim labentur aqua, tenuisq; subibit  
 20 Halitus, atq; animos tollent sata: iamq; reperti  
 Qui saxo super, atq; ingentis pondere teste  
 Vrgerent, hoc effusos munimen ad imbres.  
 Hoc, ubi hinc sit finit canis æstifer arua.*

Plinius scrobium altitudinem ita terminat. In argilloso, aut duro solo trium cubitorum in quanq; partem. In prunis palmo amplius, & vbiq; caminata fossura, ore compressiore sint. Nigra verò terra duo cubita & palmum quadratis angulis. Eadem mensura Græci authores consentiunt, non altiores quino semipede debere esse, nec latiores duobus pedibus, nusquā verò sesquipede minus altos, quoniam in humido solo ad vicina aquę perueniat. Cato, Si locus  
 30 aquosus sit, inquit, latos pedes ternos in faucibus, imosq; palmum & pedem, altitudine quatuor pedum, eos lapide consterni, aut si non sit, perticis salignis viridibus. Si neq; eæ sint, sarmentis, ita vt in altitudinem semipedem trahantur. Nobis adiiciendum videtur ex prædicta arborum natura, vt alius demittantur eæ, quæ summa tellure gaudent, tanquam fraxinus, & olea. Hæc & similia quaternos pedes oportet dimitti. Cæteris sat est, si altitudinis pedes ternos effecerint. Virgilius scrobium profunditatem ita terminat,

*Forsitan & scrobibus, quæ sint fastigia quaras.  
 Ausim vel tenui vitem committere sulco.  
 Altius & penitus terra defigitur arbor.  
 40 Æsculus in primis, quæ quantum vertice ad auras  
 Æthereas: tantum radices ad tartara tendit.*



Plinius, Aliqui lapides rotundos subiici malunt, qui & cōtineant humorem, & transmittant; non item planos facere, & à terreno arcere radicē existimantes. Glarea substrata intervtrantq; sententiā fuerit. Xenophon in suo OEconomico: scrobē neq; altiorē quatuor pedibus & semipede, neq; breuiorē duobus, & semipede fodi oportet, sed in arida altius fodies, quippe in vliginosa si altius aliquanto penetraueris, aqua manabit, quæ serere prohibet. Sequitur Theophrastus. Solo effosso oportet impleri aqua triduo antequam pangantur, & quum scrobs aqua satura fuerit, indere, vt facilior sit terra ad accipiendū radices subeūtes. Si falsum verò & arenosum solū fuerit, lapidē circūponi ad stipitē depōsiti rami, tū terram aggerere, vt ipsa discutiat falsuginē. Iuuat & arenam affundere, & calculos ab amne, vel faucibus torrētis petitos, nā & falsuginēcludūt, & ex se ipsis dulces adiungūt qualitates. A quo so verò, & scatebroso duplici fossa experiri, altera trāsuersa, vt in eā accipiantur aquæ, altera directā, quā lapidibus terrę admistis cōpleas tam pfundē, vt quū circa arborē foditur, non offendant marrā: fossa nanq; obliqua excipit, altera deducit, sabulum & terra exiccant. Quod si fors obtulerit, vt lapides ibi insint, non erunt eximendi, nam si lapides queruntur ob vtilitatem, cur abiiciendi? Ergo quamcunq; lapidis natus fueris speciem, siue grandiores lapides, siue minores, sabulū, vel inutilem terrā non auferre oportet, sed simul omnia cōfundere. Profundiores scrobes effodiendos, in quibus glareā, aut arenā illam substernas: nā si lapis continua planitie fuerit, nocet plātis, si rotundus, minutusq; refrigeratione permulcet radices, aquam excipit, & radicibus locum sibi appetētibus expeditā viam facit. Omnino & tenui solo lapides non eximendi, quippe æstiuos calores temperāt simul, & hyberna frigora: Tandē quid cuiq; terrę cōueniat, consulendū.

*De tempore sationis plantarum. CAP. XV.*

**S**TATVM tempus, quo arbores seri debeant, nemo vnquā pręscribere poterit, quū rerum series vbiq; varia sit. Ob id maiores nostri, qui de Agricultura nobis pręcepta tradidere, varii admodum & dissidētes inter se sunt, quod regionibus tantū, quas incolebant, tradidisse videantur. Differunt enim loca vel aëris qualitate, vel frigore, & calore, vel situ, quę omnia in plantarū sationibus summopere sunt animaduertenda ob ipsam germinationē, quæ in his citius, illis verò serius contingere solet. Est enim lex vbiq; terrarū plantis omnibus ferē communis, vt earum satio fiat, dum adhuc silent, & hac ratione festinantius præcoces arbores, serius verò serotinas seramus. Nos temporis sationis lunarem rationē addemus. Sed primum Theophrasti in Agricultura principis audiamus decreta. Ipse nanq; vernam probat sationē dum agitur æquinoctiū, quo tēpore turgent arbores ad germinationem. Tunc enim consitiones peragendę, quum terra citatur ad motum parturitionis ob animalium similitudinem: frustra enim est coitus, nisi in matricem immittatur semen, tempore, quo turget. Tunc turget solum, quum mader & calet: idque fit duabus cœli tempestatibus; vere & autumnō. sed melius vere seritur: Tunc enim solum est



est madens, ac calens à sole, & aer temperatus, & roscidus, vt non solum gignantur, sed viuant. Sunt tamen qui autumnum vere præstantiorem esse asserant, quod tunc plus calet tellus, & plantas melius radicari. Valida enim oportet esse principia, vnde ducantur generatio, & vita. Et si vere germinatio felix, quia terra prægnans est, tamen verna satio intempestiua: nam terram ex hyberni frigoris reliquiis etiamnum rigere aiunt, atq; aptas ad germinationis officium radices frigere, prauèque germinare: & ideo autumnò potius arbores seri, modo natura arboris ferat. Quædam enim ferre nequeunt, vt pyrus, & malus, & cæteræ arbores, quarum natura lignosa, & tenuis sit, quæ supereminenti frigori sunt obnoxia. Iam autumnali tempestate, omnia prægnantia sunt interno succo, & vere parere possunt. At vere statim possunt concipere, & præmaturè fœtus, sed cæcos edere. Vtrique ergo non est idem pristinum pariendi tempus. In autumnalibus fieri potest apparatus ad perfectionem propter temporis tractum, in vernis verò breue temporis interuallum suis excludit angustiis pleniorè fœturam. Veris autem conditiones autumnì anteponendæ sunt: nam etsi autumno sata præsto sint vere, vt quod tunc cõceperint, vere edant, idè nihilosecius accidit in iis, quæ vere panguntur: nam idè imperius æquè intus est, & aeris tum genitalis conditio, & dies calidi, & longi ad germè eliciendum promptiores sunt, & vere nihilo segnius radicari possunt propter plantarum propensionem naturalem, & humi turgorè, tum aerè ad educandū iuuantem. Solis enim vis sub terra opus facit, & radices vegetiores reddit, quæ nõ plus demittuntur, quàm quantum subire eius radii queant, aut minus bonæ sunt, si sint porrectiores. Quæ verò feruntur arbores autumnò, iis hyemis superuētū plurimum incommodari solet, vt oleis vsu venit, quæ frigore deglubuntur, & ficui succus crassior fit. Sed fortasse quispiam eximat arbores, quæ hybernā sationem tolerare valeant. Sed potiorem esse vernā arborū sationem ex legibus naturæ patet, tum quòd tempus est proprium ad arborum robur, tum quòd à cunctis pro cõfesso habetur, & longè magis cõmune. Quorundā locorum est satio, quæ sub Cane fit, quòd tunc arbores rectè valeant; & vbi frequentiores imbres æstiuæ, vt in Æthiopia, aut aliusmodi aqua, vt in Ægypto Nilus, ibi conditiones aeris sequendæ sunt, vnde ante aquas illas, aut post, sementes faciendæ, quia aeris temperies eo viget anni tempore, & id tempus præfertur verno. Fortasse meliore consilio fiet, si secundum naturam locorum sationes accommodentur, vt vbi aeris mediocris habitudo, vere serantur ibi: vbi verò sint riguæ rigationes, aut aquæ pluuiæ, aut palustres, æstate sub canicula id opus fiat, vt in agro Laconico: in æstiuosa verò regione ponantur autumno. Consulendum est autem bonæ radicū valetudini. Sed quia Aquilonibus flantibus terrā compingi, aut exugì videtur, sub Austro verò laxius mader, caletque, ob id plantam sicciorem, humidiorē fieri: ob id Austro flante melius pangitur, & non solum radices celerius comprehendunt, verum etiam germinatio maturius expeditur, fauentibus cælo, & terra. A Borea verò vtrique fit iniuria, &



arbori, quia riget, & terræ, quia compingitur, ergo neq; arbor diffundi ad radicem emissionem, neq; terra laxari ad earum admissionem potest. Florētinus verò, Australe tempus sationi accommodatius destinatur, præcipuè siccis, ut per totam hyemem rigentur plantæ, unde illicò post Pleiadum occasum obeundum id munus usq; ad hyemale solstitium. Id tempus cuncti, qui de agricultura scripserunt, vnanimiter prædicant. At Quintilii. Vere plantanda sunt, quæ autumno neglexisti. Ego experientia didici in maritima regione vineas autumno plantandas, sic etiam autumnales fructus, tum duri, tum mollis corticis eodè tempore plantaui felici successu, ex quo reliqui agricolæ nostrâ doctrinâ sequuti, non vere, ut prius soliti fuerant, sed autumno serunt. Vnde rationem afferre operæ pretium duxi. Natura simul duo contraria operari non potest, sed circum vnum occupatam, alterum negligere necesse est: nam aliquando infernas arborum partes, id est, radices, aliquando verò supernas alit. conspicuum est vere alere arborum partes summas, quum florem, & germina promunt, contra autem autumno eas relinquit, unde arbores folia abiiciunt, tunc radices aluntur, unde id tempus ad plantationem accommodatum, in quo natura circa radices occupata est. Cato autem, Caueto ne cum ventus fiet, aut imber, effodias, aut seras: nam id maximè cauendum est. Columella tradit arbores, aut radicata semina autumno deponi debere circa idus Octobris: taleas, & ramos vere, antequam arbores germinare incipiant. Plinius. Non à septentrionibus, aut ab ea parte cœli usq; ad exortum brumalem, vento flante, effodiantur arbores, aut certè non aduersæ iis ventis radices præbeantur. Virgilius,

*Nec tibi iam prudens quisquam persuadeat author,  
Tellurem Borea rigidam spirante mouere.  
Rura gelus tum claudit hyems, nec semine iacto  
Concretam patitur radicem affigere terra.  
Optima vinetis satio, quum vererubenti  
Candida venit auis, longis innisa colubris:  
Prima vel autumnus sub frigora: quum rapidus Sol  
Nondum hyemem contingit equis: iam præterit æstas.  
Ver adeo frondi nemorum, ver utile syluis,  
Vere tument terra, & genitalia semina poscunt.*

Postremo addendâ esse lunare rationem duximus, & esse plârationis veluti decretoriâ quandam, quæ ubicunq; & quomodocunq; seueris eadem semper erit. Hesiodus octauâ diem à Luna felicè esse ad plantarum positionem dicit. Diophanes, Luna crescente serendū esse semper, nihil omnino illa decrescēte. Alii à quarta ipsius die usq; ad octauâ decimâ serere commodū esse arbitrantur. Cæteri solis tribus diebus à natiuitate ipsius plâtare permittunt. Alii à decima usq; ad vigesimâ serere summo opere deuitant, ne ipsius lumē cum plantis defodiatur. Exacta igitur prædictarum observationum doctrina erit, ut Luna super terrâ existente satio fiat. Plinius humidis locis interlunio serit, vel circa interlunium quatrduo.



*Varia de satione precepta, CAP. XVI.*

**T**HEOPHRASTVS in translatione spectare iubet, vt ex simililoco plantam petas, aut saltem deteriore: nam si æquè bona sit, nulla fiet mutatio, quamobrem pristinum vitæ tenorem seruabit: læditur enim planta mutatione, quia amissis natalibus debilis efficitur. Didymus consulit plantas vt transferamus ex deterioribus in meliores, aut similes, aut certè nõ multò peiores: confertur, & perturbat commutatio in deteriora: idque non solum in plantis, sed in hominibus esse obseruatum. Plinius. Ante omnia igitur in similem transferri terram, aut meliorem oportet, nec è tepidis, aut præcoci-  
 20 bus in frigidis, aut serotinos situs, & neq; ex his in illos. Virgilius.

*Antè locum similem exquirunt, ubi prima paretur*

*Arboribus seges, ex quo mox digesta serantur,*

*Mutata ignorent subito ne semina matrem.*

Columella monet curam adhibendam, vt ab superiore, & sicciore, & exiliore in planiorem, humidiorē, & pinguiorem agrum transferatur. Theophrastus positum quoq; obseruandum ex æquo censet, quem arbores nonnullæ haberent, aut in Aquilonem versæ, aut in occidentem, aut in Meridiē. Sed quam cœli inspexere partem, in eam item vergant, vt minus sentiantur mutationes naturæ, vel consuetudinis. Virgilius idem memorat,

*Quin etiam cœli regionem in cortice signant,*

*Vt quo quaq; modo steterit, qua parte calores*

*Austrinos tulerit, qua terga obuerterit axi,*

*Restituant. Adeò in teneris consuescere multum est.*

Columella. Priusq; transferas, rubrica, vel alia qualibet re signato, vt iisdē  
 20 ventis, quibus ante steterunt, constituas eas. Plinius id floccifacit, inquit, Caro non omisisset, si attineret meridianam cœli partē signare in cortice, vt translata in iisdem & assuetis statuerentur horis, ne aquiloniæ meridianis oppositę  
 30 solibus sinderetur, & algerent meridianæ aquilonibus. Transferendarum arborum tempus alii ab ætate, alii verò à crassitudine demonstrauerunt. Arbo-  
 res crassiores digitis quinq; Caro quærit. Columella semina legit non minus crassa, quàm manubrium est bidentis, recta, læuia, procera, sine vlcerebus, integro libro, ea bene & celeriter comprehendent. Plinius ab ætate. Arborem nõ  
 40 minorem bima nec maiorem trima quidem transferri præcipiunt. Alii quum annum impleat. Theophrastus. Seritur planta recta, meliori successu, quàm flexa, nulla radicularū parte detracta, stultum est enim amittere radices, quas habemus, vt acquiramus nouas. Contra autem Xenophon. Semen iacens vt  
 gēma supinū locabis in serobe, sanè modo isto plus oculi, ac radices in terrę viscera penetrabūt, ex quo plāta firmitus radicabitur, & tandē germina super terrā pullulabunt. Plinius. Radices inflexas poni melius. Arbore ipsam ita locari,  
 vt media sit totius serobis, necessariū. Theophrastus. Plantas si fieri possi corpore fibrato capi oportet, & fibratas in recto diuittendū, & quidā etiā fibra-



tas ipsas sternendas præcipiunt. Plinius. Et hoc proderit, quamplurimum terræ, in qua vixerint, radicibus coherere, ac totas cespites circūligari. Quum ob id Cato in corbibus transferri iubeat. Radicū magnā adhibendam curam, ut exemptæ appareant, non auulsæ. Theophrastus. Si verò planta fibrata nō fuerit, ex parte potius inferiore, quàm superiore assumes, & ad palmi magnitudinē, aut plus paulò sternendū, lignum subtus scindendū, & lapide iniecto serēdum, ut oleæ, fici, & reliquarum. Rectè fit si planta sata non multum extet, propterea quòd lenta capit incrementa, quòd si plus est illud, quod supra terrā, quàm quum subter, malè cum planta agitur: quippe quū minus sit id, quod succum ministrat, maius cui ministratur, facilè laborabit inedia, & peius eueniet, ut ficus, & aliæ, quæ raræ sunt habitudinis. Sic plāta vno eodemq; impetu vberius germinat, ut iis arboribus euenit, quæ cæduntur, si prope terrā sit cæsurā, quod est in vitib<sup>9</sup>, oleis, & aliis manifestum, quæ sunt insigni magnitudine. Alii plagas obtegunt, ne sol, nève imber eò se induat. Oblinunt alii luto, alii imposita scilla plagæ, scillæ luto, luto autem fictili. Seruat enim scilla pristinum arboris vigorem, seruatur ea à luto, à fictili lutum. Plinius. Pleriq; id demum cauent, ut plaga deputati cacuminis Meridiem spectet, ignari fissuris nimii vaporis opponi. Id quidē in horā diei quintam, vel octauā spectare maluerim. Cato, Arbores crassiores digitis quinq; quæ erunt, eas præcisas serito, oblinitoq; fimo summas & foliis alligato. Theophrastus, Post sationē ne repleantur illico scrobes, ne in superiora loca citentur fibræ, atq; ab imo destituantur, nam si compleantur, succus ab ima radice ad stipitem, qui supra est, euocatur beneficio solis, & aëris. Cato, In scrobe quum pones, summā terram subdito, postea operito terram radicibus fimi, deinde calcato pedibus benè, deinde fistucis, vectibusq; calcato quamoprimè poteris. Xenophon. Vbi in scrobem arborem deposueris, superiniicias demum terram benè calcatam, alioquin periculum imminet, ne aqua vsq; ad imum penetrando patefaciat, & sol per æstus exiccādo radices adurat. Plinius. Procul dubio utilissimè quidem summam terram contentus est subdi. Terram circa radices fistucato spissandam, quod Cato primum in ea re esse censet. Plagam quoq; à trunco oblini fimo, & foliis præligari præcipiens. Theophrastus. Si iuxta scillam seratur planta ocys crescit & à vermibus non infestatur, simul omne scillis appositum facilè germinat, & celerius augefcit, causa sui odoris, feruorisq;

*De insitionis necessitate, utilitate, voluptate, & laudibus.*

#### CAPVT XVII.

**I**AM ad alteram sationis partem deuentum est, scilicet insitionem. Nam et si ibi surculus terra utebatur, ei que ipsa alimentum suppeditabat, hinc vitur trunco ab eo que alimentum ministratur: & ex utrisq; naturæ concordia vnum conflatur. Theophrastus esse mistionem quandam, ac alio modo generationem dicit, & non sationem, sed appositionem quandam dici iure optimo



optimoposse. Saturno surculorum insitionem, pomorumq; educationem, & omnem huiuscemodi fertiliū tribuunt disciplinam, ex Macrobio. Nos insitionem edocebimus, rem sanè admirabilem, ac totius agriculturæ nobilissimam partem, voluptuosam, vtilem, & necessariam. Cicero in libro de senectute nil solertius insitione in agricultura inuenire potuit. Ouidius dicit tam magnum oblectamentum de insitione capi, vt contra amorem sit remedium,

*Venerit insitio, fac ramum ramus adoptet,*

*Stetq; peregrinis arbor operta comis.*

*Cultus & in primis succos emendat acerbos,*

*Fissaq; adoptiuas accipit arbor opes.*

10

Videmus tam mirabili inuentione arbores variis, diuersisq; fructibus oneratas, vt memoret Plinius iuxta Tiburtes tot modis insitam arborem tiliam, omni genere pomorum onustam, alio ramo nucibus, alio baccis, aliunde vite, ficis, pyris, punicis malorumq; generibus vidisse. Hinc nata sunt arborū adulteria, connubia, & adoptiones, vt noua fructuū genera prioribus seculis haud visa monstrificis hominum ingeniis excogitata videantur. Hinc antiquis miluiana, epimelides, hippomelides, hamamelides, & omomelides, vt non aliud genus notare videantur, nisi in quo facta sit insitio. Sic melimela, myrapia, citromela, melocotonea, nucipruna, malina pruna, & amygdalina, & apud nos

20

nuciperfica, amygdoloperfica, soboles mediam inter vtrumq; progenitorem naturam referens, medio inter iuglandem, & persicum malum sapore, sic & amygdala, & persico vtriusque parentis ingenium referente, & effigiem simul adoptante. Sed quid mirabilius, si eodem ramo diuersi generis poma videantur, immo eodem in pomo duo dimidiati fructus videantur, vt pars vna persicum, altera nuciperficum amuletur? Sic alba & nigra vua, ficus, & mala continuò præ oculis habentur. Et si ex animalibus genere diuersis nascatur proles, hæc in totum sterilis erit, vt ex equo & asina. in plantarum verò commistione longè aliter euenit, nam si ex diuersis genere plantis nouum genus exoritur, illud possumus insitione in infinitum propagare. Sed videamus necessitatem.

30

Natura effecerat vt omnis arbor seipsam serens ex deciduo semine (vt diximus) sua natura descisceret, syluesceret, vt in aliud quodammodo genus defecisse videretur: ars autem insitionis mangonio nō solum in suam naturam redire, sed longè præstantissimam produci effecit, & contra hunc naturæ defectum, ars id remedium excogitauit. Videmus syluestres arbores sua ruditate contentas insitionis cōnubio genuina feritate domita, ac pristino habitu exuto in hortis mansuescere, & humanius viuere, edoceriq; mitioribus succis, blandoq; sapore in cibis voluptatem hominibus afferre. Papinius.

*Hinc fanit natura locis, hinc victa colenti*

*Cessit, & ignotos dulcis mansuescit in usus.*

40

Vidimus steriles arbores sua vmbra terrā opacantes adoptione tali alienos fœtus fouere, enutrire, ac diligentis nutricis officio fungi. Columella,



— aut aliena stirpe granata,

*Mitis adoptatis curuetur frugibus arbos.*

Idemq; notat, quod arbor insita fructuosior est, quàm quæ insita non est, id est quàm quæ cum ramis, aut plantis ponitur. O mira insitionis potestas! Arborem nō solum alieno germine proficisci, sed suomet surculo in semet ipsam comprehensam, multo nobiliorem, vberioremq; fieri. Exemplum est apud Plinium, doctrina verò apud Florentinum. Corellius eques, Aceste genitus inseruit castaneam suomet ipsam surculo in Neapolitano agro, sic facta est castanea, quæ ab eo nomen accepit inter laudatas. Pòst hæres eiusdem libertus, corellianam iterum inseruit. hæc est inter eas differentia, illa copiosior, hæc 10 corelliana melior. Et si sylvestris arbor fecunda euadit insitione, urbana in nobilius genus com meat vt delicatiore succo, speciosiori forma, colore, & magnitudine fructus producat. Præterea quod magni refert, omnis seminis quod feritur, vel ramis, vel alio quouis modo, lōga est expectatio ad fructuum productionem, insitio verò eodem in aliquibus quo inseritur anno producit. Florentinus ait, Arbores quæ inseruntur meliores sunt, non solum ad fructuum pulchritudinem, & bonitatem, sed & vbertatem, & celerem ipsorum fructuum prouentum. Virgilius,

*Et saepe alterius ramos impune videmus*

*Vertere in alterius, mutatamq; insita mala*

*Ferre pyrum, & prunis lapido, a rubescere corna, &c.*

*Inseritur verò ex foetu nucis arbutus horrida,*

*Et steriles platani malos gessere valentes,*

*Castanea fagos, ornusq; incanuit albo*

*Flore pyri, glandemq; sues fregere sub ulmis.*

Plinius. Pars hæc vitæ iam pridem prouenit ad culmen, expertis cuncta hominibus. Quippe quum Virgilius insitam nucibus arbutū, malis platanum, cerasis vlmum dicat, nec quicquam amplius excogitari potest: nullum certè pomum nouum diu iam inuenitur. Sed quam dicunt insitam cerasis vlmum Virgilius non habet, sed vlmis quercum: locus corrigendus venit. Est & alia vtilitas 30 insitionis, vt si fructus laboret vitio saporis, odoris, formæ, vel magnitudinis, breui tempore emendari potest defectus.

*Quid insitio, & contra Theophrastum surculum à subiecto trunco  
aliquid haurire. CAP. XVIII.*

**S**ED videamus quid sit insitio. Insitio nil aliud est, quàm surculū ex arbore accipere, & in aliā reponere, vt simul vniantur, & cogamus inuito trunco surculum quem imponimus generare. Propertius id videtur innuere,

*Insitor hic soluit pomosa vota corona,*

*Cum pyrus inuiso stipite mala tulit.*

Et Virgilius. *Miraturq; nouas frondes, & non sua poma.*

Insitio-



Inſitionem autem, Plinius inquit, caſus magiſter alius, quàm natura do-  
 cuit, & penè numeroſior ad hunc modum. Agricola ſedulus caſam ſepis mu-  
 nimento cingens, quo minus putreſcerent ſudes, limen ſubdidit ex edera. At  
 illæ viuaci morſu apprehenſæ, ſuam ex alieno fecere vitam, adparuitque trun-  
 cum eſſe pro terra. Theophraſtus de inſitione loquens ait. Quæ inſeruntur,  
 perinde vt terra ſubdito trunco vtuntur. Et ſurculus qui inſeritur, vel inocu-  
 latur, truncum ſubditum loco telluris uſurpat. Videtur magnus magiſter vel-  
 le innuere, quòd quemadmodum planta à terra non niſi alimentum ſugit, ita  
 ſurculus à ſubiecto trunco alimentum ſubripit. Et quia tum ipſius, tum alio-  
 10 rum quorundam vera hæc & indubitata opinio eſt, & videtur aliquomodo  
 eſſe vera, nos ad hanc falſitatem demonſtrandam aliquantum longius cogi-  
 mur euagari, præcipuè quum ex hac ſpeculatione quomodo rara, noua, & in-  
 uiſa in hac arte fieri poſſint, ex naturæ officina principia nanciſcemur. Dici-  
 mus ergo ſurculum à ſubiecto trunco ſubripere colorem, ſaporem, odorem,  
 magnitudinem, ac germinandi vim, & ſi non illicò, aut ſatis euidenter, tem-  
 poris tamen proceſſu clarè viſitur. Præterea vitia, ac defectus quorundam  
 fructuum hoc pacto emendari, quod authoritate, ratione, & experientia  
 demonſtrabimus. Et primo, quòd colorem à ſubiecto trunco muruetur. Flo-  
 rentinus citri poma moro inſita rubra fieri ſcripſit, idque etiam à Diophane  
 20 comprobatum. Tarentinus, & Diophanes; pyra moro etiam inſita rubra e-  
 uadere. Plinius de malis rubere infectis loquens, ait eſſe mala, quibus ſan-  
 guineus color origine, ex mori inſitu tracta. Diophanes mala in platanum in-  
 ſita rubra quoque fieri. In Veſuuii monte amineæ vites in hellanicas dictas in-  
 ſitæ, vinum ad nigrum vergens, ac reliquis coloratius producant. Beritius ve-  
 rò & Diophanes ſcripſerunt, morum à quo omnia mala rubra fiunt, in albam  
 populum inſitam, albos fructus efficere. Concipit etiam à ſubiecto trunco o-  
 dorem. Diophanes memorat; mala in cotoneum inſita fieri pulcherrima, &  
 melimela dici. Plinius ab Appio id factum, ac odore eſſe cotoneorum. Nobis  
 experientiâ compertum eſt, vuas in apianas vites inſitas, eſu moſchum olere,  
 30 ſic & eius vinum. Itemque pyra in cotoneum inſita odoratiora fieri, & colo-  
 ratiora. Sic etiam pyra myrapia, vulgò nobis *moſcatelle* dicta in cotoneum in-  
 ſita, odoratiora & nobiliora euadere. Haurit etiam & ſaporè à ſubiecto trun-  
 co ſurculus. Plinius ceraſia quæ vocantur laurea à ſubiecto trunco, cui innite-  
 bantur, nō ingratam amaritudinē hauſiſſe ſcribit, & capaciſſimā eſſe inſitorum  
 omniū platanum, & robur, verū vtramque ſapores corrumpere. Et M. Varro in-  
 nuens eſſe ad fructus ſaporè neceſſariam trunci qualitatē, ait. Si in pyrū ſylua-  
 ticam inſerueris pyrū, quamuis bonam, non fore pyrum tam iucundū, quàm ſi  
 in eam, quæ ſylueſtris non ſit. Vites, quæ vulgò hellanice dicuntur, Veſuuii in  
 monte in amineas, quas vulgò Græcas dicimus, inſitæ vinū producant, ſapore  
 40 multum Græcum vinum æmulantes. Apud nos perſicus in amaram amygdala-  
 lam inſita, poma producit, cuius ſapor amaretur. Quòd etiam trunci ratione



magnitudo variet, quotidie experientia videtur. Præcocia vulgò nobis, *almar-  
ges* dicta, quia eius fructus est paruus, vt maiorem adipiscatur magnitudinem,  
in genus pruni illud inserimus, omnium maximum, nobis *coglio pecoro* dictum,  
Plinio asininum à vilitate. Mespilum super cydoniam inseruimus, & fructus  
natus est cæteris maior. Contra verò persica, quia breuissimæ vitæ sunt, cito-  
que senescunt, nos vt huic malo remedium afferamus, iuxta Florentini præce-  
ptum in prunum inserimus, sic erimus voti compotes: nam arbor diutius vi-  
uit, sed fructus magnitudine degenerat, quippe minor euadit. Mali medices  
genus illud vulgò *limoncello picciolo* dictum, exiguo est corpore inter acrumi-  
num genera: vt maiorem ergo adipiscatur magnitudinē in citrum inserimus, 10  
vel limonem, & maius euadit, eoque magis augefcit, quo insitio reiterabitur,  
quod & germinationis tempus etiam à subiecta arbore adipiscatur. Didymus  
malum in citriū inserit, vt continuæ fœcunditatis sit. Tarentinus vt vitis vuas  
vere producat, nigram vitem in cerasum inseri iubet, nam eo tempore vuas  
producit, quo cerasus suum fructum. Eadem ratione Florentinus rosam in  
mali corticem inserit, vt rosas serius malorum tempore producat. Et nos per-  
sicum in amygdalam inserimus, vt tempestiuos producat fructus. Quod etiam  
aliquid à subiecta matrice impartiat, monstrat Tarentinus vitē in myrtum,  
insitam vnam producere, quæ imum fundum myrti baccas habebit. Florenti-  
nus oleam in vitem insitam, & vuarum botros, & oliuas producere, fructum- 20  
que gustando, & vuae acinum, & oleæ baccam simul gustabit. Palladius per si-  
cipalnam per foramen salicis inductam poma sine ossibus producere. Quod  
idem de ceraso prodicitur. Plinius in Bærica pruna malina & amygdalina nasci,  
quibus intus in ligno nucleus amygdalæ est, nec esse aliud pomum ingeniosius  
geminatum. Substituet enim truncus in insitione nutricis vicem, & sicut infans  
lactis qualitate nutritur, sic surculus impositus, & sicut cū infans Æthiopis  
nutricis lacte alitur, eius sudor pessimè æthiopis viroso odore olet, sic surcu-  
lus semper subiectæ nutricis succum sapit.

*De inoculatione. CAP. XIX.*

**N** VNC ad inferendi modos deueniamus. Erant apud maiores nostros va- 30  
rij multiplicesque modi, nec nostra ætas in nouis peruestigandis minus  
solers visa est. Insitio fit vel in cortice, vel in trunco. ab ea, qua in cortice fit, in-  
cipiemus, & primū ab inoculatione, quippe quum & antiquior, & simplicior  
sit. Dicitur Græcis *ενοπταλμια* ab oculis vt videbimus. Latinis inoculatio, no-  
bis verò hic modus, quia vsus aboleuit, penitus incognitus. Eius inuentionem  
Plinius naturæ tribuit, semine raptim auium fame deuorato, solidoque & al-  
uitepore madido, cum fœcundo fimi medicamine abiecto in mollibus arbo-  
rum lecticis, & ventis sæpe translato in aliquas corticum rimas. Vnde vidimus  
cerasum in salice, platanum in lauro, laurum in ceraso, & baccas simul disco-  
lores. Tradunt & monedulam condentem semina in thesauros cauernarum, 40  
eiusdem



eiufdē rei præbere caufas. Hinc nata inoculatio futoriæ fimili fistula, aperiendi in arbore oculum cortice excifo, fermenq; includendi eadem fistula fublaturum ex alia. In ficis autem & malis hæc fuit inoculatio antiqua. Vergiliana quærit finum in nodo geminæ expulfi corticis, gemmamq; ex alia arbore includit. Inoculationē non recipiunt ficæ, aut humoris exigui arbores. Omnium fertiliffima inoculatio, pofttea emplaftatio, fed vtræq; infirmiffima, & quæ cortice nituntur tantum, vel leui aura ocyliffimè deplantantur. Virgilij doctrinam quoque apponemus.

*Nam qua fe medio trudent de cortice gemma,*

*Et tennes rumpunt tunicas; anguftus in ipfo*

*Fit nodo finus, huc aliena ex arbore germen*

*Includunt, vdoq; docent inolefcere libro.*

Hic eft fecundus Theophrasti modus, Didymi verò tertius, docetq; hoc modo. Quæ inoculatur arbor, nodis, & agnafcenti sobole, comaq; debet liberari, relictis vberioribus, nitidiffimisq; ramis, qui huic infitioni deftinantur. Fœcundæ arboris ex anniculo germine nitidum oculum, ceu gemmam afciscere convenit, circumrafo acie scalpri diligenter cortice, & caudici in alterius veftigium imprimere. Purum corticem erugatum, nec vlla fui parte cicatricofum ligare exactè docet, & lignum integrum, & inuiolatum feruari, hoc enim perquam neceffarium fuerit. Feliciter cedit, fi recepta hoc hofpitio gemma in alterius fedem incidat, nam ita dubio procul comprehendit. Cæterum cortices craffitudine pares effe debent, & vbi coaluerunt, amputandū quod fupra compagem prominet, ne eò loci feratur alimentum, & à coalitu fuccus auocetur. Quum furculi tria monftrabunt foliola, vincula funt foluenda. Theophrastus arboris partes ad inoculationem eligit. Rami nouelli, tenerrimi; inoculandi: nam teneritudo, & ætas fauerit ad coalefcendum. nouellæ enim arbores præditæ funt principiis maximè viuendi, germinadique, & præcipuè inoculationi aptæ, quibus lentus ineft humor, præterea & quæ cortice fimili, teneroq; funt, facile mutuum obfequium præftant. Quamobrem quæ natura fimilia funt, & ætate facile coeunt, optimèq; inoculantur: vifcida enim humiditas tenax eft, & mollis cortex obfequiofus opus non refragatur. Inoculatio nō folum aptatio, fed etiam fatio iure dici poteft, & tam id quod germinat, quàm illud quod generat, fœcundus humor eft, quem oculus habens oculo aptè fe coniungit, alimentiq; obtinens facultatem, germinationem propriā reddit. Omnia enim facile augefcunt, quæ præparatā alimenti copiam fecum afferunt, fed omnium maximè inoculationes, hæ nanq; puriffimo alimento fulciuntur. Præterea fimile fimili facile coit, oculus enim oculo generis focietate coniungitur.

*De emplaftatione. CAP. XX.*

**E**MPLASTRATIO inoculationi filia, & ferè eadē videri poteft. Plinius, Emplaftatio & ipfa ex inoculatione nata videri poteft. Hoc genus nō pri-



dem repertum volunt, qui nouis moribus fauent. Sed id etiam apud vereres Græcos inuenitur, & apud Catonem. Emplastrationis nomen videtur inditū, quia quum cortex inditur, & gemma immittitur, labia luto muniant, ac emplastrant. Nobis vulgò à *scutello* dicitur, ab exempta scutula, inserēdo surculo scuti formā referente. Cato ita docet, Quod genus aut ficū, aut oleam esse volis, inde librū scalp pro eximito, alterum librū cum gemma de ea fico, quod genus esse volis, eximito, apponitoq; in eum locū vnde excaueris in alterū genus, hincitoq; vti cōueniat. Librum longum facito digitos tres semis, latū digitos tres, ad eundem modū oblinito, integito, vti cetera. Plinius ab eodem eadē recitat. Didymus vltra quæ dixerat in inoculatione, hæc habet de emplastratione. Ci-  
tra quoq; gemmā, vel oculum in pullulatione altera caudicis parte in sitionem hanc moliri nil vetat, & sæpe nō detracta ab anniculo surculo gēma, per se relicto in surculo insigni oculo inseritur, à tergo gemmæ corticē delibrans, & lignū instar scriptorij calami scalpens cum ligno, quod remansit, in vestigiū imprimitur, & sic generosiores arbores cōparabuntur. Sinistra surculorū latera, quæ inoculationis beneficio coaluerint, suos partus liberaliter scenerant. Sed elegatissimè & aptissimè à Columella designatur, Hoc genus in sitionis quū sit subtilissimū, non omni generi arborū idoneum est. Sed ferè recipiunt talē in sitionē, quæ humidum, succosumq; & validū librum habent, sicut ficus: nam & lactis plurimū mittit, & corticē robustum habet, optimè igitur inseritur capri-  
fici ramus. Ex arbore, de qua inserere volis, nouellos & nitidos ramos eligito. In iisdem obseruato gemmā, quæ bene apparebit, certamq; spem germinis habebit. Eam duobus digitis quadratis circumsignato, vt gemma media sit, & ita acuto scalpello circūcidito, delibratoq; diligēter, ne gemmā lædas. Postea item alterius arboris, quā emplastraturus es, nitidissimū ramum eligito, & eiusdem spatij corticē circūcidito, & materiā delibrato, deinde in eam partem, quam nudaueris, præparatū emplastrum aptato, ita vt alteri delibratæ parti cōueniat. Vbi ita hæc feceris, circa gemmā benè alligato, cauetoq; ne lædas ipsum germen. Deinde cōmissuras, & vincula luto oblinito, spatio relicto, vt gemma libera vinculo nō vrgeatur. Arboris autē insitæ sobolē, & ramos superiores præ-  
cidito, ne quid sit, quo possit succus euocari, aut ne cui magis, quàm insito seruiat. Post xxi diem soluito emplastrū. & hoc genere etiā inseritur olea. Palladius hæc omnia à Columella excepit, & quū noui nil sit in eo, rescribere recusauimus. Sed eiusmodi emplastrandi modū cum sua vetustate nostra ætas aboleuit, faciliorem, cōmodioremq; naçta. Ibi enim exemptā scutulam delibratę inserendæ arboris parti æquabiliter vndiq; coherere oportebat, quod sine maxima diligentia fieri nequit, nostro hoc emplastrandī modo huiusmodi labore leuabimur. Ibi coma, & arboris soboles præcidēbatur, & quū id æstu maximè fieri accideret, aut arborē exarescere, aut pluribus annis infirmari necesse erat, & si insitæ scutula non comprehendebat, vt sæpissimè accidere solet, fructibus  
& arbore ipsa priuabantur: nos æstate celebramus, quū arbores oneratas fru-  
ctibus



fructibus videmus, vbi fructuum electionē considerare possumus, quū ab omnibus decipiamur in dandis, recipiēdisq; surculis. Æstate quum arbores onustas fructibus videmus, quum succo turgent, facile deglubitur cortex: mane, vel vespere, sicco die vel temperato surculum ex arbore eligimus illius anni, scilicet è proximo vere natū, detruncatis vngue frondibus, supra gemmam per trāsuersum cultro corticem incidimus digiti latitudine, & hinc inde è lateribus acuta cultri acie circumcidimus oculum duum digitorum lōgitudine, vt cuspidatim descendat cāsura in modū scuti: gemma sit in medio, inde pollice è latere presso è ligno leuamus: inde arboris ramo, in quem inferere velimus, per trāsuersum cultro cadatur cortex, vnus digiti latitudine, è cuius medio alia aperiatut linea descendens per longum duorum digitorum longitudine, instat linea T, sed lignū ne signes. vtraq; ex parte corticē deglubes, & gemmam inter excisos cortices abscondes, coaptabis deniq; superiorē trāsuersam lineā scutuli cum illa arboris, & corticibus illis cooperies, inde cannabinis fasciis supra gemmam ligabis, & circumcirca, vt ea libera in medio remaneat. Eidemq; arbori tres, vel quatuor gemmas coaptabis, vt si vna non comprehendit, altera non deficiat. Infra viginti dies visere ne parcas: si iam comprehendit, vincula soluito, ne crescens tener truncus, vel cortex ab illis secetur. Sequenti vere supra emplastrationis locum abscondas.

De nouo anularis insitionis modo. CAP. XXI.

EST & peculiaris apud nos inserēdi modus, diciturq; vulgò *ad digitale*, vel anularis, veteribus incognitus, nec pridem nostra ætate repertus. Dicitur ad digitale, quia quemadmodū matronarum digitis imponuntur digitalia, & anuli, ita & cortex suo ligno exutus, in delibratū ramum infigitur. Præsens hic erit modus. Martio mense, quū germinatione turgēt arbores, labatq; humore nimio cortex, ex arbore, à qua fructus exoptas, nouellū germen, pollicari crassitudine, duorū pedum longitudine, leue & nitidum, acuta falce præcidito, & à capite vsq; ad imū crus corticē sensim, ac diligenter manibus intorquebis, vt à ligno illa sis gēmis delibretur. quū videbis facile à ligno, vt serpens, senecta exui, graciliori parte circumcidito anulū trium digitorum longitudine, vt in medio constitutur gēma. Deinde ex ea arbore, cui hæc insitio destinabitur, eliges virgā, cui par cum tua virga sit magnitudo, & loco leui, & enodi, vbi maximè digitalis hic cōgruere videbitur, detruncabis, & si virga crassa erit, in quatuor partes findas, si tenuis, in tres, ac vnguibus à cāsura paulatim cortice denudabis eā, & illico, ne diuturniore mora humor ille desiccetur, anulū à tua virga tolles, & in surculū iam cortice spoliatū indes, leui manus libramēto deprimendo, quousq; ligno illū excipienti vndequaq; cohæreat, & anuli corticis fracturæ periculum immineat, & virgæ cortici figatur. Sed ne laxitas, vel humor inter excipiens lignū, & aduenā corticē intersit, sed optimè in suo lare se recipiat, ibi aer subiens nunq̃ in vnitatē coire pateretur, cortices subt<sup>o</sup> deprelli manus subleuamēto ac leui filo circa caput religētur. Hoc modo castaneæ, olæ, pyra, mala, medica, iu-



glandes optimè inseruntur. Sed ficus mense Maio. Sunt qui Iunio, & Iulio mensibus ex noua virga inserant non infelici successu. Optat post insitionem illustrari Sole: nam pluuiis coalitus relaxatur, & putrescit.

*De insitionis modo, quo resecta arbor inter librum & materiam  
furculum admittit. C A P. X X I. I.*

**N** VNC de insitione agemus, quæ resecta arbore fit. Sed ratio duplex est, secto per mediū trunco, vel integro. Primum de ea, quæ integro trunco intra corticem, & lignum furculos recipit, quia prior fuit. Timebant, inquit Plinius, prisci truncum findere, mox inforare ausi medio, ipsiq; medullæ calamum imprimebāt, vnum inferentes, neq; enim plures capiebat medulla. Subtilior postea ratio vel senos adiecit, mortalitati eorum ex numero succurrere persuasa. Ex iis, quæ Cato cōmentatus est, facile apparet illa arte inter lignū & corticem, nec alio modo inserere solitos. Hæc vera dicitur insitio. Theophrastus ἐμφορτίαν vocat, videturq; significare immissionem furculi in præcisum rami. Latini peculiari voce insitionem vocant, Itali *incalamare* dicunt, quasi incalamare, quoniam furculum, quem adigunt, calamum antiqui appellabant. Vel si mauis, quia furculus cuspidatur ad modum calami. Alij graphium vocant, quum graphium & calamum ad idem vsu veniant, & Didymus ad graphij scriptorij modum efformandum furculum iubet. Id de genere insitionis. Hæc verò insitio duas habet species, ἐμφορτίαν & ἐγχευεσθαι, quarum eadem ratio, sed differunt trunci scissione. Nos hanc ἐμφορτίαν, quasi infoliationē dicimus, quia quum inserimus cortices solum aperimus, ac foliorum, vt existimo, tenuitatem imitamur. Nostrates vulgò *tra corio & pelle* dicunt, eodemque modo, quo antiqui, vtimur. Ideo eorum verbis vtetur, quum precise & eleganter demonstrent. Huiusmodi neque Theophrastus neque Virgilius meminerunt. Sed videamus primò ecquid doceat Cato antiquitate venerandus. Oleas, ficus, pyra, mala, hoc modo inserito. Quem rami insiturus eris, præcidito, inclinato aliquantū, vt aqua defluat. Quum præcides caueto ne librum conuellas. Sumito tibi furculum durum, eum præacuito, salicem Græcam discindito, argillam, vel cretam coaddito, arenæ paululum, & fimum bubulum. Hæc vnà bene condensato, quam maximè vt lutum fiat: dein capito tibi scissam salicem, eaque præcisam stirpem circumligato, ne liber frangatur, vbi id feceris, furculum aridum præacutum inter librum, & stipitem arcito primores digitos duos. Postea capio tibi furculū, quod genus inserere voles, eum primorē præacuito obliquū primores digitos duos, furculū aridum, quem arcueras eximito, eoq; arcito, furculū, quem inserere voles, librum ad librū versus facito, arcito vsq; adeo, quo præacueris. Idem alterū furculū, tertium, quartum facito. Quot genera voles tot indito. Salicem græcā amplius circumligato, lutodenfato, stirpē oblinito digitos crassos tres. Insuper lingua bubula obtegito, si pluat, ne aqua in librū permeet, eam linguā insuper librum alligato, ne cadat, 40  
postea



postea stramentis circūdato, alligatōve ne gelu noceat. Columella diligentius docet, additq; plurima. Arborem, quam inferere voles, ferra diligenter exca-  
to ea parte, qua nitida maximè, & sine cicatrice est, dabisq; operam, ne librum  
lædas, quum deinde truncū recideris, acuto ferramento plagam leuato, deinde  
cuneum tenuē ferreum, vel osseum inter corticē, & materiam ne minus digi-  
tos tres, sed considerate demittito, ne lædas aut rumpas corticem. Postea sur-  
culos, quos inferere voles falce acuta ex vna parte deradito tantum, quantum  
cuneus dimissus spatii dabit, atq; ita ne medullas, néve alterius partis corticem  
lædas. Vbi surculos paratos habueris, cuneum vellito, statimq; surculos in ea  
10 foramina, quæ cuneo adactō inter corticem, & materiam feceris, demittito,  
ea autem sine, qua adraferis, surculos sic inserito, vt semipede, nec amplius de  
arbore extent. Supra deinde muscum imposito, & ita ligato, ne pluuia dila-  
batur. Palladius eadem habet, Florentinus, & Plinius. Nos id addimus, quod  
ipsi paruifaciunt, & necessarium tamen videtur, vt inter lignum & surculum  
inanitas non relinquatur, sed vinculis extremum marginem præcingimus, in-  
ter vincula & corticē hinc inde à surculo cuneolos adigimus, vt omni ex parte  
trunci cortex surculo adhæreat, & hoc modo facilè in omnibus acruminum  
generibus vtimur. Plinius. Si crassior truncus inseratur, inter corticem, & li-  
gnum inseri melius, cuneo optimè osseo, ne cortice rumpatur laxato.

20 *De insitione, qua truncus per medium finditur.*

## CAPVT XXIII.

**A**LTER modus insurculationis erit, quum truncus per medium findi-  
tur. Primus est hic inferendi modus Theophrasto. Florentinus hunc  
modum verè insitionem appellat, vocatq; *ἐγκαντρισμόν*, fortasse quia vi scal-  
pellum in stipitem adigant. Nostrates vulgo à *spacco* dicunt, à trunci scilicet  
scissura. Theophrastus de huiusmodi insitione hæc habet. Iuuat oculum, cor-  
ticēve sine vlla scissura seruare, & surculum ita radendum, ne quid medullæ  
incommodetur, rupto enim oculo, corticēve, aut medulla nudata, futurum  
vt arefiat & emoriatur. Quamobrem foliis & corticibus insuper obtegunt,  
30 & alligant, & oblinunt luto pilis misto, vt succus persistere possit, ne sol, aut  
imber, aut frigus officiant. Quumq; trunco leniter fillo inferendum sit, sur-  
culum cuspidatim decisum malleo adigunt, vt quammaximè deprimatur, le-  
cticaq; committatur. Ad hæc humidi, tenelliq; surculi petendi sunt, ipsumq;  
locum per totam æstatem humescere conuenit: sic etiam potissimum sit, vt  
germen profiliat. Quamobrem nonnulli quatuor, & quinque menses insitio-  
nes rigari iubent. Aqua insurculationi perutilis est, nisi arbor humida natura  
sit. atq; alii argillam obducunt, alii ollam aquæ plenam apponunt, quæ paula-  
tim instillet: sit enim præ magnitudine vulnetis, vt citissimè resicceretur, nisi  
humorem extrinsecus habeant illibare. Huius insitionis modo Cato solū in  
40 vitibus vtitur. Columella ita docet. Si pusillam arborem inferere voles, imam  
abscindito, ita vt sesquipede à terra extet, & quum deinde præcideris, plagam



diligenter leuato, & medium truncum acuto scalpello permodicè findito, ita vt fissura digitorum trium sit in ea. Deinde cuneū, quo diducatur, inferito, & surculos ex vtraq; parte derafos demittito, sic vt librum seminis libro arboris æqualem facias. Quum surculos diligenter aptaueris, cuneum eximito, & arborem, vt supra dixi, alligato. Deinde circa arborem terram adaggerato vsq; ad ipsum insitū, ea res à vento, & calore maximè ruebitur. Florentinus verò. Quæ tenui sunt cortice, pauciori humore cōtentæ, & foris exuccæ, tanquam humor relicto cortice in interiorem medullam se recipiat, quales citrea malus, vitis, & aliæ complures intelliguntur, fisso ligni medio, surculi infiguntur. Palladius transcribit ab his. Virgilius hanc insitionem versibus ita celebrat.

*Aut rursus enodes trunci refecantur: & alitè  
Finditur in solidum cuneis via: deinde feraces  
Planta immittuntur: nec longum tempus, & ingens  
Exiit ad cælum ramis felicibus arbor.*

Plinius vtilia præcepta addit, quæ prætermittēda non duximus. Ante omnia gemmantes nitere conueniet, nihil vsquā vlcerosum esse, aut retorridū. Specifauet medulla calami commissuræ, si in matre ligni, corticisq; iūgatur. Id enim satius, quàm foris cortici æuari. Calami exacutio medullam ne nuder, tenui tamē fistula detegat, vt fastigatio leui descendat cuneo, tribus non amplior digitis, quod facillimè contingit tinctum aqua radentibus. Ne exacuatur in ventro, nec cortex à ligno decedat alterutri. Calamus ad corticem vsq; suum deprimatur, ne luxetur, dū deprimitur, néve cortex replicetur in rugas, ideò lachrymantes calamos inferi nō oportet, non hercule magis, quàm aridos, quia illo modo laborat humore nimio cortex, hoc vitali defectu nō humescit, neq; concorporatur. Id etiā religionis seruant, vt luna crescente calamus vtraq; deprimatur manu. Et alioquin in hoc opere duæ simul man⁹ minus nituntur, necessario temperamento. Validius enim demissi, tardius ferunt, fortius durant, contrarium ex diuerso. Ne hiscat nimium rima, laxeq; capiat, aut ne parum: & exprimat, aut compressum necet. Hoc maximè præcauendum, vt præualidè accipientis trunco in media fissura relinquatur. Quidam vestigio fissuræ falce in truncis facto, salice præligant marginem ipsum, postea cuneos figunt, continente vinculo libertatem dehiscendi. Cera si dempto libro finduntur. Dempto libro habent veluti lanuginem, quæ si comprehendit, insitum putrefacit.

*Ad insitionem maximè viles, & necessaria præceptiones.*

#### CAPVT XXIII.

**N**E docendi ordinem interturbarem, viles & necessarias quasdam maiorum nostrorum, & recentiorum præceptiones prætereundas duximus, huc enarrandas. Surculi qualitates monstrat Columella. Surculos ad insitionē sumpturus videto, vt sit arbor tenera & ferax, nodisq; crebris, & quū primum germinata tumbunt, de ramulis anniculis, qui solis ortum spectabunt, & integri erunt, eos legito, crassitudine digiti minimi. Surculi sint bifurci, vel trifur-



ti. Eadem Palla tius à Columella habet. Plinius aliqua addit. Virgilius ex cacu-  
 mine inferi verat. Certumq; est ab humeris arborum orientem æstiuum spe-  
 ctantibus furculos petendos, & è feracibus, & è germine nouello, nisi vetustę  
 arbori inferantur. li enim robustiores esse debēt. Præterea vt prægnantes, hoc  
 est, germinatione turgētes, & qui parere illo sperauerint anno. Bimi utiq; nec  
 renuiore digitominimo. Variè quoq; & nō iisdem in partibus subest omni-  
 bus succus. Viribus, ficisq; media ficiora, & è summa parte conceptus, ideo il-  
 line furculi petuntur. Oleis circa medias succus, inde & furculi, cacumina siti-  
 unt. Florentinus. Surculi, qui inferuntur, sint nitidi, fertiles, nodosi, ex arboris  
 10 parte, quæ ad Aquilonē spectat, acutis falcibus decisi, de nouo nati, laues, fre-  
 quentibus gēmis prægnantes, bifurci, vel trifurci, ab imo crure simplices, cras-  
 situdine digiti minoris, bimi. Anniculi enim promptè excurrunt, sed sunt in-  
 fœcundi. Theophrastus narrat vrbānam arborem multū fructificare, si feris  
 arboribus inserueris, nā plus alimonix subditus truncus suppeditat, vnde satis  
 prius oleastris inserunt oleas: coeūt enim validius, ac radix plus trahens alimē-  
 ti, fœcundiorē arborem reddit: contra autem si syluestrē miti inserueris, et si  
 differentia quædā erit, bonę frugis arbor nunquā erit. Contra hæc M. Varro, Si  
 in pyrum syluaticā inserueris pyrum quāuis bonam, non fore pyrum tam iu-  
 cundum, quā si in eam, quæ syluestris non sit; et si videtur Theophrasti sen-  
 20 tentiæ repugnare, tamen omnes optimè quidem dixerunt: nā alter de germi-  
 natione, & fœcunditate arboris dixit, quæ subditum syluestrē truncum habe-  
 bit, alter verò de succi fructus iucunditate. nam quæ vrbānam arborem subiectā  
 habet, ob dulcem succum, quo alitur, iucundiore fructus præbebit. Plinius. Fa-  
 cillimè coalescunt, quibus eadem corticis natura, quæq; pariter florentia eius-  
 dem horę germinationē, succorūq; societate habent. Lenta enim res est, quo-  
 ties humidis repugnant ficca, mollibus corticum duri. Reliqua observatio, ne  
 fissura in nodo fiat, repudiat quippe aduenā in hospitalis durtia, vt in parte ni-  
 tidissima, ne longior multo tribus digitis, ne obliqua, ne translucens. Inferun-  
 tur autem & inuersi, quum id agitur, vt minor altitudo in latitudinem se fun-  
 30 dat. Inferere aptissimum quamproximum terræ, si patiaturnodorum, trūciq;  
 ratio. Eminere calami sex digitorum longitudine non amplius debent. Quod  
 si longius afferantur pomorum calami, rapo infixos, optimè custodire suc-  
 cum, arbitrantur; seruariq; inter duos imbrices iuxta riuos, vel piscinas, v-  
 trinque terra obstructos. Florentinus. Si furculi longinquis tractibus defe-  
 rantur, infixi luto, in vase diligenter oblito ne ventum sentiant, asportantur.  
 Sed modum inuersum furculum ferendi à Plinio appositum, ne arbor in altū  
 excreseat, nos falsum reperimus, quippe in vite, & pruno experti, ad reli-  
 quarum altitudinem peruenerunt. Turior mihi videtur hic modus, vt bimos,  
 vel trimos furculos, & annosos detractos supra inseramus: tunc enim in la-  
 40 titudinem se diffundunt, & hoc modo cerasa, & ficus pumilas fecimus.  
 Refert Palladius à quodam diligenti agricola audiuisse: Omne insitum sino



dubio comprehendere, si depositis furculis viscum non temperatum in ipsa plaga pariter mergamus, quasi glutino quodam succos materiæ vtriusq; misturum. Plantas *ἐλαϊδεις*, hoc est, oleosæ naturæ insitiones nullo modo admittere posse, neq; enim conum aut cupressum, vel pinum, & omnino piceas peregrini quippiam vel pati, vel alere, referunt agricolæ. Cuius rei argumentum est, si plantam quamlibet oleo inunxeris, demoritur protinus. Commemoratas verò arbores præpingues esse, ac oleosas, indicio esse potest, quòd subinde desudatur pix, resinaq; proinde aliis permisceri nequeunt, sicut nec oleum ipsum. Apud rei agriculturæ studiosos sæpe agitur quæstio, vtrum sit melius plâtas in seminariis serere, postmodum inferere, ac inde in pomarium transferre, quum apud maiores legatur transplantatam arborem mitiorem reddi, an in sylvis inferere ac postea in pomarium transplantare: sanè rationes probabiles vtrinq; adducuntur, nobis autem experientia demonstravit, melius in pomario sylvestres plantas serere, ac vbi optinè comprehenderint, inferere, quàm insitas transferre: nam quum has transferimus, in coalitus loca sæpè infirmari videmus, & multoties exarescere. Præterea si velimus insitas arbores eo anno quo inserimus fructus afferre, hic erit modus. Veterem furculum inseras, præsertim qui floribus & gemmis tumeat, & qui sequenti anno fructus laturus sit, vt in sua arbore concipiat fœtus, hîc verò pariat, quos in sua arbore laturus erat.

*Ratio temporum in insitione.* CAP. XXV.

**P**RÆCEPIT M. Varro tempus potissimum esse obseruandum in insitione, ob id maiorum decreta huc afferemus: fuit enim non pauca eorum sedulitas in illius obseruatione. Arborum ergo aliæ vno, eodemq; tempore inferuntur, aliæ peculiari natura contentæ contra cæterarum morem statum sibi tempus vsurpant. Dicamus primo de communioribus. In his enim obseruari debet anni tempus, & syderum. In anni cōsideratione, non solum annus considerari debet, sed arborum natura, & locorum, ac insitionum genera, scilicet inoculatio, & insitio: nam vnum tempus vni, alteri alterum constituemus. Loquemur primo de inoculationis tempore, ac Theophrasti placita omnium principis primum apponemus. Eadem sationis, & insitionū tempora: nam quum ferre non nisi turgida valeant, ergo germinationum temporibus insitiones fieri debent. Germinatio fit per ver, per ortum Caniculæ, & per autumnum: his ergo temporibus inoculari potest. Sunt qui vernum tempus probent, dum æquinoctium agitur, arboribus adhuc fœtu grauidis: nam vnâ cum partu, germinationeq; cortex quoq; adnascitur, & obteggit. Alii præferunt quæ ex oriente Arcturo, tunc enim inoculata potius radicari, maioreq; in modum coire posse asserunt. Vere vniuersum erumpere, vtpote ex robustiori principio, sed quia aqua inoculationi officit: putrefacit enim, & admissa facile destruit, ratione infirmitatis ex hoc sub Caniculæ ortum tutissimè agi videtur.



videtur. Præterea oportet eligere tempora, tum pro locorum conditione, tum pro arborum natura: nam quum altera vdo solo, altera sicco melius degat, vtri tandem commodius sit ver, vel autumnus, considerandum. Ver ergo siccescentibus melius accommodatur, quum minus succi habeant, sed quæ pingua, limosaq; sunt, autumnum desiderant, humor enim verno tempore largior est, quàm qui ad conseruandum sufficiat. Quandiu lachrimatio durer, tempus id tricenis diebus à quibusdam statuitur. M. Varro quæ ex Theophrasto sationis, & insitionis tempora desumpserat, scripsit. Tempus idoneum, quod scribit Theophrastus vere, & autumnò, & Caniculæ exortu, neque omnibus locis, ac generibus idem: in sicco, & macro loco, & argilloso, quò minus habeat humoris, vernum tempus est idoneum: in terra bona ac pingui, autumnò, quòd vere multus humor. quam sationem quidam meriuntur, ferè diebus triginta. Cato per ver insitiones fieri debere pyrorum, & malorum, etiam per solstitium diebus quinquaginta, & per vindemiam, sed olearum, & ficorum per ver. Plinius Catonis verba interpretatur. Cato inferi iubet mala & pyra per ver, & post solstitium diebus quinquaginta post ~~quingentesimo~~, oleas autem & ficus per ver tantum. Ver tempus insitionis, incitantibus se gemmis. Didymus inoculationem ante æstatis solstitium tempestiuè celebrari prodidit, quamuis ipse circiter vernum æquinoctium, quum germinatione turgent arbores, & gemmis graxida gestiant, à die tranquillo, etiam quum cœlum silebat, inoculationem etiam spei fauentem auspicatus sit. Florentinus tradit insurculationem ad æquinoctium autumnì vsque celebrari optimè posse, in cortice vsq; ad brumam, & post Fauonii flatus, qui septima Februarii die spirare incipit vsq; ad solstitium. Sunt qui optimā in trunco prædicent post Canis ortum, rursusq; æstate post restinctos caniculæ feruores. Surculi aquilonio flatu ruente non sunt inferendi, Austro spirante potius. Columella dicit vtraq; genera insitionis verni temporis esse, tertium quo ipsas gēmas cum exiguo cortice in partē sui delibratam recipit, quam vocant agriculæ inoculationis æstiuo tempore vsurpari. Palladius. Calidis & apricis locis Februario mense, optimè celebratur insitiones duæ, inoculatio reseruatur æstati. Sed ad syderū obseruationes veniamus. Cato Luna sitiente, ficos, oleas, mala, pyra, vires inferi debere post meridiem sine vento Austro. Plinius hæc interpretatur, Luna sitiente, hoc est sicca, post meridiem, ac sine vento Austro. Sed crescente Luna inferi debere. Alibi verò. In Lunæ coitu inferuntur arbores, quam diem alii interlunium, alii silentis Lunæ appellant. Sic Columella. Omnes arbores simul atq; gemmas agere cœperint, Luna crescente inferito, oliuam autem circa æquinoctium vernum, vsq; ad Idus Aprilis. Sic enim Palladius. Sed hi omnes crescente Luna inferendas arbores iubent, nos verò contrariū obseruauimus in regionibus nostris: quippe si crescente Luna arbores inferamus, lignū non fructus affert, si verò deficiente, fructus vberes affert, arbor verò semper parua. Quapropter qui dant operā venalibus plantis, crescente Luna infe-



runt, ut breui tempore conspicuam arboris intercapedinē efficiant. Ob id pu-  
to Florentinum furculos adhuc oclusos finiente Luna, vel silente vellendos,  
decem, aut paulò plures dies ante insitionem iubere, operto sic in vase, ne qua  
expiret aura. Sed edocenda ratio cur statim eruti non sint inserendi, quippe si  
feruens adhuc, turgensq; furculus in capacem rimā immitatur, necessum est  
quippiā eius emareescere, antequā in vnum coalescat corpus, fungosam laxita-  
tem inter excipiens lignum, & hospitem furculum intercedere, in cuius rimas  
hiantes subiens aer, prorsus in vnitatē coire non patitur. Quod si dies aliquor  
vase prius claudantur, fac esset omnis iniuriæ suspicio, neq; vinculorum laxans  
mollities infestabit, neq; inspirans aer officiet, sed breui tempore comprehen- 19  
dent. Zoroastres verò Ioue existente in Leone annum esse commodum vult  
inoculationi, quum aestas veri similis eueniat. Reliquæ siderum observatio-  
nes, quum Luna Saturnum intueatur, sed ipsa in Tauro, Saturnumq; aspiciat  
sextile, vel trino, ac in bono aspectu fuerit Iouis & Venus. Saturnum enim sa-  
tionem dicunt, quum sit. Arborum verò peculiaris natura pecu-  
liare non vendicat tempus. Plinius. Punica & ficus quamquam sicca sint, re-  
craftinare minimè vtile. Pyrum vel florentem inserere licet, & in Maiū quoq;  
mensē protrahere insitionem. Cerasus sola post brumam inseritur. Cato  
inseri iubet mala ac pyra per ver, & post solstitium diebus 1. post vindemiam.  
Columella oleam circa æquinoctium vernum vsq; ad Idus Aprilis, & reliqua 20  
quæ suis in historiis recensentur.

*De insitione per terebrationem. CAP. XXVI.*

**N**VNC terebratione quomodo inseri possit edocebimus. Modum appo-  
suit primus Cato in viribus, à quo cæteri agriculturæ scriptores excepe-  
runt, aliqua addendo. Nos modum ad alias arbores traduceimus. Inquit Cato.  
Vitem quam inseres, terebra pertundito, eò duos furculos virgineos quod ge-  
nus esse voles, insertos obliquos arcito ad medullam, facitoq; ut medullæ me-  
dullam contingant, arcitoq; ea, qua terebraueris, alterum ex altera parte. Eos  
furculos facito sint longi pedes binos, eos in terram demittito, replicatoq; ad  
vitis caput, vitiq; vinclis alligato, medios in terram defigito, terraq; operito. 30  
Hæc omnia luto depsto oblinito, alligato, integitoque adeundem modum  
tanquam oleas. Columella modum corrigit, & commodiorem reddit. De-  
tractum viri quam recentissimum sarmentum eligitur, & leuiter circumra-  
sum, ut cortex tantum detrahatur, apratur foramini, atque ita luto circūlini-  
tur resecta vitis, ut totus truncus alieni generis viti seruiat. Sed aliud est fer-  
ramentum, quo priores vitem perforabant, aliud quod ipse vsus nunc magis  
aptum comperit: nam antiqua terebra, quam solum veteres agricolæ noue-  
rant, scobes faciebat, perurebatque eam partem quam perforauerat, deusta  
perrarò reuirefcebat, vel cum priore coalescebat, in eaq; nec insitos furculos  
comprehendebat, tum etiam scobs nunquam sic eximebatur, ut non inhære- 40  
ret



set foraminī, ea porrò interuentu suo prohibebat corpus furculi corpori vitis applicari. Nos terebram, quam gallicam dicimus, ad hanc insitionem commēti, longè habiliorem, vtilioremq; comperimus: nam ea excavat truncū, nec foramen inurit, quippe non scobem, sed ramenta facit, quibus exemptis, plaga levis relinquitur, quæ facilius omni tempore sedentem surculum contingat, nulla interueniente lanugine, quam excitabat antiqua terebra. Plinius vtriusq; verba refert. Palladius Columellæ. Alia est Columellæ tutior, & certior insitio, quoniam etsi proximo vere non comprehendit, sequente certè coniungi cogitur. Primum ex vicino fructuosissimam oportet considerare vitē, ex qua (velut traducem inharrentem matri) palmitem attrahas, & per foramen transmittas, quum increuerit, coniungi cogitur, & mox à matre reciditur, atq; ita superficies insitæ vitis vsq; ad receptum surculum obtruncatur. Neq; vitis in qua fit insitio interim ociosa manet, sed similiter fert fructum, & sarmentum coalitum simul augefcit, vite nihil offensa ex terebratione, neq; compressa ex coarctatione. Quod etiam à Didymo transcribitur.

*Quomodo omnis arbor omni arbori inferi possit.*

CAP. XXVII.

**N**UNC modum demonstrabimus, quò insociabiles quomodocunque arbores natura copulentur. A Catone primum edoctum in viribus. Ait enim. Si vitis vitē contingat, vitis vtriusq; latus alterum præradito oblique, & inter sese medullam cum medulla libro colligato. Ab eo edoctus M. Varro etiam suis commentariis apposuit: Est altera species ex arbore in arborem inferendi nuper animaduersa in arboribus propinquis. Ex arbore à qua quis vult habere surculum, in eam, quam inferere vult, ramulum traducit, & in eius ramo præciso, ac diffisso implicat: tam ramuli locus, qui contingit ex vtraque parte, qua fissuram intrat, falce extenuatur, ita vt ex vna parte, qua cœlum visurus est, corticem cum cortice exæquatum habeat. eius autem ramuli, quem inseret, cacumen vt directum sit ad cœlū currat, postero anno quum comprehendit, vnde progeneratū est, ab altera arbore præciditur. Sed diligentior, & vtilior ad omnes arbores, & cum omni verborū copia traditur à Columella. Sed quum antiqui negauerint posse omne genus furculorū in omnem arbore inferi, & illam quasi finitionem, qua nos paulò ante vsumus, veluti quandam legem sanxerint, eos tantum furculos posse coalescere, qui sint cortice, & libro, & fructu consimiles iis arboribus, quibus inferuntur; existimauimus errorem huius opinionis discutiendū, tradendamq; posteris rationem, qua possit omne genus furculi omni generi arboris inferi. Sed ne longiori exordio legētes fatigemus, vnum quasi exemplum subiiciemus, qua similitudine quisq; quod genus volet, omni arbori poterit inferere. Scrobem quoquouerſus pedum quatuor ab arbore oliuæ tam longè fodito, vt extremi rami oleæ possint eam contingere, in scrobē deinde fici arbutulam deponito, diligentiaq; adhi-



beto, vt robusta, & nitida fiat. Post triennium, aut quinquennium, quum iam  
 satis amplum incrementum ceperit, rami oliuæ, qui videbitur nitidissimus,  
 deflece, & ad crus arboris ficulneæ religa, atq; ita amputatis cæteris ramulis,  
 eam tan.ùm cacumina, quæ inferere voles, relinquito, tum arborem fici de-  
 truncato, plagamq; leuato, & mediam cuneo findito. Cacumina deinde o-  
 liuæ, sicuti matri inhaerent, vtraque parte abradito, & ita fissuræ fici aptato,  
 cuneumque eximito, & diligenter ramulos colligato, ne qua vi reuellantur.  
 Sic interposito triennio coalescet ficus cum olea, & tum demum quarto an-  
 no, quum bene coierint, veluti propagines, ramulos oliuæ à matre refeca-  
 bis. Hoc modo omne genus in omnem arborem inseritur. Sed Columella 10  
 mira verborum iactantia, à se modum adinuentum tradit, quum iam pridem  
 Cato, & post eum M. Varro edocuerit, vt non modus sed tantum verba sint  
 diuersa. Admisor Plinium multæ lectionis virum, qui non se apud Græcos,  
 neq; Latinos legisse scribit hunc inserendi modum, sed à Columella excogitatum  
 affirmat, baud sibi certè satis compertum. Est hæc ratio apud nos vñtatißima,  
 & maximè vtilis, vulgò *a porgere*, vel *passa inuanzi* dicta, et sic ea inter cõgenes  
 abores vtamur, scilicet in prunis persicis, malisq; & castaneis. adeò validum intra  
 duos menses incrementum capiunt, vt fructus sicut surculus, & longè subiecti  
 trunci magnitudinem superet, si nouella fuerit planta, vt vix sustineri queat. I-  
 deo animaduertendum est, vt quum iam rectè cepisse cognosces, quod erit, 20  
 quãdo pars, quæ supra truncum eminet, superat matris ramulum, tunc à matre ab-  
 scindas. Inter verò diuersi generis arbores, diutius coalescere patiaris. Quod si  
 vicinæ inferendæ arboris non datur opportunitas, & habebimus fictilia vascu-  
 la his arbusculis plantata, ex quibus fructus exposcimus, tunc præciso arboris  
 trunco, vel fisco, prædicto modo surculum inferemus, vel adraso cortice, atq;  
 itidem adraso surculo, vinculis strictè alligabimus, ne possint dimoueri, inde  
 bimestri, vel trimestri spatio elapso, à matre recidatur, & vas vltra in aliam ar-  
 borem transferas, sic vasculo nobili aliqua arbore plantato, torum pomari-  
 um, ne dicam villam optimè poteris inserere.

*De alio insitionis modo, quo & fructus simul misceri possint.*

30

#### CAPVT XXVIII.

**I**NSITIONIS, seu mistionis modos trademus, longè cæteris faciliores, ad-  
 mirabilioresq;, quibus nulla certiore via adoptati fructus ex adoptatæ for-  
 mæ, colorem, saporem, ac deniq; vniuersam eius naturam recipient. Hinc noua  
 adulterii ingenia, hinc nouos fructus hominibus visendos priorib; seculis in-  
 nisos præbebimus. Hinc qui nouis fructibus inueniendis, aut simul miscendis,  
 vitis corrigendis, emendandisq; nauant operam, principia colligere poterunt, vt  
 voti cõpotes fiant. Cato, vt præcedenti capite diximus, quum vites inferere do-  
 ceret, vtriusq; vitis adrasa flagella vniebat, vt quum coaluissent, à matre abscin-  
 deret, vt adoptati generis vites generaret. Didymus. Accipienda sunt duo di-  
 uersi generis sarmenta, eaq; findenda per mediū, atq; ita alterum alteri adiungo 40



re oportet, vt oculi coincidant, & sese mutuo coniungant, vt duo oculi quasi vnus fiat, inde validè constringere sarmenta cum papyro oportet, & scilla integere, aut glutinosissima terra, atq; ita plantare, interiectis diebus tribus, aut quinque, irrigare, quousq; germen producat. Palladius ab utroq; excepit, atq; in vnum diuersa dictorum scriptorum experimenta redegit hoc modo. Vt vitis botryones & albos afferre possit & nigros, vt Græci produnt. Si vicinæ sunt vires alba & nigra quum putantur, sarmenta vtriusq; inter se diuisa siciunges, vt medios vtriusque generis oculos æquâdo reddere possis vnitati: tunc papyro ligabis stricto, & molli, atq; humida terra curabis adlinire, & interiectis ternis diebus adquare, donec germen nouæ frondis erumpat. Nos verò duo sarmenta iuxta se vicina à parentibus non decisa, vsq; ad medullam erasa quinum digitorum lōgitudine simul adiunximus, vt duo dimidiati oculi vnus videretur: inde vlmea teniola ita alligauimus, vt è duobus oculis germen vnus exire cerneretur, qui vvas eo modo, quem diximus, præbuit. Fructus hic veluti hermaproditus ex duabus naturis coniunctus nascitur. Quod sensisse videtur Ouidius in Metamorphoseos quarto.

— nam mixta duorum

*Corpora iunguntur, faciesq; inducitur illis*

*Vna, velut si quis conducatur cortice ramos,*

*Crescendo iungi, pariterq; adolescere cernat:*

*Sic ubi complexu coierunt membra tenaci,*

*Nec duo sunt, nec forma duplex, nec fœmina dici*

*Nec puer ut possit, neutrumq; & vtrumq; videtur.*

Ficus vt fructum producat vna parte album, altera rubrum. Duorum surculorum, albæ videlicet & nigræ ficus, oculos accipito, eos per medium secato, atq; simul composito, vt medietas oculi vnus ita medietati alterius æqualiter conueniat, vt vnititas ex his facta videatur, hunc oculum ex utroq; cōpositum delibratæ ficus cortici accommodetur, vt diximus in emplastratione, & aptè deligetur, & comprehendet. Sed multas arbores sic emplastrare ne tædeat, vt earum aliqua comprehendat, & fructus hoc modo, quem diximus, afferet. Et huiusmodi inferendi ratione in malis, pyris, reliquisq; similibus vti poteris. Sic Neapoli mala, quæ ex vna parte persicum ex alia nucipersicum ostendunt, producta fuisse non dubito, vt nunc pomum in diuersas partes diuisum videatur, vt vnaquæque suum saporem, odorem, colorem, læuitatem, & formam referat, nunc vno, eodemq; ramo persicum vel nucipersicum demonstrat. Nec dissimili modo flores etiam dimidiatos producemus, vt pars alba, altera rubra, vel alterius coloris sit, vt dicemus in horto coronario. Palladius nouum infusionis genus à quodam Hispano se edoctum prædicat, monstratq; vt persica poma sine ossibus nascantur, id quod in aliis experiri posse nil vetat. Salicis ramum brachij crassitudine, solidum longum cubitis duobus, aut amplius terebrari iussit in medio, & plantam persici in eodem loco, in quo consistit, spolia-



ramis omnibus solo capite relicto per ipsum saligni manubrij foramē induci, tunc eundem salicis ramum terræ capite utroque demerso in arcus similitudinem debere curuari, foramen luto, musco, vinculis stringi, anno deinde exempto, ubi infra medullam salicis caput plantæ sic cohaerit, ut vnitas sit ex duobus mista corporibus, plantam subterincidi, atque transferri, & aggerari terram, quæ arcum salicis cum persici cacumine possit operire: hinc persici poma sine ossibus nasci. Sed hoc locis humidis conuenire, vel riguis, & salices aquationibus adiuuandas, ut & natura ligni vigeat, quæ delectatur humore, & superfluentem copiam succi germinibus ministret alienis. Nec diuersa via nuciperficum productum fuisse existimo, quod ab utroque parente nomen usurpauit, ut suum, parentisque ingenium referat. Malum est, quod foris æmula facie persicum pomum mentitur, sed succum, leuitatem & colorem iuglandis refert, saporemque medium inter iuglandem, & persicum, nomenque ab utroque parente contraxit nuciperficum, prioribus seculis inuisum, iucundo sapore, innocenti que gustu. Sic etiam amygdaloperficum, quod ab amygdalo & persico nomen assumpsit: foris persicum mentitur, intus dulcem amygdalam & forma & gustu repræsentat, nostris pomariis frequens. Nec diuersa via Plinio inuenta nucipruna: Peculiaris, inquit, impudentia nucibus insitorum, quæ faciem parentis, succum verò adoptionis exhibeant, ab utroque nucipruna dicta. Et in Betica etiam malina, malis insita, & amygdalina, amygdalis insita, quibus in ligno intus nucleus amygdalæ erat, nec vsquam pomum ingeniosius fuit geminatum. Tarentinus nigram vitem in cerasum inseri iubet, ut vvas vere habeamus: nam eo tempore vvas habebimus, quo cerasus proprium fert fructum. Sic Pamphilus, & Florentinus. Est & noua inserendi ratio, nobis cognita in senectute, oculum oculo imponendo, qua prægnantes afferent fructus, scilicet ut in aluo alterum gestent. Sic citrium in citrio, cucumeres in melonibus conspeximus.

*An herbis, & suffruticibus insitio possit reperiri.*

C A P. XXIX.

**V**IDEAMVS num & in herbis insitio possit inueniri, ut si quando necesse fuerit, odorem, saporem, colorem, vel germinandi tempus è subiecto trunco haurire possimus. Nos antiquorum dictis, aliqua à nobis explorata addemus, ut ingeniosis noua semper inueniendi ansam præbeamus. Columella ut hyberno tempore cucumeres habeamus, hoc modo fieri posse docet. Idque apud Dulum Mendesium Ægyptiæ gentis fieri posse legit. Hic enim præcipit aprico & stercoreoso loco alternis ordinibus ferulas, alternis rubos in hortis cõsitas habere, deinde eas confecto æquinoctio paulum infra terram secare, & ligneo stylo laxatis vel rubi vel ferulæ medullis stercus immittere, atque ita semina cucumeris inferere, quæ scilicet suo incremento cocant rubis, & ferulis: nam ita non sua, sed quasi materna radice aluntur, & sic insitam stirpem frigidis



ribus quoq; cucumeris præbere fructū. A quo Plinius, sed obscure admodum. Est inter herbas genus inferendi, præ illis germinibus caulibus, & in medullam semine ex aliis addito. Hoc & in cucumere syluestri. Similem huic modū Palladius commentus est, ut lactuca seminibus multis condita nascatur. Auulsæ lactucæ folia carpunt, quæ radicibus iuncta sunt, & in eisdem gradibus surculo punctis semina deponunt nasturtij, ocimi, erucæ, ac fimo adlinunt: sic obruta iterū lactuca prædictorum seminū caulibus ambietur. Sed verior insitio videri posset, si per mediū fissis radicibus syluestris intubi, radices florū caryophyllorum odore indas, & implices, ita ut vniantur: & cœruleo flore nascentur.

*De cultu, & primum deputatione. CAP. XXX.*

**H**ACTENVS seruimus, nunc colimus. Est enim altera pars libri, quam ab initio diuiseramus. Terræ cultus utilis, & necessarius, contrā negligentia perniciosus. Cultus magis refert, quàm fertilitas agri. Solum enim utcunq; fecundū natura, incuria sterilescit, ac in sentes, & dumos degenerat: nō enim possumus citra arationē, & fossionem, ceterasq; artis sedulitates, tot, tamq; agriculturæ munus frui. Placuit enim Deo opt. max. ut non sine sudore sui vultus homo vesceretur pane suo. At infœcundū cultu vber, nitidūq; euadit. Cicero in Catone maiore, Quid ergo irrigationes? quid agri fossiones? repastinationesq; proferā, quibus fit multò terra fecundior? Quid de utilitate loquar stercoreandi? M. Varro ait, nullam terram adeo immitem esse, quæ non possit cultu, & industria domari: nō aliter ac leones inter animalia ferocissimi mansuescunt. Quod Græci Poetæ innuere volentes, Cybeles terræ deæ currū per aëra duos leones ab ea mansuefactos trahere fingunt. Vnde Lucretius:

*Hanc veteres Graium docti cecinere Poetæ*

*Sedibus in curru biungos agitare leones.*

Sed terra quæ natura facilis existit, cultura longè fertilior, fecundiorque euadit, & per culturam multum acquirit, ut alimenti copiam, & pinguedinem; præterea rerum impedimenta exterminantur, noxias herbas expurgando, vitiaque ipsius perdomando, unde generosiores, & vberiores fructus producantur. Lucretius,

*Inde aliam, atque aliam culturam dulcis agellis*

*Tentabant, fructusq; feros mansuescere terra*

*Cernebant indulgendo, blandeq; colendo.*

Et Virgilius ab eo in Georgicis.

*— fructusq; feros mollire colendo.*

Sed culturæ exemplum à Plinio afferamus. C. Furius quum in patuo admodum agello largiores fructus, quàm ex amplissimis vicinitas colligeret, inuidia accusatus, ceu fruges alienas pelliceret beneficiis, die dicta, instrumentum rusticum omne in forum attulit, ferramenta egregiè facta, graues ligones, vomeres ponderosos, dixitque: Quiritēs, beneficia mea hæc sunt,



lucubrationes meas, vigilasq; & sudores non possum in forum adducere, & vobis ostendere: fuit omnium sententiis absolutus. Nos cultum alium communem, alium singularem dicimus. Dicemus iam communem, dicturi particularem in vniuscuiusq; plantæ historia. Theophrastus necessarias vocat amputationes, purgationes, decacuminationes, stercorationes, fossiones, aliasq; curas, quæ arboribus adhibentur. Plinius remedia vocat. Ex his quædam sunt communia omnium, quædam propria quorundam. Communia, ablaqueatio, accumulatio, afflari radices, aut cooperiri, riguis dare potum, vel auferre, fimisucto reficere, putatione leuare onere, & cætera. Sunt & aliquæ arbores, quæ cultum aspernantur, vt aquam, fimum, & circumfossurâ, amputationemque, 10 & omnia remedia odio habent, quin etiam iis necatur, sed ipsa amputatio est, quæ omnes præcedere debet. Quippe quum primû arboribus post fructuum decerptionem adhibeatur, & Theophrastus de hac primû differendum iubeat, quàm de reliquis agriculturæ officiis, hæc enim consequi, velut deinceps

Putatione arbores latiores, & vberiores fiunt, & facie decora, & nitate præstant: nam quæ onere languidæ premuntur, circumcisis iis, quæ pondere premebant, non iniucundo remedio leuantur, & quæ aliena ymbra laborabant, cœlum aperiendo respirant. Præterea superflua, & nimis improbè prosilientia amputando, ad ea, quæ relictæ sunt, pabulum confluir, vt ad fructificandum natura libere impetum suum faciat. Tanti arborum pu- 20 rationem antiqui fecerunt, vt deam, quæ putationi præset finxerint, quam Putam vocarunt, Arnobio authore. Sed videamus quid sit putatio. Putatio est infructifera à fertilibus refecare: auferuntur enim ab arboribus non necessaria, obstantia, fructum sobolemq; impediencia, & quod vile, & absque vitio est, relinquitur. M. Varro, & F. Pompeius putum pro puro dicebant. Hinc Callicranides malos, & nil frugi homines è republica amputandos dicebant, vt improbis hominibus careat, cōducit enim publicæ vtilitati facinorosorum hominum purgatio. Sed putationem ipsam Theophrastus in duas species diuidit. alia eruditio, alia verò putatio. Putationem in alias species ab agricolis distingui prohibet, sed alia ferro, alia manu, alia aduncis quibusdā detrahenda, 30 ne propter siccitatem, & tenuitatem ramulorum laborent vlceribus. Hic enim præarida, & tenella detrahi tantummodo iuuat. Nouellæ arbores, quoad conualescant radices, ferro tentandæ non sunt, nam si priusquam radix firmitatem adepta sit, ferro laceffitur, hædetur stipes, vtpote imbecillis: vbi verò suæ constitutionis specimen iam dederint, putationis curam adhibendam, vt in vitibus flagella adimantur superflua, pulchriora, & maximè idonea relinquuntur, sic nulla offensa sequetur, & plus alimenti ad ea, quæ relinquuntur traducetur. Sed plantarum eruditio, siue institutio est tanquam arborum figuratio, & formatio ad altitudinem, latitudinem, & humilitatem. Arbores enim, quæ in enormem excelsitatem excresecunt, agricolarum cura coercendæ sunt, 40 propterea quod de facultate fructificandi remittunt, fatigato alimento itine-



ris prolixitate, & interea intercepto ab aliis partibus. Sed consulendum germinum & ramorum frequentia. sic vberius fœtificant, & commodius coluntur. excipiendo eas quæ natura sua in proceritatem exultant, vt palma, cupressus, pinus. Adultis arboribus putatio adhibetur, & quum omnium arborum putatio intersit, potissimum ea vitis opus habet, ad hoc natura vrgente, quippe quum exuberat in fructu, & germinatione, vt adimendum sit ei, quod videtur manifesto superfluum, quod latius in eius tractatione exequendum erit. Aridæ arborum partes perpetuò demetendæ sunt, quia iis ablatis rami vulneribus non læduntur, & hærentia nutritionem impediunt. Purgantur arborum  
10 rami, qui fructum afferre nequeunt, quiq̃ue importuno situ sese immiscuerunt legitimæ germinationi; oportet enim germina foras erumpere, vnde loca inutilibus occupata euerrere operæ pretium est, etiam quæ conferta sunt, quæq̃ue mediis erumpunt, quum legitimo loco non prodeant: omnem enim tum solem, tum spiritum auferunt. Nec solem arboribus adimendū, nec ventilationem prohibendam censemus. Sed post attonisionis præcepta, tempora eiusmodi cultus edoceamus ab eodem præceptore. Id post Pleiades factitandum esse iubet, nam quum molesta sit putatio propter plagas, conuenit tunc temporis fieri, quum arbores validissimæ sunt, tunc enim suis operibus defunctæ, & cura illa fructificandi, germinandiq̃ue, se ipsa fruitur tota, sibi soli cauens. Quæ tardiores sunt, lectis fructibus tondentur. sola ficus post germinationem putatur. Nec eadem quantitas omnibus recisæ partis, habitioribus  
20 enim plus demetendum: vt myrti, oleæ, punicæ luxuria ferro compescenda, ideo quòd quanto pauciora relinquentur illis, tanto plura dabunt, quia natura sua stipata germinatione frequentantur. Sed malo, & pyro, minus recidi debet, & aut ferro leuissimè, aut manu superflua detrahenda ratione siccitatis, & corticis tenuitatis, eo enim laeso, facile patiuntur. Arborem annosam totam decidunt: germinare nanque denuò incipit, sed truncum deinde colere, tanquam denuò satum oportet. Leontius Græcus, Post collectos fructus statim magnas, & paruas arbores purgare conuenit. Omne vitiosum, & superfluum acutissimis falcibus amputandum, & nouellis non amplius vno ramulo  
30 relinquendum. Auferendæ enim truncorū propagines, vt rectus & lauis surgat. In vertice tres, aut quatuor nouellos ramos habeat illæ sos inter se distantes. sic formanda est planta, dum tenera existit. Plinius. Interlucatio arboribus prodest, sed omnium annorum trucidatio inutilissima. Vitis tantum tonsuram annuam quærit, alternam verò myrtus, punice, oleæ, quia celerrimè fructescunt. Cæteræ rarius frondentur, nulla autumno. Ac ne raduntur quidem, nisi vere putatione. Plagæ ad vitalia sunt omnia quæcunque non superuacua. Plurimæ amputari sibi volunt onerosa ac superflua, sicut nos vngues, & capillum. Reciduntur veteres rotæ, ac rursus à stolone aliquo resurgent, sed non  
40 omnes, nec nisi quarum naturam pati diximus. Sublucatio propinqua putationi est. F. Pompeius, Sublucare est arborum ramos supputare, & in densi-



rate superfluos per interualla deputare, quasi sub lucem immittere. Eo enim significatu est interlucatio. Collucare dicitur, quum rami sacræ sylvæ lumini officientes, vel arbores ipsæ succiduntur, vt lucus luce impleatur. Virgilius doctè monet,

*At dum prima nonis adolescit frondibus ætas,  
 Parcendum teneris, & dum se latius ad auras  
 Palmes aget laxis per purum immissus habenis,  
 Ipsa acies falcis nondum tentanda, sed uncis  
 Carpenda manibus frondes, interq; legende.  
 Inde ubi iam validis amplexa stirpibus ulmos  
 Exierint, tunc stringe comas, tunc brachia tonde:  
 (Ante reformidant ferrum) tunc denique dura  
 Exerce imperia, & ramos compesce fluentes.*

Nos autem in putatione his utimur. Quum setitur plantula, ramuli omnes abscinduntur, relicto eo, qui in medio est. Si arbor perfecta fuerit, abscinditur iuxta ramos truncus. Si insita fuerit, ceditur vnus, alter relinquitur, qui rectior, ac vigore præstantior fuerit, nisi punica, vel auellana, vel huiusmodi fuerit, quæ multiplici trunco diffusa relinquitur, suæ exilitatis causa. Tertio deinde anno quum rectè apprehenderit, putatio adhibeatur. Interim tamen si in cruce ramuli aliqui creuerint, decidantur, solum ij, qui circa caput sunt, relinquantur. 20  
 Primo à cruce incipiendum, & si ibi stolones adhæserint, præcidantur, nam si relinques, matrem necabunt. Si verò truncus annosus fuerit, hunc recide, illos foue: nam rectè germinabunt, & latius consurgent. Ramus si tener fuerit, cultro vno ictu refecetur, si vetus, serra, leueturq; plaga sectura inuersa, ne aquam, quæ truncum putrefacere posset, contineat. Quæ nascuntur per truncum, aut ramos, abradantur, vt crescens cortex vulnus integat, ne cicatrix appareat. Truncus solus à terra erectus formandus ad altitudinem, ad quam desideratur, lato solo altior, sicco breuior, atq; secundum arboris naturam: nam sunt quæ in altum excrecant, & quæ humiliter subrepant. In capite relinquendi sunt tres, vel quatuor rami, vt crescentes dilatentur debitis locis, & inter se 30  
 distantes. Sed si truncus nouæ plantæ, vel nitens trunci ramus non rectè abeat, pali figendi sunt circa erus, & vinculis alligandi, vt illud quod sponte facere nequit vi faciat. Sic tandem truncus in ramos, rami in virgas, & virgæ in surculos diuidantur, & vbi vento aut casu, naturæve perit ramus, facito vt crescens locum repleat. Rami soli relinquendi, qui ad trunci substantiam, & soli sufficiunt, reliqui, qui importunis nascuntur locis, recidendi.

#### *De fossione. CAP. XXXI.*

**P**OST putationem fodimus. Cicero in Catone, Quid agri fossiones, repa-  
 stinationesq; proferam, quibus sit multo terra fecundior? Fossio est ter-  
 ræ inuersio, atq; comminutio. Sed fossio duplex, vna, quæ adultis, altera, quæ 40  
 nouellis



nouellis arboribus exhibeatur. Monet nos Theophrastus, post amputationem  
 stercus adiciendum, vel alium cultum continuò adhibendum, vt languescen-  
 tibus vulnere arboribus, alimenti instauratione medicentur, & aliquid repo-  
 natur eius loco, quod ablatum est, maleficiumq; resarciatur. Fossionemque  
 omnibus arboribus prodesse scribit: nam tollit quæ impediunt, & auferunt a-  
 limentum. Præterea terra vt madescat, efficit, terræ enim agitatione subit aër,  
 eiq; permistus humorem, & alimentum facit, quapropter strigosum, siticulo-  
 sumq; solum crebro subigendum retur, vt aëre perfleretur. sic etiam palustre,  
 & vliginosum, quoniam aqua diducitur, absimiturq; à sole. quod mirum vide-  
 10 ri non debet, si contrarium effectum faciat, nam desiccet quod vdim est, sic-  
 cum humectat. Alia accedunt quoq; iuuamenta, arboris robur, & fructus bo-  
 nitas. Nam coria & testa, quæ sunt extrema fructus munimenta, vt amygdali,  
 & castaneæ, mitiora tenuioraque fiunt, & fructus interdum augescunt, quia  
 quod lignis demitur, additur pulpa: corno excepta, quæ fossione ægrescit,  
 atq; degenerat, quum plus alimenti acquirat, quàm ei opus sit. Sed eis, quæ hu-  
 miliori statu contentæ, vt sunt suffrutices & herbæ, sarculatio adhibenda est:  
 nam melius conualescunt. Tempus autem fossionis non idem vbique. Aliis  
 Martio mense, vt vberem & venustū pariant fructum. Aliis hyeme, vt sitien-  
 tibus arboribus cibum & porum præbeant. Æstate nunquam, ne solis ardor  
 20 radices perurat, sed pingue solum sese rueri possit.

*De ablaqueatione. CAP. XXXII.*

FOSSIONEM sequitur ablaqueatio, tanquā species genus. Est enim ablaque-  
 atio fossionis species. Ablaqueatio, Palladio authore, est circa arboris ra-  
 dicē dolabra terrā diligenter aperire, & purgatis omnibus, velut lacus efficere,  
 vt solis teporibus, & imbribus, puocentur. Itali excaudicare appellant, nos *dis-*  
*calzare*. Hinc satis apparet, nō à laqueis vt pleriq; putant, sed à lacubus, hoc est  
 fossis, quæ circa arboris radicem aperiuntur, hoc nomē esse deductum. Theo-  
 phrastus nouellis, & adultis arboribus conuenire dicit. Dum nouellæ sunt ar-  
 bores omnes ablaqueantur, resecanturq; radices post cōsitionem, vt profun-  
 30 diiores fiant, & plus capiant incrementi, præcipuè illæ, quæ suapte natura super-  
 ficiariæ sunt, vt iuuitæ cohibeantur. Quod studiū vitibus, & oleis potissimum  
 impenditur. Depactis verò & stabilitis, quotannis auferendæ sunt, quæ teme-  
 re effunduntur, quo fiant plures, & fortiores, quæ inferiores sunt. Hæ nanq; &  
 minutæ superiores illas interimunt, nec ipsæ quidem sibi satis cōsulunt, quum  
 quauis intemperie frigoris æstusve lædantur. Si quæ fibræ sicca sunt, auferen-  
 dæ, ne agnatæ officiant, & vermiculos creent: nec radices recidendæ, vt in-  
 fructuarij rami, & quæ bonæ frugis significationem non dabant, quum non  
 sit eadem cum radicibus ratio. Quippe præstat intactas relinquere: vnde quaq;  
 40 enim prodeat radix, modo valida sit, pabulū suggerere poterit. Plinius, Feruen-  
 tibus locis accumulanti æstate radices, operiuntq; ne solis ardor exurat. Aliubi  
 ablaqueant, perflatusq; admittunt. Idē hyeme cumulis à gelu vindicant: con-



tra illi hyeme aperiunt, humoremq; siccantibus querunt. Vbicunq; circumfo-  
diendi arbores ratio, in circuitu pedes in orbē ternos, neq; id in pratis, quando  
amore solis humorisq; in summatellure obetranr. Ablaqueandi tempus Co-  
lumella autumnale præfinit in vitibus, & ante idus Decembris lacuculos illos  
æquādos, quod nos in aliis arboribus obseruare poterimus. Sunt arbores, quæ  
minus, vel plus hanc curam desiderant, quam nos in singularum historiis de-  
scribemus.

*De stercoratione. CAP. XXXIII.*

**P**OST ablaqueationis leges stercorationis ineamus rationē, rem sanē im-  
mundissimam, sed vtilissimam agriculturæ, aruis, pratis & arboribus. Et si  
nostra tempestate quamplurimi viliissimi agricolæ pertractare vereantur, olim  
tamen ea regias manus fecerunt. Iam apud Homerum, inquit Plinius, regius  
senex agrum ita suis manibus lætificans reperitur. Augeas in Græcia Rex ex-  
cogitasse dicitur. In Italia verò Hercules diuulgasse, quæ Regi suo Stercutio  
Fauni filio ob hoc inuentum immortalitatem tribuit. Ex Augustino in libro de  
ciuitate Dei alij Stercen, & Stercutium Pici patrem vocarunt, deumq; agricul-  
turæ dixerunt. Macrobius verò Saturnum Stercutiū Romanos vocasse, quod  
primus stercore agros fecundandi rationē inuenerit. Seruius verò Pilumnū,  
Pilumni fratrem stercorationē inuenisse scribit. Sed vtilitatem stercorationis  
describamus. Hippocrates rerum naturæ cōsultissimus inquit, Terra fimo sa-  
tiata, calorē satis subministrat, & frigus, geluq; propellit, quod alioquin arbo-  
ribus nocens futurū erat, languescantibusq; illis subuenitur. Duplicem narrat.  
Theophrastus vtilitatē, nempe ad faciendum solutam terram, & ad exalefa-  
ciendū, ex quibus manifestē fertilitas exoritur. Præterea quum fructus emol-  
lire, vel adimere acinorum lignum, vel dulcem ex amaro efficere volumus, vti-  
mur eo. Quintilij, Bonam terram stercus meliorem facit, vitiosam verò emen-  
dat. Sed simorum differentias prosequamur, vt potissimum ille fimo eliga-  
tur, qui cuiq; plantæ conueniat. Theophrastus stercoris qualitates ita determi-  
nat. Hominis stercus vt Chartodras ait, omnium optimum est, secundum suil-  
lum, tertium caprarum, quartum ouium, quintū boum, sextum iumentorum.  
Stipularius fimo diuersus, diuersoq; modo additur. Quidā enim illo debilior,  
quidam efficacior est, sed id omnibus in confesso est, finū haud mordaci calo-  
re præditum esse oportere, sed tenui, faciliq; ob id ruminantium præcipuē  
capi. Ex Quintilijs habetur, Optimum stercus est auium, præter aquaticarum,  
& anserum propter humiditatem, et si aliis inimistum nō aspernendum. Præ-  
stat omnibus columbinum, quia calidum. Secundo loco à columbario est hu-  
manum, illi simile, sed perdit herbas. Tertia laus asinino, natura feruentissimo,  
& plantis conuenienti. Quarto loco caprinum, acerrimum existens. Ei conse-  
quens ouillum, quod pinguius sit. Post hæc bubulum. Suillum præstantius  
est his, sed ineptum propter nimiam caliditatem, nam perurit sata. Vili-  
mum omnium equorum mulorumq; sed acrioribus vtiliter admiscetur.



M. Varro è Cassii opinione, volucrum esse optimum ait, præter palustrium, ac nantium. De hisce præstare columbinum, quod sit calidissimum, ac fermentare possit terram. Ex sua autem opinione præstare ex auariis turdorum ac merularum, quod sit non solum ad agrum utile, sed etiam ad cibum ita bubus, & suibus, ut fiant pingues. Sic secundum columbinum, Cassius scribit esse hominis. Tertium caprinum, & ouillum, & asininum, minimè bonum equinum. Columella, Tria stercoreum genera præcipua, quod ex auibus, quod ex hominibus, quod ex pecudibus confit. Avium primum habetur, quod ex columbariis egeritur. Deinde quod gallinæ, cæteræq; volucres, edunt, exceptis tamen palustribus, aut nantibus, ut anatis & anseris: nam id noxium quoque est. Maximè tamen columbinum probamus. Secundum quod homines faciunt, si & aliis villæ purgamentis immisceatur, quoniam per se natura est feruentioris, & ideo terram perurit. Tertium locum pecudum sterco obineat, atq; in eo quoq; discrimen est. Nam optimum existimatur, quod asinus facit, quoniam id animal lentissimè mandit, ideoque facilius concoquit. Post hæc, ouillum, & ab hoc caprinum, & mox cæterorum iumentorum, armentorumq; Deterrimum ex omnibus suillum habetur. Plinius nil novi, nisi quod ex M. Varrone, & Columella excipit. Idem quoque Palladius. Nunc sterco quod cuiq; conueniat differendum. Theophrastus, Fimicatio ineunda est ex cuiusq; arboris natura, non enim ut eadem aqua omnibus confert, ita & sterco idem, sed disponendum, ut de solo supra diximus; variaturq; etiam per ætatem differentias, unde nouellis plantis lenissimum fimum apponunt, quare à ruminantibus petendum, est enim eorum lenissimus, debilis enim plantæ lenissimum fimum poscit. Vites quarto quoq; anno stercoantur, aut serius, læduntur enim si frequentius, nec vllum erit in aquis præsidium, ut in genere arborum, sed nihil secius vruntur, ob id dictum est stercoationem magis facere pro humidis locis, sicci enim agri simili periculo obnoxii sunt, nisi leuentur æstus imbrium beneficio. Nec ramen continuanda est stercoatio arboribus, vreret enim eas: etsi continua stercoatio minimè noceat aruis: quippe quum in aruo latè spargitur fimus, facile absorbitur: in agro verò arboribus confiso subit ad radices, atq; ibi vis aliquandiu perstat, ac calore aucto exuruntur. Segetes verò fimo affatim saturata, nisi pluuiarum copia diluantur, pereunt, quare tempestatibus pluuiosis crebrior stercoatio utilior, & eandem ob causam in tenuibus terris, & æstuosis locis parcius agendum. Absurdum fortasse videbitur hæc ratio: valentissimum quodq; plurimum confert validissimo, plantarum genus validissimum est, ergo validum sterco ei aptum. Sed sterco sicciora vrut: arborum natura sicca est: quocirca ne oleis quidem adhibetur absq; humore, atq; etiam quia multum appetunt humidi, quum natura humida sint, ideo quotidiana egent rigatione. Varro columbinum sterco fermentare posse terram scribit: equinum minimè bonum, sed in segetes, in prata enim vel optimum, ut cæterarum veterinarum, quæ or-



deo pascuntur, quod multam facit herbam. Columella columbinum terram fermentate reperit. Aptribr surculis hominum yrina, quam sex mēsis passus fueris veterascere, si vitibus, aut pomorum arboribus adhibeas: nullo alio magis fructus exuberat, nec solum ea res maiorem facit prouentum, sed etiam saporem, & odorem vini, pomorūq; reddit meliorem. Potest & vetus amurca, quæ salem non habet, permista huic commodè frugiferas arbores, & præcipuè oleas rigare: nam per se quoq; adhibita multū iuuat. Sed vsus vtriusq; maximè per hyemem est, & adhuc vere ante æstuos vapores, dum etiam vites, & arbores ablaqueatæ sunt. Palladius, Stercus asinorum maximè hortis conuenire, stercus quod anno requieuit, segetibus vtile esse, nec herbas creare, si vixitius sit, minus prodesse. Pratis recentia stercorea proficere ad vber herbarū. Plinius sequitur Varronem. Nunc stercorationis modum, & quantitatem indicemus. Theophrastus de vtendi ratione ambigit, nec eandem esse: nam alii arboribus apponunt admista terra. Alii effossam terram inter eandem, & inferiorem in medio finum induunt, super quem etiam reponunt exemptā terram, eoq; consilio faciunt, vt neq; à sole dissipentur genitales partes fini raptae in vapores, si supra terram esset, neq; diluatur imbris, neq; abeat. In superficie verò sparsum à sole dilui, ab aqua elui. Id tamen omnes affirmant, stercore non vehementi, sed miti vtendum, vt eorum, quæ ruminant. Plinius, Gaudent fimo plantæ. Sed cauendum ne in feruore solis admoveatur, ne immaturum, ne validius, quàm opus sit. Vrit vineas suillum, nisi quinquennio interposito, præterquam si riguis diluatur, & è coriariorum sordibus, nisi admista aqua. Item largius. Iustum existimant in denos pedes quadratos tres modios. Id quidem sola natura decernet. Columbino ac suillo plagis quoq; arborum medetur. Quintilii verò, Non aceruatim, sed densius stercorandum. Terra non stercorata rigit, nimium stercorata comburitur; Oportet eum, qui plantas stercorat, non statim ad radices stercus iniicere, sed puram terram immittere sufficientem, & tenuē, dein stercus, postea rursus id ipsum terra occultare, ita non comburentur plantæ. Stercus columbinum non præparatur, sed quale est sinentes, vnà cum semine in aruum iacitur rarius. Humanum stercus in Arabia hoc modo præparant: primo exiccant, postea aqua macerant, rursusq; siccant, & id aprissimum vitibus existimant. Sed præstat ob abominationem aliorum stercoreum mistura eius odorem mitigare. Illud præ omnibus obseruari oportet, ne annuo stercore vtantur agricola, quia nullius utilitatis est, immò etiam affert detrimenta: nam plurimas bestiolas & serpentes gignit. Triennale, & quatuor annorum valdè bonum est: nam longiori tempore quicquid fœtidum erat, euaporat, & quod durum erat, emollitur est. M. Varro columbinum vt semen aspergi in agro oportere, non vt de pecore aceruatim poni docet. Virgilius,

*Quod superest: quacunq; premes virgulta, per agros  
Sparge fimo pingui, & multa memor occulte terra.*

Columella



Columella humanum stercus aliis villæ purgamentis immisceatur monet, quia per se naturæ est feruentioris, & ideo terrâ perurit. Nec ignorare colonos oportet, sicuti refrigerare agrum, qui non stercoretur: ita peruri, si nimium stercoretur, magisque conducere agricolæ frequenter id potius, quam immodice facere. Nec dubium quin aquosus ager maiorem eius copiam, siccus minorem desideret, alter quod assiduis humoribus rigens, hoc adhibito regelatur, alter quod per se tepens siccitatibus, hoc assumpto largiore torretur. Plinius eadem habet. Sed stercorationis tempus doceamus. Post purgationem stercorendum omnino censet Theophrastus, ut se recreari pabulo possint arbores. Columella pratis debere iniicere mense Februario, Luna crescente, lupinis exili loco circa Idus Septembris. Plinius. Fimū miscere terræ plurimū refert, Fauonio flante, ac Luna siccante Id plerique prauè intelligunt à Fauonii ortu faciendum, ac Februario mense tantum, quum id pleraque sata aliis postulent mensibus: quocumque tempore facere libeat, curandum, ut ab occasu æquinoctiali flante vento fiat, Lunaque decrescante, ac sicca. Mirum in modum augetur vberitas, effectusque eius obseruatione tali. Nunc res annumerabimus, quæ etiam vires stercore præbent. Columella; Potest & vetus amurca, quæ salem non habet, permixta huic commodè frugiferas arbores, & præcipuè oleas rigare. Nam per se quoque adhibita multum iuuat. Sed vsus vtriusque maximè per hyemem est, & adhuc vere ante aestiuos vapores, dum etiam vites, & arbores ablaqueatæ sunt. Quin etiam satis profuit cineris vsus & fauillæ. Frutex verò lupini succisus optimi stercoreis vim præbet, & si hæc omnia defuerint, licet quamlibet frondem, licet è vepribus, compitisque congesta colligere, licet filicem sine iniuria vicini etiam cum officio decidere, & permiscere cum purgamentis corris. M. Columella eius patruus sæpenter numero sabulosis locis cretā ingerebat, cretosis, ac nimium densis sabulum, atque ita non solum segetes lætas excitabat, verum etiam pulcherrimas vineas efficiebat. Iam si deficiatur omnibus rebus agricola, lupini certè præsidium expeditissimum non deest, quod quum exili loco, circa Idus Septembris sparserit, & inaruerit, idque tempestiuè vomere, vel ligone succiderit, vim optimæ stercorationis exhibebit. Succidi autem lupinum sabulosis locis oportet, quum secundum florē rubricosus quum tertium egerit. Illic dum tenerum est conuertitur, ut celeriter ipsum putrescat, permisceaturque gracili solo: hic iam robustius, quod solidiores glebas diutius sustineat, & suspendat, ut eque solibus æstiuis vaporatæ resoluantur. Palladius, Maris purgamenta si aquis dulcibus eluatur, mixta reliquis vicem stercoreis exhibebunt, & limus, quem scaturiens aqua, vel fluiui incrementa respuerint. Quintili, Quidam magnam, & altā fossam efficiunt, eoque omne stercus, tum præstantius tum deterius defundunt, ac putrefaciunt, sed & cinerem furnorum, & cœnū, & omnium animalium stercorea, præ omnibus humanū, quod est magis utile, & omnes plantas, & præcipuè vites, & humanā urinam affundunt, immò etiā coriariorum recrementa, ac sordes superiiciunt. Multi etiam stipulam post messem euellam pecori subternunt, quo conculcata, & per urinam



computrefacta stercus fiat, & cum prædictis omnibus in fossam demergunt. Et si cœnosa aliqua immundities, siue etiam ex paleis, spinis, aut lignis, aut sarmentis fuerit, etiam his adiiciunt, sed & algam è mari, etiam cum adhaerentibus sordibus eiectam, aqua dulci diligenter eloram immiscent, & post omnium prædictorum in fossam misturam, aquam dulcem superingerunt, qua vna omnia putrescant. Postea verò sarculis eo vsq; mouent, donec totum commistum, & vnitum stercus succulentum fiat, valde enim prodest imbres, riuos ex viis ad sterquilinum deriuare; hæc enim aqua limosa existens stercus iam mistum augebit, & vltra putrefactione addita, melius reddet. Varro, Si in sterquilinum robusta aliqua materia sit depacta, negant serpentem nasci. Columella, Omnia in prædictum locum concauum congerenda, & assiduo humore facianda sunt, vt herbarum semina culmis, cæterisq; rebus immista putrescant. Æstiuis deinde mensibus non aliter, ac si repastines totum sterquilinum stris permisceri oportet, quò facilius putrescat, & sit aruis idoneum. Hæc eadem Plinius, & Palladius.

### De irrigatione. CAP. XXXIIII.

**D**IXIMVS de cibo, nunc de potu plantarum, quia post stercorationem irrigatione administratur. Inter ea, quæ cultui maximè necessaria sunt, aqua esse nemo est, qui ignoret. M. Varro in sui de Agricultura operis limine lympham precatur, quoniã sine aqua omnis arida, & misera agricultura est. Hanc necessitatem veteres Poëtæ suis figmentis ostendere, Herculem cum Acheloo sub tauri forma decertasse fingentes, & huius alterum cornu effregisse, quod postea vuarum, & omnium malorum, ac fructuum refertum Ætolis dederit. Cuius veritatem Diodorus Siculus ita detegit. Hercules in gratiã Chelidoniorum Acheloum amnem in alium cursum direxit, vt longè plures agros ex fluminis irrigatione feraces reddiderit. Veteres etiam Acheloum primitus aquam vocabant, Seruio referente. Ambrosius in Hexamero. Aqua nutrit omnium virgultorum, & diuersos singulis vsus ministrat, vel è terra scaturiens, vel nubibus effusa descendat. Quippe radices alit, dat omnibus vires, radicem impinguat, caudicem prouehit, ramos diffundit, folia virescere facit, fructum alit, semina pomum augere facit. Lucretius,

*Et nisi tempestas indulget tempore fausto*

*Imbribus, & tabes nimborum arbusta focillant,*

*Crescere non possint fruges, arbusta, animantes.*

Sed aquarum vtilitates, & diuersitates tractemus. Est irrigatio naturalis vna, ab arte altera. Naturalis est, quæ ex cœlestibus, & terrestribus aquis fit, sunt enim cœlestes aquæ pluuiæ, & harum imitabundi rores, terrestres verò fluentia, riuuli, & priuatim Ægypto stagnantes aquæ. Quæ ab arte fiunt, irrigationes sunt, quæ ductiles, & asperfiles sunt, quum videlicet pluuiæ desunt, supplentur arte irrigationis. In cœlestibus aquis consideranda sunt quantitas, quali-



qualitas, austrina, vel borealis, tempus, vel anni, vt hyemis, & æstatis, & eius parrium diei, & noctis, vel plantarum respectu, si ante vel post, vel in ipsa germinatione contigerit. In terrestribus considerandus est sapor, siue salus, siue dulcis, aut mixtus, puritas, vel impuritas, caliditas Solis, ignis, vel Austri, vel frigiditas. Sed quæ ab arte, secundum tempus, & modum. Sed hæc ex Theophrasti doctrinæ placitis eliciemus, ipsumq; audiamus à quantitate exordientem. Imbrium vbertatem arboribus prodesse, vel hinc etiam cōsiderari oportet, quod vbi affluentes fuerint, arbores hilariores, & meliores se habent. Sed aquiloniæ pluuiæ austrinis commodiores sunt plātis, quia frigidiores; faciunt enim vt plantæ amplius oblato sibi humore poriantur, cum fructus & plantæ ipsæ melius constent ac valeant omnes. Item superuacuum detrahunt atq; assiccāt, neq; diu id insidens humefacere patiuntur, neq; æstu solis concoctū afficere sinunt. Austrinis verò humescunt plantæ, & imbecilliores redduntur. Imbres maximè tempestiui sunt hyberni ob causas iā antè expositas. Nocturnæ pluuiæ diurnis præstant, quia humore diutius frui permittuntur, quum à sole illico non absumantur. Proxima verò bonitate eæ sunt aquæ, quæ ante germinationem eueniunt, his enim germinatio lætius agitur. Tertius pluuiarum ordo postq̃ flores lapsi sunt, quia fructuū consummationi iam pabulum accedit, sed non illicò, sed vbi fructus paulò robustiores facti sunt: nam si non consummato fructu incesserint, aut cadunt nimio humore obruti, aut si non cadunt, marcore corripuntur. Intempestiue eæ sunt pluuiæ, & pessimæ, quæ florecentibus ingruūt: pereunt enim, aut labuntur, vel rubigine marcescunt, & quæ non cadunt, degenerant, præter pauca. Sed seris fructibus seræ pluuiæ conueniunt, quum plus alimenti concoctionis desiderent, & quum nō omnibus idem tempus perfectionis. Non igitur omnibus plantis eadem pluuiarum ratio tempestiua est. Terrestres aquæ haud exiguam sibi partem vendicant ad plantarum alimenta & incrementa, quarum differentiæ multæ. Nitrosæ autē, & aluminosæ, neq; plantas alere, neq; gignere possunt, exceptis quibusdā priuata naturæ plantis, quibus quoq; priuata deberi alimenta par est, sicut mare.

30 Ei enim est sua genialis facultas, vt suas sibi plantas peculiare gignat, quæ in terra nasci nequeant. Et locis iis quibus reciprocatur mare fructuosissimas arbores quoq; videre licet, nisi quispiam dixerit, ex interiori terræ sinu dulces aquas extrahere mare ipsum, quum circumfunditur, nihil nocere. Sunt & quæ mari vicinæ nascuntur, salugine quodammodo vtentes, tum ad alimentum, tum ad robur, videturq; hoc quasi medium genus inter terrestres plantas, & marinas. Salsugo etiam plantis alimentum præbere potest, quæ in mari non viuunt, sed terrenis ipsis, minus tamen, ac minus bonum, quàm aqua dulcis, exiccat enim, atq; incrementum prohibet. Confert autem tum arboribus, tum oleribus, sed his minus, quia minus arboribus robustæ sunt, vt palmæ,

40 & brassicæ. Sed Androsthenes in Thilo Erythrei maris insula scriptum reliquit: salas rigationes plus conferre, quàm pluuias aquas arboribus, her-



bisq; & agricolas post pluuias inducere riuos eiusmodi in sata. Sed id consue-  
 tudini tribuendum iudico, quæ naturam superat. Solæ supersunt potabiles a-  
 quæ, & inter eas frigida optimæ sunt, frigus enim concoctionis est author,  
 quia introrsum ad radices calorem soluit, & obsidet, & exalefactas exu-  
 ctasq; radices refrigerat: argumento, olera, radices, & fructus frigidarum  
 aquarum irrigatione dulcescere. Et si supra commendabantur boreales aquæ  
 & nocturnæ, & frigidi flatus probabantur, par ratio & in irrigationibus. Ea-  
 dem ratione aquæ flatusve calidi diffundunt, humefaciunt, & insitum calo-  
 rem debilitant. Sed quæ potui idoneæ sunt, si salis admisceantur, vel si pe-  
 regrinis aliis qualitatibus huiusmodi vitientur, non alunt, sed lædunt. Sed 10  
 aquarum mistio tunc vilis est, quum alia cruda, & contumax existit, & al-  
 teri molli placida, & quæ injecto limo turbida, & fimoïa est, miscetur: sic te-  
 nues crassioribus congruent, vt putealis tenuitas admisceatur lutulentis sca-  
 tebris, & fluuiialis crassities pluuiali. Sed id admirabile quoque est, si qua po-  
 tabilis aqua ad plantarum alimentum inutilis sit aut non perfectè hoc funga-  
 tur officio, vt in aquis, quæ ad Pyram sunt, perspicitur: quod ex duabus  
 causis euenire potest: aut enim à raritate, quòd in ueris simile non videtur, ac  
 quippe rarissimus, alere tamen posse putatur: aut quòd saporem aliquem no-  
 xium habeant, qui gustatu hominem latet, quod deprehenditur experimen-  
 to in prædicta aqua, qui nanque homines ea lauantur, fiunt scabiosi, & plan- 20  
 tæ quoq; proximum quendam accipiunt habitum. Nec rectè putabit aliquis  
 ab ea nimium confieri nutrimentum, adeò vt concoctrix virtus plantarum  
 superetur, atq; virtute obtusa consequatur tabes. Æstate verò fluentibus aquis  
 utendum non absque ratione, siccis enim temporibus plantæ humore opus  
 habet, ad fructuum educationem. Sunt verò qui penitus tunc irrigationem ab-  
 dicunt. Sed consuetudinis habenda ratio, quia illa est iam altera natura, proin-  
 de nec intermittenda si plantæ rigari solitæ sunt, nec rigare si non sint solitæ:  
 utrouis modo, utrobiq; minus rectè fieri potest. Arbores siccis locis degen-  
 res, quia succo egent, nil aliud quarunt, quàm quod opus necessario habent, sed  
 irrigatione fructus deteriores redduntur, quemadmodum quæ non consue- 30  
 uerunt rigari, si rigentur. Sed si occeperis, perseverandum: nam & alimentum  
 substituitur. Aliæ magis fimum, quàm aquam diligunt, aliæ minus, vt eupres-  
 sus, quæ nullo pacto fimum, neq; aquam concupiscit, sed etià emori dicitur, si  
 copiosè nouella adaquetur. Punica & vitis aquam diligunt. Ficus quum riga-  
 tur, magis germine viget, sed fructum deteriore parit. Omnis cultura pro  
 natura cuiusq; propria imponenda. Plinius ex Theophrasto hæc traduxit. Cir-  
 ca Vergilias quidem pluere, inimicissimū viti & oleæ: quoniam tunc coitus est  
 earum. Hyeme imbres expectandi euident causa est: quoniam arbores fortu ex-  
 inanitas, & foliorum quoque amissione languidas, naturale est auide esurire.  
 Cibus autem earum imber. Nec per solstitia imbres vitibus conducunt. Tem- 40  
 pestiuæ aquæ hybernis primū imbribus, deinde germinationem anteceden-  
 tibus.



ribus. Tertium tempus est, quum educant poma, nec protinus, sed iam valido  
 fœtu. Quæ fructus suos diutius continent, longioresq; desiderant cibos, his  
 & serotina aquæ vtilis, vt viti, oleæ, punicis. Hæ iam pluuiæ generis cuiusq; ar-  
 boribus diuerso modo desiderantur, aliis alio tempore maturantibus. Qua-  
 propter iisdem imbribus quædam lædi videas, alia iuuari, vt in eodem genere,  
 sicut in pyris. Alio die hyberna quærent pluuias, alio verò præcocia, vt pariter  
 quidē omnia desiderent. Hybernū tempus est ante germinationem, quæ A-  
 quilonē Austro vtiliorem facit. Ratio eadem mediterranea maritimis præfert  
 (sunt enim plerunq; frigidiora) & montuosa planis, & nocturnos imbres di-  
 20 urnis. Magis fruuntur aquis sata non statim auferente eas sole. Peculiaris me-  
 dicina raphano, beræ, rutæ, cunilæ in salis aquis, quæ & alioqui plurimum sua-  
 uitati, & fertilitati conferunt. Cæteris dulcium aquarum rigua profunt. Vti-  
 lissimæ ex iis, quæ frigidissimæ, & quæ potu suauissimæ. Minus vtilis è sta-  
 gno, & quas elices inducunt, quoniam herbarum semina inuehunt, præci-  
 puè tamen imbres alunt. Horæ rigandi, matutina atq; vespera, ne inferuescat  
 aqua sole. Pluuias coruscante fulgetro demissas frugum altrices agricolæ præ-  
 dicant, & stultum prorsus dicunt quemquam harum rerum admiratione te-  
 neri, præsertim videntes in his affectionibus aquam rem mollem aspero cre-  
 20 pitu sparsum ignem eiaculari. Sed Plutarchus ex intimo Philosophiæ pœnu-  
 causas repetens inquit, Irrumpentes in tonitru aquas feraces esse fœcundas-  
 que, nihil in præsentiarum adduci potest euidentius, cuius causam ignis per-  
 missioni refert acceptam. Quippe purus ignis ac pernix ruit in fulgetrum il-  
 lucens, sæuiunt procellæ, inibiq; ventus obuersans frigus domat & humorem  
 exhaurit, ita vt germinantibus suauitatem quandam adferat, qua maturius  
 erassescant, quandoquidem & temperaturam, proprietatem, & succorum dif-  
 ferentiam emergentibus satis talia conciliant, non aliter, quàm rores dulcius  
 pabulum pecori subministrant.

*De morbis & corruptionibus plantarum, & primo de iis, qui secundum natu-  
 ram, & sponte eueniunt. CAP. XXXV.*

30 **I**AM libro finem imponeremus, nisi cultus pars altera, & præcipua, ma-  
 ximaque superesset, scilicet quæ morbos, & corruptiones demonstrat, &  
 remedia docet. Affliguntur enim plantæ omnes veluti animalia, non vno, sed  
 diuersis morbis, & communibus, & peculiaribus: vnde expedit agricolam,  
 ne suæ proles enector habeatur, erga plantas quas seuit, inseuit, & coluit,  
 veluti misericors paterfamilias erga suos liberos, medici officio fungi, &  
 ab ægitudinibus eas liberare. Nihil enim procreasse, & coluisse profuerit,  
 nisi adultis, & morbo languentibus subueniat: nec indiligentem esse conue-  
 nit, vt eis tardè opem ferat, ne quum morbi inualuerint, longa tabe de vita pe-  
 riclitentur, seroq; eis medicina paretur. Sed ad morbos transeamus, ex quibus,  
 40 vt semper nobis moris fuit, tabellā proponemus, quo magis quicquid dicturi



sumus, elucescat. Morbi vel syluestrium vel mitium arborum sunt. Dicamus primò de syluestribus, quia pauci vel nulli sunt. Theophrastus ait esse qui syluestribus morbos accidere negent, sed malè affici dicant, quum antequam germinent, vel sub ipsa germinatione, grando, aut flatus prægeli-  
 dus, aut feruidus inuasit: vincuntur enim ab intemperie. Contra hyems-  
 tempestiuatam agrestibus, quàm satius prodest: nam constipando, & con-  
 densando interna fouet principia, vnde proba germinatio prouenit. Plinius  
 ab eo, Infestantur nanq; arbores & morbis. quid enim quod genitur caret his  
 malis? Et syluestrium quidem perniciosos esse negant, vexariq; tantum gran-  
 dine in germinatione, aut flore. Aduri quoq; feruore, aut flatu frigidiorē prę  
 postero die, quoniam sua frigora etiam profunt. Nobis quoq; quod arboribus  
 idem hominibus accidere videre licet. Rustici enim nō ita frequenter, nec le-  
 uiori quauis de causa, velut vrbani languescunt. Sed vrbana morbi, & in-  
 teritus plures sunt, eosq; diuidendo dicimus: Morborū principia partim intus  
 esse, partim extrinsecus. Nos primū de intrinsecis loquemur morbis, proximi-  
 mē de reliquis. Interni morbi principium est, si alimenti copia, vel inopia, aut  
 qualitatē plus, minúsve accesserit. Est genus arborum, cui interitus spontē, &  
 secundū naturam euenit, non vllō pacto afflictato, & nimia bona habitudine,  
 quum piceæ radices succi copia in tedam abeunt, quæ vt quædam animalia  
 pinguedine suffocantur: quum enim transpiratione vti non possint, nec ali-  
 mentum transmittere, quum sint venarum oscula pinguedine angustata, &  
 obducta, moriuntur. Est & præter prædictam alia corruptio, quæ euenit pro-  
 pter nimiam fœturam. Fœcundum omne dicimus naturæ legibus breuis æui,  
 quum enim omnis humor largius fructificando absumitur, inanitione exare-  
 scit: vt olææ nouellæ nimia pereunt fertilitate; quum succus, qui matribus de-  
 betur, exhauritur in sobolē. Sed corruptio hæc videtur, nec naturalis, nec ex-  
 trinseca, violentaq;: sed arboribus accidere quòd nimia fœcunditate exsuctæ  
 moriantur. Adiungitur & alia causa, quòd aëris, cœliq; blanditiis plus quàm  
 modicum sit ad generationem citentur. Sed nil referre arbitramur, dicamus  
 naturalem esse, aut præter naturam, aut mediam inter naturalem, & non na-  
 turalem. Plinius ab eo. Aliquæ verò & obesitate, vt omnia, quæ resinam fe-  
 runt, nimia pinguedine in tedam mutantur, & quum radices quoque pingue-  
 scere cœpere intereunt, vt animalia nimio adipe.

*Extrinseci morbi qui fuerint naturales, & de publicis morbis, syderatione,  
 mortificatione, & vermiculatione. CAP. XXXVI.*

**D**IXIMVS de intrinsecis, nunc de extrinsecis. Morbi igitur extrinsecus  
 aduenientes sunt, aut secundum naturam, aut præter naturam, & vio-  
 lenti: nam qui algore, ardore, aut aëris ratione, etsi extrinsecus, eueniant,  
 non præter naturam censendi sunt. Morbus enim partim præter naturam est,  
 & est discessus quidam, atq; perturbatio rei, quæ secundum naturā fit: partim  
 quòd



quod solitus est, & sæpe accidit, secundum naturam esse dicimus. Morbi igitur extrinsecus euenientes, alij sunt violenti maximè, & præter naturam, ceu vulnera, de quibus posterius dicturi sumus: alij minus violenti, & extrinseci, vt aëris excessus: minime verò omnium corruptiones sunt, quas morbus attulerit. Sunt enim istæ maximè diuturnæ, quamobrem nec præter naturam esse apparent, æquè vt in animalibus. Quorum morborum, alij sunt publici, & omnibus communes, vel pluribus, alij sunt peculiare per genera. Dicemus primo de communibus, vt sunt syderatio, mortificatio, & vermiculatio: & primo de syderatione Theophrasti diuini doctrinam sequendo, tum quod distinctiùs, & lucidiùs, tum quod omnibus melius de iis scripserit. Syderantur nouellæ plantæ magis, quàm vetulæ, & surculi præcipuè suæ plantæ imbecillitate, quod accidit, quum siccata tellure, humorem attrahere nequeant, propterea sub Cane multa syderantur, vetulæ validius resistunt, vt pote robustiores, & quia plus è longinquo trahunt. Præterea vetulæ suo pte succo sunt pinguiore, & nouellarum præueniunt fœturam, ipsaq; tempora squallida, proinde non fallit spes, sed quantum spondent in flore, tantum fructu præstant. Tandem quia imbecillæ sunt, mutationes sufferre nequeunt. Præterea humescunt sub Cane arbores, & eo tempore germinatio germinum accedit. Est & alia causa syderationis, quæ fit vulnere, quum ea quoq; ratione infirmiora reddantur. Plinius.

20 Syderatio tota cœlo constat. Proprium syderationis est ab ortu Canis siccitatum vapor, quum insitæ, ac nouellæ arbores moriuntur, præcipuè vites, & ficus. Est & morbus *σπαχελισμός* syderatio dictus, translatus nomen ab effectu simili, quia reperitur in animalibus, est verò quum in radicibus ex vulnere, & vlcere propter putrefactionem calor extinguitur, quasi mortificatio. Sed non in omnibus verum est: nam cicer hoc morbo perit, nec propter vulnus: elota enim falsedine interit. Idcirco in aliis etiam sine vulnere videtur. Alij sunt, qui mortificationem, & syderationem idem esse dicant. Possunt aliæ causæ esse, scilicet alimenti excessus, & defectus, vel succi cruditas, vel ab aëre. Quippe frigore superueniente post aditos fructus ex imbecillitate tenui humoris arbores intereunt: nam quum crassior pars in fructum abierit, reliqua serosa tenuis petitur à frigore, vnde ex imbecillitate perit. Sequitur etiam interdum ob alimenti defectum, quotiens radices minus commodè teguntur, ita altæ, vt extantes videantur, vritur enim succus, aut incrassatur. Combustus non alit. Crassius si aleret, ad alédas partes non adit, vnde morbus, & interitus. Huic proximum quum squallent siccitate, humoreque carent, quem transmittant. Erunt suppetiæ solum semper mouere. Sic enim recenter reponitur, vnde subinde aliquid afferatur succi, id, quod æstate potissimum iuuat, propter siccitatem, eritque munimentum aduersus hyemem, ne calor exhalet, qui excessum humoris ex hyemalibus imbribus digerat per arboris partes, alioquin exalbescunt arbores, sicut & sata, & intereunt, quum vegetari nequeant; nisi enim

40 calor adsit, humoris copiam coquere nequit, nec alitur planta. Vnde ieiunio



laborare necesse est. Interdum non perit, sed tantū ægrotat, vt fructificare nequeat. Quod enim pabulum non excoquit, neq; euincit, fructificare non potest. Sed exitialis arborū lues, vermiculatio est: cuius causa duplex. Infiectuum vulnus, & sitis; ex vulnere enim fit sanies, ex sanie vermes progignūtur. Sic & in reliquis rebus euenit. Ex siti prouenit idem: nam quū debiti humoris defectus euenit, fit dimotio quædā ex natura, dimotionē mutatio & alteratio sequitur, ex mutatione verò gigni vermiculos videmus. In arefactis idē accidit, vbi calor redditur efficacior. Mali huic vitio maximè obnoxia sunt, in locis feruidis, breui enim fit radicū exiccatio. Isq; morbus omnibus penè euenit. Sed malos pluribus infestari vermibus videmus, atq; iccirco citius intereūt, sic ficū & pyrum. 10 Minus vermiculationē patiuntur, quæ acerbo & acri succo prædita sunt, tum quia minus putrēt, tum quia acerbitas animalium partum prohibet, sicut in lauro, quæ cito putrescit, at propter acrimonia vestigia non æquè vermiculatur. Caprificus nō sicut ficus putrescit, quia eius lac acerbior est: acidæ punicæ minus, quàm dulces putrescunt, quia dulcis succus imbecillior est, ob id mutationem facilius recipit, putrescit quæ, & omnium maximè mali verne, succi & totius naturæ imbecillitate. Omnia quæ lentisco inserta mandātur terræ, minus vermiculos sentiunt, odoris, calorisve causa. Plinius. Arborū communis morbus vermiculatio est, sed vermiculantur magis, minusve quædā, omnes tamē ferè. Idq; aues caui corticis sono experiuntur. Maximè autē arborum hoc sentiunt 20 pyri, mali, fici. Minusq; quæ amaræ, & odoratæ sunt. Contra hunc perniciosissimum morbum, qui si in arboribus diutius immoratus fuerit, mortē infert, rei agrestis scriptores nō segnes fuerunt: nam plura remedia ab eis descripta sunt. Alij radices ante plantationē felle taurino oblinunt, quod post etiā frequētius faciunt, idq; maximè in punica & pyro. Nonnulli suillum stercus vel caninum vrina hominis, vel asini diluunt, & ablaqueatis radicibus affundunt. Democritus lemniam rubricā cum aqua terebat, & eo postea radices illinebat. Alij lupino cum oleo trito radices etiā oblinebant. Alij hominis vrinā desumunt, & ex tertia aceti parte miscent, & vbi sunt vermes infundunt. Multi scillæ bulbū cum lupinis in aqua per multos dies macerant, & cum spongia vermium plagas abundanter inspergunt, quæ si per aliquot annos arboris truncū inunxeris, à vermibus nō corrumpetur. Plures cinerem amurcæ cōmiscunt, vel bouis vrinam cum tertia aceti parte infundunt, vel viuam calcem in aqua decocti lupini. Alij bitumen, vel oleum vermiū latebris indunt. Alij amurcā, vel veterem vrinam. Aliud est quoq; remedium. Clauo greco fodiendus, atq; vellicandus cortex, donec mucrone beltiola deprehendatur: plagam postea fimo bubulo oblinunt.

*De peculiaribus arborum morbis. CAP. XXXVII.*

**I**AM diximus de vniuersalibus morbis, nunc de quarundam specierum morbis peculiaribus. Ficus glabrationem patitur. Si enim imbres nimij fuere, radix deglubitur, quod vitium ollam appellant. Morbus hic radicibus paulò 40  
supe-



superius accidit, isq; ex humoris nimietate accidere solet. Plinius. Cæterum si rores cadunt, siue imbres nimij fuere, alio modo ficus laborat radicibus madidis. Viti hirculatio, vel articulatio accidit ex eadem causa, & quæcunq; nimia germinum luxuria fructificare nequeunt eodem pertinent: hæc pabulum excoquere nequeunt, sed vis tota ad germina conuertitur. Fitq; morbus ille, aut multæ germinibus iniuria ventorū, aut imperitia culturæ concisis aut in supinum excisis: vniuersi enim succi impetus ad germinandum excurrit, ac fructus expectandus non est. Vnde pampinatione vrendum præcipiunt per totam æstatē, sarmenta etiam, & propagines summittunt, item radículas tollunt, 10 quæ trunco hærent superiore. Adde ablaqueationes, & suffossiones, vt radices nudentur, & noui cæli haustu castigentur, præcauendo ne quid pedamentum offendat. Hæc omnia alimentum diminuunt, & vires augment. Plinius. Vitis morbus peculiaris articulatio tribus de causis. Vna, vi tempestatum germinibus ablatis. Altera, vt notauit Theophrastus, in supinū excisis. Tertia, culturæ imperitia læsis: omnes enim earum iniuriæ in articulis sentiuntur. Ficus quoq; scabiescit humore nimio. Remedium erit quum germinare incipit, putetur, ne sua opacitate succum percrassescat. Alia ratione fieri posse scabiem dicunt, ac Vergiliarum ortu initium capere ex minoribus pluuiis, quæ vbi infederint, hærent, & feruent, (nam si imber largior fuerit, sordes eluit) atque 20 etiam fortasse subeunt, vnumq; fiunt intus cum naturali succo. Et accidit vt grossi, & caprificus decidant, nec tamen eis scabies vbique accidit, sed hi morbi ratione locorum euenire videntur, quemadmodum & animalibus. Nam apud aliquos scabies nullo modo infestat, vt nec circa Æneam. Plinius. Scabies communis omnium, est impetigo, & quæ adnasci solent cochleæ, peculiaris ficorum vitia, nec vbique. Sunt enim quædam ægritudines & locorum. Scabies gignitur roribus lentis post Vergilias: nam si rariores fuere, perfundunt arbo- rem, nō scalpunt scabiem. Olea lichenas patitur, vitis rorationem, siue acino- rum defluxionē, Chelidemo authore. Fructus enim prætenuis, fluxusq; crea- tur. Remedium erit, quū nimia alimenti vbertas detrahatur, vt amygdalas & 30 punica castigare solemus: vel quū arbor firmior, & robustior redditur. Rora- tionis gemina causa est, aut quod flores rorem excipiunt, aut quod exuperantia fuerit. Quod si ita sit, aërē dixerim in profluvio floris humidiorē veluti æruginē procreare, vbi verò plus æquo inualet, alimentū auertit. Hac vtraq; de causa acini partim labuntur, partim ita manent, vt non attingant à natura debitam magnitudinem. Vites quum alere, ægrotant: oculi nanq; primò putatis hebetantur. Rursusq; ex nimio calore idem euenit, etenim eorum quoq; tempe- ramentum poscunt, sicut etiam alimēti omnino. Cuius causam affert. Accidit oculorum hebetatio, quum acriter frigent, proximum illi est, quod agrestibus euenit, si quum germina sua festinantius inchoant, gelatio consequuta est hac 40 quoq; ratione flos perit inrempestius. Flatus enim gelidus adhuc imbecilli occursans perfundit. Plinius. Vites ægrotant etiam quum alere, læsis vredine



attonsarum oculis ex calore hoc euenit intempestiuo, quoniam omnia modo constant, certoq; temperamento fiunt. Olea clauum patitur, quidam fungum appellant, alij ollam, hoc est Solis exustio. Plinius ad verbum. Olea etiam clauum patitur, siue fungum placet dici, vel patellam, hæc est Solis exustio. Nocere tradit Cato & muscum rubrum. Ficus cradationem patitur, quum rami inarescunt, marcescuntq;, crados enim ramos ficulnos quidam appellant, unde & morbo nomen.

*De peculiaribus fructuum morbis. CAP. XXXVIII.*

**H**ACTENVS de morbis arborum, nunc de iis, quibus infestatur fructus. Fructibus, vt vuis, crambus euenit. Animal est ærugini simile, nascitur quum tempore humido residente humore solacrior consequetur. Idem foliis etiam contingit. Sunt ex eadem causa nascētes & eruca, durum animal, eroduntque frondem, aliæ florem, oliuarum quoque, vt in Mileto, ac depastam arborem turpi facie relinquunt. Nascitur hoc animal tempore humido, & lento. Malo, fico, oleæ accidit vermiculatio fructuum, sed duarum priorum fructus vermiculis semper vastantur, pereuntque. Oleæ non semper, sed solum quum sub cute fuerint: nam si nucleum subierint, iuuat, quia alimentum quod fuerat ossi distribuendum abit in pulpam. Prohibent illos flatus & pluiæ, quæ fiunt sub Arcturo: faciunt enim vt frigore fugentur hostes. Ægrotant ficus, & reliqui fructus. causa duplex, aut arbor ipsa, eiusque dispositio. quod amygdalo frequens est, quoties in gummi spissescit succus. aut ab æris qualitatibus. Plinius. Nam vermiculationem poma ipsa per se quibusdā annis sentiunt mala, pyra, mespila, punica. In oliua ancipiti euentu quando subeunt nati fructum adimunt, augent si in ipso nucleo fuere, erodentes eum. Gigni illos prohibent pluiæ, quæ fiunt post Arcturum. Eadem si austrinæ fuere generant, in drupis quoque, quæ maturescentes, tunc sunt præcipuè caduæ. Id riguis magis euenit, etiam si non deciderint, fastidiendis. Oleæ quoque peculiare malum arachnium. causa, humiditas ex aëre, qua corrumpitur fructus. Germinatur anniculis ramis, quum imbres sequuti sunt, qua germinatione amittitur fructus, quia fabulum eò fluit, quandoquidem fructus imbecilli sunt: humore nanque aggregato profilit germen. Pessimum est oleis, vitibus, aliisque fructibus, si dum florent impluerit, defluunt flores & fructus, causa imbecillitatis. Plinius. Pessimum est inter omnia quum deflorescentem vitem, & oleam percussit imber, quoniam simul defluit fructus. Vermes nec specie omnes eadem constant, differentia tamen præcipua in eis est in sua quæque nasci arbore, in alias translatos non viuere, nec ab re, alitur enim vnumquodque iis, quibus constat. Sed vermis est nomine cerastes, qui peculiarem habet naturam, quod in duabus & nascitur & alitur arboribus, nasci enim in olea, in fico parere aiunt. Vnde habet ficus suos vermiculos, & illos quos enutrit alienos, omnes tamē in cerastem abeunt, sonumq; edunt, quasi stridoris. Plinius, Vermium,



Vermium, qui in ficis existunt, alij nascuntur ex ipsis, alios parit qui vocatur cerastes: omnes tamen in cerastem figurantur, sonumq; edunt paruuli stridoris.

*Extrinfeci morbi minus violenti, & interitus ab aeris excessu frigidus,  
& calido. CAP. XXXIX.*

**M**ORBI verò & corruptiones extrinsecus euenientes, qui sunt minus violenti, vt aeris excessus, iam subeunt, vt nostra ab initio indicauit partitio. Causæ duæ sunt, frigoris & caloris excessus, sed calor parcius corruptiones affert, cæterisq; potius, quàm arboribus, nisi squallor accesserit, & æstus longo temporis tractu, & etiam sub Cane: & non nisi nouellæ syderatæ pereunt, quia imbecillæ sunt, sed frigore multè pereunt, multifariisq; modis. Aliàs enim frigoris vehementia gelat, alias prægelidus flatus adurit. Nonnunquam siue silente vento, siue spirante paruo, impuro tamen aëre, ac turbulento, sequitur arborū gelatio, siue serenum, siue turbatum fuerit cælum. Circa Arcadiam, Eubœamq; sereno cœlo à ventis gelantur. In Thessalia, caliginoso cœlo & immoto spiritu. Creati verò huiusmodi flatus solent quum montes niuibz occupati fuerint, ab iis enim frigus vrens fluit, interdū aër penetrans idem facit. Vniuersalis causa ea fuerit potissima, exigui vi frigoris naturalem calorem: qua re simul humor educitur, atq; expirat. Sed quæ terra teguntur, eius obicis beneficio frigoris iniuriam non sentiunt, seruanturque. Quæ verò supra terram sunt, quasi præsidio nudata intereunt. Interdum pars trunci, quum sit terræ propior, obnoxia est etiam maleficio. & sepe tanta est frigoris vastitas, vt ne radices quidem à vi illibata sint, quin intereant. Omnino tamen ab summo incipit gelatio, & mox ad ima defluit. Quamobrem coloni apud quos id euenit, vites operiunt, & ficorum incrementa attonsiōe reprimunt, vt in Ponto, & Media, aditumq; ita frigori negant: nam quum à vertice noxa incipiat, eo operto seruantur. acerrima enim est vstio illa, nec minor quàm quæ à Solis prouenit vehementia, immo qui diuturna mora discoxerit. Frigus enim humorē, caloremq; educit. Causis locis, fluminibus appositis, & à vento silentibus, frequentius euenit, nec ab re, quum ea loca nebulas foueant, frigidus aër diutius hæret, quocirca multa fit impressio: ac vbi nō regnat flatus, plurimum hac iniuria laborant, vt in Macedonia, Thessalia, & ad Philippos. Quippe in eos sinus receptus aër non habet, qua se illa liberet obsessione, quamobrè gelu vitatur, agrumq; totum congelascere facit. Ad cliuos verò neq; aquæ, neque aëris illa concretio fieri potest propter motum. Sed admiratione dignum cur arbores validiores à gelu patiantur, debiliores minus. Olea & ficus vruntur gelu, quia debiles sunt, radices oleæ non admodū profundas habent, fici raras. Sed mirandum profectò cotinum plus accipere detrimenti, quàm oleam, punicam verò, quæ sit imbecilla contra frigora, gelu non laborare. Nam & si gelationes frigidi flatus inter se differunt, imbecillioribus magis incumbere gelationis nocumentum deberet, nisi sit, quòd densioribus pertinacius nocumenta in-



hereant, raræ transmittant. Mali, & si imbecilles, non cōgelascunt, vt in Thes-  
 salia exitit: arboris enim raritas, vt frigus aliqua parte nō arceatur, sed transeat,  
 facit. Quod quū diu nō manet, nec totū contendit, efficax esse nō potest. Por-  
 rō alterutrum opus est, aut vt nō admittāt vim frigoris vt quæ dēla sunt & solida,  
 aut si admiserint, amittant extra se. Solida sunt pyrus, & adhuc magis agrestes,  
 sterilesq; arbores, vt vlmus, & ostrya. Causa hinc cognoscenda. Ventorū impe-  
 tus, ritu fluminis delatus, eā vrit paritē, in quam incubuerit, quemadmodū & in  
 luc: quare sæpe loca p̄xima euadunt sine vlla impressione, & aliquādo adeo vis  
 illa rapidē fertur, vt in eodem interdū pampino quasdā gelet gēmas, quasdam  
 nō item: sæpe autē niue contecta vite tota (quod locis frigidis fit) si summa ex- 10  
 titerint capita palmitū, exuruntur, nec ibi sistitur perniciēs, sed ad radices vsq;  
 peruadit. In Ponto flatus cōgelant, quū cœlo sereno, ac sudo in squamarū mo-  
 dū perferuntur, quæ maiuscula sunt, dumq; ferūtur, patent, delapla nō durant.  
 Quare cōstat, quod aliqua in aëre gelatio more pruinæ cōsistit. Quū aer igitur  
 cōcrescens flatu percitus occurSAT, squamasq; illas deducit, gelatus ratione cō-  
 sequitur. In locis natura frigidis flatus quidā indigenē sunt, vt in Pōto & Thra-  
 cia. Tepidioribus verò, vt in Eubœa aduenē sunt. Sed terrę gelicidiū damnosum  
 est, p̄sertim si nudatis terra trūcis ad radices peruenerit. Sed maximē si aqua sit  
 restagnās, obsidet enim plus aqua, quippe ad radices subiens iam imbecilliores  
 factas diuturna oppugnatione nocumentū infert, & si solum agitatū fuerit, 20  
 vehementius officit. Soli enim laxatio, vt liberius penetret, facit: prohibetur  
 autē stercoratione. Stercus enim calidū est, & iuuat. Quod si contingat, vt vix  
 demissa sit, atq; tum frigus, tum pruina superueniet, atq; gelauerit, soluitur ge-  
 lu, quia terra niuib; p̄a fermentata est. Sed maius nocumentū arboribus ad-  
 fert gelu à terra quā ab aqua, nam gelu terra circumstans, radices magis tan-  
 git, damnosius verò vtrumq; tum à terra, tum ab aqua, cū remittit & rursus  
 cōgelatur: nam ex tot mutationibus arbores malē se habent, earumq; vires re-  
 solvuntur, quod perpetuo gelu nō euenit: calor enim introrsum incubans tue-  
 tur, atq; seruat, modo ne multū excedat. Omnibus damnosior glacies illa est,  
 quæ terram inuadit suapte natura tenuē, solutam, siticulosamq; quæ ad eas 30  
 incōmoditates aptior est: nō potest enim calor prohibere, quin ad radices irre-  
 pat. Euenit aliquando summos ramulos gelascere, aliquando radicibus illa sis.  
 Ratio est, quia terrā cum munimēto habet, calorq; aufugiens hostē se abdit in  
 ima. Nec semper superiora aduruntur. Sed tentantur tantū, sed intus nō labo-  
 rant, nō igitur auferendæ partes illæ: nā sæpe superueniente germinandi tem-  
 pore, germē effundūt: nam quæ arida videbātur, quū postea humefacta sunt, ad  
 pristinas redeunt functiones: ob id olea aliquando arefacta visa est, dein resti-  
 tuta est. Idem aliis euenisse tradunt, sed maximē arboribus euenit, quorū folia  
 crassiuscula sunt, gracilia verò faciliē abolentur, ceu myrti, cuius rami graciles.  
 Laurus quāuis rara resistit sui caloris potentia: punica & ficus raræ, humidæq; 40  
 minus calidæ sunt. Sed arborum, quæ gelauerint, germinatio valida, citaq; est.  
 Radix enim roborata collectione anniculi alimēti, quod adhuc retinet, alimē-  
 tumq;



tumq; primū, quod distributū non fuerat, ad germinationē, & fructificationē celeriter veniunt. Sed cur nix nō congelat, & pruina quæ minor est quantitate cōgelat, ratio est. Nix nō diutius insidet, quippe liquefcēs delabitur, pruina verò sessilis est, & exurit. Deinde nix ante germinationē cadit, pruina proximè natis germinibus, vel quū turgent, quo tempore germē humescit, rarefcitq;. Est etiā pruina niue tenuior, vimq; incidendi maiore continet, pinde noualia pruina meliorescere existimāt, quia glebæ diffunduntur, ea subeunte mordenteque, quia cōstantior est. Tenuior niue est, nā nix è nube constat, & velut spuma est, spiritū in se continens, pruina verò ex tenuiore aëre constat, humoreq;. Nunc  
19 aër crassus, an tenuis ad gelu paratior sit, querendum, an vterque. Primò si aër nunquā gelatur, nisi quū serenus est, sanè gelatio non erit affectus crassi aëris, nam serenus aër tenuior est: nec fit gelatio, nisi subeat, quod incidat. Præterea facilius refrigerat tenuis, ob id aqua prius calefacta refrigeratur & gelatur citius, quia ex calore tenuior facta est: cōprobat idem historia locorū, nam quæ serena & subdiualia sunt, plus & sæpius gelascunt, vt ad Craniū in Corintho, & ad Olympū, quamuis vicina sint, tamē circa Craniū rigida serenitates fiunt, ita vt à plantis, & hominibus percipi possit. Alibi longiori interuallo idē animaduertimus. Et loca, quæ sub aëre crassiore nō rigescabant, postea mutata conditione, scilicet aëre attenuato gelascūt, vt in campis Larissæis, vbi stagna fuerant  
20 olim, ac ppter ea crassior aër, atq; inde tepor. Ea stagna vbi emissā, frigidior facta regio, frequentius infestata est gelationibus, tunc enim læta erunt oliueta, post nulla exitere. Et de vitibus idem contigit. His rationibus tenuis aër gelationibus magis obnoxius videtur. Aliis crassus videtur: nā crassus aër immobilior est, immobilitas occasio est gelandi. Item Styges in palustribus locis gignuntur, corporaq; molestant, etiā si cōrecta fuerint. Præterea montana loca, minus gelant, quia ibi mobilior aër est. Ad Cithrum Thessaliæ, quia caua loca sunt, & rigua, maximè gelantur. Apud Philippos resecatis nunc paludibus, & reducto agro ad arui speciem nō gelatur, antea verò quū esset lacunosus, gelabatur. Sic apud Crenides fuisse dicitur. Thraces locū eum habitabāt: ager enim  
30 primū arboribus scatebat, aquisq; permadebat, & nunc magis quàm antea locus hic congelatur, aquarū copia resecata. Ex vtraq; causa igitur puenire visum, & forsan ex vtraq; puenit. Sed differt locus à loco quod plus crassetur, aut attenuetur. Aquosus igitur, crassusq;, vel prætenuis nō æque efficax est, prætenuis enim minimè stabilis est, gelatio autem non fit repente. Adhæc qualitatem quandam illis, quæ sequuntur, toti q; statui celi, & quicquid extrinsecus veniat, inesse oportet. Nam si mutationes, remissionesq; crebris inter se vicibus alternantur, nulla fiet gelatio, sed qui tenuior, celerius afficitur, qui verò crassior frigefactus frigidior red dicitur, sicut & calidior: caliditas enim & frigiditas diutius continentur in solidioribus. Quamobrem sicubi non dilutus, sed  
40 crassus, & siccus fuerit, facilius congelascit non absq; ratione. Plinius. Nec infirmissima arbores solū gelu periclitantur, sed maximæ, vexatisq; ita cacumina prima inarescunt, quoniā præstrictus gelu non potuit eò peruenire humor.



Pruina perniciosior natura, quoniam lapsa per fidet gelatque, ac ne aurâ quîdem vlla deperditur, quia non fit nisi immoto aëre, & sereno. Quædam temporum causæ, aut locorum, non propriè dicuntur morbi, quoniam protinus necant, sicut tabes quum inuasit arborem, aut vredo, aut flatus aliquis regionis proprius, vt est in Apulia Atabolus, in Eubœa Olympias. Hic enim si flauerit circa Brumâ, frigore exurit arefaciens, vt nullis postea solibus recteari possint. Hoc genere conualles, & apposita fluminibus laborant, præcipueq; vitis, olea, ficus. Flora apud Ouidium in Fastis de his loquitur,

*Florebant olea, venti nocuere proterui,*

*Florebant segetes. grandine lesa seges.*

*In spe vitis erat, cælum nigrescit ab Austris,*

*Et subita frondes decutiuntur aqua.*

Sed contra cœli iniurias nil audet humana potestas, quum nulla vi, nulla arte, etiam si præsciamus, auertere possimus. Auerti carmine grandines Cato credidit, eius verba non adduximus, quum vana & ridicula semper putauerimus. Contravredines palearum aceruos, & euulsas herbas fruticesque, ac farmenta, quum imminere pertimescebant, per campos vrebant, & fumo medebantur. Diximus quæ frigido cœli excessu veniunt, nunc quæ calido. Pereunt minus æstu plantæ, quàm frigore, sed tamen pereunt nimio æstu, idque ratione imbecillitatis: Et quæ nouellæ sunt, facilius sentiunt, præcipue, quæ non plus anno viuunt. Veteres autem eo non æque moriuntur, nempe ob radicum robur, ac magnitudinem, à quibus denuò vitæ queunt renouare principia, sed iacturam tantummodo fructuum, aut ad summum germinum facere possunt. Omnino calor excedens minus noxius, quàm gelu. Quæcunque igitur vitam tuentur, eadem suis excessibus interimunt.

*Quæ extrinsecus apposita necant, steruus, aqua, oleum.*

C A P. XL.

**D**E violentis affectionibus dicendum, quæ extrinsecus eueniunt, ab opere vel fortuito per additionem, vel ablationem, & primùm ea cōmoda narremus, quæ fiunt incommoda. Nam ager ex nimia pinguedine sterile scit, & alter macie immodica, etiam aër, qui maximè necessarius, si excedat, nocet, & aquæ copia, vel inopia officit. Aqua non fluens necat, si excesserit arboris magnitudinem, quum imbres percrebuerint, aut loca inundationibus concreuerint. Quod circa Pheneum euenit. At si excursum habeat aqua, etiam si multa sit, modo abeat, non interimit: nam iuuat motus, vt prætei fluat. Quædam apponuntur extrinsecus, quæ interimunt, vt fabarum cortices, non solum radicibus, sed germinibus appositæ, & quicquid eiusmodi. Enimvero fabarū putamina, nō omniibus, sed nouellis imbecillioribus apposita, diutina siccitate alimentū partim trahendo, partim arcendo auferunt. Arbores alimento destitutæ intereunt. Etiam sunt quædam ex eorū numero quæ conueniunt, quæ etiā nocere possunt,



possunt, si immodica fuerint, aut vehementiora, aut minus tempestiua. Vt si ster-  
 10 fecus plus æquo aggeris, vel si aërem, ceu facē pellium: hæc si minus tem-  
 perata, vel domita fuerint, interimunt, vel si minus conuenientia. Diximus  
 enim supra eandem simi naturam non omnibus communiter commodam,  
 sicut aquam, immò nec aqua omnibus comoda est, vel si nimia, vel non op-  
 portuna: nam radices inebrians putrefacit, & præsertim nouellas, & eas plan-  
 tas quæ minimè aquarum auidæ sunt, vt cupressus. Interimit etiã putatio, fos-  
 sio ve, si intempestiuè adhibita fuerint. Sic etiam in rebus conuenientibus,  
 & vtilibus latet perniciēs. Oleum, pix, seuum apposita necant; præsertim no-  
 20 uellas. Causa est caliditas, & tenuitas: tenuitate subeunt, caliditate vrunt. Ar-  
 gumento quod cortex durefcit, ac deglubitur. Is enim laborans, alimenti pro-  
 hibet comineatum. Aliud indicium etiam, quod qui ferum agrum ad cultu-  
 ram edomant, vbi excisis arboribus radicum reliquæ peruicaciores sunt, pice  
 oblinunt, aut oleo, aut adipe: ita penitus exiccantur. Pix autem plus potest.  
 Plinius. Pix, oleum, adeps, inimica præcipuè nouellis.

*Qua iuxta sata perniciem, vel mortem afferunt. CAP. XLI.*

**A**LIA sunt, quæ vel agnascuntur, vel miscentur. Quæ agnascuntur, vel  
 stipiti, vel radici. Præterea sunt vel communes, vel propriæ pestes. O-  
 mnes plantæ agnatæ quæ nocent, alimenti rapina sunt exitiales, aut maximè  
 20 perniciosæ, eoq; magis quò validiores, & magis numerosæ: tales sunt sylue-  
 stres, nam & radices suas in alias immittunt, ac multi alimenti cupida sunt, sic  
 proscindunt socias, amplexuq; strangulant. Edera irrepat, amplectitur, stran-  
 gulat: sic halimus falsugine, & pabuli desiderio necat. Sed edera halimo per-  
 niciosior est, quòd plus falsuginis habeat. Viscum innascēdo perimere potest,  
 & omnia, quæ aliam plantam pro sede capiant. Amplexu strangulat oroban-  
 cha eruum, & limodorum fœnumgræcum, statim radici adnascens. Alia sunt,  
 quæ congenerantur cum seminibus quibusdam, vt cum tritico, & ordeo lol-  
 lium, & auena, & cum lentibus aparine. Omnia hæc iccirco interimunt, quia  
 30 alimenti materiam exhauriunt duplicem, internam euocādo, & externam ab  
 aëre intercipiendo. Plinius. Necant inuicem inter sese vmbra, vel densitate,  
 atq; alimenti rapina. Necat & hederavinciens, nec viscum prodest, & cytissus,  
 nec auro, quod alimon vocant Græci. Quorundam natura non necat quidem,  
 sed lædit odore, aut succi mistura, vt raphanus & laurus vitem. Odit & vitis  
 caulem & olus omne, odit & corylum, ni procul absint, tristis atq; agra.

*De violentissimis corruptionibus extrinsecis, quæ partium ablatione  
 eueniunt. CAP. XLII.*

**P**ARTIVM ablationes violentæ etiam arboribus mortem inferunt. Eaq;  
 fiunt, vel vulnere, vel partium ablatione, vel detruncatione, & primùm de  
 vulneribus. Arbores sunt, quæ si vulnus accipiant altius, intereunt, suæ imbe-  
 40 cillitatis, & siccitatis causa. Palma vulnerata quoq; in cerebro interit, vis enim



vitalis, & germinatrix in eo sita est. Vnde quum id siccum, & vulneratum est, aëris intrusū, alieniq; caloris corrumpitur, eoq; corrupto perniciēs ad ima descendit. Sunt & arbores, quæ non solūm inflictum vulnus, sed caudicis partiū exemptionem tolerant, vt quæ humidæ sunt, & probè germinant, vt vltus, platanus, & quæ iuxta aquas viuunt. Pinus etiam tedam amittit sine vitæ dispendio, quum sit in pingui viuaticas. Sed hæc tolerare non possunt, nisi arbores, quæ insigni prædictæ sunt magnitudine, vt in locum excisatum partium rātundem sufficere valeant. Pinus quum iuuenula est, non habet tedam, nam ea per ætatē accedit, & adultæ sine vitæ maleficio adimitur. Sunt arbores, quæ non solūm plagam ferre possunt, sed vulneratæ meliores, fertilioresq; fiunt, vt vitis, ficus, punica, olea, amygdala, & malus, quæ etiam caudicis fissiōem tolerant. Cæteræ stipitis fissuram non substinent. Nam quarum partes dissita faciliè coire possunt, & in hiatum aliæ succedere, conualescere possunt, alimen-  
 10  
 tum enim quantum abundè sit, capiunt, nec à calore resiccantur, vel frigore leduntur. Hinc illud sine damno in vitibus euenit, ficu, olea, & amygdalo, quia celeriter coeunt labia in vulnere; vnde haud facile finduntur, quia tenaci compage cōstant. Talis est ficorum succus & olea pinguis, aptus ad vnionem, glutinat enim lentore suo. Vitis eiusdem generis est: nam etsi hiat insigni raritate, ablataq; medulla, obducere tamen cicatricem potest, & celerius haurundo, quæ etiam sponte coit. De pyro idem alii referunt. Plinius. Intereunt pleaq;  
 20  
 & fissâ stirpe, exceptis vite, malo fico, punica. Quædam vel ab vlcere tantū. Ficus hanc iniuriam spernit, & omnia quæ resinam gignunt. Quin si depalcantur arbores magnum accipiunt quoq; detrimentum; nempe vulnus affert discerptionem, & adustionem. Peculi re quiddam in palma, & picea est. Nam mutilatio non exitium, sed sterilitatem affert: ratio est, ex offensione principii finem lædi. Nouella vitis dimutilatione perit, etsi quid tenellum, & imbecillū relictum sit. Amygdala etiam ex hoc amara efficitur, & punica durior, & alia quædā mutantur. Plinius. Similem & depastio animalium. Oleam quidem, etiam si lambat capra, sterilefcere, author est Varro. Qua dā hac iniuria moriuntur. Aliqua deteriora tantum fiunt, vt amygdalæ: ex dulcibus enim transfigu-  
 30  
 rantur in amaras. Aliqua etiā vtiliora, vt apud Chios pyrus, quam phocida appellant. Caprarum morsus nouellis omnibus satis exitialis est, hinc & nomen lortitæ. Quippe F. Pompeio dictæ quod virgultū carpant. A M. Varrone omnicarpe capre, non solūm vulnere, sed dētiū veneno plantis pestiferæ. Ob quā iniuriam præsertim circa vites, & oleas antiquitus institutum, vt Libero patri vitis reparatori hircus immolaretur, vt damni lueret pœnas. Ouidius in Fastis,

*Quem spectans aliquis dentes in vite prementem,  
 Talia non tacita dicta dolore dedit.*

*Rode caper vitem, tamen hinc, cum stabis ad aram,*

*In tua quod spargi cornua possit, erit.*

*Verba fides sequitur, noxe tibi deditus hostis*

*Spargitur affuso cornua Bacche mero.*



Contra antiquitus Mineræ ex caprino genere non sacrificabatur, propter oleam, quam reperit, quare Athenis in arcem non ducebatur, præterquam semel ad necessarium sacrificium, ne olea ibi primum nata ab hoc animali tangi possit. Plinius huic deæ capram immolari scribit. Dryope in loron arborem conuersa Andremonem maritum, & sororem apud Ouidium deprecatur,

*Et si qua est pietas, ab acuta vulnere falcis,  
A pecoris morsu frondes defendite nostras.*

Corticis circumablatio communis omnium, aut plurimarum est interitus.

Primò quia principalis maximè pars est. Secundo quia cortice nocumenta arbor omnia extrinsecus excipit, eoq; amisso amittit vitæ principia & tutamentū  
10 ad arcēdum ea, quæ sunt arbori non naturalia. Item medullæ parte ablata non interit arbor, sed si dematur tora, omnino intereundū Arcades inquiūt. Experimentum in pinu, & abiete. Ratio est, quia medulla pars est humidissima, & vitalis maximè. Argumento quia ligna, quæ medullā continent, torquentur, idq; fieri, quia medulla exiccatur. ideo haud integras statuunt abietes operi faciundo, sed scissas per longū, & medullas auferunt. Itaq; si medulla & cortex aliquatenus detrahatur, nil absurdum arbores posse durare, sed si penitus detrahatur, exarescat arbor necesse est, ceu destituta vitali principio, nativoq; humore. Excepta adrachne, seu verius subere: hæc iuuari cortice detracto, tam ex  
20 tero, quàm interno dicunt. Ceraso, viti, & tiliæ detrahatur, ex quo funes, & ex minoribus malus; sed si intereūt, id fit celerius, tardiusve, magis, minusve. Aliquæ enim plus tēporis permanent, sicut ficus, tilia, robur. His itaq; mederi conantur luto fouentes, & harundinibus, & id genus stramentis illigantes, ne frigeant vel subarescant. Apud Heracliam trachiana ficus restituta est, & re-germinauit. Frigoribus & caloribus nimis consecutis intereunt. Refert etiam anni tempus. Quippe in germinatione pini, & abietis, quum etiam cortice turgido sunt mense Februario & Martio, si quis detraxerit moriūtur. Hyeme diutius tolerant, & magis quæ robustissimæ sunt, vt ilex, robur. Latitudinē quoq; aliquam decorticatio habeat oportet: nam si angustā feceris, non mirū si non  
30 intereunt, robustissime quamquam sint, qui etiā si quantū libet auferatur, necari penitus dicant. Quod de infirmioribus intelligi potest. Plinius Cortice in orbē detracto necantur, excepto subere, quod sic etiā iuuatur, crassescēs enim præstringit, & strāgulat. Nec adrachne offenditur, si nō simul incidatur & corpus. Alioquin & cerasus, & tilia, & vitis corticē mittunt, sed nō vitalē, nec proximū corpori, verū eū, qui subnascente alio expellitur. Quarundā natura rimosus cortex, vt platanis. Tiliæ renascitur paulo minus quàm torus. Ergo his, quarū cicatricē trahit, medētur luto, fimoq; & aliquādo profunt, si non vehementior frigorū vel calorū vis sequuta est. Quædā tardius ita moriūtur, vt robora & quercus. Refert & tēpus anni. Abieti enim & pino si quis detraxerit, sole  
40 taurū vel geminos trāseunte cū germināt, statim moriūtur, eandē iniuriā hyeme passē diutius tolerāt. Similiter ilex, robur, & quercus. Quod si angusta decor-



ticatio fuerit, nil nocet supradictis. Infirmiore quidem, & in solo gracili, vel ab vna tantum parte detractus interimit. Nos ad corticis circumablationem remedium admodum vtile adinuenimus: contuso vlni cortice, atq; obducto, inde fasciis & stramentis alligato, ne pluuiis dilabatur, & à caloribus tueatur. Decacuminatione pinus, picea, abies, & palma intereunt, quidam cedrum & cupressum adnumerant. Hæc, detracta coma, scissoque cacumine intereunt, nec quicquam germinant: sicut neque si adusta, aut tota, aut in parte aliqua fuerint: reliqua omnia & præcisa germinant, & nonnulla meliora redduntur. (Decacuminationis autem est summitatis ablatio.) Illud autem non sine ratione euenit, scilicet naturæ siccitate, caudicis rectitudine & radicis simplicitate: nam vulnus illud aditum præbet caloribus, & frigoribus: & quia recessio circularis vndiq; infertur, desuper incumbens pestis, facile ad ima vsq; succedit, propter facilem transmissionem. Neque etiam hæc à caudice pullulant, quia sicce natura sunt, & alimentum non submitunt, sed sursum mittunt, singulari q; radice constant alteq; descendenti, vnde alimentum in proceritatem absumitur, ob meatuum insignem rectitudinem, nec quicquam superfluit, nec aliorum se vertit, proinde non prodigunt in stolones. Plinius. Similem & decacuminationem habent cupressi, piceæ, cedri. Ex enim detracto cacumine, aut ignibus adusto intereunt.

# IOAN. BAPTISTÆ

## PORTÆ NEAPOLITANI

### VILLÆ

#### LIBER QUINTVS

#### SIVE

#### POMARIVM

#### PROOEMIUM



Am è syluis egressi, earum post tergum horrido aspectu relicto, proximum est, vt pomarium ingrediamur, cuius læta facies tristitiam, quæ animo inhaeserat, amouebit. Pomorum enim, quæ magnitudine, colore, odore, sapore & pulchritudine inter se de principatu certant, admiratione & voluptate non parum animus noster capitur. Itaque decet, quandoquidem in syluis satis superque, neque extra rem prioribus libris expansiati



giati sumus, vt ad hortos nunc conuertamur, in quibus ars & humanum ingenium praeualet. Vt decens ordo ac series seruetur, atque arborum materiae extrema manus imponeretur, alterum nostrae diuisionis fastigiū, vt à principio arborum naturam distribueramus. Illae suos caducos fructus, feris, pendentes verò alitibus largiebantur, hae verò mitioribus succis voluptatem cibis afferunt & necessario alimento delicias immiscere docent: ibi fructus nullo humano cultu aut labore gignuntur, sed ex suo cuiusque arboris semine vltro proueniunt, hic quæ blandos sapes odoresque adoptione, & connubio hominibus didicerunt afferre, enascuntur: ibi materies vel caesa ad securim, ad  
 10 dolabram, vel senio prostrata ad ignem nascebatur, hic arbores fructu, vel umbrarum officio, vel alia dote humanius viuunt: ibi postremo quæ naturæ muniis procreantur, hic quæ ars & solers industria parat conspiciuntur. Est inter naturam, & artem bellum assiduum, & irreuocabile: arma, quibus præliantur, sunt desidia, & labor. Natura rerum parens res rudes, ac sua rusticitate contentas producit, ars etiam arborum adulteria excogitauit, & cultus mangonio perfecit, vt illae in nobiliorem formam transeant; ac naturam cogit sibi obtemperare: quantum ars ingenio & diligentia, vt res à sua natura desciscant, & in aliud perfectius genus transmigrent, laborat, tantum natura, quæ instituta diligentia destituitur, ad pristinam sortem deficere contendit:  
 20 vtraque alteram superare nititur, ac nunc vincere, nunc vinci continue videtur. Nos poma omnia, quæ vsus, aut voluptas circurauit, in hoc Pomario includemus. Primum de arboribus mala ferentibus, deinde de nucibus dicturi. Malorum autem prius eas, quæ comantur aeterna fronde, nempe medicas, postmodum eas, quæ deciduam frondem habent persequemur, illas autem iuxta pomorum distinctas species diuidemus, eorum enim alia semina claudunt, vt sunt cydonia, mala, pyra, sorba: alia grana, vt ficus, mora: alia singula ossa, vt persica, pruna; palmae, cerasa, ziziphæ; alia plura, vt mespila, tuberes, myrti baccae & vua spina. Post hæc nuces commemorabimus, punicam, & nuces Iuglandem, Heracleoticam, Thasiam, & Euboicam, & Pistacia.

*Quid sit Pomarium, quid pomum, & de Pomona dea.*

C A P. I.

30 **N**ON à ratione alienum videtur, vt de Pomario in hoc libro scripturi, quid Pomarium quidve pomum sit ostendamus. Vocant Latini pomarium locum pomiferis arboribus consitum. Cicero ait in libro de senectute: Nec verò segetibus solum, & pratis, & vineis, & arbustis res rusticae lætæ sunt, sed etiam hortis, & pomariis. In quam significationem omnes rei rusticae authores hoc vocabulum accipiunt. Palladius pometum etiam dixit, inquit, Longe tamen ab hortis vineis, atque pometis. Plinius non solum in hoc significatu, sed pro loco etiam, in quo poma reponuntur accepit, di-  
 40 cens, Pomaria in loco sicco, & frigido contabulari: in quibus sint fenestrae se-



ptentrionales, quæ serenis diebus pateſcant. Nec re nominis ſimilitudo Pomærii decipiat; nam diuerſam rem notat: Varrone enī teſte pomæriū quaſi poſt murium dictum eſt, à veteribus enim mærum pro muro dicebatur. Eſt autem locus circa ciuitatis murum, quem antiqui in condendis urbibus inau-  
gurato conſecrabant, neq; patiebantur aliquod in conſinio ædificium fieri: vt  
notatur à Gellio. Pomiferas arbores dicimus, quaſi poma ferentes. Poma etiā  
dicta eſſe poſſunt, M. Varrone teſte, quod potu indigeant, nam in poma, quæ  
inſita erunt, ſiccitatibus aquam addi quotidie oportet. Sed qui fructus pro  
pomis, malis, & nucibus accipiendi ſunt, declaremus. Vlpiano & Priſco labor-  
leno iureconſultis placet glandis nomine arborum omniū fructus contineri, à  
Græcis accipientibus, qui arborum ſpecies omnes ἀκρόδρυα vocant, ἀκρό δρυὶς,  
id eſt glande, & δρύκλαρα. Democritus verò Græcus discrimina inter Græca no-  
mina aſſignat, inter ὀπωγας, & ἀκρόδρυα, nam ὀπωγας dicitur, quicquid herbaceo  
fructu viret, lignoſum nil exterius habēs, vt duracina, pyra, mala, & damaſce-  
na, ἀκρόδρυα verò dicuntur, quæ putamen exterius, lignoſumq; fructum habent:  
vt malum punicum, caſtanea, piſtacia, & nuceſ. Athenæus Acticos, alioſque  
ſcriptores nuceſ fructus omneſ lignoſo cortice cōtentoſ appellare dixit. Ma-  
crobiuſ Saturnaliorum libro ait, eſſe Agriculturæ ſcriptoreſ, qui nuceſ &  
mala ſic diuidant, vt nucem dicant omne pomum, quod foris duro tegatur,  
& intuſ habeat, quod eſui eſt; malum verò quod foris habeat, quod eſt eſui,  
& durum intuſ includat. Sed hæc nomina tam Græciſ quàm Latinis auctori-  
buſ ſæpiuſ confunduntur. Pleriſq; tamē Latinorum ſcriptoribuſ placitum vi-  
deo pomum nomen generale eſſe ad mala, & nuceſ, quo ſignificatu noſ acci-  
pimus: nam noſtro hoc libro pomorum ſpecies omneſ urbanorum ſingula-  
tim complectemur, ac ſi pomarii parietibuſ, & vallo includeremus. Pomo-  
rum inuentio Libero patri tribuitur, quod Theocrituſ cecinit,

*Atq; ſinu medio Bacchuſ ſua poma recondit.*

Huic iudicio ſubſcribit Neoptolemuſ Parianuſ in Dionyſiade, qui inuenta  
à Baccho mala, vt reliquos mollis calli fructuſ commemorat: vt apud Athe-  
næum videre eſt. Fuit & Pomona pomorum dea apud Romanos à pomis di-  
cta, vt Mellona à melle. Pomonam Vertumnuſ adamauit. Vnde Ovi-  
diuſ,

*Rege ſub hoc Pomona fuit: quæ nulla Latinæ  
Inter Hamadryadas coluit ſolertior hortuſ,  
Nec fuit arborei ſtudioſior altera ſætuſ;  
Vnde tenet nomen. Non ſyluaſ illa, nec amneſ  
Riuſ amat, & ramoſ felicia poma ferenteſ.  
Nec iaculo gravis eſt, ſed adunca dextera falce:  
Qua modo luxuriemſ premit, & ſpatiantia paſſim  
Brachia compeſcit: ſiſſo modo cortice, lignum  
Inſerit, & ſuccoſ alieno preſtat alumna.*



*Nec sentire sitim patitur, bibulaq, recurvus  
Radice fibras labentibus irrigat undis.*

*De Pomarii positione, & solo. CAP. II.*

**N**ON est parui momenti tum ad plantarum perennitatem, tum ad fructificationem, & fructuum bonitatem, ut pomaria congruo loco ponantur, ut eam cœli partem spectent, quam debent. Etsi principio, cum de villa situ dictum est, de hoc in vniuersum multa diximus, de singulis arboribus seorsum suis capitibus secundum earum naturam dicturi; liceat tamen nobis de huiusmodi situ hic aliqua præfari. Loca etsi inter se minimo distant interuallo, situs tamen diuersitate multum differunt, ut magis, minusque solibus, vel flatibus incommodentur. Flatibus non solum tractus quidam, sed etiam tota regio sæpius infestatur, ut arbores ægrè fructum ferre possint, neque in locis à ventorum flatu remotis quicquam boni potest prouenire: debet igitur locus commodi flatu compos esse. Loco cui Austri blandiantur, in flore, arbores fathiscunt; in frigido si spirer Aquilo, omnia perurentur. æditissima loca egrè recipiunt arbores, præsertim serotinas: nam sæpius præuenientibus autumnum flatibus, cum ad maturitatem usque stare in suis arboribus non possint fructus, cum ipsis arboribus deturbantur. In conuallibus & lacunosis locis fructus deteriores nasci, Antyllus scribit, ex Ioanne Stobæo. Lacus enim non aërem solum sed fructus inficit. Quid igitur faciendum? Eligendus situs est, qui noxios flatu obliquè recipiat, in feruidis, calidisque ad Aquilonem vergat, cum eius flatu poma odoratio-  
ra scripserit Democritus fieri. Sed omnium scriptorum præceptis, pomarium ad montis radicem constitui debere (ut vniuersa villa) eiusque planities ad meridiem expatiari liquet, & ob id Varro ni rota Italia pomarium visa est. Pomaria (Florentino auctore) intra domesticam habitationem, si fieri possit, locanda sunt: quod si non detur, ex propinquo quærendus locus, ut non solum oculis spectantium intra ædes iucunditas hauriatur, verum etiam, ut ambiens aer ex plantarum fragrantia infectus, salubrem habitationem, ac totam possessionem reddat. Sed nunc videamus quale pomario solum statuamus, & prius magni magistri super huiusmodi decretum audiamus verba. Is namque libro de causis hæc ait, Pingue solum frumentis aptius, arboribus verò tenue, itaque illæ in tenui solo radices magnas, robustasque agunt, quibus alimentum ex imis valeant haurire, quod etsi in solo pingui facere possunt, tamen alimenti copiam adeò largam trahunt; ut optimè germinare, magnitudinemque accipere amplissimam possint: sed fructum parere nequeant, quoniam non coquunt quantum satis sit: quod in tenuiori non evenit, sed modicè tam ad germinationem, quàm ad fructificandum hauritur. Atque ita arbores, utpote robustiores, quàm ut oblata copia vinci possint, plantæ ne coquunt fructumque gignunt. Ad summam quod solum humectumque



sit, nec frigore torpeat, hoc radicibus aditum facile præstat, alimentumq; laudatissimum subministrat. Pingue enim solum plantis incommodum est, exiccat supra modum, & hac de causa eas offendit. Verum ut simplicius asseram solum, quod mediam obtinet confusionem contrariorum, id est soluti & spissi, sicci & humidi, levis & ponderosi, atque etiam superiora modicè inferioribus respondentia in his ipsis sortitur, hoc optimum omnibus ferè arboribus, & frugibus est: id enim ad aëris habitum propius quodammodo, quam cetera videtur accedere. Ceterum inter hæc ipsa, quod ad alteram partem vergit, melius est: quod & simpliciter quidam optimum asserunt, ut quod solutum, leue atq; humectum est, id enim alimentum in se continet, & radicibus meatum facile præbet: hæcenus Theophrastus. Columella de pomarii solo statuens ait. Terra, quæ vitibus apta est, eadem quoque utilis est arboribus. Quam verò ipse pro vitibus laudat, videre est in Vineâ nostrâ. Berytius autem. Optimum solum nigræ terræ est, & ab omnibus præ aliis laudatum: proximum est terra fulva, & quæ flumine rigatur, item dulcis, & calida: eæ enim ad vites, ac arbores, & ad sata optimæ sunt, sed laudatur & profunda, maximè si friabilis & tractabilis ad arborum fertilitatem. Sequitur Columella. Prius quàm pomarium constituas, quàm magnum habere voles circum munito maceria, aut fossa, ita ut non solum pecori, sed ne homini quidem transitus sit, nisi per ostium, dum adolescent semina: nam si sæpius cacumina manu hominis tractata, aut à pecore prærosa fuerint, prius quàm adolescent, in perpetuum corrumpuntur. Sed quomodo in ordinem redigantur, ac plantentur, præcedenti libro docuimus, cū & Varro in pomariis ea discriminanda in cōserundo censet, quæ sunt fructuosa propter voluptatem. Præterea in recentibus pomariis satis seminibus in ordinemq; arbusculis positis, primis annis, antequam radices longius procedere possint, alii conferunt hortos, alii quid aliud, neq; cum conualuerunt arbores, idem faciunt, ne violent radices.

*De pomiferarum arborum remediis. CAP. III.*

**A**PV D antiquos Agriculturæ scriptores, tum ad morbos arborum pomiferarum quosdam, tum ad optimam fœtificationem remedia nonnulla describuntur. Nos ne alibi requirantur, quæ hic deficiunt, nostriq; Pomarii arbores, ut fœcundiores floridioresq; sint, apponere non pigebit. Scribit Paxamus, Vnicuiq; arbori propria quædam cura seorsum conuenit, eam verò, quæ omnibus simul generatim congruit arboribus, non relinquam. Si ablaqueatis quibuscunque arboribus radices simul & truncos vetere vrina humana, vel pecorum lorio perfuderis, vegetæ & vberes adolescent. Sunt qui radices bubulo felle linunt, quod, ut volunt, à vitis satam arborem vindicabit. Didymus asserit omnem arborem iuvari fabarum aut aliorum leguminum paleis aut aceribus frumenti circumpositis. Tradunt succum herbæ, quæ musticis polypremnos appellatur, caudicibus illitum arbores à noxa defendere



& largiorem edere fructum. Vt verò arbor sterilis fructum ferat, Zoroastris extat experimentum. Subcinctus, & crine in nodum obrorto, arreptaque bipenni cum indignatione ad arborem accedito, eam excisurus. Obuiam autem veniente tibi quopiam, eiusq; excisionem deprecante, & tanquam futuri fructus fideiussore, videaris persuasus esse & eius causa arbori parcere: & de cætero abunde fructū dabit. En Græcæ vanitatis exemplum. Africanus autem ait: portulacam, & rithymalum probe contusa, & mixta truncis oblinito. Omnes autem arbores copiosiore fructum ferent, si ipsarum radices columbino fimmo obleueris. Ne flores, aut folia abiiciant arbores, ex Quintiliorum placitis hæc deprompsimus. Circumfossis radicibus pælearum fabacearum aqua temperatarum, magnæ quidem arbori octo congiorum mensuram, parvæ verò non minus quàm duos congios circumiice, sic de cætero curabuntur. Ne verò fructum perdant, Sorionis hæc extant experimenta. Lolium quod in frumento reperitur, euulsum simul cum radicibus plurimum è terra, quando iam pinguescere incipit, & in coronæ figuram formatum, si trunco arboris circundetur, fructum producet arbor, perficiet, eumque non abiiciet. Si cancer, hoc est *καρκινος*, trunco circumligetur, vel si truncum plumbo amplexus fueris veluti corona, fructum plantæ non abiicient. Item si radicem circumfoderis & perforaueris, cuneumq; ex corno immiseris, & terram aggeris. Quidam nudatis radicibus crassissimas ex ipsis, & maximas diffindunt, & in fissuram duri lapidis silicis videlicet fragmentum immittunt, deinde obligant, & terra accumulata rursus obruunt. Continet etiam fructus lapis perforatus sponte naturæ, repertus & in arboris ramum iniectus. Polium herba suspensa fructum etiam continet. Democritus asseuerat, neque arboribus, neque satis quibuslibet noceri posse à quibuscunque bestiis, si fluuiatiles cancos, vel marinos quos Græci *καρκίνους* nominant, nō minus quàm decem fictili vasculo in aqua missos regas, & sub dio statuas, vt decem diebus sole macerentur, postea quæcunque illæsa volueris esse aqua diebus alternis perfundas, dum solidius quæ operatus fueris adolescant. Florentinus demonstrat, quomodo arbores à vermibus non lædantur. Rubricam Lemniam, & origanum cum aqua terito, inde radices oblinito, & scyllam in circuitu plantato. Si pineos paxillos in ambitu arborum defixeris, vermes corrumpentur. Onni arbori sterus suillum vino dilutū iniectum ipsam à vermibus illasam conseruat, vt ex Didymo colligi poterit. Si arboris radices taurino felle obleueris, arbor neq; cito senescit et neque vermes producet. Arbores à vermibus non infestabuntur, si denudatis radicibus columbinum fimum circumcirca induxeris. Plinius scribit. Pomiferis quæ germinant, nec fructum ferunt, fissa radice inditur lapis, fertilesque fiunt: cæteris arboribus agris, facem vini, ac lupinum circa radices earum seri.

Aqua, quæ lupini decocti circumfusa, pomis prodest.



**E**T si Astrologiam agricolis vtilem superioribus libris in arborum plantatione, ac seminum iactu indicauerimus: nunc non minus in futura abundantia, vel fructuum inopia prognosticis per necessariam iudicamus, cum quicquid in terris nascatur statis eueniat cœlorum cursibus, vt non temere Theophrastus scripserit, annum fructificare non tellurem. Nos primum prognostica, quæ è cœlis, inde quæ ex aere, demum, quæ è plantis ipsis eueniunt, conscribemus, quæ quæ cognitu facillima fuerint etiam ignaris agricolis: relinquemus ea, quæ peritis mathematicis cognoscuntur. Diophanes Græcus ait, Caniculæ ortum fieri illucescente vigesima die Iulij mensis, observandumquæ esse cum eius exortus fiat, in qua cœli domo Luna reperiatur, nam (præter alia significata) si in Libra fuerit, fructuum arborum foris lignosum putamen habentium abundantia erit. Si verò in Geminis, omnis fructus vbertas maxima. Zoroastes verò ait observandum esse primum tonitru singulis annis, quod post Canis ortum contingit, in qua scilicet Zodiaci domo reperiatur Luna. Nam si in Libra, fructuum omnium corruptionem. In Capricorno abundantiam. Idem in Aquario nunciabit. Præterea considerandum esse studiosè præcipit, qua signiferi circuli statione Iouis stella peragretur. Nam si in ariete steterit, campestria magis fructum ferent: in Tauro, erit lignosorum fructuum feracitas. Idem in Geminis. In Cancro verò asperi loci magis fructiferi. In virgine supplicandum esse pro fructibus. in Sagittario & præcoces, & serotini fructus optimi erunt, medij verò vitiosi, omnesquæ arbores fertiles. In Capricorno campestria fructifera erunt, lignosi fructus abundabunt, supplicandumque erit ne glacie, & ventis laedantur fructus. In Aquario venti commodi erunt lignoso fructui. In piscibus vitiosi venti nuces exurent. Plinius ex veterum placitis hæc profert. Aquilam in Italia exoriri ad x i i calend. Ianuarij. Nec patitur natura ratio quicquam in satis ante eum diem spei esse certæ. Si verò interlunium incidat, omnes hybernos fructus, & præcoces laedi necesse est. Tria namque tempora prisca fructibus metuebant, propter quod instituerunt ferias, diesque festos: Rubigalia, Floralia, Vinalia. Idem Floralia tertio calend. Maij instituerunt ex oraculo Sibillæ, vt omnia bene deflorescerent. Hunc diem Varro determinat, sole Tauri partem quartamdecimam obtinente. Ergo si in hoc quatrimum incidat plenilunium, fruges, & omnia, quæ florebunt, laedi necesse erit. Reliqua nil ad fructus attinent, iccirco omisimus suis in locis dicenda. Nunc ad ea prognostica accedemus, quæ non è stellis sed ex aeris habitudine cognosci possunt, & si hæc ex illis proueniant, quia nobis euidentiora, facilius dignosci possunt. E decenti arborum germinatione facile fieri potest fructuum prognosticon. Prima enim germinatio videtur esse quasi compendium futuri prouentus, cuius vbertas, aut inopia in aeris clementia, aut sauiua repræsentatur. Felix arborum germinatio (inquit Theophrastus)



stus) ex opportuna hyeme cōtingit: hyems illa commoda intelligitur, quæ borealium imbrium, niuium, ac frigorū sine gelu vbertate pollebit. Exhaustæ enim fœtibus arbores tantundem reponendum alimenti quærunt, quantum subtractum est ex præterita fœtificatione, sed seruato opus est, atque cocto, vt succos optimè ad partus, & ad germinationem vertant. Alimentum imbrium copia largitur: hyems verò cohibet, vt seruet & concoquat, per totam arborē expandat, necesse est: sed non prius id expedit, quàm ipsum alimentum coquatur, & quasi in vtero gestetur temporis spatio, quantum satis sit, quod nunquā fiet, nisi frigus vehemētius adiuuerit. ob id aquilonios imbres accedere iuuat; 10 austrinis verò humescunt arbores, & laxatis partibus euocant succos, vnde imbecilliores redduntur. Tempestiui omniū imbres hyberni notantur, mox qui germinationē antecedunt, nam lætius germen agitur: tertium obrinent locū, qui post deflorescentiam acciderint, pabulū namq; consummationemq; fructibus præstant, hi verò, qui post quā fructus conualuerunt sequuntur fructus aut defluat faciūt, aut infirmiores deterioresq; præ nimia humiditate reddantur: omnium pessimi, & ex toto inopportuni, qui circa floris exortū eueniunt. omnia namq; imbecilliora redduntur, & omnia aut certe plurima pereunt aut decidunt rubigine aut nimio humore; & quæ resistunt, deterius florent. Plantis 20 verò quæ sero suos maturāt fructus, maioriq; alimento, cōcoctioneq; frui desiderāt, seræ pluuiæ opportuna sunt, vt viti, punicæ, & oleæ. Nocturni imbres præstant diutnis: fit enim vt plantæ humore potiri amplius possint cum sol nō protinus illū consumat: & tutius sic quoq; agitur. Niuis multitudo magnopere prodest, vt sensim colliquescens dilabatur, ita & terra fermentari optime potest, calore circū occluso, atq; coercito. At si hyems sera est, intēpestius ille tepor, alieno natus tempore, diuturnus esse nō potest, vindicantia inde frigora superuenientia, arbores festina germinatione occupatas corrumpunt, nondū enim si mi fœtus, ac solidi mitē aerem, & indulgentē exoptant, quo adolescere possint, & inter sua in tia infirmissimi sunt. Quod autē imbecillū est, nutricis eget sedulitate. Rectè igitur Vertūnus bene precatur Pomonæ apud Quidiū.

*Sic tibi nec vernum nascentia frigus aduret*

*Poma, nec excutiant rapidi florentia venti.*

Nec minus quàm hyemis considerādæ sunt flatuū iniuriæ, & incommoda, nam nō minus hæc illis arbores infestant, vnde flatuū ratio consideranda est. Aquilonij (ex Theophrasto) flatus austrinis præstāt, pelgici terrenis & occidenti exortiuus, quia frigidiores sunt, ex toto enim frigidus flatus cōmodiores calidis sunt, nisi germina aut flores prouenire inceperint: nā tunc adurunt. Venti qui contra temporū qualitatē subueniunt optimi sunt, vt hyeme calidi, æstate frigidi spirent. Si flatus aut calidus, aut frigidus nimis spiret, vehemētius syluestres laborant, nuper germinibus editis, enimvero vterq; partū labefacit, & interimit, ex quo seræ hyemes syluestribus infestissimæ sunt. Sed vnus, idemq; ventus vni noxius, alteri utilis est, quibuscūq; Fauonius, multis Aquilo, aliis Auster,



qui plerumque omnibus infestissimus existit, & præcipuè florentibus arboribus, ut natum sit adagium: Immissi floribus Austrum, id est, mihi ipsi mali causam dedi. Quod Virgilius in Bucolicis expressit,

*Eheu quid volui misero mihi? Floribus Austrum*

*Perditus immisi.*

Superest ex floribus, & germinibus diuination. Arbotes enim alterutro luxuriantes scilicet fructu aut germine, altero minus fecundas esse oportet. Cuius causam Theophrastus reddit. Quia natura utriq; parti minime satisfacere valet, sed necesse est absumere alteram, ut alteram faciat. Pars enim, quæ absumitur in frondes, & ramos, intercipitur fructibus. Sed priuata ficus, & vitis albæ natura est: nam cum germinibus luxuriant, largioris fructus prouentum promittunt. In cæteris quod satis fructuum præstiturum sit, id neque excedere, neque deficere in germinando oportet. Optima arborum de florescentia, optimam fructuum copiam prænunciabit, oportet enim flores, quos fructus sequuntur, antea bene cecidisse. Vnde Ouidius in fastis,

*Si bene floruerint segetes, erit area diues.*

*Si bene floruerit vinea, Bacchus erit.*

*Si bene floruerint olea, nitidissimus annus.*

*Poma quoque euentum temporis huius habent.*

Sed Plinij verba afferam, quæ super huiusmodi re à Theophrasto mutuatus est. Tempestiua frigora plurimum arborum firmitati cōferunt, & sic optimè germinant: alioqui si blandiantur Austri, defatiscunt, ac magis etiam in flore. Nam si, cum de florere, protinus sequantur imbres, in totum poma deperireunt. Illa sunt noxia frigora, quæ septentrionibus aut præposteris horis fiunt. Hyemem quidem Aquiloniam esse omnibus satis vtilissimam. Imbres verò tunc expetendi euidentis causa est, quoniam arbores fortè exinanitas, & foliorum quoque amissione languidas naturale est auide esurire. Cibus autem earum imber. Quare tepidam esse hyemem, ut absumpto partu arborum, sequatur protinus conceptus, id est germinatio, ac deinde alia florescendi exinanitio, inutilissimum experimentis creditur. Quinimo si plures ita continuentur anni, etiam ipsæ moriuntur arbores, quando nemini dubia pœna est infame laborantium. Ergo qui dixit hyemes serenæ optandas non pro arboribus vota facit. Vota arborum niues diutinas sedere. Causa non solum quia animam terræ, euanescentem exhalatione includunt, & comprimunt, retroque agunt in radices, verum quod & liquorem sensim præbent, purum præterea leuissimumque, quando nix aquarum cœlestium spuma est. Ergo humor ex his non vniuersus ingurgitans diluensque, sed quomodo sicut distillans velut ex vberibus alit omnia, quæ non inundat. In maiore parte orbis cum præcoces excurrere germinationes euocatę indulgentia cœli secutis frigoribus exuruntur. Quæ de causa serotina hyemes noxiæ syluestribus quoque, quæ magis etiam dolent urgente vmbra sua, nec adiuuante medicina, quoniam vestire te-



neras intorto stramento in syluestribus nō est. Ergo tempestiuæ aquæ hyber-  
 nis primum imbribus, deinde germinationem antecedentibus. Tertium tem-  
 pus est cum educāt poma, nec protinus, sed iam valido fœtu. Quæ fructus suos  
 diutius continent, longioresq; desiderant cibos, his & serotina aquæ vtilis, vt  
 viti, oleæ, punicis. Hæ iam pluuiæ generis cuiusq; arboribus diuerso modo de-  
 siderantur, aliis alio tempore maturantibus. Quapropter iisdem imbribus quæ-  
 dam lædi videas, alia iuuari, & in eodem genere sicut in pyris. Alio die hyberna  
 quærūt pluuias, alio verò præcocia, vt pariter quidem omnia desiderent. Non  
 omittemus & Beritij prognosticon ex scylla. Inquit enim. Scyllæ flos virgæ  
 20 specie nascens, & non cito marcescens, fertilitatē fructuum & anni portendit.

*De malo medica, siue citrio, eiusq; generibus.*

C A P. V.

**F**RUGIFERAS nostri Pomarij arbores enarraturus, vnde nam exordiat,  
 nisi à fœlici arbore illa, quæ Medica dicta est? quæ tum sua dote, tum pul-  
 chritudine, & tot generum fœcunditate nobilis, tum etiam, quia à nullo, vel  
 paucis priorum memorata sit, totoq; hoc nostro Neapolitano tractu nulli sint  
 horti, nullæ ædium fenestræ cum testaceis vasis, vel pensilibus hortulis, qui  
 hoc genere arboris referti non sint. Integrum librum de se scribi meretur, vt  
 30 verè hortorum decus, ac ædium illecebra dici possit.

Sed ad Poetarū fabulas transeamus. Higinius in suo astronomico ex Phe- *Fabule de*  
 recide ait, Iunonem cum duceret Iuppiter vxorem, terram inuenisse ferentem *citrio.*  
 aurea mala cum ramis, eaq; Iunonem admiratam petiisse à terra, vt in suis hor-  
 tis fereret, qui erant vsque ad Atlantem montem, cuius filia cum sæpius de ar-  
 boribus mala decerperent, Iuno dicitur serpentem ibi custodem apposuisse  
 vasto corpore, qui ab Hercule interfectus à Iunone inter duas Arctos colloca-  
 tus est. Athenæus etiam ex Asclepiadis rerum Ægyptiarum libro scribit, tellu-  
 rem edidisse nunciato Iouis & Iunonis coniugio malum illud. Ouidius Atlan-  
 tem fingit hos hortos mœnibus cinxisse, cū ei Themis prædixisset futurum  
 Iouis filium, qui ab eis poma diriperet.

30 *Tempus Atla veniet, tua quo sfoliabitur auro*  
*Arbor, & hunc prædat titulum Ioue natus habebit.*  
*Id metuens solidis pomaria clauserat Atlas*  
*Montibus, & vasto dederat seruanda draconi,*  
*Arcebatq; suis externos fructibus omnes.*

Sed fabulæ inuolucrum Plinius aperit his verbis: Ibi Hesperidum horti. Af-  
 funditur huic æstuarium è mari flexuoso meatu, in quo draconis custodiæ in-  
 star fuisse nunc interpretantur. Amplectitur intra se insulam, quam solam è  
 vicino tractu aliquanto excelsiore, non tamen æstus maris inundat. Solinus  
 verò aliquanto clarius. Nam de hortis Hesperidum, & peruigili dracone ne fa-  
 40 ma licentia vulneretur fides, ratio hæc est. Flexuoso meatu æstuarium è mari



fertur, adeo sinuosis lateribus tortuosum, ut visentibus procul lapsus angueos fracta vertigine mentiatur. itaque quod hortos appellauere circundat, vnde pomorum custodem interpretantes struxerunt iter ad mendacium fabulandi. Sed hæc insula sinuata sinibus aluei recurrentis & in quibusdam æquoris spiris, vel spatiis sira præter arbores oleastri similes, & aram sacram Herculi aliud nihil præfert, quod propaget memoriam vetustatis. Alij autem Herculem ab Euristeo Argiuorum rege ad dicta mala auferenda missum & monitum dicunt, non posse Hesperidum mala colligere, ni Atlantis ope iuaretur, ipsumque ideo ad Atlantem peruenisse, cælumque pro eo tulisse, atque ita mala interfecto dracone in Græciam derulisse. Ex quo Aratus in Engonasin ex Festi Anieni translatione.

*Nam dura immodici memorant sub lege tyranni,  
Amphitryoniaden primo in flore iuuenta,  
Qua cadunt medijs longe secreta diei  
Hesperidum venisse locos, atque aurea mala  
Inscia, qua lentis semper custodia somni  
Sernabat, carpsit se manu postquam ille nouerca  
Insaturata odus serpens victoris ab ictu  
Spirarumque sinus, & fortia vincula laxans,  
Occubuit.*

Sed M. Varro in suis libris de agricultura aliter interpretatur. Aurea enim mala secundum antiquam consuetudinem capras, & oues intellexit. Græci enim vna, & eadem voce oues, & pomum significant, hoc est  $\pi\mu\lambda\lambda\omicron\nu$ , & has Hercules in Græciam ex Africa asportauit. Nonnulli aurea mala Veneri consecrata asserunt, non nisi ob eorum pulchritudinem.

*Vires mali  
medice.*

Sed de eius dotibus scribere aggrediamur. Malum hoc igitur maxime salutare est, & aduersus exitiale medicamentum præsentaneum remedium est. De quo genere Theophrastus, Pomum si inter vestes ponatur inoffensas conseruat. Vtile etiam si quis lethale venenum hauserit: vel ad oris suauem spiritum: quippe si quis interna pomi in iure, aut aliquo humore concocta in os expresserit, digesseritque, suauem halitum reddet. Ex quo Plinius. Comendandi halitus gratia Parthorum proceres eius grana esculentis incoquunt. Et vestiariis quoque interiecta à tinearum offensis maxime vindicat, nec alia arbor laudatur in Medis. Refert Athenæus ab Ægyptiorum magistratibus maleficos quosdam damnatos, ut feris exponerentur, antequam in locum descendissent in quo supplicia pendere solebant, in itinere cauponam quandam obuiam eorum fortis miseram, quæ ipsa edebat citria dedisse eis, qui ea recepta deuorauerunt, nec multo postea bestiis, & aspidibus demorsi illa si reperti sunt. Præfectus rogans militem, si quidpiam edissent, aut bibissent, retulit, citrium ex integra simplicitate donatum. Postridie iuber vni præberi, alteri denegari, qui comederat demorsus nihil incommodi passus est, alter *Alato ictu* confestim interiit, factoque frequenter periculo,



tulo, tandem inuentum est exitiali medicamēto præfenti esse remedio. Quod si quis iis verbis fidem non habeat, consulat fidelē, veracemq; Theopompum Chium, qui magnam expendit pecuniam ad exactā historię huius disquisitionē, qui duodequadragesimo suarū historiarum volumine, Clearcū Heracleotā Pontityrannū narrat multos veneno necasse, populūq; gratā huius medicamentipotione non ignorasse. Celebratū est & à Poeta Georgicorū libro,

*Media fert tristeis succos, tardumq; saporem*

*Felicitis mali: quo non presentius ullum;*

*(Pocula si quando sana infecere nouerca,*

*Miscueruntq; herbas, & non innoxia verba)*

*Auxilium venit; ac membris agit atra venena.*

*— animas & olentia Medi.*

*Ora fouent illo, & senibus medicantur anbelis.*

Nicander in alexipharmacis *μηδον*, id est, Medum malum vocat. Theophrastus quia hoc pomum non nisi apud Persas & Medos nasci voluit, patrio nomine *μηλιά περσική*, & *μηλιά μηδική* vocauit. Pamphilius verò (Athenæo authore) poma quædam Hesperidū vocari tradit, quę diis etiā apponi cōsueuissent apud Lacedæmonios. Bonum odorem habere hæc & esui apta non esse, & à Romanis *κίτρου* dici. Aristocrates, *μηλιά εσπερικά*, & etiā *περσικά* dici. Diphilus author est citria ab aliquibus, *κακὴν μήλια* vocari solita. Aristophanes grammaticus, *ὄξύ-ηχα* ab acido sapore vocitari, & *ἄδρυα περσικά*. Æmilianus ait Iubam Mauritanie regem in suis de Libya commentationibus scribere, pomum hoc apud eos *μη-λα εσπεριών* nominari, inibiq; ab auri similitudine *χρύσα μήλια* dici. Phantias Eresius cedrum, & malum citrium appellari. Dioscorides *μηδικὰ μήλια*, & *καδρόμηλα* & à latinis citria dici. Galenus malum medicum amplius vocari negat, citrium duntaxat ab omnibus dici. E Latinis verò M. Varro Libycam citrum dici ait. Plinius nomine sumpto à regione illicontermina Assyrium malum vocari dixit. A Palladio dicitur Citrus, Citrius, & Citreum. Macrobius ex autoritate Cloatij, & Oppij eandem esse probat citream malum, & persicam. Cedrum, & citrium dicitur ob diuinam odoris fragrantiam, quasi cithyon, odoramentum diuis libandum. Itali Cedro.

Duplex est genus: alterum, quod ouatam, alterum quod rotundam refert speciem. Ex ouatis primum de Citrio dicemus. Est inter citria genus vnum, quod pomum affert, vt matris, & fœminæ genitalia, aliave corporis membra tam affabrè ficta ostendat, vt admirabilem simul, & iucundissimam inspectionem intuentibus præseferat; quod genus & planta & pomum ab aliis differt.

Nos adductā à Theophrasto delineationem afferemus, nam vt Athenæus refert ad nostram citrum referri potest. Folium eius Adrachnes intercurrentibus spinis, vt in pyro, & oxyacanthis, sed læuibus, infestis, mucroneq; validis. Pomum non estur, sed ipsum & arboris foliū odore pollent, qui trāsit in vestes vnā cōditus, arceatq; animalium noxas. Arbor ipsa omnibus anni tēporibus fœcunda,



& superfoetans, aliis decidentibus, aliis subnascentibus, aliis maturescentibus. Flores soli qui velut erectam in medio column gerunt foecundi creduntur, qui verò ea carent infructiferi habentur. Perpetuo floret, & ob peculiarem quam sortitur potentiâ percoquit. Sed Athenæus alia apponit, quæ in græcis latinisq; libris desiderantur, nos apponemus, vt ea suis locis reddi possint. Habet folium ferè simile lauro, adrachinæ, & nuei iuglandi. Dioscorides autem pomi formam innuit ouaram, vtrinque acutam, rugis caperatam, colorem auri, suauem odorem alioqui grauem, semen pyri. Plinij verò de Theophrasti sententia verba sunt. Folium eius est vnedonis intercurrentibus spinis. Pomū ipsum aliàs non manditur, odore præcellit foliorum quoque, qui transit in vestes vnà conditus, 10 arcetq; animalium noxia, arbor ipsa omnibus horis pomifera est, aliis cadentibus, aliis maturescentibus, aliis verò subnascentibus. Tentauere gentes transferre ad sese, propter remedij præstantiâ fictilibus in vasis, dato per canernas radicibus spiramento: qualiter omnia transitura longius: sed nisi apud Medos, & in Perside nasci noluit. Alibi verò de eodē fructu sic ait, Citreis odor acerrimus, sapor asperissimus. Nos autem sic describimus. Fragili assurgit termitæ, prona terrâ petit, ni fixis hastis incubet. Folium oblongum, circumdentatum, perforatumque. Flores nitidi postremo limbo purpurascētes, modici odoris. Fron- 20 dis perpetuum decus, nitida viriditate hilarique, oculos maxime alliciens. Fructus nullis inferiores, odore fragrant; & plusquàm iucundo, duplici colore distincti: virides primum, demum auri micantes colore. Semen potius ipsius pyri, quàm eius seminis speciem repræsentat. Apud nos operi topiario accommodatissima, cum eius rami flexiles, sequaces sint, in testudines fornicatur, leni vmbra ambulacra, & hortorum attegias opacans, duciturq; in omnes formas, turres, tentoria, nauigia, cæteraque quæuis simulachra vestiendo eleganter mentitur.

*Cælum.*  
*Loca.*

Plinius citria in calidis prouenire scripsit. Palladius calidis locis, sed irriguis, & maritimis maxime, quibus humor ex- 30 undet gaudere ait. Sed si quis hoc genus, vt in regione frigida nutriatur, extorquet, loco vel parietibus munito, vel in meridianâ partem verso disponat hanc arborem. Sed hybernis mensibus teetam stramine velet agresti. Vbi æstas refulserit, aeri arbor nuda, & secuta reddatur. Afferit Martialis apud Assyrios: pomis hanc arbore non carere, quod ipse in Sardinia, & in territorio Neapolitano in fundis suis cõperit, (quibus solum, & cælum tepidum est, & humor ex- 40 undans) per gradus quosdâ poma sibi semper succedere, cum maturis se acerba substituant, acerborum verò ætatem florentia consequantur, orbem quendam cõtinuæ foecunditatis sibi ministrante natura. Florentinus. Hæc arborum sola iuuatur Austro, & Aquilone læditur. Planteretur loco contra Septentrionem parietibus munito, vel in meridianam partem verso. Cæterum hybernis mēsisbus tegetibus, aut sportulis teetâ velet. Ea stirps vt suapte natura tenerior, si paucâ glaciem experiatur, cõtabescit: quare diuites, & qui dant operâ genio, extor-



torquent sub fornices concameratos ad solem spectantes, & inibi propter parietem conserunt & copioso rigant humore. At vbi æstas affulserit, fornices apertos sole sinunt illustrari, & eius tepore foueri; appetente verò hyeme reiectas arbores stramine velant.

Theophrastus tribuit ei molle, vñum, nec valde tenue solum. Palladius ter- solum.  
ram rarioris naturæ. Pontanus in suis Hesperidum hortis,

— Putres gleba, quæq; æquora rastris

Molle sonent, fluidum facile admissura liquorem.

Nec mihi displiceat salebroso glare aruris,

Quæq; solo tenui gracileis imitatur arenas,

Si modo sepe simo spargas, si pronior unda

Diluat ipsa super, letiusq; instillet & imber.

Apud nos, etsi solo quocunq; proueniant, latiora tamen pingui, infirmio-  
ra verò arenaceo, & argilloso, & debili, vt croceas frondes producant, sicuti  
homines, qui morbi torquentur. Potius valles, & plana loca, quàm colles cõ-  
cupiscunt, sed loci in maris prospectu, quiq; abundantia humore exudant, o-  
ptimi sunt. Tale erat Mauritanix littus, vbi Hesperidum auriferos hortos an-  
tiqui posuerunt, talis est etiam Pausilypus mons noster in afflatu oræ mariti-  
mæ, vt lucorum amœnitate, & pomorum perenni fœtura neutiquam in quili-  
na videatur, quæ magnitudine, & odore cæteris præponi possit. Surrentinus  
item mons, & Amalphæa littora, vbi fœcunda latissimaque citreæ conspici-  
untur, vt non amplius à nobis Hesperidum horti desiderari possint. Hic etiam  
Palladius agens citreorum cultum primus ipse Italiæ demonstrauit. Sed Cisal-  
pina Gallia citriis caret, ob contrariam cœli solisq; qualitatem.

Semine seruntur. Theophrastus; Semen detractum vere sulcis seritur dili- Satio.  
gentissimè cultis, rigatur quarto, aut quinto die, adulta transfertur vere, seri-  
tur & fictilibus vasis dato radicibus spiramento per cauernas, vt palma. Palla-  
dus Martio mense seminum debere fieri docet. Terram in duos pedes fodies,  
cinerem miscebis, breues areas facies, vt vtrinque per canales aqua discurrat.  
In his areis palmarem scrobem manibus aperies, & tria grana deorsum acu-  
mine verso iuncta constitues, & obruta quotidie rigabis. Citius procedent,  
si beneficio aquæ repentinis vtaris. Natis germinibus semper proxima herba  
runcetur. Potest hinc trima planta transferri. Nos serenda grana grauiora,  
maiora, & illæsa feligimus, & ex perfectioribus pomis. Poteris si libet scro-  
bem trium, vel duorum pedum altitudine excavare, & pingui iniecta terra tria  
seras semina, vbi enata fuerint plantulæ, tollito infirmiores, vt quam relique-  
ris vegetior fiat, atq; iniecta humo plantæ incrementa sequare, ne transferre  
sit opus; idq; in aliis plantis facere poteris.

At si transponendæ sint plantæ, siue è seminatio, siue densius satæ fuerint,  
Theophrastus vernum tempus præfigit. Florentinus verò serendas esse ab  
autumno vsq; ad vernum æquinoctium. Palladius, In spatio non desiderat in-



terualla maiora, nec aliis arboribus annecti debet. Scrobiam altitudinem ferendiq; modum elegantissime noster Pontanus describit,

*Sed tamen & scrobibus modus hic erit, ut neq; in altum*

*Desideat nimis, ut quantum radice profunda*

*Haferat, hoc paulo iaceat plus, eaq; lacuna*

*Hauriat ut solutos imbres, madidumq; fluentum.*

Plinius plantam propagine nasci dixit. Quod si cui cordi fuerit, ita fieri posse docebimus, præsertim cum perpetua fructificatio ab imo crure pullulet, & circa, ut sæpissimè hoc modo apud nos citreæ restituantur. Vbi flagellum videris felici matre natum, circa crus arboris, ramum incuruato, terra cooperito, & optimè calcato: post secundum, vel tertium annum, ubi radices rectè emisisse coniecero, recidito à matre, & transplantato. Sunt qui curuaturam, quæ sub terra cooperitur, per longitudinem findant, & lapidem indunt, exinde enim maximam radicum copiam nascituram promittunt. Si verò vis fictilibus vasculis propagare, traiecto per vasis fundum ramulo, pulla terra repleto, calcato, arboriq; adalligato, ne ventis agitur, aquam continuo instillato, ubi hoc blandimento radices fecisse existimabis, præcido ab arbore.

Palladius docet ramum non amplius sesquipedem immergi debere, ne putrescat. Anatolius, Rami duo extrema in scrobiculo pangi debere, & obrui; sursum à fornicato flexu tumescentem germina præbere.

Idem, ramum qui flecti recuset, in caput reponendum iubet, quod verò crassius fuerit, sursum emineat, & cucumeris cinis iniiciatur. Palladius claua feri commodius posse, quæ sit manubrii crassitudine, longitudine cubitali ex utraque parte leuigata, nodis, & aculeis recis, sed integra summirate gemmarum, per quas spes futuri germinis intumescat. Diligentiores & fimo bubulo adlinunt utrinq; quod summum est, vel marina alga vestiunt, vel argilla subacta patris utriusq; extrema cooperiunt, atq; ita in pastinato solo deponunt. Sed calidissimis regionibus per Autumnum ponuntur clauæ. Frigidissimis Iulio, & Augusto positas & quotidianis rigationibus animatas ipsæ usq; ad poma, & magna incrementa produxerunt. Pontanus post ipsarum plantarum putationem,

*Tum fragmenta lege, & ramos secerne valenteis,*

*Obliquosq; insige solo, tamen ut capite extent.*

*Stipitis aut truncum, gladioq; & falce dolatum*

*Infode, & in tenui nudatum contege sulco.*

*Continuo ingentem vicino ex amne paludem*

*Elice, diluvioq; comas immerge salubri.*

Nos autem qui temperatis degimus regionibus Martio, & Aprili deponimus, Maio namque deglubuntur clauæ, & iam intumescences oculi emittunt germina. Luna crescente eliguntur rami nitidi, crassitudine manubrii vel pollicis, longitudine bipedali, atque in terram defiguntur ne maior semipede



pede extet, tenuior pars, quæ in terram defigitur, non obliquè sed rotundè iuxta nodum recidatur, ex quo radices sperantur. Rami defodiuntur bini, ut si alteri non adoleſcant, alteri non deſint, ſi ſimul bini enati fuerint, poſt annum infirmiores eruantur dextra, ſiniſtraq; manu alteros deprimente, ne vtrique euellantur.

Talea, Palladio authore, & gracilior, & breuior eſſe poteſt, quæ ſimiliter, ut claua mergatur, ſed palmis duobus ſuperſit, claua omnis obruitur, eodem tempore, quo claua.

- Arbor iplâ ſua natura tenella frigotibus, & caloribus maximè obnoxia eſt: Cultus.  
 10 nam ſi glaciem experiatur, ſiderata contabefcit, ſi calorem, exareſcit. Sed contra damna congelantis & incaleſcentis cœli hæc ſunt adinnenta remedia. Hyeme ſtramentis, & cratibus tegatur, vel lauri, & cupreſſi à ſeptentrionali parte plantentur, quæ cum hyeme perpetua vireant coma à ſeptentrionalibus ventis eas defendant; vel viuam calcem, & ſimum cruri arboris obiciant, ut eorum calore foueatur. Palladius citrium iuuari credit, ſi cucurbitæ proximè ſerantur, quarum vites etiam combuſtæ vtilem citri arboribus cinerem præbent. Florentinus etiam iuuari putat cicum ſitæ cucurbitæ flagellis, quippe quæ naturali quadam vi inſiſtente à frigori iniuriis illud vindicant. Cucurbitarum combuſtæ vites citri radicibus cinerem præbent vtiliter inſpergendum. Contra verò æſtios calores poſt ver plantæ irrigandæ ſunt ſole occidente, vel nocte intempeſta, maximè enim tunc arbor imbre inſpergi auet, & abundè humore expleri. Gaudet & ſimo ſaturari ex ſuillo, humanoq; ſtercore, ac lotio, gaudet & coriorum præſegminibus, ac ſoleis, ac tabo corruptis catulorū corporibus. Palladius, Niſi quæ arida ſunt, rariſſimè debemus abſcindere. Sed ſi acciderit plantam in frondem luxuriare, ferro eſt eius luxuries compeſcenda. Planta formanda eſt, ut in conū aſſurgat, vel ſi topiario operi deſtinatur, vinculis à teneris obedire condiſcat. Id tamen præmoneo, ne id Euro, vel Aquilone ſtantiſſimis fiat, inde plagas cera conteges, ne caloribus, vel frigotibus ſint obnoxia. Rami pondere grauati, ne in terram procidant palis ſunt fulciendi.
- De inſitione hæc Palladius habet. Inſeritur menſe Aprili locis calidis, Maio Inſit.  
 30 frigidis, non ſub cortice, ſed ſiſſo trunco circa radices. Inſeritur & pyro, ut quidam volunt, & moro, ſed inſiti ſurculi qualo deſuper omnino muniendi ſunt, vel fictili vaſculo. Sed Auguſto irriguis locis etiam citri arborem pleriq; inſerunt. Quod etiam libro de carminibus ad Paſiphilum non tacet,

*Nec non & Citri patiuntur mutua rami*

*Pignora, quæ granido cortice morus alit.*

*Pomaq; paſturi blando redolentia ſucco*

*Armatæ mutant ſpicula nota pyris.*

- Ait Florentinus, Quin etiâ ſcitu dignum ſuccurrit, quod arbor citri ſterilis  
 40 erit, quæ beneficio inoculationis coaluerit: eadē non ſub cortice ſed ſiſſo trunco more vitis inſeri debet. Præterea ſi rubra citri poma naſci voles, ſurculum



moro inferito, & malum rubrum dabit, & vice versa, & vtrique arbor fructum feret. Inferitur & punica malo. Diophanes, Citria malus cum tenui libro vestiatur, ait, vix subter cutem recipit inoculationem, nam post coalitum emarcebit, quod sæpius probauit, quod si fructum pariat, in cedromela degenerabit. Didymus in Georgicis suis rectè inseri in malum punicam tradidit: Et si malum inferatur in citrium, semper fructum ferre. Auicenna citrum in cideam inseri posse dixit, & in salicem insitam fructus semine carituros emitte, & in punicam mala producere rubicunda. Apud nos ad modum digitalis citri inferuntur. Carditur cortex in circulum, & duorum digitorum longitudine exiit virga, inde alteri virgæ eiusdem crassitudinis nudatæ, vt extrema partium oræ coeant, imponitur (vt superius docuimus.) Inferitur inter lignum & corticem, & cum omnes citrorum species similes sint & cortice, & germine, inuicem dant, recipiuntq; surculos, & mutuo fœdere immutant fructus. Pontanus noster alium insicionis modum tradit, quo multi v-  
runtur.

*Sunt qui diuersos ramos, sed cortice raso  
Coniungant, stringantq; simul, quo glutine misto  
Increscant eque, ac fixo mox stipite iunctos  
Insigant pariter. Tum vulnus ritè coronent,  
Et fallax opus admotæ tueantur ab arte,  
Quo ramo ex vno, atq; vno de palmite fructus  
Non vni veniant, sit honosq; & gloria ruri,  
Gaudeat insolito natura adiuta fanore.*

Art.

Palladius vt maiora poma proueniant, continua fossione exhilarari iubet. Florentinus autem, Vbi fructus increscens degrauiat, multa detrahi poma cōueniet, & pauca relinqui, sic altilia vegetiore proficiunt incremento, & in maiorem perueniunt crassitudinem. pubescens autem malum fictili claudatur, nam per incrementa formam vasis accipiet, & vasis magnitudinem æquabit, vt ad eius magnitudinem pomum peruenire contendat, sed fiat foramen in vase per quod aer inspiret. Pomum id non mandi solitum Theophrasti ætate, nec Athenæi auorum memoria, vt idem Athenæus author est, cum vt pretiosum quidpiam inter vestes tantum deponi solet, nec Plinii tempore. Vnde Palladius medullas eius acres in dulces mutare docuit. eius verba hæc sunt. Feruntur acres medullas mutare dulcibus, si per triduum aqua mulsæ semina ponenda macerentur, vel ouillo lacte quod præstat. Aliqui mense Februario truncum obliquo foramine ab imo terebrant, ita vt altera parte non exeat, & ex hoc humorem fluere permittunt, donec poma formentur, tunc foramen luto replent, sic quod est medium fieri dulce confirmant. Pontanus suis Hesperidum hortis docet idem,

*Quo non ars penetrat? Palmes cadatur, & ipse  
Crassior; in palmumq; canetur, & vndiq; labris*

*In girum*



*In girum ductis, nec pollice crassius, illuc  
Infer mella liquata, & grandi contege saxo,  
Quod solem auertat. Postquam arida suxerit arbor  
Inclusum humorem, & sitiens noua pocula gliscit,  
Mella cauo immersans flauentibus imbue rinis  
Rursus, & euacuam Thymbræo nectare cellam  
Distende, ac latices humano è corpore fusos  
Mollibus irroraradicibus. Interea ne  
Neglige frondosas toto de stipite gemmas  
Vellere, mosopiùs ni qualiquor implet, & ipsa  
Labra trahunt dulcem mulsi de fronte liquorem.  
Illas tu gemmas, illaq; & germina serua,  
Et blandire manu, & ventorum auerte procellas,  
Arce hyemes, funde Hyblaos & largiter amneis.*

Et paulò post.

*Sunt qui lecta manu, solerti & semina cura  
Contingunt mulsa, Siculo aut madefacta liquore,  
Postquam autem traxere ipsum ad præcordia rorem,  
Sedaruntq; sitim medicato nectare, terra  
Infodiunt, & culta rigant, ea denique fructu  
Iam referunt tenerum, quem quondam hausere saporem,  
Quemq; & arundineo duxere è palmitè succum.*

Africanus scriptum reliquit modum, quo vel humanam, vel alterius animalis induet imaginem. Si gypso, vel luto siccescente hanc obduces, & mucronis acie bipartita, videlicet in anterius, & posterius dissecueris, ut & iterum aptè possint coniungi, post in figulina torrebis: cumq; pomum ad dimidium peculiaris incrementi peruenerit, iis formulis claude, diligenterq; vinctulis adstringe, ne obuoluti pomi peractum fictiles typi diuellantur. pomum siue pyrum, siue punicum malum aut citrium fuerit, breui has exprimet animalium effigies, quorum & habitum, & imaginem mentiri placet. Quod idem ex Florentino supra docuimus. Sed quomodo citria fructu perenni, ac prouentus onere semper grauentur, totoque anno sua arbore insideant, docet suis carminibus Pontanus,

*Neve autem toto fructus tibi desit in anno,  
Carpe manu partem, & plenis bacchare canistris,  
Quæ reliqua est grandis finito gaudere volemis,  
Confestim, qua parte dolet viduata, recentem se  
Induit in florem, atq; implet spe diuite ramos.  
Sic etenim alterno ditescet sylua metallo.*

Si verò arbor vna diuersa poma diuersorumq; saporum afferat, noster idem Pontanus docet eleganter:



Qui diuersa quidem parua sed semina in urna  
 Condat, & educens collo breuiore stolones  
 Subducitq; arceiq; manu, ac sub vincula cogat  
 Crescentes, hi tandem uno se stipite miscent,  
 Atque uno obducunt se cortice: neue flagella  
 Dilabi sinuo, neu summa cacumina ventus  
 Dinellat, cera linio, aut diducat adulta;  
 Vngvine dum proprio corpus iunguntur in unum,  
 Atque operit lentum sub eodem cortice gluten.  
 Postquam alta steterit radice in fossa, & opimum  
 Raptarii stirpes succum, mirabere poma  
 Plenaq; grataq; non uno tamen una sapore.

Visitur Surrentinis in hortis genus citrii, quod ex artis mangonio produ-  
 ctum existimo, quodque acris medullæ loco aliud citrium affert, eodem pedi-  
 culo, quo continens, cortice, & integro citrio, quo nil mirabilius videri potest.

Condi-  
 tura.

Palladius de eorum conditura hæc habet, Citreum & in arbore potest per  
 totum annum propemodum custodiri. Melius si vasculis quibuscumq; clau-  
 datur. Si velis pomalegere, atque seruare, nocte luna latente debebis cum  
 ramis foliatis carpere, & secreta disponere. Alii singula vasis singulis claudunt,  
 vel gypso adlinunt, & opaco loco ordinata constituunt. Plerique in cedri sco-  
 be, vel in straminibus minutis, vel in paleis tecta seruât. Sotio iuber pomum  
 citri subacto gypso studiosè perlini, vt toto anni curriculo inoffensa integri-  
 tate incolume ab omni vitio seruetur: eaq; non putrescere promittit, quæ in a-  
 ceruis hordei fuerint obruta. Sed mirum proditur calido pane citriis superpo-  
 sito celerius putredinem concipere.

#### De limonibus malis. CAP. VI.

**E**X hac tribu alia & citriorum species, quæ ouatam etiam habet formam;  
 sed ab eius odore, sapore, & qualitate maxime recedit, cuius Latini, Græ-  
 ciq; authores non meminerunt.

Nomen.

Recentiori Latio mala limonia dicuntur. Neapolitani *Limoncelli* dicunt, 30  
 à limone velut inflexo nomine.

Genera.

Huius duplex genus, maius, & minus.

Forma.

Maius, quod vulgò *Limoncello* appellatur, oblongo formatur ductu, ac  
 protenso corpore citrium imitatur, & interdum magnitudine. Cortice con-  
 statur non adeo crasso vt citrium, sed vberiori, & acriori succo. Colore ex viridi  
 in futeum languescere. Fronde citrii, sed breuiori. Flore mali aurei, sed odo-  
 re inferiori, floretq; cum eo. Sed id genus cultus, & insitionis mangonium in  
 tantas digessit species, vt enumerare quis non facile queat. Aliud enim corti-  
 cem, aliud medullam tam dulcem continet, vt simul mandantur, aliud tam du-  
 ro tegitur cortice, vt gestatum toleret, & longius asportari patiatur, aliud se- 40  
 mine.



mine caret, spadonium, aliud per longitudinem striatum, visenda speciei, vulgò canaliculatum dicitur. Sunt quæ orbiculatam formam referant, sunt etiam, quæ ab orbiculari forma recedant. Minus Neapolitani *Limoncello piccialo* vocant, inter cætera huius generis acrium mala nobilius existit, citriorum malorum decus. Fronde nigra cuspidata, & minoris quàm arboris mali aurei. Succo cæteris acriori. Perpetua coma vulnificis infestisq; aculeis hispidatur. Florere semper nouo, semper fortunauctum. Huius multa quoque sunt genera. Est inter ea genus vnum, quod maius ferè æquat, agricolæ infirionis arte effectum prædicant. Aliud est sine semine, est & aliud nuper nobis adinuentum, vt caro & cortex dum simul vorantur, os & fauces iucundissimo cinnamomi odore repleant: vulgò *Limoncello incannellato* dicitur.

Cælum siue algens, siue æstuans planta non perfert, postulatq; assidue irrigari æstate, hyeme tegenda est, ac manipulis stipanda, subtus fimo obruenda, ne vis illam Boreæ aut cæli adurat, nec nuda hyemi credenda, cùm cæteris plantis tenerior sit, & iniuriis magis exposita, ideo locis natura, vel industria ab iis tutis feruatur: vt sub præruptis Pausilypi collibus, & Surrenti, vbi semper lata, perenni fronde, ac fructibus onerata conspicitur.

Cultus idem qui superior, sed in minori specie maior cura adhibenda est. Vnde ob dictas causas fictilibus vasis in fenestris asseruatur, coliturque: nam dum præ oculis habetur, quotidiano cultu non defraudatur.

Inferitur minoris magnitudinis genus citrium, vt odoratius, coloratius, & maius fiat, & iterata infirione augebitur semper. Inoculatione proficit, sed quia spinæ impedimento sunt, quominus à furculis deglubantur geminæ, ideo vel aliquot mensibus prius deradantur, vel illi seligantur, qui spinis careant.

#### De malo aureo. CAP. VII.

**I**AM ad alias malorum medicorum species deuentum est, scilicet, quæ orbis formam retineat, ex iis principatum sibi vendicat aureum malum, vt potè apud nos vulgarius, & magis obuium.

Ab aureo colore, quo rutilat, cùm maturuerit, multi sunt, qui putant malum aureum dici, atq; de eo intellexisse aiunt Virgilium, cum dixit,

*Aurea mala decem misi, cras altera mittam.*

Vulgus arantium vocat. Hermolaus rantium putat ab æris colore, quasi randium vocari, hoc est fuluum. Quamquàm & à Neratio fortasse inuentore neratium dici potuit. Vel aranium quasi arianum à gente, est enim Aria, vt inquit Hellanicus; Persica quedam regio. Vel malum arantium ab Arantia oppido Achææ, quod & pomis fertile scribunt fuisse. Accedit quod Herculem mala Hesperidum Arantiam primum tulisse credunt, authore Paulania. at scholiastes Nicandri super versu illo in Alexipharmacis,

*καρδάμυδος, μέδοντε καὶ ἰμπερίοντα σινάπιν.* id est

*Cardami folium, Medum, ardensq; Sinapi.*



Αἶτ', μὴ δῶντι, μὴ λον' βεῖ τὸ μὴ δῶν τὸ νεαίνετον. id est, malum medium, quod heranzion vocant. Neapolitani *Citrangulo* dicunt, nimirum à citro deflexo nomine, quasi citraginem dicas.

**Forma.**

Apuleius negat eandem esse malum medicam, & citrum; cum citrus exigua sit arbor, malus medica verò ingens, ac procero stipite & cortice, & foliis lauro similis sit, citro verò dissimilis, cum folia multo maiora quàm laurus, eadēq; diuersi coloris. Hanc Virgilius descripsisse videtur, cum cecinit,

*Ipsa ingens arbor. faciemq; simillima lauro:*

*Et si non alium latè iactaret odorem,*

*Laurus erat: folia haud ullis labentia ventis;*

*Flos apprime tenax.*

10

Arboris cortex fuscae viriditatis. Folium nigrum, minus inter cætera odoratum. Flos albus, medio auro interlitus, odoratissimè inter id genus acris mala latè spirat, avidissimè ab vnguentariis quæritur ad varia odoramenta paranda, elicitur ex iis aqua, quæ non solum cæteras odore antecellit, sed ad multa valet medicamenta. Mala sunt rotunda triplici colore distincta, viridia primum frondes referentia, demum rutilant, matura fuluo nitent metallo, aucta semper fœtu.

**Genera.**

Huius triplex genus, vnum dulce, alterum acre, tertium ab utroque commistum: ut mediū saporis sit inter acrem, & dulcem. Inter ea alia mala, quæ 20 succosa sunt, alia, quæ minus succi habent. Color dulcis albicanti auro similis, vel paleæ. Acris rubicundiori. Est & genus aliud, quod foris maris & fœminæ pudenda indicat. Nam cum cæteræ arbores casu pomū aliquod producant, est tamen genus, quod poma omnia huiusmodi ferat. Est & genus aliud, quod & si foris humana genitalia effingit, duplicem habet intus spicarum ordinem, alterum in altero contentum, ut nihil speciosius videri possit. Est & genus aliud cuius spicæ aliæ dulcem, aliæ acrem referunt saporem in eodem malo. Horum omnium generum Neapolitana pomaria plena sunt.

**Calamitas solum.**

Frigidiores cæli tractus, quàm cætera, hæc arbor sustinet, cum magis robusta, & rustica, minus commodam humum, ac negligentiam cultus patitur. 30

**Sætio.**

Seritur semine, idemq; malum restituet dulce, vel acre, maius, vel minus post decimum, vel duodecimum annum. At ubi aquarum copia supererit, citius adolescit, ut in Stabiarum seminariis videre licet, ubi optima humus, & aqua abundat, ubi plantaria filiarum dores appellant, non solum huius generis, sed cæterorum malorum medicorum. Seritur & claua, sed tardè adolescit, & continuis rigationibus adiuuatur ob ieiunam corticis ariditatem.

**Cultus.**

Potest & quocunque suæ ætatis tempore transplantari, quod nulli ferè arbori contingit, imò iuuenescit, & sic videtur quodāmodo perennitatem sortiri. Sed satam oportet primo, vel secundo anno rigationibus adiuuari: quod a-  
sundinibus excavatis, vel fictilibus tubis fiet commodè, vsq; ad radices defixis, 40



ut maximis in Canis ardoribus illæ refrigerari possint. Sed hyeme in gelicidiis obturentur, ne frigus penetret fibras.

Inferitur Maio mense inter corticem & lignum, sumatur surculus ex arbo- *Infitio.*  
re, quæ pomum producat, quod minora semina intus contineat: ea enim sunt optima, non autem te decipiant ea, quæ maius pomum producant: nam id ex soli vbertate, & arboris iuuenta potest prouenire. Sit surculus ex parte, quæ ad Aquilonem vergit, ut cum in meridianam trunci partem inseueris, vel ab Aquilone ruram, meliorem nactus locum, latius germinet. Inferitur etiam aptè per infoliationem. Inferitur hæc arbor in citrum, & optime coalescet. Sed sit  
10 infitio sub terra, vel si super terram fuerit, adulta planta transferatur, & terra obruatur, nam cum citrus fragilis, & tenella sit, & parua arbor: si infitionis coalitus supra terram fuerit, male sustinet ventorum concussionem. Sunt qui eam inferant in aquifolium, & ilicem, eisq; arboribus insita frigidis in locis viuit, seq; magis contra variantis cœli iniurias tuetur.

Exstat apud nos, ut diximus, genus vnum mali aurei, quod malum affert, *Ars.*  
cuius dimidia pars dulcis, altera verò acris. Casus fecit commistionem. Erant rami duo, quorū vnus insitus dulcia ferebat mala, alter acris: cum transplan-  
tandæ arboris daretur occasio, ac per medium secaretur, ut mos est in plantan-  
dis huiusmodi arboribus iam vetustis, incidit sectio in infitionis locum, cumq;  
20 germina profferret, ex vtriusque cortice acris, & dulcis vnum profiliuit germē, quod huiusmodi mala protulit: itaque arte id effici poterit, si huiusmodi mala producere cordi fuerit.

#### De Limone. C A P. VIII.

**N**ON longe à prædicti mali forma recedit mali medici species, quam Nea-  
poli vulgus Limonem vocat. Arbor surgit ramosa, contorta, formaque limonium malum iam dictum imitatur, magnitudine verò, & folij colore, latitudineq; aureum malum. Fructus in iuuenta in longum produci, in senectæ verò in orbem contrahi videtur. Spicæ intus malorum limoniorum formam imitantur. Umbilicus foris protenditur, non intus, ut in aureo malo, & totum  
30 genus acuminatis fastigiis hispidatur, perpetuaque fronde comante. Fructus magnitudo malum aureum superat. Et si aliqua ex arbore poma decusseris, hæres fraterni lactis latius augebitur. Succo repletur admodum acris, & ingrato. Foris herbaceo viret colore, in vltima maturitate croceo. Cute non adeo crassa, ut malum aureum, vel citrium. Id genus igni admotum, sensimq; reco-  
ctum rorem instillat foris, quo Neapolitanæ puellæ ora lauant, & nitorem inducunt.

#### De Poncerio. C A P. IX.

**E**ST & aliud acrium citriorum genus, orbiculata facie, quod poncerium dicunt, ducto nomine à pomis cereis, vel citriis. Folio maioris limonij.  
40 Flore mali citrij. Duplex genus, aliud paruo, aliud prægrandi turgens volemo,



ut melonis magnitudinem superet, ut vix illa quis possit circumplecti, cortice crasso pollicem æquante, puluillis & torulis rugolis papillatim extuberante, & dulci, ut cum carne simul mandipossit. Ferunt id littora Surrétina, & Amalphæa, quamuis minori copîa, quàm supradicta genera. Nostri legitimum vocant. Aliud genus est parua contentum forma, nostri spurium, vel nostrate dicunt, acriori sapore. Est præterea aliud genus, quod mala fert insipidiora, & à pharmacopolis propter condituram desideratur.

*De pomo Adami. CAP. X.*

**P**OSTREMUM genus à priori tam parum differt, ut sint, qui ab eo nil differre putent, sed non ad iam antedicti magnitudinem crescit, limonem 10 verò æquat, cortice non admodum crasso, pallido, è latiore basi in rotundiorrem conum turbinatur, vertice obtuso, & quasi umbone depresso, & in æquali, fissuris quibusdam apparentibus, proinde ac si dentibus demorsum esset: succosa ei, & acida medulla, sed est etiam dulci. nostrate vulgus *Pomo di Adamo* appellat, in quo morsum nostri protoplasti conspici dicit, atque ob suam pulchritudinem ex terrestri paradiso delapsum. Nobis pro deliciis potius habetur, quàm vsui sit.

*De malo cotoneo. CAP. XI.*

**D**IXIMVS de pomiferis arboribus æterna coma pubescentibus, nunc ad eas, quibus decidua est, & primum ad malorum cotoneorum historiam 20 descendamus, quam nō iniuria cæteris præferimus, cū Glaucides Athenæo referente, omnibus præferri velit, quæ, ut Columella ait, non solum voluptatem, sed etiam salubritatem afferunt. Plutarchus in præceptis cōnubialibus ex Solonis iussu scripsit, sponsam non prius cum sponso concumbere, quàm malum cotoneum degustasset, innuens primam gratiam, quæ ab ore, voceque sponsæ demanat, bene compositam, aptam, & suauem esse oportere. Et idem in problematis author est, primos complexus nil triste, aut iniucundum habere debere. Ex quo Plinius. Omnia iam & virorum saluatoriis cubilibus in- 30 clusa, simulachris noctium consciis imposita. Phylarchus, Athenæi auctoritate, prodidit cotonea mala suo præstanti odore letalium venenorum vires retundere, & vehemētiam eorum hebetare. Addit Pharicum præfens alioqui venenum in patina positum adhuc illa vel eorum salgamam olente, ignauum fatiscere, languidumq; à peculiari natura viribus exhaustis desciscere, illosque incolumes & illæsos remansisse, quibus illud venefici propinauerant, comper- tumque tandem hoc eorum relatu, qui venenum vendentes ita se habere deprehenderunt. Mirum est, quod multi referunt, si mulier prægnans cydonia mala esitauerit, illam industrium infantem, atq; ingeniosum esse parituram.

*Nemina.*

Theophrasto *σπύδιος μηλιά*, & *κωδωνίος μηλιά* dicitur. Hermon ex Athenæo, codymala nominari asserit, & si Polemon floris speciem esse voluerit. Philemon



mon in rebus rusticis *σπουδιόμηλα* vocat, Nicander Thyaticus mala cydonia struthia dicit appellari, sed ex sententia Athenæi errat. Pollux æstiuæ mala vocat. è Latinis Cato primus mala cotonea vocauit, & struthea, itemq; M. Varro. Cydonia Plinius ex insula Creta aduecta narrat. Q. Serenus ex Cydone Cretæ oppido.

*Aur que primum Cydon Cretæ misit ab oris.*

Macrobius ex Cloatio cottonium dici. Virgilius cana mala vocat,

*Ipse ego cana legam tenera lanugine mala.*

Columella struthia, & cydonea. Palladius cydonia habet. Itali *Cotogno*.

- 10 Theophrastus videtur duo cydoniorum genera facere, cotoneum, & struthium, satium struthium, sylvestre & peius cotoneum, quod ex illius semine satum hoc nascitur. Dioscorides struthia vocat, quæ magna quidē sunt, sed minus vtilia: cotonea sunt parua, rotunda & odorata. Alcmon ait struthiū minoris magnitudinis esse, quàm codymalū, vt recitat Athenæus, & struthiū minoris esse magnitudinis, & minus succi habere, & minus austerū esse, & concoctu facilius, ex hybernis verò cydonium magis austerum. Columella tria cydoniorum genera facit, struthia, chrysomeliana, & mustea. Plinius ait, Plura eorum genera. Chrysomela, incisuris distincta, colore ad aurum inclinato. Quæ candidiora, nostratia cognominata, odoris præstantissimi. Est & Neapolitanis suus honor. Minora ex eodem genere struthea, odoratius vibrant, serotino prouentu, præcoci verò mustea. Strutheis autem cotonea insita suum genus fecere Miluianū, quæ sola ex his vel cruda manduntur. Sunt præterea parua sylvestria, à strutheis odoratissima, in sepibus nascētia. Nos ita diuidemus ex his. Primum in sylvestre, & satium. Sylvestre est parvū, incisuris crispatur, à strutheis odoratissimum, quod in sepibus nascitur: apud nos *Cotogno seluaggio*. Satium genus in tria diuidemus cum Columella; Chrysomelianū, Struthium, & Musteum. Chrysomelianum incisuris distinctum, colore ad aurum inclinato, à Theophrasto, & Dioscoride arbitror cotoneū appellari. Hoc genus à cōpressa mali effigie, sessilis rotunditatis malum, Neapoli *Melo cotogno* vocant.
- 30 Musteum, quod primum prouenit, magis dulce, minus odoratum, minori quæ lanugine canescens: à Theophrasto, & Dioscoride videtur struthium nominari: magnum enim est. Hermon, ex Athenæo codymala nominari ait. *κώδυμα* apud Græcos et si papaueris caput significat, pro capite tamen ponitur, & pro orbiculato: nam videtur hoc genus humani capitis instar tumescere. De eo genere sic Plinius. Candidiora nostratia cognominata, odoris præstantissimi. Est & Neapolitanis suus honor. Neapolim ex Vesuuiο tribria veniunt. Tertium genus struthium, quod minoris quidem magnitudinis, sed odoris maioris, colore aureo, medio habitu. Ideo Alcmon minoris magnitudinis, quàm codymalum esse dicit. Minus ex eodem genere odoratius spirat. Hic utraque
- 40 species à turbinata pyri figura *Pero cotogno* dicitur.

Genus.

Descriptio.



quæ terrena magis quibusque aquosa vis admiscetur, quæ per verustatem exarescente, quodam temporis spatio vibrant odorem. Dioscorides diuersis in locis ita illud descripsit. Arborem habet arbuto non dissimilem. Fronde pingui solanum somniferum imitatur, quod aliqui halicacabon appellant, & capparem, effigie verò saluiam. Plinius hæc habet. Poma proxima amplitudine pimeis nucibus, incuruatos trahunt ramos, prohibentque crescere parente. Et alibi. Citreis odor acerrimus, sapor asperimus quadamtenus & cotoneis. Nos ita describemus, & si notior sit, quàm ut debeat describi. Arbore cõmuni ferè malo simili, nisi quod infra illius magnitudinem subidet. Flore albo, vel ex albo purpurascente, syluestris rosæ figura. Folio angusto ab ima parte albicanti. Pomo tenui lanugine pubescenti, cuius figuram supra descripsimus. 10

*Calum.*

Palladij verba hæc sunt. Amant cydonij locum frigidum, humectum. Si in tepido statuuntur, opus est illis rigatione succurri. Ferunt statum mediocris situs, inter naturam frigoris, & caloris, & in planis, & in decliuibus proueniunt, tamen magis inclinata, & deuexa desiderant. Arianus ait, teste Athenæo, Egregia nasci poma in Sydunte Corinthi pago.

*Solum.*

Et si alius inditum, solum tamen pullum, & pingue ei statuimus: (tale est Ostauianus pagus in Vesuuio positus, vbi optima nascuntur cydonia, & ferè trilibria,) quia in sicco, vel macro, vel exiguo, vitiatusque, vel fructus nullus nascitur. 20

*Satio.*

Semine feri posse: sed fructus degenerare Theophrastus prodidit: cum è struthei semine mala cotonea proueniunt. Ex quo Plinius, Cotoneum semine satum degenerat, inquit. Palladius quomodo plantis serenda sit, docet his verbis. Cydoneis serendis plerique tempora diuersa dixerunt, tamen mihi vsu compertum est, in Italia circa urbem mense Februario, vel inchoante Martio plantas cydoniorum radicas in pastinato solo tenuisse adeo feliciter, ut sæpe sequentis anni fruge gauderent, si positæ maioris status fuissent. Locis siccis, & calidis extremo Octobri, vel Nouembri inchoante ponantur. Ita ponenda sunt largæ arbores cydonij, ne alteram quatiente vento stillicidium tangat alterius. Dum minor est, vel quando ponitur, iuuetur stercore, maior verò cinere, vel cretæ puluere semel toto anno radicibus misso. Plinius, Tempus plantationis post mediam hyemem in idus Februarias. Didymus ait, eodem tempore, & modo plantari debere, quo pyrum & cerasum. Dixerat autem pyrum post mediam hyemem vsque ad ver esse plantandam. Palladius, Serunt, inquit, aliqui cacuminibus & talea, sed tardus est in utroque prouentus. Plinius, Surculos abscissos serere, hoc primum sepis causa factum cotoneo depacto, mox & cultura. Sed apud nos seminibus feri desitum est. Plantis tota hyeme plantatur, cacuminibus verò frequentius, sed solo humecto pingui, & pastinato, in Surrentinis vineis cum vites propagantur, eadem in scrobe virgas cotoneorum ponunt, mox radicas transplantant. 30

*Cultus.*

De eius cultu hæc habet Palladius, Rigandæ sunt quoties cœlestis negatur infusio. 40



infusio. Circumfodiendæ sunt locis calidis Octobri mense, & Nouembri, frigidis verò Februario & Martio. Nisi enim circumfodiatur assidue aut steriles efficiuntur, aut earum poma degenerant. Putandæ sunt, sicuti probaui, & à vitiis omnibus liberandæ.

Palladius, Mense Februario cydonia inseruntur melius in trunco quàm in *infusio.* cortice. Recipiunt in se surculos propè omnis generis, punici, sorbi, & omnium malorum, quæ meliora producant. Inseruntur autem nouellæ arbores, quibus succus est in cortice. Si maior est circa radicem, melius inseretur: vbi cortex, & lignum beneficio soli adhaerentis humescit. Quod nulli arbori inseri  
 10 possit, testatur his carminibus.

*Cum praestet cunctis se fulua cydonia pomis,  
 Alterius nullo creditur hospitio.  
 Roboris externi librum aspernata superbit,  
 Scit tantum nullo crescere posse decus.  
 Sed propriis pandens cognata cubilia ramis,  
 Stat contenta suum nobilitare bonum.*

Sed mense Martio dixit, Cydoniam Martio inseri: Et Ianuario ostendit, sorba Aprili inseri in cydonio. Et Septembri, tuberes in cydoniam inseri, mense  
 20 Ianuario ultimo, vel Februario, surculus mirabiliter proficit cydonio insitus. Plinius tuberes inseri in malo cotoneo dixit. Strutheis autem cotonea insita suum genus fecere miluium, quæ sola ex his vel cruda manduntur. Diophanes scriptum reliquit, Cydonia & caprificus omnem arborem suscipiunt, quæcunque ergo voles in his inserito. Damascena prunus cotoneæ malo impacta coalescit. Cotonea oxiacanthæ consortium nō aspernatur. Pyrus inseritur in cydoniam. Cotonea malus, & caprificus arboris cuiuscunque consortium ineunt, nec ulli surculo denegant hospitium. Anatolius author est, malum inseri in cotoneo, fierique ex cotoneis mala pulcherrima, vocata apud Athenienses melimela. Tarentinus verò pyrū in malum cydoniam inseri. Nos autē Ianuario mense mespilum in cotoneam inseuimus & optimè apprehendit. Pyra superba, quæ  
 30 vulgo *Moscarelle* dicuntur, inseruntur in cotoneam, & optima poma proueniunt, omnisque generis pyra, colore, odore, & magnitudine insignia.

Palladius. Poma in his & cito matura, & maioris incrementi assiduus humor  
 40 efficit. Domocritus cotoneum cuiusque animalis effigiem representare promittit: si in formulis insculptis clausum adolescet. *Ars.*

Palladius ait. Si arbor ægra est, amurca aquæ æqualiter admista radicibus  
 50 debet affundi, aut calx viua temperata cum creta, vel resina locularis pici liquida mista trunco arboris adlini, vel ablaqueatæ arbori circa radices imparis numeri poma cydonia pro magnitudine eius ponenda, & obruenda firmantur, quod annis singulis factū custodiet à vitiis: sed arboris longæ derogabit ætati. *Morbi & remedia.*

60 M. Varro conditura mala in loco arido, & frigido supra paleas posita seruari rectè putat, & in pensilibus iunctis. Columella de malorum conditura hæc *Conditura.*



habet, Multi eadem ratione, quæ granata, in scrobibus vel dolis seruant cydonia. Nonnulli foliis ficulneis illigant, deinde cretam figularem cum amurca subigunt, & ea linunt mala, quæ cum siccata sunt in tabulato, frigido loco & sicco reponunt. Nonnulli hæc eadem in patinas nouas sicco gypso ita obruunt, ut altera altera nō contingant. Nihil tamen certius, aut melius experti sumus, quàm ut cydonia maturissima integra sine macula, & sereno cælo decrescen-  
te Luna legantur, & in lagena noua, quæ sit parentissimi oris, deterfa lanugine quæ malis inest, cōponantur leniter & laxè, ne collidi possint: deinde cum ad fauces vsq; fuerint composita, vimineis surculis sic transuersis arctentur, ut modice mala comprimant, nec patiantur ea, cum liquorem acceperint, suble-  
uari, tum quamoptimo, & liquidissimo melle vas vsq; ad summum ita repleatur, ut pomum submersum sit. Hæc ratio non solum ipsa mala custodit, sed etiam liquorem mulsei saporis præbet, qui sine noxa possit interdum dari febri-  
citatibus, isq; vocatur melimeli: sed cauendū est, ne quæ in melle custodire vo-  
lueris, immatura mala condantur, quoniā cruda si lecta sunt, ita indurescant, ut vsui nō sint. Illud verò, quod multi faciunt, ut ea diuidant olleo cultro, & semina eximant, quod putent ex eis pomū vitari, superuacuum est, sed ratio, quam nunc docui, adeo quidē cetra est, ut etiā si vermiculus inest, nō amplius tamen  
corrumpantur mala, cum prædictū liquorem acceperint. Nam ea mellis est na-  
tura, ut coerceat vitia, nec serpere ea patiatur, qua ex causâ etiā exanimum cor-  
pus hominis per annos plurimos innoxium conseruat. Palladius verò, Legenda sunt matura cydonia, quæ hoc more seruantur, vel inter binas regulas posita, si luto ex omni parte claudantur, vel si defruto incoquantur, aut passo. Alij, quæ maiora sunt fici foliis inuoluta custodiunt. Alij tantum locis siccis reponunt, à quibus vërus excluditur. Alij canna, vel ebore in quatuor partes diuisa sublati omnibus, quæ in medio sunt, in vase fictili melle obruunt. Alij in melle sic integra dimittunt. In quo genere cōdiendi satis matura deliguntur. Alij milio ob-  
ruunt, vel paleis separata demergunt. Alij plenis vino optimo vasculis mittunt, vel vini, & defruti ad seruanda cydonia æquū corpus efficiunt. Alij dolis musti mergunt, atq; ita claudunt, quod odoratū reddit & vinum. Alij in patina noua  
sicco gypso obruunt separata cydonia. Democritus verò lecta coronea dolis musti mergit, atq; ita claudit, quod & odoratius vinū reddit. Facce vini mixtū in  
modū seruantur, aut fictile nouū iis malis assignatur, operculoq; picato in vini dolio clauduntur, sic tamen, ut fluitent: ita recentia teneri promittit, & vinū, in quo enatant, odorem bonū contrahere; aut in floccis, tomento ve mundo-  
cistis disposita cōduntur. Itidē diu in scobe demersa custodiuntur: quippe scobis ariditate defenduntur. Nec secus in straminibus minutis, vel paleis obruta cōponuntur. Sed in domo nō recondenda, vbi reliqui fugaces fructus, vel aliq; quoq; teneri resident: siquidē hos suo acerrimo sapore labefactantia vitiant, sed maximè vuas in vicino situ iacentes marcore cōficiunt. Nonnulli foliis in-  
tegunt, deinde argillo sum lutū, aut cretam figularem cum pilis subigunt, & ea li-  
nunt



nunt mala; quæ cum in sole siccata sunt, in tabulato reponunt. Cumq; postu-  
habitvsus, fracto luti regmine, cotonea qualia fuerant indita inuenientur. Alij  
hordeo obruunt, alij doliis musti mergunt: atq; ita claudunt. Plinius. Cotoneis in-  
terclusis spiramentum omne adimendum, aut incoqui melle ea, immergiver oport-  
tere. Sunt qui cotonea cerapontica illita melle demergant. Dicuntur mala cydo-  
nia melle condita etiam melimela, quasi melle parata. Vnde Martialis in Xenis:

*Si tibi Cecropio saturata cydonia melle*

*Ponentur, dicas hæc melimela licet.*

*De Malo. CAP. XII.*

**N** V N c de malo dicemus, à quo fructus omnes mollis cutis nomē capiunt.  
M. Varro ex malo apibus præberi cibum, ex quo conficiant ceram, &  
mel dixit. Malum amorem significat & Veneri dicatum est, fortasse quod in  
iudicio, quando cæteris deabus pulchritudine prælata fuit à Paride, malo do-  
nata fuerit. Philostratus in imaginibus, quatuor esse amores ait, duo qui se in-  
tucem malis petant: duo sagittis: quam rem ita interpretatur, quod principium  
amoris poma mittat: sagittæ verò amorem perficiant. Id indicat elegans Pla-  
tonis epigramma, quod sic vertit Bentinus.

*Malo ego te ferio, tu si me diligis, illud*

*Suscipe, me imperii & virginitate tua.*

*Hoc fieri si posse negas, hoc suscipe malum, &*

*Quam pereat paruo tempore forma vide.*

Ad id etiam Theocriti versus spectant in Bucolicis.

*Appetitur malis caprarius à Clearistide*

*Propellens capras, & suæ quid occinit illa.*

Ad quos versus Virgilius in suis Bucolicis allusit.

*Malo me Galatea petit lasciva puella,*

*Et fugit ad salices, & se cupit ante videri.*

Ex his veri amoris, & prolificæ fecunditatis natum est hieroglyphicum argumen-  
tum: vnde in veteri numismate Iulæ præ Augustæ & Agrippinæ Augustæ

**C**laudij Imperatoris vxoris, Neronisq; matris Venus ipsa cum malo cernitur.

Homerus malum appellat aglaocarpum, in Odyssæa libro.

*Egregio mali fructu, sicusq; suavis.*

Quærit Plutarchus in Sympotiacis, cur Poeta dignatus est hoc epitheto ma-  
li decorare. Ex Tryphonis opinione dicit id esse facta cōparatione fructus cū  
arbore, cum arbor parua admodum, & aspectu vili, fructum ferat pulchrum, &  
magnum. Aliorum verò autoritate in solo hoc fructu pulchritudinē omni-  
bus conspici forinis compositam. Nam contactu est instar violæ, vt nō inqui-  
net, & fragrantia oppleat tangentem. Saporem habet suauē, & olfactu, & visu  
iucundissimum, vt merito laudetur, quod vnà omnes sensus alliciat. Sed Em-

**P**edocles ὁ ἐπὶ πλοῖα μῦθα cur dixerit, ambigit Plutarchus: cum Philosophus non  
casu epitheta apponar. Grammatici dicunt ob vigorem, & esse quosdam de



Græcis, qui Phloos Baccho sacrificent. quoniam de omnibus fructibus in malo maximè vigor, & viror permanet. Vel cū alij fructus foris cortice ambiuntur (is enim phlæos est) id est tegmen in superficie habeant: solus mali cortex intus est glutinosa, & pinguis tunica, qua semen continetur, id verò quod est foris est circa eam circumpositum, hyperphlæon, id est extra corticem in sitū appellatur. Non omittam notatu dignum illud de malis, quæ iumentis portatu gravia sunt, vel si pauca sint, siquidem vires (ut Lucianus in suo asino aureo ait, eorū odoribus offensæ fatiscunt, ut ponderi minus pares sint. Remedium esse si prius edenda apponantur, aut utiq; si ostendantur: quod etiā in symplosiacis Plutarchus sensit, bulimo corripere equos, & asinos, qui aut mala, aut ficos dorsuarij cōportarint, sed maiori dignū miraculo remedium, quo ipsis, & hominibus quoq; succurratur. Exanimata ferè iumenta, extinctosq; penè deliquio viriū homines obiectus panis reuocat. namq; si pusillū huius vorarint animantes, ex eo protinus cibo sese recolligentes roborantur, firmataq; pristinū iter prosequuntur. Macrobius ex Verānij verbis malū inter felices arbores cōmemorat.

**Nomen.**

Græcis arbor *μηλιά*, fructus *μήλον* dicitur, Latinis arbor hæc malus, fructus malum. Italis *Melo*.

**Forma.**

Mali descriptionē, utpote vulgarem, hīc omitteremus, ni Theophrasti verba hinc inde dispersa de ea omisitū videremur. Inquit Philosophus. Assurgit itaque malus vnicō caudice, ni exilitatis causa, multiplici caudice illā diffundimus. Confestim se in ramos spargit. Corticis læuore nitet. Peculiares nodos habet beluata facie sed pergrādi vno, aliis circa eū pusillis minoribus. Folio carnosō, oblōgo, mucronatoq;. Flore foliato, albicatī, supra fructū infidente. Radicibus paucis, summæ telluri inhaerentibus. Pomo corio recto, figura oblongo, seminibus intus discretis, cōtinenterunica vestitis. Succo aquoso. Serotino pullulatur: primis namq; frigoribus dat fructum. Ex annotinis surculis frugifera. Breuissima eius vita: sed præcocibus breuior, quā serotinis: dulcibus, quā acidis: sed ut cito occidit, ita celeriter crescit. Senescit citissimè, sed suo latere repullulat, & crescit. Sed Plinius descripsit, ut accepit à Theophrasto, ita descripsit. Arbor statim se in ramos spargens, eorumq; incōditus ordo. Cortice læui, in senecta rugoso, & cadenti. Foliis mucronatis, pluribus ex vno pediculo exeruntibus. Radice breui, & angusta per summa cespitiū. Fructus partes, quæ à sole, rubent. Succo aquoso, spumeo mala callo placent, odore acuto, serotino germine. reddit semen, præter præcocia, autumnō, & quēdā genera incipiente hyeme. Celerrime verò senescit, & in senecta deteriore fructū gignit. Nāq; & minora poma, pueniunt, & vermiculis obnoxia: quin & in ipsa arbore nascuntur. Vita eius brevis, ex his præcocibus breuior, quā serotinis, dulcibus quā acutis, senescitq; velociter, sed è radicibus repullulat. Materie fragili.

**Genera.**

Multa sunt, quæ à scriptoribus malorū genera describuntur, quæ nos nō pigebit recensere; adiiciemus alia etiā nostri æui, ne huic arbori & nos ingrati videamur, quā maiores nostri tantorū generum scetibus fecundarunt. Antiqua illa ge-



illa genera nostris accommodabimus, quoad eius fieri poterit, neq; ignoro me opus difficile aggredi, cum illi tam succinctæ aliquorum historiam tetigerint, ut ad cognoscendū quibus nominibus his temporibus appellentur, Delio narrantore opus sit. Scimus tamen non defuturos, qui aliqua ex his emendant, alia adhuc restituant ut agriculationis studiosi, curiosi q; voti compotes tandem fiant. Genera periisse nō est philosophi existimare sed in alia loca translata secundum diuersas regiones diuersa nomina sortita, nemo est, qui dubitet. Sed ad rem accingamur. Vniuersum igitur malorum genus duplex statuimus, satium & syluestre. Syluestre genus in aliud caput differemus, ut minus hoc loco obscuritatis pariat. Satium verò triplex facimus à tempore: nam inter ea sunt, quæ præcocia, tempestiua, & serotina sint atque ut nobis annus affert ita nos apponemus. Præcocia proximo sequenti capite attingemus, ut clariora distinctiora q; sint, quæ scribimus. Sed nunc tempestiua dicemus, scilicet quæ medio tempore maturescunt. Est nobis mali genus vnum, quod etiamnum Neapolitano vocabulo carere semine ostenditur, à Vesuuianis *Melo di paglia*, quia pondere leuissimum est, forma turbinata, carne alba, gustu insipido, ut nil boni habeat, nisi quod primum apparet. Id puto à Plinio spadoniū dici. Belgæ spadonia vocant à conditione castrati seminis. Malum apud nos vulgo *Appione* dictum: quia quodammodo odorem nostri, quod vulgus appium dicit, imitari videtur, ac magnitudine superat, est rotunditate insigni, colore albo flauescente, sapore dulci cum quadam aciditate, magnitudine plusquam media, longo seruat tempore, quod pretiosum habetur: existimarem esse epyroticum malum. De eo Dioscorides hæc habet: Epyrotica, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho utilia, aluum sistere & vrinam euocare. Athenæus aliquas addit notas. Quæ orbiculata dicuntur, cum suauiter stringant, habent dulcedinem, ita ut stomacho sint utilia. Plinius. Orbiculata à figura orbis in rotunditatem circumacti, hæc in Epyrum primum prouenisse argumēto sunt, Græci, qui epyrotica vocant. Palladius toto anno seruari posse ait, à Varrone, Columella, & Macrobio orbiculata dicta. Maturescunt Augusto mala, quæ ad nos Puteolis asportantur, cortice toto rubro, ut cruore perfusa videantur, sapore dulci, in extrema maturitate, ut mora nigrescunt, vulgò *Mela orcole* dicta: videntur mihi à Plinio descripta mala. Sunt quibus sanguineus color origine ex mori insitu tracta. Nisi fuerit aliud apud nos genus, cuius caro etiam intus sanguine vel mororum succo tincta videtur: ut pastinaca. Sed Plinii verba de Appiano malo tam perplexa obscura q; sunt, ut quid sibi velit non sat intelligatur. Eius verba sunt. Ergo habent originem à Mario, Gestio q; & Manlio, item Claudio. Quibus cotoneo insito ab Appio è Claudia gente Appiana sunt cognominata. Odor est his cotoneorum, magnitudo quæ Claudianis color rubens. Sunt inter doctos, qui de solo Appio loqui intelligant, cum Claudius & Appius vnus item q; fuerit, nec duo mala repererit: sed magnitudo, quæ Claudianis tribuit, Appianis ascribenda est. Sunt alii, qui duo mala descripsisse



dicant, ac Claudianum malum magnum, ac colore rubrum fuisse à Claudio inuentum qui familiæ cognomentum dederit, idemq; malum Appium in se-  
 ruisse cotoneo, ex quo cotoneorum odorem acquisierit, non murata magni-  
 tudine, nec colore. Si ita est: duo sunt apud nos mala, magnitudine, & colore  
 paria, & preciosa, quorum vnum odorem seruat cotoneorum, alterum mini-  
 mè. Quod odore caret, vulgò dictum *Meliorosa*. Id roseo colore perfusum est,  
 mira teneritudine, & sapore, minimè fugax, pomum magnitudine media, vt  
 facile cū ceteris de principatu ceteret, nec indignū Claudii nomine: hoc Clau-  
 dianum dicerem. Videtur idem malum Athenæi platanium esse. Inquit ipse.  
 Platanium bonum habet succum, & facile excernitur, at stomacho minus co- 10  
 fert. quæ notæ huic malo conueniunt, nam bonum succum habet, & facile di-  
 geritur, & sua nimia dulcedine stomacho minus confert. Nam Dioscorides  
 dulcia mala stomacho negotiū facessere scribit. Sed illud quod me magis mo-  
 uet, platanium nomen est, quasi rubrum dixerit: nam malum, quod ex platani  
 infusione nascitur, rubrum prouenit, vt ex Diophane videbimus inferius. Sed  
 putari nolim, dum vulgare *Meliorosa* pronuntio, id genus mali intelligi quod  
 etiam vulgò apud nos *Meliorosa* dicitur, non admodum huic dissimile forma,  
 sed odore tam præstanti, vt dum manditur, fauces & palatum tam iucundissi-  
 mo rosarum odore repleat, vt nil suauius desiderari possit: nam hæc mala ro-  
 sea ab earum odore dicuntur, seruanturq; vsq; ad aliorum prouentum. Aliud 20  
 verò mali genus, quod odorē cotoneorum seruat, Augusto maturescit, colore  
 rubro, tenero, rotundo, magnitudine pari Claudiano iam dicto, apud nos vul-  
 gò *Melo appio rosso* dicitur, nam odorem vulgaris nostri appii retinet. Sed no-  
 strum vulgare malum appium, quia videtur cognationē quandam cum ante-  
 dicto habere, assererem turo esse melapiū Plinii: Is namq; paulò inferius sub-  
 iungit, Cognatione melapia. Videlicet sunt etiā melapia cognatione sic dicta,  
 quod similitudinem odoris cum appiano dicto retinent. Id apud nos princi-  
 patum obtinet, odore cotoneorū tam grato, vt eius cortices igni proiectæ do-  
 micilia maximo odore repleant, sapore tā grato vt nil gratius exoptetur. Callo  
 corporis duro, vt possit in annum seruari, & etiam in duos, vectū perdurat, vt 30  
 trans maria veneat, colore cum maturuerit luteo, agris innocuū præbetur, vt  
 proverbio dicatur, omne malum, malum, præter appium malum. Tertium est  
 apud nos genus appii, colore nigro, forma vulgaris nostri melopyri, etiam co-  
 gnatione melapia, odore cotoneorum. Mala, quæ Iunio supremo circa festum  
 Diui Petri maturescunt, & ob id vulgò dicta *Melo di San Pietro*, superant cæ-  
 rera magnitudine, loco, quo flos exierat, tuberculum eminet, quo verò in hæ-  
 serat ramo, crassiori orbe residet, oblongo ductu, vt mammae modo tume-  
 ant, & cum eis similitudinem maximam habeant, existimarem esse Plinii or-  
 thomastica. Cuius verba sunt, A mammae effigie orthomastica. Callo fra-  
 gili, & tenero, ventorum flatu deturbata, nō tam cito terram tangunt, quā 40  
 in partes plures dissiliant, colore rubro, mira suauitate cum aciditate qua-  
 dam,



- dam, & gustus teneritate, ita vt in ore frusta liquecant: sed vt fugientia, diu seruari non possunt, neq; ad æstatis exitum prorogantur. Serotina mala, quæ ad hyemem vsq; suam differunt maturitatem, asseruanturque per totum annum, Cato scantiana vocat, & inter conditiua ponit, & alibi, Mala scantiana in doliis, & alia, quæ condi soleant. Columella, & Macrobius scandiana vocat. Ex iis Plinius. Et quæ tradit Cato in doliis condi scantiana. Mihi videntur esse mala vulgò dicta *Oltramontane*, vel *de Cerrito*. Magna sunt, compressa, dura corporis cartilagine, pendent in arbore ad hyemem vsque, asseruanturque sine negotio vsque ad aliorum prouentum, idque insigne habent, quod maxime omnium condantur. Malum illud insignis candoris, ac rosei coloris, carne intus friabili, & si dura cartilagine cooperiatur, sapore non ingrato, quod nobis *Melo diece* dicitur, quia sola, vel pauca sunt, quæ ex eodem pediculo dena pendeant, dixerim esse Plinii mala gemella. Cætera (ait) e causis traxere nomen germanitatis, coherentia gemella, nunquam singula in fœtu. Quæ Plinius pulmonea vocat, quod stolide tumeant, retinent adhuc pristinum nomen, nam vulgò *Mela pulmonare*, aut *Mela distoppa* vocant, carne fungosa, pulmonis instar, sapore insipido, sanguineo foris colore, vel pulmonis magnitudine media, vsque ad noua absque cura seruantur, vt nil nisi id boni habeant. Plinius etiam mala serica à colore vocari ait. Ego potius syrica legerim, cum Columella prius syrica dixerit, & ex vocum affinitate facile in eius verbis mendum prorepisse iudicari, cum ipsemet syricum colorem ex Sandyce, & Synopide mixtis fieri dixerit, & ex eo minium sublini. Qui color visitur in nostris malis vulgò *Cannamele* dictis: videntur verò velut ex Synopide, & Sandyce coloribus rota perfusa, duro carnis callo, & compacto, vt si mordicus prehenderis, auellere nequeas carnem, & gingiuas comprimant, sapore tam dulci, vt à palato morosiore laborantibus fastidiantur. Si qui verò fuerint nasutuli, qui nostratia *Cannamela* vocata non esse syrica mala dixerint, recipiant fortasse nostrum vulgò dictum melopyrum. Malum id nigro est foris colore, vel magis fuliginoso ac longiori pediculo cæteris prædico, ob id melopyrum dictum, composito nomine ex malo, & pyro. Coniectura me mouet, quod syrica pyra etiam à Plinio descripta (vt videbimus) sunt nigra foris colore, atq; huic malo similima. Quæ Plinius Sceptiana vocat ab inuentore Libertino, rotunditate insignia, ea ipsa vocat Athenæus mordiana, quæ optima in Apolliniæ agro nascuntur, qui Mordicus cognominatur, orbiculatis similitudine respondent. Apud nos ea puto esse mala quæ *di Catalogna* dicimus. Nam magnitudine insignia sunt, & rotunda valde, dulcia, maturitate friantur, colliguntur ex arbore cum iam dictis vltromontanis, & reponuntur sed non diu seruantur. Malum quod vulgò Neapolitani *Melo cedrolo* vocant, quia cucumeris instar in longum protenditur, posuerim inter aphrotomela, cum sua austeritate mandi nō possit, nisi domito maturitate succo, dū asseruatur domiciliai, quando odore replet, colore est citrino, maturitate



fratur. Reliqua ab antiquis memorata, cum notas aliquas illis non addiderint, difficile immo impossibile videtur coniectari, quæ fuerint, nisi propriè diuinare velimus. Athenæus vocat setania, refertq; Africani Pamphilum meminisse. Cato quiriniana vocat, Columella Matiana, Sextiana, Pelusiana, Amerina. Plinius dicta à Matio, Gestio, & Manlio. Nunc autem nuperrime adoptata sunt parua, gratissimi saporis, quæ petisia nominantur, patrias nobilitauere camerina, & græcula. Melos foliis folium vnum aliquando & geminum erumpit è latere medio. ( & alibi, iam & in pomo ipso, mali quodam in genere, parua mediis emicant folia, interim & germina. ) Celerrime in rugas marcescunt pannucea: daxis vilissimis nomen, quamquam primis aduentu, decerpitq; properantibus: amerina maxime durant. Macrobius ex Cloatio malorum genera numerat: matianum, ogranum, panunceum, quirianum, prolium, scandianum, tibur, verianum. Horatius,

*Pitensis cedunt pomis Tiburtia succo.*

*Nam facie præstant.*

Calum.

Theophrastus frigidum locum malos concupiscere scripsit: quippe in Egypto locis feruidis paucè admodum, vitiatq; sunt. Præterea in Ponto mali per multæ habentur, sed vernæ, & syluestres maiorem in modum: præterquam si quæ ferotina. Ex quo Plinius scribit. Circa Bosporum Cimmericum in Panticapeo vrbe, omni modo laborauit Mithridates Rex & cæteri incolæ sacrorum certè causa laurum, myrtumq; habere, & non contigit: cum teporis arbores abundant ibi, punica, ficiq; iam mali & pyri laudatissima. Et alibi. Malum in montuosa subit. Et quæcunq; communia sunt montibus, planisque, maiora fiunt, aspectuq; pulchriora, in campestribus meliora materie, crispioraq; in montibus, exceptis malis, pyrisq;. Palladius ait frigido solo prouenire, si cæli tepor adiuuerit, nec in asperis & humectis sedem recusant. Anatolius frigidis locis & humectis gaudere ait.

Solum.

Palladii de solo sententia hæc est. Amant pingue, & latum solum, & cui humorem non tam rigatio, quàm natura suppeditet, & si in arena, vel argilla sit, rigationibus adiuuetur. mōtatis locis debent ad meridiem versa constitui. Macrum, & aridum solum poma vermiculosa efficit, & caduca. Anatolius nigra gaudere terra scripsit. Apuleius solas malos etiam in aridioribus locis vehementer vberes prouenire experimentum docuit.

Satis.

Suo fructu fata omnino poma degenerare, Theophrastus est author. Cato vt cupressos, ita & mala ferere in seminariis docuit. vt iam vidimus in Sylua. Plinius ait. Ex semine autem quanquam dissimili, ea quoque, quæ & aliis modis feruntur vt mala, nanque eis pro semine nucleus, sed tarda prouentu, ac degenerantia, & insito restituenda, & vt cupressi sic malorum semina nutriri. Palladius, mense Februario & Martio mala feremus, (ait) si calida, & sicca regio est, Octobri, & Nouembri. Anatolius autem scribit. Mali duobus anni temporibus plantanda sunt, vere, & autumnō: sed locis quibus humorē natura

rura



itura non suppeditat, quando satæ post imbres, melius conualescunt. Plinius interualla describit in pedibus nouenis, vel paulò amplius. Ramis etiam nasci posse, sed raro Theophrastus prodidit. Idem confirmat Columella dicens, Vltimis ordinibus vineti poterit (si quem tangit cura pomorum) in ea vineti sine, quæ subiacet septentrionalibus, ne cum increuerint obumbrent, cacumina malorum depangere, quæ vel inferas interposito biennii spatio, vel si generosa sunt, adulta transferas. Plinius. Stolones auelluntur arboribus, & cum perna sua, partemq; aliquam è matris quoque corpore auferunt secum, fimbriato corpore, & hoc modo plantantur mali.

10 Theophrastus de eius putatione hæc habet. Malus minus recidi desiderat, *Cultus.* & quicquid siccum, & cortice tenui vestitum; hæc enim resecta, vehementer laborant: qua de causa manu his auferri præcipiunt, aut ferro perquam leuissime: periculum nanq; interitus propter vlcera imminet, quemadmodum radicibus vulneratis, cum fodiuntur arbores deteriorescunt, & sæpe ægrescunt, ac exarescunt: sic etiam vulnere partis superioris noxam eandem his posse inferri credendum est, quam nequeant tolerare. Plinius. Est & quædam contusio falsis hebetioris, quibus omnibus causis difficilius tolerant frigora, aut æstus, quoniam in vlcus penetrat omnis à foris iniuria. Palladius autem, Nec exarari, nec effodi desiderant. Idcirco eis magis prata conueniunt. Stercus ouillum tantum non exiguum quidem sed libenter assumunt, vel si cineris pulveres misceantur. Amant modestas rigationes. Putatio illis apta est, sed maxime, ut arida, & male nata tollantur. Citius senescit hæc arbor, & in senectute degenerat.

Ait Cato. Mala inferi oportet Luna silenti, post meridiem, sine vento austro, inter lignum & corticē. Sed insitio per ver, per solstitium dies quinquaginta, & per vindemiā. Plinius ex Catone dixit. Inferi autem Cato præcipit per ver, & post solstitium diebus quinquaginta, post vindemiam, Luna sitiente, hoc est sicca, præterea post meridiem, ac sine vento austro. Palladius autem, Malus omni generi inferi potest, quo pyrus. Mense Februario, Martio, & aliis, 30 quibus pyrus inferitur in malo, in pyro, in spino, pruno, sorbo, persico, platano, populo, salice. Dixerat autem in pyro etiam cydonio, & ut aliqui in punico sed falso ligno; & omni generi inferi potest, ut etiā videbimus. In Iulio mense autem emplastratione malus inferi locis humidis me explorante processit. Inferitur etiam in prunum. Sed prunus eā degenerem reddit, & parnā. In se verò præcipit tuberes, & mespilum, ut suis idem ad Pasiphilum testatur versibus,

*Insitaproceris pergit concrefcere ramis,*

*Et sociam mutat malus amica pyrum.*

*Seq. feror syluis hortatur linquerè mbres,*

*Et partu gaudet nobiliore frui.*

40 *Spinifenas prunos, armataq; robora fentes*

*Lenigat, & pulchris vestit adulta comis.*



*Exiguam sorbum dulci distendere succo*  
*Novit, & ad cupidas flectere poma manus.*  
*Stipitibus gaudet nomen mutare salignis,*  
*Et gratum nymphis spargere flore nemus.*  
*Robora thyrsifigero platani concordia Baccho*  
*Fætibus instituit plena rubore novis.*  
*Illius insolitas miratur persicus umbras,*  
*Populeaq; ferunt candida dona come.*  
*Mespilus huic paret, lapidosaq; viscera mutans*  
*Tenditur, & nixco plena liquore rubet.*  
*Pro sudibus fætis, & pro pregnantibus armis*  
*Castanea fulvum dant noua mala decus.*

Virgilius in Bucolicis in platanum malum inferi posse cecinit.

*Et steriles platani malos gessere valentes.*

Plinius malum posse prunum recipere dixit, indeq; nata pruna malina dici. Traditque antiquam in malis inoculationem, qua sutorie simili fistula aperiebatur in arbore oculus cortice exciso, semenq; includebatur eadem fistula sublato ex alia. Viditq; iuxta Tiburtes tiliam omni genere pomorum onustam, malorumque generibus. Diophanes scribit inferi in omnem pyrum sylvestrem, & in cotoneorum malum fructumq; ex his cotonea mala pulcherri-  
 ma vocata apud Athenienses melimela. Inseruntur etiam in platanum, à qua rubicunda fiunt mala: recipit quoque pyrum, motum, laurum, & damasce-  
 num. Didymus in commentariis suis, quæ de re rustica reliquit, iubet & ma-  
 lum pruno damascenæ inserendam, quæ si citrio insita comprehendet, toto  
 anno pomiferam reddi pollicetur.

Docet apparatus Theophrastus, quo maiora euadant mala. Scilicet ut fructus ramis suis annexi, ollis inclusi, sequaci flexu in terram deducto ob-  
 ruantur. Cuius rationem dicemus in punicis. Palladius idem alio modo ope-  
 ratur. Si spissa poma ramos onerabunt, interlegenda sunt quæq; vitiosa, ut ali-  
 mentum ceteris succus equiparet, & generosis abundantiam ministraret, quam  
 numerosa utilitate perdebat. Quo rubra poma nascaantur, rationem docet Be-  
 rytus. Arbor vrina rigatu satietur. Sunt qui in alium modum malis rubrum  
 colorem moliantur. Palo in terram fixo, fructiferos ramos citra vulnus in-  
 curuantes illigant, & iuxta vel scrobiculos, vel vasa complent aqua, obseruan-  
 tes, ut meridie incidens in aquam solis radius calidum euocet vaporem, qui re-  
 flexu quodam in pomum resiliens, rubrum colorem conciliet. Non desunt,  
 qui sub arboribus rosas ferant, sic rubra dari poma promittunt. Scribit Ana-  
 tolius. Ut dulciorem creent fructum, sunt qui capriuum finum vrina adii-  
 ciant, & veteris vini fecem radicibus iniiciant.

Merbi &  
remedia.

Ex Theophrasto videre est communem arborum morbum esse vermicu-  
 lationem; omnes enim ferme arbores vermes gignunt, sed quædam paucio-  
 res,



res, quædā plures, vt malus. Et cū pluribus infestetur vermibus, iccirco citius interit: plures enim habet interitus authores. Eius fructus etiam vermiculis vastatur, sed quoties hoc vitium acciderit, perit. Mali non patiuntur à gelu, cum videantur debiliores, vt in Thessalia extitit: facit enim arboris raritas, vt frigus transmittat, nec aliqua parte retineatur. Quod autem diu non immoratur, nec vniuersum contendit, efficax id esse non potest: vt etiam de fulmine intellige-  
 10 relacet. Porto vt effugiant interitū, alterutro munimento se tueantur necesse est, aut non admittere intra se, aut amittere extra se, nec vsquam retinere. Dississionem caudicis tolerat, non solum eam, sed etiam caudicis fissiōnem susti-  
 20 net. Fructus etiam antequam coquat amittere potest. Ex quo Plinius. Vermiculantur magis, minúsve quædam, omnes tamen ferè, maximè autem arborum hoc sentiunt mali. Infirmissima verò malus, maximeque quæ dulcis est. Vermiculationem, & poma ipsa per se quibusdam annis sentiunt. Fissa stirpe non interit. Quæ verò ex Anatoli penū deprompsimus super huiusmodi plātarum morbis hæc sunt, Non erodentur à vermibus si circumscisa fuerit scylla. Si verò in ipsa arbore nascuntur, à suillo stercore, humanæq; misto vrinæ, & radicibus affuso, extinguuntur. Valde enim gaudet malus vrina, & hac assidue est irriganda. Sunt qui caprinum fimum vrinæ adiiciant, & veteris vini fecem radicibus iniiciant: vt dulciorem creent fructum. Morbos abiges, si asini-  
 30 nino stercore aqua macerato sex dies occiduo sole rigaueris. Si vis pomorum abundantiam subministret arbor, nec numerosam prolem perdat, dissectum plumbei tubi patulum os, sic vt circulum ducat, caudici altitudine pedis à terra strictum obducito, & cū mala cœperint adolescere, torquem hūc eximito, id quotannis est faciendum, vt vbertatem fecundam concipiat. Vt poma non putrescant, lacerti viridis felle perungatur caudex, nec ipsum eruca continget: vel radices taurino felle oblinendæ ante plantationem. Hæc planta celerrime à vermibus iniuria afficitur, quod si ei negotium exhibeāt, æreo clauo fodicandus, atque vellicandus cortex, donec mucrone tacti, radantur, sed ad vlcerata loca bubulum fimum obducatur. Palladius verò, Citius senescit hæc  
 40 arbor, & in senectute degenerat. Si caduca sunt poma fissæ radici lapis iniectus poma retinebit. Lacertæ viridis felle si tangantur cacumina, non putrescit. Vermes eius suillo stercore misto humanæ vrinæ, aut felle bubulo extinguuntur, qui si plures circa arborem sunt, æreo scalp pro semel rasi, non ultra nascuntur, si ea loca, vnde rasi sunt, bubulum sterces obducatur. Plinius, Mala ne putrescant, lacertæ viridis felle tangi cacumina iubet.

Columella. Hoc eodem tempore, vel etiam primo mense Augusto mala *Cōditura.* dulcissimi saporis mediocriter matura eliguntur, & in duas, vel tres partes arundine vel osseo cultello diuisa in sole ponuntur, donec arescant. Eorum si est multitudo, non minimam partem cibariorū per hyemem rustici  
 40 vindicant: nam pro pulmentario cedit. Possunt & in melle alia genera malorum, sicuti Orbiculata, Sestiana, Melimela, Mariana custodiri, sed



quia videntur in melle dulciora fieri sic condita, nec proprium saporem conseruare: arcule fagineæ, veteriam tiliaceæ, quales sunt, in quibus vestimenta forensia conduntur, huic rei paulo ampliores præparari debent, ex quæ in tabulato frigidissimo, & siccissimo loco, quò neque fumus, neque teter perueniat odor, collocantur, deinde subtracta prædicta poma sic componi, vt flosculi sursum, pediculi deorsum spectent, quemadmodum etiam in arbore nata sunt, & ne inter se alterum ab altero contingatur. Ita obseruandum est, vt vnũquodq; genus separatim propriis arculis reponatur: nam cum vnà clausa sunt diuersa genera, inter se discordant, & celerius vitiantur. Propter quod etiam consensualium vineatũ, non tam est firmum vinum, quàm si per se syncerum amineum, vel apianũ, aut etiam fecinum condideris. Verum sic, vt prædixi, cum diligenter mala fuerint composita, operculis arcularum cõregantur, & luto paleato linantur opercula, ne introire spiritus possit, atq; ea ipsa nonnulli, sicut in alijs generibus, vt supra iam diximus, populnea, quidam etiam abiegna scobe interposita, mala custodiunt. Hec tamen poma non matura, sed acerbissima legi debent. Palladini; Diligenter legenda sunt mala, quæ volumus custodire. Ea in locis obscuris, vbi ventus non sit, stramentis prius in crate subiectis, in cumulos secreta disponimus, qui cumuli frequenti diuisione separantur. Aliqui diuersa dixerunt, vel singula in vasculis fictilibus picatis, atq; oblitis, claudi, vel argilla inuolui, vel solos pediculos creta adlini, vel in tabulis substrata palea disponi, & stramentis de superiorũ parte cooperiri. Mala rotunda, quæ orbiculata dicuntur, sine cura toto anno seruare se possunt. Aliqui in puteo vel cisterna mergũt vasa fictilia, quibus diligenter picatis & clausis mala committuntur. Alii ex arbore mala illa sumpserunt, & pediculis eorum picæ feruenti mer sis supra tabulatum per ordinem disponunt, nucum folijs subter expositis. Pleriq; scobem populi, vel abietis inter mala diffundunt. Constat mala sic ponenda vt pediculorum partes deorsum facias, neque ante, quàm vsui necessaria videantur esse, contingas. Præcipit verò Plinius, colligi mala post æquinoctium autumnale, neq; ante x v Lunã, neq; ante primam horam. Cadiua separati, stramentis, storeis, paleisve substerni. Rara componi, vt limites peruii spiritum æqualem accipiant. Amerina maxime durare, melimela minima. Aliqui mala in patinis fictilibus fluitantia, quo genere & vino odorem acquiri putant. Aliqui omnia hæc in milio seruare malunt. Plerique verò in scrobe duũ pedum altitudinis harena substrato, & fictili operculo, deim terra operto. Mala verò generosissima crustant gypso, vel cera, quæ nisi maturuerint incremento calicem rumpunt. Semper autem in pediculos collocat ea. Alii decerpunt cum furculis, eosq; in medullam sambuci abditos obruunt, vt supra scriptum est. Alii singulis malis, pirisq; singula vasa fictilia assignant, & opercula eorum picata, dolio iterum includunt. Nec non aliqui in floccis caplisq;, quas luto paleato illinunt. Alii hoc idem in patinis fictilibus, aliqui & in scrobe subiecta harena, ita sicca operiunt mox terra. Poma longo tempore dura-



seruabunt, si, vt Apuleius suadet, vegeta legantur. Sed obseruationem desiderant, vt manu decerpantur illæsa, & fucis, id est musco marino singula conuoluantur, sic vt vndiq; cooperiantur, interiecto quoq; eodem, ne sese vlla ex parte contingant: Sic patinis indito operculo clausa, tabulato frigore obuerso, quo neq; fumus, neq; teterrimus perueniat odor, collocentur. Si desit fucus, singulæ arculæ singulis pomis sunt assignandæ: nam vnâ clausa diuersa genera discordant, & celerius viciantur. Sunt qui cætera figulina singula crustent, quæ postquam occalluerit incolumia seruantur, foliis mucum subter expositis, quo substratu, & odori, & colori perquam belle consulitur. Melius cedit, si frondibus mucum non caducis singula conuoluantur. Custodiuntur in olla fictilicera interius inducæta. A putrilaginis labe vindicantur, hordei acervis obruta. Seruantur quoq; fidelis fictilibus non picatis, effracto fundo, & excluso spiritali. Sed ad id muneris integra & lecta manu, quæ non senserint vetustatem, deligantur: iis fidelis ad fauces vsque compleantur, & pyxantha, aut quouis alio spiracula vasis diligenter obturentur: sed hyemem totam in parentis surculo pensilia cohaereant: taliaq; inuenientur poma, qualia fuerant condita. Hoc experientia quadam accepisse idem attestatur Apuleius. Seruantur quoque singula ficulneis frondibus siccis inuoluta, si deinde luto, vel argilla candida linantur, & soli quoad crustam duret, credantur, tunc talia permagent, qualia concluduntur. Poma doliis musti merguntur, atque ita clausa perdurant, & à fæce seruata vini suauitatem supramodum commendant. Sed in ollam nouam immissa, & olla in dolum vini immersa, ita vt innatent, & dolum oblinatur, recentia erunt mala, & vinum odoratum. Porro seruanda poma canistris, vel vimineis cistis componuntur, & mundo tomento obruuntur. Hyberna poma seminibus, vt vuar, demerguntur. Non putrescunt poma, quorum cacumina virentis satyrii herba fuerint illita. Hæc Apuleius.

## De malo verna. CAP. XIII.

NOMINA vernæ malo attributa, tum quia multam apud etiam doctos viros pepererant difficultatē, tum etiam quia huic ab antiquis nonnulla erant peculiaria attributa, operæpretium duximus in hoc caput dirimere, vt nostra hæc quantulacunq; commentaria dilucidiora sint, minusq; fuscedinis lectorum animis ingerant. Præterea inter cætera malorum genera nobilius genus existit, tantaq; eius nobilitas, vt in fenestris fictilibus vasculis, & ædium hortis sæpius plantetur, asserueturq;: cum ab infantia fructificet, pomaq; multo sua arbore, quod vix credi possit, maiora producat, præcoci partu cæteras antecellit, dupliciq; partu fecundatur. Tantis dotibus iure existimanda, aliisque separanda venit nostro Pomario.

Theophrasto *μυρία* *ἱερὴ* dicitur, id est malus verna, quod adulto vere maturascit, & *διφοῦρα* etiam, id est bifera, nec vlli malo decentius id nomen conuenit, quàm huic: nam suum fructum tam cito perficit, & maturat, vt iterum

Nomen.



se flore induat, ac fœtificet, ni hyemis rigiditate prohibeatur, & præsertim autumnante temperie, vt Neapoli quotannis ferè videtur. Varro in agro Cosentino biferam esse malum tradidit. Plinius in malis biferas esse etiam scripsit, & in pyris, quod ex Theophrasto desumpsit. Dioscorides *μαλίμλα* vocat, id est melimela, nomine composito ex *μέλι*, id est mel, & *μήλον*, id est malum; quasi mellitum malū dicat, quod mellea dulcedine scateat: & *γλυκύμλα*, id est dulcia mala. Caro hæc mala mustea vocavit. Plinius mustea diſta refert à celeritate mitescēdi, quæ nunc melimela dicuntur sapore melleo. Varro ait. Ea, quæ mustea dicebātur, nunc melimela. Vnde genus illud cotonei præcox, musteū nominari diximus. Macrobius etiā mustea dixit. Columella melimela. Martialis: 10

*Infanti melimela dato, fatuasq; mariscas.*

Sunt etiam, qui hæc pomi genera à Virgil. mitia dici dixerint,

*Sunt nobis mitia poma.*

Sed ne putes obsecro mala, quæ nunc melimela diximus, eadem esse cum melimelis Atheniensium, nam (Anatolio authore) ea mala erant, quæ malo cotoneo insito proueniebant. Inquit enim ipse. Malum inseritur in cotoneum, fiuntq; ex cotoneis mala pulcherrima, vocata ab Atheniēsisibus melimela, quod etiam superius admonuimus. Brasauola mala vulgò *Rosa* dicta melimela esse dixit Dioscoridis. Alij verò nostra vulgaria *Melapia*, quorū opinionibus, non solum quæ superius retulimus, sed etiam huiusmodi mali vires aduersantur. 20  
Dioscorides enim de huius facultate dicit, Ventrem emolliunt, ab eo animalia expellunt, stomacho negotium exhibent, æstuationem faciunt. Præterea ex Auicennæ doctrina, & Serapionis libro de simplicibus, Mala dulcia odorata cordi conferunt, mala acida non cor, sed stomachum iuuant, sitim arcant, bilis vomitum reprimunt, ventrem constringunt. Videmus enim, quæ nunc dicimus melimela ventrem emollire, ac stomacho negotium exhibere, & æstuationem facere. Vulgaria nostra melapia cordi conferre, &, vt vidimus, ægris innoxie præberi. Sunt qui vulgò *Melanane*, ab arborum exiguitate, quibus producuntur, dicant. Neapolitani *Mela acquatole*, ab aqueo humore, quo abundant, nominant. 30

*Empta.*

Theophrastus, verna mala imbecilla esse, & inter ea, quæ dulcia. Ex quibus verbis clarè perspici potest, alia esse mala, quæ sint acida. Apud nos verna mala & acida, & dulcia sunt.

*Descriptio.*

Theophrastus ex annotinis, & nouellis surculis fructificare retulit, quod nulli, exceptis vite & ficu, nisi biferis malis concessit. Brevis est vitæ, facile interit. Cuius ratio est; Quod enim debile est, ex multis commoueri facile potest, & si super debilitatem fertilissima quoque natura sit arbor, vt malus verna, magis quoque ita fiat necesse est, quippe cum vtraque ratione noxa oriatur principiis. Videtur enim rationi consonum, vt quod imbecille, absq; robore sit: vnde quæ vix sibi, multo minus fœtui sufficit: euenit enim ob sui imbecillitatē & pauperiem diuturni pensu solutione, cum nō habeat, quod promatur è 40



tur è penu, vt exhausta fatiscat. Ex quo Plinius. Infirmissima verò malus, maximè quæ dulcis est, Nos ita describemus. Arbor pumila est, nec cæterarum magnitudinem attingit. Mala magnitudine media. Colore cum maturuerint luteo. Callo corporis tam fragili teneroque, vt quæ ex arbore ventorum impetu derubentur, in partes dissiliant. Præpollenti odore. Sapore gratissimo, mellea dulcedine, mandendo ore in frusta liquecunt. Præcoci partu. Cæterorum pomorum ferè fugacissima, & ni tam fugacia essent, cum omnibus de principatu certarent. Acidorum plura sunt genera: Vnum nos vulgò *Melogaetanello* dicimus, quod Caieta nobis olim exportaretur. Hæc parua sunt, acidulo sapore grata, compressa, tenera, colore herbaceo, ac multum mulierum malaciis experita. Sunt & quæ vulgò *Mela grecole*, & *Mela grasse* dicuntur, cognatione acidi saporis inter se maxima. Est genus alterum, quod quia circa festum Diui Ioannis maturescit, vulgus *Melo di San Giouanni* dicitur, tenerum, rubicundum, sapore dulci leniter acescente, adiuuandum ægrotorum appetentiam, & prægnantibus apponuntur.

Tepido cælo latantur, vel calido, ideo permultæ arbores in Apulia, & Sicilia. Cælum.

Solo lato, cultoque gaudent, nec vsquam agrestia reperiuntur, vel locis incultis. Vitibus innocens, ideo inter vineas seritur. Solum.

20 Seritur semine, eademque poma restituit. Seritur & plantis, plantandi que tempus Theophrastus statuit, Vnum tempus malis vernis, quippe quæ cum gracilentia, lignosaque sint, & sicca natura consistent, hyemem ob debilitatem sufferre non valent. Nascitur & propagine. Nam propagata, breui temporis curriculo radices proiicit. Nascitur & surculo, vel cacumine, vt Theophrastus scripsit. Surrentino tractu in vineis, vbi vites propagantur, simul cum vitibus huiusmodi mali cacumina deponuntur, & citò, & optimè radican- Satio.

Theophrastus ait: si arbor feruenti aqua rigetur, meliorescit: nam alimentum mouet, atque immutat, si diutius venit. Art.

30 Theophrastus, quæ dulcia sunt, celerius putrescunt, dixit. Etenim succus eorum mutationem facilius recipit, quoniam imbecillior est. Hinc mali dulces, magis quam acida putrescunt, & omnium maximè vernæ, succi imbecillitate, atque torius naturæ. Morbi & remedia.

Plinius melimela minime durare scripsit. Cõditura.

### De pyro. CAP. XIII.

Nunc pyri historiam prosequi poscit ordo. Columella ex pyri floribus apes mel colligere scripsit, & si Varro ex syluestri pyro scripserit prius. Palladius idem ex pyro. Narrat Athenæus pyra in conuiuiis solita deferri in aqua, vt quisque sumeret matura: scilicet quæ magis narent, ex Alexi in Breutia. Macrobius adducit Veranium dicentem pyrum inter arbores felices esse.

40 Græci pyrum pomum *ἄπριον* vocat. Ister in rebus Argolicis narrat Polopon- Nomen.



mesum Apiam vocatam fuisse (ex Athenæo) quod ibi planta huiusmodi plurima reperiretur: in qua sententia etiam Stephanus est. Theocriti tamen interpretes pyra à Poloponneso nomen accepisse putat, quod in ea plurimum hic fructus apparuerit. Latinis arbor pyrus dicitur, pomum verò pyrum, dictumque volunt, quod ad pyramidis modum, ut plurimum elatum in aciem tendat, flammæ similitudinem reddens. Italis *pero*.

**Descriptio.** Descriptionem toto volumine sparsam è Theophrasto adducere libuit. Arbor simplici confurgit caudice, & si ab imis plantigera sit, cæteris abscissis simplex redditur. Plurimis ramis brachiata. Cortex ex humore, carne, & nervo constituitur. Folio circinato. Flore foliato. Turbinata fructus figura. A quo so-  
succo præditus. Autumno reddens fructum, præter præcocia. Seminibus tunica contentis, principiumque; annexus proprium habere videtur. Fructificat ex  
annorinis surculis. Latere, & cacumine germinat. Incremento velox. Prolixa radice, ut non solum è proximo, sed longinquo proliferet. Plinius hæc quæ ex  
Theophrasto accepit, refert: Folia pyro circinata, plura ex eodem pediculo  
exuntia. Elateribus ramorum, & cacumine fert. Naturæ ordine urbanarum  
paulò post malum pyrus floret, ut simul videri possit. reddit semen, præter  
quàm hyberna, aut præcocia, autumno. Turbinatior pyris figura, in iis serotina  
ad hyemem usque ad matrem pendet, gelu maturescens. Pyro propriet-  
as vini, vinoso enim succo præditum est. In hyberno pyro est pomum aspi-  
ci in matre prius decidentibus foliis, velox est, & cito occidit.

**Genera.** Nunc ad genera transeamus, sunt etenim, ut malorum, & quæ multiplicia. Sed quæ fuerint antiquorum nomenclationes pyrorum, quæque nostrorum temporum illis respondeant, ut pristinum nomen illis restitui possit, conabimur etiam, ut in malo aliqua coniectare. Nos primum, ut par est, pyra in sativa & sylvestria diuidemus, nunc de sativis, alibi de sylvestribus dicturi; sativa idem à temporibus diuidemus, verna scilicet, æstiva, & hyberna: & de vernis primum, nam Theophrastus pyra & præcocia, & serotina esse dixit: & quædam pyrorum genera bifera esse posse, sed locis hybernis, humidisque, ubi flatus commodi non desint, & cum tempus se longius protrahit, & priores fructus decerpantur. Vnde Plinius, In malis, & pyris quædam bifera sunt, & præcoces. Sed Neapoli genus est pyri, quod vulgus, *Pero due volte l'anno*, vocat, quod bis anno affert, immò semper fructu, & flore oneratum conspicitur. hæc genera ab antiquis mustea vocabantur. De præcocibus pyris hæc habet Plinius. Eadem causa taxatur in pyris superbiæ cognomine, parva hæc, sed ocys-  
sima. Hæc Neapoli *Perabiancolelle* dicuntur, quia alba & parva sunt, & ocys-  
sime cadunt, si diutius in arbore manserint, farinæ modo mandendo friantur, nil boni, nisi quod præcocia sint, habent, ut sola verè temporis prioritate superbiant. Cato, quia præcocia sunt, videtur mustea vocasse. Macrobius præcocia dixit. Manardus superba antiquorum pyra illa esse ait, quæ nostrates *Peramoscarelle* vocant, sed repugnat; quia ocyslima non sunt, nec tam insignem  
odoris



odoris notā maiores nostri præterissent, sed quæ ea fuerint, melius fortasse videbimus. Succedūt iis, quæ diximus, nostro tēpore vulgo dicta *Pera moscarelle*. Hæc tam parua sunt, vt baccas corporis tuberculo non excedant, quina, sena, pluravē vno pediculo exeuntia, saccharo condiuntur, vt in sequentem annum afferuantur, moschi dicti odoratissima iucunditate fragrant, dixerim à Plinio myrapia dici, quasi vnguentum redolentia: *μύρον* enim Græcis vnguentum est, & persæpe moschi odorem vnguentum dicunt. Sed apud Macrobiū marapia legitur, non myrapia. Cohærent his germanitate odoris quadam, & saporis, genera vulgò dicta *Pera moscarelloni*, sed magnitudine longe superant, & tardius maturantur. Plinius Dolobelliana vocat longissimi pediculi. Genus pyri, quod omnium pediculum longissimum habet, simul & subtilissimum est illud, ob sui præstantiam regale nomen adeptum, inter sui temporis pyra (nam Iunio maturatur) facile sceptrum gestat. Plinius item à colore purpurea vocat. Hic pauca adeo, multisq; aliis pyris communia dixit, vt solo eius testimonio, quæ purpurea fuerint coniectare nō possimus, verū si vnā vulgare Neapolitanū nomen cōsulamus, clarè quæ *Pera cremesine* dicimus, antiquorum purpurea pyra esse cognoscemus, nomenq; ab eis deductum, vsq; ad hæc nostra tempora seruatū censendum esse existimamus. tenetudine, sapore, & forma à supradictis parum recedunt, speciosissimaq; ob eorum colorem: luno etiam maturantur. Idemque putamus esse Macrobij rubile. Paulatim subeunt æstiuæ. Ait Plinius, Cunctis autē crustumina gratissima. Columella crustumina inter generosissima pyra ponit. Meminit etiam horum Macrobius: Virgilius item Georgicorum secundo,

— *Nec surculus idem*

*Crustumis.*

Seruij autoritate ex parte rubent, dicta que sunt crustumina ex Crustumio Tusciæ oppido, vbi optima, copiosaq; erant. Optima, copiosaq; etiam apud nos sunt, vulgò dicta *Pera giacciole di Roma*, nam Roma ad nos exportata primitus fuere, ibiq; è Tuscia, tenera sunt, succosa, dulcia, alba, ex parte rubentia. Sunt alia huiusmodi pyrorum species apud nos Puteolis è Germania allata, ob id vulgò dicta *Pera giacciole di Pozzuolo*, & *giacciole di Alemagna*, quæ etiam hordearia dici poterunt, cū eo tempore, quo metunt hordeum, appareant. Fauoniana rubra paulò superbis maiora Plinius dixit. Retinent adhuc genuinum nomen, nam *Pera rossolelle* dicimus, hæc enim paulò superbis maiora sunt, & rubicūdo colore perfusa. Quod nos *Pera inganna villano* dicimus, colore est foris nigro, vel si mauis fuliginoso, inter cætera præstātissimum est, & Augusto maturatur: existimarem esse illud, quod Syria donat, à Plinio descriptum. Inquit ipse. In iis alia colore nigro donant Syriæ. Columella Tarentina, eadem quæ Syria dici ait: quod à M. Catone, qui in sapa condi posse scripsit, desumpsit. Macrobius Tarentinum etiam Syrium dici narrat. Huius etiam meminit Virgilius,



*Crustumis, Syriisq; pyris.*

Apud nos sunt plura horum pyrorum genera, quod etiam Plinius non retinuit, nam alia, dixit, colore nigro donant Syriæ, veluti sunt *Pera caranelle*, omnium huiusmodi rubiginoso colore infectiorum optima. Item *Pera brutto buono*, aliud *Pera maluestito*, & *Pera pozzelle*. Proxima iis falerna à potu, inquit Plinius, quoniam tanta vis succi abundat: lactea hæc vocatur. Neapolim è Samnio afferuntur, ibiq; *Pera pane & vino* dicuntur vulgò: quia cum esitantur, edere ac bibere putatur. Sapore & succo sunt præstantissima, forma turbinata, acerba virescunt, matura albescunt. Pyra, quæ Plinius à collo coroliana vocitari dixit, nos putamus *ἀπὸ τῆς νεαπολίν*, quali lunatus, vel inflexus, ut boum cornu, dici, unde quæ Neapolitani *pera coscia di donna* dicunt, Plinij coroliana esse, nam & pediculus carne obductus est, & inflexus ut boum cornu, venter ut viatorum vascula, hæc vili habentur pretio, nam insipida sunt: per hordeum maturantur. Cato cucurbitina pyra nominavit, & in sapa condi posse dixit: itemque Macrobius. Plinius rationem nominis reddit, Bruta gentilitatis cucurbitina, acidula succi. Neapoli vulgò *pera cocozzaro*, cucurbitam enim *cocozza* vulgus vocitat, in figuram efformatum vasculi viatorum, colore viridia, tactu duriuscula, maturantur Augusto. Maturantur item Augusto duo pyrorum genera, quorum vnum legitimum, alterum spurium vocamus, nullis iam dictis inferiora, magnitudine, teneritate, succo, & sapore: legitimum *pera paccone* vocamus, spurium verè *pera paccone bastardo*, quod parum ab eo sapore degeneret & magnitudine. Coniicerem ego Plinij Decimianum, & Pseudodecimianum. Inquit enim, Sed confessis vrbis vocabulis, authores suos nobilitauere Decimiana, & ex eo tractum, quod Pseudodecimianum vocant. Macrobius Decimianum dicit. Cato pyra volema nominavit: ex quo Virgilius,

*Crustumis, Syriisq; pyris, grauiusq; volemis.*

Columella iridem. Plinius volema. Macrobius volemium dixit. Seruius volemis, id est magnis, dixit, nam & volema ab eo, quod volam impleant dicta sunt, vola enim palmarum medietas est, dicerem esse posse, quæ nos *pera pignatelle* dicimus, hæc optima sunt, nec ad libræ solum, sed etiam ad duarum librarum pondus ascendunt. Quæ verò Samnites *pera capaci* vocant, etiam ad trium librarum sæpe pondus ascendunt, hæc Augusto maturantur, albo, & croceo colore colorantur, coctum præstat, & ad hyemem seruatur. Maturantur etiam Augusto *pera rossolelle* dicta, alia à iam dictis praecocius, asseruanturque diutius: putarim Plinij venerea. Inquit enim, Incerta nominis causa est barbaricis, venericisque, quæ colorata dicuntur.

Subeunt hyberna, siue sementina. Cato mustea, & sementina dixit, ac sementina conditiua esse, dictaq; esse, quod sementis tempore maturentur, scilicet autumnus. Plinius ab odore pyra laurea esse dixit, ferotina esse, & ad hyemem usq; ad matrem pendent, gelu maturescunt. Pristinum adhuc retinent nomen, nam vulgò *pera laure* dicunt, cum enim vorantur, fauces lauri odore replent,



plent, & serotina sunt. Laurei etiā pyri meminit Macrobius. Incerta nominum causa regis, quæ minimo pediculo sessilia, Plinius dixit. Columella regia vocavit. hæc pyra alia esse non possunt, nisi quæ vulgò *bergamotte* dicimus à Bergamo Italix oppido, quod sua peregrinatione insigniuit. Colore sunt herbido, nec vt foris dotem referant, minimo omnium pediculo, & compressæ rotunditatis, vt sessilis videatur, serotina sunt, & facile ob sui præstantiam apud antiquos regium nomē adipisci potuerunt: mira sunt teneritudine, aquosa dulcedine, sapore egregio. Ab eorum etiam dote Imperialia nunc dicimus, quæ ampla, & grato succo, & singulari cōmendatione. Anitiana, Plinius ait, post autumnalia, acidulo sapore iucunda. Cato aniciana, per e, scribit. Macrobius antiana. Varro ex Catone in sapa cōdita manere pyra antiana. Columella anitiana legit. hæc nō nisi *pera sarriole* vulgò dicta esse possunt, nam sementina post autumnalia sunt, & acidulo sapore iucunda, ob id agris præbētur innocuē. Patriæ nomen habent Græca, serotina ad hyemem vsq; ad matrem pendent, gelu maturescētia inquit Plinius. Macrobius græculū vocat. Id genus puto Neapoli dictum *pero buon Christiano*. Inter cætera nostræ Campaniæ præstantissimum, suauitate eximia, magnitudine, & teneritate tāta, vt gustatu vel ipso ore liquefcet, perennat, gestatumq; tolerat, hyeme crudum, coctumq; mandimus, utiq; elui per optimum, agris innoxie præbetur, omnium postremū, nec prius, quā  
 10 hyemem experiatur, edomita acerbitate mitescit, Neapolim delatum à Carolo octauo hic res gerente, à nostra felici Campania his dotibus adoptatū. Calculosi pyri meminit Macrobius. Huius Neapoli multæ sunt species. ab huius generis vitio, quod calculis prædita sint, denominatæ. Sed hæc dixisse satis sit, ne charta, vel dies potius, quā genera deficient. Sunt etiam apud Plinium alia pyrorum genera, pomponiana cognomine, mammosa, ciceriana, seueriana, & quæ ex iis nata sunt tyrcanniana longitudine pediculi distantia, lateriana, tiberiana, quæ maximè Tiberio principi placuere. Colorantur magis Sole, grandescuntque, alioquin eadem essent, quæ Liceriana. Patriæ nomina habent, ferissima omnium amerina, picentina, numantina, alexandrina, numidiana, & in  
 30 iis amerina, signina, quæ alij à colore testacea appellant, sicut onychina. Ab odore nardina, & patricia, voconia, viridia, oblongaque. Item Columella signina, neuiana, vulsa. Item Macrobius citrium, ceruifca, lollianum, lanuuium, laterasianū, milesum, myrteum, nauianum, orbiculatum, præcianum, signinum, tullianum, ticianum, turriuanum, timosum, mespilium serum, sementinum serum, sextilianum serum, tatentinum serum, valerianum serum: quæ omnia, quia alias notas non addiderunt, penitus ignoramus.

Theophrastus pyrū syluestrē in feruidis male se habere dixit, vt in Ægypto, *Calum.* ubi etiā mites pyri nihilo melius germinant ob calorem inhospitalē. Ex Quintiliis verò habetur, Pyrorum genus in frigidis & humidis locis. Ex Diophane,  
 40 Pyrum in frigidis, aquosis, & vberibus locis gaudere habetur. Palladius in frigido, & repido loco provenire scripsit, sed irriguo, & florem plurimum profer-



re, & magnitudinem pomi turgentis acquirere. Plinius. Subit & in montosa pyrus. Athenæus, ex Hermippi sententia, in Euboicis optimæ pyra nasci tradidit. Sed animaduersione dignum est, cum de cælo, & solo pomiferis arboribus conuenientibus loquimur, de iis intelligendum esse, quæ syluestribus sui generis arboribus inseruntur, non alieni: nam si super alias diuersi generis arbores inseremus, velut coroneo, sorbo, & oxyacantha, solū cælumq; illis tribuendū esse censeo, quæ inferiori trunco cōueniunt, non autē, quæ superiori.

*Solum.*

Palladius scribit, Pyra nasci tali solo maximè diligunt, quale vineris conuenit, sed lato solo & validas arbores, & fructus plurimos consequi. His annexendum esse iudicāre, vt profundum sit solum, cū validas arbor in profundum radices agat.

*Latius.*

Theophrastus omnino semine satum pyrum degenerare ait, & non nisi vitiatum pyrastrum nasci. Palladius autem, Si quis semen pyrorum aspergit, nasci quidem necesse est, originem suam refouente natura, cuius æternitati nulla tarditas potest asferre fastidium, sed homini expectare longinquū est, cū & serō veniant, & de generis nobilitate decedant. Cato autem pyrorum seminata ex seminibus facere docet, quemadmodū in Cupresso retulimus. Ex quo Plinius excipiens, illud idem docuit. Viuiradicibus serere docet Palladius. Plantas pyrorū mense Februario locis frigidis ponemus, calidis verò Nouembri: sed mense Nouembri pyra locis tepidis cōserenda sunt. Sed pyrum plantis ferere propè tardus est euentus: tamen quibus hoc placuit, vt semina generosa nihil sibi de agresti asperitate permisceant, plantas bimas, aut trimas eo more, quod oleæ ponuntur, radicatae magnis scrobibus ponant, supra terrā tribus altis, vel quatuor pedibus, quarū decisa cacumina, argilla mista muscus debet operire. Melius ergo hoc mense Nouembri fiet, vt pyrorū plantas radicatae seramus agrestiu, subactis bene scrobibus, vt cum prehenderint inserantur. Hoc autē interest, quod quæ plantis suis seruntur, dulcedinē ac teneritatem seruāt, diu tamen seruata nō durant, insita verò moram temporis sustinebunt. Spatia inter pyros triginta pedū mensura discernat. Theophrastus pyrū vere ponendum arbitratur, cū autumno seri arboris natura nō ferat, quoniam lignosorum natura à germinandi facilitate abest, estq; cum earū siccitate imbecillitas aduersus hyemes, præterea lauros nō plus quàm nouenos pedes præcipit distantes serere, malos distantiores paulò, pyros amplius. Quintilij. Si verò viuiradices plantaturus es, sint hæ ipsæ triennes, aut nō minores duorū annorum. Sed pro diuersa earū natura, Diophanes ait, variā serendi rationē postulare. Etenim longorū, vel rotundorum generū arbores, quæ suos in matre partus maturāt, aliquanto celerius, ad mediū vsq; ver feri volunt, locis ad ortū solis, vel septentrionē spectantibus. Verum radicatae plantulae, nō iuniores binis deponuntur. Terra autē iniiciatur simul stercore admixto. Porro longè melius plantas syluestriū pyrorū radicatae serimus, subactis bene scrobibus, vt dum cōprehenderint, inserantur. Columella ait: pyros autumno ante brumā serito, ita vt minime



nime dies quinque, & viginti ad brumam supersint. Plinius non eodem tempore pyra omnia feri iubet, quoniam non æque florent. Eadem oblonga, aut rotunda ab occasu Vergiliarum ad Brumam. Reliqua genera media hyeme ab occasu sagittæ, Subsolanum, aut Septentrionem spectantia. Communis quidem Italiae ratio tempora ad hunc modum distribuit: Pyro autumnum, ita ut brumam x. v. nec minus diebus antecedit. Seritur etiam pyrus radicariis plantis ex radicibus auulsis, ex Quintiliorum placitis, quod Diophanes confirmat. Ex ramis Theophrastus raro nasci posse scripsit. Quintilius, Ex superna arborum parte ramos generosissimos acceptos plantant, neque successu frustra sperato. Columella idem sentire videtur, nasci posse ex cacuminibus, atque depacta ubi adoleuerint, post biennium inseri, aut transferri si generosa fuerint, ut diximus in malo. Quintilius, Quidam etiam trunci generosissimas partes scytalas faciunt, easque plantant: quemadmodum à scytalis oleas.

Theophrastus ait, quia plagis infirmatur, ideo minus recidenda pyrus, ut *Cultus.* supra in malo retulimus.

Inseri autem præcipit Cato pyra per ver, luna silenti, post meridiem, sine *Insitio.* vento austro, & post solstitium, diebus quinquaginta post vindemiam. Quod Plinius ex eo retulit. Virgilius orno inseri posse scripsit.

Ornusque incanuit albo

*Flore pyri.*

Palladius verò ita monet, Mense Februatio, & Martio pyrus inseritur more, quo dictum est, cum de insitione loqueremur sub cortice, & in trunco. Inseritur autem pyro agresti, malo, ut nonnulli, amygdalo, & spino, ut Virgilius orno, & fraxino, cydonio ut aliqui, & punico, sed fisso ligno. Surculus pyri, qui inseritur ante solstitium, anniculus esse debet, & prius quam figatur, foliis, & omni tenera parte priuari, post solstitium verò cum figis, qui summum germen inclusit. Pyrus omni genere inseritur. Iulio mense emplastratione insita pyrus Palladio explorante processit. Recipit citreum, mespilum, & tuberos. Qui ad Pasiphilum sic scribit carmine,

*Germine cana pyrus, niveos haud inuida flores*

*Commodat, & varium nectit amore nemus.*

*Nunc rapit hirsutis horrenda sororibus arma,*

*Et docet indomitas ponere tela pyros.*

*Nunc teretem pingui producit acumine malum,*

*Fraxineasque novo flectit honore manus.*

*Phyllida quin etiam grandi mitescere fructu,*

*Instituens, dura dat sua membra cuti.*

*Et steriles spinos, & inertem foetibus ornum*

*Dotat, & ignotum cogit amare decus.*

*Huius & immissi vertere cydonia rami,*

*Pomaque confusus blanda creavit odor.*



*Castanea septos aspro velamine factus*

*Exiit, & placido pondere mutat onus.*

*Mespilāq; exarmat pugnacibus horrida membris,*

*Et mala tranquillo cortice fota premit.*

*Creditur in Libycis sua germina nectere ramis,*

*Letaq; puniceo posse decore frui.*

Ait Plinius. Pyrum vel florentem inferere licet, & in Maium quoq; mensem protendere insitionem. Ait M. Varro, Pyrum non recipit quercus, neq; enim si malus pyrum. Hæc sequuntur multi, qui aruspices audiunt multum, à quibus proditum in singulis arboribus quot genera insita sunt, vno ictu tot fulmina fieri illud, quod fulmen concepit. Si in pyrum syluaticam inseueris pyrum quamuis bonam, non fore pyrum tam iucundum, quàm si in eam, quæ syluestris nō sit. Sed quercus bona pyra ferre Plutarchus est author. Ex Quintiliorum placitis, Cassianus animaduersione dignum esse iubet, ne malorum, pyrorumq; surculi, qui ad insitionem cautè, & diligenter accipi debent, acutissima falce deputentur: sunt enim hæ arbores valde tenui cortice præditæ, quapropter aliqui ipsos manibus potius auferunt, quàm falce resecant. Pyrus (vt ait Tarentinus) inseritur in punicam, in malum cydoniam, in amygdalum, in terebinthum, & in morum. Insita autem in morum, pyra rubicunda producit. Diophanes myrapia commode infoliarī in mala, quod ipse experientia manifesta condidit. Nos autem myrapia, quæ diximus, in cotoneam insita maiora, quæ vnquam ex arbore pependerit, odoratiora, coloratioraq; produxisse vidimus. Alii pyrum in salicem inseri posse scribunt, sed salix humido loco sata sit oportet, optime autem inter lignum & corticem, tardissime omnium affert: inserendamq; esse vltimis deficientis Lunæ diebus.

*Morbi & remedia.*

Theophrastus ait, in pyris præuenire solet lapsus maturitatem, vel debilitate appendiculorum, nam cum mole grandiuscula constent, facile sentit pediculus incōmoda distentionis ex pondere: vel vrgentur interdū copia flatuum, grauātur etiam humore, humiditatem verò esse causam lapsionis pomorum docet, humefacto Austris aëre, atq; nubilo, tum flores cadere, tum etiam priores fructus, qui statim flores subsequuti sunt. Ex quo Plinius, Si cum defloruere pyri protinus sequantur imbres, in totū poma depereunt, etiam si omnino nubilum fiat, austrinūve flatus, amittūt fœtus. Et alibi. Perdunt facillimè ante maturitatem fructus pyri, etiam si non pluat, & fiat austrinū cælum, aut nubilum, amittunt flores, & primos fructus, si cum defloruere tales dies fuerint. Tradit Palladius crebris fœssionibus, ac frequenti humore proficere, vt nulla floris iactura fiat. Multum quoq; prodesse, si interiecto anno quale libet adiungatur latamen, sed bubulum spissa & graua poma creare fertur. Aliqui cinerem miscent, existimantes argutiores pomis contrahi sapes.

Theophrastus vermiculationem etiam sentire pyra prodidit, eoque morbo celeriter interire. Ex quo Plinius. Maxime autem arborum vermiculantur pyri,



pyri, poma etiam ipsa per se quibusdam annis vermiculationem sentiunt. Diophanes à vermibus liberari promittit, si radices dum plantantur bubulo felle linantur. Palladius, Vermes enari necantur, & nasci quoq; prohibentur, radicibus felle taurino frequenter infusis.

Theophrastus item, Si pyrus frondibus, & germine luxuriabit, foramini facto quernum palum adigunt, terraq; occultant. Quod punire nonnulli vocant. Ex quo Plinius, Pyri, quæ germinant, nec fructum ferunt, fissâ radice è teda cuneo adacto, & cinere, ac terra cooperto. Diophanes, Vt pyrus ferax, & dulcis sit, iuxta radices truncus findatur, fissuræ cuneos ex quercu, vel fago  
 10 adiges, atque ita obrues. Vel circa eam facie vini veteris radicibus affusa, rigandoque ad quindecim dies, postea verò obrues. Quod si non ægroret, affusa tamen facie, dulcior euadet. Columella eadem docet, Vt pyrus ferax sit, cum adoleuerit, altè eam ablaqueato, & iuxta ipsam radicem truncum findito, & fissuram cuneo teda pineæ adigito, & ibi relinquito, deinde absumpta ablaqueatione, cinerem supra terram iniicito. Palladius verò, Si languida est arbor pyri: vel ablaqueata radicem terebras, & ibi ligneum palum deprimis: vel in trunco similiter terebrato ex teda cuneum figis: vel si hoc desit, ex quercu. Item facies vini veteris recentes si radicibus affundantur per triduum, diutius arbores in floribus laborare non faciunt.

10 Præterea. Si lapidosa pyrus est, ab extremis radicibus terram priorem leuabis, & secernes omnes lapillos, quibus diligenter remotis, alteram terram cribro cretam in loco eius infundis, sed hoc proderit, si rigare non cessas. Lapidosiq; generis pyra vitium mutare creduntur, si terris mollibus conserantur. Quintilii verò ab extremis radicibus terram leuant, & omnes secernunt lapillos, quibus diligenter summotis nouam terram cribro cretam in alterius locum suffundunt. Sed frequens rigatio calculosæ pyro præsentis est remedio. Sed mirum tradit Plinius, quod animalium depastio, quæ arboribus pernicio-  
 20 sa, pyro utilis sit apud Chios, quam vocant Phocida. Theophrastus caudicis fissionem tolerare posse scribit, quia facillimè coit.

30 Pyra alia sunt conditiua, alia minime. Conditiua, vt volema, anitiana, & sementina Cato iubet condi. In sapa verò tarentina, mustea, & cucurbitina. Sed M. Varro ex eo aliter sentit. Nam pyra antiana, & sementina in sapa condita manere. Plinius ex utroque Tarentina scriissime legi, anitiana seruari & in passo.

Varro item pyra dissecta, & in sole macerata per se vbicunque sint posita, facile durare. Columella siccandi modum docet, Augusto pyra dulcissimi saporis mediotriter matura eliguntur, & in duas, vel tres partes arundine, vel osseo cultello diuisa in sole ponuntur, donec arecant. Palladius, Pyra diuisa, & purgata granis in sole siccantur. Plinius condi pyra, vt mala dixit, & vuz, ac  
 40 totidem modis.

Ex Palladii doctrina, Pyra, quæ huic negotio destinantur, à cadiuis dili-



genter electa integra debent esse, placido die, decrefcente Luna, à vigesima secunda vsq; in octauam manu decerpta, vegeto solis calore ab hora secunda in quintam, vel à septima in decimam, dura tunc, & aliquanto viridia, picato vase claudantur, quod tegatur operculo, & inclinato deorsum ore breui obruatur scrobe, loco iuxta quem perennis aqua defluit. Item, quæ dura sunt in carne & cute, in aceruo posita, vbi se mollire cœperunt, in fictile picatum ponuntur, & operculo superueniente gypso linuntur, vas breui scrobe demergitur, loco, qui quotidie sole tangatur. Alii statim lecta cum tenacibus suis picatis vrceis condiderunt, & oribus vasculorum gypso vel pice clausis, ipsa sub diuo obruta sabulone texerunt. Plurimi pyra obruta inter paleas, aut frumenta seruarunt. Alii pyra, quæ non se contingerent, in melle seruarunt. Aliqui aquam salsam, cum cœperit vndare calefacta, despumant, & ei post iam frigide pyra seruanda demergunt: tunc exempta post tempus exiguum condunt vrceo, & eius lito ore conseruant. Vel nocte, & die in frigida salsa manere patiuntur, post in aqua pura biduo macerant, deinde in sapa, vel passo, vel dulci vino mersa custodiunt. Seruari pyra Democritus affirmat, quæ illitis pice surculis suspendantur. alii in sapa, vel passo, vel dulci vino, vel musto mersa custodiunt vasis plenis. Plurimi inter scobem obruta seruarunt. Alii siccatis frondibus iuglandis inuoluta recondunt. Alii in vrceo fictili nouo in vino, vel musto demergunt, parum salis habenti, & operculato vase reponunt. Alii vinaceis discreta, ne se contingant, obruunt. Apud nos funiculis laquearibus appensa, vsque ferè ad aliorum prouentum seruant, & præsertim quæ *bergamotte*, & *buon christiane* vocamus, quod etiam antiquitus fieri docet Martialis ad Mancinum.

*Non pyra, quæ lenta pendent religata genista.*

#### De sorbo. C A P. X V.

**S**EQVITVR sorbus, cuius fructus malorum, pomorumq; generi iure venit annumerandus. Et si suus locus in syluis sit, tamen ob gratiam, quam apud omnes eius fructus adeptus est, in nostrum pomarium transtulimus. Inter felices arbores connumeratur à Verannio, Macrobio referente. Astringentem eius naturam Martialis innuit,

*Sorba sumus molles nimium durantia ventres,*

*Æpius hæc puero, quam tibi poma dabis.*

Nomen.

Sorbus arbor Græcis ὄνη, & ὄνη, fructus verò ὄνα, ὄνα. Ita & apud Latinos arbor sorbus dicitur, fructus verò sorbum: vel quia ore absorbeantur, vel quia diu seruentur. Itali arborem *sorbo* dicunt, fructus *sorbole*.

Descriptio.

Theophrastus sorbi arborem accuratissimè describit, tanquam incognitam sibi, & aduenam. Sorbus arbor de grandibus & subrectis est, coma concinna, & nisi quid impediatur, verticem nucis pineæ repræsentans. Aculeos non habet vt mespilus. Nouella cortice læui, pinguiusculo, flauente candido, an-



mosa scabro, atroque. Folia pediculo singulari, prolixo, nervaceo, conditam  
 versus, alæ modo à lateribus emicantia, tanquam ex omnibus vnum fiant, la-  
 ciniis pennatim ad nervum vsque diductis, ampliusculo diuisis intervallo, o-  
 mnibus ramulis in extremo pediculi folium prominet, cuius accessione im-  
 par numerus efficitur, sunt in vetustioribus, breuioribusq; pauciora: figura iis  
 lauri tenuifoliae, præterquam quòd serrata per ambitum breuioraq; sunt, neq;  
 cacuminibus mucronatis, sed in rotunditatem retusis: atq; hæc non paulatim,  
 vt cæteris, sed vniuersa collabuntur. Flos racematim coactus ex pluribus can-  
 didis ac minutis, petiolo vnico dependet. Fructus cum large proueniunt, vix  
 20 modo satietati, congestiq; visuntur, ex vno petiolo faui speciem præbentes, a-  
 cerbissimi. Noua admodum fructificat, etenim à trimatu fert. Autumno fo-  
 liis subinde amissis, cachrym suam fundit, eduraturam hyeme. Radicibus ne-  
 que multis, neque in altum defixis, validis alioqui, & crassis, auelliq; difficilli-  
 mis. Plinius ex eo, non ante trimatum ferre ex vilo genere scripsit. Ei vni-  
 uersa folia decidere: sorbæ inter se densa, quæ ramos circumdata ex omni par-  
 te vuarum modo degrauant.

Sylvatica sorbo præstantior quàm urbana fructus ait Theophrastus, quod Genera.  
 in hac, & in cornis præcipuum notauit. Suauius enim olent. Cuius rationem  
 in libro de causis assignauit: quia sicciores sunt, ea tamen siccitate, quæ non in  
 20 totum tollit humiditatem ad odorem conficiendum: syluestre nempe genus  
 siccius, ieiunius, feruentius, ac succo tenuius est, nec succum carni permixtum vr-  
 bani modo gerit. Præterea duo alia sorborum genera ab aliis tradit reperiri, for-  
 minam, quæ sola fructificat, & masculam sterilẽ. Aliud etiam discrimen in fru-  
 ctu, quòd alia figuram orbis, alia oui referunt. Item alie succo odoratiore dulcio-  
 req; vt quæ orbiculatos fructus ferunt: alia acido, peiusq; olente, vt quæ oua-  
 les. Plinius verò, Sorbis quadruplex differentia. Aliis eorum rotunditas mali, a-  
 liis turbinatio pyri, aliis ouata species, ceu malorum aliquibus. Hæc obnoxia a-  
 cori. Odore & suauitate rotunda præcellunt. Cæteris vini sapor. Generosissi-  
 ma quibus circa pediculos tenera folia. Quartum genus torminale appellant.  
 30 De quo nos alibi. Sed syluestre genus nos vocamus, quod in syluis absque ali-  
 quo cultu fructus optimos affert, de quo intellexit Theophrastus. Sed est ali-  
 ud genus, quod verius syluestre dici posset, nam arbor ab urbana nihil differt,  
 nisi fructu qui exiguus est, & vix oxyacanthæ baccas superat, colore ferrugi-  
 neo, & vtimur ad aucupia turdorum, cuius sunt auidissimæ. Masculæ caremus,  
 quia omnes fructificantes sunt. fortasse feruentibus locis ea Theophrasto visa  
 fuerit. Fœminam dicimus, quæ paruos, rotundosq; fructus affert, masculam  
 verò, quæ magnos, ac turbinatos. Sunt præterea discrimina multa, colore, sa-  
 pore, & magnitudine differentia, nam alia oui magnitudine, alia oleæ fructus  
 ferunt, alia lentiginosos, & inter hæc præcipua, quæ in arbore ad Ianuarium  
 40 vsque vegetos seruat.

Suapte natura frigidos tractus querere scribit Theophrastus: nam si ad lo- Calam.



ca feruentia venerit, sterilefcere. In montibus etiam nafci. Plinius sorba in frigidis, & humidis prouenire fcripfit, aquofis etiam montibus gaudere. Aristophanes (Athenæo auctore) ait,

*In montibus sunt sorba sponte plurima.*

Palladius amare loca humida, montana, & frigidis proxima.

*Solum.*

Theophrastus aliiolum, humectumq; solum concupiscere, quo tamen si uiuacior, aboleriq; contumacior, montibus etiam nafci dixit. Palladius solum pinguiſſimum, cuius indicium facit certiffimum, si frequens ubiq; nascatur.

*Ratio.*

Theophrastus semine nafci fcripfit. Plinius idem confirmat. Palladius, Mense Ianuario, Februario, & Martio locis frigidis. Calidis uero Octobri, & Nouembri sorba feruntur egregie, ita ut matura in seminario ipſo pomapangantur. Ipſeq; expertus est, arbores ex pomis sponte progenitas, & in crescendo, & in ferendo exitiſſe felices.

Tradidit etiam Theophrastus uiuira dice feri. Plinius ab eo, radice plantam feri fcripfit, ac post mediam hyemem inridus Februarias. Palladius, Plantas etiam si quis ponere uelit, habebit arbitrium, dummodo calidis locis mense Nouembri, temperatis Ianuario, uel Februario, frigidis Martio inclinante disponat. Planta est transferenda robustior, serobem desiderat altiore, & spatia longiora, ut (quod illi maxime prodest) à uentis frequentibus agitata grandescat.

Etiam auulſione nafci fcripfit Theophrastus. A quo Plinius. Cū perna sua auellitur, partemq; aliquam è matris corpore auferat ſecū ſimbriato corpore.

*Cultus.*

Veluti ſylueſtris arbor reſpuit omnem cultum, ſed ſiccitatibus ſi irrigetur, ac hyeme ſuffodiatur, maiores & ductiores dabit fructus, ſed non odoratiores, ut è Theophrasto colligitur. Formanda est arbor, ut à terra decem, uel duodecim pedibus eleuetur.

*Uſus.*

Plinius in calabrice inferi monet, ea est ſpina ſylueſtris. Pallad. Mense Aprili sorba inferi in ſe, in cydonio, in ſpina alba, uel trunco uel cortice. Idē in uerſibus.

*Sorba ſuos partus merito maioris honeſtant.*

*Seminis, & pulchro curua labore nitent.*

*Hæc arbor ſpina duros mucronibus artus.*

*Exiit, ac libris mitibus arma tegit.*

*Aureaq; annexo miſcere cydonia facta.*

*Gaudet, & externi dona coloris amat.*

Plinii calabrix Dioſcoridis oxyacantha est, ut alibi monuimus, retinet apud nos priſtinum nomen, optimeq; ſuper ea prouenit ſorbus, etiam malus, & optimos fructus præbet.

*Morbi & remedia.*

Ait Theophrastus, Ipſa arbor in ſenectate uermibus obnoxia ruſſis, hirsutis ſui generis, atq; ita emoritur. Fructus etiam ſuper arborem crudus adhuc magis, quàm meſpila, pyraq; quāuis hic maxime omnium ſit acerbiffimus. Plinius ex eo, Sorbus arbor infeſtatur uermiculis ruſſis, pilofis, atq; ita emoritur. Nos ex his ſæpe extraximus non ruſſos, neq; hirsutos, ſed ſicut cæteri. Palladius re-

medium



medium affert. Si vermes patitur infestos, qui in ea ruffi, & pilosi solēt medullę interna sectari, aliquos ex his sine iniuria arboris detractos vicino crememus incendio: Creduntur hoc genere, vel fugere, vel perire.

Plinius, Sorbis, quę generant, nec fructum ferunt, fissa radice inditur cuneus ē teda, ac cinere, & terra cooperitur, fertilesq; fiunt. Ex quo Palladius. Si vetō minus ferre cōperit, tedę cuneus eius radicibus inferatur, vel citcā partem vltimam fossa facta cumulo ingesti cineris adæquetur.

Theophrastus materię sorbi solidam, spissam, coloratam, & validam esse. Plinius lignum ossibus carere inquit. Apud nos ex ea optima vasa exponuntur, arceę, & balistarum manubria. Materies.

M. Varro de sorbis pensilibus promendis ait, Ipsa ostendunt, quando ad vsum oporteat promi, quōd colore mutato, & contractu acinorum, si non demiseris ad edendū, ad abiciendum descensura se minitantur. Sorbum marurum mite conditum, citius promi oportet: Acerbum enim suspensum lentius mitescit, quod prius domi maturitatem assequi vult, quam nequit in arbore, ut inde promatur ad escam. Theophrastus ad hyemem suam differre maturitatem dixit, quia eius fructus plus sicci habent, terreni, acerbi, solidiq; natura sunt, & arboribus decerpti maturescere possunt, et si non vera maturitate, tamen quoad succum conceperint esculentum, nisi hoc maturitatis genus putrefactionem appellare mauis, nec prohibet id fieri posse ab extremo calore, cum enim perpetuus humor effluere desierit, qui prius ab arbore suppeditabatur, frigoris superuentu calor intus naturalis obsidetur, quoad maturuerint. Columella ita seruat, In vindemiis sorba manu lecta, curiosē in vrceolos picatos adiucito, & opercula picata imposito, & gypso linito, tum scrobibus bipedaneis sicco loco intra rectum factis vrceolos ita collocato ut oblita eorum ora deorsum spectent, deinde terram congerito, & modice desuper calcato. Melius est autem pluribus scrobibus pauciora vasa distantia inter se disponere: nam in exemptione eorum, dum vnum tollis, si reliqua commoueris, celeriter sorba vitiantur. Quidā hoc idem pomum in defruto seruant, adiecto Cōditura.

spissamento aridi fenuli, quo deprimatur ita sorba, ut semper ius supernater, ac nihilominus picata opacula diligenter linūt gypso, ne possit spiritus introire. Plinius ait, Cato & sorba sapa condi iubet. Et in vasis fictilibus picatis seruantur in scrobibus, gypso operculo duū pedum, terra superinducta, in loco aprico, inuersis valis, & in doliis ut vuas cum ramis suspendi. Palladius ex iis, Lecta duriora, ac posita, ubi maturescere cōperint, fictilibus vsque ad plenum claudantur vrceolis, gypso desuper rectis, & bipedanea scrobe loco sicco sub sole merguntur ore peruerso, & desuper spissius terra calcatur. Item lecta per partes siccantur in sole, & seruantur in vasculis in hybernum. Cum voluerimus viui, aqua feruenti macerata reuirescunt sapore iucundo. Aliqui cum pediculis suis viridia lecta suspendunt locis opacis, & siccis. Alii sorba in sapa assertunt diu posse seruari.



**H** A C T E N V S de arboribus, quarum fructus semina intus habent, nunc de iis, quæ grana, vel frumenta in se continent, verba faciamus, à ficu incipientes. Macrobius ficum albam inter felices arbores connumerandam censet, nigram inter infelices, Veranii testimonium asserens, de verbis pontificalibus ita dicentis: Felices arbores putantur esse Quercus, Æsculus, Ilex, Sapinus, Fagus, Corylus, Sorbus, Ficus alba, Pyrus, Malus, Vitis, Prunus, Cornus, Lotus. Tarquinius item Priscus in ostentatio arborario idem innuit, cum ait: Arbores, quæ inferorum deorum, auertentiumq; in tutela sunt, infelices nominant; alaternum, sanguinem felicem, ficum atram, quæq; baccâ nigram, nigrosq; fructus ferunt; itemq; acrifolium, pyrum syluaticum, bruscum, rubum, sentesq; quibus portenta, prodigiaq; mala comburi iubere oportet. Sed ficum tanquam non pomum à pomis secerni iubet Afranius dicens. Pomum, holus, ficum, vuam. Et Cicero, Neq; serit vitem, neque quæ sata est diligenter colit: Oleam, ficus, poma non habet. O Economicorum terrio: Nos autem ex Plinio, cæterisq; inter poma connumerari affirmamus. Ficus in ea æstimatione apud antiquos fuit, vt secundum ab vua locum ei dederint, primum inter horarios fructus: cum sit eius succus minime vitiosus, maioris nutrimenti, & demum succo vitis præstantior. A Græcis, Latinisq; adeo copiosè de ea differitur, vt nunquam de alia, vnde necesse est, quæ de ipsa tradimus in plures sectiones parti, vt quæ ab aliis membratim discripta accepimus, distinctè & ordinatè, quæq; nostra vidimus experientia luculentius explanemus, à cuius inuentione nostri sermonis initium erit. Magna sunt de ficu Poëtarum commenta, per plures historia, & in ea laudanda eo vsq; progressa est antiquitas, vt à Diu originem traxisse dixerit. Pausanias in Attica primum æditam ficum putat prope Cephissum: Phytalus Cererem (vt fama est) hospitio suscepit, Dea beneficii non immemor ficulnam arborem dono dedit, quod in eius monumento his numeris memoriæ proditum fuit,

*Hic Cererem tectis Phytalus suscepit heros,  
Cui primum sacri largita est semina pomi,  
Quam mortale genus ficum vocat: illius ergo  
Muneris, aeterno hic Phytali gens floret honore.*

Athenæus verò Græcorum commenta luculenter complexus, hæc de ficu tradit. Solibius Laton Libero patri ficus inuentionem tribuit, & ob hoc Lacedæmonii Sycitem Bacchum colunt. Naxii, vt Andriſcus, & Agasthenes referunt, Liberum patrem vocari volunt Melichion, quod ficulnum fructum ædiderit, Melichenq; iidem appellant. quare Liberum, vt vitis inuentorem, facie vitiginea, Melichium ficulna, Naxii excudebant. Poëta gigantem Siceum nomine persequente Ioue, à tellure eius matre in Sycem, hoc est in ficum conuersum fabulantur: vnde in Cilicia vrbi nomen fuit inditum Siceæ.

Phereni



Pherenicus commemorat Oxylum ex Hamadryade Sycen filiam suscepisse. Oxylum verò Orio parente natum sororis amplexu genuisse nucem iuglandem; cornum, populum, vlinum, vitem, ficum, & has Hamadryadas vocari nymphas. Ficus purioris vitæ mitiorisq; principium fuit, hinc locum, in quo primum reperta emicuit. Athenienses *ἱεγὲν πυκνῶν*, id est sacram ficum appellauêre, quæ Athenis via vocabatur, quæ ducit ad Eleusinem, eiusq; fructus *ἡμμεία*, quia primus ab Atheniensibus, quasi ante alias fruges ad mansuetum victum inuentus fuit. Herodotus suis in historiis introducit virum regi persuadentem non debere contra viros expeditionem facere, qui inter alia, neq; vino vtantur, neque ficus, quibus vescantur, nec aliud quidpiam boni habeant.

Philippus Perseipater (vt ex Polybij historiis habetur) dum Asiam percurreret, à Magnetibus in annonâ ficum pro victu accepit, quamobrem cum Myntem postea debellasset, regionem Magnetibus ficuum causa donauit. Hinc Ananias iambographus auro pronunciauit ficus esse meliores. Pergratas fuisse Persarum regi caricas scribit Dion, etiam si apponi modo nō consueuissent, quæ imperio obnoxia ferret regio. Aristophanes nil ischadibus dulcius ait. Indorum rex Amitrochates per epistolam ab Antiocho mitti sibi ischadas poposcit. Alexis caricas Athenarum eibum insignem vocauit. Hæc Athenæus. Ælianus item veterem, primumq; fuisse cibum Atheniensibus scribit, sicuti Arcadibus glandem, Tirynthiis *ἰχθυόδας*, Indis calamos, Carmanis palmas, Mœotis milium, & Sauromatis Persis cardamum, ac terminthum. Cyrenenses (authore Orpheo) Saturno sacrificantes ficis recentibus coronabantur, quod eius fructus repertorem credant. Artaxerxes Mnemon iunioris Cyri frater in fuga, apparatu eius direpto, cū caricis vesceretur, exclamauit inquires: cuiusmodi voluptatis expertem me regalis fecerat affluentia? Calendis Ianuarij caricas, caryotides, & mella tum deo, tum amicis elargiri veteres solebant, vt dulces anni dies à dulcibus auspicarentur. Colitur (inquit Plinius) arbor in foro ipso ac comitio, Romæ nata, sacra fulguribus ibi conditis, magisq; ob memoriam eius, quæ nutrix Romuli, ac Remi conditoris, appellata: quoniam sub ea inuenta est lupa, infantibus præbens rumen (ita vocabant mammam) miraculo ex ære iuxta dicato, tanquam in comitium sponte transisset. Adactō nauigio illico arefcit, rursusq; cura sacerdotum seritur. Fuit & ante Saturni ædem vrbis anno 260. sublata sacro à Vestalibus factō, cum Syluani & Isidis simulachrum subuerteretur. Eadem fortuito satū viuuit in medio foro.

Quia peculiare sunt aliqua ficuum vires in nostris corporibus, cū apud nos crebrior sit earum vsus, physicis consulentes, aliqua de iis pertractemus, vires omittendo, quæ ad medicinam pertinent, cū id nostri consilij non sit, sed de iis tantum, in quas facile inconsulti incidere possent: Athenæi verba subnectentes, is namq; diphnosophystarum libro 3. veterum medicorum præcepta refert. Quod verò ficus omnium fructuum, qui ex ligno nascuntur, sit vilissima, Herodotus Lycius demonstrauit, qui bene nutriti pueros nuper na-

*Alique ficum operationes in nostris corporibus.*



ros ficus succo assernit. Pherecrates, & qui Persas inducit: Si quis nostrum novam ficum aliquando viderit, puerorumq; oculis imposuerit, quasi non vulgaris medicinæ utilitatem conferet. Philotimus libro 3. de nutrimentis refert, ficus multas habere differentias, & ex generibus, temporibusq; vires sortiri, & ut vniuersum dicatur, musteas ficus, & adhuc humentes melius, & celerius reliquis pomis excoqui, nec reliquum cibum impedire, quo minus conficiatur. Vim humorem conglutinandi, cogendiq; possidere; & internum quippiam retinere, quo citam, facilem, fuscāq; reddat aluum, humorem non insulsum alicuius acrimoniæ participē præbere, si cū sale fumantur. sed qui celeriter discutitur, argumento, quod & si magna vis earum ingeratur, paulò post inani-  
tio, vacuitasq; eximia sentitur, quod fieri nō posset, nisi celeriter dissolutæ fastiscerent. ocyus reliquo cibo conficiuntur, nō modo quod maiorem copiam, quàm reliquæ frugis sumptitantes innoxie degimus: sed solito cibatu præsentata nullū nobis exhibent negotium, facileq; calori cedentes, reliquū cibum excoqui minimè vetāt. vis glutinatoria & saluago manifeste in eis deprehenditur, quum & manus extergant, & dulcis sapor, indice lingua, sentiatur. Quod autem aluum sine torminibus cieant, eamque laxigent, euidentius est; quàm ut probari desideret. Salsedinem quandam licet leuem respiciunt, ideo nitrosa vi pollere iam dictum est. Heracledes Tarentinus nō illepide in conuiuio quarrit, an post ficorum esum aqua calida, vel frigida sit obicienda? qui calidā suadent præbendam, celeriter eam & abstergere, & eluere causantur, ideo est verisimile breuiter calida dissolui, quod calor factō partiū diuortio extenuet, & in angustias ducat, frigus contra-cogat. Cæterum qui frigidā aquam iubent præferendam, contendunt frigidi potius beneficio, quæ in stomacho residebant, gravitate quadā deturbari: Siquidem æstuantē stomachum ficus molestia afficiunt, & imbecilliorē reddunt, quare nonnulli secundum ficus merum præcipiunt offerendū, sic promptè recrementa ventris exigi. Sed et ebriore, & largiore potu ab eo cibo utendum non ambigitur, ut in ventre nō immorentur, sed ad imos intestinorū sinus raptantur. Sunt qui ficus meridiano esu abdicent, tum enim, ut Pherecrates ait, morbū creant: quare Aristophanes cū æstate ægrotantem quendam conspexisset, meridiano ficuum esu prælagit. Eubolus nobis cibo ficorū meridiano interdixit, morbū inde contrahi testatus. Damnat item Nicophron inquit: ficus meridie sumentem statim febre corripit quæ vomitū flauæ bilis eliciat. Diphilus Siphnius memoriæ prodiū reliquit, musteas ficos paruā efficere alimoniam, noxiū creare humore, sed facile aluo excerni, cibis supernatate, verū meas melius siccis distrahi. Porro quæ imminere iam hyeme gignuntur, magna difficultate maturescentes euadunt deteriores: meliores habentur, quæ solis vigorem expertæ, per naturā ematuruerint. Cæterum quæ multo turgent lacte, aut aquoso liquore madet, stomacho quidem gratiores, magis faciunt ad palatum, grauiores tamen, ponderosioresque facilius descendunt. Studiosos vocis abstinere ficis Demetrius Sceptius iubet.



Hegesiana & is Alexandrini exemplo motus, quòdis traggædiarum actor optimus enaserit, quia ficu duodeuiginti annos abstinuisset. Hactenus Athenæus. Sed quamquam nostri instituti non sit, cogit me præstans erga venena fico- rum vis, tanquam res maxima, remedium apponere. Nota iam est Mithridatis compositio illa tantopere ab omnibus celebrata, vt Plinius tradit. Cn. Pompe- ius inuenit in peculiari commentario ipsius manu compositionem antidoti è duabus nucibus siccis, item ficis totidem, & rutæ foliis viginti simul tritis, ad- dito salis grano, ieiunoq; sumentis nullum venenum nociturum illo die. Var- ro refert apes è fico mel capere, sed non bonum.

- 30 Sed afferamus aliqua huius arboris prodigiosa nature miracula, quorum al- terum est tauros quantumlibet indomitos fico alligatos cicurari, & quasi im- mobiles conquiescere. Alterum, victimas casorumq; animalium carnes per- quam celeriter tenerescere, & fragiles effici, quæ in fico pependerit. Horum causam demonstrat Plutarchus in symplosiacis dicens: Quû inter obsonia Ari- stionis coquus immolatum Herculi gallinaceum gallum, recentem, tenerum, & penè friabilem obrulisset, tam citam teneritudinem ficui acceptam refere- bat Aristio, contendens ingulatas aues etiam præduras teneritatem cõtrahe- re, quæ pensiles adhæ're ficui. Causam affert Plutarchus: Nanq; quòd auram halitumq; vehementè, ac validum expirat ficus, visus satis testatur. Fidem quo- que facit, quòd vulgò de tauris dicitur: ferocissimus quisq; huic adligatus ar- 20 bori miscet, tangiq; manu, ac subigi tolerat, & efflans iram, animumq; veluti lassum deponit, tanta vi pollet ea spiritus acrimonia, vt ruat licet, sæuiatq; tau- rus, imperet furori. Siquidem arboris fici plus cæteris lacte copioso prægnans est, vt lignum, rami, pontum eo planè resarciuntur, quapropter cum comburi- tur, fumus què eructat maxime mordet & vellicat: lixiuus quoq; cinis maximè deterget, purgatq;. Quin & cogitur caseus ficulneo lacte, quòd emittit arbor, si virentè saucies corticem. Cæterû caloris munere euenire volunt, vt iniecto succo lac coeat, qui humoris concrementû, & aquosum liquefaciat, proinde calidâ, acremq; auram, ac digerentè ficus exhalat, què carnes halitu desiccet, ac 30 cõcoquat, sic vt friabiles reddantur. Hoc idè euenit, si tritici aceruo obruantur carnes, aut penitus immergantur, calore videlicet hoc præstante, argumento, quòd frumentû, in quo amphoræ vini fuerit obruta, cõfestim laticem depascit. Sed alij sunt, qui hæc ad caprificû, non ad ficû referant. Aliud quoq; accedit na- turæ miraculû ab eodem traditû, quòd ficus de cælo nō tangitur, id vtiq; ama- ritudini acceptû referre oportet, tale genus quippe nō attingût fulmina, quòd vitulus cõprobat marinus, atq; hyæna. Theophrastus ab aruspiciibus ostenta existimari ait, quæ fortuita mutatione fieri contingit, vt ex caprifico ficum, & ex fico caprificum, sed de fi. o in caprificû deterius, vuamq; ex candida nigram, & ex nigra candidam, & pro ostento etiam capi, cum arbor in arbore nasci- 40 tur, vt laurus orta in platano, & quercu. Ex eo Plinius, Prodigio fiunt ex caprifico fici, & contra graui ostento, cum in deteriora mutantur, & ex cap-

*De prodigiis ali- quot ficus naturam ir- rabilibus.*



dida ficu in nigram. Sunt etiam prodigia cum alienis locis enascuntur, ut in capitibus statuarum, vel aris, & cum in arboribus ipsis alienæ. Ficus in lauro nata est Cizici ante obsidionem.

**Nomen.**

Ratio poscit, ut de eius nomine dicamus. Græcis arbor συκή, fructus verò σύκων dicitur, de cuius nomenclatura apud eos existit controuersia. Nam alij ex gigante Syce, alij ex Syce Oxyli filia, quæ omnia iam supra memorauimus, cum de eius inuentione verba fecimus. Sed tanta fuit apud antiquos ficus ueneratio, ut omnes eius partes, & fructus peculiaribus nominibus designauerint, ideoq; non iniucundum fore duximus, si eas Græcarum vocum studiosis apponereimus, cum in illius historia sæpe occurrant. Athenæus caprificum *ιερών* vocat Homeri & Strattis autoritate, at Amerias grossos *ιερνάκας* appellari ait. Seleucus protericen fici genus quoddam scribit, quod præcocem fructum fert; & Philemon maturam ficum *κάλυθρον* dici. Athenienses ficos maturitatis falsam speciem præferentes vocant *φήληκας*, hoc est pheleccas, quia *φελώματα* dicuntur impostura, & deceptiones. Ficus antequam maturescant Græci iidem *ιλιώθεις*, nos dicimus grossos, & si nomen sit etiam urbis in Thracia, à qua Demosthenis orationes Olynthiæ inscribuntur. Sed sunt inter Græcos, qui ita distinguant, ut primum sit *ὀλιωθες*, mox *φήληξ*, inde *σύκων*, postremo *ιχάς*, & diminutiua forma *ιχάσιον*, id est carica, *ὅθεν τὸ ἶχον*: quia ulterius augmentum fici prohibeatur autumnali tempore. plerique eo nomine aridas ficus intelligunt, è nostris nonnullos inuenias, qui aridas ficus caricas dicant, cum carica fici species sit, ut videbimus. *ιχάδες* Iulius Pollux distinguit, ut alia recens, alia virens, item vetus, & sicca, item que sale condita. Nouellæ ficus *συκάδες* dicuntur. Sed eius partes etiam peculiari nomine insignitæ sunt, ut *κράδα* eius surculus, *κεκράμεις* grana intus. Et auiculæ cum tam uis, quam ficubus pinguescant, à fico nomen indiderunt *συκελὶς*, id est ficedula, ut M. Varroni placet, non *ἀμπελὶς* ab uvis, quibus etiam pascitur. Ad quod alludit Martialis epist.

*Cum me ficus alat, cum pascar dulcibus uvis,*

*Cur potius nomen non dedit una mihi?*

Latini ficum à fecunditate vocant, M. Varrone & Quintiliano authoribus. **Itali fico.**

**Descriptio.**

Nunc verò arborē describamus. Theophrastus variis in locis ita depictam exponit. Arbor ficus statim ab radice simplici caudice brachiata ramis, surculosa, dissolutuque contumax assurgit, sed suæ exilitatis causa multifidam aliquando dimittere assolet. Corpore non magnopere procera, quanquam inter eas, quæ solutum fructum progenerant, modo solum obtineat probum, vastum incrementum capiat, in altum se attollens, & ramoso admodum corpore, amplissimum locum occupet. Ligno contorto, carnosio, enerui, & enodi: Enodi, inquam, non quòd nodis omnino careat, talis enim arbor nulla videtur, sed ita enodem accipi volo, ut nodos paucos naturæ ordine habeat, etsi eius ramuli nuper oborti nodosi adeo sint, ut tactu asperi videantur, idq; quia breui



breui internodiorum diuortio sciuncti sunt, longe tamen quàm ea nodosior est caprificus. Medulla carnosa. Corrice simplici, & læui. Humore lacteo succo simili. Folio amplo, laciniato & (vt ita dixerim) cruciformi, quod cōstat neruo, cortice & carne. Serotina fici antequam fructū percoquant, folia deperdunt: at in Elephātino agro caduca nō sunt, tum cœli genio, tum humi præsidio, hæc enim vberem succū, qui sufficitur in consumpti locū, illud verò obsequens ad fouendum se præbet. Nouello surculo fructificat; aliquādo rei temeritate poma auersa ramulis affert, quod mirū videri nō debet, si alienis in locis fructuum eruptio fuerit: cōmutatio enim parua est, nec posterior hic locus à priori dissimilis admodū est, cū aggregatio imbecilla, & confluxus in eam validior sit. Præterea in ficuum genere species quēdam est ὁπισθοκαρπός, id est quæ retro post frondem fert fructum, vnde illud, quod cum specie quadam naturale, & frequentissimum est, in altera eiusdē specie euenire, non ita mirum videri debet. Semina intus congesta continet, atq; tunica contenta, sed incerta, & quæ præ nimio humore conculcantur. Cacumine, & latere germinat, paulo ante æquinoctium, ad ortū arcturi post ver: quod tempus et si omnibus edomitis commune est, cōmunius tamē fico. Non florer, sed protinus fructum ostendit. Ei datū est à natura, vt plura producat, & grossos deciduos, & ficus: & si pars maior fructuum acerba initio esse soleat, quia siccitatem sortita est. Humidorum omnium extrema esse putatur ficus, cuius succus lacteus existit. Fructus sero maturescit, cū & putamine obtegatur, succū amplum, crassumq; obtineat, & summam quodāmodo maturescat, & ampliorem mole constet. Sed celeriter perficitur, quia humidus, quia tenui amictu reclusus est. Si arbor egregiè ramis, & frondibus luxuriabit, egregiè etiā vberes fructus promer, eius nanque talis natura priuata est: (reliquis enim omnibus ferè negatum, cū natura vtrumq; explere nequeat. Necesse est enim si in frōdibus materia absimitur, quod debita pars fructibus intercipiatur, sic largiori fructus prouentu, minus germinationē frequentari:) quod & soli vbertate, & arboris robore euenit, id enim attrahere valet, illud largius suppeditat alimentum. Velocia incrementa capit: Cuius ratio est, quia rara, humidaq; est: rarioribus enim, & humidioribus celeres sunt augmenti progressus. Radice præcipua est, quippe si sedem nanciscatur expeditam, subire quantumuis facile & euagari potest, sed oblique, quod expedita faciliq; semita careat. Breui vita est, nam cito senescit, & contabescit, ratione nimiaæ fœtificationis: diuturni enim penli solutione, maxima & potissima naturæ pars exhausta fatiscit. Idq; in animalium genere videre licet, in quibus excessus superfœtationis citam affert senectutem, & mortem, quod inter congeneres euidentius patet. Rectè igitur contra Democritū, qui arbores, quæ proluxa, crassaq; radice nituntur, vitam obtinere breuiorē dixit. Nunc Plinij ficus descriptionē, quam ex Theophrasto excepit, multisq; in locis disseminauit, afferemus. Ficus simplici caudice surgit à radice, frequentibus ramis. Corrice simplici, læui, & in senecta rugoso. Humor corticis lacteus, huic ad ca-



seos figurandos coaguli vis. Corpus totū ē carne: ideo finditur velocius, quā frangitur. Folio amplissimo, quod in serotina cadit, antequam maturescat fructus. Sed in Elephantino Thebaidis nulli cadit, ne viribus quidem. Arboribus habet folio pomū, vt protegatur, excepta ficu, cui folium maximum, vmbrosissimumque, & ideo super eo pomū, eidemq; serius nascitur folium, quā pomum. Ex reliquo pomorū genere ficus amplissima est: quā dā est pyri magnitudine æmula: admirabilis est pomi huiusce festinatio, vnius in cunctis ad maturitatem properantis arte naturæ. Ficus mollis omnibus tactus, maturis frumenta intus, succus maturescētibus lactis inest, percoctis mellis. Senescunt in arbore, anusq; destillant gummi modo lachrymā, siccāturq;. Succus ficui dulcis, lacteusq; in capite, in corpore nō item. Ficus teguntur carne, & cute detrahitur hæc virentibus vt putamen, in siccis eadem maxime placet. Non florer, protinus enim fructū flores gignunt. In ficis mirabiles sunt abortus, qui nunquā maturescunt. Eis nullus odor. Æstiuas germinationes à canis ortu & Arcturi omnibus arboribus cōmunes putant, sentiri autē maxime in fico: causam afferentes, quia in Thessalia, Macedoniaq; plurimum ficus exeat. Maxime tamen in Ægypto apparet hæc ratio. Gignit ē lateribus ramorum, & cacuminibus. Breuissima eius est vita, ex iis præcocibus breuior, quā serotinis, & dulcibus, quā acidis. Radix copiosa, flexuosaq;. Quidam breuitate radicū celeriter senescere arbores putauit: quod coarguit ficus, cuius radices longissime, & senectus ocyssima. Hippocrates ficus foliū coronopoeidē vocat, id est cornicis pedi similē. Plutarchus ficū non florere scribit, & fructū proferre, verū grossi in hac decidui floribus respondent. Præterea à veteribus Græcis foliū *Spion* dicti ex scabritie. Vnde ob eius asperitatē anguilla piscis facile lubricus, eo cōuoluta possit cōtineri. Vnde adagiū *πρὸς Σπίον τὴν ἰχθυίαν*, id est ficulneo folio anguillam. A Plutarcho in Symposio agitur quaestio, Quī fiat, vt arbor amarissima fructū producat dulcē, ac pinguedinis multæ? Cuius propositæ ratio illa esse nonnullis videtur: quod arboris dulcedo quantacumq; sit, in fructum secernatur, proinde quicquid reliquū fiat in ligno succi in amaritudinem degeneret. Id vel hepatis præcipuē argumento patet, quod ipsum dulcissimū est, fœculento, & bilioso in vnum locū sequestrato, ac quodammodo percolato. Inesse autem ficui bonitatem succi quam *euchymiam* vocant eo probant indicio, quoniā ad nata illi ruta, dulcior euadat, ni diuersum magis astruat quispiam, ficum videlicet, dum alimentū sibi conciliat, eximere quod acre, quodq; amarulentum est. M. Varro, quæ laxiora, ea & fœcundiora esse dicit, vt fœmina, itaq; ficus, ppter fœmineam mollitiem ad crescēdum prona est. Lactiq; pro coagulo addunt de fici ramulo lac. Columella de lacte idem habet. Cogitur plerumq; lac ficulneo lacte, quod emittit arbor, si eius virentem saucies corticem.

*Seneca.*

Ficus multis inter se discriminibus distare prodidit Theophrastus, vt alia maturē, alia serō admodum maturescant. Præterea tot subiēre genera, (inquit Plinius) vt vel hoc solum æstimantibus mutaram appareat esse vitam. Apud nos ju-



nos infinita propemodum sunt, inter se sapore, colore, forma, magnitudine, & temporis prouentu differentia, quibus antiqua nomina tribuere impossibile ferè esset. Nos continua omnium generum ficuum nostræ Campaniæ inspectione, sycophantarum consilio, antiquorum librorum lectione, ac comparatione vulgaria nomina apponere conati sumus, speramusq; nec nostros conatus frustratum iri. Primò ficum in urbanā, & syluestrem diuidemus. Urbanam mox aggrediemur, de syluestri postea dicturi. Urbanarū genera à temporibus, quibus maturantur fructus distinguemus, vnde à præcocibus incipiendum duximus, è quarum genere bifera sunt. Hæ principium nostræ tractationis exhibent. Theophrastus ficus biferas vocat, quæ bis eodem anno, certoque temporis tenore fructus proferre solent. Achæis præcox ficus *δυσπικτος* dicitur, quasi præcurrens: forte proterice quoque: nam & Seleucus ita genus ficus quoddam nominat, maturius fructus promens, vt ex Athenæo elicitur. A Columella appellantur bifera, & trifera flosculi. Et in suo hortulo,

*Tunc præcox bifera descendit ab arbore ficus.*

Plinius ex his, Ficus & præcoces habet, quas Athenis prodromos vocant. Sunt & præcoces bifera alba & nigra, cum messe, vindemiaq; maturescentes. Ex Chalcidicis quarundā trifero prouentu. Macrobius etiā biferarum meminit. Apud Siculos adhuc retinent nomen, nam *bifere* vocant. Neapolitani *vollemole* à manus vola, vt spero, quia magnæ sunt, suaq; magnitudine manus volam implent. Harum apud nos nonnulla sunt genera colore, figura, & magnitudine differentia. Hæc prima omnium maturantur, fructificantque ex annotino genere: scilicet prioris anni surculo. Martio enim mense prima ficus rudimenta generantur, maturanturq; Iunio cum messe: inde ex nouo germine alia ficus producuntur, Augusto, & Septembri maturescentes cum vindemia, vnde ex annotino, nouelloq; ficus fructificat germine, quod annotauit Theophrastus de malis biferis loquens. Fructificant ex vtriusq; surculis tam annotinis, quàm nouellis, sic etiā caprificus, quæ maturat, ficusq; profert ex nouellis. Tot generū præstantissimum est, quod vulgò *fico gentile* dicimus, quasi nobilitate cetera antecedit, tamq; vilia, rusticaq; cum eo minime cõferenda, principemq; locum omnium sibi vendicat, albedine est decora, sapore insigni, pinguedine, suauitate, iucunditate, ac dulcedine. Cùm hiascit, cãdidissima demonstrat viscera, videturq; ex hoc fructu dicta nostra Campania felix. Siculi *fica Zane* vocant, vel africanas, & adhuc pristinum africanæ nomen retinent, ac animus inclinatur has esse, dicere Africanas ficus Carthaginis excidio celebratas. Athenæus Africanā Romæ maximè laudari dicit. Cato eas nominat. M. Varro ex trãsmarinis esse dicit. Columella præcipuè serendā duxit. Sic etiam Macrobius. Plinius hæc habet, De Africanis, quas multi præferunt cunctis, magna quæstio est: cùm id genus in Africā nuperrime transierit, patriæ nomen obtrinent. Sed à Catone appellata iam tum Africana, admonet & Africæ, ad ingens documentū vso eo pomo. Nãq; perniciali odio Carthaginis flagrans, nepotūq;



securitatis anxius, cum clamaret in omni senatu Carthaginem delendam, attulit quodam die in curiā præcocem ex ea prouincia ficū, ostendensq; patribus. Interrogo vos, inquit, quando hoc pomum demptum putatis ex arbore? cum inter omnes recens esse constaret. Atqui tertium, inquit, ante diem scitote decerptū Carthagine, tam prope à muris habemus hostem. Statimq; sumptum est tertium bellū Punicū, quo Carthago deleta est. Est inter præcoces à Theophrasto memorata Laconica riguis gaudens, & esse quam minimam dicit. Ex quo Plinius, In Laconico genere præcoces ficus maximæ sunt. Quod præceptorum maximo aduersari videtur, qui quam minimas esse dixit. Sed hanc controuersiam soluit Athenæus, qui Aristophanis versu transcribens ait.

*Omnes serò ficus, procul Laconica  
Sit, hæc mihi est inuisa, quod tyrannica,  
Non esset illa parua nisi plebem oderit.*

Sed paruam dixit, quia exigua eius est planta; cui multum prodest aquam habere propinquā. Leucophalia etiam à Theophrasto memoratur inter præcoces. Athenæus Leucophias vocat. Plinius inter præcoces Tiburtinam ponit. Primo prouenit porphyritis longissimo pediculo. Auguror nobis dictam *fico molengiana*, hæc enim è præcocibus est, colore inter nigrum, & rufum, vel ut lapis porphyritis purpurescere, quo etiam colore mala insana nobis *molen-giane* dicta proprie vestiuntur, corpore & pediculo longo est. Subdit Plinius. 20  
Constat eam è minimis, & vilissimis popularis dicta. Hæc Neapolitanis *fico migliarola* dicitur, nam & sequitur antedictam, & corpore est exiguo, sapore vili, grano intus frequenti, dum manditur sub dentibus crepitant grana miliacea, (ex quo nomen *migliarola*) coriumque adhæret palato, & manibus, ut vix auelli queat. Nisi præcox esset, vix voraretur, ad aucupium potius, quam ad escam feritur.

*Tempora-  
ria ficus.*

Quæ sine nota præcocitatis, vel tarditatis temporis ficus ab antiquis memorata fuerunt, in hunc locum conessimus. Charition, & Aration genus à Theophrasto nuncupari secundo hystoriarū libro memorat Athenæus, quod nusquam legitur. Plinius Aratiæ albæ meminit, pediculo minimo latissima. 30  
Idem Athenæus Atticam ficum Antiphanem laudare scribit: dicens regionem Hipponicam omnium totius orbis terrarum ficuum præstātißimas producere, nec licere cuiquam ex agro Atheniensi ficus caricæ ibi natas asportare, ut soli incolæ fruerentur. Carica ibi confecta erat Athenarum insigne, Dionis, & Alexi testimonio. Præterea Callistrutiæ, quæ Romæ nascuntur, alias totius orbis ficus antecellunt. Columella has inter præcipuè serendas censet. In hortulo verò,

*Et Callistrutiæ, roseo quæ semine ridet.*

Latini passarias vocant. Nam apud Græcos *passer* est. Refert Capito-  
nius Clodium Albinum quingentas ficus passarias ieiunum comedisse. Pli- 40  
nius



nus parum sapore præstantiores iis, quas supra dixerat, scilicet Lydiis, chalcidicis, & mammillanis dixit. suspicor in Plinii textu mendum. Hæc nobis *ficus diguella* sunt, præstantissimo sapore inter ceteras, vt Athenæus, præcipue serenda, vt Columella, ridens hiat roseo semine, oblongo pediculo, vt non mirum sit Clodium quingentas comedisse. Chiam inter eas ficus, quæ Romæ nascuntur, maxime laudari scribit Athenæus. M. Varro transmarina genera ficuum in Italiam perlata esse, vt chia. Plinius, Ex aliis gentibus transisse ad Romanos chias. Quarum plura genera. Hæc ficus in Setinis agris, ob salis, viniq; saporem præstantissima erat. Vnde Martialis,

10 *Chia seni similis Baccho quam Setia misit.  
Ipsa merum secum portat, & ipsa salem.*

Et alibi,

*Nam mihi, quæ nouit pingere Chia sapit.*

Chalcidicam dicit etiam Athenæus ex iis, quæ Romæ nascuntur laudatissimam. M. Varro inter transmarina semina, quæ in Italiam venire, chalcidicam fuisse. Columella præcipue serendam esse chalcidicam. Macrobius Chalcidicam dicit. Plinius, Ex aliis gentibus ad Romanos trāsire ex Chalcide, quarum plura genera, ex iis quædam trifero prouentu. Libyanam Athenæus è Romæ nascentibus laudatissimam dicit. Idem ait Columella, & Libycam vocat. In hortulo etiam,

*Scissalibifca simul.*

De lydia hæc habet Athenæus. Archilochus de his, quæ in Paro insula nascuntur, has mire celebratas scribit, easdemque esse, quas hæmonias dicunt, quod nomen ab innato colore adsciuerunt, ac egregias esse. quæ ficus tantum ab omnibus, quæ vbique nascuntur differunt, quantum apri syluestris caro, à cicurum suum carnibus. M. Varro inter transmarinas numerat. Columella inter laudatas, suoq; in hortulo,

*Et picta quoque lydia tergo.*

Plinius lydias purpureas esse scribit. Meminit earundem Macrobius. Has 30 puto Neapoli *fico pente* dici. Nigra est, vel si mauis sanguineo colore infecta, maturefcentibus finditur putamen, vt affabre picta videatur. Celebratur à Cariis populis apud Lydos.

Mariscam ficum Cato in loco cretoso, & aperto vult seri. M. Varro cum soli varietates scriberet, quæ summis in locis plantis eueniant, quæq; in planis, & depressis, ait, In montanis prolixiora nasci, & firmitiora quia frigida, vt arbores sappini, in planis, quæ tepidiora, populi, salices, sursum fertiliora, vt arbutus, & quercus, deorsum vt nuces græcæ, & mariscæ fici. Hæc Plinius excipiens, arborum fertilitati partium ascribit. Est verò, inquit, & ipsis arboribus etiam onustis fertilitatis differentia, summa sui parte fertilior est arbutus, 40 & quercus, inferior iuglandes, fici mariscæ. Iudicent doctiores. Catonis etiam verba transcribens, addit: & sole siccāda, & ad annuos vsus aptissima. Hæc



grandiores, insipida, nimiaq; pinguedine rumpuntur, ac maturescentes semina ostendunt. De his Marialis extat distichon,

*Infanti melimela dato, fatuasq; mariscas.*

Et alibi.

*Non boletis hiare, non marisca*

*Ridere.*

Id nomen à similitudine ad morbum transfertur, & ficus etiam dicitur. De quo Iuuenalis.

*Sed podice leni*

*Caduntur tumida medico ridente marisca.*

Videtur hæc Macrobio asinina dicta. Magna enim, ac vilia quæ sunt pomorum genera, asinina vulgò dicunt. Senecio hanc inter tot ficuum genera libentius comedebat, nempe is grandia solum appetebat, ut propterea sibi nomen grandioris acquisiverit, Seneca authore. Nos hanc Neapoli *fico pallara* dicimus, vel si mauis *fico lardare*. Sapore insipido, magnitudine stolta, ac multa pinguedine, ut laridi nomen sibi vendicarit. Soles passa ad seruandum aptior, quam viridis ad escam. Græcis *βύσσος* Festo, & Macrobio authoribus dicitur: Nam Græci amplis rebus *βυ* syllabam præponunt. Subdit Plinius, Et quas arundinum foliis macula variat. Ego potius legerem sine coniunctione, & led mariscis ficubus subiungerem: quas arundinum foliis macula variat. Nam huiusmodi ficorum fructus colore sunt similes arundinum foliis. Vel si mauis separatam esse ficum, apud nos est *fico stella* vulgò dicta, à pediculo ad umbilicum striis, veluti teniolis depicta, ut stella videatur. Striæ albae sunt, corporis color arundinum folii. Apud nos ob picturæ præstantiam potius, quam ob saporem feritur. Macrobius hanc, vel illam arundineam vocat. Alexandrina è nigris est candicante rima, cognomine delicata: inquit Plinius. Hæc nobis *albanera* vulgò est. Nam & nigro corio est, & cum hiat, albet, saporis nimium delicati. Apud plerosq; præstantissima habetur, fortasse hæc fuerit, cuius Cato, & Macrobius meminere, atra pediculo longo, quæ crasso, & stercoreato loco feri auet, ea nigra, & oblongo pediculo est, & præ cæteris humidis, crassisque locis feri auet. Cato herculanas, saguntinas, telanas in loco crasso, & stercoreato feri iubet. Macrobius herculaneâ, tellanam memorat. Plinius herculanam solum. Quibus quum alias notas non addiderint, quæ fuerint penitus ignoramus. Phibaleæ ficus meminit Athenæus, ac Pherocratem scribere, æstate phibaleis ficubus vesci debere, ac Teleclidem, pulcherrimas esse phibaleas, & ex Androtionis sententia in planitie plantandas esse. Sunt enim phibaleæ Hippocrati. Memorat etiam basilicas, & sycobasilicas, quasi regias ficus dicas, & à Palemone descriptas, & oporobasilicas, quæ ubiq; plantari possunt. Hæc nobis est vulgò dicta *fico Imperiale*, extima superficie alba, Augusto maturescens, sapore, specie, & magnitudine singulari, ut non immerito regiae nomen adeptæ sit. Idem præterea coracem ficum Hermippum commendasse, ac phibaleis



leis æquiparasse scripsit. Hæc coronea à Strabone, vel corarium ab Aristophane dicitur, quod eius fructus corui colore sit, quem coraceum vocant. Adhuc antiquum retinet nomen, nobis dicta *fico corbo*, ab insigni nigredine, Augustoque maturescit. Memorantur etiam ab Athenæo cirrhocæladia, hyladia, sarcelaphia, lapyria, picridia, draconia, melanophia, eremia, myleca, ascalonia: sic & colura, phomynia, & megarenses, quibus prodest aquatio. De phrygiis ficibus meminit Alexis, de toxaliis Heracleon Ephesus, & Nicander Thyatirenus. Hæc omnia memorat Athenæus, ficorum historia diligens scriptor, quarum nota, & descriptiones simul cum vetustate periere. Sullas præcipue ferendas monet Columella, sic topias, & rhodias. Plinius, Rhodia nigra est. Athenæus de ficibus Lynceum meminisse, quæ in Rhodo nascuntur scribit, & cum optimis confert Atticis, & eiusdem naturæ cum tralianis. Varro Sabinam ficum, ait, quanto citius promas, iucundiore vtare, quod vetustate ficus sit pallidior. Plinius mammillanas ficus earum similitudinem habere tradidit. Pompeias ex authoris nomine dictas, sole siccandas, & in annuos usus aptissimas. Macrobio pompeianæ sunt. Columella in hortulo albiceratæ meminit hoc versu,

*Albaq̃, quæ seruat flaua cognomina cera.*

Plinius albiceratâ vocat. Hanc centerem vulgò *fico ottata* dictam. maturescens colore albo flauescenti insignitur, vt si eam aspexeris, cereâ dicas. Hæc ficus id habet propriû, vt præ ceteris prodromos ostendat hyeme, qui maturantur Iunio cû bifera, vt bifera dici possit. Macrobius adhuc albulâ nominat, fortasse quòd albescenti colore insigniatur. Neapoli nascitur, pristinoq̃ nomine potitur, nam *bianchetta* vel *biancolella* dicitur, ex albo pallefcit, mitescitq̃ Augusto. Palusiâ item, angustam, calphurnianâ, ludiam, leptoludiam, marlicam, numidicâ, & pullam. Sed quia solum nomina, non signa apposuit, si eas coniectari velimus, non ita feliciter nobis, vt quamplurimis coniectura succederet.

Cauneas (Athenæo referente) Parmeno Bizantius laudat, ciuitatis Æoliæ, *Serotina: ficus.* vtpote egregias. Ficus enim Cauni ciuitatis Caria ab omnibus laudari. Columella in suo hortulo excellentia similes esse chalcidicis, & chiis dicit,

*At grauis Arcturi sub sydere parturit arbor*

*Linia, chalcitis, & cannis amula chia.*

Plinius, Recentibus ficis sale siccatis vice casei vesci nuper excogitatum est, ex hoc genere sunt coctana, & carica, & quæ conscendenti nauim omen fecere M. Crasso, venales prædicantis voce cauneæ. Omnia hæc in Albenſe rus è Syria intulit L. V. tellius, cû legatus in ea prouincia esset, nouissimis Tiberii Cæsaris temporibus. Nec omittemus Ciceronis verba libro de diuinatione. Cû enim M. Crassus exercitû Brundusii imponeret, quidam in portu caricas Cauno aduectas vendēs, cauneas clamitabat, sic monitus ab eo Crassus caueret, ne iret. Chelidoniæ ficus mentionē fecit Athenæus, inducens Epigenē vocantē chelidonias asperas. Androtiō verò ait chelidonias in planitie plātandas



esse. Philemon verò chelidonias caricis vocari eas, quæ nigrae sunt, & rubicundas Erythrocomelenas dictas. Columella in hort. Purpureæq; chelidoniae.

Iulius Pollux chelidonias dicendo Atticas intelligit, quas Lacedaemonii chelidonias appellabant. Quidam à Chelidoniis Illyrici populis dictam volūt, in quorum frigidissima regione hyeme maturescat. Hæc nobis *fico asprina* dicitur, aspera enim corio & sapore est, & asperissima contra hyemis sæuitiam. Hyeme maturescit multo tempore post foliorum casum. Duplex genus, alterū nigrum, alterum verò albū. Liuiam ficum in hortulo Columella memorat.

*At granis Arcturi sub sydere parturit arbor*

*Linia.*

Plinius, Sunt & authorum nomina iis, Liuia, siccata hæc in annuos vsus aptissima. Macrobius Liuianam vocat. Nobis *fico Troiana* dicitur. Serotina est, sapore iucundo, ad siccandum inter cæteras aptissima. Serotinas à corio appellatas duro, Plinius dixit. Macrobius duricorias vocat. Plautus item,

*Ficus nobis attulit duricorias.*

Neapoli *cotinarole* dicuntur, serotinae sunt, & duro corio vestiuntur, quod Neapolitani *cotina* vocant. Coctanae ficus Martialis meminit,

*Hac tibi, qua torta venerunt condita meta,*

*Si maiora forent, coctana ficus erat.*

Et Iuuenalis,

*— Quo pruno, & coctana venio.*

Statius,

*Prunorum globus, atque coctanorum.*

Omas Plinius Tarenti nasci prædulces ait. Caricas aliqui priuatum genus dicunt in Syria, Cariæve proueniens.

*Cælum.*

Et si ficus omnibus propè locis seri possit, ex Palladii sententia, tamen vt veriores fructus, & meliores, ac arbores perennes sint, earum natalia loca designemus. Sub cælo maximè calido, vt in Ægypto, & tractibus illis, bona poma arbor nunquam producer. Theophrastus affert causam, Quia æstus perurit, vt concoctio minime fieri possit. Ita etiam in Assyria (Herodoto authore) quæ in ferendis ficibus, & olea nequaquam de principatu cetter, cæterarum verò adeo ferax, vt singula ducenta reddat, trecenta etiam, vbi locus melior sit. Contra verò cælo maxime frigido ficera fieri non posse contendit M. Varro. Idemq; confirmat Columella, frigidis regionibus ficos seri non debere, laudatq; apricum cælum, & temperatum, ad calorem potius vergens, quàm frigiditatem. Ait M. Varro, Ficus quòd densa materie non est, ideo sequitur calorem. Palladius scribit, Ficus in calidis locis natas pinguioribus esse, & siccitate durabiles, contra quæ in montanis, & frigidis nascuntur, quia minus lactis habent, ad siccitatem durare non posse; vsum illis in viridi esse, melioris magnitudinis, & saporis arguti. Ob id insulae, quia apricae sunt, ad calorem potius, quàm ad frigiditatem vergentes ferendis ficibus idoneæ magis



magis sunt. Hermippus apud Athenæum scribens quid quælibet regio generosum producat, ait:

*Vuarum passa Rhodo dantes Et somnia grata  
Ficus.*

Cnidum Rhodi partem vuarum & ficuum abundantissimam scribit in Iconibus Philostratus. Plinius, Circa Bosphorum Cimmericum in Panticapeo urbe, teporis arbores abundant, ut fici laudatissimæ. Et in Hyrcania (ex Onesicriti autoritate) multum nostris esse dulciores, fertilioresque, ut quæ modios c c l x x singulæ ferant, asserit. Et in Ebuso insula præstâtissimas, amplissimasque, mox in Marrucinis. Et Scardona insula maris Adriatici Illyrico adiacens ficubus abundat. Sed cum fici genus multiplex sit, varioque inter se habitu distet, cœli differentiis ficuum qualitatibus obuiabimus, unde calidis, & æstuosis locis seremus serotinas ficos, Columellæ autoritate, qui calidis locis hybernas feri præcipit ficus. Palladius item, Calidis & æstuosis locis eas seremus, quæ sero maturant. Sic frigidissimis locis præcoquas apponemus, ne importunus hyemis aduentus tenera ramusculorum cacumina comburat, idque superiorum autoritate confirmabimus. Columella, Frigidis & aquosis locis præcoquas ponito, ut ante pluuiam fructus deligas. Ex quo Palladius, In locis nimium frigidis præcoquas fici us seramus, quæ citò veniant, ut ante imbres genus hoc possit 20  
occurrere. Theophrastus, In Ponto frigidissima regione fici multæ, & amplæ opacitatis habentur, bonæque frugis ac vernæ, præterquam quæ serotinæ.

Theophrastus loca illis silentia conuenire scripsit ac campestria, solumque 30  
solidum, ac siciens: quippe alimentum ficum, callosumque exoptant. Modice etiam ficus viginem attrahit, ratione suæ infirmitatis. Solum ut minus frugale sit necesse est, ne soli causa excessus ullus accedere possit, quapropter in insulis frequentiores videntur. Columella loca glareosa, calculosa, & interdum saxosa amat. Palladius verò, Genus terræ durum, & gracile, & siccum pro utili sapore pomorum. Prouenit & petrosis, atque asperis. Sic etiam soli qualitatibus cœlo obuiabimus, & id aptè illi coniungemus. Cœlo maximè calido, ficum humidis locis plantabimus, ut cœli æstus terræ humiditate compensetur: Nam si calido sub cœlo siccis locis eam plantabimus, fructus antequam ad perfectam veniant maturitatem decident. Sic cœlo maximè frigido, humidoque in sicco solo seremus, nam si in humido seremus, arbores nimia frondium, & ramorum luxuria fructificationem absument. Theophrastus ait, Ficus in humidis locis putrefaciunt fructus, aut non bene maturant, cum fructus ipsi humidi sint. Didymus in pastinato solo, sed non admodum irriguo ficus plantari debere scribit: Siquidem aquarum copia genitriam earum pulchritudinem, natiumque decus tollit, opportuniotesque corruptioni reddit. Item Plinius, Ficus arbor ipsa riguis alitur, pomum verò eius marcescit. At si nos necessitas co- 40  
git frigido solo plantare, orientem, vel occidentem versus seratur.

Ficum inter cæteras arbores, narrat Theophrastus, id præcipuum obtinere,

*Satio exsermine.*



omnibus modis satā emergere, præterquam ramo. Sed à semine, prima arborum satione incipiamus. Seri semine posse idem affirmavit, sed omnino degenerare. Nam è ficatio grano nullum genus, nisi caprificum, & ex candida nigram, & ex nigra candidam nasci. M. Varro in ficus satione, quia tarda ad crescendum, surculis potius utendum, quàm semine præcipit. Fici enim semen naturale intus in ea fico, quam edimus, quæ sunt minuta grana, è quibus parvis, quod enasci coliculi vix queunt: præter si aliter nequeas, ut si quādo quis trans mare semina mittere, aut inde petere vult, tum enim resticulas per ficos, quas edimus, maturas perferunt, & eas cū minaruerint complicant, ac quò volunt mittunt, vbi obrutæ in seminario pariant, sic ficorum genera Chix, Chalcidicæ, Lydiæ, & Africanæ, cæteraq; peregrina in Italiam translata esse. Didymus ficariis granis pangi non illepide posse docet, hoc modo: Maceratas ficos resti obducas, siccatas frequenti imbre inspergas, complures exhibunt arbusculæ: vbi in hoc seminario nutriueris, transplantas in serobes.

*Ex vitis  
dice.*

Vitæ radicem ferendi duo tempora statuunt Græci, autumnū, & ver. Theophrastus ver præfert, ne ei post autumnalē sationem hyems secuta intestinum succum pinguefaciendo, & coagulando officiat. Sed iuxta scyllam sata latior conualescit, ocyus augetur, minusque vermibus infestatur, & ut summatim dicatur, Satum omne scyllæ appositum facilius germinat, & celerius increfcit. Scrobes non altos exoptat, cum radices habeat, quæ in summo cohæreant, sed quantos natura exigat. Molestissima est tam viti, quàm cæteris, cum multum attrahat alimentū, & umbram faciat amplam. Positionem in plantatione minime obseruandā censent, nam si in contrariā partem verratur, fructum nō amittere, atq; ita scansile fieri. In ea plantanda, facienda sunt intervalla maiora, quàm malo, pyro, aut amygdalo, cum in altum extollatur, & ramoso corpore amplū occupet locum. Didymus duobus anni temporibus, scilicet vere, & autumno ficū ferendam: vernam tamen sationē magis probat. quippe arbor omnium ferē tenerrima, & delicatissima gelicidia & glacies horret, ventosq; mirum in modum formidat, ne cū ruunt, aut sruunt status rumpatur. Ego verò (inquit ipse) Iulio mense toto plantas disposui, rigans, & transferens, & poma mihi adolescentes peperere. Si vitæ radicē quis deponat, scylla bulbos interiici oportet. Alij madefactam muria plantā collocant. Melius tamen siue plantulam, siue ramulos velis serere, prius in bubulo fimo madefacere oportet. Sunt qui cum planta viuā calcem obruant, sic satam suo domino decoquere negant. Cassianus ait, Hybernīs, frigidissimis, & humidissimis locis, aut qui rigari possunt, vñq; ad idus Iunij plantant, quum manifestum sit omnem plantam, priusquā in germina extruberet, plantationi aptā esse. Nam quæ germen emittit, amplius nasci nō potest, sola fico excepta. Præterea Florentinus scribit. In spatiis vitium ficū plantari posse dicunt aliqui, sed non ita se habere experientia convincitur, quapropter præstat ficus foris in ambitu circūplantare. Quintilij dicunt, Aprilī mense ficos, quæ radices egerunt, transferri è plantariis, etiā si iam germent



germen emittant. E. Latinis Cato ficos docet eximi bene cum radicibus cū terra sua quamplurima, circūligariq; vt ferri possint in alueo, aut in corbula. idq; maxime cauendū esse. nō effodi, aut feri, cum ventus fiet, aut imber. In scrobe cūm pones, summā terram subdi, postea radices operiri, pedibus, deinde fistulis, vectibusq; calcari quāoptime poteris, idq; esse ei rei primū, arbores crassiores quinq; digitis quæ erunt, eas præcisas feri, obliniri fimo summas, & foliis alligari. Columella hæc docet, Eiusmodi arbor cito conualefcit, si scrobes amplos, patētesq; feceris. Palladius verò, Calidis locis fici planta radicata Nouembri mense, temperatis Febuario, frigidis melius Martio, vel Aprili ponēda est.

- 20 Plantæ in scrobe depositæ lapides substernēdi sunt, ad radicē fimo terra miscēda est. Si loca frigida sunt, plantarū cacumina diuisis cannæ internodiis defendantur à frigore. Ego mēse Febuario vltimo, vel Martio in Italia plantas grandes ficorū per pastinatum solū disposui, & eo anno poma peperēre supra comprehendendi felicitatē, velut tributa reddentes. Legendæ sunt plantæ, in quibus frequens nodus extuberat. Steriles creduntur, quæ nitidæ sunt, & oculos suos per longa internodia distulerāt. Si plantā ficus prius nutriuēris in seminario, & maturā transferas in scrobē, poma generosiora producet. Aliqui multū prodesse cōfirmant, si plantā fici diuiso scyllæ bulbo interfitā, strictamq; vinculis collocemus. Scrobes amat altas, intervalla maiora. Plinius ē Theophrasto cæterisque, Ficus intervalla paulo amplius, quā pyrus, malus, & amygdala. Umbra ficorū leuis, quamuis sparsa, ideoq; inter vineas feri nō vetantur. Sicutum quidā ē diuerso affectant permutantes in contrariū. Densiores ita fieri folio, magisq; protegere fructum, & minus amittere, & sic etiā scansilem fieri. Si scylla (bulborū hoc genus est) seratur, ocyssime ferre traditur pomum, neque vermibus obnoxium: quo vitio non carent reliqua poma similiter sata. Ficus suas notas habet, cū folia pauca in cacumine acetabuli modo germinent, tunc maxime ferenda. Ficum etiam arbutis non sperni. Sed Plinius experientia, & tantorum virorum authoritati aduersatur. Theophrastus nanque, & Florentinus Græci, reliqui que agriculturæ scriptores, viti ficum molestam esse inquit, solus ipse inter vites feri nequaquam vetat.

Cato propagatione ficum feri posse docet. Pullos ab arbore abs terra, qui nascuntur, deprimendo, extollendoq; primorem partem, vt radicem capiat, ac biennio post effodiendo, & serendo. Palladius ficus ramis posse propagari etiam monet. Nos verò ficus ramos circa terram vsq; ad medullam incidimus, vt aptius deprimi possint, deinde in latum scrobē ramulos propagamus, sic quā plurimas arbusculas ex vno ramo biennio nanciscemur.

Didymus auulsione ficum nasci confirmat. Plinius docet. Sed cū auellitur cum perna sua, partemq; aliquam ē matris corpore quoque auferat secum fimbriato corpore.

- 40 Ficus feri etiā grandiori ramo docet Theophrastus, Malleo in humū illum adigente, vt exiguus supra terram relinquatur, deinde arena superiecta coope-



riatur, easque plantas meliores effici volunt, quandiu nouellæ extant. Sed ligno, veteriq; ramo exurgere non potest, cum enim partes mediæ siccæ, lignosæq; sint, difficile germinare possunt. Ex quibus verbis facile intelligi potest, ficum omnibus modis oriri apud Theophrastum, nisi ligno, veterique ramo. Sed libro historiarum secundo, modis omnibus præterquam ramo, & surculo: quod supradictis aduersatur: videbimus enim paulo post, quomodo surculo quamoptime exoriat, unde verbis eius mendum esse arbitror. pro ramo, & surculo, ibi reponendum, ligno, & veteri ramo. Plinius hæc verba perperam est interpretatus: nam verba Theophrasti vertens, Ficus (dixit) omnibus aliis modis nascens, præterquam talea. Quod est falsum, nam vt inferius videbimus, ficus optime talea plantatur. Sed ad rem redeamus. Plinius de ramo hæc vertit ex Theophrasto, Optime quidem, si vastiore ramo pali modo exacuto adigatur altè, exiguo super terram relicto capite, eoque ipso arena cooperto. Didymus, Si ramos melius velis ferere, prius in bubulo fimo madefacito.

*Ex talea.*

Seri talea docet Palladius, Taleam sic ponemus, vt cætera, cui leuiter ab infima parte diuisæ lapidem mergemus in fisso. Idq; vltimo Aprili, cum ei se viridior succus infuderit. Didymus etiam taleam plantari posse docuit. Sed si in altitudinem luxuriari nolis, clauam in caput serito. Plinius talea exire nõ posse scribit, cui continua refragatur experientia, etiam mulierculis nota: fictilibus enim vasculis de more plantant taleam, atque inuerso cacumine, vt pumiles semper ficorum plantulas habeant, fenestris asseruandas. Theophrastus addit, Lignum subtrus scindendum, & lapide iniecto ferendum.

*Ex surculo.*

Surculis, siue summis ramulis facile posse pullulare monet Theophrastus. Quia ficus habet humorem ingenitum, eundemq; seruare potest. Et humida superiori parte melius germinant. Habet enim ficus summa tenera, & humecta, unde facile potest germinare. Et ita pronus est ad germinandum ramus ficulnus, talia principia germinandi obtinens, vt defixus, germen sæpenumero emittat, quamquã pars ima nullis radicibus innitatur. M. Varro ait, Ficus propter molliciem fœmineam ad crescendo pronam: quare ex terra potius in seminariis surculos de ficeto expedit obruere. Vbi eas in seminario plantaueris, quomodo tuendæ sint, docet. In seminario quæ surculis consita, & eorũ molliora erunt natura cacumina, vt ficus. Ea summa integèda binis tabellis dextra ac sinistra deligatis, herbarq; elidendæ, & dum teneræ sunt vellendæ, nam aridæ factæ rixantur, & celerius rumpuntur, quàm sequuntur. Columella huiusmodi sationem etiam docuit, inquiens: Potes iam (si te cura pomorum tangit) vltimis ordinibus in ea vineti fine, quæ subiacet septemtrionibus, ne cum increuerint, obumbrēt, cacumina ficorũ depangere, quæ vel inseras interposito biennij spatio, vel si generosa sint, adulta transferas. Februatio mense ficulnea cacumina iã tumentia vtilissime ponuntur. Octobri verò ficorũ arbusculæ in seminariis putati, & ad singulos stylos redigi debēt, quæ tamē melius dū tenere sunt per germinationē pampinantur. Plinius modum operosius docet, In fico quidem



quidem dodrantales paxilli solo patefacto feruntur, sic vt descendant, quæ fuerint proxima arbori, duo oculi extra terram emineant. Oculi autem in arborum surculis proprie vocantur, vnde germinant. Hac de causa & in plantariis aliquando eodem anno ferunt, quos laturi fuere fructus in arbore, cum tempestiuè sati pragnantes inchoatos conceptus aliubi pariunt. Ita satas ficos tertio anno transferre facile. Palladius ex eo, Si cacumen velis ponere, trifulcum ramum bimum, vel trimum ab australi parte decidas, & sic obrues, vt diuisa cacumina, terra interiacente, velut tres surculos reddant. Idque vltimo Aprili, cum ei se viridior succus infuderit. Martio mense ficulnea cacumina  
 20 obruuntur vtiliter cum tumescunt, vt plantas faciant, si earum copia non abundat.

Attionis tempus ficum peculiare ver statuit Theophrastus ante germinationem. Ratio est, quod tempore illo vulnus facilè in cicatricem coit, & celerius coalescit; quippe cum ficus rara sit concretionem, & imbecilla, autumno, & circa Vergilias maxime laborat; quia tempestas illa sicca est, nec plagæ obducuntur, vnde arbor ingruente se humore in hiantes meatus putrescit, & hyemis superuentu vndique ei paratur pernicies. Cum rigatur germine magis viget, fructumque deterioremparit, præter Laconicam, quæ iugi rigatu gaudet. Excitato puluere magis adolescit, ac viret, ad quem vsum ficos suffodiunt, cum puluerationis opere indigeant. Plinius ex Catone iuber ficos ster-  
 20 corari debere Luna silente, sic etiam interpurgari. Sed Cato ficos interpretari debere, & in vinea altè succidi, ne eas vites scandant. Palladius verò assidua fossione gaudere scribit: per autumnum prodesse, si stercurus admoueas, præcipue de auariis: recidenda esse in fico, quæ aut putria, aut mala nata repereris, & ea ratione putanda, vt inclinata per latera expandi possit. Didymus verò, alios rubricam, alios cinerem radicibus adicere debere, inquit.

Fisso trunco protinus post sectionem inserendam ficum monet Theophrastus, cum siccissima sit: secus autem in vite fit, cuius natura adeo humida, vt aliquot ante dies cadenda ad futuram insitionem, ex ea fluat, quod nimium est. M. Varro ita transfert è Græco: Vitæ triduo antequam inserant, desecant, vt qui in ea nimius est humor, defluat, antequam inseratur: contra in fico, & si qua etiam horum natura aridiora, continuo. Sed circiter solstitium ficus etiam inseri solet. Cato inseri monet Luna silenti, post meridiem, sine vento austro, inter lignum & corticem, & per ver. Etiam emplastratur. Plinius ex eo; Antiqua inoculatio in ficis erat, & malis. Sed vitibus, ficisque media sicciora, & è summa parte conceptus, ideo illinc surculi petuntur. Ficus per ver tantum, Luna sitiente, id est sicca inseritur. Præterea post meridiem, ac sine vento austro. Ficus recastinare minime vtile. Tilia ficum recipit, omniq; genere inseritur. Emplastratio crasso cortici maxime conuenit, sicut est ficis.  
 40 Columella ficum inoculari optime posse docet, quia humidum succosum, & validum librum habet, nam & lactis plurimum mittit, & corticem robustum.



habet, optime itaque inseritur caprifici ramus. Aprili mense optime inseritur. Calendis Septembris ficorum arbores inocularantur. Idq; licet vel commodius facere superiore mense post idus Iulias, quo tempore etiam aliarum arborum nonnulli emplastrationem faciunt. Quomodo autem olea inseri possit, docerimus in Oliueto. Nunc ad Palladii placita veniamus. Aprili mense ficum debemus inserere inter corticē, vel si nouellæ arbores sunt, fisso ligno, quod statim operiendum est, & ligandum, ne ventus introeat. Melius comprehendūt, si circa terram recisa inserantur arbuta. Aliqui & Iunio mense inserunt. Surculus legendus est anniculus, inuicilis enim creditur maioris, vel minoris ætatis. Inoculari ficus locis siccis Aprili, humidis melius Iunio medio poterit, Octobri mense locis tepidis. Inseritur in caprifico, in moro, in platano, & oculis & surculis. Et fico inseritur morus. In versibus autem hæc habet,

*Persuadet moris tetrum mutare colorem*

*Ficus, & inuasit dat sua iura comis.*

*Se quoque miratur pingui grandescere succo,*

*Et solitum gaudet vincere poma modum.*

*Insignes foliis platanos, felicia mensis*

*Brachia, gaudentes vitis honore comas.*

*Ingrediens pingui se cortice maxima ficus*

*Seruat, & optatos implet adeptajunus.*

Leontius Græcus ficum moro, & platano inserendam suadet, non modo vere, sed æstate ad brumam vsque, Florentini auctoritate. Quod Diophanes roborat. Et inseri Octobri mense, & Apuli, & inoculari post idus Iulias docet Cassianus.

*Art.* Ut ficus præcoces ædat fructus, Democritus columbaceum fimum, piper & oleum adhiberi vult. Florentinus grossos columbino fimo, & oleo linebat. Apud nos verò cum ficus iam maturescit, ligna acu oleo peruncta ficum oscilla transfigunt, vt per aliquot dies maturationem accelerent. Palladius, Vt cito ficus maturet, succo cæpæ longioris cū oleo & pipere mixto vnge poma, quando grossi incipiunt subrubere. Sed Plinius diuerso admodū ab his artificio, ita præcoces producit ficus. Sunt & hybernæ quibusdam prouinciis sicuti Mæsiæ, sed artis non naturæ. Paruarum genus arborum post autumnū fimo contegunt, deprehensasq; in his hyeme grossos: quæ mitiore cælo refossæ cū arbore, atq; in lucem remissæ, nouos soles, aliosq; quàm quibus vixere, auidæ tanquam iterum natæ accipiunt; & cum venientium flore maturescunt, alieno præcoces anno, in tractu vel gelidissimo. Apud nos autem, quæ per intempestiuum hyemis aduentum ficus poma immatura in arbore remansere, fœno, aut frondibus inuoluimus, ne ea frigus perurat, incipiente vere se ostentari, nuda soli exponuntur, sic maturescunt alieno præcoces anno. Contra autem, si ficum, quamuis nō natura, seram facere vis, docet Columella. Cum grossuli minuti sunt, fructum decurito, iterum alterum ædet, qui in hyemem serā differt

maru-



maturitatem. Ex quo Plinius, Fici serotinæ fiunt, si primæ grossi, cum fabæ magnitudinem excessere; detrahantur: subnascuntur, quæ serius maturescunt. Ex utroq; Palladius, Si vis maturâ ficum serotinam facere, incipientes grossos decute, dum illis fabæ fuerit magnitudo. Democritus affirmat, si quis alterius rei effigiem delineare contendat, ea figura, quam voluerit referre, conscribat ficulneum oculū, & poma hac specie prodibunt insignita. Vt varios fructus vna ficus exhibeat, ita ut pomum altera parte nigrescat, altera candicer, iubet Leontius viticulas, ramulosq; ficuum, albæ videlicet, & nigræ, inter se vinculo distringi, ac torqueri, ita ut germina misceri cogantur, sic ut obruti, & stercoreati, & humoris rigatu adiuti, ubi prodire cœperint, germinantes oculi aliquo inter se annexu conglutinentur, ut compactum germen in vnum caudicem coalescat, qui bicolores ficus pariet. Alii tutius huiusmodi coitum moluntur. Ficulnea grana hac varietate nobilia linteolo deligata ferunt, & cum res postulabit, transferunt. Plinius hoc eodem modo à natura doceri ait, Semine raptim aurum fame deuorato, solidoq; & alui tepore madido, cum fecundo fimi medicamine abiecto in molibus arborū lecticis, & ventis sæpe translato in aliquas corticum rimas, vnde baccas simul vidimus discolorēs. Palladius. Vt etiam varios fructus vna ficus exhibeat, ramos duos nigræ & albæ arborum inter se ita vinculo stringis ac torques, ut germina miscere cogantur, sic obruti, & stercoreati, & humoribus iuti, ubi prodire cœperint, germinantes oculos aliqua inter se annexione conglutinas. Tunc germen adnatū parturiet duos colores, quos vnitare diuidat, diuisione cōiungat. Hoc eodē modo Theophrastus vitur in punicis. Nobis autē tutius, & celerius licebit, si vtriusq; ficus oculos albæ videlicet & nigræ, per media germina diuisos, atq; vna cōpactos stricte arbori ficus emplastrabis, sic discolorēs fructus pducet. Democritus docet, Si quis fici esu alio deiectionē moliri cupiat, veratrum nigrum cum lactuca marina, id est, rithymalo tritū, raditibus arboris quæ deponitur adhibeat, & quæ nascetur poma ventrē mouebunt. Pollere idem affirmat aduersus ferarū morsus pomum, quod antidoto theriacæ pubescens fuerit delibutū. Columella ut firmiores arbores, & feraciores sint, hæc tradit. Cū frondere cœperint cacumina fici, ferro suauina pdest amputare. Ac semper cōueniet, simulatq; folia agere cœperint ficus, rubricā amurca dilutā, & cum stercore humano ad radices infundere. Ea res efficit vberiorē fructū & farctum fici pleniorē, ac meliorem. Plinius ab eo. Fici cū frōdere incipiunt, si cacumina rami cuiusq; detrahantur, fertiliores, firmioresq; fiunt. Ex his Palladius, Cum folia incipiunt producere fici, ut fructum multum, & plēguem ferant, in principio germinis cacumina summa decutimus, vel illud tantum cacumen, quod ex arboris medietate procedit.

De ficus lapsu maturitatem præueniente, ac de remedio à caprificis accersito primum dicemus. Græcis *καπριφικία* dicitur, Latinis caprificatio. Ficum inter ceteras arbores maximè fructū amittere, antequā coquat, prodidit Theophrastus, cui auxiliū magnopere quæritur, vnde & caprificatio cōperta habet.

Morbi  
remedia.

De fructuum  
casu.



tur. Nam ex pomis annexis culices egredientes corrodunt, & peruia reddunt ficuum cacumina. Regiones quoque ad fructuum iacturam differunt, quippe cum in Italia iacturam fieri negent; quamobrem caprificandi vsus terræ illius incolis nullus penitus est. Nec in aquiloniis, & macrofis locis, vt Phalisco Megarenfis agri, & partibus quibusdam agri Corinthii. Flatuum quoq; conditio pari ratione referre videtur. Aquilonis, quàm Austrinis potius fructus decidunt, & si crebriores, vehementioresq; fuere, maior iactura sequatur necesse est. Item natura ipsarum arborum refert. Præcoces enim amittunt, serotinæ nequaquam, vt Laconica, & aliæ quædam. Quamobrem eas caprificari minime solent. Hæc igitur loci, generum, cœliq; ratione discrimen accipiunt. Culices verò ficarii e pomis caprifici egrediuntur: ex putrescentibus enim eorum granis gignuntur, cuius indicium afferunt, quòd postquàm euolauerunt, grana ficubus nulla penitus insunt. Euolant magna ex parte, pennam aut pedem relinquentes in pomo. Est vel alterum culicum genus centinæ vocatū, ociosum, quemadmodum fuci inter apes: & quos ex altero genere sua poma ingressos adspexerit, protinus necat: id verò suis moritur operculis. Laudantur caprifici potissimum nigra, ex locis ortæ saxosis, quod per multa ista grana contineant. Nescuntur, quæ aprè culicibus emerferint, quòd rubra, & versicolores, & robusta constant; contra, quæ minus aptè, alba, imbecillesque cernuntur. Apponuntur ficis, quæ scilicet eam operam desiderant, cum pluerit. Quin & polium culices gignit, cum copiosè fructificat. Et vlm. folliculis genus quoddam bestiolarum innascitur, quod cnipes appellant, qui cum in ficis gignuntur ficarios illos culices deuorant. Huius rei remedium caneros statuunt alligandos: in eos vertere sese culices inquirunt. Libro verò de causis hæc affert: Vt ficus non labantur fructus ante maturitatem, artis parata præsidia hæc erunt. Vt caprifici ferta ficuum ramis appendantur, vel caprificus in summo ficeti limine seratur, eas species obseruando, quæ fructibus ferendis cum ficuum speciebus conueniant: vt maturæ maturis, serotinæ serotinis, & quæ medio tempore fructificant, mediis coniungantur: ita tamen, vt culices ad ficos secundo vento deferri queât. Cuius causas sic inuestigato. Cum enim caprifici fructus perfici nequeant, & putrescentibus illis genus aliquod animalis generare necesse sit, culices generat: sed cum indidem alimentum sibi parare nequeant, migrant ad id auidè, quod simile est. Omnibus enim cognatæ rei natura desiderium iniecit. Sic ad ficus aduolant, crebroq; morsu oculorum labra aperientes, superfluum depascunt humorem, & subeuntibus auris iter patefaciunt, spirantiaq; poma efficiunt. Sed macro solo, boreali, puluerulento, & temperato, vt modicum suppeditet alimētum, caprificatio nulla est, desiccatur enim puluis. Plinius eadem à Theophrasto refert: Ficus sola ex omnium arborum fœtu maturitatis causa medicatur. Caprificus vocatur ficus, nunquam maturescens, sed quod ipsa non habet aliis tribuens, quoniam est naturalis causarum transitus, atq; e putrescentibus identidem generatur aliquid. Ergo culices parit



rit: hi fraudati alimento in matre, putri eius tabe, ad cognatam volāt: morfuq;  
ficorum crebro, hoc est auidiore pastu aperientes ora earum, atque ita pene-  
trantes, intus solem primo secum inducunt, cerealesq; auras immittunt fori-  
bus apertis. Mox lacteum humorem, hoc est, infantiam pomi absumunt, quod  
fit & sponte. Ideoq; ficetis caprificus permittitur ad rationē venti, vt flatus e-  
nolantes in ficus ferat. Inde repertum, vt illatæ quoq; aliunde, & inter se colli-  
gatæ iniicerentur fico: quod in macro solo, & aquilonio nō desideratur, quo-  
niam sponte arescunt loci situ, timisq; eadē, quæ culicum opera, causa perficit:  
nec non vbi multus puluis, quod euenit maxime frequenti via apposita. Nan-  
10 que & pulueri vis siccandi, succumq; lactis absorbendi: quæ ratio puluere, &  
caprificatione hoc quoq; præstat, ne decidant, absumpto humore tenero, &  
cum quadā fragilitate ponderoso. Et alibi: Caprificatione maturata, in ea culi-  
ces nasci è grossis manifestum est: quoniam cū euolare, non inueniuntur  
intus grana, quæ in eos versa apparet. Exeundi tanta est auiditas, vt pleriq; aut  
pede relicto aut penna pariter erumpant. Est & aliud genus culicum, quos vo-  
cant centrinas, fucis apum similes ignauia maliciaq; cum perniciē verorum, &  
vtilium. Interimunt enim illos, atq; ipsi moriuntur. Caprificorum laudantur  
maxime nigra, & in petrosis, quoniam frumenta plurima habeant: caprifi-  
catio ipsa post imbrem. In primis autem cauendum, ne ex remediis vitia fi-  
20 ant, quod euenit nimia, aut intempestiua medicina. Columella tempus docet,  
quo caprificatio fieri debeat, Augusto tempus est ficulneis arboribus caprifi-  
cum suspendere. Quod quidam existimant iccirco fieri debere, ne fructus de-  
cidat, & vt celerius ad maturitatem perueniat. Palladius autem, Mense Iunio  
circa solstitium caprificandæ sunt arbores fici, id est, suspendendi grossi ex ca-  
prifico, lino, velut ferra pertusi. Aliqui inter ficarias caprifici arborem ferunt,  
ne sit necesse per singulas arbores pro remedio eadem poma suspendi. Si hoc  
desit, abrotani virga suspēditur, aut callum, quod in vlmeis foliis inuenitur, aut  
arietina cornua circa arboris radices obruuntur, vel truncus arboris, quo loco  
turgent scarificandus est, quo possit humor effluere. Democritus ait, Caprifici  
30 grossuli, vel intorta ex iis ferra suspendantur, quapropter aliqui ramulum ca-  
prifici inserunt, & quotannis hoc idem tentant.

Accidit etiam ficubus (dicit Theophrastus) vt aliæ ante, vel post pluuias  
fructus amittant, aliæ deteriores reddantur arbores, putrefactæ strangula-  
tæq; humoris nimietate, aut contrā ultra modum exiccata penuria. Cato de  
eodem vitio, Ficus vti grossos teneant, ablaqueato, postea stramenta circum-  
ponito. Postea amurcam cum aqua commisceto & quas partes, & circumfodi-  
to. ad arborem maximam amphoram vnā commisti satis est. Et cū ver ap-  
petet, terram adaggerato bene. Si ita feceris, & grossi non cadent, & fici sca-  
bræ non fient, & multò feraciores erunt. Ex hoc loco Plinius, Cato & me-  
40 dicamenta quædam componit, mensuræ quoq; distinctione, ad maiorum ar-  
borum radices amphoram, ad minorum urnam amurcæ & aquæ portionem



æquam, ablaqueatis prius radicibus, paulatim affundi iubens, stramentis at-  
tea circumpositis. Præcipue veterem adaggerari terram radicibus: ita futu-  
rum, ut non decident grossi, maiorq; fœcunditas nec scabra proueniat. Suc-  
cus inutilis ficorum turgido cortice incisuris in obliquū leuibus emittitur, ita  
fit, ne decident fructus. Etiam radices circumcidisse prodest luxuriantium fi-  
corum, & circumcisis cinerem addidisse. Fici cum Vulcanalibus tonitru cadunt.  
Remedium est, ut antè stipula hordeacea area stringantur. Grossos non deci-  
dere Africanus pollicetur, si circum ablaqueatam radicem quaternos salis sex-  
tarios inieceris, dein terræ obruas aggere. Democritus asserit fici arborem fru-  
ctuū iacturam non facere, cuius caudex mororum succo sit illitus. Nec amit-  
tere velut ægram pomū, quum marino fucoradix obducitur, aut si quadrantibus  
lunæ rubrica caudices oblinantur. Si Pleiadum emerſu in excauatos scro-  
bes quis pares aquæ, & insulsæ amurcæ porciones infundat circum caudices,  
arbor sui fructus tenax pomum non abiiciet. Vnde Palladius: Si fructus suos  
velut ægra proiiciet: alii rubrica, aut amurea insulsa mista aqua arborem li-  
niunt, vel cancrum fluuialem cum ramo rutæ suspendunt, vel algam mari-  
nam, vel fascem lupinorum, vel radici terebratæ cuneum figunt, vel securi ar-  
boris corium sæpe proſcindunt.

De vermi-  
culatione.

Nunc ad alios morbos accedamus, & primo de vermibus, qui in ficu-  
bus gignuntur. Nam et si communis arborum morbus vermiculatio sit, Theo-  
phraſto authore, omnino tamen in arbore ficus peculiaris est. Et vermium,  
qui ficorum proprii sunt, alii ex ipsis arboribus nascuntur, alios parit vermis,  
qui cerasites vocatur, omnes tamen in cerasitem abeunt. Stridulum animal,  
& exiguo sonitu constrepens. Hic in olea nascitur, & in fico parit, unde ha-  
bet ficus & suos vermiculos, & illos quoque enutrit, quos alienos recepe-  
rit. Sed omnino, quæ lentisco inserta mandantur terræ, vermiculationem  
non sentiunt, odoris, feruorisque causa. Præterea fici fructus etiam vermi-  
bus infestantur, & quoties hic morbus accedit, pereunt. Conducibile est ci-  
nerem ficuum apponi radicibus, arcer enim sua siccitate à radicibus tabem,  
& vermiculationem. Plinius idem, quod Theophrastus: Maxime autem ar-  
borum vermiculationem sentiunt fici. Eorumq; qui in ficis existunt, alii na-  
scuntur ex ipsis, alios parit, qui vocatur cerasites, omnes tamen in cerasitem  
figurantur, sonumque edunt paruuli stridoris. Vexant & tinea semina fico-  
rum. Contra quas remedium, in eodem scrobe defodere Italicam lentiscum,  
inuersa parte, quæ fuerit à cacumine. Ficus asperguntur ruta, ne fiant vermi-  
nosa, neve radices putrescant. Sed quomodo vermibus liberentur, cum viu-  
radices plantamus, iam diximus. Si autem nati sunt in arbore, hoc remedio  
eos arcemus. Didymus, Calce latebris vermium, aut radicibus inspersa, ne-  
cantur. Palladius alia affert remedia: Ne vermes patiat, ramum terebin-  
thi, vel lentisci taleam, cum plantis fici cacumine ponemus inuerso. Vncinis  
arcis tollendi sunt vermes ex fico. Alii amurcam, alii veterem urinam abla-  
queatis



queatis radicibus miscent. Alii bitumen, & oleum, aut solam calcem viuam labris vermium inspergant.

Gigni & culices (Theophrastus scribit) in aliquibus arboribus, vt in robo- Culices & formica.  
re, & fico, & consistere ex humore videntur corticibus subdito, gustu dulci. Plinius ex eo interpretatur, Sunt & culicum genera aliquibus molesta, vt glandibus, fico, qui videntur ex humore nasci, tunc dulci, subdito corticibus. Diophanes contra formicas, Quidā piscem appellatum coracinum ex arbore suspendunt, atq; sic formicas disperdunt. Palladius ab eo, Si formicæ molestæ sunt, rubrica, butyro, & pice liquida mista circa truncum debet induci. Alii coracinum piscem contra formicas in arbore suspendendū esse confirmant. Sed Cælius Rhodiginus variæ vir eruditionis Palladii locum ita corrigebat. Legebatur prius in veteri exemplari non coracinum piscem, sed coracinam-picem, vt differret à resina, quæ alba pix est, sic ex Græco Diophane coracinum-piscē substituit. Sed ego cum Rondeletio male commutatum locum existimarem, quippe se expertum dixit, coracinum piscem formicas non arcere, quod etiam ego comperi experientia falsum. Plinius inter fortuita miracula refert, in Boëtia derolas à locustis ficus iterum germinasse.

Scabies, & cochleæ adnasci solitæ ficorum peculiare sunt, scribit Theophrastus. Non tamen id eis vbique accidit, sed his morbi quoque ratione lo- Scabies & cochleæ.  
corum euenire videntur, quemadmodum animalibus. Nam apud aliquos scabies nullo modo molesta est, vt nec circa Æneam. Sed hūc morbum ex nimio humore prouenire Chelidemus est author. Cuius remedium esse potest, vt nimia alimenti vberitas detrahatur, quemadmodum aliarum arborum luxuriam cohibere solemus, vnde cum ficus germinare incipit, putetur ne sua opacitate succum percrasset. Sunt qui scabiem alia ratione fieri arbitrantur, id quæ Vergiliarum exortu ex minutionibus pluuiis initium capere, quæ vbi insederint, referuescentes erumpunt vt pustulæ, id namq; imbre largiore non fit, eò quod vberiores aquæ tum arboris sordes, tum seipsas eluunt, atq; etiam fortasse subeunt, vnumq; sunt intus cum naturali succo. Plinius ex Theophrasto hæc interpretatus est: Scabies communis omnibus est. Et quæ adnasci solent cochleæ, peculiaria ficorum vitia; nec vbiq;. Sunt enim quædam ægritudines & locorum. Scabies gignitur roribus lentis post Vergilias. Nam si rariores fuere, perfundunt arborem, non scalpunt scabiem. Leontius Græcus ait: ficum, si scabie afficitur, curari scylla iuxta eius radices plantata, aut rubrica aqua diluta, circa ipsius truncum oblita.

Theophrastus ait, Ficus maxime radicationem, & cradationem noscit. Radicatione & cradatione.  
Vocant radicationem, cum radices marcidæ contabescunt: cradationem cum rami, quos priuatim cradas in sicu vocant, vnde & morbo nomen. Plinius hæc perbellè transfert: Vt homini neruorum cruciatus, sic & arbori, ac duobus æque modis. Aut enim in pedes, hoc est, radices erumpit vis morbi; aut in articulos, hoc est, cacuminum digitos, qui longissimè à toto corpore exeunt;



inascunt ergo, & sunt apud Græcos sua nomina utriq; vitio. Vndiq; primò dolor, mox & macies earum partium fragilis, postremo tabes, morbusq; non intrante succo, aut non perueniente: maximeq; id sentiunt fici.

*Vredo & tabes.*

Sunt & affectiones quedam temporariæ (Theophrasto auctore) aut aliàs per se euidentēs, quæ & necare arbores solent: & præcipuè ficus iis infestatur, quas morbos non dixeris, sed tabes, & quod vredinem appellant. Ex flatibus eueniunt, qui exurere solent, vt in Chalcide Eubœæ Olympias cùm ante solstitium frigidus flauerit, aut post hyberna solstitia; arbores enim aridas reddit, vt ne sol quidem diu reddere ita possit. Hæc sæpe aliàs, & Archippo Athenis magistratu anno quadragesimo facta vehementissima proditur. Laborant maxime loca concaua, & inter valles, & fluminibus vicina, & quæ ab omni afflatu penitus silent. Plinius ita vertit: Quædam temporum causæ, aut locorum nō proprie dicuntur morbi, quoniam protinus necant, sicut tabes cùm inuasit arborem, aut vredo: vel flatus alicuius regionis proprius, vt est in Apulia Atabulus, in Eubœa Olympias. Hic enim si flauerit circa brumam, frigore exurit arefaciens, vt nullis postea solibus possint recreari. Hoc genere conualles, & opposita fluminibus laborant, præcipueq; ficus.

*Frigor & calor.*

Sunt etiam morbi à Theophrasto descripti, qui aëris excessu eueniunt, frigoris, vel caloris, sed plures squalore percutiunt, exugitur enim naturalis calor vitæ frigoris, qui simul cum humore expirat, & maxime arborum partes, quæ supra terram quasi præsidio nudatæ intereunt, quæ verò terra reguntur, eius obicis beneficio frigorū iniuriā arcant. Sed tanta est interdum frigoris immanitas, vt ne illæ quidem partes ab iniuria liberæ sint. Quamobrem coloni, apud quos id euenit, his remediis occurrunt. Plantam modicis operiunt glebis, satisq; est partem obtegi ad totius tuitionem. Aliud est, ficus incrementa prohibere: quod fiet attonsiōe: ita nec multum distabunt à radice partes. Quidam summa capita operiunt, vt in Ponto, & Media, nam si à vertice noxa incipiat, eo seruato reliquæ partes seruabuntur.

*Syderatio.*

Plinius: Proprium syderationis est, abortu canis siccitatum vapor, cùm insit, ac nouellæ arbores moriuntur, præcipuè ficus. Theophrastus etiam de syderatione tradiderit, oblitus est ficus, videtur tamen ad Plinii assertionem accedere.

*Sterilitas.*

Theophrastus si arbor fructus non fert, sed se totum in germina vertit, partem caudicis infimam scindit, atq; lapidem interponit, ita fructificare posse asserit. Ficorumq; non solum radices amputari, verum etiam obducto cinere obstrui, ac passim caudicem scindi præcipit, sic copiosius fructu dari affirmat. Quod euenit nimia humorum vbertate, alimentique copia. Palladius hoc remedio utitur: Cum ficus locis humidis sita fructus obtusi saporis producat: huic circumcisis radicibus, aliquantus cinis affundi debet.

*Si non fructificet.*

Ficus non solum caudicis scissionem tolerat, sed fissiōem sine vitæ detrimento patitur. Theophrastus asserit causam, Elle succi copiam, quæ sui sub-

stantia



stantia subuenit in defectæ partis locum, & glutinosa qualitate, qua rursus dis-  
sitæ partes coalescere possint. Plinius ex eo: Intereunt pleraque & fissa stirpe,  
fico excepta.

Circumablato cortice tardius cæteris ficum interire prodidit Theophra- Circūab-  
latis cor-  
ticis.  
stus. Sed apud Heracliam Trachianam ficum restitui, regerminareque potuis-  
se proditum est. Medentur luto fouentes, arundinibus & id genus stramen-  
tis operientes, ne frigore, vel æstu subarescant. Sed quam nos inuenimus me-  
delam supra docuimus.

Dicemus primo viridis quomodo seruetur, mox passæ ad vetustatem. Ra- Cõditura.  
tionem seruandarum ficum recentium, non secus quàm in propria parente  
nobis Africanus explicuit: Ficus vbi maturitatem conceperint, reliquorū po-  
morum modo in matre cohærentes non immanent, sed caducæ dilabuntur,  
& si quoq; nemo decusserit. Musteas perinde quasi in parente seruari ad hunc  
modum constat. Cùm vinaria dolia operculantur, in nouum fictile nō rotun-  
dum, sed potius ex arbitrio quadratum, fundoq; fultum, missæ recentes ficus  
minus maturæ cum suis pediculis, vmbilicisve, hoc est particula, qua arboribus  
suis dependent lectæ, à se sic vt bene intercedat spatium secretæ recluduntur,  
& in doliō vini pleno diligēter operculato natare permittuntur, & nisi vinum  
contrahat acorem, tali habitu mansisse comperies, quali constabant, quum in-  
iectæ fuerant. Recentes quoque seruari possunt singulæ intra viridem cucur-  
bitam clausæ, loculis vnicuique cauatis, & item spleniata, quæ secatur, tessera  
cōclusis, suspensa ea in vmbroso loco cucurbita, vbi nec ignis, nec fumus inspi-  
ret. Verum vti antea dictum est, legendæ cum petiolis, quippe quæ diutius du-  
rent integræ. Alij sic in melle disponunt ficus, vt neque se inuicem, neque vas  
tangant, dein indito operculo sinunt. Alij calicem vitreum, aut aliud quoduis  
perispicum poculū, super ficos leniter inuertunt, & obducto cera spiramen-  
to ita relinquunt, sic manent immarcidæ. Palladius ex his transcribit: Ficus vi-  
rides seruari possunt, vel in melle ordinatæ ne se inuicem tangant, vel singulæ  
intra viridem cucurbitam clausæ, locis vnicuique cauatis, & item tessera, quæ  
secatur, inclusis, suspensa ea cucurbita, vbi non sit ignis, vel fumus. Alij missas  
ficas recentes minus maturas in nouo vase fictili lectas cum pediculis, & à se  
separatas recludunt, & in doliō vini pleno vas natare permittunt.

At quomodo siccæ condantur, videamus quid doceant maiores nostri. Ca-  
ro docet: Fici aridæ si voles vt integræ sint, in vas fictile condito, id amurca de-  
cocta vngito. Et si ramos ficulneos voles cum fructibus seruare, cum foliis in-  
ter se alligato, fasciculos facito, eos in amurcam demittito, supraster amurca  
facito. Sed ea, quæ demissurus eris, sumito paulo acerbiora. Vas, quo condide-  
ris, oblinito planè. Docet Paxamus aridas ficos, quas vocant ischadas, à putril-  
agine vindicari hac ratione. Passæ sine vllo cariolæ labis sensu integræ mane-  
bunt, si tribus liquida pice imbutis vna in fictilis fundo collocetur, altera refer-  
to ficubus ad medium vase, tertia faucibus iam completo superponatur. Plu-



rimo tempore sanæ, & à vitio intactæ comperiuntur, si in tegete, qualo, vel  
 cratibus inditæ fici calefacto furno post exemptum panem propendeant, &  
 in fictilem, & bene picatam fideliam cōdantur. Sed eas cum fundo, cui resides  
 hærebant, eximere conuenit, & candente muria ex oleo in sole rigare, condi-  
 tiuasq; collito vase luto, noctem vnā roris imbre sub dio conspergi, demum  
 in cellas deferri. Alij cratibus expandunt toto sole siccandas, & recipiunt no-  
 cte sub tecta. Columella ita monet, Ficus neq; nimium vieta, neq; immatura le-  
 gi debet, & in loco expandi, qui toto die solem accipiat. Pali quatuor pedibus  
 inter se distantes figuntur, & perticis iugantur, deinde cannæ iugis superponun-  
 tur, vt duobus pedibus absint à terra, ne humorē, quem noctibus remittit hu-  
 mus, trahant, tunc ficus iniicitur, & crates carice textæ ex vtroque latere super  
 terram planæ disponuntur, vt cum sol occiderit, erigantur, & inter se acclues  
 inarescentem ficum à rore, & pluuia defendant. Cum aruerit, in orcas picatas  
 meridiano tempore calentem ficum condere, & calcare oportebit, subiecto  
 arido feniculo, & iterum vasis repletis superposito, quæ vasa confestim oper-  
 culare, & oblinire conuenit, & in horreum siccissimum reponi, quo melius fi-  
 cus perennet. Quidā lectis ficis pediculos adimunt & in sole expandunt, cum  
 paulum siccata sunt, antequam indurescant in labra fictilia congerunt, & pe-  
 dibus proculcant, iisque admiscunt torrefacta sesama, cum aniso, feniculo, &  
 cymino in modum farinæ redacta. Hæc cum calcauerint, & fici massam pulue-  
 ri permiscuerint, modicas offas ficulneis foliis inuoluunt, ac religatas iunco re-  
 ponunt in crates, inde cum peraruerint, picatis vasis condunt. Nonnulli for-  
 mam fici orcis non picatis includunt, & oblito vasa clibano torrefaciunt, quo  
 humor excoquatur, sic in tabulatum reponunt, & cum exegerit vsus, testam  
 comminuunt. Alij pinguiissimam ficorum viridem eligunt, & diuisam digitis  
 dilatant, ita sole arescunt, quas meridianis teporibus siccatas, cum calore solis  
 emollitæ sunt, colligunt, & vt mos est Afris atque Hispanis, inter se compo-  
 sitas comprimunt in figuram stellarum, vel aliā redigentes, rursus sole assiccant,  
 & in vasis recondunt. Plinius in foliis verbasci scemina fici omnino non pu-  
 trescere ait. Honos laudatas seruat in capsis. At vbi copia adundat, implentur  
 orcæ in Asia, cadi autem in Ruspina Africæ vrbe, panisq; simul, & obsonij vi-  
 cem siccate implent, vt pote cum Cato cibaria ruris operariis iusta ceu lege san-  
 ciens, minui iubeat per fici maturitatem. Palladius verò ex Martiale dicit: Cari-  
 cas per genera multa seruari, cum ratio vna sufficiat. Ergo hoc genere, quo Cam-  
 pania tota custodit, seruare debemus. In cratibus ficus expanditur vsq; ad me-  
 ridiē, & adhuc mollis in qualū refunditur. Tunc calefacto furno ad panis co-  
 quendi modum, supposita tribus lapidibus ne ardeat qualus includitur, & clau-  
 so furno vbi discocta fici fuerit, sicut est calida, interpolatis foliis suis, in vas  
 fictile cōditur bene picatum, densius pressa, & operculo diligenter obducitur.  
 Si pluuiis abundantibus crates non possis expandere, sub tecto eas ita ponis, vt  
 semipede erigantur à terra, & eas ad vicem solis cinis calidus subiectus vaporet,  
 & sub-



& subinde ficus, sicut est diuisa, vertatur, vt ficarum coria siccantur, & pulpæ tunc duplicatæ in cistellis seruentur, aut loculis. Alij maturas mediocriter fectus, & diuisas in cratibus expandunt toto sole siccandas, & recipiunt eas nocte sub recta. Pherecrates Athenæi testimonio nigras caricas improbat.

Fici materies, quibus idonea sit, ex Theophrasto excipimus. Rara est corpore, rectis idonea. Valida & in rectum protendens. Fico fumus acerrimus, caprificoque, item cuiusque lactis cremor redundat, atque hæc ipsa tamen aqua infusa madefacta detracto cortice, mox siccata, minime omnium tædio illo infestant, quin & flammam quoque mollissimam reddunt, lixiuium quoque, cineremque vehementer asperrimum. Ignem excipere optimam ficum, & oleam contrariæ causæ faciunt. Ficus quia lenta, fungosaque materies, olea quia pinguis, & densa. Plinius verò: Ficus scutis faciendis aptissima, quorum plaga contrahit se protinus, clauditque suum vulnus, & ob id contumacius transmittit ferrum. Queritur etiam à Plutarcho in symposio lignum fici crematum cur acerrimum fumum faciat, & eius cinis ad detergendum maxima vi præditus sit.

*De moro. C A P. XVII.*

**S**E offert morus, cum eius fructus intus ficus instar minuta grana cōtineat: principio syluis degens neglecta, nostra autem tempestate serici velleris gratia non solum in nostris villis eius arboris plantaria instituiamus, sed in viridariis cum malis medicis, & citriis vnà serimus. Nos prius mirificum lanificium commemorabimus. Bestiola sunt, quas Græci seres appellant, Latini bombyces, oua pariunt, è quibus vere appetente chartæ, vel linteolo adhærētibus solis radiis, vel hypocausto, vel pectoris calore vermiculi excluduntur, qui mori foliis vescuntur, quo grandiores facti, vellus, quo turgēt vterus, pedibus explicantes nent, se inuoluunt, ac inuolucra conficiunt, idque quadraginta diebus à Vergiliarum exortu ad solstitium. Postquam suum nendi munus obierunt, moriuntur, mortui testacea tunica obducuntur, aliquot post diebus reuiuiscunt, ascitis alis in volucres papiliones verruntur, hi assidue insidentes, coeuntesque relictis ouis, piscium ouis haud dissimilibus, quibus rediuiua proles sequenti anno renascatur, iterum moriuntur, ex inuoluctis vellus netur, quo pretiosa linea cōtexuntur. Mori arborē Plinij ætate eximiam adamant Pællienus Crispus, bis consul, orator, Agrippæ matrimonio & Nerone priuigno clarior postea, osculari cōplectique eam solitus, non modo cubare sub ea, vinumque illi affundere Hegesander (referente Athenæo) posteritatis memoriæ mandauit, sua ætate moros viginti annos non tulisse fructum, quo tempore articularia lues tanta grassabatur, vt non viros modo, sed & mulieres quoque, & spadones in discriminatim corripuisset. Mori fructus primitus tantum albos fuisse Poetæ fabulatur, postea Pyrami, & Tyibes amantiū sanguine tinctos. Vnde Ouidius,

— *Arbor ibi nuncis vberima pomis*

*Ardua morus erat, gelido contermina fonti,*

*Arborci sæuis aspergine cadis in aëram*



*Vertuntur faciem, madefactaq; sanguine radix*

*Purpureo tingit pendens mora colore.*

**Nomen.**

Græcis arbor *συκαμνία*, pomum *συκάμνον* dicitur. Alexandrinis *συκάμνος*, & Nicandro in Georgicis *μορέα*, Athenæo referente. Sed à Iulio Polluce ea tantum, quæ ex rubis nascuntur. Latinis arbor morus, fructus morum dicitur, à mora, ut quidam putant, quod omnium postrema germinet. Sunt tamen, qui à Græco nomen deriuent *μαυρόν*, quod nigrum significet. Itali *moroni*, & *celsi* vocant.

**Forma.**

Et si cum multæ sit notitiæ, nihil operosius demonstranda foret, tamen ne quæ ex veteribus, tum Græcis, tum Latinis accepimus desiderentur, ea in medium afferenda duximus. Theophrastus ita format: Moro flos vitigineî modo lanugineus, fructui toti, nec postremis tantum insidet; in mediis inculcatus, neque singulas partes ambit, fallens interdum propter lanuginem, ut con- cerni nequeat. Fructus ex humore, & carne constat, lævis, laxus, & præ arboris magnitudine pusillus. Succus vinosus. Præpropere suos fructus perficit, humoris obsequio, & fructus nuditate, cum omnium tenuissima cuticula am- ciatur, facile solis impressiones transmittit, celeresq; progressus ad maturita- tem facit. Mnestheus author est: Mori germinatio sera, maturatio cita, hæc pro- pria imbecillitate, illa loci frigiditate. Diu enim vires colligit, inde virium col- lectarum impetu factò, tam celeres progressus ad germinationem facit, ut so- nitum facere videatur. Fructus statim ab ortu candidus, mox rubeus, cum ma- turuerit, ater, sic succus primùm acerbus, deinde acutus, tum dulcis: cum enim albescit, acerbus sapor sentitur, secundo rubescens, acutus, ultimo dulcis est: rubescens autem acutioris saporis est quàm cum albescit, quia tunc ad maturi- tatē propius accedit, cum verò albescit, acerbus sapor, quia remotior est à dul- cedine: qua de causa morum albescens siccus est, rubescens humectus, ceu iam succum, saporemq; suum adipisci cœperit. Particulatim fructificat, unde diutius durat. Et si serotino germine, nihil tardius, quàm cætera folia de- perdit. Plinius ex Theophrasto: Moris succus in carne vinosus, trini colores, candidus primo, mox rubeus, maturis niger, tingunt manus succo matura, e- luunt acerba. Carne & succo cōstant, cartilagine, succo vinoso, & sanguineo. Et si nouissime germinat, cum primis folia dimittit. Serotino germinatu flo- ret, maturatq; celeriter, nam nouissima urbanarum germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum. Sed cum cœpit in tantum vniuer- sa germinatio erumpit, ut vna nocte peragat etiam cum strepitu. Unde datur finiti frigoris indicium, cum germinare videris morum, iniuriam postea frigo- ris timere nolito. Tardissime senescit, fructibus minime laborans. Hæc Pli- nius. Quin postrema omnium germinat, ideo gelu non patitur, ob id diuinus Vates, ut ostenderet Israëlitarum populorum arbores omnes esse gelu con- sumptas, dixit, Occidit moros eorum in pruina. Fructum mollem Æschinus esse dixit, Athenæo authore, de Hectore loquens,

*Erat*



*Erat vir ille mollibus maturior moris.*

Trini colores in mori fructibus ab eodem describuntur in Cressis.

*Moris & albis, & nigri succi simul*

*Grauaturs arbor, atq; pictis murice.*

Et Sophocles:

*Videbis alba mora primum, postea*

*Mori rubescunt fructus, atque pinguntur.*

Nos morum in duo genera partiemur: in albū, & nigrum, scilicet sylvestre, Sylva.  
& urbanum: nam nigrum sylvestre genus videtur. Album veteribus Græcis in-  
20 nominatum, & Latinis etiam præter Quidium, nigri genera nullo alio modo  
differre videntur, quàm pomi magnitudine. Romæ (Plinius ait) Ostiensis, &  
Tusculana. Album in duo partiemur, in albū vulgare, & albū sapore & forma,  
sed colore nigrum. Hoc genus non pridem Neapolim allatum. Album radici-  
bus diffunditur longioribus. Ramis maxima petulantia distenduntur. Corpore  
crescit ampliore, ac proceriore. Folia læuiora, tenerioraq; citius senescens ob  
eximiā fecunditatem. Ante villæ domus fores nos plantamus, ut dum rustica  
opera exercent coloni, à solis æstu defendantur. Longè verò à cisternis, nam  
humiditatis auida improbo reptatu per longam distantiam petit, & penetrat,  
& muros frangit.

30 Palladius calida loca amare scripsit, vel maritima. Plinius plana diligere, nec  
temere in montibus conspici. In temperatis etiam nascitur, in frigidis nequa-  
quam, & præcipue alba, quæ montibus non nascitur. At si quis in frigidis sere-  
re velit, meridiei saltem, vel orienti exponat. Brutius in suis maritimis multas  
alit, ad explendos fronde bombyces. Colum.

Palladius fabulosa loca quærere scribit. In topho, vel argilla vix cōprehen- Solum.  
dere. Nos in dirutis ædibus serimus, quia cementis gaudet. Si quis fructus cau-  
sa, serat sicco loco, ita sapidiore fructus enascentur: Si verò frondis causa, pro  
vermibus sericeis velleris depascendis, humidis locis, vel qui irrigari possunt,  
nam & frondibus maioribus, læuioribus, delicatioribus, & quæ melius conser-  
40 uabuntur luxuriabit, eisq; libentius vermes vescuntur.

Palladius mora semine nasci scripsit, sed poma, & virgulta degenerare. Na- Satis.  
sci & semine poma Beritius Græcus tradidit, si granula delecta deponantur, sed  
rigari continuo desiderant. Columella plantas ab Idibus Februarij ad equino-  
ctium vernū recte feri debere. Ex quo Plinius, Seritur & viui radice. Palladius  
scribit, Plantam si robusta est transferes mense Octobri, vel Nouembri: si te-  
nera, Februarij & Martio. Scrobes desiderat altiores, interualla maiora, ne al-  
tera umbris prematur alterius. Morus amica est & vitis. Beritius duobus tēpo-  
ribus plantari, autumnō & vere. Plinius feri debere ab idibus Februarij in æ-  
quinoctium. Propagationis vsus apud nos præualet. Nam virgas humotenus  
50 natas propagamus, ac post triennium à parente recidimus, & transferimus.  
Seritur (ut Beritius est author) ramis ficulnorum modo terræ defixis. Quod



Didymus confirmat. Sed Plinius morum talea tantum feri ait, quoniam ramo eam feri prohibet religio fulgurum. Talea Didymus morū plantari posse scribit. Beritius præstare: si talea plantetur. Palladius feri taleis sesquipedalibus ait, ex utraque parte læuigatis ac fimo oblitis, cū locum palo ante fecerimus, tū immingimus, ac regimus cinere terris admisto, non amplius quā quatuor digitis operimus. Seremus à medio Februario, & toto Martio: locis verò calidioribus Octobris postremo, vel Nouembris initio, sed verno maxime, die nono calendarum Aprilium. Beritius etiam à claua plantari dixit, & ramulis ficulnorum modo terræ defixis. Palladius cacuminibus feri posse docet. Sed vñtata est apud nos satio cacuminibus à summo recisis. In vitreis enim cum vires propagantur, virgas mori apponimus cum propaginibus simul, triū, vel quatuor pedū longitudine, vno super extante, post verò triennium, vel quadriennium vegetiores factas transferimus in moreta.

*Cultus.*

Palladius assiduum humorem moris prodesse non credit, fossionibus laturari, & stercoreari. Putrida in his, & arida post triennium putāda. Circa Octobris calendas ablaqueandas, & radicibus eius vñi veteris recētissimās faeces infundendas. Beritius ait: Vegetior prouenit, ambiente solo sapius effosso: siquidem altis radicū tenuis fossionibus laturatur. Qui frondes carpunt pro vermibus debent à virgarum cacuminibus manus abstinere: nam si cunctis frondibus fuerit spoliata, & fructificationē intermittit, & inutiles fructus producit.

*Institio.*

Plinius minimum ingenia in hac arbore profecisse dixit, nec nominibus, nec insitis. Beritius scribit morum inseri castaneæ, & fago, item populo, quæ sit alba, si vel inoculetur, vel inseratur, & candida nasci poma. Diophanes verò in castaneam, fagum, malum, terebinthum, pyrastrum, vlmum, & populum albam, à qua alba mora reddi. Recipere ficum, pyrum, & citrium, & rubicunda mala producere. Nos nigrum in album inserimus, vt citius incre scat arbor, ac valentius frondes producat, pro bombycibus saturandis. Palladius in ficus inseri scribit, & in se tantum sub corice. Vñmo insita comprehendit, sed pasturæ magnæ infelicitatis augmenta: In versibus verò:

*Mutua quin etiam moris commercia ficus  
Præstat, & oblatum robore germen alit.  
Fraxinus huic auida confert sua membra sorori,  
Et metuit fœtus sparsa cruore novos.  
Proceras fagos, & poma hirsuta virentis  
Castanea, duris aspera mala comis  
Inficiens, monstrat piceo nigrescere parui,  
Et succo pascit turgida poma novo:  
Obsequitur moris blando terebinthus odore;  
Et geminis veniunt munera mista bonis.*

*Ars.*

Palladius feracē, latiorēq; arborē mori fieri aliquos tradidisse scribit, si perforata hinc inde trūco, singulos cuneos inseramus terebinthi hinc, inde lēuisci.

Beritius



Beritius seruari diutius vitreo vase, suo vino demersa, & diligenter operata, *Coditura.* tradidit.

Mnestor apud Theophrastum calidā esse morum prodidit, quod ex ea fac- *Materia.*  
 re ignaria soleant. Spissa, simulque lenta est. Post cupressum, ac thuiam æter-  
 nam potissimum arbitrantur, ac validā, atq; vetustate, loti modo, nigrescere,  
 ideo surculas ex ea, circosq; faciunt. Item nauibus tornacula: similiter & auri-  
 culas liburnicis, & testudines, atq; firmamenta. Materies utilis operibus, quæ  
 flexu constant, eiq; hac in re primatus datur. Plinius ex Theophrasto hæc ha-  
 bet: Morus ossea tota est. Calida est, vt omnis, ex quibus ignaria fiunt. Est ei  
 20 lentitia sicca, sed ponderosa. A cupresso proxime laudatur ad æternitatē, quæ  
 vetustate etiam nigrescit. Mirum, cortex in moro medicis succū quærentibus,  
 ferè hora diei secunda, lapide incussus manat, alius fractus siccus videtur.

*De persicis, & primum de præcoci.* CAP. XVIII.

**I**A m poma, quæ semina, vel grana intus continebant, exposuimus. Nunc  
 de offigeris pomis, & primum de iis, quibus singula insunt ossa: & à persicis  
 auspicabimur, tum quia apud nos maximo sunt in honore, tum quia parum de  
 his maiores nostri tetigerunt. Nos persicorum genus in quatuor species dini-  
 demus, secundum Palladij sententiam, scilicet in præcocia, armeniaca, persica,  
 & duracina. Commodius enim, & clarius sub his generibus omnium species  
 20 commemorabimus, vt nil omittatur, quod ad horum historiam fructuū perti-  
 nere possit, principiumq; nostrum à præcocibus erit, cum & fructus nobilita-  
 te, & temporis prioritate antecedere debeant. Narrat Plinius præcocia intra  
 triginta annos reperta esse, & primo denariis singula venundata. Galenus ex  
 genere persicorum præcocia esse, & nonnihil ea superantia, nec in ventriculo  
 corrumpi, vt illa, nec acescere, & esse suauiora, ac stomacho gratiora.

Dioscoridi *μῆλα ἀρμενιὰ* dicuntur, atq; à Latinis *æγικόνια* dici narrat. Idem- *Nomen.*  
 que ait Galenus ab eo mutuatus, tamen sua ætate non plus armeniaca nomi-  
 nari, sed vtramque speciem sine vlllo discrimine *æγικόνια* dici: attamen ab ar-  
 meniacis *æγικόνια* differre, & hæc illis multo esse præstantiora. Sed Plinius, &  
 30 Palladius maximam differentiam faciunt, reorq; magis Latinis de Latinis no-  
 minibus, quàm Græcis de Latinis differentibus fidem adhibendam. Plinius ait:  
 Florent post amygdalam armeniaca, & præcocia. Neapolitani *albergio* vocant,  
 Bononienses *umbiliaco*.

Dioscorides, persicorum forma, sed iis minora facit. Plinius: Primam om- *Forma.*  
 nium florere amygdalam, ab ea proximè armeniacam, dein tuberes, & præco-  
 ces. Nos ita describemus. Arbor non sanè procera. Foliis nigra populi mucro-  
 natis, & per ambitum serratis, ternis, quinisve simul emergentibus. Flore albo  
 cerasi. Fructu persicorū forma, non autē magnitudine, nam longe minori, pru-  
 norū simili, cute itidem, & odore, sed præstantiori, os intra se cōcludit, vtrinq;  
 40 parum turgens, in quo nucleus dulcis eadem forma clauditur. Floret Ianuario



cum amygdala, vel paulo post, maturefcit Maio, ante alios fugaces fructus. Rami nouelli colore croceo, albis punctulis distincti, fructus optimo sapore placent, innocentigustu, vt impune agris concedantur.

*Cœlum.*

Cœlum exoptat calidum, & apricum, locumq; concauum, à ventis tutum, vt est Surrentina planities, & Sicilia insula, cæteris Italiae locis non tam frequens reperitur. Nam cito florescens, si hyemis sæuitia non desierit, facile floribus à vento priuatur.

*Solum.*

Amat solutam terram, & teneram, vel humidam arenaceam, vt prunus, odit argillam.

*Sætio.*

Scratur semine Ianuario, vel Februario locis frigidis, vel Octobri, & Nouembri calidis. Transplantatur post trienniū. Plantatur Octobri, vel Nouembri, aut Decembri prius, quàm floreat, sed raro semine nascitur. Etiam à radicibus pullulat soboles, si qua est à radice planta: quia apud nos in prunum insita viuit.

*Cultus.*

Ablaqueanda arbor, & fossionibus exhilaranda, siccis temporibus riganda. Si qui fuerint sicci rami, aut putridi tollendi, vt in prunis consueuimus.

*Institio.*

Palladius Ianuario mense locis temperatis pruno præcoqua inserit. Nos inserimus in se, in persicum, amygdalam, sed omnium maxime in prunum, cum quo maximam habere affinitatē videtur. Sed æstate melius inoculatur, quàm Martio fisso ligno: etiam ad modum digitalis.

*Art.*

Vt maiora poma producat, in id pruni genus inserimus, quod à similitudine, & vtilitate, *cogliopecoro* Neapoli dicimus. Nam ad eius similitudinem fructum producit magnum.

*De Armeniaco, persicorum specie. CAP. XIX.*

**N** V N c aliam persici speciem prosequemur, quæ post præcocia fructus affert: ideo post illius tractationem hanc aggrediemur. Hæc armeniaca dicitur. Galenus à persicis parum natura differre scripsit, immò non tam citò in ventriculo corrumpi, & si contrarium recentiores arguant.

*Nomen.*

Dioscorides *ἀρμενιάκη* vocat. Galenus verò armeniaca vocari desita, & præcocia, vel præcoqua dici. Democritus verò de interpretatione Græcorū vocabulorum ait, Armeniaca est præcocium. Hanc peregrinam esse vel ipso nomine cognoscitur. Latinis, vt Columellæ, & Plinio armeniaca. Palladio armeniaca dicitur. Itali *moniache*, corrupto ex armeniaca nomine. Neapolitani *chrisomela*, quasi chrysomala vocant, id est aurea mala, cum enim maturuerint aureo splendent colore. Alterum armeniacorum genus recentiores Græci *βερίκοκ* vocant. Neapolitani *bericocche* vocant, ab eis detorta nomenclatione.

*Genus.*

Nos armeniacarum genus in duo partiemur, vnum *chrisomela* vocamus, alterum *bericocche*, inter se colore, odore, sapore, forma, & magnitudine differentia. Ex quo Matthioliferror apparet, qui ea differre non putauit. Sunt enim bericoccia forma fructus rotundiori, colore cædidiori, carne magis friabilis, inspidiori, viliori que. Caro ab osse non separatur, & intus amaram includunt



dunt amygdalam. Sed inter bericoccia genus est vulgò dictum *bericocco vero*, magnitudine superat omne dictorum genus, sapore, & odore præstantissimo, dulci amygdala, vt præcocia iam prius dicta ferè nobilitate præcedat. In Surrentino tractu large proueniunt, & hæc genera priora sunt, quàm chrysomela. Chrysomelarum genus in plures species partiemur, alię nanq; amaram, alię dulcem amygdalam intus includunt. eorum, quæ amaram intus amygdalam includunt vnum genus est maius, alterum minus, hæ Neapoli *chrisomele alef-sandrine* dictæ sunt. Quæ verò dulcem amygdalam habent, inter se magnitudine differunt, vt maior species, & minor sit. Hæc odore suauiori, coloratio-  
 10 ra sunt, & os à carne diuellitur.

Arbor armeniæcarum nil à prædicta præcocium differt, nisi quod maior, durior, validiorq; est. Internodia surculorum maiora habet, longioraq; & in  
 vniuersum magis rustica. Fructus magnitudine persicum æquat. Florer post  
 præcocem, & ab ea fructus maturat, id est Maio.

Idem cœlum, solumq; , quod præcocibus conuenire diximus, his conue-  
 niet, nisi quòd, cum serius floreat, arborq; validior sit, cœlorum variationi-  
 bus minus obnoxia est, ideoq; magis fructifera.

Et si apud nos vulgo iactetur semine non nasci, ramen si diligenter seueris, & siccitatibus irrigaueris, optimè nascuntur, humido, pingui, ac soluto solo  
 20 Martio mense ponantur. Cum plantantur trunci altitudo octo, vel decem pe-  
 dum, distantia viginti quatuor sit.

Ianuario mense armeniaca arbor inseri potest, Columellæ autoritate, cum  
 prima floreat. Palladius, Armenia inseritur pruno Ianuario locis tempe-  
 ratis. Nos Ianuario inserimus in prunum fissò ligno, sed difficiliter compre-  
 hendit. Iulio verò, cum pruni arbor fructus suos maturat, in eam emplastra-  
 mus: sic restatius agitur. Item in persicum, & amygdalam. Vbi supra prunum  
 insita coalescit, in vastam crescit magnitudinem, vt vix homo completi pos-  
 sit, vimq; subdita pruno præstat, vt ad maiorem crassitiem increseat.

*De persicis, & duracinis.* CAP. XX.

30 **S**E QV VNT V N persica, quæ succedunt armeniæcis. Hæc Theophrasto,  
 Scæterisq; vetustioribus Græcis incognita fuere, blaterent indocti quic-  
 quid velint. Plinius: Pomum innocuum expetitur agris: Pretiumq; iam sin-  
 gulis triceni nummi fuere, nullius maiore: quod miremur, quia non aliud  
 fugacius. Longissima nanq; decerpro bidui mora est, cogitq; se venundari. Sed  
 quia pomi succus, & caro facile corruptione semiunt; tuadet Galenus primis  
 mensis sumi, sic enim celeriter descendencia sternunt aliis viam commodè  
 præeuntia, reliqui cibi subsequentes lubrico meatu facile labuntur. Postremo  
 cibo sumpta, vt moris est plerisq; in summo natantia corrumpuntur, vt quic-  
 quid præsumptum fuerit vnà secum in corruptionem trahant. Palladius ho-  
 40 rum flore apes vesci notauit.



Nomen.

Dioscorides *περσικὰ μῆλα*, id est, persica mala vocat, itemq; Galenus. Cassianus vocat *ροδάκινά*. Sic recentioribus Græcis Aetio, & Paulo. Nicandri scholiastes *ροδάκινά*, & *ροδάκινῃ*. Putat Hermolaus *ροδάκινά* dicta vernaculo Græcorum sermone, quòd in Rhodo ad florem vsq; peruenerit, quod primum ab Ægypto venienti fuerat hospitium, Plinii, quem sectatur, verbis confidens, cuius opinionem, cæterorumq; explodimus, capite de Persca: vel putat nomen inuersum à *δοράκινά*, quasi duracina, quod falsum est. Columella persicum vocauit, atq; ex Perside arborem fuisse, vel ipso nomine constare existimauit, & ad nos primum aduectam, vt testatur in hortulo.

*Quin etiam eiusdem gentis de nomine dicta*

10

*Exiguo properat mitescere persica mala*

Sic Plinius, & Palladius. Itali *Pesco*, & *Persico*.

Forma.

Plinius hæc habet de persico: Color succi Persicis nullus, cum præsertim duracina succo abundant: sed quis vllum eius dixerit colorem? Odor est dilutus. Foris corpus, intus lignum, vitiumq; cinctum fructu, cum fructus a libi muniatur vitio. Eorundemque trigemina natura est, corpus, deinde lignum, rursusque semen in ligno. Quædam statim à ligno recedunt, quædam adhærent: quorundam generi vtraque est natura, vt persicis, etenim duracinis adhæret corpus, à lignoq; auelli nequit, cum in cæteris facillè separatur. Poma rara in ramis, non inter se densa. Nos verò ita describemus. Arbor pumila potius, quàm procera, & si humidum solum nata in altum excre- 20  
scat. Folio amygdalaceo maiusculo. Flore subpunico. Pomum carne, & cute constat, extrinsecus molli lanugine conuestitum. Dura intus, rotunda, & scabra nuce, in quo nucleus, qualis est amygdalis, continetur. Radicibus imbecillibus, nec profundis. Citò crescit, & celerem senectam sentit.

Genera.

Huius arboris fructus species tam variæ, multa q; sunt, quæ tum insitionis mixtura, tum cultus mangonio prouenerunt, vt eas omnes enumerare, & fastidientis, & multiplicatæ esset lectio. Nos verò, quæ insigniori discrimine diuersa videbuntur, solùm apponemus, sumpta à tempore tractatione. Primo genus in duo diuidemus, in persicum, & duracinum. Incipiemus à per- 30  
sicis, quia tempore priora. Inter persica species est vna, quæ reliquas omnes antecedit, & ferè cum armeniacis concurrir, à reliquis speciebus admodum differens. Foris herbaceo viret colore rubescenti, odore plusquam iucundo, sapore suauis, vberi succo, vt per mandentium ora fluat. Neapolitani, quia cum festo Diui Ioannis maturatur, vocant vulgò *Persico di san Gionanni*. Caro ab osse non recedit. Sunt illius variæ species, sapore, colore, & magnitudine differentes. Sequuntur vulgaria persica æstate, omnibus his caro ab osse auellitur. Carne alba, vel ex coloris, ex ucca, friabili, sapore insuauis, & sine odore. Has vulgò *Persiche* vocamus. Hæc sunt Plinio popularia dicta, nullo succo & colore, vt diximus, nobis exosa, agris obnoxia. Hæc species à Plinio vocatur Gal- 40  
lica, & à Columella excepit in suo hortulo:

*Tempe-*



*Tempestiua manent, quæ maxima Gallia donat.*

Subeant *degenia* Græcis, Latinis duracina ex eo dicta, quodd pertinaciter ossa adhæreant carni. Nobis vulgo *percoche* dicta. His datur à Plinio palma, pomumque innocuum expetitur agris. Asiatica Columellæ, & eidem dicta, ut in hortulo,

*Frigoribus pigro veniunt Asiatica fœta.*

De his Martialis intellexit, qui cum videret præcoqua persica vilia esse, ac insitione recepisse persica duracina, seriora, meliora quæ, cecinit,

*Vilia maternis fueramus præcoquarumis,*

*Nunc in adoptivis persica sola sumus.*

Huius innumera sunt species, prima, quam vulgo poma nuncupamus, foris colore albo, odore fragrantissimo, sapore excellenti, succo vberissimo. Sequuntur duracina. Sunt & in duracinorum genere, quibus caro ab osse auellitur, ac manibus leuiter compressa sponte aperiuntur, nobis dicta *Percoche apertore*, quæ omnibus dotibus ceteris antestant, & expetuntur. Hæc antiquis incognita fuere, quorum itidem multæ sunt species, magnitudine insignes, ut bilibria etiam nascantur. Aliæ ad Ianuarium usque in arbore pendent.

Palladius ait, Locis quidem qualibuscunque proueniunt, sed & pomis, & *Calum* frondibus, & durabilitate præcipua sunt, si cælum calidum sortiantur. Frigidis verò, & maximè ventosis, nisi obiectu aliquo defendantur, intereunt. Ob id à nobis sæpe vallibus, & concauis locis feruntur, ut cum primum florent ventorum turbine flores non derurbentur.

Idem, qui supra, solum arenosum, & humidum concupiscere scribit. Florentinus aquosis locis, & assidue rigatis gaudere, ut fructus maior euadat. *Solum* Apud nos humidis locis insipidos fructus procreat, facile quæ putrescit arbor. Si irrigaueris, facile vermes generabit, sed solum arenosum altum, & solutum & planitiem amat. Tales sunt Arentii vulgò dicti campi, ubi latè fructificat huiusmodi arbor, ac præ cæteris Italiae locis viget, ut eius natalia loca ibi à natura esse constituta videantur.

30 Palladius calidis locis Nouembri mense, cæteris verò Ianuario persici ossa in pastinatis arcis ponenda iubet, binis à se pedibus separata, ut cum ibi plantæ excreuerint transferantur. Sed ossa ponantur acumine deorsum verso, & non amplius, quàm duobus, aut tribus digitis obruantur. Ossa verò, quæ ponenda sunt, aliqui siccata prius paucis diebus cineris insitione terra soluta in qualis reseruant. Ipse verò usque ad ferendi tempus absque ulla cura sæpe seruauit. Dum tenera sunt germina, sæpe herbis circumfossa liberentur. Sed habitiores habebimus plantas, Florentinus ait, si simul ut ederimus, ossa feremus, parte aliqua carnis circa ossa relicta. Columella persicum serit ante brumam per autumnum. Ex quo Plinius etiam serit per autumnum ante brumam. Bimam plantam Palladius transfert, serobe breui. Nec à se longè statuenda sunt, ut inuicem se à calore solis excusent. Sunt qui loco



vbi ossa ferunt, ibi satas velint. Tunc cum ossa ponemus, trium, vel quatuor pedum scrobes effodiemus, in fundo tria, vel quatuor ossa constituemus, quatuor digitis à se inuicem distantia, inde superinducta terra, vbi pullulauerint, arbuscula vegetior relinquatur, ceteræ tollantur, ac alio ferantur, illius incrementa terra operiendo prosequemur. Interualla duodecim pedum erunt.

Cultus.

Palladius ita colit: Ablaqueandæ sunt arbores per autumnum, & suis stercoreandæ foliis. Putanda persicus in autumnno est, vt arida, & putrida tantum virgulta tollantur. Nam si quid viride resecemus, arescit. Et si hæc arbor ardore solis inatrescit, frequenti aggestione cumuletur, vespertino humore iuuetur, obiectis defendatur vmbraculis. Sed in nostris regionibus temperatis contrarium videtur, nam quo magis putantur, & abscinduntur rami, latius assurgunt. Formanda est arbor, vt vno se attollat stipite. rami sint in orbem circumnati, vt se à sole tutius defendant. Altitudo stipitis sex pedum.

Institio.

Mense Ianuario, vel Februario, Palladius ait, locis frigidis, Nouembri calidis persicus inferatur, maxime circa terram furculis plenioribus, & propè arborem natis: nam cacumina, vel non tenebunt, vel diu durare non poterunt. Inferitur in se, in amygdalo, in pruno: sed armenia, vel præcoqua prunis, duracina amygdalis melius adhærescunt, & tempus ætatis acquirunt. Mense Aprili, vel Maio locis calidis, in Italia verò vtroq; exeunte, vel Iunio persicus inoculari potest; quod emplastrari dicitur, præciso super trunco, & emplastratis pluribus geminis, more, quo dictum est. Rubescit si platano inserta figuratur. Ad Pasiphilum postea.

*Ipsa suos onerat meliori germine ramos  
Persicus, & pruno scit sociare genus.  
Imponitq; leues in stipite phyllidis umbras,  
Et tali discit fortior esse gradu.*

Alium inferendi docet modum, quem ab Hispano quodam se didicisse fateretur, de quo in libro de Cultu diximus. Florentinus de persici insitione hæc habet: Cum notum sit persicum citò senescere, in damascenam arborem, id est, prunum, aut in amaram amygdalum inferi debet, vel etiam in barbylum: est autem barbylus arbor ex persici osse enata. Didymus poma persici rubescere scripsit, quæ platano insita coaluit, & in damascenum, & amygdalum inferi posse. Diophanes in cerasum inferi, & viceuersa. Inferitur apud nos Ianuario fillo ligno, in prunum, & optimè apprehendit; sed fit insitio circa terram, fructus diuturnius viuit, sed magnitudine degenerat. Sic etiam inter lignum, & corticem, optime etiam ad modum digitalis mense Maio, vsque ad idus Iunii nouellis ramis. Si in amaram amygdalum inferatur, sentit gustus aliquid amaritudinis in fructu.

Amygdalo-  
loperjicus.

Ruellius genus quoddam persici tradit à recentioribus agricolis amygdalo perjicum dictum, ab vtroq; parente, cum ea soboles mediam inter vtrumq; progenitorem naturam contraxerit, fortasse insitionis diligentia, aut satorum mixtio-



mixtione, nouum adulterii repererunt genus, vt ex amygdalo & persico progenies inuisa prioribus seculis exoriretur, vtriusque parentis ingenium referens, & effigiem simul adoptans. Hoc est malum, quod foris æmula facie persicum pomum mentitur, intus dulcem amygdalam, & facie, & gustu representet. Hæc species in Gallia fortasse vulgaris: nos eâ Romæ vidimus. Neapoli non visitur. Retulerunt tamen amici in Mineruæ promontorio quoddam in horto adhuc viuere. Arbor media est inter amygdalam, & persicum. Fructus est persici, intus dulcem amygdalam continens. Quomodo id fuerit exortum, omnino ignoratur. Videamus si eius inuentionis modum tradere nos possimus. Palladius ait persicum in amygdalam insitum fructum producere, qui intus dulcem amygdalam includat, foris verò persici carnem. Quod his verbis ad Pasiophilum innuere videtur:

*Pomaq; permutat velamine persica misto,*

*Duriciemq; docet, tegminis esse loco.*

Quibus autem modis id fieri possit, non docet. Nam si vsitato modo quæ persicum in amygdalam fissis ligno, vel inter lignum, & corticem, vel per emplastrationem inseruerit, persicum pducet, quod amaram intus amygdalam, vt cetera producet. Id testatur totius Apuliæ pomaria, vbi persicus in amygdalam inseritur, & omnes intus amaram producant amygdalam. Sed meo quidem iudicio vtriusq; oculi, persici scilicet & amygdalæ, per medium findantur, coaptenturq; oculi duo, vt vnus fiant, sic demum emplastrentur amygdalo, vel pruno, vel persico, sic ex vtroq; semioculo enatum germen, tales fortasse dabit. Nam diuersi admodum generis duo germina fructus producent, non fructus dimidiatos, sed alter intus, alter verò foris sedem nanciscetur. Fortasse etiam fiet, si perforato amygdalæ trunco persici germen traducatur, ac post triennium, vel quadriennium, vbi optime coaluerint, recidatur à parente. Hoc enim modo maxima videtur fieri in fructu variatio, nec alia mihi videtur procedendivia.

Aliud est etiam persicorum genus, nucipersicum dictum, etiam antiquis incognitum, quod insitionis diligentia in lucem productum non solum arbitror, sed ratum habeo: ab vtroq; parente vt nomen, ita mediam naturam contraxit, ex nuce scilicet, & persico. Ex nuce colorem contraxit herbidum, cutem nulla exterius lanugine pubescentem: sed admodum leuem, succum leniter subamarum, serò maturescit, diutiusq; suam prorogat ætatem, scilicet in autumnum, à persico autem formam habes, carnem, succum, cum maturatur rubescit sole, duram intus & scabram nucem habent, qualem persica poma, gustu, saporeq; iucundo, sed multo nuce fugacius. Arbor humilis est, persicorum magnitudine, folio amygdalino, vel maiori flore puniceo, ex quibus clare patet facile ex vtroq; progenitore mixturâ contraxisse. Sed quomodo id etiâ factum fuerit, penitus ignoratur. Videtur enim maxime distare nucem à persico, adeò quòd inde medium genus prodire nequeat. Sed agrico-



larum ars, & sedulitas, eam, omnemque difficultatem vincere potest. Ipse autem nullis fieri posse modis, quam supradictis coniicio, ut utriusque dimidiatus oculus vnâ compositus alterutri emplastretur. Vel perforato nucis trunco, perfici ramus inducatur. Horum pomorum plura sunt genera: Sunt æstiuo tempore maturefcentia, sunt & ferotina, quæ usque ad Ianuarias calendas in arbore pendent. Sunt ex his duracina, & ex quibus caro ab osse diuellitur, sunt quæ viridi, & quæ alba cute matura sint induta, cæterisq; pulchritudine, & suauitate præstant.

Sanguini-  
persicum.

Sunt tandem, quæ cortice detracto sanguineum succum fundunt, ut sanguiniperfica dici possint. Apud nos admodum grata, & speciosa, non quod reliquis carne suauiora, sed quod oculis suo colore pergrata sint, vulgò, quod pastinacæ colorem imitentur, *Persiche pastinache* vocitantur. Sed quomodo id genus productum fuerit indicandum. Rubra nasci persica Democritus promittit, rosas sub arbore consitis. Vel post septem dies, quum patefieri cœperint (nam totidem diebus obruta sponte fatiscunt) in ossium internos ventris sinus cinnabarim infundas, mox ut cohereant strictim obligata simul cum suis nucibus obruas, sic rubra dabunt persica, & si alium quæuis colorē instillaueris in talem enata progenies degenerabit. Didymus in platanum insitam, rubicunda rhodacina producere posse scribit. Palladius etiam rubescere scribit, si platano inserta figatur. Apud nos tamen præualet opinio, ut in viuam, & perforatam pastinacam, ossis nucleus persici inclusus fuerit, ac inde enatus. Vel in sanguineum mori succum, si postquam enatum fuerit, germen pluribus diebus eo succo rigaueris: Vel in morum infra tales fructus proferre.

Paratur  
vel. Art.

Maiores poma creari pollicetur Florentinus, si assiduo potu inebrientur: hunc in modum iugi rigatu fatiata, maiores multo poma creabit. Et si complura interlegantur, quæ vbertate nimia matrem onerauerint, ut arboris succus ad reliquorum nutrimenta pomorum conuertatur, succi enim copia in pauciores fœtus se conferens, altitil saginat incremento. Sed Palladius magna poma affetre scribit: si florenti per triduum ternos sextarios caprini lactis ingesseris. Sed suillum sterco radicibus affusum maiores poma ut producat efficere, quam ex arbore vnquam pependerint. Ut persica scripta nascantur, docet Democritus. Exesi corporis os ut iduo madescat in aqua, dein aperto sensim ligno, nucleus intus inuentus cortice tenui a neo stylo, non alte, quibus placebit literis exaretur, dein papyro, vel charta reuolutus, commissis carinis seratur: quod in eo amygdalo depinxeris, hoc enatum inde pomum repræsentabit. Ex quo Palladius: Affirmantibus Græcis persicus scripta nascetur, si ossa eius obruas, ea post dies septem, ubi patefieri cœperint, apertis his nucleos tollas, & his cinnabari quod libebit inscribas, mox ligatos simul cū suis ossibus obruas diligentius adhaerentes. Sine ossibus nasci persica scribit Africanus: si in perforatum truncum exclusa medulla, salicis vel corni palum adegeris.

Morbi  
remedia.

Palladius ait, Contra solis ardores iuuat serpentis spoliū appendi. Contra pruinās



pruinās Nouembri sterco ingeratur, vel fæces vini cum aqua permixtæ, vel quod magis prodest, aqua in qua faba decocta est. Si vermes persicus patitur, cin seos amurcæ mixtus extinguit, vel bouis vrina, cum aceti tertia parte confusa. Si poma caduca sunt, nudatę radici eius, vel trunco lentisci, aut terebinthi cuneus affigitur, vel terebratæ in medio palus salicis imprimetur. Si poma rugosa creabit, aut putrida, circa inum truncum cortex recidatur, vt cū inde modicus humor effluerit, argilla, vel paleato luto plaga retegatur. Contra vitia persici proficit spartum ligarum, vel spartea suspensa de ramis.

Idem, qui supra: Duracina seruantur condita muria, & oxymelle. Vel *Cōdiura.*  
 10 detractis ossibus ficorum more in sole siccantur ac pendent. Idem sæpe vidit detractis ossibus duracina melle conditi, & saporis esse iucundi. Item bene seruantur, si vmbilicum pomi gutta picis calentis oppleueris, vt sic sapæ innatare cogantur vase concluso. Nos verò persica, & huiusmodi generis mala do-  
 20 liolo conclusa, optime foris picato, ac sub cisternæ aquis demerso per multos menses incorrupta seruauimus.

## De Prunis. CAP. XXI.

Nunc pruni commentationem auspicabimur. Miratur Plinius huius  
 pomi mentionem à Catone non habitam, præsertim cum condenda  
 demonstraret quædam & syluestria: Cū & pruna syluestria ubiq; nasci cer-  
 20 tum sit. Vnde pruna omnia post Catonem cœpisse manifestum est. Comme-  
 moratur à Macrobio inter felices arbores. Vim subducendi aluum insignem  
 retulit Martialis,

*Poma peregrina carie rugosa senecta*

*Sume: solent duri soluere ventris onus.*

Aratus Græcus, Athenæo authore, arborem κοκκομηλίαν, fructum verò *Nomen.*  
 κοκκύμηλον vocari dixit. Seleucus verò brabyla, ala, coccymala, & madrya ea-  
 dem esse scribit. Nam madrya esse velut mali fructus, brabyla, quia ventrem  
 soluât, ala quasi mala. Clearchus peripateticus, & Theocritus Syracusius Rho-  
 dios, & Siculos Damascena pruna brabyla appellare dixerunt. Democritus  
 30 Damascenum coccymalum appellari scripsit. Sed vnde huius nominis ety-  
 mon Græcum descendat, ignoratur ex compositione. Nam κόκκος granum est,  
 μήλια malus, quasi granatum malum dicas. Sunt qui per barbaralexin putant  
 è Latino coquendi vocabulo deriuatum, vt coccymalum, quasi coquimalum  
 dicas, cum ei præcipua vis sit deiiciendi. In Asia scribit Galenus προδμνον dici.  
 Latinis arbor prunus est, fructus prunum. Itali *Susino, Prugno.*

Theophrastus de eius forma pauca retulit. Emittit florem frequenti folio  
 supra fructum insidentē. Pomum carne, humore, & neruo vestitum. Lignum  
 intus durum, in quo nucleus includitur: natura enim ligno, & rursum carne se-  
 40 que facile nepotes generent, superficie viuaciores. Prunus & syluestris paucis



adhæret radicibus, superficie viuacioribus. Arcades autem prunum altissimam radicem habere, & numerosam, vnde diu viuat opus est, & emori contumacem referunt. Plinius ex eo: Fructus pruni aquoso succo præditus, foris corpus, intus lignum, vitiumq; cinctum fructu, cum fructus alibi muniatur vitio. E radicibus pullulat sobole densa, & pariēte matre, quas enecet, eius quippe vmbra turba indigesta premitur. Velox crescit, in trimatu enim ferre incipit, ostendens & ante, & cito occidit. Sed quod cito occidat è Theophrasto perperam interpretatus est, dixit enim emori contumacē. Nosq; continua experientia videmus ad hominum vitam peruenire. Præterea Theodorus Theophrastum vertens, Prunum ait corpore humilem, folio arbuti, peculiarēq; in eo fructum lanugine pappo dicta perire, quod Theophrastus coggigryæ tribuit, non pruno. Pliniusque Theophrastum secutus etiam coggigryæ vocatæ ascribit. Decepit hominem nominum affinitas, forte quia cocconeliā, non coccomeleam scribendum erat, nam vnedo, cui similis est coggigrya, nelia vocatur à Theophrasto. Nos ita describemus. Prunus arbor procera. Caudice subrecto, scabro, multis ramis brachiata. Folio ex oblongo ferè rotundo, per oras minutim serrato. Vere prius florem, quàm folium emittit.

*Cætera.*

Ingens turba prunorum, dixit Plinius, versicolor, nigra, candicans. Vt inueneret tot esse prunorum genera, & plenè inexplicabilia. Nos verò in urbanum, & syluestre genus diuidemus: Urbanorum à Damascenis incipientes, utpote inter cæteras species principatum gerentibus. Damascena pruna dicta Athenæus scribit, quod in Damascenorum regione nascantur, cum ibi is fructus ita colatur, ut ab aliis qui alibi nascantur plurimum differat, cuius magnitudo minor, quàm prunis, & gustus idem, nisi paulo esset asperior. Dioscorides syriaca pruna vocauit, & præcipue, quæ Damasci gignuntur. Galeni testimonio, omnium opinione, prima bonitatis laus ei ascribitur. Meminit etiam huius Columella in hortulo,

*Armenis, & cereolis, prunisq; Damasci.*

Plinius in peregrinis arboribus ait: Damascena à Syria Damasco cognominata, iam pridem in Italia nascentia, grandiore quamquam ligno, & exiliore carne, neq; vnquam in rugas siccata, quoniam soles sui desunt. Alibi verò. Pruna Damasco monte nata, Italia familiaria. Neapoli vulgo dicimus, *Prune damasche*: Nigra sunt cute, carne suavi, crocea, rotundo intus ligno, in caeuminibus turbinato, exili nucleo, digitis pressum internum os exilit, parua, pauciq; succi. Post Damascena Iberica apponemus. Galenus proxima Damascenis, quæ ex Iberia, & Hispania proueniunt, verum hæc minus astrictiōis præ se ferunt. Neapoli vocantur *Prune pernigone*, à perdice deductum nomen, ut credo, quemadmodum enim inter aues ipsa carnis suauitate excelsit, sic hæc inter prunorum genera, à citerioris Hispaniæ regione nobis allata, ob id nobis etiam catalonica dicta: non vulgaria nobis sunt, sed quibusdam in hortis asservantur, dulci succo prædita, carne duriori, gustu suavi, purpureoq;



æoq; splendent colore, parte, qua solem spectât, ex aduersa candicâr, pressum digitis os internum dimittit, oblonga, exili nucleo, ac longo. Sed ego existimarem Iberica pruna esse, quæ nobis vulgo *de frate* dicuntur, nam inter cætera facile principatum obtinent, innoxie præbentur ægris, ac minus stipticitatis, quàm Damascena obtinent, colore gramineo, ingrato, succo melleo prædita, callosa, oblonga, os intus oblongum compressum acutumque. Sunt alba, nigraque, sed nigra dulciora, maiora oui magnitudine, ac magis serotina. Sunt & pruna cerina à colore flauentis ceræ dicta, quorum Virgilius meminit,

*Addam cerea pruna.*

10 Ouidius etiam Metamorphoseos libro,

*Prunaq; non solum nigro lucentia succo,  
Verum etiam generosa, nouasq; imitantia ceras.*

Columella in suo hortulo,

*Armenisq;, & cereolis, prunisq; Damasci.*

Plinius ex his: Sunt & nigra, ac laudatiora cerina. Multi *ὄχρα* à Græcis vocant arbitrantur. Et si innumera sint apud nos genera huiusmodi colore prædita, præstantius tamen, & quod magis cereo colore flauet, est vulgo *Scaldaro* dictum, ex candido enim in luteum pallescit, paruulum est, dulcore insigni, Augusto maturatur. Armenicarum meminit Columella in hortulo,

20 *Armenisq;, & cereolis.*

Plinius dixit, Ab externa gente armeniaca, quæ sola & odore commendantur. Hæc quæ fuerint, cum alia signa non addiderint, diiudicare arduum erit. Onychina ab vnguis colore vocantur, *ὄνυξ* enim vnguis est. Columella matura esse onychina dixit iuxta messem. A colore candicantia Plinio dicta. Præcocia sunt, immo prima, quæ maturantur, vulgò nobis dicta *biancolelle*, quia cæteris candidiora sunt: & purpurea laudatiora à Plinio memorata, à Columella etiam pruna purpurea dicta, quæ inter reponenda pruna commemorat. Nobis dicta sunt *Pruna d' appendere*, sunt enim serotina, purpureo siue violaceo foris colore, intus crocea, dura, callosa, acida, nec esui apta, nisi laquearibus appen-

30 sa, domita aciditate per hyemem promantur. Alia eodem colore, inquit Plinius, seriora maioraq;, asinina cognominata à vilitate. Hæc Neapoli dicta sunt *Pruna cogliopcore*, honor sit auribus, obscurum quidem nomen, non tamen ineptum, nam pruna omnia magnitudine superant, colore flauetia, mollia, Iulio & Augusto maturantur, insipida, ac hircorum testiculorum formam imitantia. A tempore hordearia, à comitatu eius frugis dicit Plinius, ac flauentia esse, cum subdat; eodẽ colore asinina. Huiusmodi multæ sunt species, sed quæ *Pruna d' Indie*, dicuntur, & *Pappacode*, insigniora sunt, magna enim sunt, flauentia, forma ouata, ac cum messe maturantur. Sunt & apud nos serotina pruna, quæ vsq; ad calendas Ianuarias in matre dependent, vulgo, *Pruna cascaneglie*,  
40 adeo parua sunt, vt vix syluestrium prunorum magnitudinẽ superent, rotunda, nigra, & alba. Sunt & vario colore, dicit Plinius, inter quæ *Pruna simiana*



principatum obtinent, hæc rotunda, ampla, foris ruffa, intus crocea, pressa os foris iaculantur. Sunt etiam Surrentina carne suavi, ac friabili, & pleraq; alia, quæ ne tempus longius teratur, omittenda proposuimus.

*Cælum.*

Calido cælo lætari prodidit Pamphilus. Plinius non temere in montibus visam prunum. Palladius cælo tepido melius prouenire, tamen & frigidum sustinere valet.

*Solum.*

Scribit item Pamphilus sicco solo gaudere. Palladius læto, & humido, Sed si in lapidosis, & glareosis lætamine iuuantur, excusant ne poma caduca & vermiculosa nascantur.

*Satio.*

Palladius, Pruna si ossibus seratur autumno, mense Nouembri solo putri & 10 subacta duobus palmis obruantur. Ossa eadem ponantur & mense Februario. Sed tunc prius lixiuio sunt maceranda per triduum, vt cito germinare cogantur.

Idem & plantas poni tradit, quas sumit ex caudice mense Ianuario exeunte, vel Februario, circa idus, radicibus fimo oblitis. Columella post mediam hyemem vsq; ad idus Februarias serit. Pamphilus pruna eodem modo, & tempore quo perlica plantari debere monet. Interualla ex Theophrasto sumemus, qui punicis nõ plus, quàm nouem pedum distantiam, præcipit, malis paulo maiore, pyris ampliorem, & prunis. Plinius scrobium altitudinẽ in argilloso, aut duro solo trium cubitorum esse in quanq; partem aliis, sed in prunis palmo amplius.

Didymus etiam auulsione feri posse memoriæ prodidit.

20

Nos prunum propagauimus, & breui tempore radices iniecit. Itemq; teneros eius ramos humidis, & vmbrosis locis seuiimus, & optime comprehenderunt.

*Cultur.*

Palladius ita colit: Extirpanda sunt soboles à radice, exceptis rectioribus, quæ seruantur ad plantas. Iuuantur frequenti uulnere, & assidua fossione. Nobis formanda est arbor, vt vno se attollat stipite, non admodum procero, vt valeat sua vmbra truncum operire. Frigidis regionibus lætamen ingeritur. Sed etiam neglecta fertificat.

*Infitio.*

Pamphilus iisdem horis inferi docet, quibus & persicus in sui generis arbores, & in malos. Diophanes in omnem pyrastrum, & in cotoneum, & malum: & recipere persicum & præcocium. Quintilij indicant Ianuario fieri debere, 30 quia prima florent. Palladius hæc habet. Mense Martio extremo prunus inferitur, melius trunco fisso quàm cortice, vel mense Ianuario antequam incipiat gumen lachrymare. Inferitur in se, & persicum recipit, vel amygdalum, vel malum, verum vltimam degenerem reddit, & paruam. In versibus verò,

*Pruna suis addunt felicia germina membris,*

*Donaq; cognato corpore lata ferunt.*

*Exarmat fixius, sed brachia roboris armat*

*Castanea prunus iussa tenere lærem.*

Nos autem docemus vt insita prunus in amplam exurgat magnitudinem. Die ante infitionem, fœnum, paleas, vel arida sarmenta inter arboris ramulos, 40 & furculas apponimus, vt pede à loco distet, vbi infitio futura est, mox ignem appo-



apponimus, & comburimus ramos, vbi verò frigescet, præsignato loco inferimus, ignis enim caliditas surculorum ramorumq; humorem in truncum fuggat, ac in contrariam sibi partem descendere cogit, vt in viridibus lignis igni appositis videre contingit, quæ ex opposito latere humorem exudant: euocato mox humore ab indulgentis cœli temperie, in magnam prunus crescit amplitudinem. Possumus hac vtri præceptione Luna crescente, si necessitas cogit, vt igne reuocetur humor ad radices, quem ipsa lumine suo euocauerat. Prunus inserenda est loco, vbi nascitur, & quanto tertè propinquius, eo melius, vt inde translata, in profundiorē scrobē obruta, insitionis coalitus sit infra terram, 10 vt inde enata soboles domestica sit, facile enim prunus circa truncum pullulat. Nos Maio, & Iunio emplastramus, vbi gummi lachrymare desierit. Emplastratione optime recipit persicum, & amygdalam, difficulter autem fisso trunco. Si prunum in persicum inferemus, maiorem producit fructum, sed brevis erit vitæ: si persicus in eam, paruum, & degenerem, sed vitæ diuturnioris.

Id effecit ars, vt Plinij temporibus nucipruna, & pruna malina, & amygdali- *Ars.* na reperirentur. Nostra autem tempestate cum arte ea genera petiere. Primo eius verba recitabimus, mox artē, qua id efficere possimus demonstrare conabimur. Peculiaris impudentia est nucibus insitorum, quæ faciē parentis, succumq; adoptionis exhibent; appellata ab utroq; nucipruna. Nuper in Bœtica 20 malina appellari cœperunt, malis insita, & alia amygdalina amygdalis. His intus in ligno nucleus amygdalæ est, nec aliud pomum ingeniosius geminatum est. Sed quomodo id fieri possit inuestigandum. Quæ supra monuimus, cum de hoc ipso in persico loqueremur, huc adducenda ducimus. Præterea est alia insitionis species, quæ de subiecto trunco multa haurit, vt facile prunus ex nuce succum haurire possit, faciēq; parentis retinere, scilicet truncum nucis perforando, & per foramen pruni ramulos transiiciendo, vt ex utroq; facto cōpages, vtriusq; naturam referat, quemadmodū de vite insita ceraso retulimus, ac de persico salici. Huiusmodi enim insitione conicere licet, hæc inuenta, ac in lucem producta esse. De amygdalinis, & malinis prunis idem faciendum puto.

30 Palladius ægris arboribus ita medetur: Si languida pruni arbor est, amurca *Morbi & remedia.* cum aqua æqualiter temperata radicibus debet infundi, vel bubulum lorum solum, vel humanum vetus, cum duabus aquæ partibus mixtum, vel cineres ex furno maxime sarmentorum. Si poma decidunt, oleastri cuneum terebratæ infige radici. Vermes eius, atq; formicas rubrica cum pice liquida, si adlinatur, extinguet, sed modestius, propter arboris noxā, ne idem faciat remedium, quod venenum.

Pamphilus nobis scriptum reliquit, Damascena seruari cadis, vino dulci vel *Cōditura.* nouo natantia, operto diligenter vase. Palladius verò. Pruna siccantur in sole per crates loco sicciore disposita. hæc sunt, quæ Damascena dicuntur. Alij in 40 aqua marina, vel in muria seruente recenter lecta pruna demergunt, & deinde sublata aut in furno tepido faciunt, aut in solo ficcari. Columella aliam docet



condituram: Circa messem pruna onychina, & sylvestria adhuc solida, nec maturissima legenda sunt, nec tamē nimium cruda, deinde vno die umbra ficanda, tum aquis partibus acetum, & sapa, vel defrutum misceatur, & infundatur. Oportebit autem aliquid salis adicere, ne vermiculus, aliudve animal innasci possit. Verum commodius seruantur, si duæ partes sapæ cum aceti vna parte miscēantur. Pruna purpurea immatura, non tamen percruda, integra & sine vitio, aut vermiculo, in fictili picata fidelia componuntur, & defruto, aut passo, ita vt omne pomum sit immersum, vas completur, impositoque operculo gypsatur. Nos quæ diximus purpurea, cum ramulis ac pediculis lecta, suspensa que laquearibus, vsq; ad alium ferè prouentum seruari promittimus. 10

De myxis. CAP. XXII.

**D**E sylvestri pruno diximus in sylua. Nunc autē de myxis: sunt enim prunorum species. Plinius scribit in Damasco monte nata, iamq; Italia familiaria esse sua ætate. Dioscorides, & Galenus earum nusquam meminere, ceterique veteres Græci: Plinius ex his vina fieri in Ægypto. Viscumque fit in Syria ex arboris huius acinis, commendatissimum aucupius, præterquā aquatiliū volucrum.

Nomen.

Græcis recentioribus *μύξα*, Paulo Æginetæ, Psello, & Actuário *μύξαι* dicuntur per diminutionem *μύξαις*, id est à lento narium mucore fluente. Officina barbaro nomine, quæ iam ferè maxima ex parte à Mauritanis, vel Arabibus emendicare solent, Sebestena vocant, à *σεβαστός*, quoniam nonnulli in Cæsaris honorem factam arbitrantur. 10

Forma.

Plinius perseam Ægyptiam rubentibus myxis similem esse scripsit. Id est, persea Ægyptia similis esset myxis, si myxa rubescerent. Recentiores, quibus frequens est arboris huius conspectus, ita describunt. Arbor supra terram attollitur procero caudice, qui cortice candido vestitur. Fundit ramos viridi colore nitentes. Folia circinata. Poma auellanae nucis magnitudine racematim collecta, per maturitatem carulea. Callo corporis dulci, intus albo, mucoso lentore, vnde Græcis nomen myxon, ita enim mucum nominare consueverunt, osse oleagino triangulari, cuius nucleus insuavis non est. 30

Celum.

Palladius in tepido cælo feri debere scribit. Plinius Damasco monte nata.

Solum.

Palladius soluta terra pangi debere docet, humore moderato.

Satio.

Palladius, Februario seruntur myxa ex nucleis in aliquo vase positis, donec plantæ induant firmitatem.

Insitio.

Plinius scribit: Ipse nunc cœpere nasci Romæ insitæ sorbis. Et myxas recte inferi in calabrice, ea enim est spina sylvestris, quæ eas optimè recipit. Ruellius, ceterique, qui ab eo desumpserunt ignorantes quæ sit calabrix, nescio quæ verba afferunt. In Calabria ea est spina sylvestris, quæ myxas optimè recipit. Vocatur enim Neapolicalabrix spina illa sylvestris, quam Dioscorides



oxyacantham vocat, vt vidimus in Sylua. Palladius ex Plinio melius. Inferuntur myxa mense Martio, sorbis, & spinis.

*De palmis. CAP. XXIII.*

**I**AM ad palmas deuenimus. Erat hic oleæ locus: sed quum nobilitate, mirisque dotibus, quibus est prædita, satis amplam historiam exposceret, suam tractationem in oliuetum transtulimus: relictus est locus palmis. Nam à vino, oleis (Plinio auctore) proxima nobilitas palmis. Strabo est author Babylonios carmen decantare, quo tercentæ & sexaginta palmae utilitates docerentur, inter quas vna est, quod nihil abiiciat, vt *ἀνφύμος*, cognominari possit. Vinum ex ea multæ gentes faciunt, inter quas Indi, qui per Augustum, quomodo nos vires, suo tempore palmam putant, quod verò de lachrymat, vas excipiunt, quo pro vino triduo post vulneratam arborem vtuntur, quod enim post illud tempus effluit, acescit, quod verò per triduum defluerit athenis ad tertias decoquunt, efficiturque mel suauissimum, quod si volunt, aquis diluunt, ad vigesimum autem diem defæcant: & deinde pro vino vtuntur, quod suauissimum est. Dioscorides quomodo vinum fiat ex chydæis docet. Et ex eo Plinius, quo Parthi, & Indi vtuntur, & oriens totus. Xenophon in Cyri minoris expeditione scribit, ex palmis vinum fieri, quin & acerum ex iisdem decoctis conditum, & siccitas etiam ad vsum bellariorum reponi, mensis ex his suauissimas epulas, quin & cerebro, id est, medulla ex viridibus ramis exacta vesci posse, præcipuamque quandam in eo cibi genere suauitatem admirari epulantes. Plinius etiam ex his in Oriente vina fieri, gentiumque aliquibus panem, plurimis etiam quadrupedum cibum. Et ante chartarum vsum in palmarum foliis primo scripturatum testatur. Ob suam nobilitatem duæ insignes ciuitates à palmis nominantur, vna maior insularum Balearium, alia Syriæ Palmira dicta. Præterea inter Saturnalia dona palmulae mittebantur. Vnde Ouidius,

*Quid vult palma sibi, rugosaque carica, dixi.*

Et Martialis:

*Aurea porrigitur Iani caryota calendis.*

**30** Nam decoctæ, aspectus iucunditate, & gustus suauitate omnia tragemata, & bellaria antecedeant. Quibusdam verò palmis in palmulis nucleus lunatus est, hunc potissimum (auctore Plinio) contra fascinoles pollere arbitrabantur. Sed lunatum, quasi arcuatum intelligi debet, cuiusmodi in Luna à coitu conuiscitur schema. Sed cur maxime ea figura expetatur, Plutarchus declarare videtur in libro de Iside: Ait enim, Solem Luna semper appetit, eumque persequitur, eoque argumento ab amatoribus aduocari Lunam, & amatoria ab Iside dispensari Eudoxus scribit, quæ non alia est, quàm Luna.

Græcis palma φοῖνῖξ dicitur. Palmaeque fructuum adhuc florentium in uolucrum & calix ἰλάμ dicitur, vel *απαμή*, qui posthac ubi prodierint *πῶμα*, ubi maturuerint, & foliis nigricant, φοινικεῖς ἀλανοί appellantur, ac si dicas, palmae

Nomen.



glans, hanc etiam *καρύων*, id est de ceryum à Galeno videtur appellari: fructus etiam à digitorum forma *καρύτις* medicantur. Iulio Polluci mascula *καρύτις*, seu mella *βόλαρος* est, quod ab Herodoto sumpsit. Latinis verò palma arbor dicitur, fructus palmula, & dactyli generaliter vocantur. Sunt qui caryotas, caryotidas, vel caryotim appellent. Statius,

— *Latente palma*

*Pregnantes caryotides cadebant.*

Et Martialis,

*Et notas caryotidas theatris.*

Ita arborem *palmā*, fructus verò *datteri* vocant.

*Forma.*

Quæ apud Theophrastum perpaucæ extant & vagæ, huc adducemus, ut *palmæ* delineationem adumbremus. *Palmæ* arbor tereti, ac simplici caudice altissimè assurgit. Cortice cum adolescit lævi, scabriore multo cum senescit: Lignum humore, nervo, & carne constat, sed processu lignescit. Nervos non per totum corpus expandit, neque prolixiores, neque positu eodem extensos: sed multifariâ cunctos porrigit. Medulla omnino nulla. Folio arundinaceo, angulari, duplici, & in medio dorso carinato, per quod amplius in longitudinè fertur meatus. Perpetua virescens coma. Folia fructus, & germina propemodum cacumine gestat, quippe cum vis tota genitalis in eius vertice resideat. Fructum producit non ex anniculis, vel novellis ramis, ut ceteræ arbores, sed è rudimentis præcedentis anni, cum turgent in spicis semina antequam proferantur: ramulos enim simul cum fructu in spica prodit. Huius rei causam & arboris proprietatem, & siccitatem dixerim: præterea fructus munimento quodam egent ad conservationem & cum editi sunt, & cum exeunt, quando aliarum arborum fructibus hoc præsidium à frondibus petatur, in palma verò, quia secundum frondem fructus inest, necesse fuit, in ipso sinu conformatus, & constitutus, ut validiusculus, non tener prodeat in aerem. Quia fructificatio similis est spicarum fortificationi. Fructus dulci succo præditus. Semen protinus post regnè ambiens subest, ambientiaque plura sunt, cavitatem nullam habens, sed totum plenum, solidumque est, tamen huic quoque humor quidam, calorque inest, estque maxime diuturnum, cum spissum, siccum, lignosumque sit, pulpaque ambiatur. Plinius, quæ ex Theophrasto accepit habet: Palma arbor teres, & procera, densis gradatisque corticem pollicibus, ut orbibus, facili se ad scandendum orientis populis præbet, utilem sibi, arborisque induviis circulum mira pernecitate tum homine subeunte. Coma omnis in cacumine: & pomum est, non inter folia, ut in cæteris, sed suis inter ramos palmitibus racemosum, utraque natura vuae, atque pomi. Folia cultrato mucrone, lateribus in sese bifidatis, bellas primum demonstrare gemmas, nunc ad funes, vitillumque nexus, & capitum levia umbracula finduntur. Prima nascitur pomi caro, postea lignum intus, hoc est semen eius. Argumentum quod parvæ sine hoc reperiuntur in eodem palmite: Est autem oblongum, non ut olivis orbiculatum, præterea casum à dorso pul-

uinata



in nata fissura, & in aluo media plerisq; umbilicatum, vnde primum spargitur radix. Multis, candidisq; lignum hoc à carnibus discinditur tunicis, aliis corpori adherentibus, laxeq; distans, tantum à cacuminibus filo adherens. Caro maturescit anno. Huic folia non decidunt, & duplicia sunt. Fructus dulci succo præditus, caro statim à ligno recedit, sed quibusdam palmis lignum, nec intus nec extra. Fructus in racemis dependet. Carne, & succo placet. Sola ex arboribus in spathis habet fructum racemis propendentem. Tardè crescit, & subarata ocyus senescit. Cortice scabro, in senecta rugosior. Tantus est huiusmodi arboris decor non ingratus, vt Poetarum princeps Homerus puellæ Phæaciz Nausicæ venustatem palmæ ramo assimilare permiserit. Sola inter arbores ynicam in quolibet Lunæ exortu frondem geminat, vt duodecim frondibus annum expleat. Quare Ægyptij annum exprimere volentes palmam arborem depingebant, vt author est Horus in suis Hieroglyphicis.

Palmarum genera à Theophrasto descripta hæc sunt. Primum, & quasi discrimine maximo aliud sterile, aliud fructiferum. Sterile quo Babylonij lectos, & vasa conficiunt. Fructiferorum aliud mas, aliud fœmina, illa super spatham floret, fœmina suum fructum oblongum illico præstat. Horum aliud fructu, aliud arbore inuicem distat. Fructus inter se nucleo, colore, magnitudine, & sapore. Fructuum ipsorum alij sine ligno, alij cum ligno, & horum alij duri, alij molles sunt. Colore etiam discrepant, alij enim candidi, alij nigri, alij flauī, & ad summum non pauciores, quàm ficorum colores. Magnitudo aliis malorum, vt quatuor tantum in spica contineantur, aliis cicerum. Et in Cypro genus est, quod folium amplum habet, & fructum multo ampliorem, magnitudine mali punici, figura oblongum, insipidum, sapore radicibus simili, vt non deuoretur, sed succo expresso expuatur. Saporibus quoq; plurimum differunt, sed optimum tam inter nigros, quàm candidos genus est, quod regium vocant, non ubique, sed in hortis antiqui Batoni apud Babylonem cõperiri affirmant. In Cypro genus quoddam est aliud, cuius fructus nunquam maturescit, crudus tamen suavis, dulcis dulcedinemque peculiarem sortiens. Differunt arbores longitudine, & forma. Nam alia longa, excelsaque, alia breues fecundiores, quæ trimæ, & in Cypro, Syria, & Ægypto quadrimæ & quinquennes fructificant, hominis altitudine assurgentes. Alia præterea simplici caudice, alia bifida, vt in Ægypto, quasi bifurca, statura caudicis à parte, qua finditur, vel quina cubita, paresq; inter sese propè partes ipsæ assurgunt. In Creta bifida, & trifida. In Lapea eua quino cerebro nasci tradunt, & fertilioribus locis plura eiusmodi. In Æthiopia genus Cyce vocatum fruticosum, pluribus caudicibus, & interdū coniunctis, virga breui, leui coma cacumini annexa, folio amplo, & quasi ex duobus minutis cõpacto, forma eximia, fructū figura, magnitudine saporeq; diuersum, quàm cetera præstant, quippe rotundiorē, gustu gratiorem, minusq; dulcem, triennio maturat, vt recentē fructū habeat, nouo lubnascente. Panes ex his quoq; cõficiunt. Genus est aliud palmarum humile,



quasi a quoque dictum: excepto cerebro viuit, & ab radicibus succisum repul-  
 latur: fructu enim, & folijs distat, est enim lato, molliq; folio; ob id sportulas,  
 regetes, & capitis umbracula ex eo contextunt. In Creta, & in Sicilia multo  
 plures tales proueniunt. Plinius, quæ ex Theophrasto aliisque excepit, habet;  
 nos ne ad illorum lectionem lectores diuertamus, huc afferre non pigebit,  
 Genera unde quinquaginta sunt: si quis omnium persequi velit nomina, etiam  
 barbara, vinorumque ex iis differentias, genera earum plura. Prima fruticem  
 non excedentia: sterilem hunc, aliubi & ipsum fertilem breuique ramorum  
 orbe foliosum. Tectorij vicem hic parietibus plerisque in locis præstat contra  
 aspergines. Procerioribus sylua arbore ex ipsa, foliorum aculeo frutificante circa  
 totas pectinatim, quas sylvestres intelligi necesse est. Incerta tamen libidine  
 etiam mitioribus se miscent. Arboribus, imò potius omnibus, quæ terra gignit,  
 herbisque etiam, utrumque sexum esse diligentissimi natura tradunt, nullis  
 tamen arboribus manifestius. Mas in palmitæ floret. Fœmina citra florē ger-  
 minat tantum spinæ modo. Caro quibusdam in locis, ut in Cypro, quanquam  
 ad maturitatem non perueniat, grato sapore dulcis est, & folium ibi latius, fru-  
 ctusque reliquis rotundior, nec ut deuoretur corpus, verum ut expuatur succo  
 modò expresso. Et in Arabia languidè dulces traduntur esse palmæ. quanquam  
 luba apud Scenitas Arabas præfert omnibus saporibus, quam vocant dabulan.  
 Quædam in Syria, & Ægypto in binos diuidunt se truncos, in Creta & ternos,  
 quædam in quinos. Ferunt statim in trimatu. In Cypro verò, Syria, Ægypto  
 quadrimæ aliæ, aliæ quinquennes, altitudine hominis, nullo intus pomi ligno,  
 quandiu sunt nouellæ, ob id spadonū accepto nomine. Sterilibus ad materias,  
 operumq; lautiora utitur Assyria, & tota Persia. Sunt & cædunt palmarum quoq;  
 syluæ, germinantes rursus ab radice succisæ. Dulcis medulla earum in cacumi-  
 ne, quod cerebrum appellant: exemptaq; viuunt, quod nō aliæ. Vocantur au-  
 tem chameropes, folio latiore, ac molli, ad vitilia utilissimo. Copiosæ in Creta,  
 sed magis in Sicilia. Fructiferarum aliis breuius lignum in pomo, aliis longius,  
 his mollius, illis durius, quibusdam osseum, lunatumq; dente contra fascino-  
 rum religione politum. Aliud pluribus vestitum, paucioribusve tunicis: aliud cras-  
 sioribus, tenuioribusve. Fructuum quoq; plura genera. Differunt figura rotun-  
 ditatis, aut proceritatis. Differunt & colore nigriores, ac rubetes. Nec pauciores.  
 sic traduntur colores, maxime tamē placent cædidi. Distant & magnitudine,  
 prout multi cubitum effecere: Quidam sunt nō ampliōres faba: Alexandri mi-  
 lites palmis viridibus strangulati sunt. In Gedrosia id factum est pomi genere,  
 alibi copia euenit. Est enim tanta musteis suauitas, ut finis mandendi non ni-  
 si periculo fiat. At in meridiano orbe præcipuā obtinent nobilitatem syagris:  
 proximamq; margarides. Ex breues, candidæ, rotundæ, acinis quàm balanis si-  
 miliores, quare & nomē à margaritis accepere. Vna arbor earum in Chora esse  
 traditur, vna & Syagrorum. Mirumq; de ea accepimus, cum phœnice aue, quæ  
 putatur ex huius palmæ argumento nomē accepisse, emori, ac renasci ex se ipsa.

(quod



(quod erat prius) pomis refertam. Ipsum pomum grande, durum, horridum, & à cæteris generibus distans, sapore ferino, quem fermè in apris nouimus; euidentissimeq; causa est nominis. Quarta authoritas sandalium à similitudine appellatum. Iam in Æthiopia sine quinq; earum, nec plures arbores tradunt, non raritate magis quàm suauitate mirabiles. Ab his caryotæ maxime celebrantur, & cibo quidem, sed & succo vberimæ. Ex quibus præcipua vina orienti, iniqua capiti, vnde pomo nomen. Sed vt copia ibi atque fertilitas, ita nobilitas in Iudæa, nec in tota, sed Hiericunte maxime, quanquam laudatæ & Archelaide, & Phaselide, atq; Liuiade, gentis eiusdem conuallibus. Dos his præcipua succo pingui lactentibus, quodamq; vini sapore in melle prædulci. Sicciores in hoc genere Nicolai, sed amplitudinis præcipuæ, quaterni cubitorum longitudinem efficiunt. Minus speciosæ, sed sapore caryotarum sorores, ob hoc adelphides dictæ, proximam suauitatem habent, non tamen eandem. Tertiū ex his genus pateron, nimio liquore abundans, rumpitq; se pomi ipsius etiam in sua matre ebrietas, calcatis similis. Suū genus est, sed è sicciore turba iacens, dactylis prælonga gracilitate curuatis in terrā. Nam quos ex his honori deorum dicamus, chydeos appellauit Iudæa. In totum arentes Thebaides, atq; Arabicæ, macro corpore exiles, & assiduo vapore torrentes, crustam verius, quàm cutem obducunt. In ipsa quidem Æthiopia friatur hæc (tanta est siccitas,) & farinæ modo spissatur in panē. Gignitur autem in frutice ramis cubitalibus, folio latiore, pomo rotundo, sed maiore, quàm mali amplitudine; cycas vocant. Triennio maturescunt. Semperq; frutici pomū est subnascente alio. Apud nos palmæ fructus variis sunt generis, alii enim crocei, rubescentes, alii candidi sunt. Genus Theophrasto humile dictū, quo Creta, & Sicilia abundat, Plinius chamerope appellat, Palladius, cefalonem. Nobis copiose offertur ex vulgo dicta *Terra del police* fortasse à Pollucis templis, quo loco cadauer illius visitur, quæ iuxta Lylibeum sita est, antiquitus Selinis dicta, ob id à Vergilio palmosa dicitur.

— *Palmosa Selinis.*

30 Et Silius,

*Palmis quoque Selinis.*

Sed cur Plinio Nicolai dicantur, comperio apud Plutarchum, Nicolaum quendam fuisse peripateticæ familiæ philosophum, suauissimis moribus, egregia indole præditum, corpore procero quidem, sed non indecoro, facie paulo pleniore sparsa puniceo rubore, quo cum maxime oblectaretur Imperator, eumq; diligeret plurimum, similitudinis argumento, balanos magnitudine præcipua, & pulchritudine nicolaos dici instituit. Ex Athenæo verò, Nicolai ab Augusto in primis nominati in honorem Nicolai peripatetici philosophi, crebro eas ad illum mittentis.

40 Palma non omnium prouinciæ hospes, nec ubiq; fructuaria est, sed sæpe suos hospites fallit fructu, & maturatione. Theophrasto auctore a stuosi



arboris aulda est, imo gaudet excessu, quocirca in Babylone, & Syria fructu præcellit, & nisi caliditas faueat plaræ, fructus non maturatur. Si quis è Babylone in Græcia ferat, peregrini cœli ignara sterilefcit, sed si quis è Græcia in Babylonem ferat, reddi fructiferam, ac loci illius domesticam dicunt. Diximus de Cypro, Creta, Æthiopia, & Ægypto. Plinius, Nulla est in Italia sponte genita, nec in alia terrarum parte, nisi in calida: frugifera verò nusquam nisi in feruida. Iudæa inclita est vel magis palmis, nec in tota, sed Hyericunte maxime. Sunt quidem & in Europa, vulgoq; in Italia, sed steriles. Ferunt in maritimis Hispaniæ fructum, verum immitem, dulcem in Africa, sed statim euanescentem. In Oriente maxime vigent. Quamobrem iure dicentur externæ. Diximus in Assyria, Syria, Ægypto, Creta, Cypro, Babylone, Æthiopia, Arabia nasci. Fastidit palma ubique nasci, aut nata parere, vel cum promissit etiam, ostenditque ea educare, quæ tanquam inuita peperit. Palladius locis delectatis apricis, & calidis dixit. Idumæa Syriæ regio palmis abundantissima est, unde Virgilius,

*Primus Idumæas referam tibi Mantua palmas.*

Lucanus,

*Et arbusto palmarum dines Idume.*

Silius verò:

*Palmiferamq; senex bello domitabit Idumen.*

Persiam usq; ad Mesenem, & mare magnum palmis abundare scribit Ammianus, ut instar ingentium nemorum videantur. Dioscorides in Ægypto gigni scripsit. In ipsa Ægypto apud Tentyram præciosæ sunt. unde Iuuenalis,

*Qui vicina colunt umbrosæ Tentyra palme.*

Plinius etiam. Esseni gens sola, palmarum locia: infra hos Engadda oppidum fuit, secundum ab Hierosolymis fertilitate, palmetorumq; nemoribus. Quod ab eo Solinus etiam affert.

Solum.

Theophrastus solum arenosum, saluginosumque concupiscere scripsit. Quodq; tale appetat locum illud argumēto est, quod ubi palmarum copia sit, humus arenosa concernatur, quippe Babylonem, in qua palme nascuntur, ita esse aiunt. Sic Africam, Ægyptum, Phœnicem, & Syriam quoq; cauam cognominatam. Plinius ex eo, Gignitur leui, sabulosaq; terra, maiore in parte, & nitrosa: salsumque ab his solum diligitur. Anatonius scribit ab ea solum concupisci salsum terram, & ad omnia ineptam, & sic optimos fructus proficere, quapropter sua regio, quia saluginosa, optima erat ad palmarum plantationem. Palladius terram solutam, vel sabulonem requirere scripsit. Ceterum non solum saluginem, sed etiam riguum locum palmam concupiscere narrat Theophrastus, nec admodum in profundo aquam, & dulcem, & salsum inuicem propinquas habere oportet. Pars Africæ in qua nunquam pluit, palmas magnas, atq; optimas producit. Aquam item subditam palmis ad Ammonis delubrum esse ferunt. Plinius: Gaudet & riguis, totoq; anno bibere cūma-

met,



met, anno siccanti, squallidoq; lætior est. Palladius: Aquis palmae aliquatenus salis iuuantur, & si tales eas natura non præbuit, infici debent salibus. Diodorus Iudæam omnibus in locis palmetis fertilem describit, quæ fluminibus, & aquis irrigentur. Scribit etiam Theophrastus ancipitis esse vitæ, & quæ terrestris sit, & mari nonnunquam viuat. Vita in sicco æque vt in humore.

10 Palmas Theophrastus ex his esse dicit, quæ semine tantum nascantur, non degenerantes, sed in suo genere persistentes. Serantur autem ligna, quæ fructibus insunt, bina iuxta composita, superque totidem, omnia tamen prona, germen enim non de supinis, cauisq; partibus mittunt, sed è supernis, quapropter in earum coniunctione quæ superponuntur, minime est operiendum principium, vnde germen. Plura simul feri debent, quoniam infirma singulis plantatio est, horum radices amplexu mutuo connectuntur, in vnum ex cunctis caudicem primo ortu promiscuo coeunt. Seriturq; fictilibus in vasis perforatis. Ex quo Plinius, Seritur autem pronum, & bina iuxta composita semina, superque totidem, quoniam infirma singulis planta est, quaternæ coalescunt. Virgilius etiam semine nasci cecinit,

*Chaoniq; patris glandes, etiam ardua palma  
Nascitur.*

20 Serendarum palmarum ratio à Leontio ita traditur: In excauatis duorum cubitorum altitudine, & totidem latitudine scrobibus, & aggere fimo quolibet, præter caprillum, saginato, sesquipedem in altum completis, ossa seu nucleis palmularum humanantur, ea tamen conditione, vt eorum mucrones in Orientem spectent, dein terra stercore satiata post respersum salem obruuntur. Quotidie dum germinent imbre, rigantur. Palmarum verò semina non illico terræ credi debent, sed fictilium fundo mandari, & vbi comprehenderit transferri. Palladius: Cui placet curas agere sæculorum, de palmis cogitet serendis. Octobri mense dactylorum non veterum, sed nouorum, ac pinguium recentia ossa debet obruere, terræ cinerem miscere. Nos autem palmulas eligimus maiores, pinguiore, quæ ex arbore vnquam pependerit, non siccas, aut in rugas contractas, sed quæ conspicuo succini colore micent, ac Martio mense vsq; ad Maium feri possunt ossa: vt vi solis citius nascantur, puerorum vrina, aut salia aqua, aut dulci permixta sale biduo madescant, fictilibus serantur, vt post sextum, vel decimum annum transplantentur in terram. Sunt qui scribant maris, & fœminæ ossa simul colligari quatuor, vt vna planta ex his omnibus efformetur, sic fœminam mascula ad sui fortificationem egeret: quod mihi plane commentitium videtur.

40 Seritur etiam viuiradice. Nam Theophrastus mutatione sedis vehementissime gaudere scripsit, easque anniculas transferunt, & bimas iterum, saltemq; adiiciunt, idq; vere faciunt. Sed Babylonii circa sydus, & ad summum pars maior eo tempore serit, vt proueniat, crescat celerius. Ex quo Plinius: Ergo plantaria instituunt, anniculasque transferunt, & iterum bimas. Gau-



dent enim mutatione sedis, verna alibi, in Assyria autem circa carnis ortum. Leontius verò: Sunt qui plantas transferant, alii vernaculo situ contenti dicunt inolescere patiuntur. Palladius, Si plantam velit, ponenda est Aprili mense, vel Maio, ita tamen, ut quando planta deponitur, circa eam, vel sub ea pinguis terra fundatur. Annicula transfertur, aut bima, Iunio mense, vel Iulio incipiente. Nos quod huc afferamus, nil habemus, cum nostris regionibus vix semine ferantur ob specimen. Didymus auulsione etiam plantari posse dixit. Plinius, Ab radice auulsæ vitalis est satus.

Quod etiam propagari possit scribit. In Assyria arbor strata in solo humido, tota radicatur, sed in fruticem, non in arborem abit. Theophrastus ramos superne cæsos in locis Græciæ si quis seriat, radicem demittere, & germen non solum è cerebro nasci, verum etiam subtus radicari, largius asserit. Plinius etiam, E ramorum tenerrimis vitalis est satus.

Trunco etiam nasci posse docet Theophrastus, cum supernam partem auferunt, qua cerebrum includitur. Auferunt enim duorum cubitorum longitudine, quam fissuris humore ipso detracto defodiunt. Item si truncus inuersus ponatur, sitque solum humidum, multis partibus radices dimitti, & germina dari exploratum habet. Id tamen maiorem amplitudinem capere nequit. Ex eo Plinius: Seruntur autem palmæ & trunco duorum cubitorum longitudine à cerebro ipso arboris viridi fissuris diuiso, atque defosso.

Fit quoque satus è virgis, & à Theophrasto itidem edocetur, hoc modo: Virgas enim tenerrimas Babylonios viuunt radices efficere, adultasque transferre accepimus, ex quibus palma facile procreari potest, tum humi feracitate, tum nascendi facilitate. Tenerrimæ enim virgæ petuntur, quia tales humidissimæ sunt: sed è cerebro potius, quam imis partibus germen prodire ratio est. Huic enim & virgarum exortus, & omnino velut principium quoddam vitale est. Ortus vndique propterea sequitur, quia humor, calorque naturalis vbiq; aliquandiu valet perdurare; scilicet ea de causa, quia ob angustiam meatuum prohibetur exuccatio illa.

Trogus palmas foliis feri apud Babylonios scripsit, atque ita arborem producere, quod Plinius admiratur.

*Cultus.* Theophrastus ait, Nouellam minime tangunt, sed comas duntaxat ei religant, ut procera assurgat, nec virgæ torqueantur. Post hæc deputant, cum iam maiuscula sit, & crassitudinem habeat ad magnitudinem palmi. Quandiu nouella est, fructum nullo intus ligno producit, postea cum ligno. Quidam Syrios nullam adhibere culturam, sed purgare tantum, atque irrorare affirmant. Plinius ex eo: Nec ferro attingunt in Assyria nouellas, sed religant comas, ut in altitudinem exeant. Robustas deputant crassitudinis gratia, semipedales ramorum relinquentes truncos, qui decisi alibi necant matrem. Aquam scaturientem potius, quam pluuiam eas quærere aiunt. Talem autem in conualle, qua palmaria insunt exuberare. Conuallem hanc, per Arabiam usque ad rubrum



brum rendere mare Syrios affirmare, ac plerosq; , qui inde venissent, referre. In eius itaq; conuallis parte cauissima palmas exoriri enarrant.

De fimo inter scriptores non constitit. Quidam ab eo prorsus abhorre-  
statuunt, eamque quouis modo delectari negant. Alii vsum fimi concedunt,  
incrementum inde magnum consequi affirmantes. Riuis tamen finum im-  
miscere oportet, inquit, quemadmodum Rhodii facere solent, & finum  
ipsum cum aqua utilem & sine aqua non esse contingit. A Theophrasto hac  
Plinius, A fimo quidam etiam lædi putant, & Assyriorum pars aliqua, si non  
cuius misceatur.

- 10 Salem concupiscere scripsimus, iccirco, vbi falsuginosum solum non sit,  
agricolæ sal aspergunt, quod quidem circum radices facere haudquaquam o-  
portet, sed longius amandando accumulare, quantum semisestarius. Est &  
asperitas in palma, auferturque ab ea vi salis ab initio. Sed nil peculiarius inter  
curas agrorum, quàm sal, quod radicibus palmarum adiicitur; quod opus  
& germinationi, & fructificationi conducibile est. Sal ne adhibeatur, vel mu-  
ria, nil refert, nam vbi sal in solo non sit, salis ope subueniunt. Sed ratio in so-  
lo, & radicibus requirenda est; sal terram, & radices afficit: sal terram leuem,  
& dissitam facit, & radices vegetiores, crassioresque, nam pabuli plus tra-  
hant ex apertis meatibus, & causa est refrigerationis, cum stercoreatio idem præ-  
stare non possit: etsi palma calidum quærat aërem, vt maturescat fructus, ta-  
men radicibus refrigerari desiderat, quod sal præstat. Babylonis experientia  
compertum est sale iuuari palmam, non fimo. Quod sal profit palmæ, Natu-  
ræ proprietati imputandum, materies enim arborisque radices à cæteris di-  
stant, ob id sale remorsa, alimentum vberius trahunt, vt sibi satis habeant, &  
quantum exigitur ad fructum nihilo secius queant suppeditare. Plinius dixit  
falsum ab his solum diligi, ergo vbi non est tale, salem aspergunt, non radici-  
bus, sed longius paulo. Leontius, Cæterum cum salsa humo gaudeant, quo-  
tannis ablaqueare conuenit, & salem iniicere. sic celeriter in magnam proceri-  
tatem exhibunt. Aquis palmas aliquatenus salis iuuari scripsit Palladius, quæ  
20 infici debent salibus, etiam si tales eas natura non præbuit.

- Aristoteles: In palmis si folia, vel foliorum puluis, vel palmæ masculæ ra-  
mus fœmellæ apponatur, maturescit ei fructus, eorumque casus prohibetur. Morbi & remedia.  
Discernitur mas à fœmina, quia prius folia eius pullulât, & sunt minora. Quod  
si ventus masculæ odorem ad fœminam duxerit, maturescunt earum fructus.  
Theophrastus inter arbores, quæ maxime fructum amittere possunt, palmam  
connumerat. Palmis autem mascularum coitum referunt. Hoc enim & perdu-  
rare, & maturescere fructus efficit, & ob similitudinem caprifactione appel-  
larunt. Quæ sic fieri solet: Dum mascula floret, spatham abscindentes, qua flo-  
res emergunt protinus, & lanuginem, & florem, & puluerem, quem conti-  
40 net super fructum fœminæ decutiunt. Illa sic eo aspersu afficitur, vt suos fru-  
ctus nullo pacto amittat, sed cunctos conseruet; ynde fit, vt duplici adiuuen-



to mas esse fœminæ valeat. Fructiferam enim fœminam quoq; facit. Sed alterum coitu, alterum alia ratione contingit. Causam diceret aliquis, fœminam ad perficiendam minus sufficere, & cùm conspicua putetur caprificationis ratio, in palma nulla causa dari potest. Ex quo Plinius: Perdit facillime ante maturitatem fructus palma. Cætero non sine maribus gignere fœminas sponte edito nemore confirmant, circaq; singulos plures nutare in eum pronas blandioribus comis. Illum erectis hispidum, afflatu, visuq; ipso, & pulvere etiam reliquas maritare. Huius arbore excisa viduas post sterilefcere fœminas. Adeoque est Veneris intellectus, vt coitus etiam excogitatus sit ab homine, ex maribus flore, ac lanugine, interim verò tantum pulvere insperso fœminis. Cæterum non est silencio prætereundum, quod Leontius veterum testimonio fretus memoriæ prodidit: Palmas vehementi se prosequi amore, ita vt altera alteram depereat: adeo inest Veneris intellectus, nec prius ardenti desiderio, cupiditateq; leuabitur, quàm ipsam adamarus mas consoletur. Quandoquidem videre licet pronam suis comis incumbere, impatientemque suum non ferre stabilimentum, quin & quasi viduam sterilefcere, quæ res agricolam non latet, sed cuius amore desflagret, aut in quem maritandi cupidine sollicitetur, incompertum habet. Quapropter complures palmas inibi circiter obstratas digitis contrectans, ac blande demulcens, reuersus ad hanc denuo, quæ corripitur amore, & manibus dato tanquam osculo contingit, tum quadamtenus veluti refricato huiuscemodi desiderio denuncians, blandioribus comis, perinde quasi manibus in eum nutat, cuius cupidinis tabe peribat, hoc velut oculorum gestu amorem confessa, seseque huius studio constimulata, quasi radicibus abiicit. Huius vesaniæ remedia sunt, si subinde manus ei admoliatur agricola, quæ marem, cuius inani amore capiebatur, attigerit, multo magis insanus amor discutietur, si maris flores capite erutos amantissimè capiti circūponat, hæc mariti ornamento collustrata fructum dabit, hocq; pigmore amoris exhilarata fœcundabitur. Herodotus scribit, Babylonios palmas curantes more ficorum. Harum, vt aliarum arborum Græci masculas vocant; quarum fructus his, quæ palmulas ferunt, alligant, vt illinc prodiens culex palmulas penetrans cogat maturefcere, alioqui occasuras. Ferunt eorum mares quemadmodū caprifici culices. Athenæus ex eodem idem affert. Nobiliorem creati fructum Democritus promittit, si inutiles vaginæ, thecæve, quas nōnulli helices florentes vocant, vbi resiccata fuerint, palmarum caudicibus quemadmodum caprifici ficis adpendeant. Claudianus hæc innuit,

*Viuent in Venerem frondes, animisq; vicissim*

*Felix arbor amat, nutant ad mutua palma.*

*Fœdera.*

Vberiores & proceriores adulescere pollicetur Didymus, colata vini veteris fœce, & radicibus affusa. Iuuari quoque consperso itidem sale. Palladius, Si ægra est arbor, fœces vini veteres ablaqueata oportet infundi, vel radicibus cum



cum superuacua capillamenta decidi. Vel cuneum salicis interfossis radicibus premi.

Vulnerato cerebro palmam emori tradit Theophrastus: vis enim vitalis germinatrixve in eo sita est, quamobrem cum id resiccatur, alteratumq; sit, aeris calorisq; alieni intrusu corrumpitur, partisq; superioris pernicies ad ima descendit. Arboris peculiaris natura est, ut pars ea vitæ auctrix sit. Interit etiam decacuminatione palma, idq; non sine ratione contingit, scilicet sua siccitate, meatuum rectitudine, & radicis simplicitate, vulnus præbet aditum caloribus & frigoribus, cum sit circulare, & superincumbens facile ad ima descendit, propter transmissionis facilitatem, quia recta est, nec ipsa radice pullulat, tum quia alimentum superioribus partibus ministrat, tum radicis siccitate. Præterea singulari radice prædita, & alte descendens, nusquam alimoniam quicquam superfluit, nec verò dimotum alio sum se vertit, itaq; sit, ut nullum sit exurgendæ proles initium: Vnde omnino huic mortem sequi necesse est. Præterea si depascatur palma, ei exitium non affert, sed sterilitatem. Referri hoc potest ad causam iam dictam: ex offensione principii finem ladi. Iam est germen, & fructus nondum est, quia futurus, absimitur succus in germine, non feret ergo fructus absumpta materia. Sed id fortasse non patiuntur in suis regionibus, in quibus non sunt, ut apud nos, peregrinæ. Plinius ex eo. Quibuldam debilitas sterilitatem non necem affert, ut si quis palmæ cacumen auferat: sterilescunt enim nec moriuntur. Cum cerebrum eruitur palmæ, efferratur, ex Nicandri traditione.

Theophrastus ait. Palmæ materies præualida est, & in diuersum, quàm cæteræ incuruatur, quippe cum non infra flectatur, pandaturq;: sed contra pondus fornicatim surgit. Ex quo Plinius: Palmæ arbor inualida, in diuersum enim curuatur, & è contrario fornicatur. Querit Plutarchus Sympolicon octauo quam de causa alia certamina alias habeant coronas, palmam communiter omnia. Alii sunt à foliorum æquabili ordine institutum id esse opinantes, ceu certatim coorianur, & quodammodo simul currant, quadam contentionis imagine, idq; tacito naturæ consensu, tum victoriam *victoriæ* dicunt, quasi *νίκη* in *μὴ ἔκταν*, id est, à non cedendo. Alii ob pulchritudinem, & germinandi venustatem. Alii sunt opinantes victoris gloriam quantum omnino fieri potest ab interitu, & senio immunem esse, cum palma inter longæuas plantas maxime macrobia sit, id est, longioris æui. Id Orphicum illud comprobare videtur,

*Animal æquale longiconi palma ramis.*

Huic etiam congruere videmus, quòd arboribus decussis prioribus foliis succrescunt alia, palma nullum abiiciens è se natum folium, suis semper foliis ornatur, quam vini victoriæ arbori accommodant. Sed si quid ex historiis petendum sit, legitur in Atticis, quòd Theseus primus in Delo certamen instituens, de sacra palma frondē auulsit, inde spadice dictam. Videtur etiam hoc præmium esse Pythicū, quòd Amphictyones Pythiis primum victores in ho-



norem Apollinis lauro, ac palma coronauerint. Sed peculiare præter hæc omnia, & cum nulla alia planta cōmune, quod palma si superne imposito onere premas, non deorsum inflectitur, sed contra incuruatur, quasi virenitens prementi: ita res se habet in athleticis certaminibus, imbecilles enim, & molles flectuntur, & deprimuntur, qui verò validi sunt, non corpora modo, sed animi etiam eriguntur. Tradit Pharnutus, Musas palmis coronatas propter homonymiam: quod Phœnices primi inuenisse literas credantur, nam palma (ut diximus) Græcis φοῖνῖς dicitur, sed ratio magis probat ob arboris teneritudinem, propter quam non facile scanditur, sicut nec ad Musas & Poësim: vel propter eius virorem, & beneficentiam, nam dulcissimos fert fructus. L. 16  
Papyrio, & Sp. Carnilio cons. deuictis Samnitibus, captisque illorum oppidis Aquilonia, & Cominio, palma data est, more tunc primum è Græcia in Romam translato, vnde postea inoleuit, ut victores spadice haberent. Virgilius,

*Eliadum palmas Epeiros equarunt.*

Victoriam ob id deam palmarem Apuleius vocitat, & palmaris vestis triumphantium fuit, & palmaris statua, quæ alicui propter victoriam erigebatur. Sed de palma victoriæ symbolo hætenus. Palma item ex Theophrasto materie tractatu facili, & cum dolatur & ferratur, molliore & lentiore, quàm suberis: suber quidem rigidus est; quare simulachra è palmis condere cœperunt, repudiata, spretaq; suberis materia, ut incommoda. Cremata fumo infestat, de quo & Cheremonis poetæ carmen, Palmas ad venas vsq; & radice: tenus ellè fumosas.

Palma Deli longæua proditur. Plinius: Quæ in laminas sæcatur, cuiusque operimento vestiatur alia materies, præcipua est palma. E palmis prunæ viuaces, ignisque lentus. Palma Deli ab eiusdem Dei ætate conspicitur. In Oriente funes validos è palmæ foliis fieri dictum est, eosq; in humore vtiliores esse, & apud nos ferè palmis à messe decerpuntur. Ex his meliora, quæ sese non diuiserint. Siccantur sub recto quaternis diebus, mox in sole expanduntur, & noctibus relicta, donec candore inarescant, postea in opera finduntur. Didymus scribit candidos, & ad implexus tegetum, sportularumq; aptiores reddi spadices, si à termitibus euulsi virides, quaternis diebus sub regimine condantur, postea sinamus quattriduum imbre torido perfundi, deinde solibus, dum inalbescant, exarescere.

*Cōdictura.*

Palmulæ, quæ condi & reseruari possint, Theophrastus in arenosis locis enascantur oportere dicit, ut in Cælesyria, tribus duntaxat locis, ubi arenæ sint, proueniant: alibi computrescunt. Recondi autem fructus, qui in Syria nascuntur, illos tantum posse, quos palmaria conuallis parturit, narrant, qui verò in Ægypto, Cypro, & alibi gignuntur, hos adhuc recentes omnes cōsumi. Ex eo Plinius: Seruantur hi demum, qui nascuntur in salis, atque sabulosis, ut 40  
in Iudæa, & Cyrenaica Africa, non item in Ægypto, Cyro, Syria, & Seleucia



cia Assyriæ: quamobrem sues, & reliqua animalia his saginantur. Viriati, aut vetusti eius pomi signum est decidisse candidam verrucâ, quæ racemo adhæferit. Thebaidis fructus extemplo in cados conditur, cum sui ardoris anima: ni ita fiat, celeriter expirat, marcescitq; nō retostus furnis. M. Varro, Palmulas quanto citius promas, iucundiore vtare, quod vetustate palmula fit cariosior.

*De cerasis.* CA P. XXIIII.

**D**IXIMVS de baccis, dicturi de acinis. Nunc historiam cerasi cōtexemus, quia medium genus habet, inter baccas, & acinos, authore Plinio. Inter prima ē pomis colono annuam gratiam refert. Peregrinæ & cerasi, & omnes, 10 quarum Græca nomina, aut aliena. Ante victoriam Mithridaticam L. Luculli non fuere in Italia, ad vrbis annum sexcentessimum octogesimum, is primum vexit ē Ponto. annis cxx trans Oceanū in Britanniam vsq; peruenere: Athenæus memoriz prodidit, Lucillum debellato Mithridate victorem reuersum, primum arborem hanc à Cerasunte Pontico municipio in Italiam detulisse, fructumque gentilitio nomine cerasum appellasse. Veruntamen Diphilus Siphnius vir arte, & facundia celebris, longis annorum curriculis vetustior, vt- 20 pote qui Lyfimachi regis successoris Alexandri ætate vixisset, cerasorum meminit. Cerasa, inquit, bonum succum creant, sed parum subministrant alimentum, stomacho grata sunt, & eidem auxiliantur in frigida sumpta. Sed rubentiora præstant, & Milesia, quæ vrinam pellant. Sed Seruius grammaticus inquit, antequam ē Ceraso vrbe Lucullus adueheret, cerasum erat in Italia: sed durū, & cornu appellabatur, quod postea mixto nomine cornocerasum est vocatum.

Græcis, Latinis, & Italis cerasus eodem nomine appellatur. Græcis enim *κέ- 30 exos*, & *κερίσιον* à Cerasunte gentilitio, vt diximus. Latinis arbor cerasus, fructus cerasum. Seruius pomum cerasum, non cerasum vocitari præcipit. Itali *Cireggio*, & *Ciraso*. Nomen.

Theophrastus satis anxie eius descriptionem prosecutus est. Cerasus peculiarem naturam sortita est, ad quatuor, & viginti cubita proceritatis erigitur, & 30 crassa quaternis dodrantibus à radice, siue bicubitali crassamento. Folio mespili, præduro, & latiore. Corticis lauore, colore, & crassitudine tilia similis. Is meatu flexo, nec complente gyrum obducitur arbori, quasi mucronatim ambiat, ab imo sursum in angustias sese colligens, qualis in fronde quoq; ipsa descriptio est. Quum desquamatur, hoc eodem modo delibrari solet, alioquin præscinditur potius, quàm filo eodē detrahi possit. Quin & per crassitudinem prætenuis modo folij finditur, reliquumque durare, arboremque tueri valet, nec iactura huius arbor ipsa emoritur. Quod si totum deglubas, qui reliquus est humor, elabitur. Porro tunica exterior adempta nigricat pituita quadam 40 mucosa: & vice eius secundo anno tenuior subnascitur, priorisque damnum refarcit. Nerui ligno contorti, conuolutiq; in anfractus, vt cortici: virgæ con-



tinuo nascuntur eodem modo. Rami dum adoleſcunt, alij percunt, qui ab imo ſparguntur, alij continuo creſcunt, vt ſuperi. ramaſa prout arbor nō eſt. Paulo enodior, quā populus. Flore albo pyri, vel meſpili, pluribus ſhoſculis racematim congeſto, fauaceo. Fructu rubro dioſpyri figura, magnitudine fabæ, quamquā acinus dioſpyro prædurus, ceraſo mollis. Radix multiiuga, ſumma telluris cute niritur, nō craſſa. Contortio eadē radicis, & corticis radicē regentis. Athenæus à Theophraſto deſcriptionē deſumens, ait: Florem habet ſimilem pyro ſylueſtri, eumq; pluribus ſhoſculis, veluti faui, cōpoſitum: fructū rubicundū, ſimile melampyro, fabæ magnitudine, niſi quod melāpyro nucleuſ eſt aſper, ceraſo mollis. Hermolaus Theodori verſionē non probat, nam dioſpyrō Theophraſti louis flammā ipſe interpretatuſ eſt, cū louis triticū dicere debuiffet, quandoquidē vulgo granū ſolis dicatur. Sed Plinius aliter ceraſum deſcribit: Ceraſuſ loti penē natura eſt. Ramaſa admodū. In quadraginta cubitorū trabes æquali per totū duorum cubitorū craſſitudine reperiri dicuntur. Cortex libris ſimilis, cuiuſ humor gummoſuſ. Pomū extra carne habet, intuſ lignū, conſtatq; cute, & ſucco. Primo candicāt baccæ, mox rubent, deinde nigreſcūt. Succo ſanguineo præditū. Non alternat fructuſ, quia lignū carnoſum habet, nō vt olea, cui ſiccum lignum. Pullulat ab radice denſa. Vnde Virgiliuſ,

*Pullulat ab radice aliis denſiſſima ſylua,*

*Vt ceraſis.*

**Genera.**

Plinius octo ſui temporis ceraſorū ſpecies ponit, quem ſequemur. Et primo Aproniana maxime rubent. Apud noſ huiuſmodi generis multa ſunt ſpecies, habent magnitudinem, & mollitiem, ex omni parte maximē rubent, & quia nobis Surrento optima aſſeruntur, vulgo *Ceraſa di Sorrento* vocamus. Actia nigerrima ſunt. Hæc nobis *Ceraſa di Lettere* dicuntur, inde enim nobis exportantur, & Coruine. Corpore magna, & nigerrima ſunt, vt veſcentium manuſ & labra ſanguineo viridi ſucco, mororum more, inficiant. Hæc raro menſis apponuntur, cū mantilia deturpent. Cæciliana verò & rotunda. Exiſtimarem, quæ Neapoli vulgo *Imperiale* dicuntur. Sunt enim cæteris rotundiora, ac pretio habita, parte ſoli obuerſa rubeſcunt, auerſa lacte candicant, ſapore dulci cum quadam aciditate miſto. Iulianis gratuſ ſapor, ſed penē tantum ſub arbore ſua, adeo teneriſ, vt geſtatuſ non tolerant. Matthioluſ hæc in Heſtunia *Acquaiole* vulgò dici, minimeque haberi ait, quia ob aquæ redundantiam inſipida ſunt, oriūque ingrata. Sed quomodo, bone Deus, iſ gratuſ ineſt ſapor, ſi inſipida ſunt, oriūque ingrata? Rectiuſ igitur putandum ea eſſe, quæ Neapoli *Ceraſa cannamele* dicuntur. Hæc Iunij fine maturantur, vel Iulij initio, ideoq; Iuliana dicuntur, dulci ſapore, melleo, ac plurimo ſucco prædita ſunt, adeoque mollia, vt non ſolū geſtatuſ non tolerant, ſed vix parumper manuſ pertrahant licet, quin celeriuſ marceſcāt. Principatū duraciua ſibi vendicāt. Hæc nobis *Toſtole* dicuntur, plurimaque horum ſunt genera, rubentia, callo prædura, guſtu præſtanti, carne nucleo pertinaciuſ hærente: alia ſunt, quæ *Oliuette* dicimus,



cimus, alia *Cornole* vulgò, quia vtriusque magnitudinem, formam, & duritiem referunt, omniumq; maxime gestatum tolerant. Sunt qui legant Plinij verba sequentia cum præcedentibus annexa, sed mihi videntur separatim legenda. Et quæ Pliniana Campania appellat: in Bælgica Lusitanis. In ripis etiam Rheni. Tertius iis colos è nigro, ac rubenti, viridiq;e, similis maturescen-  
 10 tibus semper. Ea esse, quæ *Tostole veradere* dicimus passim. Colore sunt mixto ex nigro, viridi, rubentiq;e; nec perfecte, albescentia ferè semper, vt maturescen-  
 20 tibus similia videantur, lunio maturantur, sæpissime vno pediculo duos affert fructus: nam quæ Pliniana Campani vocent, nulla hodie sunt, fortasse nomen perijt.

- Si quis verò hæc verba cum præcedentibus annexa legere velit, vltimum hoc  
 10 genus illud erit. Minus quinquennio est, quòd prodire quæ laurea vocât, non ingrata amaritudinis, insitæ in lauro. Hoc genus ex lauri insitione ortum penitus nobis ignotum est, & si communi insitionis modo multoties expertum sit, multos fetellit experientia, maximo enim lauri amatore germen emoritur. Sed puto quæ Neapoli, *Visciole di Roma* dicuntur, id esse nobilissimum genus quidem cætera longe superans, magnitudine perspicua, colore sanguineo, succosum, inest in maxima dulcedine amariusculus quidam sapor, vnde fit vt nec nimia acerbitate respuantur, nec maxima dulcedine fastidium pariant, id genus nobis Roma aduectum est. Sunt & Macedonica parua arboris, raroq; tria  
 20 cubita excedentis. Neapoli genus id non visitur, nam omnia in magnam excrescunt altitudinem. Minore etiamnum frutice chamaecerasi. De hoc videbimus in sequenti. Multa & innumerabilia ferè apud nos genera sunt, vt præcocia, quæ *Maiatiche* dicimus, quia Maio maturantur: sic Ierotina *Agustegne*, eadem ratione, sunt quæ vno pediculo terna, quaternaq;e; sint, & quæ racemata vna modo dependant, aliaq;e, sed sat sit antiqua memorasse.

- Plinius cerasa gaudere septentrione, frigidisq;e; dixit, ob id in Ponto abundare, & trans Oceanum in Britanniam quoque vecta, eadem in Ægypto nulla  
 cura eualuit, vt prouenire possent, & iuxta Romam ægre prouenire. Palladius: Cerasus amat cæli statum frigidum. In tepidis regionibus parua prouenit. Ca-  
 30 lidum non potest sustinere. Montana, vel collibus constituta regione latatur. Pamphilus cerasum frigidis gaudere scripsit. Ob id Apulia nostra ob cæli caliditatem cerasi caret, sed si necessitas cogit his locis fortè eas plantare, saltem iugum rigatu adiuuentur.

- Theophrastus vbi amnes, & rigua, & omnino vbi tilea, nasci scripsit. Plinius  
 40 aquosis montibus gaudere. Palladius solum positionis humectæ desiderare. Pamphilus vda loca. In nostra Campania vallis ea, quæ prius Sueffulanorum fuerat, quæ ad caudinas furcas protenditur, cerasi tota confita est, quarum poma adeo proba sunt, vt Cerasuntij potius à nobis petiisse, quàm ad nos misisse videantur, solum enim leue, humidumq;e; obtrinent.

- Palladius ex semine nasci probauit, immo ex eis plantaria creari posse: si Octobri, vel Nouembri spargantur poma, quæ summa facilitate nascentur. Serij



tur & viuit adice. Vnde Octobri, vel Nouembri mense syluestrem plantam transferre debemus. Plinius, Circa brumam cerasa feri debent. Interualla maiora esse debent, cerasis enim umbræ enormes sunt. Pamphili autoritate cerasus feri malorum, & pyrorum more debet. Auulsione etiam plantatur cerasus Didymi autoritate. Nascitur etiam virga, quod Palladio experienti optime euenit. Is enim virgulta ex ceraso pro adminiculis per vineam posita, in arborem prosiluisse confirmat, tanta est huius nascendi facultas. Amat scrobes altas, & spatia largiora. Apud nos sunt quadraginta pedum.

*Cultus.*

Palladius: Amat continuas fossiones. Putria in ea, & sicca putari debebunt, vel quæ densius arctata protulerit, vt rareseat. Fimum non amat, atque inde degenerat. Siccis locis nos irrigamus, & optima producunt poma, sed celestibus aquis putrefiunt. Arborem formamus, vt truncus octo, vel decem pedum à terra eleuetur.

*Institio.*

M. Varro, brumalibus diebus cerasus inferi solet, ait. Columella: Possunt circa idus Ianuarij cerasi, cæteræque arbores, quæ prius florent, inferi commodè. Cassianus Octobri inserit. Quintilij Aprili inserunt. Pamphilus cerasum maxime insitione latari scripsit, neque vnquam bonum, dulcemque fructum afferre: nisi alteri arbori insitam. Diophanes cerasum in terebinthum inferi ait, in persicum, & viceuersa. Plinius, Virgilij autoritate cerasis vlnum insitum, dicit. Cerasus statutum tempus anni habet serendi, vel inferendi vbi-  
que circa brumam. Demptolibro finditur: habet enim post eum veluti lanuginem, quæ si comprehendet insitum putrefacit. Præterea in laurum inferi (vt diximus) & inde enasci cerasa laurea. Palladius verò: Inferitur mense Nouembri melius, vel si necesse sit, extremo Ianuario. Alij & Octobri mense inferenda esse dixerunt. Martialis in trunco inferi iubet. Mihi inter lignum, & corticem feliciter semper euenit. Qui in trunco conserunt, vt Martialis dixit, omnem lanuginem, quæ circa est auferre debebunt, quæ si remanserit, insitis nocere ait. In cerasis hoc seruandum est, & in omnibus gummatiss, vt tunc inferantur, quando his vel non est, vel desinit gummi effluere. Cerasus inferitur in se, in pruno, in platano, vt alij, in populo. Ad Pasiphilum verò Palladius.

*Inferitur lauro cerasus, partuq; coacto*

*Tingit adoptiuus virginis ora pudor.*

*Umbrantes platanos, & iniquam robore prunum*

*Compellit gemmis pingere membra suis.*

*Populeasq; nouo distinguit munere frondes,*

*Sic blandus spargit brachia cana rubor.*

Nos Ianuario inferimus trunco per media fisso, & facillime comprehendit. Vnde qui insitionibus initiantur, huic arbori incumbunt. Emplastratione etiam optime comprehendit, tempore cum arbor maturat poma, id est Maio, & Iunio. Inferitur etiam ad modum digitalis. Sunt qui in salices, & casta-  
neas inferant.

Cerasa



Cerasa sine osse quemadmodū nascantur, Graeci Latiniq; demonstrauerunt. Democritus ita monet: Si quis tenellum cerasi caudicem radice tenuis scindat, non vulnerata parte ima, medullamq; auriscalpio eruat, deinde lachrymam cyrenaicam aqua dilutam dummodo sapæ crassitudinem referat infundat, & humente charta diligenter obligata adminiculo fulciat, ne lachryma effluat, octauo die eadē lachryma perfundi præcipit, vt germina citet: sic exos, & enucleatus fructus exhibet. Sed si scylla cōsita fuerit, præstabit, vt segmenta facilius iungantur. Palladius hæc eadem, quæ ex Democrito excepit, etiam in cerasis opus esse experiri dicit, cum de vite præcepisset. Sed quomodo aliter fieri posset à Martiale, docet. Arborem tenerā ad duos pedes recides, & eam vsq; ad radicē fines, medullā vtriusq; partis ferro curabis abradere, & statim vtrasque partes in se vinculo stringis, & oblinis fimo, & summā partem, & laterum diuisuras. Post annū cicatrix ducta solidatur. Hanc arbore surculis, qui adhuc fructum non attulerunt, inseris, & vt asserit, ex his sine ossibus poma nascentur. Quod falsum esse demonstrauit experientia. Sed sunt apud nos earū genera, quæ adeo molli osse prædita sunt, vt ferè cum carne mandantur, existimarem potius in salice insitum modo, quo persicum enatū diximus, esse productum. Vt præoces vuas habeat, Florentinus in cerasum vitem inserit: sic quo tempore cerasus fructū afferre solet, eo tēpore vuas afferet, hoc est vere. Pamphilus  
 20 vuam nigrā ceraso inseri debere, quòd vere afferat vuas. Plinius, Cerasos præoces facit, cogitq; maturescere calx radicibus admota. Sed id ante quā flores afferat, vel si calidam aquam sapius radicibus infundis, et si postea inarescat.

Cerasus, authore Plinio, cortice in orbem detracto non offenditur, si non *Morbi & remedia.* simul incidatur corpus, alioquin corticem mittit, sed non vitalem, nec proximum corpori, verum eum, qui subnascante alio expellitur. Palladius: Cerasus si concepto humore putrescit, in trunco foramen accipiat, quo possit educi. Si formicæ patitur, succum portulacæ debebis infundere, cum aceti media parte permixtum, vel vini facibus truncum arboris florentis adlinire. Si æstu canicularum fatigatur, trium fontium singulos sextarios sumptos post solis occasum radicibus arboris iubeamus influere sic, ne remedium Luna deprehendat. Vel herbam symphoniacam circa arboris truncum torquebimus in coronam, vel ex ea iuxta imum caudicem cubile faciemus. Sed symphoniaca, quæ herba fuerit, ambigitur. Apuleius symphoniacam eandem esse cum hyoscyamo scribit. Plinius symphoniam herbam alternis, viridibus roseisq; per caulem foliis describit, in posca sanguinē reicientibus mederi, sed si floribus, non foliis diceret, credendum esset hyoscyamum esse, quod Dioscoridis descriptioni accedit, & ad sanguinis eruptiones laudatur.

Condiendi ratio à Florētino rei rusticæ authore sic tradita est. Cerasia ante solis exortum arbore sua decerpta in vas, substrata in fundo satureia, con  
 40 iiciuntur, dein cerasia superponuntur, iterumque alternis satureia adiicitur & non nihil acidi mellis aliquantum dulcescentis. Seruantur itidem interiectis



arundinum foliis, & in eundem modum alternatim dispositis in cado. Plinius Siccatur etiam sole, conditurq; ut oliua cadis. Palladius, Cerasa nō aliter, quam in sole vsque ad rugas siccata seruantur.

*Historia.*

Theophrastus: quia cortice similis est tilia, ob id cunas ex eo conficiunt, sicut etiam ē corticibus tilia.

*De pumila ceraso. CAP. XXV.*

**V**ISVM est præsens caput à præcedenti separare, cum genus id cerasi à cæteris longè distet, tum facultate, tum quod diuerso indigeat cultu, ut quæ à nobis præcipienda fuerint, clariora videantur. Quæ enim supra memorauimus, Galeni auctoritate aluum subducunt, ac stomacho minus cōmoda sunt, 10 at hæc acida contrario modo se gerunt; nam phlegmaticis & fluidis, superfluitantibus stomachis phlegma incidunt, & exiccant. hæc insolata reponuntur, ac viridia saccharo condita per annos asseruantur, commendanturque ad intinctus conficiendos, quibus non modo edulia sanis iucundissima præbentur, sed ægrotantibus biliosis febribus afflictis, & sitim sedant, & oris insuauitatem emendant, & cibi appetentiam inducunt.

*Nomen.*

Videntur sub chama-cerasi nomine reponendæ, cum non in altum, sed in latum spatientur. Alij, sub syluestri genere cerasiorum posuere, cum neglectæ viuant. Græcis ὀξύεξοια ab aciditate dicuntur. Itali *Marasche*, *Visciole*. Neapolitani *Amarendole* vocant.

*Forma.*

Non frondium, & fructus effigies, quæ alioqui eadē cum superiori est, sed succus, utpote qui acidus sit, diuersitatem inter genera facit. Præterea magnitudine, & humiliori corporatura à superiori distat. Fructus longiori pediculo dependent. Succus morosa laborantium morbo palata recreat, prægnantium etiam malaciis expetitus. Ab imo crure maxima soboles pullulat, ut arbor vna breui tempore totum pomarium expleat.

*Celum.*

Vnumquodque cælum fert, calidum, frigidumve fuerit. In Apuleia, vbi difficile esset aliud genus prouenire, frequenter nascitur, & maxima generum varietate.

*Genus.*

Infinita propemodum sunt huius generis varietates, quemadmodum alterius iam dicti. Differunt enim aciditate, forma, colore, nam alia diluto rubore matura, alia in nigrum vertuntur poma, sic magnitudine, temporis prouentu, aliisque diuersitatibus.

*Solum.*

Siccō solo, leni, arenosoq; melius proueniunt, & optimos præbent fructus, etiam pingui leuiq; humido verò fructus affert, qui nimia aciditate reiciantur.

*Satio.*

Suis ossibus sata optime proueniunt. Quæ seminio destinantur, eligantur maiora, coloratiora, speciosiora, & quæ breviori pediculo dependent. Sed tardè proueniunt. Nascuntur sobole, nascunturq; etiam surculo, sui enim natura maxime viuax, & omnibus ferè modis apprehendit. Densius serenda est.

*Cultus.*

Arboris truncus sex pedibus assurgat. Eossiones continuas quatit. Dege- 40 nerat,



metat, decrefcitque arbos, fi circa caudicem soboles nocitura pullulat, & non interlucetur.

Quæ infixa funt præcociorem afferunt fructum. Mutua infirione melio- *infirio*  
refeunt, omnibusq; infirionum generibus comprehendunt, fi in fylueftrem ce-  
rafum inferemus, poma maioris magnitudinis producent. Si cerafa in has in-  
feremus, & arbor & poma degenerabunt.

De Ziziphis. CA P. XXVI.

**D**E VERA T ziziphus in fyluis feri, fed fui iucunditate fructus, fpecieq;  
decora pomaria cultiora ferè omnia colunt, vt rectè protulerit Plinius,  
10 In rectaiam fyluæ scandunt. Peregrina eadem effe testatur, quæ non pridem  
in Italiam venire ex Africa. Sex. Papinius attulit diui Augufti nouiffimis tem-  
poribus. Diofcoridi innominata eft. Videtur à Theophrasto inter loti genera  
recenferi, cum plura effe defcribat. Vnum enim Lotophagorum, cuius fructus  
prædulcis, fuauis admodum, & intus fine ligno, quod à Græcorum Poetarum  
principe miris laudibus Odyffææ nono celebratur.

*Lotophagumq; folum fubeunt, quod iurgida loti  
Semina dat mandenda viris, hi prorfus, vt hafit  
Dulcis in ore fapor, patriam de corde fugarunt,  
Auelliq; nona capti dulcedine truncis  
20 Haud poterant.*

Alterum genus paliurum vocat, in Africa frequens, quippe quo Hefperides  
ad vtrendum vtuntur, cuius defcriptionem inferius afferemus: fic Agarthoclis,  
& Polybij testimoniis noftram ziziphum Africanam effe paliurum affirmare  
non veremur. Columella de apum paffionibus, Arbores, inquit, probatiffimæ  
vtraque ziziphus, cum mediocris guftus funt eius flores. Palladius ex eo: In ar-  
boribus ziziphus, pomiferaq; arbores, quibus nulla amaritudo refpondet in  
flöre, vel fucco, apibus apta funt. Galenus parui fucci poma effe dicit, nec con-  
coctioni, nec ftomacho facilia, namq; in folentibus, & effrenatis pueris, & mu-  
lieribus cibi gratia tantum expetuntur, exiguumque præbent alimentum. De  
30 eius vi Pallada Græci Poetæ extat epigramma, quam fe inueniffe in ziziphis  
fateretur. Is enim cum quartana febris laboraret, & zizipha infpexiffet, fubito  
copualuiffe & fanum, vt eroto, factum.

*ἔκ ἀλόχως ἐν δίζυφοις δῶκε μὲν πνα θεῖαν  
εἶναι ἔφην, χεῖς γὰρ δίζυπον ἐν χρονίῳ  
ἡ πάλω κάμνοντι τετραταίῳ περὶ νῆα,  
καὶ γέροντι παχέως οἶα κρότων ὕγιος.*

Græcis ζίζυρα, & ζίζυρα, & ζιζυρα, & aliquibus exemplaribus etiam δίζυρα: tot  
enim modis fcriptura variare folet. Galenus μέλα vocare videtur. Theophra-  
fto videtur παλίουρος Africana. Latinis, vt Columellæ, ziziphus fæminini generis,  
40 Plinio ziziphum. Officinæ Barbaros imitata, iuiubas dicunt, Itali ginginle.



Forma.

Theophrastus de sua Africana paliuro: Eruticosior est Lorophagorum paliuro. Folio nostrati simili, sed fructu diuerso, non lato, sed rotundo, rubroque Nucleo, qui nō simul mandatur, acinorum punici modo. Magnitudo fructus, quæ fructibus cedri, paulo amplior, iucundus per se, atq; suauior, etiam vino affusus, quin & vina succo suo commendans. Sed Græcia paliurus cui huius Africanæ paliuri folia similia dicit, videtur nō altera arbor esse, quàm Dioscoridis rhamnum tertium, cū saepe rhamni, & paliuri nomina inter scriptores confundantur. Hic nanque frutex folia tam similia zizipho affert, vt nisi propinquius inspexeris, facile in vtriusque distinctione hallucineris. Distant maximè fructu, nam nostræ zizipho rotundus, magnitudinis, quæ cedri, paulo amplior, esu iucundus. Rhamno verò, siue paliuro in siliquis folliculari specie, verticillo similis. Agathocles item libro historiarum suæ patriæ tertio videtur hanc quoq; paliurum describere: Assurgit hæc arbor in Alexandria ad pinus, vlmique proceritatem, ramis frequentibus aculeatis, folio viridi, rotundo, tenui. Hæc bifera est, non tam vere, quàm autumnis. Fructum profert oliuæ phauliæ vocatæ magnitudine: crudus mandituris, ac virens, vbi verò exaruit in farinam molitur, atq; ita estur nullo liquore subactus. Polybius Megalopolitanus libro historiarum duodecimo (referente Athenæo) se vidisse testatur hanc arborem spinis asperam, folio virenti, quale rhamno, tantum profundiore, latioreque, fructu candidæ myrti per initia, sed processu puniceo, magnitudinis oliuæ, sed rotundo. Eum cibo familiæ rundi cum nucleo, qui ei per exiguus est, seruari conditum eundem nucleum, herilibus mensis eximi, saporem fici & phœnicobalani inesse pomo, sed præstantiori odore, vinum, & acrum inde fieri. Plinius poma similia baccis, quàm malis dixit, cypri foliis. Nos autem ita describemus: vt omnium collatione Africanæ paliurus fuerit possit iudicari. Arbor infra pruni magnitudinem subsidet. Caudice retorrido, nec satis recto. Ramis senticosis, multis aduncis intercalantibus spinis, è quibus surculi præduri, foliosi, spithamæ longitudine exeunt, frondes gerentes vtrinque per intervalla impari exortu, lentisci modo per cubitū serratas, similes tertio Dioscoridis rhamno, qui hyeme cum frondibus vnà decidit. Flore muscoso olea, sed odorato magis, pomo cornis baccis simili, dulci, primo viridi, ultimo phœniceo, vel rubello colore. Radicibus firmis, validisque.

Genera.

Columella duplex affert genus ziziphi, rutilum & candidū. Neapoli vnum tantum genus videtur, rutilum. Sunt qui azadarat Arabum albam ziziphi speciem putent.

Cælium.

Palladius loca calida, & aprica amare scribit. In temperatis nostris regionibus etiam optime fructificat.

Solum.

Palladius terram non nimis lætam, vel proximam tenui, & ieiunæ. Plinius in castrorum aggeribus lata, & aggeribus præcipue decora.

Sæpi.

Plinius granis feri debere scribit mense Aprili. Palladius ossibus suis feri in scrobe palmari, ita vt terna grana per scrobem cacuminibus ponantur inuersis, quibus



quibus in imo, & summo affundatur latamen, & cinis, & herbis adnascen-  
tibus manu planta liberetur erumpens. Cùm pollicis soliditati similis fuerit,  
transferatur in locum pastinatum, vel in scrobem Aprili mense.

Seritur etiam stipite, & planta. Crescit tardissimè, sed si plantam ponis Mar-  
tio, magis in terra molli. Locis calidis Aprili mense ziziphum conferitur, fri-  
gidis verò Maio, vel Iunio. Nos omnes viuiradice serimus, cùm stolones cir-  
ca eius crus facile fruticent, quod etiam à Didymo adnotatum reperimus.

Vindanionius, Didymi auctoritate, ziziphum ramis plantari retulit, sed ra-  
mi è media arbore accipienda sunt. Quemadmodum quoq; & Palladius supra  
10 descripsit stipite feri posse.

Didymus etiam talea feri posse memoriæ mandauit, & transplantata me-  
liora reddi. Et si tempus non præsignent, quando id faciendum sit. Nos Mar-  
tio mense ponere poterimus, & optimè in frigidis, humidisq; Aprili.

Palladius hæc de eius cultu. Per hyemem prodest illi, vt circa caudicem la-  
pidum cumulus aggeretur, qui æstate auferri debet. Si arbor hæc tristis erit,  
terrea strigili subrata hilarior fiet, vel si simum bubulum radicibus modice, &  
frequentè affundas. Nos arborem formamus, vt vno stipite assurgat, cuius  
altitudo sex pedum erit.

Facile inseri posse existimarem in oxyacantham, vel prunum syluestrem, *Institio.*  
20 cùm omnium ferè surculorum susceptrices sint, Februario, vel Martio men-  
se. Hyeme fisso trunco, æstate verò emplastratione vti possumus.

Zizipha collecta matura in longo vase fictili seruantur, oblito, & loco sic-  
ciore composito. Vel recentè lecta poma si guttis vini veteris perfundas, ef-  
ficetur ne ea rugarum deformer attractio. Seruantur etiam decisa cum ramis  
suis, aut fronde sua inuoluta, atq; suspensa. Hæc Palladius. *Cõditura.*

Materies intus colorata est, solidaq; . Ideo ex ea citharæ conficiuntur. *Materies.*

### De Mespilo. CAP. XXVII.

**D**I X I M V S de baccis singulari osse præditis, nunc de iis, quæ plura inclu-  
dunt. Plinius malorum, pyrorumq; generi iure adnumerari mespila  
30 monet, nec eas in Italia fuisse Catonis æuo: cùm earum nusquam meminert.

Theophrasto *μῆσπιλον*, Dioscoridi verò *μέσπιλος*, fructus *μέσπιλον*, Latinis ar-  
bor mespilus, cuius fructus mespilum. Itali *nessilo*. *Nomen.*

A Theophrasto ita describitur. Arbor inter amplissimas est, & recta coma *Forma.*  
in gyrum, magna ex parte pineæ nucis formas vertice suo æmulatur, nisi quid  
impediat. Aculeis caret. Cortice læui, pinguiusculo, colore ad flauum albican-  
te dum adolescit, scabro, nigroq; dum veterascit. Flore amygdalæ, non tamen  
rubenti, sed propemodum herbaceo. Radices nec multas, nec alte descenden-  
tes, validas tamen, & crassas, & incorruptibiles agit. Maxime viuax & abole-  
ri contumax. Serò suos perficit fructus, cùm terrestris naturæ solidi, acerbisq;  
40 sint, vnde serò suum adipiscuntur humorem, & laporem. Et mespila syluestria



mitibus odoratiora sunt, & tam agrestium, quàm urbanorum acerbiora sunt odoratiora minus acerbis. Cuius rei ratio libro de caulis fusius explicatur: Quum sicciora sint, ea tamen siccitate, quæ non tollat, sed patiatur quantum humidi sit ad odorem necessarium in natura. Sed alia est nostra vernacula mēspilus ab hac Theophrasti, cum inter amplissimas illa sit, nisi nostra sylvestris, vel chamæmēspilus fuerit. Præterea corruptus textus Theophrasti, & hians, quid de generibus statuendum sit, difficultatem affert. Dioscorides ita depingit, Alterum mēspili genus in Italia nascitur. Arbor foliis mali, sed minoribus. Pomum fert rotundum esui aptum, umbilico latiore, quod astringit, seroq; maturescit. Plinius, putamen in mēspilis mandî, scripsit, quod in aliis reiiçitur, ac vasculis constare. Nostratem verò mēspilum ita describemus, Arbustula est similis sylvestri pyro: Ramis in gyrum comosis, aculeatisq;: Foliis mali, promissiori, angustiori que. Longo pediculo. Flore subherbaceo, amygdalæ forma. Pomo dum pubescit viridi, & duro, ubi maturuerit fulvo, & molli, umbilicello superne extante, foliosis vnguiculis redimito, tribus, quatuorve intus nucleis. Radice numerosa. Politianus noster de cristato illo vertice ipsius ita meminit,

— Regum imitata coronas

*Mēspila.*

*Genera.*

Theophrastus Idæorum secutus observationem tria genera tradidit: Anthedona, Sataneam & Gallicā. Sataneum, quod in præsentî memoratus, ferè malum grandius, candidius, solutius, molliori intus acinorum ligno, verum ceteris fugacius. De alio in sequenti capite. Dioscorides ex eo: Mēspili hoc genus aliis *επιάνιον*, vel *ἐπιμυλίσ*. Pomum rotundum affert, umbilico latiore, quod astringit, & serò maturescit. Ex quibus Plinius: Mēspili tria genera, Anthedon, Setania, tertium degenerat, tamen si anthedoni simile est, quod Gallicum vocant. Setaniæ maius pomum, candidiusq; , acini molliore ligno. Sed nostratis mēspili genus vnum est, grandiori pomo, ut ferè malum magnitudine peræquet, cuius rami carent spinis, quod viderur & cultu & insitione in pomariis committuisse, & sylvestrem habitum exuisse. Alterum spinis horret, sylvis & vepribus nascens, pomo paruo, acerbiori que, ut vix edendo sit, nisi prius per hyemem frigore mollescat: vulgè *Nessolo canino* dicitur. Est & tertium genus oblongiori pomo, tenuiori q; , intus ossibus carens, quod cultu, humi que frugalitate potius prouenisse credendum est, quàm quod genus diuersum sit, cum vna, eademq; arbore, & rotunda cum ossibus, & oblonga sine ossibus poma habeat.

*Calum.*

Theophrastus in montibus nasci scribit. Palladius calidis locis maxime gaudere, sed irriguis tamen, & frigidis quoque prouenire. Nos in calido, frigido & temperato cælo vidimus, sed in calidis arbores parua sunt, paruosque ferunt fructus.

*Solum.*

Theophrastus solum gelidum, atque humectum quarere dixit. Palladius

in



in riguis locis, & magis sabulone pingui, aut glareosa terra, cui arena permixta est, vel argilla cum laxis.

Semine nasci Theophrastus prodidit. Plinius semine seri, sed tarda prouentu, & degenerantia, ac insito restituentia. Palladius etiam seri semine, sed in longiorem speratur ætatem. Satis.

Theophrastus viuiradice quoq; nasci scribit. Didymus ante diem calendarum aprilium seri, modo quo cotonea malus.

Theophrastus item auulsione nasci retulit. Plinius: Auulsi ab arbore viuunt stolones, sed cum perna sua, & aliquid è matris corpore auferat secum Satis.  
10 fimbriato corpore: & hoc modo plantantur mespili. Didymus, Auulsione etiam nascitur mespilus.

Possunt etiam propagari, & optime concipiunt radices, quo transferre possis. Talea serendam, esse Palladius retulit mense Martio, vel Nouembri, sed solo stercorato, & subacto, ita vt vtrunque caput taleæ stercus obducatur. Sunt eius incrementa tardissima.

Palladius: Amat putari, & circumfodi, & parco humore inter siccitates Cultus.  
sæpe refoueri. Formanda est arbor, vt à terra truncus duorum, vel trium pedum altitudine erigatur, ex quo spargantur rami.

Palladius docet mense Februario inseri in se, in pyro, & in malo. Surculum Insitio.  
20 tamen eius de arbore media debere assumi, nam de summitatibus vitiosus est. In trunco fillo inserenda est, nam corticis macies ieiuna nil nutrit: ad Paphilum verò,

*Emula dura pyri despecti mala saporis*

*Mespilus admissio germine tuta subit.*

*Et geminis sese violentior inserit armis,*

*Atque audas terrent robora sua manus.*

Nos in oxyacantham inseruimus fillo per medium trunco, & optime pro-  
genit Ianuario mense. Inleuimus etiam in cotoneam malum, ac fructum pul-  
cherrimum, & supra magnitudinem assecuti sumus, & si quis insitionem ite-  
30 rauerit, maiorem habebit. Albertus magnus in serere docet in mala & pyra,  
vt fructus sine ulla nascatur, quod falsum esse experientia nouimus.

Theophrastus vermiculationi arborem obnoxiam esse ait in senectæ, ver-  
mesque prægrandes ei diuersi q; , quàm cæteris arboribus cernuntur. Erod-  
itur & fructus à vermibus adhuc crudus in arbore, & si minus, quàm sorbus  
acerbus sit. Plinius ab eo: Mespilus in senectæ obnoxia vermiculationi est, &  
vermiculationem quoq; coma ipsa per se quibusdam annis sentiunt. Palladi-  
us: Si vermibus occupatur stylo æreo purgandi sunt, & amurca vel humana  
vetere vrina, vel viua calce profundendi, sed parcius propter arboris no-  
xiam: Vel aqua decocti lupini. Si putatur, hinc arbor sterilis fieri. Fi-  
40 mus, & cinis vitium simul si radicibus infundantur, fertilem reddunt. Si  
formicæ molestæ sunt, rubrica cum aceto, & cinere temperata necabuntur.

*Morbi &  
remedia.*



Si poma labantur, frustum de eius radice præcisum in media trunci parte figatur.

*Cōditura.*

Palladius: Mespila ad seruandum leguntur nec dum mitia, quæ in arbore diu durabunt, vel in vrceolis picatis, vel in ordinem suspensa, vel, vt quidam posca, vel sapa condita. Die serena legantur, ac media, & paleis obruantur discreta, ne ea vicissim tactus afficiat. Vel cum pediculis lecta semimatura, & salsa aqua, per dies quinq; macerata, postea sapa infundantur, vt enatent. Seruantur & melle, sed si minus matura collegeris.

### De Tuberibus. CAP. XXVIII.

**A**LTERAM mespili speciem prosequemur. Plinius æque peregrina esse zizipha, & tuberes scribit, nec pridem in Italiam venisse, atque è Syria Sex. Papinium attulisse in castrorum aggeribus saram. Hæc inter mespili species à Theophrasto descripta est, itemq; à Dioscoride. Plinius ex illis excipiens, & ignorans qui fructus fuerint, alibi postea tuberes vocat, quas prius mespili species vocauerat.

*Nomen.*

Theophrasto videtur μέσπιλος αἰθίδων ni fallor. Dioscoridi ἀρούρια, & ita à multis vocari refert, & τεῖκοκος. Galenus communi vocabulo τεῖκοκος, quasi triossum appellari ab aliquibus dicit, quum tria intus grata, aut ligna, seminis loco fructus contineat. Columella tuberes vocat. Ab eo Plinius, & Palladius. Itali corrupto vocabulo ex aronia *Azarolo* vocant.

*Descriptio.*

Theophrastus suum anthedona ita describit. Arbor inter amplissimas habetur. Ramis in gyrum comosis. Lignum spissius, flauiusq; , cætera pruno simile. Folium scissum, extremitateq; apio simile, sed maioribus diuilitis promissum, rigens, neruosum, tenuius, quàm apium, longo & gracili pediculo, antequam decidat, vehementer rubescit. Fert pomum minus quidem, sed fugacius, astringentis ingenii, & vetustatis impatiens. Flos vt amygdala rubescit. Radix alta, numerosaq; , ideo longa æua arbor, & inextirpabilis. Dioscorides verò. Aculeigera arbor est, folio oxyacantha, fert pomum suaue, & exiguum, paruo malo non dissimile, ternis intus ossiculis, qua ex causa nonnulli tricoccon appellant. Sera ei maturitas est, astringit, stomacho gratum est, aluumq; supprimit. Plinius quam excepit à Theophrasto descriptionem affert: Arbor ipsa de amplissimis est. Folia antequam decidant rubescunt. Pomum minus, quàm prædicto generi, sed odore præstantius, & quod diutius seruetur. Radices multæ, & altæ, & ideo inextirpabiles. Alibi verò tuberes describens ait. Pomabaccis similia, quàm malis, & aggeribus præcipuè decora. Florent post armeniaca. Apud nos est arbor mediocris amplitudinis, longè alterum mespili genus superans, cortice, & materie pruno similis, spinis non admodum acutis armata, foliis calabricis, floribus racematim coeuntibus, albis, odoratis, & in totum calabrici similibus, fructu rubenti, arctiore vmbilico, maturatq; Septembri.

Plinius



Plinius duo eius genera describit, candidum, & à colore sericum dictum, & utroque genere nostra Campania scater. Rubeum magis vulgare, candidum magnitudine malum æquat, odoratus, dulcius, & preciosius. Sed oxyacantha, cui Dioscorides assimilat, nil aliud est, quàm tuberum sylvestre genus, ab eo nil nisi pomi magnitudine, & sapore distans, quod si quis hortis serat, ac colat, ac suomet surculo multoties inserat, affirmare non vereor in hac domesticum genus mutari. Iam nostra villa sevimus, ac suomet surculo bis inseruimus, pomumq; maius produxit.

Nos calido, vel tepido cœlo gaudere credimus, cùm Syria, cui tale est, iis abundet, sic nostra Campania, Sicilia, & loca maritima. Sed à ventis tuta sit oportet: quippe cùm tempestiue floreat, hyemis sæuitia nondum sedata.

Palladius pingui terra gaudere ait.

Theophrastus semine nasci scripsit. Palladius nucleis seri. Nam pomis statim grana decussa, & sole siccata, pingui, & prope cribrata terra autumnò tria simul ponunt, quæ feruntur in vnum coire virgultum: quod assidua rigatione iuuandum est, atque fossura, quæ solum leuiter scalpens teneritudini robur inducat. Post annum deinde, vel aliquando tardius, quæ fuerit de semine planta transfertur, & hoc genere fructus efficit dulciores. Theophrastus etiam auulsione nasci. Palladius: mense Septembri, circa calendas Octobres, vel Februario tuberes seremus sobole, cuius tenera diligenter nutriri debet infantia. Sumatur cum radicibus planta diuulsa, bubulo fimolatur, ac luto statuatur pingui terra & subacta, subditis conchis, & marina alga, terris sui magna parte condatur.

Palladius ait prodesse tuberibus, quæ malis prodesse memorauit.

Plinius: Tuberes melius inferuntur in pruno sylvestri, & malo cotoneo, & in calabrice, quæ spina sylvestris est. Palladius, Inferitur malis omnibus, pyris, & prunis, & calabrici, melius trunco fisso, quàm cortice, desuper qualo, vel fictili vase munitur, repletis vsq; prope summitatem surculis, terra subacta cum stercore. In nulla alia arbore melius concipit, quàm supra calabricem, vt domestica arbor supra sylvestrem.

Morbus earum, vt Theophrastus ait, vt senescens vermibus erodatur. Vermes isti grandes, & alii, quàm qui in reliquis cernuntur arboribus.

Palladius, tuberes seruabuntur, ait, si obruantur in milio, vel vrceolis picatis & oblitis. Vesuviani vsque ad Maium ita seruant: Decerptas ex arbore nondum perfectè maturas, & per hebdomada intactas relinquunt, vt tutius integræ à vitiatis separentur. Inde sabulonem è fluminibus, vel procurrentibus viarum aquis accipiunt, ac incerniculo minutum à lapillis secernunt, ne eorum occulsi tenera fructuum cutis offendatur. Inde fictili vase sabulonem inspargunt, inde fructus, ne se contingant, ac vicissim vsq; donec vas compleatur: & opertum vas sicco loco reponunt. Si annus siccus fuerit, ferè omnes illasæ asseruantur: si pluuius, multæ vitiuntur.



Materies.

Lignum spissum, solidum, nullamque putredinem sentiens esse prodit  
Theophrastus.

## De Myrto. CAP. XXIX.

**M**YRTVS hortorum præcipuus decor, & delicia, ad plurimos mortali-  
um vsus venit. Plinius succorum naturam præcipuam admirationem  
in myrto habere scripsit, quando ex vna omnium, olei, viniq; bina genera fi-  
unt. Item myrtidanum. Et alius vsus baccae fuit apud antiquos, antequam  
piper reperiretur, illius obtinens vicem, quodam etiam generosi obsonii no-  
mine inde tracto, quod etiam nunc myrtatū vocatur. Eademq; origine apro-  
rum sapor commendatur, plerunque ad intrinsectus additis myrtis. Cato docuit  
vinum fieri è nigra, siccata vsq; in ariditatem. In vmbra, inquit, arefacito, ser-  
uatoq; ad vindemiam. In urnam musti contundito myrtæ semodium, id obli-  
nito, vbi desierit feruere mustum, myrtum eximito. Si non siccantur bacce, o-  
leum gigni docet. Postea compertum & ex alba vinum fieri album, duobus  
sextariis myrti tusæ in vini tribus heminis macerata, expressa q; Oleo quoq;  
(mirum dictu) inest vini quidam sapor, simulque pinguis liquor, præcipua vi  
ad corrigenda vina faccis ante perfusis. Retinet quippe facem, nec præter pu-  
rum liquorem transire patitur, datq; se comitem præcipua commendatione  
liquato. Virgæ quoq; eius gestatæ manu viatori profunt in longo itinere pedi-  
ti. Quin & virgei anuli expertes ferri inguinū tumori medentur. Prodest myr-  
tus coturnicibus vescentibus, quippe veratrum depastæ (Didymo auctore)  
non satis tutæ sunt cibo, nam & distentionem, & vertiginem inducunt. Vnde  
si quis ab earum esu infestabitur, myrti baccis ei subueniendum est. Præterea  
turdi in suis nidis myrtum ingerunt, vt abigant animalium noxas, Pamphilo  
scribente.

Fabula de  
myrto.

De myrti planta fabulæ nonnullæ inueniuntur, quas huc adducere operæ  
precium esse visum fuit. Græci arborem Mineræ dicant, commenti fabulam,  
quod Myrsine Attica puella fuerit, pulchritudine ac robore insignis, amica Pal-  
ladi, quam iuuenis ab ea cursu, & palestra superatus interemit, inuidia du-  
ctus, quod elegantia, cæterisque naturæ dotibus reliquæ inuenturi præstaret.  
arbuscula in demortuæ vicem succedens semper Mineræ chara remansit, re-  
fricans aspectu suo desiderium. Sed cur Veneri myrtus dicata sit, vnde appo-  
sit dicta? Amat enim myrtus maris littora:

*Littora myrtetis gratissima.*

Seruius ait, quod huius arboris in mulierum necessitatibus vsus multus, ac  
plurimus sit, vt ex medicorum libris patet. Alii ob arboris odorem: nempe Ve-  
nus odoribus, & vnguentis delectatur. Odor quoq; arboris creditur nonnul-  
lis venerea suadere, & è baccis ipsius compositum fiebat, per quod libido ex-  
citabatur. Demonstrat id Poëta Furtus, dum Digonem meretricem introdu-  
cit, dicentem, *Myrrhinū mihi affers, quod Veneris armis occursem fastidiuncula.*

Virgilius in Georgicis:

*Formosæ*



*Formosa myrtus Veneri.*

Et apud inferos syluā myrteā fingit, in qua essent, qui amoribus affliguntur.

*Nec procul hinc partem fusi monstrantur in omnem*

*Lugentes campi. sic illos nomine dicunt:*

*Hic quos durus amor crudeli tabe peredit*

*Secreti celant calles, & myrtea circum*

*Sylua tegit.*

Myrtum etiam Paphiam vocant, ob insulam Paphum Veneri dicatam:

*Solido Paphia de robore myrtus.*

- 10 Plutarchus in Numa prodit, mense Aprili Veneri sacrificari, quod is mensis huic deæ sacratus esset, ad cuius calendas myrto coronata laurentur. Querit idem in quaestionibus, cur matronæ Bonæ deæ sacellum ornantes, myrtū non inferant, cum plantis & floribus cunctis studiosè tunc petantur: an quod putant omnibus flagitiis, & præcipue venereis sacra peragunt, ut non solum maritos, sed omnes e domo mares expellant? itaq; myrtum, ut Veneri sacram abhominantur, nam quæ hodie murtia Venus dicitur, olim myrtia dicebatur. Etiam symposiorum primo ait, morem antiquis fuisse, ut omnes conuiuii initio prænam Deo canerent: deinde singuli accepta myrto, quam ex eo asacon appellabant, quod is caneret, cui tradebatur in eum finem, circumlata tyra qui
- 20 petitus erat eam sumebat, & carmen illud concinne modulabatur, quod quoniam musicæ rudes recusabant, scolion dicebatur. Alii dicunt myrtum non ordine solere circumduci, sed e lectulo in lectulum transmitti, ita ut qui primus fecisset, primo in secunda mensa illam mitteret, is primo tertiæ, eodemque modo secundi secundis, ut hoc modo in circuitum iret. Veneri simulachrum ex pullulante myrto ad flumen Hermon fecit Pelops, unde Hippodamiæ nuptias est consecutus. Myrtus quia Veneri, coniugio etiam sacra fertur: & inter myrti genera genus est vnum coniugale dictum à Carone. Traditur myrtea verbena Romanos, Sabinosq; cum propter raptas virgines dimicare voluissent, depositis armis purgatos eo loco, qui nunc signa Veneris Cluaciæ habet. Cluere enim antiqui purgare dicebant. Ignoratque Plinius an prima omnium in locis publicis Romæ sata sit, faridico quidem, & memorabili augurio. Inter antiquissima nanq; delubra habetur Quirini, hoc est, ipsius Romuli, in eo sacræ fuerunt myrti duæ, ante ædem ipsam per longum tempus, altera patricia appellata, altera plebeia. Patricia multis annis præualuit flaccescente plebeia, quandiu senatus floruit, plebeia retorrída ac squallida. Quæ posteaquam eualuit, flaccescente patricia Marisco bello languida patrum auctoritas facta est. Quin & ara fuit vetus Veneri myrtæ, quàm nunc Murtiam vocant.

- 40 Memorat Athenæus Apollodori autoritate, quod Dionysius, qui author portionis fuerat, idem fuit adiutor, ut malis, quæ adinuenerat, præsidium afferret, nam ebrietate laborantibus, coronam ad aspectus, & odoris iucun-

*De Coronis quæ ex myrto.*



diratem, è myrto astringentem donauit, & vini vapores reprimeret. De corona itidem Naucraticæ hæc habet è Polycharmo: Herostratus mercator, cum Paphum Cypri appulisset, Veneris simulachrum coemit, cum naue in Naucratem contenderet. Iuxta Ægyptum cum hyems repente incidisset, nec ubi locorum esset, cognouisset, ad Veneris simulachrum confugit, orauitque ut omnes seruarer. Tunc dea myrtos omnes appositas virides fecit, nauemque odore repleuit, sic sol emicuit, & in Naucratem peruenerunt. Tunc Herostratus è naue egressus in Veneris templo simulachrum & myrtos deposuit, & sacrificia instituit, & singulis coronam myrteam donauit, vocauitque Naucraticem, quæ Philonidis etiam testimonio vini vapores reprimat. Seleuci etiam traditione habetur, coronam ex myrto compositam Hellotidem vocari, & viginti vlnarum habere circumferentiam, & Helotum festo in pompam procedere, & Europæ ossa circumferri, quam Hellotiden appellauerunt. Philetas asserit myrti ramum Lesbios Hypothymidas decere, circa quem alios flores innectere consueuerunt. Bellicis quoque rebus se inseruit myrtus, inquit Plinius, triumphansque de Sabinis Posthumius Tubertus in consulatu, (qui primus omnium ouans ingressus urbem est, quoniam rem leuiter sine strepore gesserat) myrto Veneris victricis coronatus incescit, optabileque arborum etiam hostibus fecit. Hæc postea ouantiū corona fuit. Massurius auctor est, curru quoque triumphantes myrtea corona usos. L. Piso tradit, Papyrium Mas-

Nomen.

sonem, qui primus in monte Albano triumphauit de Corsicis, myrto coronatum ludos Circenses spectare solitum. M. Valerius duabus coronis utebatur, laurea, & myrtea, qui & hoc vouerat. In Hereis certaminibus, quæ Argis fiebant in honorem Iunonis, victores myrtea corona & æneo clypeo donati consueuerunt. Apud Eleos (etiam Theophrasto auctore) pulchritudinis certamen fieri solitum, cuius victor arma, quæ Palladi offerebat, & myrteam coronam accipiebat, qua redimitus comitantibus amicis ad Palladis eodem ducebatur. Persæ, Herodoto auctore, diis sacrificantes cincti myrto tyaram gerunt.

Norma.

Græcis *μύρτιν* dicitur, sed Galenus *μύρτιν* vocauit, cum soleant sæpius Græci *π* in *σ* commutare. Puto sic vocatam propter myrtæ quandam amulam odore gratiam, qua pollent eius bacculæ. Nicander in Theriacis *φινώδεα μύρτα* dixit, id est, constipantia myrta, ubi & scholiastes admonuit *μύρτα* pro fructu accipi debere, ut *μύρτις* arbor, & *μύρτιν* fructus dicatur: *μύρτιν* etiam ab Archilocho dicitur, ab Antiphane verò phibaleos. Sed adnascencia quædam myrti *μύρταδες*, & *μυρτίδαρον* nominatur. Latinis myrtus dicitur, à Catone myrtum, & myrta masculino, & foeminino sexu. Varro murta dixit. Vnde murta-  
tum genus farciminis. Itali *mirto*:  
Vagam myrti descriptionem à Theophrasto afferemus. Myrti arbor in fruticem abit, nisi crebrò repurgetur. Medulla caret. Fronde semper videnti, angusta, crebra, & seriatim disposita, myrobolani arboris simili, sed breuiori. filore suprafructum insidente, qui senescens in pappum vocatam conuer-

tatur.



ratur. Cacumine, & latere germinat. Ex anniculis fructificat surculis. Sed con-  
 tingit post Arcturi exortum, vt denuo concipiat, floreat, fœtificet que, sed fru-  
 ctum perficere nequeat, nam semiconditus remanet: adeo est ad supergemi-  
 nandum propensa natura, cum suapte natura affici facillime possit. Fructus ad-  
 uersus inter sese, densusque in ramis, vt lotus. Succo vinoso præditus. Sed vino-  
 sus myrti sapor perspicuus non est, minus etiam qui pinguis est in eodem: ha-  
 bet enim talem quoque humorem, qui vino cum sacclatur, supra innatat, qui  
 detrahitur, & ad lucernarum lumina vritur. Fitque purior si detractis operimen-  
 tis è mera pulpa extrahatur humor. Idem consequitur etiam procedente ata-  
 10 te: quia exhalat aqueum & terrestre subsidet. Brevis est vitæ: sed fertiliori bre-  
 uior: & quæ molli sunt nucleo celerius moriuntur, quàm quæ duro: & nucleo  
 vacans enucleatis. Sunt qui durissimam, & validissimam myrtum esse affirmant.  
 Nouelli fructus acerbiore, amarioreque sunt, sed maturando dulcescunt, quia  
 temperatur à natura humor aquosus, vnde dilutiores, dulcioresque fiunt. Odo-  
 rata sunt folia, flores, rami, & fructus. Ratio est, quia eis acedo & pinguedo  
 insit, & vinosi sunt. Myrtus suauius halat, si eam multo prius maceraueris, quàm  
 sola, quia dul. ior, meliorque redditur temperata. Sero suos maturat fructus,  
 quia sicciore sunt, vnde leuiorem frigiditatem requirit, nimia enim exiccat,  
 exacerbatque, media verò temperies, & austrini, & humidi flatus commo-  
 20 dissimè alunt. Nec longa, nec numerosa nititur radice. Plinius ex eo: Frutico-  
 si generis arbor. Folio angusto atque disposito, nunquam decidenti. Fert late-  
 ribus & cacuminibus. Bacca primo candida, mox viret, deinde rubet, ultimo  
 nigrescit. Succo vinoso prædita, piperis gustu. Cito occidit, tamen antecedit  
 diuitiis: nam in trimatu ferre incipit, ostendens & ante. Sed quæ Theophrastus  
 de myrti odore protulit, ab Aristotele excepit, quippe libro problematū qua-  
 rit, Quamobrem myrta collisa in manu dulciora sentimus, quàm integra. An  
 quemadmodum racemorum acini vindemiati dulciores sunt, quàm non vin-  
 demiat: etenim musto, quod natura suaue est, excepti acini quasi condiuntur,  
 quippe qui vel extrinsecus mustum resudent: at qui in racemo coherant, uti-  
 30 que inconditiores constant. ergo myrta quoque naturam dulcia, intusque suam  
 dulcedinem acinorum in modum vix continentia, vbi manu compressa, con-  
 flicataque sunt, diffusa intestina dulcedine, parte quoque exteriori inopple-  
 tur, itaque dulciora non immerito sentiuntur. Quærit item Aristoteles, cur myr-  
 ta enucleatiora sunt, quæ minora, & palmulæ nucleo penè carent, quæ minu-  
 ta adoleuerunt, & vuarum acini, qui passim constiterunt exigui, vinacea vel  
 nulla continent, vel pauciora, minoraque. An quia minus perfecta sunt, quæ  
 minora, ideo semen continent indiscretum, cui perinde vt finis, nucleus de-  
 putatus est, quamobrem & minora sunt, utpote surculi quidam agnati exte-  
 riores, partusque imperfecti, & minus dulcia, quàm quæ iustum continent  
 40 nucleum: sunt enim minus concocta: concoctio autem non nisi perfectio est.

Aristoteles meminit albe, nigraque myrtus. Alba domestica, nigra sylvestris, Genera.



quæ crebriori folio est. Causam reddit in problematibus. Syluest. ē esse, quod syluestribus locis proueniat, minimeq; ex cultu mutetur: humida autē omnia crebriore fronde condi, quodq; minus fructus suos decoquat, iccirco ad frondes alimentum se vertere. Theophrastus, myrti genera varia esse, & explorata communis vsus fecit. Meminit alterius myrti, sed ab hac diuersæ, oxymyrsinæ, quæ fructum supra frondem gerat. Aliam esse molliori nucleo. aliam duriori, aliam verò nucleo carentem, scribit. Præterea fructu nigro, alboque, & rubro etiam. Meminit præterea tenuifolia, videlicet coronarij generis. Columella albam, nigramque memorat. Plinius Catonis verba referens tria dicit esse genera, scilicet cōiugalem, albam, & nigram. Coniugalem putat dici à coniugiis ex illo Cluacinæ genere, ac coniugalem nostratem dici. Aliamq; adducit distinctionem satiuæ, & syluestris, & in vtraque latifolia, in syluestri propriam dicit esse oxymyrsinem. Satiuatum genera inquit, ropiarij fecerunt: tarentinam folio minuto, nostratem patulo, exoticam densissimo, senis foliorum versibus: hæc non est in vsu, ramosa vtraque alia. Dioscorides diuidit in nigram, & albam, & satiuam, & syluestrem, quippe satiuæ nigra vtilior, quam candida. Diuidit etiam in tenuifoliam, & latifoliam: nam capite de Tithymalis inquit, Dendroidem constare myrti foliis tenuioris. Celebris est Hyppolyti, & Phædræ amoribus Træzenia, cuius folia, vt inquit Pausanias, prope delubrum Veneris satæ perforata nascuntur; iniuriam videlicet ferentia latuentis vnguibus, & calamistris fœminæ. Nos hoc modo genera distinguemus. Primo in satiuum & syluestre. Syluestre in duo genera diuidemus. Primum est oxymyrsine dicta, quam etsi vera myrti species non sit, apposuiamus tamen quia à Theophrasto, & Plinio apposita est. Aliud genus est, nostras Plinij, vel latifolia, Catonis coniugula, Græcis dicta *πλάτυσμος*, ramosa, minus gracilis, cuius baccæ lagenulas efficiant, floribus albidis, ex quibus chymicis organis aqua extrahitur odoratissima, mire vnguentariis expertita, à nobis vulgo dicitur syluestris, cum totius nostri tractus maritima, & colles aprici, & scæpes hæc scateant, ac sponte nascatur, & sine cultu viuat, & optime fructificet. Hæc in albam, nigram, purpuream, & inter hos colores, mediam diuiditur. Alba maiores efficit fructus, & magis urbana videtur, sic nigra minores fructus, acutiores frondes. Putabat Matthiolus albam, & nigram myrtum dici ex frondium colore, quod cum albos fructus, & nigros myrti non inspexisset, cum aucthores, qui horum meminerant, Theophrastum, Dioscoridem in vini compositione, Columellam, Plinium, reliquosque, nec considerasset locis siccis nigriora folia, tenuioraque vt fructus, cultis verò & humidis albidiora, maioraque. Plinius tria Catonis genera myrti commemorat, coniugulum & album, & nigrum, cum coniugulum album genus vnum sit, alterum nigrum, vt duo sint, nō tria. Satiuam nos vocamus, quæ minuto folio est, hanc Plinius tarentinam vocat, & in opere ropiario consilis. Theophrastus coronarij generi accommodat. Huius species plures sunt, & quæ latiori, & quæ minutori folio, & quæ



& quæ albos, nigros, & purpurascens fructus afferat, præterea in surculis retetibus, & bini, & terni, quaternive frondium ordines distincti conuiscuntur. Græci hanc *σπόγγιον*, siue angustifoliam vocant. Fruticat hæc virgis consiliibus, flexilibus, nigricantibus, topiario operi accommodatis, folio buxi, sed minore, fructu minore, hederæ simili, copiosiore, in summitate pluribus vnguiculis redimito, vinosum succum presso remittenti, intus minutis, crebris, albicantibus ossiculis prædito, quo aues autumnos saginantur, tantumq; odorem contrahunt, ut non exenteratas voremus. Neapolitani *Mortela gentile* vocant. omnes in arborem cultura commeant in viridariis. Exotica Plinij nobis infrequens, & nisi aliquis studij gratia asseruauerit, non visitur.

Inter ea, quæ frigidos odit tractus, nec iis mansuescere potest, myrtus est, *Celum.* argumento quod omnino nulla in Olympo, nulla in Ponto profuerit, & si summo studio, adhibitaque omni solertia, etiam religionis causa cõseruerint. In Propontide verò, & montibus, & locis multis prouenit. Fragrant suauissimo odore in Ægypto, causamq; perscrutatur Theophrastus. Primò vi & proprietate soli, & aeris id euenire putandum est, secundo ab ipsius plantæ natura. Nam & myrtus omnis sicca sua natura est, Ægyptia tamen cæteris siccior est, quod & frondium tenuitate, fructus exiguitate, ac nigro eius colore perspicitur, hæc enim omnia ex sicco proueniunt. Succus humoris parum habet, quod parum est facile excoquitur, suauitasq; odoris non nisi in excoctione consistit. Euenit autem soli & aeris opera, quippe solum siccum, & aer mollis, & placidus, quæ utraque cocturam augent, alterum quia coquit, alterum quia humectat, ob id syluestria vrbis odoratiora, & quæ in apricis, præcipue meridie, iis quæ in umbra degunt, suauius olent, quia minus alimenti hauriunt, & quicquid hauerunt, melius concoquunt. Vnde efficitur, ut non in longitudinem crescant, sed fruticosa, & crassiuscula euadant. Quæ circa Cisthū, in longitudinem crescant. Sed cur odor præcipuus myrti in Ægypto ubi cætera omnia prorsus hebescent, causa est, quia cælum roscidum est, & flores largius humefacit, utpote natura humidiores: at quæ sicca sunt, ut myrtus, minus humefacit: validius enim humiditati resistere valet, & fructus ideo pusillus est, quia cœlesti aqua non fruitur. Plinius ex eo myrtum odoratissimam esse in Ægypto scribit, cætera sine odore. Subit & in montosa myrtus. Didymus editioribus locis seri præcipit, quod vicinia odoris suauitate repleat. Virgilius,

*Littora myrtetis latissima.*

Theophrastus ut quædam animalia, ita myrtum ancipitem vitam degere, & *Solum.* littora amare, & terrestria loca prosequi asserit. Præterea Latinus ager, qui totus aquis abundat, & plana myrtum habent. Circæ promontorium, quod vocant excelsum, frequentissime myrto scatere. Circem illud incoluisse tradunt indigenæ, & in Elpenoris inibi tumulo myrtum coronario genere nasci, in quo primū visa traditur. Plinius: Arbor ipsa in Europæ citeriore cælo, quod a Cerauniis montibus incipit, primū Circæ in Elpenoris tumulo visa traditur,



Græcumque ei nomen remanet, quo peregrinam esse apparet. Nos solo fabuloso, siue arenaceo, sicco & leui optime prouenire conspeximus.

*Salis.*

Semine satam myrtum interdum præstare, inquit Theophrastus, sed eam ut plurimum degenerare, ne colorem quidem seruare, sed fructum ex rubro fieri nigrum, ut in Antandro. Didymus ex baccis seminaria facit, quas leuiter tulas, & restibus butomo contextis inuolutas fossiculis obruit. Columella ab idibus Februariis myrti baccas in areolas differere optimum præcipit. Plinius, Myrti genera omnia in Campania baccis seruntur. Democritus & alio modo seri docet, grandissimis baccarum tuis leuiter, ne grana frangantur, eaque intrita restem circumlini, atque ita seri, parietem fore densitatis, ex quo virgulae differantur. Palladius Februario tempore ex myrti baccis seminaria facit, & facta excolit.

Seritur & plantis, & à trimatu tempestiuum est transferri, ex Plinio. Theophrastus crebras serere docet, non plus, quam nouenos pedes, & nisi frondibus obsepta sit, seruari non potest, cum sicca spissaque sit, fructum enim nucleosum vel humidum gerit, itaque soli expositus obarescit, in umbra autem coalescens, & solem modice sentiens humorem suum seruare, atque coquere nimium potest, quam obrem breui interuallo conserere oportet, ut se contactu operiant mutuo, ut solis nimios a stus aufugere possint, tum etiam, quod radice numerosa non sit, nullo alimenti mutuo raptu infestatur. Mutuo etiam amore coniunguntur olea & myrtus, Andronionis autoritate, qui eas mutuo amplexu radicum degerere refert, & myrti virgas per oleæ brachia protepere, fructumque olea protectum, ut nullam vim solis, flatúsve pateretur, tenerum ac dulcem euadere, sed minorem, quam locis Soli expositis. nec aliud est quod seri iuxta oleam velit. Seri myrtus sub pino comode poterit. Democritus tradit punicam & myrtum mutuo amore coniungi, & ex propinquo simul plantatas fructu abundare, & radices mutuò implicare, & si non valde vicinæ existant. Plinius, Quidam myrtos densiores seri iusserunt, in pedibus tamen nouenis. Theophrastus, In consuetudine amputari desiderat, & quo propius terræ fuerit, eo melius, sed plagas allenatas contegunt, ne intrudatur sol, aut imber.

Didymus auulsione plantari posse docet, sed auellatur cum conspicua radicis parte.

Propaginibus etiam plantari posse docet idem, viui radices faciendo. Plinius rarentinam Romæ propagine seri.

Ramis seri monet etiam Theophrastus, sed terra iugiter accumulanda, dum germinantes ramuli roborentur, & hic myrti satus proprius est. Didymus: Decerptus à cacumine termes, proceritate subiectus pangitur, qui solo stercore satiato, quousque ramulos emittat, exaggerari debet. Plinius: Seritur & ramo myrtus laxato prius meatu, longitudine trium pedum, crassitudine minus brachiali, cortice diligenter seruato, trunco exacuto. Myrtus etiam ligno conualescere potest, authore Theophrasto, cum spissitate sui corporis, virale illud, genita-



genitaleq; conseruare principium valeat, non tamen sine adiumento naturalis caloris. haud enim satis spissitas illa facit, si admodum sicca sit, & ad neporum procreationem inhabilis.

Didymus tradit esse, qui cubitales taleas scrobibus oleatū more in obliquū mergant. Alij longe melius fructificare pollicentur, si in caput plantulæ figantur, & alibi transplantatas meliores reddi. Cassianus, Theophrasti autoritate, Aprili mēse myrtos in taleas sectas plantari posse humidis & riguis locis, quod in Erethio nusquam legitur. Plinius & taleis myrtum feri dixit. Virgilius,

*Solida Paphia de robore myrtus.*

- 10 Theophrastus, Androtionis autoritate, maximam purgationem querere *Calam.* myrtum dixit: latius enim germinat, à qua plura fuerint adempta, largioremque fructum ministrabit. Myrti luxuria ideo compescenda, quia sua natura stipata germinatione fecunda est; adhuc facile exarescunt propter gracilitatem, ergo recisis crassescunt. Didymus. Gaudet arbor iugi repurgatu, in excelsam proceritatem adolescit, ad textile vasculorū opus utilis. Plinius non annuam, sed alternam tonsuram quarit, quia celeriter fruticescit. Cum vetusta est, ramos ab ea decidere, & truncum deinde colere, tāquam denuo satum oportet, inquit Theophrastus. Androtionis etiā autoritate, acerrimo fimo, & rigatione copiosissima myrtum egere dixit, vehementissimo stercore, vti pellium
- 20 facibus, & vrina ex syluestri genere in vrbantum habitum transire. Didymus delectari hominis vrina, & maxime onula.

Didymus inferi ait, in suum genus, in albam, & nigram, & viceversa, & in *Institu.* malum, & in espilum, & punicam. Diophanes in salicem. Tarentinus vitem recipere ait, & super ipsam arborem vitis sarmenta insita vuas producere, quæ immum fundum myrti baccas habebit. Myrtus punicam ferre visa est: quia maxime myrtus punica delectatur, vnde si punica in myrtum inseratur, aut vicissim myrtus in punicam, multo maiorem afferet fructum.

- Quomodo myrtus sine interno nucleo fiat, docet Theophrastus. Si feruēti *Am.* aqua rigetur, in tantum meliorescit, vt sine nucleo reddatur. Deprehensum id
- 30 esse fortuito, cum myrtus iuxta balneum staret neglecta: ab hac enim vacua nucleo reddita semina petentes ferebant, atq; ita genus huiusmodi Athenis esse inceperat. Alium quoq; demonstrat modū: spurcicias pellium congerere, vrinaq; adhibere, cum germina prosiluerint, precipiunt: quasi fructus ita reddi sine interiori nucleo possit. Id enim genus stercoreandi ex syluestri in vrbantum genus immutat. Didymus à Theophrasto: Baccas sine internis nucleolis creabit crebro aquæ repentis imbre rigata. Latiore coma virebit, vberioremq; fructum pariet, si comes rosa coniungatur. Et cum myrto consortium iniens rosa fructuosior emicabit.

- Theophrastus, Androtionis autoritate, nec medullā habere, nec vllō mo- *Morbi & remedia.*
- 40 do sub terra infestari, tradit. A gelu facillime lædi, imbecilla & gracilis cum sit, ipsiusq; rami tenues, tenelliq; tota que arbor minus calida.



Culura.

Cato docet, Virgas myrteas si voles cum baccis seruate, cum foliis inter se alligato, fasciculos facito, eos in amurcam demittito, super stet amurca facito, sed ea, quæ dimissurus eris, sumito paulo acerbiora. Vas quo condideris obnito planè. Didymus: Myrti baccas diutissime virentes seruant vase non picato, & diligenter operculato conditas. Alij cum eius ramulis reponere malunt. Aristoteles quatit, Cur fructus myrtorum nō conditarum magis, quàm folia defluant, conditarum autem, reseruatarumq; alga, vt sit, folia defluant, fructus adhæreant? An ita euenit non conditis, quoniam natura sancitum est, vt fructus peracta decoctione flaccescant, ac decidant, quæ quidem decoctio in repositis agi non potest, sed eatenus tantum efficitur, vt algæ vapor prohibeat, ne humor fructus immutetur: folia contra cum siccent decidunt: algæ autem, vt salsa, exiccandi vim habent. ergo non idem foliis accidit arbori adhaerentibus, & conditis, modo quo dictum est.

Materie.

Virgilius de eius materie,

*At myrtus validis hastilibus.*

Claudianus,

*Et pastoralem præfixa cuspide myrtum**Gerit.**De vua spina. CA P. XXX.*

**H**ABETVR frutex pomariis frequens, topiario operi accommodatus, vteribus, vt spero, indictus. Quia ciborum condimentis omphacij modo expetitur, nec non mulieribus vtero gerentibus, nobis non erit silentio prætereundus.

Nomen.

Cum nomen Græcum, vel Latinum quo appellemus, non subueniat, vulgari, & omnibus vsitato contenti erimus. Vuam spinam, vel crispam nominant ab acinis, quos affert vuæ modo effigiaris, & à spinis, quibus frutex toto suo occursu horret: vel crispum à foliis apij modo crispantibus.

Forma.

Fruticosi namq; generis arbuscula est, ramulis crebris, viciis, crebrisq; horribus spinis, aculei mucrone seuientibus. Foliis circinata rotunditatis, æmula facie apium, vel oxyacantham exprimentibus. Flore ex herbido candicante. Granis primo viridibus, acerbisq;, mox flauescētibus, dulcibusq;, & pellucidis, à pediculo ad vmbilicum striatis, non racematim, sed baccarum more dependentibus. Veris initio pubet, dein flores, nec diu post vuas aciditate astringentes affert.

Genera.

Duorum est generum, satiua altera, syluestris altera, quæ baceas pilosas fructetis, & vepribus affert.

Calum.

Temperato viuit cælo.

Solum.

Solo tenui, soluto, &amp; pingui.

Satio.

Seritur semine, sed rectius ramulis ad radicem crebrius fruticantibus.

*De ma-*



## De malo punico. CAP. XXXI.

**D**EMOCRITVS, alijq; Agriculturę scriptores malum punicum inter nuce-  
ces, non inter mala reponendum censent, cum foris duro tegatur corti-  
ce, intrus verò habeat, quod esui sit, ea Greci ἀκροσπυα vocant. Plinius verò inter  
mala, inquit: Mala appellamus, quamquam diuersi generis, persica, & gra-  
nata. Nos in hoc loco reposuimus, rati omnibus satisfactum iri, nam & à ma-  
lis vltimum est, nucum verò primum. Varro ex malo punico cibum apes so-  
lum capere scripsit. Africanus affirmat punica ramos serpentes arcere, qua-  
propter in locis amœnis tutaminis gratia deponi consueuere. Plinius etiam in  
10 manibus ramos punicorum serpentes fugare scripsit. Quod mihi ridiculum  
admodum videtur, cum cuiusque arboris rami in manibus gestati serpentes  
fugent, neque vnquam serpentes peiores me vidisse memini, quàm sub vmbra,  
& punicarum cespitibus. Sed ad Poetarum commenta veniamus.

Mercurio punica fructum antiquitas dicauit, nam veluti in eo quampluri-  
ma latebra sunt, ita in oratione, quam Mercurio ascripserunt, vt apud Græcos  
eruditus Clemens Alexandrinus prodit. Apollonius verò Tyaneus malum pu-  
nicam in honorem Iunonis plantari dixit. Habetur etiam ex Græcorum fabu-  
lis satam primò in Cyprum malum punicam à Venere, nullam aliam ob cau-  
sam reor, nisi ob eius pulchritudinem. Insuper Hereum templum in Eubœa  
20 memorabile fuisse Iunonis simulachro ex ebore, & auro factò, Polycleti ope-  
re, cuius manuum altera malum punicum, altera sceptrum gestaret. Cur ve-  
rò malum punicū gestaret, Pansanias secretius esse dicit, quàm vt alicuius ser-  
mone possit explicari. Ideoque prætermittendum. Darius Xerxis pater, cum  
malum punicum haberet præ manibus, à quodam interrogatus, cuius nam rei  
taneum numerum desideraret, quanta granorum illorum esset multitudo?  
Respondit tot Zopyros, erat enim hic vir probus. Sed Herodorus Darium ab  
Artabano de eo percontatum tradit respondisse se optare tot Magabizos po-  
tius, quàm Græciam subditam. Fuit & punicum maxime laudatū in sacris He-  
breorum cerimoniis. Sacerdos enim tabernaculum ingressurus vestem gere-  
30 bat, à cuius ambitu alternatim mala punica, & tintinnabula pendebant, nō si-  
ne mystica ratione, vt à sacris interpretibus edocemur. Quemadmodum exti-  
mus cortex plura continet grana, sic fides vna innumeros populos sacra eccle-  
sia conseruat. Alij dicunt hoc malū concordiam significare. Ferunt etiam Mi-  
lonem Crotoniatem inter egregia suæ fortitudinis facinora malum punicum  
manu ita continuisse, vt nullis conatibus inde eripi permiserit, & quod mirum,  
poma ipsum premendo non collidebat. Proserpinam à Plutone raptam Ce-  
res diu perquisiuit, tandem rescuiuit, & à Ioue impetrauit, vt sibi communis filia  
restitueretur, hac lege si nihil apud inferos degustasset: sed inuentum est, eam  
tria mali punici grana comedisse. Ouidius in Fastis,

40 *Raptat tribus, dixit, soluit ieiunia granis*  
*Punica, qua lento cortice poma legant.*



Aliubi septem fuisse cecinit.

— Et cultis dum simplex errat in hortis,  
Puniceum curua decerpserat arbore pomum,  
Sumptaq; pallenti septem de cortice grana  
Presserat ore suo.

Sed post multas matris querelas indultum est, ut sex menses apud illam maneret, totidemque cum Plutone. Sed id non sine mystagogica ratione. Proserpina enim luna est, quæ sex mensibus crescit, totidem decrescit, videlicet, ut per menses quindecim diebus crescens apud superos, quindecim aliis deficiens apud inferos videatur. Sed de punice ortu Arnobius fabulam cōtexit: In Phrygia finibus ingens saxum fuit Agdus dictum, ex quo Deucalion & Pyrrha ex Themidis præcepto ad humanum genus renouandum post diluvium lapides sumpserunt, ex quorum iactu deum mater efficta fuit, quam in Agdo obdormientem Iuppiter incestis cupiditatibus appetiit: diu oblectatus, cum quod optauerat, obtinere nequisset, sperma in lapidem fudit, ex quo Agdestis natus fuit, qui sua immani efferitate, cum nec deos, nec homines timeret, à diis de eius temeritate imminuenda constitutum est, ut Liber in eum animaduertere, cui cum merum potui Liber apposuisset, gravissimoque somno oppressus esset, Liber setis complicatis laqueo plantas nexuit ex vna parte, ex alia testes eum pene, qui somno solutus extensis pedibus membrum virile sibi amputavit, cuius cruore mali punici arbor cum suis pomis nata est: quæ cum Nana legisset, ac in sinu reposuisset, Arym concepit.

Nomen.

Græcis ποία, & ποία dicitur. Hippocrati, & Nicandro σιδή. Menandro, Athenæo auctore, ποιδία. diminutivum autem est ποιδιον, veluti puniculum dicas. Batio σιδή vocant, nomenque sibi vendicavit ex Side eorū loco, qui frequentissimam hanc habet plantam. Idemque ex Agatharchidis autoritate declarat, quod inter Athenienses & Batio orta contentione de Sida regione, Epaminundas protinus ex dextra conditum depromens punicum, sciscitatus sit, quonam modo malum hoc vocatis? qui Rhœan responderunt. sed nos, inquit Sidam vocamus, & ita Athenienses victi memorantur. Latinis malum punicum dicitur, quod è Pœnorum regione primum in orbem nostrum sit translatum, ob id Plinius, E Carthagine nomen sibi vendicant, crescunt enim ibi laudatissima. Aliquādo & punica Columella mala granata vocat, & granata. Sic etiam Plinius, quod numerosis intus acinorum granis infarctum sit. Est & vna pars Beticæ regionis in Hispania, quæ ab eorum copia Granata appellata est. Itali Melo granato vocant.

Forma.

Punica descriptionem membratim discerptam à Theophrasto in unū colligemus. Exurgit punica haud adeò procero caudice, sed breui, & cōtorto. Medulla ligni carnosa. Fruticosa est, suæque exilitatis causa multiplici caule diffusa relinquenda. Ramosa, superiore coma multo fusiore. Folio angusto, cuomi-  
ni arbori simili, quemadmodū & magnitudo, nitidūque viroris. Flore cōtra quā-



cæteris arboribus puniceo, excipiendo amygdalarum genus quoddam, quod  
 subrubicundum florem substat: qui creber, copiosusq; erumpit, amplitu-  
 dinemq; sui pomi, quadamtenus æmulatur, is in fructum incumbit, qui subitus  
 attollens se colligit, & ambitu congruo sinuatur, calatiq; effigie. Pomo quod  
 corio, prætenuiq; membrana tegitur, numerosis intus acinorum granis in-  
 farcto, qui constant cute, & humore, vel succo vinoso, acidoq;, modo nuclei  
 paliuri. Acini principium annexus proprium habere videntur, evidentissi-  
 mumq;: vnde expresse discernitur. Germinat latere, & cacumine. Germina-  
 tio, quæ ad ortum Arcturi post vernal æquinoctium fieri solet, & si vrbani-  
 10 omnibus communis, peculiaris est tamen punicæ. Anniculo fructificat sur-  
 tulo, quamquam suo caudice fructificasse nonnunquam prodigiose fertur.  
 Quod remotius à ratione videtur, cum ex crassioribus brachiis, aut ex caudi-  
 ce fructus erumpat: sed caudex, & rami non differunt, nisi materiæ crassitudi-  
 ne propter ætatem, ædito enim ramo ex parte noua, & iam via facta, facile per  
 iam institutas laxitates subit ad fructum succus: facile germinat, quia viribus  
 valet, alimentoq; abundat. Nec est ad germinandum solum propensa, sed ad  
 supergerminandum, nam secundo turgit, etiam inchoata fructus ostentatio-  
 ne, qui non solum prioribus specie cedunt, sed fructificandi impetus ad per-  
 fectionem usq; non peruenit. Cuius causa est, quia facillime afficitur. Cytini  
 20 eius serius exeunt, quia operosiores sunt, cum sint corpulenti. Parum sua vi-  
 cinia arbores lædit, verasq; obtinet innocentiae conditiones, cum non nume-  
 rosa radice nitatur, & modico leuiq; egeat nutrimento, & brevis vitæ sit, cum  
 citò senescat. Auctu facilis, quia natura humidior, solutiorq; constat. Bre-  
 uis est vitæ, ratione fecunditatis, ac concretionis raritate, quippe partium laxi-  
 tas obnoxiam reddit externis impressionibus, fecunditas autem exhaurit  
 vitæ fundamenta, cum robore careat, quod sibi, & fœtui sufficiat. Et acidæ  
 punicæ non ita, ut dulces putrescunt, & magis quæ nucleo carent interiori.  
 Et si senescit putrescitq;, velocius arbor suo latere germinat. Breuib. inniti-  
 tur radicibus, & angustis, prolemq; suam sursum generat. Sed non solum pro-  
 30 pè stipitem, sed procul fecundat noua sobole: quacunq; enim radix per sum-  
 mum solum graditur, illic germen formam stipitis induit, quod enim succus  
 confluerit, eò facile vi solis coit coquiturq;. Fisso caudice nō moritur. Plinius  
 ex eo ita depingit: Punicæ arbor angusto folio comatur. Flos eius balaustium  
 vocatum, & medicinis idoneus, & ringendis vestibis, quarum color inde no-  
 men accepit. Pomi partus florere incipientis cytinus vocatur Græcis. Pomum  
 membrana tegitur. Acini sub cortice intus. Angulosi soli, structura eorum,  
 ut in fauis, communis. Corticis maior vsus ex acerbis ad perficienda coria. Et  
 quia vulgus coria perficere maxime illo nouit, ob id malicorium appellant  
 Græci. Germinat præter quàm vere, etiam Canis ortu, & Arcturi. Fert è late-  
 40 ribus ramorum, & cacuminibus. Decidentibus foliis poma tantum est aspici  
 in matre. Breuissima eius vita, ex his breuior dulcibus, quàm acutis. Velociter



senescit, sed è radicibus repullulat. Velez nascitur, cito occidit, in trimatu ferre incipit, ostendens & ante. E radicibus pullulat densa soboles. Hæc Plinius. M. Varro ait: Quæ laxiora, ea & fecundiora, vt malus punica propter molli-  
tiam, ad crescendo pronæ.

Genera.

Theophrastus plura genera punicarum connumerat. Durum, & enucleatum: aliud insuper genus, cuius acini glauci, aliud cuius viles. Item acidum, dulce, vinolentum, sic & sylvestre. Est & genus punicæ, quod fructum perficere nequit, sed ad florem vsq; eius generatio tantum prouenit. Plinius verò diuisit & in genera, apyrinon vocando, cui lignosus nucleus abest, sed candidior ei natura, & blandiores sunt acini, minusque amari, distincti membranis. Nucleos habentium quinque species, dulcia, acria, mista, acida, vinosa. Sæmia, & Ægyptia distinguuntur erythrocomis, & leucocomis. Et alibi Punici mali nouem genera, dulcia, apyrina alio nomine appellantur; paruum nucleum habentia acida. Est & sylvestre punicum à similitudine appellatum. Dioscorides tres species apposuit, acida, dulcia, vinosa. Nos ex his ita distinguemus: Punica in duo primum genera diuidemus, sylvestre & urbanum. Sylvestri generi accommodabimus, quæ fructum vsq; ad florem producit. Urbanum in duo genera diuidemus, alterum ἀμπύων Græcè dictum, quod præci medici dulce granatum vocarunt. Sed nos Græcæ etymologiam sequentes; ἀμπύων, vt Dioscorides explanat, cui lignosus nucleus abest. Seneca, Non enim  
nulla nucleorum durities sit, sed cui minima. Nucleos habentium species quinque. Dulcia, acida, acria, mista, vinosa.

Calum.

Florentinus feruente cœlo gaudere rerulit. Palladius regionem illi aptam esse, quæ calida sit, memoriæ mandauit. Ob id frigidis regionibus, vt in Germania Flandriaq; minime visuntur.

Solum.

Florentinus loca illi minime aquosa conuenire dixit. Apuleius aridioribus locis vehementer vberes prouenire experimento didicit. Palladius solum cretolum, & macilentum amare, sed in pingui etiam prouenire scripsit. Plinius in montibus non remere videri, atque in Africa Carthagine laudatissimas. Theophrastus in Thimolo Olympoq; Mysio copiosissimas, & in Ponto amplè opacitatis haberi. Athenæus Sidam Bætiæ regionem frequentissimam hanc plantam habere scripsit. Imò & loca sunt, quæ eorum priuatam naturam conuertunt. Refert Theophrastus, Si sata punica fuerit acida, in Ægypto in dulcem, & vinolentam conuertitur. In Cilicia verò circa Solos iuxta Pinarum amnem, vbi cum Dario confluit Alexander, præter suauitatem nascuntur sine ligno interiori, & visenda acinorum specie. Quanquam aliubi punica cum acidum edere dulce, vel dulce acidum, ostentum aruspices existimaauerint. Sed punica cur mutetur, in causa est sua raritas, & imbecillitas, quæ namque huiusmodi sunt natura, obnoxia sunt mutationi. Cur verò sapor illius peculiaris in Lycia excellit, causa est amnis vicinitas, ac illius aquæ qualitas. Est enim punica aquarum præauida; & rigatione fit dulcior, imò ex profluentis  
amnis



amnis rigatione magnitudinem acquirere, & ex acida in dulcem mutari, mirum esse non debet. Nos arenosis pinguibus locis latas prouenire conspeximus, quales Africa esse retulerunt. Consurgunt enim lapidosi locis: sed humidis etsi magna quidem poma producantur, insipida tamen, vel maxime acida, & patum durabilia sunt. Conuenienti solo vnumquemque situm sufferunt, montes, colles, plana, & valles.

- Theophrastus, punica semine sata omnino degenerare contendit, & ex acinis glaucis vilia, & ex enucleatis dura, & plerumque acida oriri, nisi in Ægypto, & Cilicia, vt diximus. Sunt qui dicant ex satis feminibus, paucas nasci, & matas tarde crescere, & fructus inutiles, & insipidos ferre, & non nisi insirione meliores euadere. Nos tamen in Stabiarum seminariis, humidis in locis minimè vilia enata granata conspeximus. Palladius viuiradice seri locis temperatis Martio mense, vel Aprili, calidis, & siccis Nouembri asserit. Plinius in satione radices inflexas poni melius esse docet, arboremque ipsam ita locari, vt media sit totius scrobis, necessarium est. Florentinus seri iubet comite scylla. Theophrastus crebras esse serendas, non plus, quàm nouem pedes distantes præcipit. Ratio est, quia opacitatis amatrices sunt, earumque fructus sicci, & nucleosi sunt, quippe si plusculum solis experiantur, tantundem acerbicatis accipiunt, quantum soles excessere. Ideoque propter earum infirmitatem mutuis opacationibus vmbra cõsequi necesse habent, vt à nimio frigore, æstûve se defendant. Vnde facillima, & innocentissima cunctis est punica, nec arbores vicinas fatigat, tum quia breuioribus constat radicibus, adeo, vt nullus radicum decurtus, nullus complexus, rixatusque improbus infestet, neque intolerabili egeat pabulo, tum quia cito senectam experitur, nec diu queat molesta esse. Ab eo Plinius: Quidam punice densiores seri iusserunt in pedibus tamen nouenis. Sed Empedocles (vt refert Plutarchus in symplosiacis) punicam malum *ὀψαρινόν* dixit, quòd scilicet sub autumnii exitum calore eneruato, hæc arbor suum excoquit fructum. Imbecillum enim, & tenuem humorem sol non sinit coire, nisi arbor incipiat frigidior fieri, ob id Theophrastus hanc arborem in vmbra rectius, & celerius fructum maturare dixerit. Democritus testatur punicam, & myrtum mutua consuetudine mirum in modum oblectari, quòd si inter se consortio iungantur, fertiliores reddit: radices quoque si non longo distent intervallo mutuo complexu exhilarari. Aristoteles ait punicas inter oleas plantatas prohibere ne decidant, & maturentur. Palo seri Plinius punica monstrat laxato prius palis meatu. Sed in taleas sectos ramos plantari locis humidis, & rigatis Casti inus docet ex Quintiliis. Palladius autem, Quamuis, ait, multis generibus seratur, melius tamen ramus eius cubitalis incisus manubrii crassitudine, & capite vtroque acuta falce leuigatus, scrobi veluti obliquus immergitur: prius tamen porcino stercore, & in capite, & in parte, quæ ima est, oblinatur, vel in crudo solo malleo cogatur ad inferiora defigi. Melius

Satio.



proueniet, si ponendus ramus gemmata iam matre sumatur. Nos has taleas decidimus, quas diu fecundas conspeximus, si malleo adigitur, pars ea, quæ terræ adigitur, acuat, ut facilius ad inferiora descendat, & quatuor digitis superemineat. Melius tamen proueniet, si scrobem pasto aperiemus, ac ipsi apte collocabimus: habeat pars ima à matre aliquid, ac circumcirca optime calcetur terra, caput taleæ in nodum finiat, unde spes futuri germinis. tempus huic aptum ver erit, eoq; modo optime prouenisse conspeximus. Prouenire ex virga etiam Theophrastus prodidit, sed ramo prius infixo foramen fiat, ratione suæ infirmitatis. Quidam in contrarium feri præcipiunt, eâ ratione, ut subinde se valeat inclinare, nec in altum excreseat, ne flores in altum erecti suscipiant humorem, indeq; excidant. Palladius curandum esse ne inuersa vitigula ponantur dicit: contra prædictum Theophrasti præceptum. Apud nos virga sata etiam optime apprehendit.

*Cultus.*

Inter cæteras, Theophrasto authore, punica maximè coli desiderat, nam nisi cultus adhibeatur, syluestris omnino redditur, & si neglecta degenerat, non solum cultu mitescit, sed etiam mutatur. Andronionis etiam autoritate, purgatione maxime indigere, nec medullam habere, nec villo morbo sub terra infestari, sed cum arbor vetusta est, ramos cedere, & truncum deinde colere, tanquam denuo satum oportere. Præterea frequentium aquarum copiam desiderat. Palladius credit acidum fieri si rigetur assidue, nam siccitas in eo & suauitatem præstat, & copiam, cuius tamen nimietati aliquid debet humoris apponi. Circumfodi autumnò debet, & tempore verno. Plinius ait punicas præcipuè riguis ali.

*Infitio.*

Punicam, & quæ ea sicciore sunt, protinus à sectione inferere iubet Theophrastus. Ex quo Varro: In malo punica, & si qua etiam horum natura aridiora, continuo postquam desecata fuerit, inferi debet. Punicam, Plinius ait, quamquam aliàs sicca sit, retransinare minime vtile. Florentinus verò diuerso à cæteris arboribus modo inferi docet. Caudicem eligi præcipit flexilem, qui possit vsq; ad terram deduci, ipsumq; sub corticem inferi, deinde vinculis distringi, & obrui, ne possit in suam sedem resilire, sic ut infita pars superemineat, demum amurca suffundi. Est & aliud scitu non indignum. Punicæ surculus iam oculis gemmascens accipi debet, in aliis prius, quàm germinet. Latatur hæc myrti coniugio, ut refert Didymus, ideo infita myrto punica, aut contrà myrtus punicæ, multo plurima poma largietur. Item salici inseritur. Recipit etiam citrium, ut idem testatur. Punicam variis gaudere adulteriis Diophanes retulit, inferi in salicem, & pyrum recipere. Plinius omnis generis arbori inferi posse punicam autumat. Palladius verò ex Martialis relatione inferi posse affirmat ramorum connexione, ut medulla vtriusq; diuisa se iungat: in se tamen inferi potest, circa Aprilescalendas, mense Martio vltimo, sed secto trunco surculus recentissimus statim debet inferi, ne mora exiguum, qui inest, siccet humorem. Ad Palsiphilum verò,

*Punica*



*Punica non alios unquam dignata sapores*

*Mala, nec externis associata comis.*

*Ipsa suas augent mutato semine gemmas,*

*Et sibi cognato picta rubore placent.*

Nostrates agricolæ hîsso trunco Februario inserunt, emplastrant verò **Ma-**  
**io**, sed difficillime omni modo comprehendit, nec recipit, nec aliis inferitur.  
vanitatis potius Græcos redarguerem, quàm laudarem, cùm punicam variis  
gaudere adulteriis dixerint.

Punicarum mutationes culturæ ratione exultant. Vt ex acidis amarisque in **Ari.**  
**30** dulces transeant, docet Aristoteles libro de plantis. Mala granata stercore  
porcino radicibus iniecto, ac frigida aqua dulci rigata, meliorescunt, & dul-  
cia fiunt. Ex quo Theophrastus eius discipulus, Earum radicibus ingeratur  
vrina, vel pellium faeces, non tamen multum. Earum enim radices remorde-  
ri desiderant, idque diutius, vt in amygdalis tertio quoque anno diximus,  
nam radices punicæ plus temporis persistunt. Ratio, qua fructus permutatur,  
est, cùm alimentum magis percoquitur: tunc verò alimentum percoquitur,  
cùm radix qualitatem quandam cepit, sic mutato principio, rotius naturæ  
mutatio sequitur. Alimentum immutat, si diutius sequetur. Sed in Ægypto,  
& Cilicia totarum arborum permutatio fit & sponte, vnde effectio, & vis illa  
**20** naturæ agri tribuenda est: sed si non arbor tota mutetur, ex alimento & ha-  
bitudine causa petenda est. Theophrastus granata dulciora mollioraq; aqua-  
tionem facere docet, nam acerbitas, atq; duricia, tale auxilium desiderat. Sed  
peculiaris in primis mollities, quæ radicibus exhibetur, apparet, sterces enim  
suillum, vel quod vim proximam illi obtinet, radicibus punicarum superin-  
iectum dulcorat succum, quin etiam copia, & frigiditate aquæ mutationem  
affert, aliquam dicitur. Paxamus radices arboris circumfodi iubet, & sterces  
suillum iniici, ac superiniecta terra hominis vrina irrigari. Columella, si pu-  
nica acidum, aut minus dulcem fructum ferat, hoc modo emendari iubet.  
Stercore suillo, & humano, & lotio humano veteri radices rigato, ea res  
**30** & fœcundas arbores reddet, & primitiuis annis fructum vinosum, postea  
verò & dulcem, & apyrenum faciet: Ipse verò exiguum admodum lasce-  
ris vino diluit, & ita cacumina summa arboris obleuit, ea res emendauit  
acorem malorum. Ex quo Plinius: Si mala punica acida nascantur, abla-  
queatis radicibus simum suillum adhibent, eo anno vinolenta, proximo  
dulcia futura. Alii vrina hominis aqua mista riganda censent quater anno  
singulis amphoris, aut cacumina spargi vino lasere diluto. Ex quibus Pal-  
ladius: Si acida nascatur, modicum laser cum vino tritum per summa ar-  
boris cacumina oportet infundi vel ablaqueatis radicibus tedæ clauus infi-  
gi. Alii algam marinam obruunt ad radices, cui nonnulli sterces miscent  
**240** animum, atque porcinum. Sed quomodo magnitudo pomorum arte pos-  
sit comparari, docet Theophrastus: Cytini, vbi formati sunt, in pertusam



eos transmittunt ollam, deorsum absque noxa deflexo ramo, terra obruunt,  
 eoq; modo in miram crescunt magnitudinem. Ratio est, quia defendit eos ol-  
 la ab iniuria caloris populantis. Item à terra nonnihil suppeditatur humoris,  
 unde fiat accessio magnitudinis ex alimento. Arbor enim fructui non præ-  
 properum distribuit alimentum, quare acini non evadunt maiores aliis, qui  
 nulla terra obruti adolefcunt, sed eis crassius corium fit. Succus proprius in  
 tantum naturali conficitur, & excoquitur: iccirco sapor malorum dilutior,  
 ac deterior, cortex autem extrinsecum recipit alimentum, utpote, qui  
 minus alimentum conficiat. Quod Palladius ex Martiali recitat. Locis  
 calidis, Maio mense, mala punica florere incipiunt. Ramus ergo cum flo- 10  
 re, si obruto circa arborem fictili vase claudatur, & ne resiliat ligetur ad pa-  
 lum, pro vasculi magnitudine pomum reddit autumno. Itemque Martio  
 mense miræ magnitudinis poma fieri, si olla fictilis obruatur circa arborem  
 punici, & in ea ramus, cum flore claudatur, ne resiliat ligatus ad palum.  
 Tunc cooperta olla, contra aquæ muniatur incursus. Autumno patefa-  
 cta, suæ magnitudinis poma redhibebit. Etiam Iunio mense fieri potest.  
 Nos tutius, & melius id facere consuevimus. Accipimus vetus latamen,  
 cui æquales adicimus partes suilli stercoreis, ac vini facium, itemque orde-  
 ceum fursurem, locoque ab aquis tuto commixta seruamus per annum, sin- 20  
 gulis quoque mensibus remiscendo, his demum acetum adicimus, ac in vn-  
 guenti formam reddimus, & Nouembri, vel Octobri mensibus radicem par-  
 tes punicæ disco operimus, ac misturam circum accommodamus, inde ter-  
 ram inducimus. Sic suo tempore miræ magnitudinis poma evadunt, & sin-  
 gulis quoque annis idem faciendo, maiora semper producemus. Quomodo  
 varios punica fructus ferat demonstrat Theophrastus. Malleo castigant vir-  
 garum duriciem, ut contusis partibus facilius admittantur ad unionem, mox  
 arctissime colligatas pangunt. Tunc arbor vna, ex compositarum virgarum  
 coitu exurgit, sed vniuscuiusque pars sibi facit, & suum iustuetur, & suum  
 quemque succum trahunt, & coquunt, nec aliud inter se commune habent,  
 quàm mutuum illum complexum, coalitumque. Sed ut acini sine nucleis 30  
 nascantur, superius ex Theophrasto vidimus nucleorum duriciem aquatio-  
 ne tolli. Sed sine nucleis Africanus nasci promittit, si dempta, ut in vite,  
 medulla, fissum surculum obrues, & dum comprehenderit, recidas, quod  
 emiserit. Democritus ramuli medullam auriscalpio eradit alte, quantum  
 fieri possit sarmento non fiso, & laseris cyrenaici succum aqua dissolutum  
 ad sapæ spissitudinem coctum infundit, & erecta sarmenta ad radices illi-  
 gat, ne succus effluere possit, singulis deinde hebdomadibus succum e-  
 undem sarmento infundit, donec germen emittat. Rubra fieri mala Dio-  
 phanes scriptura reliquit, si ex lixiuo balneorum arboris radices rigentur.  
 Sed Didymus aquam cum lixiuo permisceri iubet. Candida in punicis gra- 40  
 na fieri pollicetur Palladius, Martialis autoritate, si argilla, & creta  
 quartam



quartam partem gypsi misceas, & totò triennio hoc genus terræ radicibus eius adiungas. Vt dicere possis, quot grana punicum habeat: Acinos granati totidem numero in singulis affirma, & si magnitudo variat, modo ex eadem arbore legantur. Nam quod plures, aut pauciores acinos habeat, id ex magnitudine mali non euenit, inde enim est, quod acini maiores, aut minores existant. Sed tam insigne mendacium ferre nequeo, cum magnum paruum centrum, ne dum decem acinis vincat. Vt ex vno acino punicum facias: In syluis vbi corni proprius natalis locus, earum viuaciorem eligas, vltimo Nouembri per medium seca, & cera circunda plagam, & à trunci parte illa, per quam furculus descensurus est, post decem circiter dies amoue ceram, & finde truncum, & imprime fissuræ punicæ furculam, vt eræ agricolationis arte, vt optime apprehendat, ostendet opportuno tempore fructum vnum acinum continentem.

Theophrasti testimonio punicæ ante maturitatem flores, & fructus facile labuntur. Ratio est, quia debili pediculo pendent, facile iacturam patiuntur, cum enim cælestes imbres decidunt in cytinus, eos subeuntes humectant, ideoque facile dilabuntur. Contra hæc ars parat præsidia. Non concedunt arbores elatiores fieri, sed breues ac sub iuctas, sic imbecillitate exilium ramorum nutant cytini, ita vt os auersum à cælo non excipiat humores. Pat quoq; eorum consilium, qui virgas depargi iubent, vt obtenuitatem subrectos nequeant cytinus sustinere. Ex quo Plinius: Punica toribus nimis, & pruinis flores amittit, qua de causa inflectunt ramos eius, ne subrecti humorem infestum excipiant, atque contineant. Palladius: Si florem punica non continet, vrinam veterem cum pari mensura aquæ temperabis, & per annum radicibus infundes, vni arbori amphora ingesta sufficiet. Vel amurcam mittes insullam, vel algam radicibus iunges, & bis rigabis in mense. Vel arboris florentis truncum plumbeo circulo debebis includere, vel corio anguis inuoluere. Theophrastus ait, punica quæ dulcia sunt, celerius putrescere: et huiusmodi succus eorum imbecillior est, & mutationem facilius recipit. Plinius: Vermicationem poma ipsa per se quibusdam annis sentiunt. Palladius: Si vermibus laborant, tanges radices felle bubulo, & continuo moriuntur, aut clauo æneo si vermes eorum punges, difficile nascentur, vel alini virgine stercore admixta porcino vermibus obuiabit. Ne punica dehiscant: Africanus in excavatos scrobes cum pangerentur silices ingerebat. Si arbor prius plantata fuerit, scyllam iuxta plantabat, quippe cæca quadam naturarum discordia, nec dissilire mala, nec rupta fatiscere patiuntur. Similiter nec dehiscet, si secundum caput plantata fuerit. Columella: Mala punica ne rumpantur in arbore, remedio sunt lapides tres, si cum seres arborem ad radicem ipsam collocaueris. At si arborem iam satam habueris, scyllam secundum arboris radices serito. Alio modo, cum iam matura mala fuerint, antequam rumpantur, petiolos quibus pendent intorqueto, eoq; modo seruabuntur, etiā toto anno.



Plinius ait: Quidam puniceis malis substrato lapide non rumpl pomum in arboribus tradunt. Palladius, Si crepant mala, lapidem in medio arboris radice supponas, vel squillam circa arborem seras. Et si dum pendunt poma, tenacibus, sicut in arbore habentur, intorseris, in totum annum sine corruptione seruabis. Sed qui in scrobe deponit, si tres lapillos in ipsa radice constituat, prouidebit, ne poma findantur. Copiosa in punica mala nasci Democritus asserit, si thymali, & portulacæ sacco bene commixto arboris truncus antequam germinet adlinatur. Lata, & fructuosa reddi Palladius arbuta dicit, si cinis cum lixiuio, circa punici truncum frequenter imponatur. Si fructus crudos creabit, Theophrastus nimiam humoris vbertatem detrahendo eam castigat. Ab auibus non impeti Florentinus scribit, si cucurbita & rapum, quæ nullo antea humore maduerint, apponantur. Languentes arbusculæ fuco in mari scaturiente recreantur, si parte ima caudex radice tenuis inuoluatur, ex Florentini placitis. Et si punica inualida est, quia rara, non ob id laborat gelu, raritas enim facit, vt transmittat gelu, in solidis verò validius inhaeret.

*Codituri.*

Speciosum hoc pomum, & vtile, quomodo diuturnius custodiat incolime, tum ob ipsius erga agros facultatem, præsertim in exstinguenda siti, tum ob alios mortalium vsus, non pauca excogitarunt, & adinuerunt maiores nostri præsidia, nos ea primum, quibus in arbore vegeta permaneant, mox quibus decerpta seruentur recitabimus. Beritius hoc modo in sua parente hætere patitur: Arente flosculo singillatim inuoluta mala funiculis obstringunt, ne tumescencia dehiscant in rimas: sic tamen munita relinquunt. Potest & hoc in aliis malis obseruari. Alii in singulis fictilibus ollulis singula collocant, & diligenter opertas ita stabiliunt, ne vel caudicis occursum, vel mutuo eorum collisione possint confringi, ita & vberius, & adultis semper potentur. M. Varro: Punica immatura cum hærent in sua virga si dimiseris in ollam sine fundo, eamque si conieceris in terram, & obteres circum ramum, sic ne extrinsecus spiritus efflet, non modo integra eximi dicit, sed etiam maiora, quam in arbore vnquam pependerit. Columella: Quidam pediculos punicorum, sicuti sunt, in arborem torquent, ne pluuiis mala rumpantur, & hiantia dispareant, eaque ad maiores ramos religant, vt immota permaneant, dein se sparteis restibus arborem cludunt, ne aut coruis aut cornicibus, aliisve auibus pomum laceretur. Nonnulli vascula fictilia dependentibus malis aptant, & illita luto paleato, arboribus hætere patiuntur. Alii scæno, vel culmo singula inuoluunt, & insuper luto paleato crasso linunt, atq; ita maioribus ramis alligant, ne vt dixi vento commoueantur. Sed hæc omnia sereno cælo administrari sine rore debent, quæ tamen, aut facienda non sunt, quia læduntur arbusculæ, aut certe non continuis annis vsurpanda, præsertim cum liceat etiam detracta arboribus eadem innoxia custodire. Granata autem lecta, quæ custodire cupis ad hybernos vsus. Beritius: Poma leni manu, ne tactu asperiore:



asperiore virientur, aut vulnus sentiant, interlegi debent, nam ea putrilaginis  
 originem afferunt, & incocta pice mergi, refrigerataque sus-  
 10 trobe querna, suffuso prius aceto, composita obruant. Alij in  
 te aqua marina, vel muria demergunt, vt combibant, dein sole relucant, & lo-  
 co suspendunt frigido, & cum vti volunt, aqua dulci pridie macerant. Longo  
 custodiuntur tempore, si in feruentem aquam intingantur, & protinus erepta  
 in arena sicca componantur, aut tritici cumulo in vmbra, dum rugas contraxe-  
 rint, recondantur. M. Varro mala punica demissis suis surculis in dolio arenæ  
 iam decerpta, ac matura condit. Columella ita seruat: Sub recto fossulæ tripe-  
 20 daneæ siccissimo loco fiunt, eoque cum aliquantum terre minutæ repositum  
 est, infiguntur sambuci ramuli. Deinde sereno cælo granata leguntur cum suis  
 pediculis, & sambuco inseruntur, quoniam sambucus ram apertam & laxam  
 medullam habet, vt facile malorum pediculos recipiat; sed cauere oportebit,  
 ne minus quatuor digitis à terra absint, & ne inter se poma contingant, tum fa-  
 30 ctæ scrobi operculum imponitur, & paleato luto circumlinitur, eaque humo,  
 quæ fuerat egesta superaggeratur. Hoc idem in dolio fieri potest, siue quis vo-  
 let resolutam terram vsque ad dimidium vas elicere, seu, quod quidam malunt,  
 fluuialem arenam, cæteraque eadem ratione peragere. Pænus quidem Mago  
 præcipit aquam marinam vehementer cale fieri, & in ea mala granata, lino spar-  
 40 tæ illigata paulum demitti, dum decolorentur, & exempta per triduum in so-  
 le siccat, postea loco frigido suspendi, & cum res exegerit, vna nocte, & po-  
 stero die, vsque in eam horam, qua fuerit vtendum, aqua frigida dulci macera-  
 ri. Sed idem auctor est, creta figulari bene subacta recentia mala crasse illinire,  
 & cum argilla exaruit, frigido loco suspendere. Mox cum exegerit vsus in a-  
 quam dimittere & cretam resolvere. Hæc ratio tanquam recentissimum po-  
 mum custodit. Idem iubet Mago in vrce nouo fictili substernere scobem po-  
 pulneam, vel iligneam, & ita disponere, vt scobs inter se calcari possit. Deinde  
 50 factæ primo tabulatæ rursus scobem substernere, & similiter mala disponere,  
 donec vrceus impleatur, qui cum fuerit repletus operculum imponere, & cras-  
 so luto diligenter oblinire. Omne autem pomum, quod in vetustatem repo-  
 nitur, cum pediculis suis legendum est, sed, si sine arboris noxa fieri possit, et-  
 iam cum ramulis, nam ea res plurimum ad perennitatem confert. Multi cum  
 ramulis suis arbori detrahunt, & creta figulari cum diligenter mala obruerunt,  
 in sole siccant, deinde si quam rimam creta facit, luto linunt, & assiccata frigido lo-  
 co suspendunt. Plinius ex eo, Punica aqua marina feruente indurari, mox triduo  
 sole siccata, ita ne nocturno rore contingantur, suspendi: cum libeat vti, aqua dul-  
 ci perlui. M. Cato in doliis arenæ seruari iubet. Palladius ab his: Punica mala  
 60 seruantur, si picatis pediculis ordinata suspendas. Aliter, Lecta integra in aqua  
 marina, vel muria feruente mergantur, vt combibant. Post triduum sole sic-  
 centur, vt sub dio nocte non maneant, post in loco frigido suspendantur. Cum  
 volueris vti, aqua dulci pridie macerabis. feruntur hæc pomis recentibus amu-



lari. Item si tactu inuicem sepatata paleis obruantur. Item fossa sit longa, & cortex eiusdē magnitudinis paratur, cui mala acutis surculis suis affiguntur. Tūc inuersus cortex supra fossam ponitur, vt mala sine terræ tactu subter pēdētia ab humore defendant. Item si induantur argilla, & ea siccatā loco frigido pendēat. Item si seriola sub dio obruantur, quæ habeat arenas vsq; ad mediū, & mala cum tenacibus lecta imprimantur cannis singulis, vel sambuci virgulis, & ita separata in arenis figantur, vt ipsa quatuor digitis emineāt ab arena. Hoc & sub recto in scrobe bipedanea fieri potest, & vtilius est ad seruandum si cum ramo longiore tollantur. Aliter: In seriola, cui ad mediū aqua mittatur, suspenduntur mala, ne humorem tangant, & seria clauditur, ne ventus irrumpat. Item in dolio intra ordeum sic ordinantur, ne se inuicem tangant, & dolium desuper operitur. Hęc de punicorum conditura maiores prodidere, quæ referre non piguit, & si eadem proferant, aut si alter ab altero aliquid imminuat, ex diuersa, quæ successit, experientia descripserunt, vt & lector sibi melius consulat.

*Depinu.* C A P. XXXII.

**D**IXIMUS de malis, de nucibus dicturi auspicabimur à pinu, cūm & fructus omnes coni magnitudine superet, & perpetuo vireat folio, cuius proprius locus licet sit in syluis, Theophrastus tamen & Plinius inter vrbanas arbores recensent, sic etiam Virgilius:

*Fraxinus in syluis pulcherrima, pinus in hortis.*

*Fabula de  
pinu.*

Pitys (vt Græci fabulantur) puella fuit olim perquam illustris, quam vnicuique Pan adamabat, hanc quoq; deperibat Boreas, puella vtriq; adducta potius Panni adhæsit, propterea zelotypia irritatus rivalis Boreas, Pityn in saxa propulsans, neci dedit, cuius mortem tellus dolens, in eius nominis arborem commutauit, mutatoq; vitæ genere apud eos mansit. Pana virens coronat, lugetq; indignum facinus arbor collachrymans, quod Boreas eam immeritam proteruo spiritu impulerit. Huius fabulæ inuolucro Poetæ mirā arboris naturā innuunt, nam flet arbor, vbi Boream afflantem percipit. Cybelæ deorum matris pinum dicauit antiquitas, vnde pini nucs à Martiali Cybeles poma dicuntur;

*Poma sumus Cybeles, procul hinc discede viator,*

*Ne cadat in miserum nostra ruina caput.*

Cybelæ iccirco sacra propter Atym ab ea adamatum, atq; in hanc arborem transformatum. Fuit Arys speciosus puer, qui sacris magnæ matris præfuit, à suæ ciuitatis Rege perditè dilectus, qui cūm ab eo sibi vim inferri intelligeret, in syluas ad Cybelem profugit. Rex autem inuenro quum vim inferte conaretur, dea stupratoris verenda abscidit, qui moriens, & facinus vlisci cupiēs, puero eadem percidit, quem quum sub pinu semianimem iacentem Cybeles antistites inuenissent, in templum deportarunt, nixq; sunt, verū frustra, reficere, mortuumq; sepelierunt. Pinum arborem, sub qua ille iacuerat, tutelæ suæ dea adscripsit, sed vt eius in perpetuum memoria remaneret, edixit deo-  
rum



rum mater, ut singulis annis defleretur, eiusque cultores castrarentur. Ovidius.

— *Mollesq; ministri*

*Cadunt iactatis vilia membra comis.*

Alii Atym cum per mare Phrygium nauigaret, ad flumen Gallum usq; peruenisse memorant, cuius potu ad insaniam versus, scilicet testes sibi amputarit. Iuuenalis,

*Semivir obsceno facies reuerenda minori,*

*Molli qui rupta secuit genitalia testa.*

30 Sed Arnobius hæc fabulam aliter describit. Fuit Atys Nanae Sangarii amnis patris filius. Hæc autem illum hircino lacte enutrit. Hunc deorum mater ardenter amavit, sed perditissime Acdestis: quod Midas Rex sentiens, ut illum à nefanda coniunctione tutum faceret, filiam suam ei matrimonio destinavit, & nequis nuptialia munia violaret, intra oppidum eos recludit, illudque muris, turribusque circummunit. Cybele Atys resciscens fatum, civitatem ingreditur, turribusque spoliatur, unde postea turrita cognominata: sciebat enim non aliter inter mortales liberum quemquã esse, quamdiu matrimonii fœdere victus esset. Acdestes verò amore & ira æstuans propter puerum à se alienatum, conuiuantibus furorem ingerit, unde orta est inter eos non parua rixa. Postremo Atys sub pino arbore se proiciens, genitalia sibi defecat, quæ in Acdestim iaculatur, & cum sanguine vitam efflat. Abscissa autem deum mater veste inuoluit, & in terra recondidit: flos viola è sanguine nascitur, ex qua arbor redimitur, cœptumq; postea sacras pinos hoc flore velarier, ac coronarier. Acdestis enim Iovem deprecatus, ut Atys reuiuisceret, non obtinuit: tamen affecutus est ne putresceret, sed semper in virides comas cresceret, & minutissimis foliis. Ovidius in sua Metamorphosi,

*Et succincta comas, hirsutaq; vertice pinus,*

*Grata deum matri, siquidem Cybeleius Atys*

*Exiit hac hominem, truncq; induruit illo.*

30 Ida mons Phrygiæ pinis refertissimus est, quamobrem matri magnæ attribuunt. Fraudi verò consecratam pinum Seruius ait, quod eius poma per fraudem interimant. Panes, & Satyri è pino coronas factitatas gerunt. rationem affert Pharnutus, quod montanum quid, ac sylvestre hæc habeat. Lucretius,

*Et genus agricolæ lare senticescere, cum Pan*

*Pinea semiferi capitis velamina quassans.*

Propertius:

*Et Arcadio pinus amata deo.*

Plinius auctor est apud Isthmos pinea corona coronari victores. Miletus urbs Cariæ vetustiore vocabulo Pityusa dicebatur, cuius incolæ ῥήπες, quia 40 pinnorum sylvis abundavit, quarum flores vel fructus ῥήπες dicuntur: ab eadem pinu Pityodes, vel Pityula insula in mari Balearico. Lampacus, Hellepontii



vrbs Troianis temporibus Laomedontea, & Pityusa, & Homero Pityus dicebatur.

Nomen.

Theophrasto πύκη dicitur, cum omne quod de πύκη tractet, pino adaptari possit. Theodorus optime interpretatus pinum vertit. Bellonius, quia viros etiam acutissimos πύκη, & πίνος dictionum affinitas fefellit, litrem dirimere gestiens, πύκην piceam vocat, πίνω pinum, magisque tenebras offundit. Idemque sentit Leoniceus. Sed hi mea quidem sententia Pliniū secuti facile lapsi sunt. Plinius πίνω pinum vertit, nam πίνω κάμπος Græcas, Latine pinorū erucas vertit, ac toto suo volumine πίνω nunc pinum, nunc piceam indifferenter vertit. At quomodo Dioscorides vocauerit, vix à paucis ipsius verbis elici potest. Theophrasto pini nuces σπόροι dicuntur, sic Pindaro. Galenus κώνιν commune facit pino, picea, & pinastro. Simeon Sethi κανάκια vocat strobilos. Mnastheus Atheniensis pinearum nucleos, & conos ἰσράκιδας vocat. Ab Hippocrate id totum κόκκαλος dicitur ex Athenæo. Latini pinum vocāt à pinnato foliorum acumine, cuius lignosos fructus frequenti nucamento in turbinatā effigiem compactiles, conos & strobilos vocant. Itali pino.

Forma.

Theophrastus ita suam peucem depingit. A surgit procero, & recto caudice, nodosoque. Folio perpetuo, in extremitate pungenti. Medulla carnosā, succo pingui, & resinaceo. Quidā florere existimant, alij minime, sed nucamenta quædam proportionē præciduis grossis respondere. At Macedonia incolæ ne illas quidem florere arbitrantur. Eius germinatio intermissa, ter turgens, terve germina edens: ideo id genus arboris περισλίπνις dicunt, quod ter inchoatum opus, intermissumque repetat. Prima germinatio Februatio incunte, quāquam in monte Ida serius ac ferè idibus. Secunda mense Martio, germinans ab extremo surculo, vsque ad proximum antecedentis, & quædā sursum, quædam in latera, circumquaque; emittunt, veluti geniculo factō surculo primi germinis, ut fieri prima germinatio solet. Tertia Aprili mēse diebus circiter quindecim interiectis, forte id diebus sex, vel septem absoluitur, quò cum ventum sit, non amplius in longitudinem, sed in crassitudinem incrementa vertuntur, & si omnium germinationes conspicua sunt, in pino maximè videntur, nam germina in versus rectos porriguntur, ramiq; ex æquo conditi spectantur. Conis adhuc pendentibus semina prosiliunt, vasaque relinquunt inania. Semen nuceum est. Amentum profert, hyphear & stelis in ea nascitur. Radice singulari, & prægrandi, & ad ima descendente, parua autem cōplures ab ea exeunt, sed ab ea nulla soboles procreari potest. Vete sollicitatam quo transferretur, longiorem, quā octo cubita radicem habere quidam vidisse retulit, quamquam non totam refossam, sed abruptam. Radicibus abruptis numquam amplius repullulat, ut in Lesbo accidit incenso nemore Pyrrheo. Auctu difficilis. Plinius, quæ ex Theophrasto: Pinus habet folium capillamenti modo prætenue, longumque, & mucrone aculeatum, perpetuo virens. Fructus grandissimus pineis nucibus, altissimeque; suspensus, intus exiles nucleos lacunatis includit to-



dit roris, vestitos alia ferruginis tunica, thica naturæ cura molliter semina collocadi. Larix intermittit tripartito, & terna germina ædit, & ideo ter squamas cortici spargit, quod omnibus arboribus in germinatione euenit, quum prægnantium rumpitur cortex. Est autem prima earum incipiente vere, circiter quindecim diebus. Iterum germinant transeunte Geminos Sole. Sic fit vt prima cacumina impelli secutis appareat, geniculato incremento. Tertia est earundem ad solstitium breuissima, nec diutius septenis diebus, clareque & tunc cernitur excrefcentium cacuminum articulatio. In maxima etiam admiratione pinus est, habet fructum maturefcentem, habet proximo anno ad maturitatem venturū, ac deinde tertio, nec vlla arborum auidius se promit. Quo mense ex ea nux decerpitur, eodem maturefcit alia, & sic dispensatur, vt nullo non mense maturefcat. Quæ se in arbore ipsa diuisere, lamix vocantur, læduntque cæteras, nisi detrahantur. Nullo flore exhilaratur, natalesque pomorum recursus annuos versicolori nuntio promittit. Vstis radicibus larix non repullulat, vt in Lesbō accidit incenso nemore Pyrrheo. Præmonendos tamen lectores diximus Theodorum in Theophrasti versione lapsū, nam vbi ipse *περιλινος*, Theodorust ter squamosas vertit, quasi *περιλίωγος*, quum ter turgere Theophrastus intelligi voluisset, cuius erroris causam Plinius præbuit. Præterea Plinius larici tribuit, quæ Theophrastus pino, de vstarum radicū repullulatione, & de germinatione.

Theophrastus pinorū alteram vrbānam, alteram syluestrem dicit. De syl- Genera.  
uestri in syluis diximus. Plinius vrbani generis alteram Tarentinam dicit, digitis fragili putamine; auiumque expositam furto in arbore. Apud nox duo obseruantur genera, syluestris, & vrbani. Vrbani duo tantum, duro & molli discrimine. Durum contumaci tegmine occluditur, vt nisi lapidis icti frangatur, vefci non possis. Alterum fructus affert adeo molles, vt digitorum compressu aperiantur. Vulgò *pigne mollesse*. Hoc genus à Plinio Tarentinum dicitur, & coniamis affixi Solis estu dehiscētes, nucleos emittūt, qui & ab auibus deuorantur.

Theophrastus frigida loca concupiscere scripsit, montes, & loca aptica, Calum.  
30 pacis verò nullo modo, aut prauè exurgere. Mnestorisque sententiā calidam esse, argumento, quod locis argentibus perdurare valeat, sui caloris ratione, nec super eam nives insistant, sed eas excutiat hyeme. Sensu etiam probari posse, quod pinguis, & acris, odorata sit, & qua facile ignem concipiat. Humidā quoque esse, argumento ex picis generatione tracto. Imò adeo frigoris amatrix, vt feruidis locis prouenire posse multis sit dubium.

In Latini agri montuosis passim obutam pinus rerulit Theophrastus. Apu- Solum.  
leius arenosis in locis. Palladius locum gracilem amare, & sæpe maritimum scripsit. Inter montes, & saxa vastior, & procerior inuenitur. Ventosis, & humidis arborum fiunt incrementa latiora, sed siue montes conserere velis seu spatia quæcunque huic generi deputabis, quæ alteri vtilia esse non possunt. Ob id  
40 M. Vatro in prædii finibus seri iubet, ne familiæ rixentur cū vicinis, ac limites ex



litibus quærant iudicem, ut eius vxor habebat in Sabinis. Nos in sterilibus, & inutilibus locis passim serimus.

*seris.*

Id genus non nisi seminio nasci, ut omnes coniferæ, prodidit Theophrastus, solamque nõ degenerare satum. Didymus legi strobilos iubet Iunio antequam Etesia spirare cœperint, & debilescentes tegumẽro exiliant, & ab Octobri mense usq; ad Ianuarium, ut amygdalus suis feri nucleis. Cato nuces pineas feri, ut cupressu, & ad eundem modum tanquam allium. Plinius nucleis seprenis ferẽ in ollas perforatas additis. Tempore à kalendis Martii ad idus eiusdem. Palladius: siccis regionibus mense Octobri, vel Novembri: frigidis & humectis Februuario, vel Martio, feritur nucleis suis. Exarabis ergo loca diligenter, atq; purgabis, & frumenti more semen asperges, ac leui sarculo curabis operire, nec enim plusquã palmo debet abscondi. Defendenda est tenera arbor à pecore, ne calceretur inualida. Proficiet si nucleos aqua triduum macerabis. Dicunt pineum fructũ translatione mitescere. Sed plantas hoc modo procurat, ut prius. Multa semina in calyculis terra & fimo repletis obrunt, quæ ubi processerint, relicto eo quod solidius est, auferunt alia, ubi iustũ cœperit incrementum, trimã plantam cum ipsis calyculis transferunt, quibus fractis in scrobe, indulgent radicibus largitatem. Terræ tamen equæ sterco admiscet, facientes straturã alterno ordine subinde crescente. Seruandum est tamen, ut radix eius quæ vna & directa est, usq; ad summitatem suam possit integra, & illæsa transferri. Pinus benigna omnibus arboribus esse putatur. cum enim singulari radice nitatur, circa se non sugit, eaq; alte descendit è profundo sibi hauriens alimentum, non defraudat superficiarias adsitaram arborum radices. Vnde patitur myrtos, & lauros prope satas bene habere, ex quo manifestatur radices maius incommodũ afferre, quã umbræ. Plinius: Quibusdam satis umbra, aut nutritrix, aut nocuerca est, pinorum quæcunque attigere, non dubie venenum est. necat & germina pinus, nocet & stillicidio. Palladius: Pinus prodesse videtur omnibus, quæ sub ea seruntur. Vbi semel sata est pinus transplantari non patitur, nam si quis fibrillas aliquas fregerit, exarefcit. Vnde qui agris, vel pomariis serere cupiunt, vasculis primo, inde scrobibus confractos deponunt. Nos etsi maxima diligentia transplantare conati simus, raro comprehendit.

*Insistit.*

Pinus, ut cæteræ resiniferæ omnes, alterius sobolem aspernat, nam ut pingues picem, resinamq; illachrymant, distilloque libro hiant, quasi de propria late saniem contrahant, quocirca aliis generibus immisceri recusant.

*Cultus.*

Palladius expertus est nouellas arbores putatione promouere, ut quæ speraueras incrementa duplicentur. Omnes neglectam viuere, nec cultu indigere putarunt: tamen quæ campis seruntur, & coluntur, in vastam amplitudinem crescunt, & conos maiores, vberiores, & sapidiores proferunt. Crebri ramis inter lucandi sunt, & ut melius arbor increlcat, & ut ordinata speciosior videatur.

*Morbi & remedia.*

Pini morbus est, ut Idæi incolæ tradunt ex Theophrasto, ut teda fiat, tam

parte



parte caudicis externa, quàm corde, id quod ex abundantia succi, & vbertate  
 larga luxuriantis naturæ provenit, isque morbus naturalis est: non enim vlllo  
 morbo afflictata, sed optimæ habitudinis causa emoritur. Radices enim cras-  
 fescētes in tedā abeunt, quod euenit ex succi copia, ac nutritionis excessu, cum  
 alimentum, quia pinguedine obstructæ sunt viæ, transmittere nequeant, sicuti  
 animalia quædam, quæ supra modum crassescunt: cum enim auram attrahere  
 nequeāt, nec spirationis vlu frui possint, quoniam venarum oscula pinguedi-  
 ne sunt angustata, obductaq; suffocantur. Idcirco nō inēpte rustici de pino di-  
 cunt, pinum obesitate strangulari, omnia nanq; spirituum egent solutione, &  
 10 meatuum libertate. Alibi verò: Cum tota radix abierit in tedam, pinum mori-  
 turam. Ratio est, quia alimenti pars excocta, purissimaq; insidet, ex eo infestus  
 pinguedo fit, quod verò ad cæteras partes superiores pertinere deberet fertur  
 ad earum quæ super terram sunt alimentum, non per pingues partes, sed per  
 alios meatus, non enim amplius suppeditabit ad alendum, occupatis aditibus,  
 obsessisq; viis à pinguedine illa, interclusoq; sic spiritu, vt amplius commeare  
 non possit, exinguitur. Aliis autē arboribus quibus nulla pinguedo, aut si in-  
 est non multa, id nō euenturum. Plinius ab eo: Aliæ verò obesitate, vt omnia,  
 quæ resinam ferunt, nimia pinguedine in tedā mutantur, & cum radices pin-  
 guescere cœpēre intereunt, vt animalia nimio adipe. Decacuminatione mori-  
 20 tur, quod non sine ratione accidit, quia cū humore nō abundet, & meatu con-  
 datur rectissimo, & singulari radice inhæreat, vulnus infestat, facitq; vt frigus  
 & ardor facilius subeat, præsertim cū vndiq; inferatur, cum meatuum rectitu-  
 dine non pigrè ad radices deueniat. Plinius ab eo: Quibusdā debilitas sterilita-  
 tem, non necesse affert, vt si quis pino cacumen auferat, sterile scit enim, nec mo-  
 ritur, detracto cacumine piceæ, aut ignibus adusto interit. Pinus detracta tedā  
 seruati potest, pinguedo enim huic pro morbo habetur. Sed hæc non nisi bene  
 adulta sufferre potest, & hinc quamuis putruerit, seruati ac viuere potest, nam  
 non semper tedificare consuevit, sed cum viger, & ætate adulta est. Nouella  
 30 tedā cæter, quum nutrimentum ad germina, incremētaq; altitudinis absumit,  
 cum dilatare cœperit, statim tedæ habitudo consequitur. Cortex in orbem  
 detractus in pino mors est, sed refert anni tempus, scilicet in germinatione.  
 Cum enim cortex rurget Februario, vel Martio mense si quis ei detraxerit sta-  
 tim morietur. Hyeme diutius durat. Refert & anni tēpus. Pino si quis detra-  
 xerit corticem, solet taurum vel geminos transeunte, cum germinat, statim  
 moritur; eandem verò iniuriam hyeme passæ diutius tolerant.

Huius pinæ, Palladius ait, vsq; ad mensem Nouembris in arbore esse pos-  
 sunt, & maturiores legentur, prius tamen legenda sunt, quàm patefcant. Nu-  
 clei nisi purgati durare non possunt, tamen alii in vasis fictilibus nouis, & ter-  
 ra repletis in testis suis millos asserunt custodiri.

40 De resiniferarum omnium arborum materie diximus in cada sylua, & de *Materia.*  
 pice.



**A**NVCIBVS pineis locum amplitudine vendicauerunt, quæ cessete auctoritati, nuces iuglandes (inquit Plinius) multum pineis minores vniuersitate, eademq; portione ampliores nucleo. Peregrinas esse arbores, & à Regibus è Perside translatas indicio sunt Græca nomina. Creditum est hoc genus nucis Ioui sacrum esse, eò quòd hæc arbor inter omnes nuces suauissimum ferat fructum. Fuit enim glans apud antiquissimos maximo in honore, antequam mortales se ad delicias conuerterent, ut qua sola innocuæ vitæ atq; simplicia alimenta præberent, quapropter quum nucem veteres illi egregiam existimarent, decorare eam digna appellatione volentes, iuglandem quasi Iouis cibum nuncupauere. Hæc inter nuces primum obtinet locum, & per antonomasiam nux appellatur. Prisca etiã ætas nuptiis religiosas fecit, spargebantur enim eæ nuptiis, cuius rei ratione Seruius Varronis auctoritate narrat, ut Iouis omine matrimonium celebraretur, ut nupta matura sit, sicut Iuno. Festus autem: Nouæ nupte mariti domum intranti fiat auspiciu secundum. Nam illud vulgare est spargi nuces, ut à rapientibus pueris fiat strepitus, ne puellæ virginitatem deponentis vox exaudiat. Ad id allusit Virgilius:

*Nouas incide faces, tibi ducitur uxor,*

*Sparge marite nuces.*

Plinius: Quamquam & ipsæ nuptialium Fescenniorum comites. honor his naturæ peculiaris, geminato protectis operimento, puluinati primum calycis, mox lignei putaminis; quæ causa eas nuptiis fecit religiosas, tot modis factum unito, quod est verisimilius, quàm quia cadendo tripudium sonumve faciât. Tinguntur cortice earum lana, & ruffatur capillus primum prodeuntibus nucleis, id compertum infectis tractatu manibus. Vim, quam contra venena habent, iam diximus in ficu.

Nomen.

Theophrasto καρύα πρσικὴ id est nux persica. Dioscorides καρύον βασιλικόν, εὐβοϊκόν, & πρσικόν vocat, id est nucem basilicâ, siue regiam, euboicam, & persicâ. Democritus Græcus vocabula declarat ἀς βασιλικόν καρύον dicit esse nucem regiam, vel quæ simpliciter nux dicitur. Sed δὲς βάλαρος castaneam esse dicit. Plutarchus in Sympotiacis καρύον dictam putat, quod spiritum grauem, ac soporem inducentem profundum exhalans lædat eos, qui sub ea recumbunt, ἀπὸ τῆς καρύος id est odoris grauedine. Macrobius verò iuglandem nucem secundum aliquorum opinionem dictam à iuuando, & glande existimat. Ex C. Bassi opinione iuglâs arbor dicta inde est perinde ac Iouis glans. Nam id arboris genus nuces habet, quæ sunt suauiore sapore, quàm glans est. Hunc fructum antiqui illi, qui egregiū ipsum, & ipsam arborē Deo digna existimabant, Iouis glandem appellauerunt, quæ nunc literis interlisis Iuglans nominatur. Ex Cloatii autem opinione in Iuglans d prætermisum est, quasi diuglâs, id est δὲς βάλαρος. Caryatides, de quibus Vitruuius tractat libro primo, ait Lactantius apud Statium in Thebaide à nuce arbore nominatas esse, quòd virginū chorus has arbores propter hostiū metum



metum cōscendisset. Plinius has à regibus translatas indicio esse Græca nomina, quippe optimum genus persicum, & basilicum vocant, & hæc fuere prima nomina. Caryon à capitis grauedine propter odoris grauitatem conuenit dictum. Etenim arborum ipsarum, foliorumq; vires in cerebrum penetrant: hocq; minore momento, sed in cibis nuclei faciunt. Sunt qui honoris nomen interpretantes, & louis glandem esse dicunt. Videntur hæ à Catone nuces caluæ dici, & si Plinius galuæ dicat. Inquit enim, Nuces galuæ, prænestinas, Græcas: cū calua nux non nisi iuglans esse possit. A M. Varrone iuglans dicitur, quod hæc antequam purgetur, gladii similis sit, & ideo nux dicta, quod eius succus corpus atrum faciat, veluti nox est. Aliquibus nux dicitur à nocendo, quod & corpori nocet, vt diximus, & satis, vt dicemus. Itali vocant *noce*.

Descriptio hæc à Theophrasto adducitur. Germinat non cacumine, vt maxima pars arborum, sed lateribus impulso priore pullulo, qua forma & caudices toti, & prægrandes rami crescunt, vt quibusdam aliis, in foliorum vnum procumbunt, idque optima ratione prouenit, quum de sit initium, vnde germine erumpat. Non floret, sed villum affert, quod præciduis grossis proportionem respondere existimatur. Mature germinat, paulo ante æquinoctium, & ætate fructificat. Semen protinus post ligneum tegmen est. Plinius, Honor his naturæ peculiaris gemino protectis operimento, puluinari primum calycis, mox lignei putaminis, solum hoc pomum natura compactili operimento clausit. Namq; sunt bifidæ putaminum carinæ, nucleorumq; illis quadripartita distinctio, lignea intercurfante membrana. Fructus pingui succo præditus, cuius extrageminantur vitia. Fauonio inter primas germinat. Inferiore sui parte fertiliior est. Fructus vetustate pinguescit. Et si apud nos notior sit, quam vt representari debeat, cū à summo viro prætermissa sit, non relinquemus. Arbor assurgit prægrandi, & procero caudice, multis summatim ramis ingentibus brachiato, latitudine spatiosa, ad binum ternumve cubitorum complexus sæpius crassescente. Cortice hiulco, & in rimas altas dehiscente. Frondibus neruosis, latis, oblongis, terebintho, vel fraxino maioribus, è iucundo grauius subolentibus, patulamq; iactantibus vmbra, & insalubrem, per autumnum deciduis, verni temporis initio panicula prælonga protuberat, statim quam frondem facere cæpit, caduca prolabitur. Multis, prælongisque nixa radicibus. Fructus multis occultitur inuolucris, calloso primum, herbaceoq; cortice, quem guliocam dicunt, hinc compactili carinarum loculo, mox tenui tunica, quæ nauci aliquibus dicitur. Crispi intus nuclei quadripartitè digeruntur, lignosa intercedente membrana.

Theophrastus è syluestri genere esse ait, cū cultu mansuescat. Syluestria enim deteriorem fructum pariunt, & foliis, ramis, totaq; forma breuiora efficiuntur, spissiora, contortiora, durioraq;. Plinius, Optimum quidem genus earum, persicum atq; basilicon vocant. sola differentia generum in putamine duro, fragillive, & tenui, & crasso, loculoso, & simplici. Et Tarentinarum

Forma.

Genera.



duo genera, fragili putamine, ac duro, quæ sunt amplissima, & minimè rotunda. Præterea mollusca putamen rumpentes. Insuper consulare virum audiuit iuglandes nuces & biferas habere se profiteñtem. Sed Macrobius Saturnalium libro, nux tarentina, dicit, quæ ita mollis est, ut vix attrectata frangatur. De qua in libro Fauorini sic reperitur: Itemq; quidam tarentinas oues, vel nuces dicunt, quæ sunt Terentinae à Tereno, quod est Sabinorum lingua molle. Vnde Terentios quoque dictos putat Varro. Quam in culpam etiam Horatius potest videri incidere, qui ait,

*Et molle Tarentum.*

Nux mollusca quæ fuerit, ab eodem declaratur.

Plautus in Calceolo sic eius meminit:

*Molluscam nucem super eius dixit impendere tegulas.*

Sed persicum, quod vulgo vocatur, molluscam esse nucem ait, quòd cæteris omnibus nucibus mollior sit. Cuius rei idoneus assertor est Sueuius in suo moreto, qui inter cætera, quæ eò mittit, hoc pomum mitti ait, his verbis,

*Admisce in Acca basilicis hac nunc.*

*Partim persica: quod nomen sic denique fertur,*

*Propterea quòd qui quondam cum rege potenti*

*Nomine Alexandro Magno fera prælia bello*

*In Persas retulere suo: Post deinde reuentum,*

*Hoc genus arboris in prælatis finibus Graiis*

*Differuere, novos fructus mortalibus dantes,*

*Mollusca hac nux est, ne quis forte inscius erret.*

Sed Macrobius aperte hallucinatur, quòd persicum vulgò dictum molluscam nucem esse putat. Quippe Sueuius in suo moreto persicas nuces, id est, molluscas basilicis, & congeneribus esse miscendas dixit, nomenq; persicis inditum refert, quòd post bellum ab Alexandro aduersus Persas gestum, ea ad Græcorum fines delata, satum inuisos antea fructus dedere, & basilicæ, & persicæ nuces dictæ fuere. Sed Macrobi erroris causa fuit, quod putauerit idem esse malum persicum & nucem persicam. Sed persicæ hæc nuces, vel, ut Plinius ait, mollusca, nobis afferuntur ex oppido, quod vulgò *Castelluccia* dicitur, corio adeo fragili vestita, ut crescendo illud rumpant, auiumq; furto exponantur. Sed parua sunt, nobis dicuntur *mollesse*, dura verò *maschie*, quas moracias, & moracillas dictas à frangendi mora sunt qui dicant.

*Colum.*

Nux, Theophr. authore, montibus ppria, in planis nasci recusans. In Thimo- lo Olympioq; Mylio plurima nascitur. E syluestri genere esse videtur, quæ frigoris cupida mōtanaq; potius sit, sed cultu mitescit. Plin. ex eo. Nux in montibus nō temere visa est. Damageron Græcus in frigidis potius quā calidis gaudere ait. Pallad. amare loca mōtana, humida & frigida, plerumq; lapidosa, potest tamē & locis tēperatis iuuante humore nutrirī. Antiphanes, ex Athenæo, optima cuiusq; regionis laudans, nuces è Paphlagonia optimas afferri dicit:

*Paphla-*



*Paphlagonumq; Iouis & glandes.*

Apulia his carer, vbi calidum cœlum, & si ibi aliqua forte feratur, degenerat arbore, & fructu. Petrus Crescentius quocunque cœlo viuere scripsit, quod tantorum virorum doctrinæ, & experientię repugnat, cùm calidis locis, si nascantur, non fructificent.

10 Damageron siccis gaudere air. Plinius: aquas odere iuglandes. Nos qui *solum.* temperatis degimus regionibus multas habemus confitas, & optime fœrificantes iuxta aquarum decursus, in conuallibus, vel montium radicibus, soluta terra, nigraq; Sed maxime argillam reformidat. At si quis argillofis locis  
10 serere eas cogatur, scrobem profundam excauet, prædictaq; repleat terra, & in medio eas conserat. Idem faciendum est reliquis locis, in quibus soli natura arboris naturæ repugnet.

Damageron iuglandes plantari air tempore, quo & amygdalæ, ac sæpius *Satio.* transplantatas fieri lætiores. Columella ante calendas Martias air iuglandem serere oportere. Plinius, iuglandi à calendis Martii ad idus eiusdem satio distribuitur. Palladius lætiores fieri tradit, si sæpius transplantetur: in locis frigidis bima, in calidis trima transferri debet. Radices plantarum sicut in aliis arboribus solemus, in hoc genere refecare non debes. Fimo bubulo ima  
20 planta ringenda est, sed melius cinis aspergatur in scrobibus, ne calore stercoreis aduratur, nam cinis creditur vel corticis teneritudinem procreare, vel fructuum densitatem afferre. Altis scrobibus delectatur pro arboris magnitudine, & desiderat interualla maiora, quia stillicidiis foliorum suorum, proximis vel sui generis nocebit arboribus. Columella air: Omnis nux vnã radicem mittit, & simplici stylo prorepat. cùm ad solum scrobis radix peruenit, duritia humi coercita recuruat, & extensa in modum ramorum alias radices mittit. Nos eas transplantamus, quæ à sua arbore caduæ seipsas serunt, atq; limitibus, iuxta vias, locaq; inutilia serimus, cùm sua vmbra vicina lædat.  
Ouidius de nuce,

30 *Sponte mea facilis contempto nascor in agro,  
Parsq; loci, quo sto. publica penè via est.  
Me, fata ne ladam, quoniam fata ledere dicor,  
Imus in extremo margine fundus habet.*

Quercum & iuglandem tam pertinaci odio dissidere dicit Plinius, vt iuxta nucem iuglandem depacta, moriatur. Et si hanc nonnulli in quercum senio transmutari dicant. Interualla sint quadraginta, vel quinquaginta pedum. Nasci etiam auulsione Damageron scripsit.

Ramo etiam depacto vitalis fuit satus. Euellitur à radice ramus, cum aliqua trunci corporis parte fimbriata, & scrobibus accommodata calcari debet validè terra. In calidis regionibus Ianuario, in frigidis Februario.

40 Erigatur truncus à solo decem, vel quindecim pedes. Omniq; abdicato *Cultus.* cultu ferax est. Vnde Ouidius,



*Non mihi falx nimias Saturni deputat umbras,  
Duratam renocat non mihi fossor humum.  
Sole licet, siccaq; siti peritura laborem,  
Irrigua dabitur non mihi sulcus aquæ.*

*Infitio.*

Posteritati memoriæ mandarunt rei rusticæ periti, neq; iuglandem, neque resiniferas arbores vlllo infitionis inter se, aut cum aliis pignore iungi posse, ita ut iuglans aliam non admittat arborem, & suum etiam surculum respuat: si pangantur nullo fœderis nexu coalescant. Sed ii planè, ut Damageronti placeat, à veritate sunt deuui, experientiaq; docuit iuglandis surculum resinosa terebintho, aut pistacio infitum comprehendisse, & in grandiore sua sorte arborem euasisse. Terebinthus, & iuglans surculum pistacii recipiunt, qui conceptus persæpe conualuit, & licet forsitan non facile coëat, non ideo tamen negligendum, si res semper suum non sortiatur effectum. Sunt qui hoc infitionis vtantur genere: Nucem obruunt, & vbi adoleuerit, bimam aut trimam radicibus eruunt, radiciq; surculum iuxta carnem infigunt, & iterum terræ religant, alii ramulum anniculum elgunt, & inuertunt, quia medullam pleniorē habet, & rasuram facilius sustinet, sic infita melius comprehendet. Diophanes nucem in arbutum solam inferi dicit. Quod Virgilius confirmat,

*Inferitur verò & fœtu nucis arbutus herida.*

Plinius: Quippe cum Virgilius infitam nucibus arbutam dicat. Palladius: Inferitur, ut pleriq; asserunt in mense Februario in arbuto sed melius in trunco, ut alii, & in pruno, & in se. Ad Palsiphilum,

*Arbutæas frondes vastæ nucis occupat umbra,  
Pomaq; sub duplici cortice intaresert.  
Cætera, quæ solers processu temporis usus  
Exprimet, exemplis instituerenouis.*

Nos Aprili vltimo nuces digitali infitione mutuo inserimus, & optime comprehendunt. Sunt qui dicant in castaneam inferi posse. Inoculamus & vere, & concipit.

*Art.*

Nuces nudas, & sine putaminibus ædent iuglandes, ut pollicetur Africanus: si fractis vtrinq; carinis integer nucleus illæsa prorsus carne, lana, vel vitigineis foliis recentibus, aut platani foliis obuoluatur, quo minus à formicis enucleatus erodatur fructus, dein terræ mandetur. Hoc etiam modo, Florentinus asserit, in amygdalis venturum, si cinis scrobibus aspergatur. Damageron ait: Si quis terebro per medullam arborem traiciat, & foramini parem vlineum adigat cuneum, nodosam duritiem nux exuet. Latiorēque fieri affirmat, si quis cuprinum clauum imprimat arbori, qui vsq; ad medullam penetret. Cinis etiam iugiter caudici, vel radicibus affusus, & teneritudinem affert, & fragiliorem nuclei carnem efficit. Palladius: Si dura nux erit, vel nodosa: cortex vulnerandus non circumcidendus erit, ut vitium mali deducat humoris. Alii radicum summam præcidunt. Alii terebratæ radici palum



de buxo imprimunt, vel cuprinum clauum, vel ferreum. Si Tarentinam facere volueris, solam nucis carnem lana propter formicas inuolutam in seminario debebis obruere. Si ferentem iam in hoc genus velis mutare, lixurio per annum continuum ter rigabis in mense.

Nux fructum non abiiciet, Damageton ait, si quis verbasci radicem, vel coccinium è sterquilinio pannum amuleti vice suspendat. Si senectæ vitio cauetur, Palladius ait, longus canalis à summo trunco ad imum debet excludi, sic beneficio solis, & venti diffilantur, & durefcunt, quæ in marcorem transibant. Arcebitur etiam hiantis carinæ vitium si frequenter ablaqueetur. Democritus scriptum reliquit, Si quispiam ieiunus lentis grana mandat, atq; dum adhuc mansum in ore versat, quum flore pubet iuglans, eius ramum demordeat, arbor distabescet. Item si flagrans igni clauus radicibus imprimatur, aut si in traiectam terebro arborem puerile lotium indatur, aut si quis iuxta ablaqueatam radicem dictamnum, fabas, vel pannum menstruo sanguine mulieris imbutum deponat, arborem ariditate tabida conficiet.

Theophrastus nuces perraro seruari, quia præ raro minimeque continuo putamine obreguntur. M. Varro ait, nucem iuglandē quanto citius promes iucundiore vtere, quod vetustate nux fiat aridior. Palladius: cortex in nuce demissus maturitatis indicium est, qualis debet & poni. Nuces seruantur vel paleis obrutæ, vel arena, vel foliis suis aridis, vel arca ex suo ligno facta inclusa, vel capis mixtæ, quibus hanc vicissitudinem reddunt, vt eis acedinem tollât. Martialis asserit, & expertum se ait: virides nuces tantum liberis putaminibus suis melle demergi, & post annum virides esse, & ipsum mel ita medicabile fieri, vt ex eo facta potio arterias curet, & fauces. Ferrur apud nos prouerbi-um, nucem rusticorum naturam sortitam esse, quo enim immitius eius rami perticis feriantur, eò vberiores fructus sequenti anno proferre. Si leni manu colligas, minus fertilem futuram. Ouidius hoc versu exprimit,

*Ac cum maturas fisso noua cortice rimas*

*Nux agit ad partes, pertica sana venit.*

*Pertica dat plenis immitia vulnera ramis,*

*Ne possim lapidum vulnera sola queri.*

Vbi collectæ sunt nuces in cumulos rediguntur, vt biduo, vel quattriduo corticibus denudentur, dein eiusdem temporis spatio areis relinquuntur, quo sole resiccentur, vt commodius seruari possint. Priusquam reponantur, eligantur integræ, vitiosæ separantur, rumpanturq; vt nuclei ad oleum seruentur, nam si cum testis diutius immorauerint, à vermibus erodentur. Maximus est apud nos vsus conditarum saccharo, vel melle nucum. Albæ hoc modo die vna condiuntur. Teneræ nucis putamen antequam lignescat, cultro deglubitur, testæ albæ tenues illico ne nigrore contrahant, in aquam proiciuntur, coquantur vsq; dum mollescant, inde cinamomo, & garyophyllis traiectæ saccharo perfecte cocto bulliunt tribus quatuorve bullitionibus, tū quo saccharū bi-



bant, triduo aut quatrduo inibi sinuntur, & quia saccharū recrudescit, propter humorem imbibitum, idem per se denuo coquitur, & bistérve sic repetitur.

*Materia.*

Theophrastus eius materiem amplam esse dicit, eiusq; vsum ad tectorium opus, sed frangi se sonitu prænunciat, ita vt præsentire homines possint, quod in Antandro contrigisse, omnesque è balneis terrefactos profugisse traditum est. Sub terram obruta à putredine immunis durat, quinimo omnium præcipua operi subterraneo redditur. Etiam carbones iuglandis experi solent ferreis metallis, cum iam exarserit. Plinius ab eo: Cariem vetustatemque tardissimè sentit iuglans. Non improbatur iuglans in aqua, hæc quidem in his, quæ defodiuntur, vel principalis. Colos mire adulteratur iuglande tincto, atque in medicamine decocto. Facile pandatur iuglans. Fiunt enim ex eo trabes, frangiq; se prænunciant strepitu, quod in Antandro accidit, cum è balneis terrefacti sono profugerunt. Apud nos arcis, & mensis, & utensilibus lautis dicatur, materie vndatim crispa.

*De Amygdalo. CAP. XXXIIII.*

**T**ERTIVM ab his locum amygdalo Plinius assignat, cui nos assentire volumus. Hæc arbor an fuerit in Italia Catonis ætate dubitare ait, quoniam Græcas nominat, quas quidem & iniuglandium genere servant. Legitur apud Arnobium fabula de Amygdalo: Ia Mydæ regis filia fuit, quæ mortuo Ary sponso suo exanimati pectus mitioribus lanis velat, illachrimans cum Ac-  
deste, qui mortis causam dederat, seseque interficit. Cruor in purpureas vio-  
las vertitur, corpus à deûm matre sepelitur, vnde amara amygdalus nascitur, amaritudinis causam secum afferens. Virgilius de futura frumenti copia, ex amygdalo prognosticon desumit.

*Contemplator item, cum se nux plurima sylvis  
Induct in florem, & ramos curuabit olentes:  
Si superant factus, pariter frumenta sequentur,  
Magnaq; cum magno veniet tritura calore.  
At si luxuria foliorum exuberat umbra,  
Nequicquam pingues paleæ teret arca culmos.*

Ebrietatem accere putavit Plutarchus in Symposiacis, qui apud Drusum Tiberii Cæsaris filium quendam medicum comessari solitum retulit, qui omnes bibendi certamine prouocabat, neminiq; codebat in vini potu, is tandem deprehensus est, antequam biberet, quina, senave comesse amygdala, quominus remulencia tentaretur. Porro cum deuotate vetuissent, ne pauxillum quidem in huiusmodi potu resistebar. Hoc idem Athenæus retulit, cuius causam amaritudinis vim dicit, quæ resicet & humores depascat. Sunt qui amygdala putent facultate mordendi, detergendaque carnis donari, sic vt faciei fuscas & contractas sole maculas obliterent. Ergo cum præsumpta fuerit, amaritudine sua meatus vellicant, & quodam lacerant morfu, qua de re  
vaporem



vaporem, quem humor in cerebro creauit absorbent. Sic itaque non ab re amygdalarum amarulentia contra meri iniurias pollet, interanea resiccans, sic ut non sinat venas impleri, quarum, ut tradunt, distentione, & perturbatu remulentiam contrahi volunt, effluuiis obfessa mentis arce. Pereuidens argumentum est mori vulpes amarorum pastu, si non cōtingat è vicino aquam lambere, intestino humore affatim exucto. M. Varro ex nuce Græca triplex ministerium fieri ab apibus, cibum, mel, ceram, earumque florum pastu caliacos fieri. Columella probatissimam arborem amygdalum vocat ad apes. Ex his Palladius: Ex amygdalis apes mel conficiunt.

20 Græcis arbor *ἀμυγδαλή* dicitur, fructus *ἀμύγδαλον*. Sed Pampphilus, Athenæ *Nomen* authore, de pronunciationis tono loquens ait: *ἀμυγδαλής* in fructu grauari oportet, sicut in *ἀμυγδαλή*, at arborem vult circumflecti, ut *ἀμυγδαλή*. Aristarchus & fructum & arborem indifferenter posuit accentu acuto. Philoxenus utrumque circumflectit. Triphon Atticus amygdalam fructum cum graui profert, quod nos neutro genere amygdalum dicimus, sed amygdalam arborem: nam cum nomen à fructu sit deductum, videtur merito circumflecti oportere. Lacones muceros vocant amygdalas, ut Seleucus scribit. Amerias mycerum dicit. Nicander in suis Georgicis amygdalum dicit neutro genere. Herodianus Alexandrinus inquit amygdalas dici, quod post viride putamen multos scarificatus ostendat, & hiulcas rimas, quas Græci amychas vocant. Dicitur etiam amygdala nux Thasia, quemadmodum declarat Democritus Græcus. Macrobius amygdalam dicit nucem Thasiam, & Græcam ex Cloatii doctrina. Cato è Latinis nucem græcam vocat, nuces omnes commemorans, caluam, quellanam, prænestinam, & græcam. M. Varro nuces Græcas vocat. Columella etiam nuces Græcas amygdalas vocat. Argumento quodd omne, quod de nuce Græca scripsit, à Theophrasto excepit de amygdala loquente. Vnde maxime miror Hermolaum doctissimum virum ambigere, an Græca nux Columellæ sit amygdala. Plinius, & Thasiam, & Græcam nucem amygdalam vocat. Palladius etiam nucem Græcam vocat.

30 A Theophrasto ita formatur: Arbor vestitur folio fœminicoruo si- *Forma* mili, sed minus pingui crassove. Inter arbores soli peculiare est, quodd ante foliorum ortum floreat, vel cum flore folium promat, vel paulo post. Flore foliato, candido, quamquam & amygdalarum quarundam subruffus exeat. Aronia mespilo forma simili. Germinat præmaturè, sed non præmatura folia dimittit, cum multis serior sit. Facile germinat, quia viribus præualet alimentoque abundat. Facileque afficitur, & nisi siccitas suæ naturæ foret impedimento, ad supergerminandum propensa esset. Fructificat ex annotinis surculis. Fructu perseæ simili, vel fraxini semini. Cuius semen sub tegmine ligneo est, ambiētiaque plura habet. Succo pingui prædito. Principio succus aquosus, quandiu viridis est, atque recens, sed senescens crassiusculus redditur. Cuius putamina acerba, acutaque sunt: Vnde sordes omnes, terraque partes eo vis naturæ secer-



nēs expellit. Sed cur cito floreat, fructus verò serò maturet, causa est, quòd flores, & folia sunt faciliora, utpote quæ crassiore consistunt materia, fructus verò purgatiore succo consistunt, quòd maioris patatus indigeant, præsertim cùm lignosus, pinguis, siccusq; natura sit fructus, tales igitur difficilius confici necesse est. Visitur aliquando fructum sine foliis afferre, quod non aliunde evenire credibile est, quàm ex nimia fructus frequentia, & ob id folia minus frequentia: absumpta enim naturæ vi in fructu, folia parva, imbecilliaque remanent, & casui obnoxia prolabuntur, ut nuditatis speciem in arbore relinquant. Prima quidem specie fructum abunde parit, sed quos peperit sæpè numero educare non potest, quippe cùm in perficiendo porissimo labore sit opus. Et si fecunda sit, non ob id brevis vitæ eam censere fas est. In senectâ enim fertilior euadit. Cuius ratio est, quòd ætate viribus detractis detrahitur & alimentum vbertas, itaque fit, ut facile quod reliquum est concoquatur ad fructus confectionem. Singulari radice firmatur, prægrandemque ac alte defixam agit. Pingui succo turget, lachrymamq; rimosa plorat, quæ concrescit in gummi. Plinius ab eo. Amygdala folia rubentia habet. Floret prima omnium mense Ianuario, Martio verò pomum maturat. Nec interest maturius germinasse, cùm prima germinet, & inter nouissimas nudetur. Messibus reddit semen. Fructus tenuiore, sed simili iuglandium summo operimento, item secundo putaminis: nucleus dissimilis latitudine, & acriore callo. Extra germinantur vitia. Succo pingui prædita. In senectâ fertilissima. Sed valde minor Theophrastum in re arboraria diligentissimum virum soli amygdalæ inter arbores tribuisse, ut prius flores, quàm folia promat, cum contra eum restentur Neapolitana pomaria, ubi præcox, armenia, persica, cornus, cerasus, prunus, malus, populi, vlmique, quæ ante folia florent, ut videantur arbores frequenter albo linteo coopertæ. Plinius item Ianuario florere. Martio maturare, cum præcox amygdalus Iunio suos maturet fructus, serotina autumno. Dioscorides amygdalum rhododendri foliis esse. Palladius etiam in vetustate plus afferre scripsit. Apud nos nouellis amygdalis folia hyeme non cadunt, adultis cadunt.

Genera.

Theophrastus sylvestris, & domesticæ, dulcis, & amaræ, duræ, & molles meminit. Athenæus Cypriæ meminit, quæ reliquis longior, & extremitatem aduncam habet, item Naxiæ, & in pretio habitæ, quia erat mollis, ut ex Phrynici testimonio patet apud eundem, qui se molares dentes sibi rupisse dicit, ut ne Naxiam quidem amygdalam frangere posset. Plinius à Theophrasto dulcis, & amaræ. Nos autem ita diuidemus. Amygdalarum duplex genus, sylvestre, & urbanum. Sylvestres amygdalæ amaræ sunt, & salubriores, quippe in remediis magis quàm dulces valent. Urbanum genus in duo itidem diuidemus: Molle & Durum. Molles amygdalas tarentinas dicimus, quæ tam fragili putamine sunt, ut manibus attritæ frangantur, & scarboribus furto auium exponantur, nam hiascunt, & decidunt, vel antea

rostræ



rostro frangunt, & vorant, à mercatoribus spernuntur, quia fragiles sunt, non ita à mulieribus & pueris, qui manibus pressis, vel dentibus ruptas edunt. Harum duæ species, altera maior, altera minor. Neapoli *amendule pomegue* dicimus. Athenæus has *Naxias* vocat. Durum genus in tria diuidemus, maximum, medium, & minimū. Maximum quatuor digitorum longitudine fructus est, cuius apex veluti hamus incuruatur: Athenæus *Cyprias* vocat, Plinius *falcatas*. Apuli *amendolagine*. & ab eis pro vili pretio habitæ, quia earum arbor paucas producit, nec continuo fœtificat, nec exportari tolerant, sed secundis mensis apponuntur, ac saccharo condiuntur. Medium genus communes vocat, à pice sunt retusiori, folia arboris maiora. Sed minimum genus præstantius est. Incolæ *ambrosinæ* vocant, hæc exportantur in diuersas partes, gestatum tolerant, maximoque habentur pretio à mercatoribus. Hoc genus in duas species diuidemus, maiorem, & minorem. maior non dicitur, quod cum cæteris conferri possit, sed respectu alterius speciei, quæ minima est. Fructus rotundus est, parvusque, totam suæ testæ cavitatem replet. Arbor tenuior, & delicatior est. Folium angustius breuiusque. Hæc singulis annis vberiores fructus producit, ut nimio onere frangantur rami, ni subdita furca ferat opem.

Theophrastus ei cœlum serenum apricumque tribuit. Columella calidum. Plinius calido cœlo, & meridianis partibus gaudere dixit. Palladius: amant cœlum calidissimum, quia mature florere consuerunt. Ita statuendæ sunt, ut arbores ad meridiem spectent. Florentinus: gaudet calidioribus locis hæc plantæ, ob id insulis plantant, ut vberius adolescant. *Naxia* ab insula *Naxo* veteribus Græcis *amygdala* maxime commendabatur, ex *Athænei* auctoritate: secūdas sibi vendicat *Cypria*, quæ præter cæterorum morem, quæ gignuntur alibi, repando cacumine prodit. Ex *Hermippi* sententia, ex *Paphlagonia*, & primitus ibi venerunt. Plinius ait *Thasias* & *Albenses* celebrari. Est enim *Thasus* *Thraciæ* insula. Apud nos qui temperato degimus cœlo minus fructificat, frigido verò aut perit, aut sterilefcit, nec semine sata pullulat, ita aquilonium odit cœlum. Aiunt in *Anglia* interdum nuces maturare.

Theophrastus *amygdalis* gracile solum tribui vult, quoniam si pingue, vel altum nanciscatur, nimia pabuli vbertate sterilitate afficietur. Adeo virium soliditate valet, ut ex nimio alimento in germinum luxuriam proruat. *M. Varro*: deorsum fertiliores nuces græcæ, id est in planis consistæ, ut supra diximus. *Columella* agrum durum, & siccum desiderare ait, nam si in locis diuersis natura eiusmodi posueris nuces, protinus putrescēt. Plinius ex *Magonis* sententia ait gaudere dura terra, in pingui, aut humida sterilefcere. A quib⁹ *Palladius*: Amat agrum durum, siccum, & caleulosum. Ob id *Apuliæ* solum totius nostri regni accommodatissimum est *amygdalis*, calido enim fruuntur cœlo, ubi patentissimæ planities consistæ, & solum, cui post duorum, vel trium pedum altitudinem calculi subsunt, vel perpetuus tophus. Prohibet hic enim, ne vnica *amygali* radix in profundum descendat: sed alimentum in fructus conuertat.



tur. Ideo Italia Apulas laudat. Et nobis inuidendæ parum sunt Cyprius, Naxus Thasusq;.

Satis.

Satam semine amygdalami Theophrastus exurgere posse ait, sed degenerare sapore, duramq; ex molli reddi. Idcirco aut adultâ inserere, aut sæpius transferre præcipiunt. Cuius ratio seminis infirmitas est: devincitur enim ab influxu copiosioris alimenti, quod digerere nequeat. Sic durior euadit. Ob id Thasii amygdalas inoculant, ex mollibus enim præduræ post satum redduntur. Didymus semine seri ait, & transplantatas meliores fieri. Florentinus Græcus seminio pãgi posse docet. Nuces, quæ seri debent, pridie liquido fimo macerentur, alii aqua mulsa madefaciunt, in eaq; noctem solam esse patiuntur, ne germen 10  
extinguat mellis mordacitas. Cacumina in terram rectè figuntur, sic ut lignosior pars sursum spectet. Tradunt vegetiores enasci, si in scrobiculos, quibus obruuntur, ferula coniiciatur. Columella, Antequâ nuces deponas in aqua mulsa, nec minus dulci macerato, ita iucundioris saporis fructum, cum adoleuerit, præbebit, & interim melius & celerius nasceretur. Ternas nuces in trigonum statuito, parsq; durior inferior sit, quia inde radices mittit, nuxq; à nuce minimo palmo absit, & anceps ad Fauonium spectet. Plinius ex Magonis sententia, qui in nucibus operosus fuit: Serendas quàm maximè falcatas, & è nouella, fimoq; diluto maceratas per triduû, aut pridie quàm serantur, aqua mulsa. Mucrone defigi, aciem lateris in aquilonem spectare: ternas simul serendas 20  
trianguli ratione, palmo inter se distantes, denis diebus adaquari, donec grandescant. Palladius nihil utilius, ait, quàm seminarium facere. Fodiemus ergo altam pede vno semis aream, in qua obruemus amygdala, non amplius quatuor digitis, ita ut acumina figamus in terra spatio inter se binorû pedum separata. Sed ipsa amygdala ad ponendum, & noua legamus, & grandia, quæ antequam ponamus, pridie mulsa aqua, ita ut nimis maceremus, ne germine extinguat ex multo melle mordacitas. Alii prius fimo liquido per triduû nuces eas macerant. Deinde die, ac nocte esse patiuntur in mulsa, sed quæ suspicionem tantum possit habere dulcedinis. Cû in seminario amygdala disponimus, si siccitas intercesse- 30  
rit, ter in mense rigemus, & herbis nascentibus circûfodiendo sæpe purgemus. Terra seminarii lætamen debet habere admistum: seruandæ sunt à pecore, quia si rodantur, amarescunt. Seri debent Ianuario & Februario, locis calidis Octobri, & Nouembri. In Baro aliquando satæ amygdalæ degenerare conspiciuntur, quippe si eas seras, quas ambrosinas nominari diximus, ex proueniunt, quas communes diximus, si communes seremus, prouenient syluestres, si molles, duriusculæ nascuntur, ob id ex sobole, quæ circa matris crus nascitur, plantatur. Qui Neapoli seminaria facere velint, ex Apulia semina exportari curent, nam meliores nascuntur, quàm ex iis, quæ nostra regione nascuntur, nam si nostratia seueris, plerunque euanida fiunt. Viuiradix ab autumno ad Brumam, ut Florentini fert opinio, commodius seritur, verno satum difficilius 40  
comprehendit, quòd arbores ea præcoci partu germinet. Columella serit Ar-  
turi



Aruri signo, vel circa kalendas Februarias, quia prima gemmascit. Mago, Plinio referente, amygdalas ab occasu Arcturi ad Brumam seri iubet, statuitque tempus. Palladius: Seritur Ianuario & Februario, calidis locis Octobri & Nouembri. Cum in seminario adoleuerint, relictis ibi, quæ spatio sufficient plantis, alias transferemus mense Februario. Amplo distent inter se intervallo, cum & numerosam radicem habeat, & vires solidas hauriendi. Sunt qui intet vites serendas censeant, tanquam innoxias, & cibo mediocri contentas, & simul quod maturè fructificent, nec latè adumbrent, minime graues, sed Theophrasti opinione hi non recte existimant. Umbra enim & sera feracitas, non tam infestant, quàm vires radicū. rapiunt enim alimentum suo amplo dis-  
 10 cursu, implexuq; enecant. Amygdalis ampliora distribuenda sunt intervalla, quàm malis, pyris, sed minora quàm fico. A quo Plinius: Amygdalas seri iusserūt distantiores, quàm malos, & pyros. Palladius: Spatia inter arbores viginti, aut viginti quinque pedū dedisse sufficiat. Didymus auulsione nasci amygdalas scripsit. Florentinus etiam pangi posse auulsione vel stolonibus. Palladius seri posse plantis, quæ de maiori radice tolluntur. Theophrastus ramo prægrandi depositis germen erumpere raro solere. Florentinus ait, Nonnulli ramulos, qui de cacumine sumerentur, non infelici successu deposuerunt. Didymus nō solum ramo, sed etiam taleis nasci posse scripsit.

20 Cum amygdalam semper sererent semine ob nascendi facilitatem, opus erat, ut bonos fructus afferret, ut eam infererent, ob id Theophrastus Thasios semine satas, & adultas amygdalas inoculasse dixit. Paxamus autumnii exitu amygdalas inferere iubet non iuxta summitates, sed in ramis iuxta mediū excurrentibus. Florentinus verò etiam autumno inferendam præmonet, cum vere germinet, sed inferendos surculos non summatim legēdos esse, sed è media arbore. Quintilii verò Ianuario inferendam præcipiunt. Plinius: Statutum tempus habere suæ insitionis amygdalas circa brumam. Palladius: Mense Decembri, vel Ianuario circa idus amygdalus inseritur, locis verò frigidis & Februario. Si tamen surculos condias antequàm germinet viles sunt, qui de  
 30 summitate sumuntur. Inseruntur & sub cortice, & in trunco: inseruntur in se & in persico. In versibus verò,

*Phyllis odoratos primænis floribus artus*

*Discissi pruni cortice fissa tegit.*

*Pomaq; permutat velamine persica misto,*

*Duritiemq; docet tegminis esse loco.*

*In modicam tornat siliqua tendente figuram,*

*Et frondes pulchro ditat odore feras.*

*Castaneamq; nucem depulsis cogit echinis,*

*Mirari fructus laeta poma sui.*

40 In Baro Apulix Octobri, & Nouembri inserunt. Inferendas arbores Augusto iuxta medium detruncāt, ne frondibus & germinibus arboris succus ab-



sumatur. desitis mox caloribus, vbi cœlum frigescere cœperit, truncum prædunt, & inter lignum, & corticem inserunt, acuunt surculum, ne dum intruditur corticem rumpat. Surculum ex Austrina arboris parte desumunt, & è ramorum summitatibus, non trunco supernascentibus, Luna decrecente postremis diebus, nam si crescente id fieret, materiam multam, fragilemq; produceret arbor, fructus verò paucos. Nos in Campania in prunum inoculamus, & optime concipit, difficilius trunco fisso, medio modo inter lignum & corticem in persicum inserimus. Ipsa recipit persicum, præcocia, chrysomela & cerasia, & tempestiua proueniunt, contra rusticorum opinionem, qui pettinaciter serotina prouenire affirmant. Sed si subdita amygdalus amara fuerit, tantillum fructus cortices amaroris sapiunt. 19

Cultiv.

Nihil æque degenerat vt amygdalus, vnde sæpius plantam transplantare licet. Amygdalam, Theophrastus ait, dum fructus parit, neque rigandam, neq; stercorandam, neque purgandam præterquam aridis, neque vlla cura tractandam existimant, ne plus æquo validior facta fructum in flore amittat. Plinius, Amygdalæ si colantur, fessione floræ amittunt. Palladius: putandæ sunt. Nouembri mense, vt superflua, & arida, & densa tollamus. Seruandæ sunt à pecore, quia si rodantur amarescunt. Circumfodi non debent, quoties florêt, quia inde flos eius excutitur. In vetustate plus affert. Theophrastus: Cultura mitescit amygdala, vnde neglecta amara ex dulci, & dura ex molli redditur. 20

Ari.

Amara amygdala quomodo esculenta fieri possit, multa Græcorum, & Latinorum extant experimenta. Aristoteles docet clauum confixum amygdalæ, vt gummi per multum tempus destillet, vrbani reddere, & per hoc artificium syluestres arbores fiunt domesticæ. Theophrastus amygdalam cultura maxime immutari posse multis in locis profiteretur sui operis. Vnde si quis stipite circumfosso, & ab ima parte perforato mensura dodrantali, vndique lachrymam affluentem in idem defluere sinat, hoc tam ad bene sapiendum, quam ad fructificandum conferre creditum est. Amygdala perforatu castigatur. Si paxillo deciso humorem influentem abstergas, idq; biennio, vel triennio facias, dulcē ex amara efficies. Amaror enim ex nimia alimenti copia prouenit, humorisq; vbertate, quod perforatu castigatur: nā illo liberata humore, in meliorem & suauiore fructum transit. Reliquus humor facilius concoqui potest, sic dulcescit. Amygdalam mutari posse ex toto procul à ratione est, cum arbor sit satis robusta; sed diminutam meliorescere verisimilius est. Præterea si stercoribus nonnullis ex validioribus vtemur, ceu suillo, amygdalæ ex amaris in dulces transeunt. Sed amygdalæ triennio post mutatur, cultum enim per tantum temporis adhiberi par est. Africanus ex amaris dulces fieri affirmat, si circumfosso stipite quatuor digitis à radice cauernula imprimatur, per quam noxium desudet humorem. Vel si circa radices apertas vrina, vel suillum stercus diffunditur. Quintilii ex Aristotele, Martio mense amygdalarum radicibus suillum stercus imponunt, nam ex amaris faciunt dulces, maiores, &



res, & delictiores. Plinius: amygdalæ ex amaris dulces fiunt, si circumfosso stipite, & ab ima parte circumforato, defluens pituita abstergetur. Palladius ex his, Ex amaris dulces fiunt si circumfosso stipite tribus digitis à radice fiat cauer-  
na per quam noxium defudet humorem, vel medius truncus terebretur, & cu-  
neus ligni melle oblitus imprimatur. Vel circa radices suillū sterco affundas.

E duris molles reddere etiā docet Theophrastus. Africanus ita pollicetur:  
Si radicibus ante florem ablaqueatis aqua calida frequenter ingeratur. Palla-  
dus ex Martiali: Teneras nuces amygdalus creabit, si ante florē radicibus ab-  
laqueatis per dies aliquot calida aqua ingeratur. Nucem græcam tarentinam  
10 facere hoc modo docet Columella: In quo scrobe destinaueris nuces serere, in  
eo terram minutam pro modo semipedis ponito, ibiq; semen ferulæ repangi-  
to: cum ferula fuerit enata eā findito, & in medullam eius sine putamine nu-  
cem græcam abscondito, & ita obruito, hoc ante kalendas Mart. facito, vel in-  
rer nonas & idus Mart. Sed Florentinus amygdalam suis operimentis spolia-  
tam facere promittit, si solam amygdalæ nucis carnem vitis recentis, vel plata-  
ni foliis propter formicas inuolutam terræ obruas, sed cinis assidue aspergatur  
trunco, & radicibus. Vt amygdalæ testa tenuior fiat, intestina verò ampliora  
fiant, docet Theophrastus, si continua fossione exhilaretur arbor, nam ali-  
mento meliori vberiori q; cum ipsæ arbores vigent, tum fructus meliores cre-  
20 antur: nam alimenti copia humefacit, pulpamq; fructus auget. Africanus na-  
sci scriptam asserit, si eius testam fregeris integro nucleo, & in eo quicquid li-  
buerit descripseris, mox papyro religatam, ac luto circumlitam, ac suillo ster-  
core congesto obrueris. Palladius: Græci asserunt nasci amygdala interpta, si  
aperta testa nucleum suum tollas, & in eo quodlibet scribas, & iterum luto,  
& porcino stercore inuolutum reponas.

Si lasciuit arbor frondibus, & germinibus, nec ferax fuerit, castigandi mo-  
dum docet Theophrastus, sic copiosiores fructum dari affirmat, si ferreus pa-  
lus adigatur arbori, impressoq; foramini querneus inferatur paxillus, & hoc  
modo in eam animaduerti volunt. Vel si posthac fructus abunde nō dabit, ra-  
dices refossas spoliatasq; hybernis frigoribus dabunt, & reliqua puniendi ge-  
nera. Sublata enim nimia alimenti copia, calor insitus amplius in residuo va-  
let. Ab eo Africanus. Si ferax non est amygdalus, hyeme radices ablaqueabis,  
30 & iuxta terram terebrato trunco teda præpinguis adactum cuneum, infuso  
prius humano lotio, immergemus. Plinius: cuneo è robore adactō fissā radice  
fertiles fiunt, si germinant, nec fructum ferunt. Palladius, Si ferax non est, te-  
da cuneum terebratæ radici mergamus, vel salicem sic inferamus, vt libro te-  
gente claudatur. Sed Theophrastus querneum, Africanus è teda, Palladius è  
salice paxillum arbori adigunt, & alii diuersum, ex quo perspicui licet non cunei  
materiem, sed duritiem & incorruptibilitatem quæri, quo diutius arboribus  
40 infixi durent. Perdit facillime amygdalus fructus ante maturitatē, dicit Theo-  
phrastus, quia nexu infirmo dependent, cum mole grandiuscula cōstent: nam



quodlibet humefacere, atq; debilitare eos facile potest. Tū etiam flatus interdum vehementes inuadūt, vt nil resistere valeant: imò etiā si non pluat, dummodo aer austrinus, nubilusq; sit, amittūt flores & primos fructus, si illico postquam de floruere illud acciderit. Plinius ab eo Si amygdalæ cū defloruere, protinus sequantur imbres, in totū poma depercut, etiam si omnino nubilū fiat, austrinusve flatus, amittunt fœtus. Perdit facillime ante maturitatem fructus amygdala etiam si non pluat & fiat austrinum cœlum aut nubilum, amittunt florem, & primos fructus, si cū defloruere tales dies fuerint. Apud nos à Martio mense vsq; ad medium Aprilem gelu timent, quia tunc flore & fructu pubent, & si noctu pluit in flosculis insidente aqua gelu torpebūt, & caduci fiūt flores, hoc elapso tempore tutius viuūt. Amygdala non solū plagam, sed etiam discissionem caudicis sustinere potest (& si permultæ fissio caudice pereant) Ratio est, quod disciectas partes celerrime comprimere potest, & coagmentare. Vredine non infestatur. Aliquando gummosus humor efficitur. Mutilatione deterior euadit, quippe ex dukci amara efficitur. Ratio est, quod principio alterato, finis quoque alteratio sequitur. Palladius: Locis frigidis vbi metus est de pruina, Martialis dicit hoc remedio subueniri. Antequā floreat, radices nudantur, & albi lapides minutissimi misti arenis cōgeruntur, & vbi iam tempus videbitur, vt debeant germinare, effossi iterum lapides submouentur.

*Cōditura.* Amygdalæ, Florentinus ait, ad legendum maturitatē fatentur, quū fuerint spoliatę corticibus, quæ si muria lauentur, & candidæ fiunt, plurimum durant, mox siccatae ad vsum seruantur. Si difficulter corium exuant, paleis obrutæ continuo relaxabunt. Semina, quæ mollia, Theophrastus ait, carnosaq; sunt, vt amygdala, putamine ambiente optime seruantur, omniaq; diutius seruantur putaminis circundantis præsidio. Sed minus perdurat, quā auellana, quum pinguiuscula illa sit. Palladius: amygdalæ maturitatem fatentur ad legendum, cum fuerint spoliata corticibus. Hæ sine cura hominis seruantur in lōgum. Si difficulter corium dimittent, paleis obruta continuo relaxabunt. Item decorticata, si aqua marina lauemus, aut salsa, & candida fiunt, & plurimum durant. In Baro septem, vel octo diebus insolata cum putaminibus earū sicco loco per triennium, vel quadriennium asseruantur.

*Materia.* Arboris cinerem, ad lixiuiamque probauit Theophrastus vim acerrimam. Ad fornaces, artesque aliquas non incommoda materies.

*De auellana. CAP. XXXV.*

ET si montes, & nemora corylis vestiantur, vt syluestribus arboribus, nos etiam tum ob eorum fructuū gratiam quā apud omnes adeptæ sunt, tum quia facile cultu mirefunt, in pomarium transtulimus. Plinius esse in ipso nucum genere ait. Habent ea facultatem non minimam aduersus venena, præcipitq; Caro in suburbanis hortis conferendam. Plutarchus scribit appensam in laquearibus nucē scorpiones prohibere, ne in domicilia irrepant, leetorum etiam pedibus adligatam, scorpiones ne cubantes adoriantur inhibere nec ad equilia,



æquilis, si præsepibus affixa sit, irrepturos. Nec omitemus, quæ simplex obser-  
uauit rusticitas: serpētem coryli virga, vel caudice idē obtorpescere, & tan-  
dem emori. Metallicorum etiā experientia compertum est tantam cū metallis  
coryli arborem sympathiam habere, vt si illius recta virgæ per montes & loca,  
vbi metalla lateant, deferatur, illico flectatur in absconditi metalli indicium,  
cū cæteris locis recta maneat. Hæc nux inter felices arbores à Macrobio enu-  
meratur. Nec prætereūdum duximus ridiculum Alberti experimentū: Coryli  
virgæ verū instat accommodatæ regulus parua auis figatur, virgæ extremitati-  
bus lignum, vel quoduis aliud subiiciatur, supra quod facile possit circumuer-  
10 ri, mox prunæ subiiciantur, fiet vt calescente colurno verruculo, non sine astan-  
tium risu, se ipsam vertat, dum coquatur, auis. Sed putat ipse eam vim inesse a-  
ui falsò, sed corylo, quæ per se sola conuertitur obiecta igni.

In magnis est ambagibus auellana ob sui nominis varietatem. Theophrasto Nomen.  
*ἡρακλειοπικὴ* dicitur, id est nux Heracleotica ab Heraclia Ponti ciuitate dicta.  
Dioscorides *λεπτοκάρυον* vocat, id est tenuem, & exiguam nucem, respectu iu-  
glandis. Hermonax, & Timachidas auellanam nucem iuglandem vocant ex  
Athenæo. Mactobius prænestinā nucem vocari ait, à loco vbi luxuriat. Est au-  
tem natio hominum iuxta agrum Prænestinum, qui Carsitani vocantur *καρύων*,  
à nucibus, inde scilicet prænestinæ nuces. Hanc autem nucem etiam à  
20 Græcis vocari ait *κάρυον ποντικόν*, cū vnaquæq; gens indiderit huic nuci nomen  
ex loco, in quo nascitur copiosior. Putat idem, Oppii opinione, heracleoticam  
nucem non auellanam, sed iuglandem dici, falsò. Didymus ponticam nucem  
vocat. Plinius: Auellanas antea abellinas patrio nomine vocabant, & in Asiam,  
Græciamq; venere à Ponto, ideo ponticæ nuces vocantur. Seruius ab Auella-  
no Campaniæ oppido. Sed nunc duo oppida in Campania vulgò *Auello* & *A-*  
*uellino* distant sex millia passuum; citra ea *Corigliano* vulgò, quæ optimas, co-  
piosas & varias affert. Neapolitani respectu maioris nucis *nocelle* vulgò dicunt.  
Arbor Græcis *κόρυλας* dicitur, Latinis etiam corylus.

Rara admodum videtur fuisse Theophrasto, quod tã anxie eius historiam Forma.  
30 prosequatur. Auellana assurgit caudice multis infernè stolonibus fruticāte, su-  
perne ramis brachiato. Virgis sine alarū sinu enodibus, breuibus, crassisq; nō-  
nullis. Folis per ambitū serratis, utiq; alno similibus, tamē latioribus. Materie  
admodum lenta. Corrice summo tenui, pingui, maculis albis & variis. Medulla  
tenui & sufflata, quæ dematur. Florere hanc nonnulli inficiantur, sed floris vi-  
ce præludia quædā ostentare, quæ iulos vocant: Siquidem fructu iam caduco,  
squamosum quiddam minutis squamis racematim compactum, veluti præ-  
longus vermis, erūpit, quod singulari fultum pediculo pensile nititur. Is nucis  
pineæ viridis, & nouellæ rudimentū exprimit, nisi quod tereti crassamēto pro-  
pemodum tendit, tripollicari longitudine, crescens hyeme, vere dehiscens, &  
40 flauescens defluit, cū folia profiliunt, tunc calyculacea tegumenta rotidē, quorū  
iuli supra pediculū exeunt, eorūq; singulis singulæ nuces insunt. Germinat & è



lateribus se fundentibus surculis, & ipsum quod præsit propellitur, sic caudex & rami sua prosequuntur incrementa, ut ea quorum germina in singulare folium finiuntur. Radice altissima, tenui, & robusta, & ob id diuturnioris vitæ. Plinius: Has nuces molles protegit barba, sed putamini, nucleisq; solida rotunditas inest. Umbilicus illis intus in ventre medio. Ferunt & auellana iulos compactili callo ad nihil vtilis. Macrobius ait: Pontica nux & basilica, germina & flores agunt, scilicet eisdem temporibus, quibus græcæ nuces.

Genera.

Theophrastus ait: Duo eius genera: sylvestris, & urbana. Sed sylvestris prorsus vtriusq; naturæ, nec urbana fructus magnopere, quam indomita præstantior, folium urbana maius, & caudex procerior. Amba bino genere constant: quædam rotundam, quædam oblongam nucem largiuntur, urbana candidiorem fructum. Didymus: est alia rotunda, alia oblonga. Apud nos sylvestres, & urbana copiosissima sunt. Sylvestres putamine duriori, minores, & sapidiores. Urbana fructu rotundo sunt & oblongo, sed oblongus fructus curretegitur rubra, præcocior est, & calyx summatim magis fimbriatus. Rotundæ altera præcox, altera serior.

Celum.

Hyemis vtraq; patientissima, & montibus magna ex parte proveniunt, cum natura sylvestres prorsus sint, ut ait Theophrastus. Descendit in plana corylus, dixit Plinius. Palladius verò frigido cælo gaudere scripsit.

Solum.

Theophrastus aquosis locis urbanas gaudere retulit. Didymus argillaceis, & vliginosis. Palladius loco humido, macro, & sabuloso. Tale est Abellinum solum, ubi in planis, & montibus optime, copiosissimeq; fructificat.

Salis.

Seritur, ut Didymus tradit, eo quo amygdalæ modo, & tempore eodem deponitur. Palladius: Auellana ponendæ sunt nucibus suis, non amplius supra terra ducenda est, quàm crassitudine digitorum duorum. Viviradice Plinius feri iubet à kalen. Martiis ad idus easdem. Palladius plâis, & sobole expertus est melius provenire. Mense Februario seu planta, seu semen exponitur. Cato propagari posse docet. Plinius auulsione nasci, sed cum parte corporis matris, quam secum auferat fimbriatam. Nos sationis modum, & cultus, quibus in Abellino vruntur exponemus. Nucibus raro, vel nunquam, sed sobole frequentius ferunt. Effodiunt scrobes altitudine quatuor pedum, latitudine trium, inde virgas quinque, circa matris crus fruticantes trimas, vel quattrimas euellunt, panguntq; ut singulis scrobius angulis, & in medio vnam statuunt Octobri, vel Nouembri, terram iniiciunt, & optime calcant, cacumina obtruncant, & vinculis simul religant, ut simul crescant, nec se in latitudinem fundant. Interualla viginti pedum ponuntur, ut cum ad iustam proceritatem increuerint, cacumina ne se obubrent. hoc modo ingentia auellana in Abellino conspiciuntur. Sed à vitibus longe absint oportet. Virgilius, *Néve inter vites corylos fere:*

Ex quo Plinius: Vites odit corylus, & ni procul absit, tristis & egra.

Cultus.

Theophrastus maxime coli iubet. Translatum mitescit sylvestris. Prægraciles eius virgæ desquamantur, crassioresq; derasa interpolantur. Fructum melio-



rem, & copiosiorē afferre traditur, si plures virgas reliquerit, vt quę naturę suę proprietate fruticosa sit. Arborem si quis frequenter collucet, fecundiorē reddi, quare tonderi, resecariq; præcipiunt, alioqui si arborefcere patiatur aliquis, in corpulentiam alimentum omne sumptitabit. Plinius ex eo: Nux auellana fruticosi generis, quinimo melior est, & copiosior fructu in plures dispersa ramos. Abellini populi ita colunt: singulis annis ablaqueant, ager bis aratur, optant Iunio aquas pluuias: tunc enim repleri nuces dicunt. Si defierint, semiplenas & paruas procreabit, neglecta com meat in fruticem.

10 Apud nos non inseruntur, & cū sæpius inseruissem rarò comprehendit, *Institio.* ferunt tamen persicum emplastrari, & inseri posse filo trunco in eam, immo fructus producere, qui amygdalam intus dulcem habeant, nec ingeniosius, quàm hac arbore fructus posse duplicari.

Columella nucem auellanam tarentinam fieri posse docet, si ferulæ *Ars.* mēdulla seratur, quemadmodum diximus in amygdala.

Cato nuces prænestinas recentes in vrceo in terra obrutas condere docet. *Cōditura.* Palladius mense Iulio circa nonas auellanam maturam esse in locis calidis, ait. Abellini populi arenis obrutas, vel sub terra coopertis locis vsq; ad Aprilē virides asseruant, inde tunc eximi oportet, nam cælo incalescente cōtinuo pululant. Iunio fumo suspendunt in cratibus, vt assiccentur, vel furno, vt breuius assequantur. Sunt qui nucleos nudent, ac filo traiciant globulorum precariorum more, ac suspendunt locis siccis. Maturitatis signa, cum sponte è calyculaceis suis tegumentis exiliunt.

Hastilibus præcipua est, vnde columna hastilia F. Pompeio sunt, quæ ex *Materia.* corylo facta erant. Materies fragilis: ob id Ouidius,

*Et coryli fragiles.*

Plinius. Erat corylus olim facibus familiarissima. Cædua est, sed tardius nascitur, terræq; defixa vix tolerat, non modo humorem. Apud nos circuli fiunt ex ea ad vasa vinaria constringenda, & ex eius virgis bimis vel trimis carbones ad pyrium puluerem conficiendum aptissimi.

30 *De pistaceis. C A P. XXXVI.*

**I**N nucum genere etiam pistacea nota esse Plinius dixit, quæ prodesse aduersus serpentum traduntur morsus, & potu, & cibo. Vitellius in Italiam primus intulit, eodem tempore, simulq; in Hispaniam Flaccus Pompeius eques Romanus, qui cum eo militauerat.

Theophrasto *πρίστυδος* dicitur, vt paulo post in eius descriptione dicemus. *Nomen.* Nicander Colophonius, authore Athenæo, pittacia vocat, & phistacia. Possidonius Stoicus bistacia: Fratres Georgici bistacia. Damageron *ψιτάνια*. Dioscorides *πικάνια*. Latini pistacia vocant. Neapolitani *pistacchi*. Siculi *festuchi*.

40 Theophrastus ita suam terebinthum Indicam describit. Ferunt Indiam terebinthum habere, vel, vt alii, arborem similem terebintho, foliis, ramis, & reliquis omnibus, fructu tamen diuerso, amygdalarum similitudine, nam &



in Bactris terebinthum hanc esse, ferreque; nuces amygdalarum magnitudines non magnas, sed visu similes, suauitate verò amygdalis præstantiores, & ideo incolas eis potius vti. Plinius ex eo. Est & terebintho similis cæteræ, pomo amygdalis, minore tantum magnitudine, præcipuæ suauitatis. In Bactris utique hanc aliqui terebinthum esse proprii generis potius, quàm similem ei putauerunt. Possidonius Stoicus ex Athenæo ait, Arabia, & Syria affert pistaciū vocatum. Fructus racematim coheret vñ modo, longus, cortice albo, & lachrymis simillimus. Et Fratres, qui Georgica conscripserunt, inquirunt: Terebinthum pistacia Syri vocant. Nos hanc Indicam terebinthum Theophrasti, pistaciorum arborem esse haud temere affirmamus, cùm vtraque; similis, & resinifera sit. Præterea super terebinthum insita, utpote in proprium genus mirè coalescit, & fructificat, nec pistaciorū aliter Theophrastus meminit, cùm suo tempore nondū in Græciam essent allata. Nos ad horum maiorem declarationem pistacii arborem conscribemus. Planta tota est terebintho similis. Folio maiore, quàm lentisci, ita in ordinem vtrinque; disposito, distantioribus frondium intervallis, subrufo. Arbor omnino nuda præterquàm ramorum cacuminibus: nam supra comatur densiore folio. Nuces racematim pendent ex ramorum extremitatibus, facie vnguentariæ glandi simili, internus nucleus cuticula tegitur rufa, medullæ sapor pineæ nucis proximus, sed odoratior, ut terebinthi.

Genera.

Palladius duo genera dicit, masculinam, & feminam: masculinam cui sub cortice velut ossei longi videntur latere testiculi. 20

Cælum.

Theophrastus terebinthum Indiam ferre, & Bactrum. Dioscorides pistacia Syriæ esse. Galenus Alexandria magnæ nasci pistacia scripsit, verum in Beroea Syriæ municipio copiosissime. Damageron querere locum soli expositum dicit. Plinius in Syria nasci. Palladius loco calido, & sole gaudere. Sicilia pistaciiis scatet.

Solum.

Palladius humectum solum, & rigationem desiderare ait.

Satio.

Pistacia Damageron feri ait Aprilibus calendis, sexum vtrumque; matrimonio coniungendo, eo ordine tamen, ut mas deorsum in Fauonium spectet: ita connexa largiorem, ut asserit, fructum dabunt. Diophanes nucem integram, 30 suisque; putaminibus illam terræ dabat. Pistacia, Palladius inquit, feruntur autumnino, & mense Octobri. Qui diligentius facere volet, pertusos calyculos, & stercoreata terra repletos parabit, & in his pistacea terna constituet, ut ex omnibus germen quaecumque; procedat, quod ubi conualuerit, planta hinc facilius transferetur mense Februario. Nos Neapoli Aprili seruimus in calyculis, Maio prosiluerunt, foliis sui generis, & caducis, tardeque; crescebant. Si viuiradices plantare necesse fuerit, Paxamus docet, scrobes locis apricis, & iugiter insolaris elaboratos excavari, & viuiradices vegetas recentes vna colligatas infuso stercore luna secunda demergi, iisque; plantulis ab imo solo ad ramos usque; vinculo constrictis, terra in gyrum accumulata scrobiculos implere, dareque 40 operam, ut rigatione, potuque; latientur, ab octauo die rursum vinculis ut committe-



mitterentur, coirentq; comprimere. Sed vbi caudices trimatum agerent, ablaqueatione facta, effossisq; scrobibus, firmum inspargere, & impulso altius trunco aggere terræ munire, arbor enim in vastam crescens proceritatem, hoc munere firmitus hærens, impetu ruentis ventis non deturbabitur.

Damageron Aprilibus calendis inserit in sui generis arbores, & terebinthum, utq; idem arbitratur, in amygdalum. Didymus in suis Georgicis pistacium in amygdalum inseri dicit. Palladius, inseritur terebintho mense Februario, & Martio, at alii amygdalo inseri posse firmarunt. Ad Palsiphilum,

*Quin & amygdaleos subeunt pistacea ramos,*

*Et debitum maius de breuitate petunt.*

*Hac & cognato cingens terebinthus amictu,*

*Nutrit adoptiuus nobilitanda comis.*

### De castaneis. C A P. XXXVII.

**V**LTIMA omnium accedit castanea, etiam nucum generi connumeranda, duro enim regitur corio, quod proicitur, intus verò quod esui est.

Virgilius nuces vocat,

*Castaneasq; nuces, mea quas Amaryllis amabat.*

Heracion Ephesius etiam nuces vocat, Athenæo authore, sic Mnasticeus nuces & castaneas. Nicander, & Theophrastus etiam nuces vocant: quamquam Dioscorides iuglandium, & gladium generi accommodatius tribui existimet. Sic Plinius ab eis, cæteri q; Etiam Diui Tiberii nominum impositione, qui glandes nominare fecit. Torrere has in cibis gratius. Moluntur etiam, & præstant ieiunio fœminarum quandam imaginem panis.

Græcis καστανον dicitur: à Castana Magnesiæ oppido, vnde primum aduecta est, nominatam esse constat. Theophrasto κάρυον εὐβοϊκόν. Nicander ait in Georgicis suis, referente Athenæo, Euboicos nucem castaneam vocare: Agelochum amoras appellare. Dioscoridi σαρδιανὰ βάλανοι, & διὸς βάλανοι, & λόπμα dicuntur. Plinius reddit rationem, cur Græci Sardianos balanos appellent, quia Sardibus ea prouenire primum. Iouis glandes, quia glandibus præstant, adeo ut Ioue dignam existimarent. λόπμα à cortice, quæ Græcè λέπις nominatur. Diphilus etiam castaneas sardicas glandes nominat ex Athenæo. Vocatur etiam & nux Heracleotica, ut Macrobius ex Oppii auctoritate testatur. Heracleotica nux, quam quidam castaneam nominant. Democritus διὸς βάλανον ait castaneam designare. Apuleius castaneas eodem nomine vocat. Sic etiam Damageron. Latinis castanea dicitur. Italis castagna.

Theophrastus quorundam opinione castaneam florere existimat, alii minime, sed villum proportionem grossis præciduis respondere. Germinat ineunte vere, seriusque, Virgiliarum obitu fructificat. Amentum profert, id ante germinationem verni temporis initio gignitur, fit veluti foliorum conceptus, dehiscit postea, & squammata illa flauescunt, & in longitudinem vel tripolli-



carem increfcunt, cū vere folium exit, ifta decidunt. Fructus glandeus in calyce echinato, fimilis glandi, fagi dulcedine, & fucco, fed illi levis, & placida, non hifpida vt caftaneæ. Plinius ab eo. Armarum iis echinato calyce vallum, quod inchoatum glandibus. Mirumque, viliffima eſſe, quæ tanta occultauert cura naturæ. Trini quibusdam partus ex vno calyce, cortexq; lentus: proxima verò corpori membraua, & in his ſaporem, ni detrahatur, infeſtat. Germinat vere cœpturo. Virgilius hifuras vocat,

*Sunt & iuniperi, & caſtanea hifura.*

*Genera.*

Plinius plura eius genera deſcribit. Tarentinæ faciles, nec operoſo ſunt cibo, planæ figura. Hæ Neapoli *caſtagnepiatte* dicuntur à figura. Facillimè purgantur membrana, imò corio inharrent. Plinius. Rotundior, quæ balanitis, purgabilis maxime, & ſponte proſiliens. Neapolitani vulgò vocant *caſtagne palombelle*. Glandis figura ſunt, acuminatæ, dentibus frangendo proſilit albus fructus, & ob id expetuntur, corio flauelcenti. De Salariana, quæ pura, & plana eſt. Multa ſunt apud nos genera, quæ his accommodari poſſunt, prima præcox eſt, quæ Auguſto maturatur, figura eſt plana, ac facile decoratur. Laudatior Corelliana. Adhuc antiquum retinet nomen, nam vulgò *Cordeglia* dicitur, quòd cordis ſpecimen gerat, cū ignoret Corellium, à quo nomen acceperit. Materana vulgò *marroni* dicuntur, corrupto à materana vocabulo. Hæ maximo eſt apud nos pretio, quia magnitudine ferè malum æquat. Cortex ex flauo rubelcit. Hanc Campania laudat, & ſerior eſt. Triangulas, & populares ſylvæ affatim producunt, ſcrupuloſa corticis intra nucleos quoq; ruminatione, quæ ſuum pabulo gignuntur, minore corporis tuberculo.

*Celum.*

Quia caſtanea è ſylueſtrium genere eſt, etſi cultu vibana, non ob id ſylueſtrem habitum exuit. Theophraſtus, montibus exultat, ait, quia frigoris auida, atq; adeo montibus gaudet, vt in plana non deſcendat. Septentrionalium locorum incola, vt in Thimolo, Olympioq; Myſio, in Eubœa, & circa Magnetiæ Euboicæ. Ab eo Plinius: Montes, & valles diligit caſtanea. Damage-ron frigidis latari ait. Columella: Opaco, & ſeptentrionali cliuo læratur. Plinius iterum ab eo: Gaudet opaco, ſeptentrionalibus, & præ frigido ſitu, vel etiam decliui. Palladius: Diligit cœli ſtatum frigidum, ſed & tepidum non recuſat, ſi humor aſſenſerit. Delectatur cliuis, & opacis regionibus, ac maxime in Septentrionem verſis. Apulia caſtanetis caret, quia calida regio, & plana eſt: ob id etiam puto iuxta Romam ipſam caſtaneas agrè prouenire, vt refert Plinius. Sic apud Allobroges caſtaneæ multæ, generolæq;: Pariſius ager non niſi paucas, & degeneres habet.

*Solum.*

Apuleius caſtaneas in locis aſſiduam pluuiam excipientibus deponi monet. Damage-ron in arenola terra. Plinius: patria laudatiſſimis Tarentum, & in Campania Neapolis. Columella, Pullam terram, & reſolutam deſiderat, ſabulonem humidum, vel reſractum tophum non reſpuit. Spiſſum ſolum, & rubricolum reformidat. Plinius ab eo, Quærit ſolum facile, nec non arenolum,



sum, maximeque sabulum humidum, aut carbunculum, vel tophi etiam farinam. Recusat eadem gallicam, rubricam, cretam, omnemque terræ fecunditatem, qua feri nuces diximus. Palladius: Amat solum molle, & solutum, non tamen arenosum. In sabulone proueniunt, sed humecto. Nigra terra illis apta est, & carbunculus, & tophus diligenter infractus. In spisso agro, & rubrica vix prouenit. In argilla, & glarea non potest nasci.

- Damageron semine plantari docet, verum fructu, amygdalo, & nuce longe secus, sursum mucronem habente. Decembri mense castaneā plantari posse docet Cassianus. Columella de eius ex semine satione hæc habet: Castaneę in repastinato nux posita celeriter emicat. Seritur ab Nouembri mēse per totam hyemem sicca terra, & repastinata, in altitudinē dupondii & semissis. Nuces in ordinem semipedalibus, ordines autem quinum pedū spatiis dirimuntur. In altitudinem dodrantis castanea depressis sulcis cōmittitur, qui vbi nucibus sunt confiti, prius quā cōplanentur, breues arundines ab latere castanearum panguntur, vt per hos sationis indices tutius fodi, & runcari possint. Simulatque semina stillauerint, & iā bima transferri queunt, interualluntur, ac bini pedes arbusculis vacui relinquuntur, ne densitas plantas emaciet. Spissius autem semen propter varios casus deponitur, nam interdum priusquam enascantur, aut siccitatibus nux inarescit, aut aquarum abundantia putrescit, & interdum subterraneis animalibus, sicuti muribus & talpis infestatur, propter quę sæpe mouella castaneta caluescūt. Plinius ab eo: Non nisi ex maximis prouenit, nec nisi quinis acruatim satis. Perfringi solum debet supra ex Nouembri mense in Februarium: quæ solutæ, sponte cadunt ex arbore, atque subnascuntur. Interualla sint pedalia vndique sulco dodrā tali. Ex hoc seminario transferuntur in aliud, bipedali interuallo, plus biennio. Palladius à Columella: Serenda est ergo ipsis castaneis, hoc est seminibus suis mense Nouembri, & Decembri, item Febuario. Eligendæ sunt castaneę ad ponendum recētes, grandes, maturæ, quas si Nouembri mense seramus, facilem se præsentia fructus ipsius præstat. Si verò Febuario ponamus, vt vsque; tunc durent, ita faciendum est. In vmbra castaneæ siccantur expansę. Tunc in angustum. & siccum locum translata cumulum faciant, & eas omnes fluuialis arena diligenter operiat. Post dies triginta eas, remota arena, in aquam frigidam mittis. Quæ sanæ sunt, merguntur, supernatat quæcunque vexata est. Item quas probasti, similiter obues, & post triginta dies æque probas. Hoc cum tercio feceris, vsque; ad veris initium serere debebis, quæ manserint illibatæ. Aliqui in vasculis seruant arena pariter missa. Pastinari ergo locus debet, qui huic destinatur arbusto, altitudine pedis vnus semis, vel duorum: vel totus, aut sulcis in ordinem destinatis, aut certe aratris resolui hinc inde findentibus. Qui fimo satiarus aut redactus in puluerem castanearum semen accipiat, non amplius pedis dodrante demersum. Vnicuique semini propter notam surculus debet affigi. Ipsa semina singulis locis simul terna, vel quina ponantur, & inter se quatuor pedum spa-



rio separentur. Quibus transferre placuerit, bimas plantas transferre debent. Locus tamen deductoria liquoris accipiat, ne humor insidens limo, germen extinguat. Seritur & plantis, sed quæ radicibus exempta, & deposita est, biennio reformidat: (dicit Columella) ob id commodius nucibus, quàm viuiradicibus syluas institui cōpertum est. Plinius ex eo: Translata nescit hospirari, pauetq; nouitatē, biennio ferè postea profilit, ideo nucibus potius, quàm viuiradicibus plantaria cædua impleantur. Tempus ferendi à Calendis Martii ad idus eiusdem. Palladius. Quibus transferre placuerit, bimas plantas transferre debebunt. Seritur & plantis quæ sponte nascuntur, sed quæ plantis seritur ita ægra est, ut biennio de eius vita sæpe dubitetur. Columella propagare docet: Vbi frequentāda sunt, melius ex vicino, si competit (mergi mote) pertica declinata propagatur, quàm exempta reseritur. Hæc enim velut immota sua sede vehementer germinat. Plinius: Sunt & propagines nulli quidem faciliores, nudata enim radice tota in sulco prosternitur, tunc ex cacumine super terram relicto renascitur & alia ab radice. Palladius ex his: Cui placet, potest castaneæ ducere in propaginem ima virgulta, quæ in radice nascuntur. Damage-ron viuiradice feri docet, qui modus longè tutior est, & bima fructum reddit. Pangitur etiam a uulsione, & stolone ab æquinoctio. Quintilii castaneam à palo, siue talea in frigidioribus, vel humidioribus locis plantant.

*Institio.*

Diophanes ait, Aprili mense inferi incipit castanea. Recipit morum. Inferitur in nucem, quercum, & fagum. Plinius suomet surculo insitam longe meliorem fructum reddere scripsit. Corellius eques Romanus Ateste genitus inseruit castaneam suomet ipsam surculo in Neapolitano agro: sic facta est castanea, quæ ab eo nomen accepit inter laudatas. Postea hæres eiusdem libertus Corellianam iterum inseruit: hæc est inter eas differentia, illa copiosior, hæc Corelliana melior. Palladius. Inferitur in se, & in salice, sed ex salice tardius maturat, & fit asperior in sapore. Inferitur, ut ipse probauit, sub cortice mense Martio, vel Aprili, tamen genere utroque responderet. Potest & inoculari. Ad Palsiphilum,

*Flumineam salicem fecundant ardua membra*

*Castanea, & multipasta liquore vigent.*

Nos Martii fine inserimus fillo ligno, sed melius inter lignum, & corticem, aliquanto verò serius emplastramus, & ad modum digitalis, & optimè comprehendit.

*Cultus.*

Columella. Cultus eiusdem est fossionis, positionisq;, qui vineæ. Supputari debet bima, quin etiam trima, nam bis ferro repetenda est veris principio, ut inciterur eius proceritas. Plinius: Cultura non alia quàm supra dictis fodiendis, supputandisq; per biennium sequens: de cætero ipsa se colit, umbra stolones superuacuos enecante. Palladius: Nouum castanetum circumfodi debet assiduè, mense Martio, & Septembri, incrementum maius acquirit, si putationibus adiuvetur.

Palladius



Palladius ita condit: Castaneæ seruantur, vel in cratibus dispositæ, vel in- *Cōditura*  
tra sabulonem, ne inuicem tangantur inuersæ, vel in vasculis fictilibus nouis  
conditæ, & loco sicciore defossæ, vel inclusæ virgeis ex fago receptaculis, &  
lutatæ vt spiracula non relinquant, vel ordeï paleis minutissimis obrutæ, vel  
palustri vlua figuratis densioribus sportis reclusæ.

Castaneæ deinde, priusquam cineribus credantur, ferro, vel dentibus vul-  
nctari debent, vt plagæ hiatu spiritus igne citatus euadat, alioqui flagrantes  
flamma magno cum crepitu profiliunt, assidentium periculo: flatus enim in  
angustiis elusus à noxa vindicabit, impetu in sibilum eunte.

# IOAN. BAPTISTAE

## PORTÆ NEAPOLITANI

### VILLÆ

#### LIBER SEXTVS

##### SIVE

#### OLIUE TV M.

#### PRO O E M I V M.



OMARIVM meum clausum iam, firmoq; munimen-  
to vallatum putaram, & in vineam progredi accinge-  
bar, sed memini de olea me dicturum, ob id lectores ne  
tædeat proximum montem subire, vbi oliuetum con-  
stitutum. Decreueram enim prius oleam ipsam apud  
bacciferas arbores in pomario locare, sed delicia, & di-  
uitiæ huius plantæ, & accurata, diligensq; eam serendi  
ars, quæ amplam, exactioremq; commentationem

exposcebant, me ab instituto proposito auerterunt, vnde hic proprius erit o-  
leæ locus: hoc libro eius historiam pressius, quàm quisquam author designa-  
uerit, cōplecti decreuimus. M. Cato oleto quartum locum dedit. Varro sui ru-  
stici operis principio Mineruā deprecatur, cuius procuratio oleti est. Scirpium  
nobilissima, & mortaliū sorti utilissima, vt qua animalium princeps homo ferè  
viçtum trahat. Virgilius ob suas dotes viti præposuit: quod si vitæ dignitate su-  
perabit, quæ ex nascētibus planta erit, quæ ei conferri possit? Fenestella tradit  
(Plinio referēte) omnino non fuisse in Italia, Hispania, atq; Africa, Tarquinio



Prisco regnante, ab annis populi Romani 183. quæ nunc peruenit trans Alpes quoq; & in Gallias, Hispaniasq; medias, vrbis quidem anno quingentesimo quinto Appio Claudio Cæcinepote, L. Iunio cos. olei libræ duodenæ assibus veniere. Et mox anno sexcentesimo octogesimo M. Seius T. F. ædilis curulis olei denas libras singulis assibus præstitit populo Romano per totum annum. Minus ea miretur, qui sciat post annos 22 Cn. Pompei IIII consularu oleum prouinciis Italiam misisse.

*Quòd olea Minerva dicata sit. C A P. I.*

**M**INERVÆ oleam sacram dicunt tum Græci, tum Latini scriptores omnes, quòd illius inuētrix fuerit, aliasq; multas ob rationes. Virgilius, 10

— *Oleaq; Minerva*

*Inuentrix.*

Plinius etiam scripsit: Olea Minervæ dicata seruat. Primo quod olea virginea manu sata, & exulta, vberiores præbeat fructus: puritatis siquidem amantissima, labisq; nescia, ob id virgini Minervæ dicata. Addit Florentinus Græcus; quòd quum pura sit olea, pueros etiam esse vult suos collectores, & iurare, quòd à sola propria vxore veniant, & non ab alieno cubili, & sic insequenti tempore plurimum fructum exhibebit. Ferunt etiam in Anazarbo Ciliciæ pueros castos oleam colere, & propterea oleam apud ipsos fertilissimam & fructuosissimam esse. A quo Palladius: Græci iubent oliuam, cum 20 plantatur & legitur, à mundis pueris, atque virginibus operandum, credo recordati arbori huic esse præfulem castitatem. Martianus Capella oleam Minervæ sacram dicit, quod artes & disciplinæ, quarum illa dea est, oleo lucernarum lucubrationibus perdiscantur, inquit libro sexto,

*Hinc iam vernicoma frondent tibi munera oliuæ,*

*Artes cura vigil per te quòd discat oliuo.*

Demosthenes demonstrare quærens, quòd sobrius multas noctes vigiliis absumpsisset, & lumen, & oleum multum triuisset, dixit, plus olei, quàm vini absumpsisse. Phurnutus olei munus Minervæ esse dixit, quòd semper in virore sit, & glaucum colorem præ se ferat, & adulterari alio liquore nequeat: sed 30 semper in sua sinceritate permaneat. Sed de olearum origine ita Græci scriptores fabulantur. Cùm à primordio tellus aquis emerisset, primum Athenis emicuisse dicunt: cùmq; Minerva & Neptunus amore loci capti, de ciuitatis sibi nomine dicando contenderent (vt Cicero pro L. Flacco dixerit, de quorum vrbis positione propter pulchritudinem inter deos certamen proditum est) Iuppiter eorum controuersiam dirimere cupiens, tulit sententiam, Eum oppidi principatu potiturum, qui hoc meliori possessione donaret: Neptunus itaq; portu, & naualibus exornat, Minerva in Acropoli cum lætam, & virentem, cum fructiferam oliuam edidit: cuius ramum in coronam cōtorquens capiti suo imposuit, omniumq; calculo vicit, & ciuitatem suo nomi- 40



ne nuncupauit: nam Minerva & *Θέω* dicitur: victus itaq; Neptunus ad consueta munia secessit. Higinius verò ait, inter deos decertatum fuisse, qui primus in Attica terra oppidum conderet, & secundum Mineruam à Ioue, quòd in ea oleam seuisset, iudicatum. Alii verò inquirunt, Post deorum longam dimicationem, etiam vsq; ad succumbentis vindictam, placitum est, vt eius nomine ciuitas appellaretur, qui munus mortalibus melius protulisset: sic Neptunus percussio littore effecit vt tellus equum, animal bellis aptum proferret: Minerva autem iacta hasta oleam procreauit, quæ res melior comprobata, quòd pacis insigne foret. Sunt qui dicant Neptunum arcem percussisse tridente, & inde aquarum saluos haustus prosiluisse, vt inde fons in arce fuerit, qui Neptunius diceretur, & Mineruam oleam euocasse hasta, quæ omnibus vtilior visa est, atque ita vt ei Athenæ cederent arbitratum. Alii dicunt: post longam altercationem in id conuentum fuisse, vt ambo simul Athenis præessent. De hac contentione Statius,

*Ipsa quoque in pugnos vacuatur collis, ubi ingens  
Lis superum, dubiis donec noua surgeret arbor  
Rupibus, & longa refugum mare frangeret umbra.*

Et Virgilius Georgicorum primo,

*— Tuq; o cui prima frementem  
Fudit equum magno tellus percussa tridenti.*

Plinius ad sua vsq; tempora oleam durare tradit in certamine editam à Minerva. Sed hæc fabulam M. Varro ad veritatem ita traducit. Edificatis autem Athenis, & ibi imperante Cecrope: in arce sponte nata olea, & ibidem alio loco aquarum scaturigo: his prodigiis perterritus Rex, formidans ne hæc portentosa futurarum calamitatum prælagia forent, Apollinem Delphicum sciscitatum misit, qui respondit, ostentum illud nihil mali portendere, sed deorum contetione binorum de vrbis nominis impositione decertantium, per oleam Mineruam, & per vndam Neptunum significari, liberumq; esse Atheniensibus ex vtrius dei appellatione ciuitatem denominare. Cecrops mares, & fœminas ad conferenda suffragia conuocat; mares pro Neptuno, mulieres pro Minerva sententiam tulere, & quia fœminæ numero plures, vt ferè semper vique, pro Minerva vicerunt: indignatus Neptunus Atheniensium terram inundauit: quare vt supplicio mulierum vacarent, Athenas quidem vocarunt, sed edixerunt ne nascentium vllus materno nomine censeretur, & demum ne mulieres suffragia ferrent. Sed Plutarchus in Themistoclis vita ait ex re ipsa fabulæ locum fuisse, etenim cum reges Atheniensium (vt ferunt) studerent efficere, vt ciues omissa nauigatione arbores consererent, & fertiliorum eorum regionem redderent oleis, quarum ager Atticus apprimè ferax esset, atq; ex earum fructu non minimum questum facerent, sermonem illum vulgatum, quòd Neptuno de regione contendente, Pallas oliuam iudicibus obtulerit, ac vicerit. Vel Athenienses primos fuisse, qui hæc plantam & nouissent, & studio co-



luisent. Theophrastus refert Athenis oleam antiquissimam fuisse. Sed de oleæ inuentione alii alia tradunt. Quippe Diodorus Mercurium inuentorem, non Mineruam fuisse, huicque olei educendi, exprimendique inuentum tribuit: nam ante Mineruam, hæc cum cæteris syluestribus immista, ignotaque erat, vilisque habebatur. Et Cicero libro de natura Deorum, Aristeum Apollinis filium oleæ inuentorem fuisse scribit. Tacitus refert Latonam partu grauidam apud Cenchrum amnem, prope Ortygiam, oleæ adnixam Apollinem & Dianam enixam. Sed hæc poetarum figmenta sunt, qui sub fabularum inuolucris vim & plantæ naturam demonstrarunt, secus autem nostra fides sentit: Immensus enim omnium creator Deus iussit, vt terra plantas omnes produceret, quæ nulla penitus intercedente materia, quod est supra hominis caput, plantas, stirpesque omnes produxit: solius Dei honos & gloria est.

*Quanto honore habiti fuerint, qui in ludis, solemnitatibus, & victoriis corona oleaginea coronarentur.*

C A P. II.

**E**X prædicta Palladis victoria super Athenarum vrbis nominis impositione, tanti Athenienses oleam fecere, vt in eorum victoriis, solemnitatibus, ludisque oleaginea corona donum & gestamen fuerit, & victoriæ signum apud eos esse cœperit, vt ex Halicarnasseo habetur. Scribit in artibus Dionysius, in oleæ laudibus illud meritò recenseri, non modò, quòd illa sit Palladi sacra, sed quòd veteribus ex ea cõstituebantur trophæa, quodque sit victoriæ symbolum: nam & Neptuno superato, hac primum dea est coronata. Cassianus Græcus ab hac victoria scribit non solum certaminum victores, sed inspectores etiam, & arbitros ex oleastro apud Athenienses coronari. Ex Plinio quoque habetur Athenis victores olea coronari. Seneca oleam gentilem Atheniensium frondem vocat in Hercule furente,

*Teramus olea fronde gentili tegat Theseu.*

Et Athenienses patriam coronam vocarunt. Græcos Achilli, & Aiaci ob hostium victoriam prædamque coronam ex olea donasse memorat Dictys Cretensis. Et in bello, quod Græci cum Xerxe gesserunt, Themistocli & Euribiadi eandem coronam sunt largiti. Idem Dionysius Halicarnasseus ait, Romanos idibus quintilibus, quæ dies cladis Latinorum fuit, Castori, & Polluci sacra facere, & milites, quibus equi è publico donati sunt, tributim curiatimque, ac cateruatim olea coronatos incedere, ac si è pugna, & victoria redirent, ab æde Martis vsque ad eorum ædes progrediendo. Plinius ad id: Oleæ honorem Romana maiestas magnum præbuit, turmas equitum idibus Iuliis coronando, item minoribus triumphis ouantes. Qui etiam pro republica aliquod egregium facinus peregissent, eadem oleaginea corona donabantur. Thralibulus occupato loco, cui Phila nomen, & quum triginta Atheniensium tyrannos sustulisset, & ciuitatem in pristinam libertatem



tatem vindicasset, prædicta corona insigniri requisivit. Hac enim donare bonos ciues Athenienses consueuisse Valerius Maximus est author, quæ ex duobus ramulis complicabatur, eaque Periclis caput incinctum fuisse. Pannathena, quæ Athenis magna sacra dicebantur, singulis annis celebrari solita, quæ Theseus in Mineræ honorem primus instituit. Erant solum pueri cæritatores, quorum victoris præmium corona oleagina fuit, & oleum, quod ex sacra olea pressum erat. Instar huiusmodi ludorum Æneas ludos curules fecit, in quibus victores oleaginea corona coronabantur. Virgilius,

*Tres præmia primi*

*Accipient, flammæque caput nectentur olivæ.*

*Quod olea venia, & pacis index sit. CAP. III.*

**O**LEAM Græci ἔλαιον vocant ab ἔλεος, id est misericordia, est enim supplicantium, & pacis symbolum, ut qui has petant, oleam manibus gestent. Athenienses contra Timocratem sordidati, & oliuam gestantes supplicare soliti fuerat, ut narrat Demosthenes. Artaxerxi, ut author est Siculus in vita Philippi, Sidonem obsidenti, quingenti ptimores ciuitatis oleæ ramos gestantes obuiam fiunt, pacem petentes. Deuicti item Carthaginenses, consulente Annibale, ad Scipionem ad deprecandam pacem & misericordiam decem e ciuitatis principibus seligunt, quos nauis oleæ ramis velata deferebat. Romani quum bellum cum Perseo Macedonia Rege gererent, Alexandrini legati sordidati, barba, & capillo promissis, & oleæ ramos ferentes, in Romanam curiam progressi ad miserationem procubuerunt, Liuius scribente. Eodemque Rege deuicto, Rhodiorum oratores, habita prius oratione, veniam deprecantes, & ramos oleæ gestantes, vniuersi prociderunt. Et apud Apuleium mulieres propter homicidium viduæ, iudicibus sui commiserationem mouere cupientes, ramos oleaginos ferunt. Æneas ad commiserationem implorandam ob tempestatem, Æneidos quinto,

*Ipse caput tonsæ foliis eninctus olivæ,*

*Stans procul in prora pateram tenet, extaq; salfos*

*Porricit in fluctus, ac vina liquentia fundit.*

Et libro septimo.

*Centum oratores angusta ad mœnia regis*

*Ire iubet, ramis velatos Palladis omnes:*

*Donaq; ferre viro, pacemq; exposcere Tencris.*

Sed lugentes non coronatos, sed manibus tantum ferre decet.

*Paciferaq; manu ramum prætendit olivæ.*

Et Stadius Thebaidos duodecimo,

*Vittata laurus, & supplicis arbor olivæ.*

Ovidius Metam. sexto,



*Circuit extremas oleis pacalibus oras.*

Et columba post commune omnium animantium naufragium à Noa ex Arca tertid emissâ, rostro oliuæ ramum pertulit, generi videlicet humano à Deo summo pacem redditam significare volens. Immod cum nos meliorem aliquem significare volumus, oleæ ei ramum porrigimus: quod etiam expressit Virgilianus Æneas,

*Optime Graiugenûm, cui me fortuna precari,  
Et vitta comptas voluit prætendere ramos.*

*De Olea laudibus, & quanta antiquitus habita sit veneratione. CAP. IIII.*

**T**ANTA erat apud Athenienses olea dignitate, vt si quis aliquam oleæ plâtam vel subriperet, vel discinderet, in iudicium vocaretur, ac pro sacrilego condemnaretur. Erantq; magistratus deputati pro huius oleæ cultura. Et quum Lacedæmones ad Atheniensium expugnationem venissent, eorumq; regionem ferro, & igne deuastassent, oleas solum non attigerunt, tum plantæ veneratione, tum pænæ timore: Nam Athenienses & hostes, & amicos diris blasphemiiis persequabantur, qui oleam violarent. In profanis vsibus, auctore Plinio, oleam pollui fas non erat, vt ne propiciandis quidem numinibus accendi ex ea altaria, aræve deberent. Plutarchus in Solonis vita narrat, quod Athenienses cum ciuitatem sollicitam haberent ostentis, & piacula appeterent, ad expiandam eam Epimenides Phæstius ex Creta Athenas venit accersitus, cumq; se Athenas contulisset, in multis Soloni adiutor fuit, ad legum condendarum rationem, & quod maximum fuit, placationibus, expiationibusque ad mysteria, & religionem urbem instituens, iustitiæ obnoxiam, & ad concordiam proniorem reddidit. Magna is igitur admiratione habitus, opes multas, & honores largientibus Atheniensibus, non aliud, quàm ex sacra olea ramos poscens, atque accipiens decessit. Erat & Athenis celebritas, quam *εισιονισμός* vocabant, à Theseo instituta, qui è Creta Athenas incolumis reuersus, supplicationem Apollini Delphico pro facili reditu peregit, erectionem offerens. Erat enim ramus è sacra olea, alba lana implexus, *ειων* Græcis dicta, in quo plurimarum arborum fructus, quos acrodrya vocabant, circūpendebant. A Theseo post Athenienses annuatim Apollini votum persoluerunt, hunc enim ramum puer in Apollinis foribus affigebat, singuli verò post ante ædium ianuas, eademque die, vt meminit Plutarchus in Theseo, *εισπορεία* celebrabantur, ac si ramalia dicas à ramis ferendis: *ὄρεος* enim ramus est. Sophocles in OEdipo Coloneo in Atticæ terræ encomio, sacras ibi oleas fuisse dicit, quarum Iuppiter cognomento Morios custos erat. Hæc olea morias dicta erat à cede Halirrhothii Neptuni filii, qui cum eam in odium Palladis victoriæ excidere tentasset, sibi met securim cum aberrasset impegit, vt inde occumberet, vt à casu hoc olea



Ilex nomen desumpserit. Tantaque est huius plantę pulchritudo, vt princeps poetarũ Homerus, cũ egregiam aliquam speciem iuuenum describere quærir, olea comparer, quæ humilitatia, cœliclementia, ac ventorum benignitate nitida vigoreque plena è solo surgat. Euphorbus cũ à Menelao cadere-  
tur, comparat eum casum olea, quæ ventorum videturbata humi procum-  
bat: vbi verò iuuenum formam non memorat, eos quercui, vel pinui assimilat. Et in sacra pagina vbi necesse est perfectæ alicuius speciei meminisse, olea commemoratur: Quali oliua speciosa in campis: cũ virginalis pudoris, & pu-  
ritatis specimen quoddam præ se ferat.

De olea necessitate, & utilitate. CAP. V.

**O**LEARVM vsus tantus, & tam multis in rebus varius est, vt multiplices eius vtilitates arduum sit enarrare, sed paucas, vel nonnullas in medium afferre non inconcinnum est visum. Ad rei medicæ necessitatem nulla res ea maior inueniri poterit. Plinius inquit: liquores duo sunt humanis corporibus gratissimi, intus vini, foris olei, amborum è genere ambo præcipui, sed olei necessarius. Olei liquor recreans membra est, cuius etiam potestas repe-  
facere, & contra algores munire. Veteri oleo vsus est ad quædam genera mor-  
borum. Existimatur & ebori vindicando à carie vrile esse. Certè simulachrum Saturni Romæ intus oleo repletum est. Interrogatus Democritus, qua ra-  
tione homines inoffensa valetudine degerent, atque animi illum vigorem cu-  
stodirent, respondisse fertur, si corporis externa oleo, interna melle linirentur. Celebris etiam Pollionis Romuli exemplo: centesimum annum exce-  
dentem eum diuus Augustus hospes interrogauit, quam ratione maxime vigorem illum animi, corporisq; custodisset. At ille respondit, intus mulso, fo-  
ris oleo. Diuus Ambrosius in Hexamero prodit ægrotantem ceruum sanum fieri mansis olea ramusculis, & locustas ab ægritudine liberari, arrosis olea foliis. Illud non omitam perquam vrile, vt qui ferrum remollire cupiant, o-  
leo tangant, qui obdurescere, in aquam ignitum mergant. Contra vespas re-  
medio est oleo aspergier ore. Pix oleo extrahitur, quando vtrunque pinguis  
naturæ est. Thracius lapis aqua accenditur, oleo restinguitur. Oleo quidem  
non apestantum, sed omnia insecta exanimantur, præcipuè si capite vncto in  
sole ponantur. Ad venenorum haustus oleo succurritur ad vomitiones cien-  
das, ne lædantur præcordia. Vrinantes oleum ore sub aquis spargunt, & cla-  
rius omnia patescunt. Ad victum necessarius est olei vsus. Diuinus psaltes  
ait: à fructu frumenti, vini, & olei multiplicati sunt. Memorabile est, quod Pli-  
nius scribit, Alpibus coercitas, & tam inexuperabili munimento Gallias, hanc  
primum habuisse causam superfundendi se Italiæ, quod Elico ex Heluctiis ci-  
uis earum, fabrilem ob artem Romæ commoratus, ficum siccam, & vuam, o-  
leique, ac vini præmissa remeans secum tulisset. Oleum suo lumine tene-  
bras discutit, ac noctem in diem vertit. Nec prætereundum, quod eius vsus ex-



gi deos, eorumque sacrificia frequentissimus sit. Sed ne illoris manibus ab ea discedamus, scriptum reperimus, quod luctaturi oleo perungebantur: cuius vnctionis & ludorum olympicorum inuentor Hercules extitit, vt ex Lucano habetur,

*Ille Cleonei proiecit terga leonis,*

*Anteus Libyci perfudit membra liquore*

*Hospes olympiaca seruat more palastra.*

Et Philostratus in Palestræ icone, oleagineum ramum in Palestræ Mercurii filia luctæ inuentricis nudo sinu locauit. Vngebantur luctaturi tum vt eius vnguinis lubricitate difficilior foret mutua brachiorum connexio, tum quod validiores euadebant. Author est Polybius, victoriæ causam, qua potitus est Annibal in Italia contra Tiberium, fuisse milites prius oleo perunctos. Propterea Anacharsis Scythæ oleum infantiæ pharmacum esse dicebat, quoniam eo peruncti athletæ feruentius inuicem insultarent. M. Varro dicit, Olea corpus non solum intus vngit, sed etiam extrinsecus, itaq; dominum & ad balneas & ad gymnasium sequitur. A quo Plinius, Vsum eius ad luxuriâ vertere Græci, vitiorum omnium genitores, in gymnasiis publicando. Notum est, magistratus honoris eius octogenis sestertiis strigmenta olei vendidisse. Porphyrius Essæos è ludæorum genere vngi oleo non pati scripsit, quod si quis oleo tactus fuisset, tanquam à magna corporis macula, diligenter abstergebatur, quod eos corpore aridos, & duros, non molles esse oporteret. Odores oleo optimè seruantur, ex Plinio habemus, quod diuturnitati eorum tâto vtilius est, quanto pinguius: & ipsa vngueta vetustate meliora. Mirumq; dulcem succum bibere, & alieno infici sapore, etiam si oleum absq; odore sit, vt ideo vngueta, ad quæ frequens vsus, nullo modo inficiat; quod testatur Lucretius.

— Cum primis querere par est,

*Quod licet & potis es reperire, inoleis oliis*

*Naturam, nullam qua mittat naribus auram,*

*Quam minimè ut possit mistos in corpore odores,*

*Concoctosq;, suo contactos perdere viro.*

Oliua hyeme secundis mensis libenter vescimur, & sua amaritudine, & salis potum sapidiorem efficit, condit dapes, suauiore efficit cibum, vbi imponitur. Diogenes cum vidisset iuuenem in diuersorio oleas esitantes, inquit, Sic prandisses, non ita cœnares. Idem etiam cum Platonem in lautissimo conuiuio degustantes oleas intuitus esset, illum percunctatus est, quam obrem in Siciliam huiusmodi mensarum gratia profectus, appositis modo non frueretur? Cui ille, At Hercules ô Diogenes, illic & oleis & reliquis huiusmodi pluribus volvebar. Cur igitur, respondit ille, Syracusas adhauigare te oportuit? An Attica tunc oleam non ferebat? Quibus verbis Platonis nauigationem subarguere videbatur. Tanta longæuarior arbor est vitæ, vt propè immortalis videatur. Multiplici modo seritur, citò comprehendit, & fructificat maxima vbertate.

Et



Et quia frondosa, æternaque puber coma, solet hyeme à ventis agitati, & sæpissimè deturbari, & ne tam utili bono priuaremur, effecit Dei benignitas, vt detruncatis brachijs, & denuo effosso, scrobe lata, comprehendat, & citò etiam fructificet, vt quæ tam humanæ vitæ vsui inserviat. Facile colitur, nec neglecta deperit, vt Columella inquit. Longè ex omnibus stirpibus minorè impensam desiderat olea, quæ prima omnium arborum est: nam quamuis nō continuatis annis, sed ferè altero quoq; fructum afferat, eximia tamè eius ratio est, quòd leui cultu sustinetur, & cum se non induit, vix vllam impensam poscit, & si quam recipit, subinde fructus multiplicat, neglecta compluribus annis, nō vt vinea deficit, eoq; ipso tempore aliquid etiam interim patrifamilias præstat, & cum adhibita cultura est, vno anno emendatur. Florentinus ait, quòd non solum securos, & firmos redditus habet ex olea prouentus, sed & maximū bonum est, & ad omne vtile. Id præterea præcipuum, & consideratione dignū habet, quòd non sicut ficus fructus deprædantur eo tempore, quo maturantur, nā ab omnibus colliguntur ficus, nec ferè alio tunc rustici cibo victitant, quod de oleis non euenit, cum ab omnibus sua amaritudine tunc respuantur, & non nisi ad oleum, vel ad condituram expectantur. Præterea M. Varro apes ex olea arbore ceram conficere dixit, etsi Plinius scripserit oliuæ florem ab apibus nō attingi, ideoq; hanc arborem procul esse melius fore. Sed idem in arbutum non sperni dixit, si non sit vmbrosa ramis. Plinius spōtè nasci in mariuinis Syriæ dixit, quod elæomeli vocāt. Manat ex arboribus pingue, crassius melle, resina tenuius, sapore dulci. A scriptoribus etiā accepimus, Galliæ locis quibusdā ex vulgari olea emanare manna verè melleū, sapore, colore, & incorruptū durare. Manat è renellis ramis, & stipitibus, & rimosis corticibus, vel etiam scapello incisus, oliua nigricante, vel purpurascente, Nouembri mense, ingruente hyemis sæuitia. sectis etiam maioribus truncis initio melle liquidior glutinosus latex emanabat, postea frigore densior euadebat non tam mel, quàm manna præseferens.

*De olea prodigijs. — CAP. VI.*

**E**X Theophrasto multa, quæ de oleæ prodigijs dicuntur, afferemus, inquit enim, Olea aliquādo visa est de lapsis folijs vberes fruct⁹ protulisse. Quod & Thessalo Pisistrati filio accidisse proditum est. Folium enim imbecillius est, & frigoris violentiæ magis obnoxium, ideo abit: sed fructus non nisi maturus cadit, ante id tempus in permanendo pertinax est, ob id perticis decutiunt. Videntur quidem hæc naturæ leges exire, non tamen pro monstris accipienda. Sic recisa oleæ ligna, obiecta & reposita terræ, foris omni destituta, spōtè pululasse. Sunt enim hæc natura viuacia, propensaq; ad germinandum, suæ densitatis, humiditatisque causa, quæ cum extrinsecus liquoris aliquid senserint, quàm primum germina edunt. Simile in statuis ligneis, cum sudant. Ratio: Quoties adblanditur eis austrina tempestas tepore suo, suaq; humiditate: haud tamen omnia, sed quibus modo pinguis succus inest; hæc inter o-



stenta relata habent: Sic etiam olea penitus aliquando adusta, regetminauerat tota. Bætiæ verò germinibus omnibus à locustis derosis iterum germinauit. Sæpè etiam pars arboris comprehensa ab altera proxima est, atque in eiusdem corporis coagmentata magnitudinem: & si lapidem, aut aliquid simile arboris alæ inculcaueris, demum in sinuabitur, atq; occultabitur amplexu auctoris obductæ, quod etiã in oleastro, qui Megaris in foro stabat, euenisse accepimus, quo succiso urbem capi, ac dirimi oraculum erat, sicuti actum est: in hoc enim percisso, reperræ ocreæ sunt, & alia quædam Attici ritus, parte qua primum affixa fuere, ad ramorum ambitum concauata. A Theophrasto Plinius: Inter arborum vitia est & prodigiis locus. Inuenimus oleas folia amississe baccis hærentibus. Sunt & miracula fortuita: oliua in totum ambusta reuixit, & in Bætiæ erolæ à locustis ficus, iterum germinauere. Prodigio autem fiunt graui ostento: cum in deteriora mutantur, vt olea in oleastrum. Et Laodiceæ Xerxis aduentu platanus in oleam. Super omnia, quæ vnquam audita sunt, erat prodigium in nostro æuo Neronis principis ruina factum in agro Marrucino, Vectii Marcelli è primis equestris ordinis, oliueto vniuerso viam publicam transgresso, aruisque inde è contrario in locum oliueti profectis. Herodotus author est, In arce Athenarum templum Erechtheo terrigenæ fuisse, & in eo oleam Mineruæ, & mare Neptuni, testimonium quòd de regione decertassent. Hæc cum in Athenarum à Medis facto incendio conflagrasset, eodem die duorum cubitorum altitudine repullulauit. Pausanias author est, Cum Xerxes Græciam inuasisset, milites oleam exusserunt, & altera ab incensiois die cum Athenienses ad rem diuinam missi templum ascendissent, fructificasse inuenerunt, edito à stipite virgulti instar. Illud quoque ex historia succurrit, Augusti temporibus è taberna meritoria trans Tyberim oleum terra erupisse, ac toto fluxisse die, nulla intermissione, quo significatam interpretantur Christi gratiam ingentes.

*De olea nomine. CAP. VII.*

**E**λαις & Ἀλιυαῖς Græca appellatio, Illain enim primum vocauit Mineruæ, quæ vt vidimus oleæ munere Atticam ditauit. Aliis ἐλαια. Latinis olea, & oliua. Caper Grammaticus oliuam arborem esse dicit, oleam verò fructum. Sed hæc differentia vana est apud classicios authores. Virgilius arborem oleam & oliuam vocauit Georgicorum secundo:

*Sed truncis olea, melius propagine vites.*

In Eclogis.

*Incumbens Damon tereti sic cæpit oliua:*

Ἐλαια fructus est, Latine olea, & oliua dicitur. Varro oleam conditiuam vocat, quæ ad condituram adseruatur. Columella, Sic curata oliua tertio die possis uti. Incipientes baccas nigrescere Græci drypetas, Latini drupas dicunt, authore Plinio. Sic olea liquor dicitur oleum, & oliuum, oleum ab olea, oliuum ab oliua. Virgilius Georgicorum secundo,

*Liquida*



— *Liquidi corrumpitur vsus oliui.*

*De olea descriptione: CAP. VIII.*

**E**T si notior sit, quàm vt debeat explicari, tamen è Theophrasto hinc inde distractam hìstortam colligemus, diuersis quippe capitibus eiusdem doctrinam distrahit, vt Absyrtus ille Medea non tam membratim fuerit conquirendus. Arbor est, caudice ab radice surgens ramoso, surculoso, non facile dissolubili, nodoso, & simplici, nisi quis multiplici caudice diffusam relinquat. Medulla in ea tam incerta spectatur, paruaque, vt sint, quibus non in medio ligno haberi, sed per totum lignum spargi videatur, vt nullus sit  
 10 certus medullæ locus, nec desunt, qui ea omnino carere existiment. Gongros à quibusdam vocatos habet, eoq; morbo plusquam cæteræ laborare videtur: premnum nonnulli appellant, alii crotonam, alii alio nomine vtuntur, quia contorta, & plantigera esse solet, sic etiam concauitate laborare videtur. Ex urbanis perpetuo viret. Frondibus angustis, quæ tam breui nituntur pediculo, vt quasi defixæ cohæreant. Illud sanè peculiare euenire videtur, quod frondium supinas partes vertit mox post æstiuum solstitium, eoq; argumento rusticici confectum solstitium intelligunt, cùm supina foliorum contra, quàm cæterarum, candicant magis, quàm prona, minusq; sunt læuia. Cuius causa est, quia eo tempore foliorum agitur profluuium, & cuncta affici necesse est, &  
 20 infirma, & quasi senio confecta exarescunt & decidunt, reliqua circumaguntur tantummodo. Omnibus igitur illud euenit magis, vel minus, sed conspectius in iis est, quia summo coloris discrimine pars prona discrepat cum supina: hæc enim viridis, illa aquosa. Flore pusillo quidem, sed foliato, vno folio conformato, sed ita implicato, vt plura videantur, vt flos lasinoes: conceptaculo auersa parte non indiget, sed postrema eius in angulos exeunt. Fructum in medio flos ambit, & tunc probè defloruisse præbet augurium, cùm cadiui, velut perforati spectantur, nam si exaruerint, aut madefacti cum fructu defluant, nullatenus perforantur. Fructificat annotinis surculis, tam cacumine, quàm lateribus, & quando cacumina ferunt, copię indicium esse dicitur. Conge-  
 30 stum vix modo fert fructum, vt Syriæ, aliisq; locis ob fertilitatem, feracitatemq; soli. Baccæ carnis callo & nucleo interiacentibus constant, & caro in nucleo est: tamen ligno natura operuit. Radice parua, & velut lacinia ex medio tendente firmatur, cæteris grandioribus & contortis, inæqualibus, nodosis, & villosis. Quod vsu venit, quia breues & tenues illas permultas atq; pmissuas fundunt, nam et si omnibus parua è grandibus exeat, tamen non omnibus eodem modo congestæ, frequentesq;, quod naturæ ipsius proprium est. Summo cespite hærent, non solum loci ratione, cùm recto tramite progredi nequeant, sed ipsius proprietate. Auctu difficilis: sed viuax postea, & diutissimè durat. Caudice & laterali germine, nepotumque procreatione, atque et-  
 40 iam stirpe incorrupta. Viuere ducentos annos tradit Theophrastus. Cum



myrto amore coniunctam esse, mutuoq; radicum coniugio, & amplexatione gaudere, Androtion refert, virgasq; myrteas per brachia oleæ subire, & versari, & fructum oleæ protectum dulciorem producere, oleamque ab cuiusvis alterius arboris vicinia remouendam. Sed Plinius, quæ ex Theophrasto accipit, habet. Oleæ folia non decidunt, angusta, & pediculo breui, superne candidiora, & minus leuia. Mirum id, quod oleis euenit: circumaguntur enim folia earum post solstitium, nec alio argumento certius intelligitur sydus confectum. Florentibus aliis germinant. Paulo serius solstitio florere incipiunt, concipiunt Vergiliarum exortu. Hoc sydus illarum est. Succus earum pinguis. Baccis intus lignum, extra caro, & caro adhæret ligno. Pediculis, & ramulis adhæret. Alternant fructus, quibus siccus lignum, vt olea, magis, quàm quibus carnosum. Radices inæquales, & ramosæ, per summa cespitum recto meatu incedentes. Familiare eis, quòd plurimum ventorum concipiant, propter densitatem ramorum, quibus amputatis leuatq; onere in sua scrobe reponuntur. Tardè crescit. Hesiodus negauit oleæ satorem fructum ex ea percipisse quenquam. Longa est vitæ. Durabant ad tempora vsque Plinii oliuæ in Liternino Africani prioris manu satæ. Et Argis olea etiam, ad quam Io in vaccam mutatam Argus alligauerit. Firmissimæ ad viuendum oleæ, vt quas durare annis 200 inter authores conueniat. Athenis quoque olea durare traditur in certamine ædita à Minerua. A Virgilio describitur pallido folio, trunco tereti, tarde crescenti, pingui, viuaci, & semper viridi,

*Lenta salix quantum pallenti cedit oliua.*

*Incumbens tereti Damon sic cæpit oliua.*

*Virgulta, & procul tarde crescentis oliua.*

*— Et pingui Pallas oliua.*

*Palladia gaudet sylua viuacis oliua.*

*Consequitur viride Mnestheus euinctus oliua.*

M. Varro ait, Admiranda discrimina naturalia sunt, quòd ex foliis propter eorum versuram, quod sit anni tempus, dici possit, vt olea, cuius folia cùm conuertant se, solstitium dicitur fuisse. Sed Aulus Gellius de eo item: vulgo & scriptum, & creditum est folia olearum arborum brumali, & solstitiali die conuerti, & quæ pars eorum fuerat inferior, atque occultior, eam suprafieri, atq; exponi ad oculos, & ad solem: quod nobis quoq; semel, & iterum experiri volentibus, ita esse propemodum visum est.

*De olearum generibus, & primo de oleastro. C A P. IX.*

**T**HEOPHRASTVS oleam primo in duo genera distinguit, in urbanam, & syluestrem. Dicemus primo de syluestri, postmodum de urbana. Prima oleastri apud Græcos origo sic ducta est, si Pausani credendum est, homini doctissimo quidem, sed alioquin iis in rebus superstitioso: Nam & clauam Herculis ex Hyperboreis reuersi ex oleastro volunt fuisse, prius ignoto  
Græci,



Græciâ, quæ terræ defixa sponte effloruit apud Træzenios, aut certè iuxta amnem Alpheum, in qua gente locus est versus mare oleastris frequēs: quemadmodum ab intorta specie olea celebratur cognominata Strepte, circa Epidaurum, adiecta ab eodem authore fabula, euenisse circumacta manu ab Hercule illac permeante. Ouidius aliam eius originem tradit: Appulus pastor saltantes nymphas irridēs, & rustica cōiuitia addens, in oleastrū commutatus est,

*Arbor enim est, succoq; licet cognoscere mores:*

*Quippe notam lingua baccis oleaster amaris*

*Exhibet, asperitas verborum cessit in illas.*

- 10 Celebrabantur apud Olympiā Græciæ urbem ludi, quorum victor olympices dicebatur, cuius præmium erat ex oleastro corona, quod primum Hercules, in cuius honorem inuenti, hanc arborem ex Hyperboreis attulerit, authore Pausania. Ante Olympiam templum fuit, & ante illud locus oleastris confitus, ex quibus victores contextis ramis coronabantur. Hoc genus oleæ, ex quo corona donabatur, elæa callistephanos vocabatur. Plutarchus in Catonis vita, ait ipsum M. Fauonii ædilitate spectaculum in theatro edidisse, in quo victoribus ex oleastro coronas, veluti in Olympicis proposuerit. Plinius, Græci Olympiæ oleastro coronant victores. Ex quo primus Hercules coronatus est, & nunc custoditur religiosè. Elephas chamæleonte deuorato con-
- 20 colorifronde, huic suo veneno occurrit oleastro.

Græcis cotinos dicitur. Gadir Hispaniæ ciuitas, aliquando Tarressum, & Nomen. Cotinusa ab oleastri vbertate, qui cotinos dicitur, dicta est, si Eustathio credimus. Et syluestris olea, si domesticæ inferatur, fiet, quæ vocetur cotinod s. Dicitur & agrielæa, id est, syluestris olea. Apud Lacedæmonas, authore Suida, agrippus dicitur. Deputato oleastro, quod inde gignitur phaunos vocatur. Streptos dictus oleaster, cui implicitæ fuerunt Hippolyti habenæ, currusque eius euersus. Latinis oleaster dicitur. Virg.

*Indicio est tractu surgens oleaster eodem.*

- Et oleastrum oppidi est nomen in Batica Hispaniæ, Ptolemæo authore.
- 30 Theophrastus ita describit. Oleaster satiuæ fœcundior est, quod ferè sylue- Descriptio. stres omnes habent, ceu cura fertilitatem minuente. Nascitur ex satiuæ nucleo. Sed mansuescere cura, vel sata surculis, vel translatione vix potest adduci, vt credat. Olea incuria fit oleaster, sed si ex oleastro olea fieret, pro ostento haberetur. Vita longior quàm olea: sed Olympiæ longissima. Plinius: Quadam æternitate consenscunt, proxima adoptioni virga cmissa, atq; ita alia arbore ex eadem iuuenescente, iterumq; & quoties opus sit, vt æuis eadem olimina constent. Nos autem ita describimus. Olæa distat ab hoc non nisi magnitudine, & habitiore corporatura: est enim ipse rigidiusculus, impexo atque horridiore aspectu, senicosus si in faxis nascatur, qui alioqui cum satiuâ idem
- 40 esset, perennis virotis, fructus numerosior, par myrto maiori, flosculi racemosi, candidi, odorati, & foliati.



sens.

Plinius oleastrum in montibus nasci tradidit.

insitio.

Africa quidem peculiare est oleastro inserere, inseritur autem calamo, &amp; inoculatione, eodem autore, &amp; cotinodis vocatur, ut diximus.

Materies.

Cariem, vetustatemq; non sentit.

Oleum.

Oleum ex oleastro tenue est, multoque amarius, quam oleum, tum ad medicamenta utile.

*De domesticarum olearum generibus. CAP. X.*

**V**RBANARVM Theophrastus plura genera esse inquit. Vetus Cato multorum generum meminit, eademq; ab eo M. Varro, Virgilius, Columella, Plinius, & Palladius mutuuntur. Sed Columella olearum, sicut vitium, plura genera esse inquit, sed in suam notitiam decem modo peruenisse, quæ in duo partiuntur, scilicet quæ ad escam, & quæ ad effusionem, ut de vitibus dicemus. Omnis olea maior ferè ad escam, minor verò oleo aptior: & ut à Catone incipiamus: Cato meminit conditiuæ oleæ. Sed ab eo M. Varro non conditiuam, sed conditaneam dicit. Sed Columella & Plinius huiusmodi non meminere. Ego potius olearum genus existimarem, quæ condiuntur, quam olearum speciem: nam idem M. Varro conditiua mala vocat struthia, cotonea, & reliqua: quæ apta condi, & asseruari, quemadmodum postremo quæ apta condi sunt, manifestabimus. Orchitis Cato meminit, & eiusdem ab eo M. Varro, & Virgilius Georg. secundo,

*Nec pingues unam in faciem nascuntur oliuæ,  
Orchites, & radii.*

Columella ait. Orchis melius ad escam, quam ad liquorem stringitur. Orchites Cato optimè condi dixit, vel virides in muria, vel in lentisco contusas. Et ab eo Plinius eadem refert. Et post pausiam colligi, non naturæ vitio, sed operæ, cui plurimum olei, & quia tenerrima amurca cogit decidere. Dicitur orchitis, ut Seruius inquit, ab obscæna & Græca etymologia, id est, à testiculo, qui orchis dicitur. Probus à magnitudine appellatas dicit, quòd testibus ferè pares sint, nam grandes sunt, ut à nonnullis archemoræ vocentur. Hæc ergo ipse existimarem cerro esse, quas Hispania nobis, vel Caieta mittit: sunt enim nucis iuglandis ferè magnitudine, testiculorum similitudine ouatæ, ad escam condiuntur, toto orbe insignes, ut Columella in sampsa, epityro, & nigra oliuæ conditur docet. Vocat & vetus Cato radium maiorem: eadem verba recenset ab eo M. Varro. Virgilius plures radios esse demonstrat suis versibus,

*Orchites, & radii.*

Columella enim radium ad escam idoneum magis, quam ut lique scat dicit. Plinius ab autumno post pauseam, & orchitem radium colligi tradit, quia tenerrima amurca cogit decidere. Columella: radius neq; specie, neq; oleo tam grata est, quam licinia, & pausia. Minorem radium in sampsa radiolum vocat,



ut videbimus. Seruius radium dici ait à longitudine, quod oblonga sint. Apud nos *per Zutelle* vulgò dicimus, quasi acutiunculas dicas, quod oblonga, & utrinque acutę sint. Columella regiam speciosissimam facit, & potius escæ, quàm oleo idoneam tradit: sed si licinianæ, pausię & orchiti comparaueris: neq; specie, neq; cibo est tam grata. Plinius ad hæc: Omnino in vita error est publicus, tumore oliuæ oleum crescere existimantium, præsertim cùm magnitudine copiam olei non constare, indicio sunt, quæ regia vocantur, ab aliis maiorinę, ab aliis phauliæ, grandissimę, alioquin minimo succo. Et in Ægypto carnosissimis olei exiguum: Decapoli verò Syriæ perquam parua, nec cappari maiores, **10** carne tamen cõmendantur. Theophrastus phaulias dicit, quibus caro multa, nucleus paruus, & parcissimè præstat oleum, & iis acerbum oleum fieri. Polluci phaulia est, quam hic collimidam, & trobellum vocat, & apud eundem Pherectrates trambellos in oleastro, insitas oleas vocabat. Nobis vulgò dicuntur, *olue rotonde*, quia rotunda specie sunt, magnæ, & pulcherrimæ, & ad escam conditis vtimur. Poseam oliuæ speciem Cato dicit, ita etiam Varro. Virgilius Georgicorum secundo non poseam, sed pauseam dicit,

*Orchites, & radii, & amara pausia bacca.*

Cato posias optimè condidixit, vel virides in muria, vel lentisco contusas, quæ eadem ab eo Plinius recenset. Columella: Ex iis pausiæ iucundissima bacca est, cuius oleum saporis egregii dum viride est, verustate corrumpitur, & optime vapores sustinet. Eam in Sampsæ nominat pauseam, & posiam, & in epityro, & in nigra olea conditura. Plinius ad hæc: Prima ab autumno colligitur pausia operæ vitio non naturæ, cui plurimum carnis. hanc etiam ocysimè occupatam, quia est tenerissima, amurea cogit decidere. Purpureæ sunt & in iis, ut vis in nigrum colorem transeuntibus, pausiæ. Probus possiam appellat, fortasse ex literarum cognatione: Seruius pausiam à puiendo, id est, tundendo, dictam autumat, aliter enim oleum ex se non facit. Alii à sapore nominatam dicunt, quòd fiat pausi, sunt enim eius bacca amarissimi succi, ob id incomedibiles. Ego ipse puto pauseam Apuliæ vulgo vocatam *pasola*, cuius cal- **30** lus immaturę virescit, maturæ ex purpureo puniceat, nudiore cuticula: orbicularis, communi maior, virescens amarissima, matura iucundissima, optima oleo, escæve. Sunt & oleæ, quæ ad effusionem. Cato Liciniam nominat, & ab eo Varro: sed Columella ait, optima oleo licinia, vel liciniana: & ubi de oleo conficiendo loquitur, maximè ad oleum licinianam peti post regiam, & si hæc desit, culminiam. Plinius etiam differri ad Martium mensem, quia callosæ, & contra humorem pugnaces, ob idq; minimæ, ut licinia, non ante fauonii flatum nigrescentes. In agro Venafrano, licinianum habetur oleum, vnde & liciniæ gloria præcipua oliuæ. Vnguenta hanc palmam dedere, accommodato ipsis odore. Dedit & palatum delicatiore sententia. De cætero baccas liciniæ **40** nulla avis appetit. Hodie vulgò *olue pollinole* dicuntur, quia parua, vel corrupto liciniæ vocabulo. Cato etiam culminianam nominat. M. Varro ab eo



culminiam dicit. Columella post liciniam & regiam ultimo loco culminiam baccā probat. Plinius cominias vocat, & vsq; ad Martium differri ait, quia callosa, & contra humorem pugnaces, ob idq; minimæ. Cato sergianam nominat, & ab eo Varro. Sed Plinius sergiam baccam à Sabinis regiam dici ait. Sed Cato & Varro, qui sergiam nominant, regiam non meminerunt. Sed Columella & sergiam, & regiam nominat, & plurimum olei afferre dixit, ac optimè frigus sustinere. Meminere etiam Cato, & Varro salentinæ, omissæ à Columella, & Plinio. Ego eam familiarem existimo Salentinorum regioni in hoc nostro regno, ubi ingentia oliueta sunt, & maxime fructu fera. Atq; etiam à regione Plinius picenas, & fidicinas in Italia. De picenis Martialis,

*Si mihi picena tardus polletet olina.*

Meminerunt iidem albiceræ, à Plinio & Columella prætermittæ: sed eius loco Columella algianam, nazuiam, circitem, & myrteam nominat, & nazuias conuiuiorum epulis præparari, ut in eius conditura dicemus. Plinius cotinas nominat, & in Maium mensem differri, quia callosa, & contra humorem pugnaces, non ante 6 idus Februarii nigrescentes. Suntq; & superba, & prædulces præter iam dicta genera, per se tamen siccata, vuisq; passis dulciores, admodum rara in Africa, & circa Emeritum Hispaniæ. Sunt & apud Pollucem olearum genera hæc, drypetes, halimades, neotrides, corinadas, trambelos vocauit Pheretrates. Est & proprii generis olea dicta callistephanos, de qua Aristoteles, huius folia contrario modo se habent, quàm in aliis, extra siquidem non intus albescent, ramos mittit, ut myrtus, ad coronas peraccommodos.

*De celo, & situ oleæ conuenienti.* CAP. XI.

**T**HEOPHRASTVS, ut ab eo initium sumamus, neq; frigidis, neq; calidis locis optimè oleam prouenire posse memoriæ scriptum reliquit, quod per summam terræ radice cohaereat, facile namq; gelu concrevit, frigiditas enim eximit humorem, & ad conuenientem cocturam perducere nequit. hinc olearum aliarum fructu nulla carne, sed oleo refertum profundunt, aliarum carnolum sine oleo præstant, nam plus caloris ad oleum concoquendum requiritur. Gelidioribus locis oleas succo carere (non sapore, ut perperam vertit Theodorus) tradidit libro de caulibus, cum succus ad conficiendam carnem intendatur, & calor deficiat, qui oleo conficiendo necessarius; quam obrem vere nullum sit oleum, quia calor exiguus: æstate non bonum, quia non regnavit satis: autumno fit, quia calor inualuit, & si in æstate vigor, in autumno diuturnitas: quam obrem oleum æstate fieri solet, neq; frigus oleosum succum coquere potest. Aquæ tam cælestes, quàm per rigua demissa pulpam augent. oleum nil se carni permisceat, sed per se manet. Sunt olearum ægyptiarum species, altera oleo faciundo inepra, altera vitilis, & pinguis. Cateri vero agricola variis olearum generibus varias cœli qualitates statuerunt. Cato: in calido agro conditiuâ olearum, radium maiorem, salentinam, orchitem, poseam, sergianam, colminiam, albicerem:



bicrem: Si ager frigidior, ibi oleam liciniam feri oportet, nam si in calido ferueris hostus nequam erit, & ferundo arbor peribit, & muscus rubet molestus erit. M. Varro eadem ab eo recenset, sed ipsius abstrusa vocabula interpreterarur: Air enim hostū vocari, quod ex vno facto olei reficitur, factum dici, quod vno tempore conficiunt, quem alii centum sexaginta aiunt esse modiorum, alii ita minus magnum, ut ad centū viginti descendat, & exinde, ut vasa olearia, quot, & quanta habeant, quibus conficiunt illud. Columella: Nulla ex iis generibus, aut perferuidum cœli statum patitur, aut gelidum, itaq; æstuosis locis septentrionali colle, frigidis meridiano gaudet, optimè vapores sustinet pausia, frigus sergia. Plinius, quod ab his habet, refert: Fabianus negat, puenit in frigidissimis oleam, neq; in calidissimis, & sine dubio in his solum maxime, cœlūq; refert. In Thessalia circa Larissam emissio lacu frigidior facta est regio, oleaq; defuerunt, quæ prius fuerat. In India sterilis, præterquam oleasti fructu. Principatum in hoc quoq; bono obtinuit Italia toto orbe, maximè agro Venafrano, eiusq; parte, quæ licinianum fundit oleum: reliquum certamen inter Istrie terram, & Baticæ par est. Vicina bonitas provinciis, excepto Africa frugifero solo. Reliquæ ex Catone refert. Horatius de venafrana olea.

*Pressa venafrana quod bacca vetustatoline.*

Herodotus, In Assyria in feruidis locis ficus, & olea nequaquam de principatu contendit, cæteris vsq; adeo ferax, ut ducenta reddat, & trecenta. M. Varro præfert, quæ in Agro Cassinate nascuntur. Virgilius idem,

*Atq; olea magnum vestire Taburnum.*

In Sabinis laudatissimæ. Batice Hispaniæ regio oleis fertilis. Silius

*Palladio Betis ornatus cornu a ramo.*

*Nulla palladia magis sese arbore tollit.*

Sed Florentinus sic loquitur. Calido, siccoq; cœli statu gaudet, ut in Libya, & Cilicia videre est. Sed de situ nunc videndum. Id peculiare in oleis adnotauit Theophrastus, quod trecentis à mari stadiis prouenire non posse videtur. Huc spectant locorum differentia ad arborum habitudines. Apud Tarentum oleis id accidit: silēs enim spiritus sensu perspicuus est, quippe pleraq; aduruntur, & cum flatus ex mari talis occurrerit, inuecta falsugine corrodit flores, ac populatur. Calgo quoq; sine vllō vento quædam egredi videtur, quæ ubi flores inuasit, exurit. Caro: ager olerō conferundo in faonium spectet ventum, & soli ostentus sit, alius bonus nullus erit. Columella, Sed neq; depressa loca, neq; ardua, magisq; modicos cliuos amat, quales in Italia Sabinorum, vel tota prouincia Batice videmus. Hanc arborem pleriq; existimant ultra miliarium sexagesimum à mari, aut non viuere, aut non esse feracem, sed in quibusdam locis rectè valet. Onidius de Sabinorum agro,

*Primus oliuiferis Romam deductus ab agris.*

Plinius, Negat Theophrastus nisi intra xl millia passuū à mari nasci. &



Caro ait: spectare olera in fauonium debent, loco solibus exposito. Palladius: Amat hæc arbor arduo locorum situr mediocriter ab humore suspendi, scalpi assidue, lataminis vbertate pinguescere, feracibus ventis clemēter agitari. Sed Florentinus accommodatē de situ loquitur: Auxiliantur ad aeris commoditatem terræ situs accliuui, & alti. In iis enim solis ardor ventorum proflatu refrigeratur, quare optimum exhibent oleum, planis verò, & campestribus locis oleæ minus impetu ventorum agitata, atq; insidentia sturambusta spissius oleum mittunt, siquidem cum omnes stirpes, tum oleæ maximē aduerso flatu roboratae vigent, argumento, quod oleas lauiore, & virentiores offendes locis, qui ventis patent, tristiores iis, qui a flatu silent, nec spiritus nouitate recreantur, modo id intercedat spatium, quo libere peruagetur aurē. Igitur accliuibus, & arduis locis oliuæ latentur, quod proprium nactæ ventum, nil præterspirant, sed in omnes partes æqualiter insinuans ventus arborē excitat & auget.

*De solo oleæ debito.* CAP. XII.

**N**ON minus in soli electione, quàm cœli, veteres agricolæ diligentes fuerunt. Theophrastus albicantem argillam oleis fertilem esse dicit, quæ multum vaporis, flatusque contineat, quod olearum natura desiderat. Exoptat præterea solidum, siccumque solum, quia oleæ alimentum siccus, calidumque querunt. Ad summum campestre solum oleis maximē conuenire statuit. Caro diuersis olearum generibus diuersas soli differentias distribuit. Crasso agro oleam conditiuam, radium maiorem, salentinam, orchitem, poseam, sergianam, coliminiam, albicerem, vel quam earum in his locis optimam dicunt esse, eam maximē serito, macriori oleam licinianam. M. Varro eadem ab eo refert. Vergilius secundo Georgicorum oleis his versibus solum statuit,

*Difficiles primum terra, collesq; maligni,  
Tenuis ubi argilla, & dumosis calculus aruis  
Palladia gaudet sylua viuacis oliuæ:  
Indicio est tractu surgens oleaster eodem  
Plurimus, & strati baccis syluestribus agri.*

Columella aptissimum genus terræ esse oleis dicit, cui glarea subest, si superposita creta sabulo admista est. Non minus probabile est solum, ubi pinguis sabulo est, sed & densior terra, si vuída est, & læta, commodē recipit hanc arborem. Creta ex toto repudianda est, magis etiam scaturiginosa, & in qua semper vligo consistit. Inimicus est ager sabulo macer, & nuda glarea. Nam si non emoritur in eiusmodi solo, nunquam tamen conualescit. Potest tamē in agro frumentario feri, vel ubi arbutus, aut illex steterat. Gaudet etiā collibus siccis, & argillofis, ac humidis campis & pinguibus lætas frondes sine fructu affert. Plinius omnia, quæ Carō habet, transfert. Præterea glareosum solum oleis aptissimum in Venafrano, pinguisimum in Batica. Palladius libro primo, Terra profunda (quod Græci allerunt) oleæ grandes arbores efficit, fructus



minores, & aquatos, ac seros, magisque amurcæ proximis. Aer oleas tepidus  
 iuuat, & ventus mediocris sine vi, & horrore perflabilis: cætera ex aliis habet.  
 Florentinus ad hæc: Porro solum vuidum, & latum commodè recipit hanc  
 arborem, vberioresque dat oliuas, quapropter id præferendum fuerit: secun-  
 dum sibi locum vendicat, cui argilla alba subest, terrium argilla dura. Profun-  
 dum, & rubricosum repudiatur, quòd suo æstu stirpes exurat: sed longè ma-  
 gis salebrosum, & scaturiginosum, in quo semper vligo consistit, damnatur,  
 quippe quòd strigosas, & minimè atiles baccas, vliginososq; part<sup>9</sup> creat, ieiun-  
 nior paulò terra, vt Attica testatur, ac commodatior. Apuleius, Oleas in aridio-  
 20 ribus locis vehementer vberes prouenite experimentum docuit. Apud nos a-  
 mœnissimi colles, & repidiores planities oliuetis virent: iuxta Casinarium ar-  
 ua adiunguntur Venafrana, montium intra partes oliuis conuestiuntur, gla-  
 reosa terra gaudentibus, & meridiano sole, quarum oleo ob purum succum  
 palmam vnguenta dedere. M. Varro connumeratis aliquot Italiæ locis, vbi  
 quædam ad victum humanum cæteris præstantiora nascuntur, ad oleum a-  
 grum Cassinatæ prætulit. De Venafro Horatius,

—— Viridique certat.

Bacca Venafro.

Et Martialis,

20 Hac tibi Campani sudauit bacca Venafræ.

Turditanum oleum bonitate præcipuum aliqui dixerunt. Ouidius de Pe-  
 pareto Metamorphoseos septimo,

Et Gyarus, nitidaq; ferax Peparetor oliua.

Samos etiam oliuetis fecunda: Sycion vrbs Achaia. Ouidius in Ibin.

Aut vt oliuifera quondam Sycione profecto.

De Mitisca Virgilius Italiæ vrbe, Æneidos septimo,

Ereti manus omnis, oliuiferaq; Mitisca.

De Eуроta Statius libro quarto, & duodecimo de Lycabeso.

—— Et oliuiferi Eurota

30 Dura manus.

—— Et pingui melior Lycabesos oliua.

Cassinæ ager apud nos olei, quàm frumenti feracior, magnumque vecti-  
 gal ex eo comparant agricolæ, & non procul ab eo montana Calatia, cuius col-  
 les olea distincta oleastris habet, quarum baccæ reliquarum dulcedine com-  
 mendantur. Surrentini colles lætis etiam oliuetis conuestiuntur, in maris pro-  
 spectu, quibus viuum saxum, lærumq; subest solum.

Quibus modis nascatur olea. & primum de semine.

C A P. XIII.

40 NOn parui momenti est hæc inter eas, quas primo explanauimus dotes,  
 quòd olea modis omnibus enascatur sola, quibus omnia terræ nascentia



serè generantur, nam ita facilius oliueta comparabimus, olearumque copiam nanciscemur, dempro modo vno, quem recenset Theophrastus libro de causis, scilicet, quòd luminis surculis prodire nequeat, cuius causam affert, quòd surculi, qui in summo nouelli nuper extant, inepti sint ad radicem conceptionem, ob eorum siccitatem, & tenuitatem, in ea enim tenuitate haud multo succo abundare possunt, qui germinationi fauet. Et si in historiis scribat, nonnunquam adminiculo ad hederam defixam vitam egisse communem, & arborem factam, id verò rarò accidit, sed id scribendum, quod maiori ex parte à natura factitatum videmus. Nec nobis rarò in vineis, summis oleæ surculis, virgisque pro palo depactis, & radicasse, & ad iustam magnitudinem deuenisse, vidisse contigit. Sed olea nascitur semine, ramo, taleis, trunco, ligno, radice, aliisque modis, quos recensebimus. Sed sationis per semen modus ab omnibus improbatur, tum quia seculorum turba indigemus, dum fructum afferat, tum quòd fructus deteriorescit. Theophrastus è nucleo oleæ syluestrem nasci ait, & ex olea oleastrum fieri posse, sed ex oleastro oleam raro euenire. M. Varro ait, Olea semen, cum sit nucleus, quòd ex eo tardius enascatur cutilis, quàm ex taleis, ideo potius in seminariis taleas, quàm nucleos serimus. Antonius Venutus non in prima satione nucleum deteriorescere scribit, sed sexta, vel septima, quod magis veritati consonum reor, sic à syluestri habitu in urbanum, non nisi æuis euenire. Si quis tamen semine serere velit, eligat oliuam magis oleosam, & optimè maturam, quam pulpa munder, ac liquidiorē stercore ammictam scrobiculis palmum profundis obuiat, & singulis hebdomadibus irriget, tertio deinde anno transferat, immo quo pluries transfertur, meliorescit, vbi optimè comprehenderit, inserat sub terra effosso scrobe, paulatim vbi crescit, terram aggerando.

*Olea plantatio per ingentes ramos. CAP. XIII.*

**E**X multiplici oleæ serendæ ratione, non in vltimis ponenda est ea, quæ per ingentes fit ramos. Theophrastus in historiis, & libro de causis scribit oleam ramis exurgere posse, cum oleæ rami prægrandes humore non vacent, scilicet pinguedinis, spissitatisque causa, vnde exiccati difficiles sunt. Intelligit Theophrastus pergrandiores, siue grossiores ramos oleæ brachia, quæ non in summo, sed quæ iuxta truncum sunt: sunt enim humor, pinguedo, & spissitas, præsentis vitæ sedes, & futuræ auspicia. Leontius Græcus huiusmodi sationis modum edocet. Nonnulli crassiores ramos ex arboribus adimunt, & ex iis partes præcidunt, quæ biniū cubitorum proceritatem impleant, dein in rectum constitutas adobruunt. Alii insignes ramos quinū, aut quaterinū cubitorum longitudine à caudicibus terra præcisos solo committunt, sed rubrica partes notant, quibus obuersa steterant, ut quemadmodum in scrobe coherrebant, ita parte ima terram, & cacumine cælum spectantes deponantur, ut celeriori proficiant incremento, celeremque fructum largiantur.



giantur. Hoc modo satum Moroni iuxta Capuam oliuetum vidimus. Erant enim rami prægrandes, ut utriusque manus indicibus, & pollicibus in orbem diductis vix cingeretur: erant scrobes trium pedum altitudinis, & latitudinis, in ima parte rami acuti, stercore vitulino obducti, intus infixi, terra cooperti, ac vectibus calcati, senis vel septenis pedibus supra terram exstantibus, suprema pars noniosior, ex qua sperabantur germina. Sunt qui infimam partem scindant, ac lapidem indant, & sic citius radices elicere dicunt. Superior casura fimo, lapide, vel aliquo munimine cooperitur, ne gelu, vel calor intus intrudatur, & exarescat ramus, sic tertio, vel quarto à satione anno fructus attulerunt.

*Quòd etiam ligno, vel stipite per longum discisso olea exurgere possit.*

CAP. XV.

Nunc etiam nascendi modum ferè prodigiosum oleæ proferemus, ad facilem huius plantæ propagationem demonstrandam, ut non solum ramis, & taleis, & trunco sine radicibus, sed ligno id est trunco in plures partes per longum discisso (quod nulli, nisi soli oleæ contingit) exurgere possit. In historiis Theophrastus ligno oleam nasci posse scripsit, et si inepta videatur ad germinationem substantia. In libro verò de causis rationem affert: Nam densitate sui corporis vitale illud, genitaleque semen, præcipuè non sine adminiculo naturalis humoris seruare diutius potest, at si densitas siccitati comes sit, sufficere nequit, & si vel vni stipites sint: Sectam nanque non solum depactam arundinem, sed etiam sectam partem prodire videmus, sicut & oleam. Ligna enim oleæ è truncis abscissa seruare suum vitale principium possunt, ut ad excitandum germen mouere se valeant. Modus autem est. Ligna oleæ palmo minora diuidi haudquaquam oportet, neque corticem detrahi. Nec minori admiratione dignum videtur, quod vna omnium germinat in opere, ut Theophrastus dicat: oleaginea materies tum rudis, tum sapè elaborata, si humorem nacta fuerit, locumque adipiscatur humectum, germen potissimum citabit, ita ut iam cardo valuæ, & poculum limo immersum prodantur regerminasse. Ob id Virgilius, qui omnia, quæ de plantarum generatione carminibus mandauit, ex Theophrasto excepit, id non prætermisit, inquit in Georgicis,

*Quin & caudicibus sectis (mirabile dictu)*

*Truditur è sicco radix oleagina ligno.*

Sed reor quòd per siccum lignum caudices intelligat in plures partes per longum discissos, ut ligna scindere solemus, quæ igni destinamus, non quòd verè siccu sit lignum, sed post longam moram humore ferè omni orbatum, siccum videatur. Didymus sationis modum demonstrat. Non desunt, qui secta ab imis radicibus ligna, quæ apud Syros gorphia appellantur, plantis depuant, postea quæ comprehendisse sic videbuntur, ut mutationi sit locus, transferunt.



Multi non in plantariis, sed propria terra deponentes ipsa, non aberrant. Le-  
 guntius etiam ad hæc. Non desunt, qui recisa ab imo caudice segmenta seu qui-  
 pedalia, ita ut nec corticem quidem aut ullam aliam partem, quam terra præci-  
 dit, lædant, in defossam scrobem lapide subiecto deponunt, & aggere sic ob-  
 ruunt ad palmi altitudinem. Memini me vidisse oliuetum deputantes, ramos,  
 truncos, & imos caudices igni destinatos securi scindentes in congeriem ac-  
 commodasse, ut cum occasio daretur, aliò transmitterent, ac per annum ibi  
 sterisse, caputque postea ex iis lignum vnum, & arenis in litore malleo va-  
 lidis ictibus infixum, cuius ope ergata nauigia ad siccum traherentur, post an-  
 num pullulasse, & ramos emisisse, ut quod de oleæ viuacitate nostri maiores  
 scripserint, procul dubio sit credendum.

*Quòd etiam trunco exurgat olea, & propagine. CAP. XVI.*

**T**RUNCUS etiam nasci posse oleam Theophrastus libro de historiis tradi-  
 dit. Leontius Græcus & credidit, & docuit, inquit. Quidam recisos  
 caudicibus maiores truncos, & relicto superius cortice, cacumine tenus ad ob-  
 ruunt, sic tamen, ut quatuor alte digitis supereminet. Caro quomodo olea  
 propagetur docet, ut cætera plantæ, Ab arbore abs terra pulli qui nascuntur,  
 eos in terram deprimito extollitoque primorem partem, ut radicem copiat, in-  
 de biennio post effodito, seritoque.

*Usitatus per sobolem oleæ ferendi modus. CAP. XVII.*

**Q**UOD sobole nascatur olea, reticuit Theophrastus, utpote triuialis, fre-  
 quens & usitatissimus modus, eos describens, qui mirabiliores, ac incre-  
 ditiores viderentur: non tacuit tamen oleam prolificam esse, & radice sum-  
 ma terræ hærentem, unde iuxta caudicem plurima proles exurgat. Virgilius  
 peculiarem credidit oleæ sationem per sobolem, vocans stipites illos rami  
 spoliatos truncos,

*Sed truncis olea melius propagine vites.*

Plantas enim, quibus cacumina, & germina præcisa sunt, truncos vocare  
 solemus, sic etiam Priami corpus capite mutilatum, truncum vocauit. Ab eo  
 etiam Columella truncos vocat, ubi libro de arboribus inquit: Melius autem  
 truncis, quam plantis oliuetum constituitur. Sed quinto libro ubi de plantarum  
 translatione è seminario in oliuetum loquitur, ait, Optimum est omni fron-  
 de priuare truncum, atque leuatis plagis, fimoque, & cinere oblitis in scrobem,  
 vel sulcum deponere. Truncus autem aptior translationi est, qui brachii cras-  
 situdinem habet. Poterit enim longè maioris incrementi, & robustioris trās-  
 ferri, quem ita cōuenit poni, ut si non periculum à pecore habeat, exiguus ad-  
 modum supra scrobem emineat, latius enim frondet. Si incursum pecoris vi-  
 tari non poterit, celsior truncus constituetur. Quod Leontius Græcus non o-  
 mitit. Alii sobolem cum radice ferunt. Alii residem adhuc caudici plantulam  
 decisis



decisis falce capitibus & brachiis, in truncum redigūt, & terræ fossæ circa Auri ortum defigunt. Palladius è sobole oliuetum constitui docet: Februario enim mense, temperatis locis, quæ in pastino ponuntur, radicata plantæ decisis capitibus, & brachiis, & in truncum redactæ, vsq; ad mensuram cubiti vnus, & palmi in fermento terræ fossæ defigūtur, locum palo antea deprimente, ordeï grana subteriaciantur, & amputetur iis quicquid putridi inuentū fuerit aut arentis, & tunc amputata capita luto velentur, & muscovlmeis vinculis, vel tenacibus quibuscunq; constricta. Sed maximū beneficium est, vt proficiant incremento, si rubrica partes notentur, quibus obuersæ steterunt, & contra eas simili ratione ponātur. Hic est v̄sitatissimus, & principalis apud nos oliueta constituendi modus, quippe antiquis arboribus adnatos stolones, qui trimi vel quadrimi sint, pauco negotio securi dissecamus, et si paucis, minimisque radicibus muniantur: sed eò meliores fuerint, quò longius à trunco orti sint, & pluribus radicibus fulti fuerint: hos scrobibus mandamus, vt septenis pedibus supra terram emineant, sic tertio, vel quarto anno fructum præbent, & si Hesiodus negauerit oleæ satorem fructum ex ea percepisse quenquam, tam tarda res tunc erat, nunc autem in plantariis serunt, translatarum altero anno decerpuntur baccæ. Sunt qui modum sationis per taleas huic præferant, cum hic expeditior, & paratior sit: nam si deputantur rami, & plantariis deponuntur, quinto anno transferuntur, & primo inde, vel secundo anno fructus proferunt, cum stolones, vt transplantationi apti sint, per decennium immorentur apud matricem, & quinto anno fructus proferāt, sed id falsum est. nam & si nulla cura, industriæve rami apud truncum, ita & stolones apud patetem crescunt, & secundo anno fructus proferunt apud nos. Præterea multum obesse arboribus dicunt, quibus detruncātur, cum vulgaris sit apud colonos sententia, nisi abradantur interficere parentem. Si verò dicent, hoc tēporis spatium, dum crescunt, fructum abbori adimere: respondemus eos eliciendos esse, qui ab arbore longiusculè absunt, semper supra terram adaggerando, vt suis radicibus impetratis parenti non officiant.

30 *Quomodo ex radicibus oculis exurgat olea.* CAP. XVIII.

**R**ANICE etiam nasci Theophrastus tradidit oleam. Sed Columella sationis modum docet: Quidam melius existimant ex radicibus oculis syluestrium olearum hortulos excolere, & chorda simili ratione disponere, sed utrunque debet post vernum æquinoctium feri. Palladius ab eo excipiens dicit. Scio plerosque, quod facilius, & vtilius est, radices olearum, quæ in syluis plerunque sunt, aut in locis desertis, in cubitalem mensuram recisas, aut in seminario, si placuerit, aut in oliueto solere disponere, & admistione stercore adiuuare. Quare proueniet, vt ex vnus arboris radicibus numerosa planta nascatur. Sed Plinius Columellæ placita confutat, & recitat verba Catonis, cum  
40 superius dixisset, vbi de olearum plantatione agit, gemma, vel oculo seruato,



ait ipse, oculos serito. Sed sæpius ego animi causa expertus sum, cum superuacuas radices à plantâ distruncis resecarem, eas in plures partes dissecui, & scrobibus disposui, vbi à state ingruente ex eis virgarum sylua pullularit. Sed ego non possum satis admirari doctissimum Columellam, expertissimumque agricolam præcepisse, dissecandas radices ex oleastris desumendas esse, cum plantæ, quæ ex iis nascuntur, & tardè crescant, & sylvestres proferant fructus. Sed si aliquis responderet fieri posse per infitionem, vt in vrbani habitum mutantur, magis veniret irridendus, cum multis annis id accideret, & contra Virgilium peccaret, qui sylvestres oleas inferi vetat, nam cum sæpè accidat comburi oliuetum, germina, quæ imò repullulant trunco, sylvestres iterum produciunt oleas, vbi si vrbanae radicibus plantatæ essent, idem restituerent oliuetum. Sed sunt, qui non integras radices, sed oculos quosdam, seu tumores dicas, vbi eleuata pars rûpere nititur ad termites procreandos, plantent, quos è veterum olearum radicibus euellunt, hos aliqui ouia, ab ouorum similitudine vocant, hæc dixerim Columellam, & Palladium per radices intellexisse, nam si eiusmodi oculos ex imò stipite, vel radicibus securi euellis, & scrobibus committis, non plus quatuor digitis altis, subtili supra iniecta terra, miraberis ex eis germina lata, & felices plantulas prouenire. Nec oculos illos eligas, qui turiones foras emittunt, nam trunco sublato, humoris egeni, vi caloris facile marcescunt, sed qui iam iam germina parituri sunt. Nec per timendum id arboribus obesse, ex quibus huiusmodi oua diuelluntur, si bina solum ex singulis arboribus demas, nam quodammodo arbores sollicitantur, & iuuenescunt. Possimus etiam sine veterum arborum noxa hisce oculis nostra oliueta multiplici sobole replere, inspicendo veteres arbores, quæ duplici, vel triplici stipite humo surgunt, duos abscindere, solum vnum relinquere, nam sequenti anno, qui reliquus est, obtruncati damna repender, nam & vberius fructus afferet, & lætius germina producet, vacuumq; locum replebit, & ex obtruncati radicibus, caudice & læuioribus brachiis, vbi nitidiores partes conspiciuntur taleas & oua secare. Hunc oleas ferendi modum sunt qui præferant taleis, primo quia & breuiori tempore radican-<sup>10</sup>tur, quàm taleæ, præterea quia è seminario in plantarium transferuntur, facili-<sup>20</sup>ori negotio effodiuntur, & facili-<sup>30</sup>or erit cum sua terra in suos scrobes translationis ratio: nam taleæ, cum profundius hæ-<sup>40</sup>reant, in earum effossione radicula non sine læsione transferuntur.

*De modo ferendi per taleas, & de seminario olearum faciendo.*

CAP. XIX.

**V**ERAM, & præcipuam olearum sationem Theophrastus per taleam statuit. Ait enim, Ex ramo præciso taleas deorsum versus sectura inuersa ferere oportet, nec palmo minora præcidere, corticemque minimè detrahere. Seruntur autem ex his rami, quibus germinantibus terra semper assidue



diu accumulanda, quoad satis roborentur. Cato inter Latinos ita primus  
 docuit, seminatiumque hoc modo instituit. Taleas oleaginas, quas in scrobe  
 saturus eris, tripedaneas excidito, diligenterque tractato, ne liber laboret, cum  
 dolabis, aut secabis: quas in seminario saturus eris, pedales facito, easque sic in-  
 ferito. Locus bipalio subactus fiet, beneque glutus fiet. Cum taleam demit-  
 tes, pede tantum opprimito, si parum descendit, malleolo, aut mateola adigi-  
 to, cauetoque ne librum scindas, cum adiges. Palo locum prius si feceris, quo  
 taleam dimittas, & si ita seueris, utilis fiet talea, meliusque viuet. Taleæ ubi tri-  
 mæ sunt, tū denique tibi curæ sint, ubi liber sese vertet. Si in scrobibus, aut sulcis  
 20 seres, ternas taleas ponito, easque diuaticato supra terrā, ne plus quatuor digitis  
 transuersis emineant, gemma, vel oculo seruato. Sed si voles olea cito crescat,  
 quā seueris, semel in mense sarrito, & circum capita oleagina usque donec trimæ  
 erunt fodere oportet. Plinius eisdem verbis eadem recitat, sed aliqua sunt ver-  
 ba in eius textu corrigenda. Nam Cato ait: gemma, vel oculo seruato. ipse ait,  
 oculos serito. Quod ibi tale præcipiendum non erat. M. Varro ad hæc. In  
 seminario quæ surculis confixa sunt, ut olea, & quorum erunt molliora na-  
 tura cacumina, ea summa integenda binis tabellis, dextra ac sinistra deligatis,  
 herbeque elidendæ, & dum teneræ sunt vellendæ, nam aridæ factæ rixan-  
 tur, & celerius rumpuntur, quàm sequuntur. Demum in oleagineis semini-  
 30 bus arbores videndum, ut sit de tenero ramo ex utraque parte æquabiliter præ-  
 citum, quas alii elauolas, alii taleas appellant, ac faciunt circiter pedales. Co-  
 lumella etsi verbosius, præcisius tamen docet: Primo seminarium instituito.  
 Libero cœlo præparetur, terreno modicè valido, sed succoso, neque denso, neque  
 soluto solo, potius tamē resolutio, id genus terræ, ferè nigre est, quā cum in tres  
 pedes pastinaueris, & alta fossa circum dederis, ne aditus pecori detur, fermentari  
 finito. Tum ramos nouellos nitidos, quos comprehensos manus possit  
 circumuenire, ex feracissimis arboribus adimito, & ex his taleas recidito, ne  
 corticem ladas, id cauebis si prius varam feceris, & partem eam, supra quam  
 ramum secaturus es, stramentis texeris, ut sine noxa corticis superpositæ ta-  
 30 leæ secentur. Taleæ deinde sesquipedales præcidantur, & utraque parte fal-  
 ce leuentur, & rubrica notentur, ut quemadmodum in arbore steterat ramus,  
 ita ima parte terram, & cacumine cœlum spectans deponatur: nam si inuersa  
 mergatur, & difficulter comprehendet, & si conualuerit sterilis erit. Sed ta-  
 learum capita & imas partes misto fimo cum cinere oblinire, & ita totas im-  
 mergere oportet, ut putris terra quatuor digitis altè superueniat. Sed binis in-  
 dicibus ex utraque parte humanantur: hoc facere utile est propter fossorum i-  
 gnorantiam, ut cum seminarium bidentibus colere institueris, taleæ non læ-  
 dantur. Id debet post vernum æquinoctium fieri, & frequentissimè semi-  
 narium primo anno sarriri, postero, & sequentibus, cum iam radiculæ se-  
 40 minum conualuerint, rastris excoli, biennio à putatione abstineri, tertio anno  
 singulis seminibus binos ramulos relinqui, quarto ex duobus ramis infirmior



amputandus, sic excultæ quinquennio arbusculæ habiles sunt translationi. Palladius eadem quæ Columella habet. Didymus autem suadet, ut oliuetis plantulæ serantur citra moram, quæ in seminariis contingit: quia verò è seminariis translate tutiorém habent generationem, etiam seminarii modum tradit. Solum in quo stirpes pangentur, qualitatem non modo, & figuram seminarii, sed & cœli quoque conditionem referre debet, ne quod in eo pangitur, noua loci peregrinatione tentetur, maxime quæ profecerint, si rubrica partes notentur, quibus obuersæ steterunt, ut simili ratione ponantur. Porro legi debent, qui seminario destinabuntur, non stolones caudicibus adnati, sed summatim decerpti rami, longitudine cubitali. Danda est opera ne cortex sectione violatus collidatur, sed falcula, quæ acie polleat, vulnus vndique laeuiget, seruata stirpis integritate: Stylus parte ima bubulo fimo cum cinere liniendus. Scrobes concamerato sinu, ut imbrium sint capaces, excauandi, ramulus non in verticem, hoc est inuersus, humanus, qui tamen palmo à terra extet, arundo affigenda, ut à cultoribus cognoscatur, singulis mensibus vsque ad septimū mensem moueatur. Extirpari debet arbuscula trimatu altulis, & vegeta, quadrima iā collucari debet, & superuacui termites putari, & sic transferantur in terram, quam plantare instituisti, sublata cum plantis terra propria, & hic præstantior est oleæ plantandi modus. Nos eodem die, quo plantare taleas destinamus, ab arbore recidimus, & in taleolas diuidimus, ne nimia supra terram morare resiccentur. Et si aliqua præpeditus occasione sator, quo reciderit die plantare non quiverit, melius inhumare, quàm sub dio resiccati finire compertum est. Id tamen admonendum, cum plantantur, si humiditatem terræ aliquam contraxerint, resiccantur, quod videtur Plinius adnotasse. Non inhumare taleas, aut siccare prius quàm serantur, vtilius compertum.

*De olearum plantatione. CAP. XX.*

**C**UM è seminario in locum, in quem oliuetum instituere cōstituisti, transferes plantulas, hæc obseruabis maiorum nostrorum præcepta. Et primò Theophrastus ait: Olea in consitione amputari desiderat, ut arbores omnes, quæ ampliorem magnitudinem capiunt, plagas alleuatas contegunt, ne intrudatur sol, aut imber, nam si id acciderit, contrahendi morbi periculum imminebit. Circumlinunt alii luto, alii subdita scilla lutum superimponunt, testam quæ superadiiciunt, scilla plantam viridem seruat, lutum scillam, testa lutum. Cato plantare ita docet: Oleas cum seres benè cum radicibus eximito, cum terra sua quam plurima, circumligato quæ; uti fertè possis, in alueo ferri iubeto. Caueto cum ventus, aut imber fiet, effodias, aut seras nam id maxime præcauendum est. In scrobe cum pones, summam terrā subdito, postea operito terram radicibus fini, deinde calcato pedibus benè, deinde fictucis, veticibus quæ quam optime poteris, id autem erit rei primum. Post hæc arbores crassiores digitis quinque quæ erunt, eas præcisas serito, oblinito quæ; fimo summas, & foliis.



& foliis alligato. Columella de eius consitione hæc habet. Scrobes quaternum pedum præparantur anno ante, vel si tempus non largitur, prius quam deponantur arbores, stramentis incendantur scrobes, ut eos ignis putres faciat, quos sol & pruina facere debuerat. Antequam explantes arbusculam, rubrica notato partem eius, quæ meridiem spectat, ut eodem modo, quo in seminario erat, deponatur. Deinde ut arbusculæ spatiū pedale in circuitu relinquatur, atq; ita cum suo cespite planta eruarur, qui cespes ne resoluatur in eximendo, modicos surculos virgarum inter se connexos facere oportet, eosq; pilæ, quæ eximitur, applicare, & viminibus ita innectere, ut constricta terra, velut inclusa teneatur, tum subruta parte ima, leuiter pilam commouere, & suppositis virgis alligare, atque plantam transferre. Antequam deponatur oportebit solum scrobis imum fodere bidentibus, & terram aratro subactam immittere, & ordeï semina substernere, & si constet in scrobibus aqua, ea omnis haurienda est, antequam demittantur arbores. Deinde ingerendi minuti lapides, vel glarea mista pingui solo, depositisq; seminibus latera scrobis circumcidenda, & aliquid stercoris interponendum. Quodd si cum ea terra planta non conuenit, tunc optimum est omni fronde priuare truncum, atq; leuatis plagis, fimoq; & cinere oblitis, in scrobem, vel sulcum deponere. In libro verò de arboribus inquit: Omnes arbusculas, prius quam transferantur, rubrica notare conuenit, ut cum serentur easdem cœli partes aspiciant, quas in seminario conspexerant, alioquin frigore, vel calore laborabunt ab iis partibus, quas præter consuetudinem sub alio tractu expositas habuerint. Arbusculam in scrobe deponere ita rectam oportet, ut quod à scrobe extiterit, in medium sit, arbusculam autem à tempestatibus tueri diligenter oportet adminiculando, & terræ quæ in scrobe reponitur stercora immiscendo. Plinio adjiciendum videtur, ut scrobes fiant ex arborum natura, ut alius demittantur ea, quæ summa tellure gaudent, ut olea. Didymus: Locus, quem oleis dicaueris, runcandus est, omniq; alterius generis frutice extirpandus, maceris, & viuis sepibus cingendus, ne aditus pecori detur. Scrobes ante sationem fodiendi, ut sole, ventis, & imbribus terra reddatur fragilior, stirpesq; iaciant vltro, circoq; radices. Vno, aut altero mense minimum aridis fruticibus, cremis, & iis, quæ ignem facile concipiunt stramentis, scrobes adurantur, qui tricubitali altitudine, aut minimum sesquicubitali cauentur. Id etiam omittendum non duxi, quod tantopere monent veteres agricolæ, & primò M. Varro, quod multum refert ad fundi fructus, quemadmodum vicinus in confinio constitutus agrum habeat: si enim ad limitem quercetum habet, non possis rectè secundum eam syluam serere oleam, quod vsque eo est contrarium natura, ut arbores non solum minus ferant; sed etiam fugiant, ut introsum in fundum se reclinent. Columella autem ait, quod olea seri potest, vbi arbutus, aut illex steterat: nam quercus excisa radices noxias oliueto relinquit, quarum virus enecat oleam. Plinius: Olea, vbi quercus effossa sit, male ponitur, quoniam ver-



mes, qui rauce vocantur, in radice quercus nascuntur, & transeunt. Et alibi Quercus, & olea tam pertinaci odio dissident, ut altera in alterius scrobe depa-  
 ctæ moriantur. Palladius verò in Februario. Poteest olea feri, ubi arbutus, aut i-  
 lex steterat, nam cerrus, & esculus excisas radices noxias relinquit, quarum vi-  
 rus oleam necat. Sed in Arcadia spectari solitam arborem Pausanias affirmat,  
 è cuius radice vna ilex, & olea nascerentur in quodam fano. Serendarum au-  
 tem arborum interuallum indicandum. Cato in viginti quinque, aut triginta,  
 pedes ferit. A quo Plinius: Oleam maximo interuallo, de qua Catonis Italica  
 sententia est, in viginti pedibus minimum, plurimum triginta. Sed hoc varia-  
 tur locorum natura. Non alia maior in Bética arbor. In Africa verò (fides pe-  
 nes authores erit) miliarias vocari multas narrant à pondere olei, quod fer-  
 rant annuo prouentu: Ideo 75. pedes Mago interuallo dedit vndiq; etiam in  
 macro solo, ac duro, & ventoso, cum minimum 45 Batica quidem vberri-  
 mas messes inter oleas metit. Columella verò: Spatium inter ordines mini-  
 mum esse debet pingui, & frumentario solo sexagenum pedum in alteram  
 partem, atq; in alteram quadragenum, macro, nec idoneo legetibus quidem,  
 & vicenum pedum. Libro verò de arboribus addit: Oleam decet inter sexage-  
 nos pedes disponi, ut spatium in latitudinem crescendo habeat, nam quæ in  
 proceritatem extenduntur, euanida fiunt, parumque fructus ferunt. Didy-  
 mus: Sed liberale quinquagenum cubitorum interuacer spatium, ut & cau-  
 dices per flatu venti fruantur, & intercedens locus feri possit, alioqui si semen-  
 tis subtus neglectui habeatur, tanto ramorum stipatu luxuriabunt, ut in sese  
 mutua umbrarum beneficia non conferant.

Nunc de tempore statuendum. Tempus autem plantationis Theophra-  
 stus vernum statuit, & præcipue oleas: nam quæ autumno feruntur, post sa-  
 tionem hyems secuta corticem detrahit. Cato sic tempus præfinit. Si quis  
 querat, quod tempus oleæ ferenda sit, Agro sicco per sementim, agro lato  
 per vet. M. Varro: inter vetnum æquinoctium, & Vergiliarum exortum ole-  
 am feri oportet. Dicit Columella, Plantæ oliueto dispenuntur optimè siccis,  
 minimeque vliginosis agris per autumnum, latis & humidis verno tempore  
 paulo antea, quam germinent. Libro de arboribus: Magoni autem placet, sic-  
 cis locis oliuam, aut mox post æquinoctium feri, aut ante brumam. Nostræ  
 ætatis agricolæ ferè vernum tempus circa calendas Martias seruant. Plinius:  
 Mago in colle, & siccis, & argilla inter autumnum, & brumam feri iussit, in  
 crasso, aut humido, aut subriguo à messe ad brumam, quod præcepisse eum  
 Africæ intelligitur. Italia quidem nunc vere maximè ferit, sed si & autumno  
 libeat, post æquinoctium 40 diebus ad Vergiliarum occasum 14 soli dies sunt,  
 quibus feri noceat. Sub Etesiarum flatum conferunt oleam in Laconia. Flo-  
 rentinus autem Græcus inquit, Seritur ab succularum occasu ad brumam, i-  
 tem vere, quando hæc duo tempora sese imitentur, calidam, humidamq; for-  
 tita naturam. Autumnus calorem adhuc retinet pristino solis illustratu, con-  
 ceptum



ceptum humorem à caducis eo etiam tempore imbris contrahit. Ver autem præcedentibus pluuiis humorem, ab accessu solis calorem concipit. Cassianus Theophrasti autoritate, Aprili mense oleam plantari posse scribit, sic etiam oleas in taleas sectas humidis, & riguis locis.

*De olearum cultu. . C A P. X X I.*

**I**A M olearum sationum rationem descripsimus, nunc autem præcepta trademus, quibus iam consitum, constitutumq; oliuetum colamus, etsi Plinius dicat, cæteri que, nec desiderare rastrum, aut falcem, vllamve curam. Ex primò de aratione loquemur, & maximi viri Catonis inter Latinos præferendam semper sententiam audiamus. Quid est agrum bene colere? Primum bene arare. Quid secundum? Arare. Quid tertium? Stercorare. Qui oliuetum sæpissimè, & altissimè miscebit, is tenuissimas radices exarabit, si male arabit, radices sursum abibunt, crassiores fient, & in radices vires oleæ abibunt. A quo eadem Plinius, pferat. Columella: Optimum est constitutum iam, & maturum oliuetum in duas partes dividere, quæ alternis annis fructu induantur, neq; enim olea continuo biennio vberat. Cùm subiectus ager consitus non est, arbor coliculum agit, cùm seminibus repletur, fructum affert, ita sic diuisum oliuetum omnibus annis æqualem redditum adfert, sed id minimè bis anno arari debet, & bidentibus alte circumfodi: nam post solstitium cùm terra æstibus hiat, curandum est, ne per rimas sol ad radices arborum penetrret. Palladius: Gaudet hæc arbor assidue scalpi. Omnis subinde circa eas herba velatur, & quoties imber se infuderit, breuissimis & frequentissimis fossionibus sollicitentur, & subinde ducta à trunco terra, atque permista in aliquanto altiores cumulos congeratur: idq; mense Februario.

Prodest etiam pulueratio. Cassianus iubet Augusto mense glebas dissolvere, quo pulvis excitetur: hic enim ubi in fructum inciderit, citius cum maturum reddit, quapropter oleæ iuxta viam sitæ vberiore, & plenior fructum ferunt, propter excitatum à prætereuntibus puluerem.

**30** Ablaqueatio necessaria est. Theophrastus: Postquam pactæ sunt oleæ, curandum est de ablaqueatione, ut altè descendat radix, & in profundum mergatur, ob id radices luxuria, & auiditate supra excurrentes amputandæ, & præcipuè dum nouellæ sunt. Olea enim suapte natura superficialias radices habet, & in sublimi euehuntur, vnde prohibere oportet in eoactam profunditatem. Cùm adultæ fuerint, auferendas eas iubet, quæ temerè effunduntur, quo plures fiant, & firmiores, & ne matrem exhaustiant, lædanturq; à quauis intemperie, quia ob ex terræ debilis est, nec à frigore, vel calore trueri valet. Cato: Circum oleas autumnitate ablaqueato, & stercore ad tiro cor foueto. Si locus siccus erit, per sementiam oleas ablaqueato. Columella, Post æquinoctium autumnale, ita sunt arbores ablaqueandæ, ut à superiore parte, si olea in cliuo sit, incilia excitentur, quæ limosam aquam ad cau-



dicem deducant. Omnis deinde soboles, quæ ex imo stipite nata est, quotannis extirpanda est. Palladius: Octobri mense ablaqueanda sunt arbores oleæ prouinciis siccioribus, ac tepidis, ita ut eis à superiori parte humor possit induci. Omnem sobolem conuelli Columella præcepit, mihi autem videtur paucas dimitti semper, ac solidas, ex quibus vel in vetustate, matris loco succedat delecta, vel melius nutrita, & aggestæ terræ beneficio, & iam suas habens radices, ad oliuetum instituendum sine cura seminarii transferatur arbuscula. Plinius. Circumfodi autem omnibus annis à solstitio. duum cubitorum scrabe, pedali altitudine.

Theophrastus de stercoratione putat lotium, & pellium strigmenta maxime oleis prodesse ad latè fructificandum. Columella tertio quoque anno firmo pabulandas esse oleas censet, atque eadem ratione stercorationi oliuetum, quæ in secundo libro proposuit, ac si ipsis inquit tantummodo arboribus satis seruaueris, singulis stercoreis caprini sex libræ, stercoreis sicci modii singuli, vel amurcæ in singulis congius. Stercus autumnò debet iniici, ut permixtum hyeme radices oleæ calefaciat, amurca valentibus infundenda est, nam per hyemem si vermes, atque alia suberunt animalia, hoc medicamento necantur. Plinius: Nuper repertum oleas maxime gaudere cinere, è calcariis fornacibus. Stercorationi oliueta tertio anno melius inuentum. Hedui, & Pictones calcem berrimos facere agros, quæ sanè & oleis utilissima reperitur. Palladius Octobri mense. Intermissò triennio stercorationda sunt oliueta, locis maxime frigidis Octobri mense. Caprini stercoreis sex libræ vni arbori, vel cineris modii singuli sufficient. Amat hæc arbor lataminis vbertate pinguescere. Post ablaqueationem fimi aggere latantur, ut Sotion scriptum reliquit, sed locis vliginosis longe minus stercorationi debent, ante tamen superfluatorum repurgatione stercore satiari conuenit, ut aduersus noxam, quæ putatione contrahitur, fimi iniuamen opponatur. Siquidem repurgati quoque caudices resgminum causa vitio laborant, quibus celeriter stercorationi succurritur, sed stercoreis aggestionem, & multitudinem, & altitudinem iuxta truncos, iuxta terræ, & arborum naturam facere oportet. Quæ enim germinibus luxuriant, & loci humecti, pauciore indigent stercore, & per spatium plurium annorum. Aggestione autem terræ vtendum est, ne à sole exurantur. Didymus autem ait: omne sterminus aptum esse oleæ præter humanum. Conuenire autem ad radicem non iniicere ipsum sterminus, sed paulo longius à trunco. Stercorationem quarto aut quinto quoque anno fieri.

Semper post stercorationem sequitur irrigatio, nec stercolare debemus, nisi irrigare valemus, tantoque vberius irrigandum, quanto vberius sterminus inieceris. Palladius. In siccis verò prouinciis, cum pluuia defuit, rigare cōuenit.

At demum de putatione agendum. Theophrastus, Androtione auctore, scribit maxime purgatione oleas indigere: etenim quo pauciora reliqueris, letius germinant, fructusque copiosius ferunt. Putationis modum, & tempus breuiter



breuiter maximus Cato docet. Oliuetum diebus quindecim ante æquinoctium vernum incipito putare, ex eo die dies quadraginta quinque rectè putabis. Id hoc modo putato: qui locus ferax erit, quæ arida erunt, & si quid ventus interfregerit, ea omnia eximito, qui locus ferax non erit, eo plus concidito, aratoq; bene, enodato, stirpesque laues facito. M. Varro inter æquinoctium vernum, & vergiliarum exortum oleam interpretari oportere dicit. Columella: Plerumq; etiam locis siccis, & humectis arbores musco infestantur, quem nisi ferramento ressecueris, nec fructum, nec lætam frondem olea inducet. Quin etiam compluribus interpositis annis oliuetum putandum est: nam  
10 veteris prouerbiū meminisse conuenit; Eum qui aret oliuetum, rogare fructum, qui stercoret, exorare, qui cædat, cogere. Quod tamen satis erit octauo anno fecisse, ne fructuarii rami subinde amputentur. Nonnunquam etiam in olea vnus ramus cæteris aliquanto lætior est, quem nisi recideris, tota arbor contristabitur. A kalendis Martiis vsq; in idus Septembris, vbi prægelidum, & pluuium cælum est, oleæ putantur, & emuscantur. cæterum tepidis regionibus duobus temporibus anni facere istud oportebit. Primò ab idibus Octobris, vsq; in idus Decembres, iterum ab idibus Februarii, vsq; in idus Martias, si tamen arbor librum non remittit. Palladius ab eo: Octobri mense muscus eradatur, & putetur octo annorum ætate transacta. Videtur mihi vnoquoq;  
20 anno sicea, & infructuosa, cum aliqua debilitate nascentia debere recidi. Plinius eadem, quæ Cato habet, sed illud, aratoque bene, non habet, quod mihi certè superfluum videtur. Præterea vetus oliuetum ab æquinoctio verno intra vergiliarum exortum interradi alternis annis melius inuentum. Veruntamen condentur oleæ cum & vites, atq; etiam interradi gaudent. Sotion Græcus & putare & formare eas docet. Adultarum olearum putationem moliti occasu Pleiadum, vt in reliquis arboribus oportet, quia illo tempore primum medius humor in germina & in fructus alimoniam consumptus est. Secundo ob æstatis ardorem reliquus humor exiccatus est. Tertio hybernos imbres nō dum hauserunt: horum omnium gratia autumno temporius hanc putationem fieri volunt, quòd cum reliquæ arbores, tum oleæ maximè robustiores  
30 sint. Superuacuis arbor exonerata latius fruticat. Resecare autem oportet & marcida, & sicca, & media, vt liberalius diffidentur: item ramulos detrahere, qui inuicem incumbunt, itidem inflexos, & recuruos amputare, præsertim cum in nimiam longitudinem exeunt, & alia etiam, quæ in difformem proceritatem tendunt, vtpote cum suapte natura notentur infertilia, quapropter inter omnes rei rusticæ prudentes conuenit, incommodam esse longitudinem olearum, quæ denos excedit cubitos, amplius etiam incrementum omnibus patere noxis addiderunt, quòd & rami ventorum impetu frangantur, & flores quoque succussi intempestiue procidant. Ideo complures ramos  
40 versus terram trahunt, vt humiliosam redditam arborem cogant in solum procumbere. Conuenit etiam stolones, & adnatos caudicibus nepotes ad-



hunc molles, & teneros quotannis eximere, ne his onustus caudex fatigetur. Cassianus etiam Græcus monet oleas post decerptum fructum putare tempestivum esse: nam copiosior fructus ex novellis ramis prodit: Et mense Aprilio oleas purgare oportere, ut purgatæ meliorem fructum producant. Neque esse cogitandum ablatis manifestis, & conspicuæ magnitudinis ramis pauciorum fieri fructum, nam multo copiosiores fructum ex recentium ramulorum ubertate feres. Sed quod Sotion apposuit maximam afferre utilitatem in purgatione, & si cæteris in arboribus, in oleis maxime animaduerri, si adnati caudicibus ramuli abscindantur locis incongruis: nam si circa truncum magnus, & antiquus ramus detruncetur, exarefcit non solum cæsuræ, sed nervi, & ligna, & cortices è trunci corpore progredientes usque ad radices, quod olea inter cæteras arbores peculiare habet: quod in veteribus oleis apparet, cum caro exiccata est, nervi, & ossa conspiciuntur, ut in humano corpore; & apparebit experiienti, quod à cæsuræ per corpus usque ad radices, quibus pars illa incumbit, sicca erit. Debet ergo putator in oleæ cæformatione à principio ramos illos decidere, qui incongruo loco nati videntur, ne cogantur, ubi adultiores fuerint, detruncare.

*De olea insitione. C A P. XXII.*

**E**X Theophrasti præceptis oleam in oleastrum inferi, & inoculari posse perbelle patet, nam si mite in agreste inferatur, valido surculus proficiet incremento, robustiores sunt arbores ferè domesticis, atque ab subministrante solo plus rapiens alimentum radix, sic ut probè fœcundet arborem. Sed in olea ferius proficiet insitio, quia serior est oculorum prouentus. Hoc ultimum collegit Plinius, verno tempore esse inferendum, cum tempus viget, incitantibus se gemmis, præterquam in olea, cuius diutissime oculi parturiunt, minimumque succi sub cortice habent, qui nimis insitis nocet. Africa peculiare est inferere oleastro, inseriturque calamo, & insitione. Cato noster oleam per ver inferi iubet, luna sitiente, post meridiem, sine vento austro. Inoculatur, inseriturque inter lignum, & corticem. Plinius eius verba recitat, declaratque luna sitiente, id est, sicca. Miraturque Catonem inoculationem docuisse mensura præfixa secundum reliquam diligentiam suam. Virgilius oleam in oleastrum inferi vetat, non quod mire non coalescat, & fructificet, sed ne casu aliquo incendatur oliuetum, quod facile contingere potest, & ambustis igne stipitibus, radices imæ oleastrum repullulent. Georgicorum secundo:

— *Né ve oleæ sylvestres inferere ramos;  
Nam sæpe incantis pastoribus excidit ignis,  
Qui furtim pingui primum sub cortice lectus, &c..  
Hoc ubi: non a stirpe valent, casaque reuerti  
Possunt, atque ima similes reuirescere terra,  
Infelix sperat foliis oleaster amaris.*



Sed Palladius, ne olea in oleastrum inferendi vtilitas, & commoditas deperdatur, remedium affert. Aprili mense inferatur olea inter corticem. Sed vt oleastro inferas, contrailud, quod ex oliueto insito, & casu incenso renascatur oleaster infelix, sic providendum erit. Positis prius oleastri brachiis in scrobe, in qua disponemus inferere, scrobes ita replebimus, vt mediz vacuæ sint. Cum comprehenderit oleaster, inferemus in infimo, vel insitum ponemus, & insitionem propè infra terram nutriemus. Deinde sicut adolescit, terram subinde colligimus. Ita commissura in profundo latente, quisquis vrit, aut cædit, oliuæ locum non aufert pullulandi, quæ & apertam redeundi felicitatem de olea, & occultam valendi feracitatem de oleastri connexionetretinebit. Aliqui oleas in radicibus inferunt, & vbi comprehenderit, cum aliqua parte radicis auellunt, & transferunt more plantarum. Græci oleas ab octauo calendarum aprilium die, vsque in tertium nonarum Iulii inferi debere præcipiunt, ita vt locis frigidis serius, calidis maturius inferantur. Et in suis versibus,

*Robora Palladii decorat syluestria rami,*

*Nobilitat partus bacca superba feros.*

*Fœcundat sterilis pingues oleaster oliuas,*

*Et qua non nouit munera ferre, docet.*

Sed Hispanus oleam in ilicem inferi posse iudicat, Palladii autoritate, quia per syluestria robora ilices interpretatur, sed hæc admodum difficilis, dissimilisq; esset insitio, cum in suis mensibus nil habeat Palladius de huiusmodi insitione, cum in versibus ea canat, quæ prosa oratione dixerat prius, & potius per syluestria robora syluestres oleastri truncos intelligendum, quàm flices. Crescentius oleas vindemiæ tēpore inferendas dicit, suæq; insaniæ Catonem authorem facit, qui nil tale vsquam habet. Columella inferi debere monet circa æquinoctium vernum vsq; ad idus Aprilis, atq; luna crescente, & calidis regionibus Maio mense inferi, & emplastrari, si iam librum remittunt. Florentinus Græcus hæc addit, Ex oleis, quæ crassum librum habent, vdumq; iuxta corticem inferuntur: quæ tenuem & aridum, in ipsum lignum. Tempus à decimo calendarum Iunii vsque ad Iunias calendas. Sed insitæ oleæ multoties, quippe aridæ existentes, rigandæ sunt. Plurarchus Charoneus oleas tradit ex lentisco pullulasse in hortis Soclari, quos Cephisus amnis ambiebat.

Sed oleosæ arbores, vt diximus, insitiones difficillimè, vel nullo modo admittunt, cui rei argumento est, si plantam quamlibet oleo inunxeris, demoritur protinus: proinde aliis permisceri nequeunt, sicut nec oleum ipsum. Sunt qui aliam causam refundant, scilicet corporis tenuitatem, cuius imbecillitas cum ariditate sedem insitis præbere nesciat. Nos hic Martii calce oleam inferimus inter lignum, & corticem, & optimè apprehendit. Inoculamus verò aliter, quàm in cæteris. Truncum serra præcidimus, inde à summo corticem scindimus, deglubimusq; trium digitorum latitudine, longitudine duorum,



& eiusdem magnitudinis scutulum, cum sua gemma pupilla, ex qua fructum speramus, imponimus, labra luto munimus, & vinculis alligamus. Quo etiam modo vititur Apulia. Saltem si oleastros inferere nolumus, oleas ipsas inseramus, quas masculas vulgus vocat, quæ ramos viridiores, frondes arctiores, carnosioresq; habent, habitiolem truncum, minusq; fructificant, & fructum paruum afferunt, cuius os magnum, caro minima est: hæ enim optime apprehendunt, concipiuntq; feliciter.

*Quid arte, paratū ut in olea fieri possit.* CAP. XXIII.

**N**ON est silentio prætereundum, quod de vitis, & oleæ naturalis comcordia Florentinus memoriæ mandavit. Oleam, si viti inferatur, non v-  
uas modo, sed oleas quoque parere. Addit visam arborem à Mario Maximo, qui quum fructum eius degustasset, negavit unquam se quidpiam comesse, quod magis oleum, vnamque resiperet, tam exactè simul utriusq; sapor linguæ representabatur. Nascuntur huiusmodi arbores in Libya, gentiliq; ac vernacula regionis voce vbolima vocant. Perticæ subiiciendæ, quæ possint brachiorum onus fulcire: si verò alio modo quouis inferantur, longuriis non erit opus. Ergo prope terram vitem terebramus, & oleæ ramulum imponimus, simul ut à vite dulcedinem, simul ut ab humo vernaculum alliciat nutrimentum, ut tandem eius iucundiore cibo fruamur. Postremo si nondum ferentis viticulae sarmenta fructuaria transferantur, misturam progenitorum  
servabunt. Porro fructus à promiscua parentum conditione, insitoris utriusque nomen adoptavit, elæstaphylos Græcis, quasi dicatur vuolea, nominatus. Columella præterea docet, quomodo omnis arbor, omni arbori inferatur, exemplumque apponit, in ramum fici oleam inferi posse, quod nos iam libro de insitione recitavimus. Audiui ab amico se vidisse in iuglandem insitam oleam, & fructum insignis magnitudinis, & ferè sui fructus protulisse & egregii saporis.

*Olearum fertilitatis, & caritatis prognostica.*

CAP. XXIII.

**S**VNT & prognostica, ex quibus olearum fertilitatem, & caritatem  
præscire poterimus, nec nobis parum erit emolumenti, si rem optime cognoverimus, ut olim insignes philosophos fecisse legimus. Ferunt Democritum, (inquit Plinius) qui primus intellexit, ostenditque cum terris cæli societatem, spernentibus hanc curam eius opulentissimis civium, prævisa olei caritate ex futuro Vergiliarum exortu, magnam vilis propter spem oliuæ, coemisse in toto tractu omne oleum, mirantibus, qui paupertatem, & quietem doctrinarum ei sciebant in primis cordi esse. Atq; ut apparuit causa, & ingens diuitiarum cursus, restituisse mercedem anxie, & avidæ dominorum pœnitentiæ, contentum ita probasse, opes sibi in facili, cū velleret. Hoc postea Sextius à Romanis sapietia adfectatoribus Athenis fecit ea-  
dem



dem ratione. Futuram olearum penuriam Thalès Milesius philosophus per  
 astrologiam præsciuit. Hic enim vnus è septem Græciæ sapientibus, cui quum  
 obiiceretur paupertas propter studium philosophiæ, tanquam inutile, parum  
 pecuniæ simul coegit, vrgenteq; adhuc hyeme, in Mileto, & Chio insulis par-  
 no pretio olearia cōduxit, arrasq; dedit, nemine plus offerente, secutaq; olea-  
 rum caritate, innumeras pecunias sibi comparauit, ostenditq; facile esse, phi-  
 losophum contemnentem diuitias ditari, si velit. Sed iam ad prognostica ve-  
 niamus. Scribit Diophanes, Luna existente in Leone, si canicula exorietur,  
 magna erit olei abundantia: si verò in libra, raritas: si in Capricorno, vel A-  
 10 riete, fertilitas olearum. Zoroaster verò Iouis stellam existentem in Cancro  
 & Leone olearum fertilitatem causare dixit, sic etiam in Scorpione. Si recte  
 floruerit olea optimum erit præsagium. Ouidius fastorum libro,

*Si benè floruerint olea, nitidissimus annus,*

*Poma quoq;, euentum temporis huius age.*

Sed oportet flores, quos fructus sequuntur, bene cecidisse. Theophrastus,  
 Intempestiui imbres pessimi sunt, atque ex toto inopportuni, qui circa floris  
 exortum accesserint, omnia nanq; imbecillia redduntur, & omnia ferme, aut  
 certe plurima pereunt, deciduntque partim rubigine, partim nimio humore,  
 oliuæ autem germinibus omnino intereunt, cū alimentum deducatur ad  
 20 germen. Olea florem circa fructum ipsum producit, cuius prostrati flosculi  
 perforati spectantur, idque argumento capitur probe arborem defloruisse,  
 nam si exaruerint, aut madefacti fuerint, vnà cum fructibus defluent, atque i-  
 ta nullatenus perforabuntur. Plinius de prognosticis hæc. Pessimum inter o-  
 mnia, cū deflorescentem oleam percussit imber, quoniam simul defluit fru-  
 ctus. Circa Vergiliæ quidem pluere inimicissimum est oleæ: quoniam tunc  
 coitus earum est. Hoc est illud quatrimum oleis decretorium. Hic articulus  
 austrinus nubili spurci, quod diximus. Serotinæ aquæ oleis vtilis sunt, quo-  
 niam fructus suos diutius contineant, longioresq; desiderant cibos. Olearum  
 conceptus exortu Vergiliarum incipit ad 6. Idus Maii. Aliud hoc quatrimum  
 30 est, quod neque rore sordere velint: exhorrent enim frigidum sydus Arctu-  
 ri postridie occidens: & multo minus plenilunium incidere. 4 nonas Iunii i-  
 terum aquila exoritur vesperi, decretorio die florentibus oleis, si plenilunium  
 in eum incidat. Nos autem optimam abundantiaæ spem concipimus, cum o-  
 leam optimè concepisse videmus, id est primos florum conceptus profert v-  
 berrimos, quibus mox se aperientibus oleam florere dicimus: spem nostram  
 confirmamus, si deinde optime florebit, & deflorebit, vt diximus. Certius erit  
 signum si non solum ex summitate surculorum, sed etiam ex lateribus flores,  
 & fructus proferant.

*De morbis oleæ, & remediis, & primo de nimia fertilitate, & vermi-  
 culatione. C A P. XXV.*



**M**ORBI sunt (vt superius diximus libro de insitione) vel intrinseci, vel extrinseci, & intrinseci vel copia, vel inopia alimentī eueniūt, vt est corruptio plantarū ex nimia fertilitate. Oleę, authore Theophr. nouellæ ob nimiam fertilitatem intereunt. Causaq; est, quod succus, qui trunco debetur, in nimia fœturā absumitur. Ob id Plinius ab eo: Nocet oleis nimia fertilitas. Extrinseci morbi vel secundum naturam, vel præter naturā sunt: qui præter naturam, aut maximè violenti sunt, vt vulnera: aut minus, aut minimè, vt corruptiones. Sed hi morbi, vel corruptiones, vel sunt omnibus cōmunes, vel plurib. vel particulares. Dicamus de cōmunibus, vt de vermiculatione. Sed vermiculatio si est in ipso fructu, Theophrastus ait, Vermis oleæ natus sub cute fructū adimit, sed in ipso nucleo erodens prodest: phibetur pluuiis, quę post arcturū sequantur. Et in drupis quoq; oleis vermes nascuntur, qui ad lacturā peiores certe deprehenduntur, vt marcidi, putresq; omnino videantur, hinc & austrinis nascuntur, & riguis magis. In caulis verò. Oliuæ, si sub cute vermiculi nascuntur, pereūt: quoniam penitus adimuntur, sed si ipso nucleo, augentur. Caro enim non tangitur: phibet illos flatus, & pluuiæ quę fiunt sub arcturū, facit enim refrigeratio, vt turgiant omnes. Sed vermiculorum species multæ, discrimen p̄cipuum in his, q̄ in alia arbore, fructūve alio nati, trāslati in aliud gen<sup>9</sup> seruari nequeunt, sed peculiare notatur de eo, quē cerastem appellāt, in olea creari, & in fico parere asseuerant. Plinius quæ ex Theophr. excepit, habet: Vermiculationē & poma ipsa p se quibusdā annis sentiūt, sed in oliua anticipati eūtu, quādo subeunt nati, fructū adimunt, augēt, si in ipso nucleo fuere erodentes eū. Gigni illos prohibent pluuiæ, q̄ fiunt post arcturū. Eedem si austrinę fuere generāt, in drupis quoq; quę maturescentes tunc sunt p̄cipue caducę. In riguis magis euenit, & si non ceciderint fastidiēdis. Aiunt Quintili. Si radices siccas, & velut morbo languētes offendas, huic acceptū causæ feres, vermiū progeniē interno sinu delitescere, quos cū pluribus, vt dictum est, modis, tum circumfira scilla demolieris.

*De particularibus olea morbis. CAP. XXVI.*

**N**VNC de morbis particularib. Olea lichenes patitur, Chelidemo authore, fructus enim prætennis fluxusq; creatur. remediū erit, vt ei alimentī vbertas detrahatur, vt amygdalas & punica castigare solemus, & arbor firmior robustiorq; reddetur. Oritur & oleis peculiaris morbus, arachniū dictus, nascitur enim hoc, & fructum absumit, proficiscitur q; ex humiditate, generatur anniculis ramis, cū imbres secuti sunt, qua germinatione fructus absumitur, cū eò pabulū trahatur, quandoquidē & fructus nondum vires conceperint, & aggregato humore p̄silit germen. Plinius ad id, Est etiam nū peculiare oliuis, araneū vocant, cum veluti relæ inuoluunt fructū & absumunt. Columella: Solent quāuis lætæ arbores fructū non afferre, eas terebrari terebra gallica conuenit, atq; ita in foramen viridem taleā oleæ stri dimitti. Sic veluti inita arbor fecundo semine fertilior extat. Quintilii: Si sterilitate laborāt oleę, ad fertilitatē adduci poterūt hac ratione. Ab radice cubitali spatio caudicē terebra gallica perforabis, parte qua spectat in Austrū, impresso foramine digiti maioris amplitudinem



dinem capiēte. Hinc duos frugiferę arboris ab australi parte ramos tolles, cras-  
 sitie, quę hiatū foraminis explere possint, & strictē in ipsum cōiicias, detractis  
 vehemēter palorū cacuminib. abscissoq; eo, quod superabit: aceroso vel palea-  
 to luto curabis occulere. Hoc veluti coitu steriles arbores vberātur, & quales  
 volueris oleas adipisci, tales fructuarios indes surculos. Ita melius oleum dabit,  
 impressis foramini ramulis eius à cœli parte lectis, quę ad austrū dirigitur. Ea-  
 dem Africanus promittit, & restibilem oleis adferre fœcunditatē, si semel in  
 excavatū terebro foramē, duos feracioris oliuę ramulos in cacumina vtrinq;  
 adegeris, sic vt traiectu penetrent, manibusq; vehementer transactas partes  
 10 traxeris: dūq; veluti impacti cuneoli strictim adhæserint, exertū vtriusq; taleę  
 verticē, hoc est extātes foramini stylos resecueris, lutoq; cū aceribus, aut paleis  
 oras foraminis, & hiātem sinū illeueris, hoc veluti initu, grauida arbor, vberio-  
 rem partū enitetur. Palladius, In Octobri mense, si fructus arbor lätos nō af-  
 fert, terebra gallica terebretur vsq; ad medullā foramine impresso, cui olea stri-  
 informis talea vehementer arctetur, & ablaqueata arbori amurca insulsa, vel  
 vetus vrina fūdatur, hoc enim velut coitu steriles arbores vberātur, quas tamē  
 durāte malitia oportebit inferere, sed si sine fruge luxuriāt, olea stri palū radi-  
 cibus eius infige. Si verò olea fructificant, sed non maturant, quod ex soli vitio  
 euenire solet, Columella huic vitio medetur. Altis gyris ablaqueat eas, deinde  
 20 calcis, p magnitudine arboris plus minus circūdat, sed minimæ arbori modicū  
 donat. Hoc remedio si nil fuerit effectū, ad remediū cōsultionis confugiat. Ad  
 hęc Quintilii: Solent enim, quāuis lätę arbores fructū copiosum adferētes, ad  
 maturitatē non producere, aut largū florē induentes, perperam exuere, quod  
 vitium abigetur, si ablaqueata arbore, maiusculo caudici fuci corbes duos cōdu-  
 xeris, minori singulos, dein amurcā aque mistā infuderis. q̄ si fuci non erit oc-  
 casio, solius amurcæ vsu eris cōtentus. Vel si parū fructuosa, vel cacuminib. re-  
 torrida frondis, magnis arborib⁹ quaternos modios stercoreis caprini circum-  
 spargere oportet. Democritus autē docet: ne baccas abiiciat olea, fabā pedun-  
 culū intus continentē, obstruso cera foramine, in gleba radicib⁹ hæreticōdes,  
 30 sic labās fructus firmabitur. Ad luxuriantes verò sine fruge oleas, scilicet, quę  
 nimia ramorū petulantia syluescūt, earum multiplex lapsus, erraticusq; furor  
 sic cohibetur. In foramē, quod gallica terebra excavauerit, viridem talē olea-  
 stri, vel pini, vel quercus palos, vel lapidē immittis, sic velut inita arbor fœcūdo  
 semine fertilior exabit. Quod etiā ab eo Palladius recēset Martio mense. Pli-  
 nius: Oleę si parum fructus promissere, nudatas radices hyberno frigori oppo-  
 nito. Olea si fructū non ferat ex Catone: Ablaqueato eam, postea stramen cir-  
 cūponito, postea amurcam cū aqua cōmisceto a quas partes, deinde ad oleam  
 circumfodito, ad arborē maximam amphoram vnā cōmisti satis erit, ad mino-  
 res arbores pro ratione indito, & idē hoc facies ad arbores feraces, hę quoq;  
 40 meliores fient, ad eas stramēta nē addideris. Columella, Sed & sine ablaquea-  
 tione iupāda est amurca insulsa cū suilla, vel nostra vrina vetere, cuius vtriusq;  
 modus seruatur. Nā maximę arbori, ni tantundē aque misceatur, vrna abundē



erit. Palladius ab eo: Martio mense oleis laborantibus circum radices insulsa amurca fundetur. Maximis arboribus sex congii, mediocribus quatuor, ceteris pro æstimatione sufficiunt. Alii paleas, fabæ binos per maiorem arborem qualos. Alii veteris urinae humanae trunco, quantum satis videtur, affundunt, & arbori mortarium statim faciunt, maxime locis siccis, trunco ante cooperito. Quintiliorum agricultura docet: Latiores, & virentiores plurimum fructum afferent, si circum radices ablaqueatas insulsa amurca aqua mixta fundatur, vtriusque sextarius sufficit. Acus quoque fabaginum, vel fraces satis est indidisse, vel etiam humanae urinae, quantum satis vitum fuerit, affunditur, aut argilla bubulo stercore permixta imponitur, aut marini fuci tantundem: sed post hæc, confestim adaggeretur terra circa radices dodrantali altitudine, sinu in orbem fornicato, ut imbres pluuii retineantur, & cum se infuderint, breuissimis, & frequentissimis fossionibus sollicitentur. Id genus etiam auxilii adhibere licet, cum caniculæ incendiis arbores deflagrant, quo tempore, & etiam quum siccitates inceserunt, rigationem desiderant. Patitur etiam clauum, quidam fungum appellant, olea, inquit Theophrastus, alii ollam, hæc est veluti solis exustio: quæ verba etiam recitat Plinius. Et nocere ait Cato eis muscæ rubrum. Columella: Plerumque locis siccis & humidis arbores musco infestantur, quem nisi ferramento resecueris, nec fructum, nec latam frondem olea inducet.

*De morbis, qui ex aeris excessu veniunt locorum proprietate, & ab animalibus. CAP. XXVII.*

**M**ORBI verò extrinsecus venientes, qui sunt minus violenti, sunt aeris excessus. Olea gelu facile aduritur, quod eius radices per summa celsitum natent, ut frigus desuper inuadere possit, & oleastrum ea magis laborat, quod robustius est, ob id frigus densis magis insidet, atque immanet, quam parvis. Et olea tum fronde, tum toto corpore arefacta apparatus regerminauit. Haud equidem arefactio fuit, sed esse quidem apparuit ex siccitate, atque colore, quæ vim genitalem frondis non attingit. Adurunt & æstus quidem oliuas, adurit & flatus, ut in Chalcide Eubææ Olympias cum flauerit frigidus ante solstitia, aut post solstitia hyberna, arbores enim exurit, quocirca vredinem vocant. Id Archippo Athenis magistratu anno quadragesimo facta vehementissima proditur. Laborant maxime loca concaua vicina fluminibus, & loca, quæ ab omni flatu silent. Et oleaster magis infestatur, quam olea. Deprehenduntur quædam statim in germinatione: olea, quod semper vireat, tardius. Afferit etiam Theophrastus propria locorum vitia, ut quod apud Miletum, atque Tarentum oleis euenit, quippe apud Miletum cum florent, si aer austrinus, serenusque sit, erucæ varium genus creatur, quarum aliæ frondes erodunt, aliæ florem. luuat contra hoc si æstus sit consecutus, omnes etenim disrumpuntur, atque intereunt. Apud Tarentum cum florent, aliàs desiderio flatus ærugine infestantur.



infestantur, aliàs habitu quodam ex mari caliginoso, crassove floribus residente odorem florum amittunt, & ob id et si arbores pulcherrimæ fructu carent. Plinius ex eo: Sunt & ex eadem causa nascentes crucæ, dirum animal, eroduntque frondem, aliæ florem, oliuarum quoque, vt in Mileto, ac depastam arborem turpi facie relinquunt. Nascitur hoc malum tempore humido, & lento. Fit aliud ex eodem, si sol actius insecutus inussit ipsum vitium, ideoque mutauit. Quædam temporum causæ, aut locorum, non propriè dicuntur morbi, quoniam protinus necant, vt flatus alicuius regionis proprius; vt est in Apulia atabolus, in Eubœa olympias. Hic enim si flauerit circa brumam, frigore exurit arefaciens, vt nullis postea solibus recreari possint. Hoc genere conualles, & apposita fluminibus laborant, & præcipue olea. Quod cum uenerit, detegitur statim in germinatione, in oliua tardius. De noxa ex ventis Ouidius,

*Florebant olea: venti nocuere proteruis.*

De ea, quæ ex aestu, Horatius,

*— haud quia grando*

*Contuderit vites, oleamque momorderit aestus.*

Sunt autem & ex animalibus noxæ. M. Varro: Quædam enim pecudes culturz sunt inimicæ, ac veneno, vt capra, hæc enim omnia nouella sata carpando corrumpit, & non minimum oleas, quod eas, quas læserit, fieri dicunt steriles, eius enim saliuam esse fructui venenum. Plinius: Quin & oleam si lambendo capra lingua contigerit, depauperitque primo germinatu, sterilefcere author est Varro. Hinc & nomen sortitæ: quippe F. Pompeio dictæ, quod virgultum carpant, & M. Varroni, carpa, & omnicarpæ capræ, non solum vulnere, sed & dentium veneno plantis pestiferæ. Rustica iuuentus capram exoriabat, & in vitem eius per vicos exiliebat. pereuntem verò videre gestiebat Liber pater. At contra Minerva videre præ odio nolebat. Quare antiquitus prohibitum ne illi quid ex caprino genere sacrificaretur, propter oleam, quam reperit. Quare Athenis in arcem non ducebatur, præterquam semel ad necessarium sacrificium, ne olea ibi primum nata ab hoc animali tangi posset. Plinius huic deæ capram immolari dixit. Sed vbi animalia huiusmodi plantulas depasta fuerint, his nos hoc remedio succurrimus, vt cultro sub morsu, vbi modus erit, detruncetur abrasa pars, nam ex nodis noua germina pullulabunt, & lætius crescent, quod si depastas ita relinques, ex morsus veneno diutius ægrotabunt.

*De preparandis ad oliuitatem necessariis vasis, & instrumentis.*

C A P. XXVIII.

N V N c de cōficiendo oleo verba faciemus. Sed multa sunt, inquit doctissimus Columella, quæ ante oliuitatem, sicut ante vindemiam, præparanda sunt, nec cum res desideratur, operæ auertantur: velut copia lignorum,

MM



quæ multo ante apportanda est, scilicet, corbula, decem modia, trimodia satō-  
 rix, quibus districta bacca suscipiatur, fisci, funes cannabini, & spartei, conchæ  
 ferreæ, quibus depletur oleum, opercula quibus vasa olearia cōtegantur, spon-  
 gix maiores & minores, vreci, quibus oleum progeritur, canneæ tegetes, qui-  
 bus oliua excipitur, & si quæ sunt alia. Cato ad cōgendam oleam multa paran-  
 da esse inquit, vt vimina matura, & salices per tempus legātur, vt fieri vnde cor-  
 bula fiant, & veteres sarciantur. Salix enim, vt Tarētinus Græcus habet, ad o-  
 lei pulchritudinem multum facit. Docet etiam Cato quomodo olearia dolia  
 imbui debeant. Amurca impleto dies septem, & quotidie suppleas, inde exi-  
 mito, & arefacito, vbi arebit, cuminum pridie in aquam infundito. Ea postri-  
 die diluito. Postea dolum calefacito. Minus, quàm si picato velis, tepear, satis  
 est. Leuibz lignis facito caleseat. Vbi temperate tepebit, tum cuminum indit-  
 to, postea linito. Si recte lueris, in dolum quinquagenarium cumini pedum  
 quatuor satis erit. Columella, dolia, & seria, vbi oleum reponitur, quomodo  
 curanda sint, monet, idque non solum cū necessitas cogit, sed vbi ea vacua  
 fuerint. Si fæces, vel amurcæ in vasorum fundis subsederint, emundetur, non  
 calida lixiua, ne vasa cerato remittant, sed semel atque iterum eluantur, & te-  
 pida aqua manibus defricentur, & spongia humor assicetur. Alii vbi lauerint,  
 figularem cretam aqua resoluunt, & intus oblinunt, & arefcere patiuntur,  
 & cum res exigit, aqua eluunt. Alii amurca, deinde aqua perlunt, & assiccant,  
 ceraq; perlinunt. Nam sexta quaque oliuitate cerari debere antiqui dixerūt,  
 quod fieri haud leuiter potest, nam noua quidem vasa calefacta ceram reci-  
 piunt, sed vetera ob olei succum ceraturam non patiuntur. Sed melius alii li-  
 quida gummi perlinunt, siccataq; alba cera suffumigant, eamq; suffitio-  
 nem faciunt, cū noua, vel vetera vasa curantur. Alii cū crasso guttū milue-  
 runt, vna illa gummitione in perpetuum contenti sunt, nam testa olei per lima  
 gummitionem non recipit.

In oleo eliciendo quinque instrumentis maiores nostros vsos scribit Colu-  
 mella, scilicet mola, trapeto, canali, solea, & rudicula. Sed mola meliores sunt,  
 quàm trapetum: trapetum, quàm canalis, & solea. Mola quàm facillimam pa-  
 tiuntur administrationem, quoniam pro magnitudine baccarum submitti, &  
 eleuari possunt, non nucleus, qui saporem olei vitiat, confringatur. Rursus tra-  
 petum facilius, & plus operis, quàm solea, & canalis efficit. Est & organum ero-  
 & tribula simile, quod rudicula vocatur, idque non incommode opus effi-  
 cit, nisi quod frequenter vitiat, & si bacca plusculum ingesseris, impeditur.  
 Pro regionum consuetudine prædictæ machinæ exercentur, sed est optima  
 molarum, tum etiam trapeti. Torcular, & trapetum quomodo conficiantur,  
 docet Cato. Sed quia alias & optimas nostra agras adinuenit machinas, consul-  
 ro omisimus hæc omnia, & multo plura prius præparari debent, quoniam in  
 vsu depereunt, & pauciora sunt, quorum siquid suo tempore defuerit, opus  
 intermititur.



## De obnitatis tempore. Cap. XXIX.

**I**N Libro de causis Theophrastus scrutatur causam, cur in aestate oleū com-  
pareretur, quoad arcturus oritur, tunc enim ossis duritia superuenit, & in os  
abit succus, non in oleum, abiit enim æstius calor cum æstate, & superueni-  
ente frigore, nequit fructus elaborari, ob id introitum ad os adigitur, nam et si  
accedant imbres, repleanturque fructus succo, adueniente hyeme, non con-  
coquitur in oleum, quia deest calor: olea enim prius quàm nigrescat, oleū pu-  
rius habet, argumento est illud, quod ex phaulis exprimitur; illud autē, quod  
fit post imbrium accessionem, impurius est, multam enim trahit amurcam se-  
cum. Statuit igitur ipse, quod ante arcturum excoquat ut humor à multo ca-  
dore, & sit oleum, & minuitur pulpa, post verò æstatem crescit pulpa: olei enim  
copia non ex imbribus accidit, argumentum, quod pluuio anno, vel si rigetur  
coluberum, minuitur oleum. Et alibi. Calori datum est, ut oleū, & succi pingue-  
dinem præstare possit, sed si vehementior sit, vim succi impellens ad carnem,  
corpus inolescere cogit, quod etiam imbrium accessu accidit: nam caro excre-  
scit, & oleum alimenti nimietate absimitur, nisi secuta serenitas corpus exi-  
cor, sic amplius exuberare potest, quod magistratu Nicodori obtigisse memo-  
riæ proditum est. A quo Plinius: Augetur oleum ab arcturi exortu, 16. Calen-  
das Octobris, postea nuclei incalescunt, & caro. Cum siccanti imbres copiosi  
accedere, vitiatum oleum in amurcam. Huius color oliuam cogit nigrescere,  
ideoque incipiente nigritie minimum amurca, ante eam nihil. Et error homi-  
num falsus, existimantium maturitatis initium, quod est vitii proximum. De-  
inde quod oleum crescere oliuæ carne arbitrantur, cum succus omnis in cor-  
pus abeat, lignumque intus grandescat. Ergo cum maxime rigantur (quod ubi  
contra multa, siue imbribus accidit) oleum absimitur, nisi consecuta serenitate,  
quæ corpus extenuet. Omnino uti Theophrasto placet, est olei causa calor,  
quare & in torcularibus, & iam in cellis multo igne quæritur. Virgilio hyeme  
stringendas esse oleas videtur his verbis, *hæc omnia præstat olei*  
*quædam sunt. Sed tamen, & quernas glandes tunc stringere tempus,*  
*Et lauri baccas, oleamque, cruentaque myria.*  
Columella, Media oliuitas est plerumque initium mensis Decembris. Nam  
& ante hoc tempus acerbum oleum conficitur, quod vocatur æstinum, & cir-  
ca hunc mensem vitæ premitur, deinde postea maturum. Sed acerbum o-  
leum facere patrisfamilias rationibus non conducit, quoniam exiguum fluit,  
nisi bacca tempesta ubi in terram decidit, & necesse est eam sublegere, ne à  
domesticis pecudibus, ferisve consumatur. Viridis autem notæ conficere vel  
maxime expedit, cum & satis fluit, & pretio penè duplicat domini reditū. Ab  
eo Plinius: Olea prima omnium cruda, atque nondum inchoatæ maturita-  
tis, hæc sapore præstantissimo. Quin & ex ea prima vnda præli laudatissi-  
ma. Quanto maturior bacca, tanto pinguior succus, minusque gratus. Opti-  
ma autem ætas ad decerpendum inter copiam, bonitatemque, incipiente bacca



nigrescere. Cetero distat, an maturitas illa in torcularibus fiat, an ramis; rigua fuerit arbor, an suo tantum bacca succo, nihilque aliud, quàm fores cœli biberit. Tempus olivati statuit idoneum Paxamus, quando parte plus dimidia bacca nigricat: accelerare autem olearum collectionem decet, antequam gelent frigora, sic largiores partus fratres ministrabunt, & bacca copiosius fundent oleum. Crescentius dicit, quod quantò diutius in arbore immorauerint bacca, eò perfectiorem maturitatem consequentur, & quò nigriores, eò perfectius, & copiosius oleum profundent, suaque ineptiæ Aristotelem, & Plinium auctores facit, quod nusquam in eis reperitur, ex quo reor Latinam linguam ignorasse. Sed quia ob variam locorum naturam, anni & syderum variationes, certa oléitas præscribi non valet, vno omnium consensu euenit optimam esse ad decerpendum baccam, quum variare cœperis, & quædam nigra, plures tamen alba, quas Græci drypetas vocant, nostri drupas.

*De leguli, custodis, capulatoris, & factoris officio. CAP. XXX.*

**P**OST QUAM maturitatis tempus designauimus, qualis collectio esse debeat manifestemus, in qua præcipua versatur utilitas, maiorque, quàm in reliquorum fructuum collectione, propter olei accessionem, & decessionem, quæ ex tempestiua, & intempestiua strictione fit, ut olea strictio longe difficilior, quàm olei confectio fuerit. ob id legulos in hac re prudentiores esse oportet, quàm aliis in rebus, ut hanc rem diligentissime tractent. M. V. tro optimè de olea legenda sentit, quem omnes sequenti sunt. Inquit enim: Oleam, quam manu possis à terra tangere, aut scalis, legere oportet, potius, quàm quatere, quòd ea, quæ vapulauit, inarescit, nec dat tantum olei, quæ manu stricta, melior ea, quæ digitis nudis legitur, quàm illa, quæ cum digitalibus. Duricies enim eorum non solum stringit baccam, sed etiam ramos glubit, ac relinquunt ad gelicidium reiectos: quæ manu tangi non poterunt, ita quati debent, ut arundine potius, quam perrica feriantur. Grauior enim plaga, medicum quærit. Qui quatiet, ne aduersam cadat: sæpe enim ita percussa olea secum defert de ramulo partem, quo factò, fructum amittunt posteri anni, ut hæc non minima causa, quòd oliueta dicantur alternis annis non ferre fructus, aut non eque magnos. Cato inter Agriculture iura, hæc habet: Oleam ne stringito, neve verberato iniussu domini, aut custodis. Oleam qui legerint, omnes iuranto ad dominum, aut ad custodem sese oleam non surripuisse. Leguli volunt, ut olea caduca quamplurima sit, quo plus legatur, sed olea, quæ diu fuerit in terra, inde minus fit olei, & deterius. Legulos, & factores, quot opus erunt, præbeto. Factores volunt, ut in sabulato diu sit, ut fracida sit, quo facilius oleum efficiant. Columella sereno cœlo baccas distringi manibus præcipit, & substratis regibus cribrari, & purgari debere. Plinius à Varrone hæc habet: Tertia culpa est in parsimonia, quoniam propter impendium decerpendi expectatur, ut decidat oliua. Qui medium temperamentum in hoc seruant, periculis



decutunt, cum iniuria arborum, sequentiq; anni damno. Quippe oliuanti-  
 bus lex antiquissima fuit: Oleam ne stringito, ne verberato. Qui cautissi-  
 me agunt, harū dīne leui ictu, nec aduersos percutiunt ramos. Sic quoq; alter-  
 nare fructus cogitur, decussis germinibus. Nec minus si expectetur vt cadat,  
 Hærendo enim vltra suum tempus absument venientibus alimentum, & de-  
 tinent locum. Argumentum est, quod nisi ante fauonium collectæ, novas vi-  
 res resumunt, & difficilius cadunt. Paxamus non inutilia his addit: Collectio  
 ipsa sereno cœlo si fit, minime cū pluuius imber incessit, quia profusus ramu-  
 lus imbecillitate languens, facile distrumpitur, qua de caula neq; torulenta die  
 10 ramuli concuti manibus, neq; bacca decerpi debent, prius quā omnis arbo-  
 rum humor sole discutiatur, si lutum subest, canistri & tegetes substernende,  
 quæ si defuerint, immunda bacca, & inquinata, & obsita luto, & quæ tem-  
 pestatibus decidæ sublegantur, calida perluantur aqua. Caduca, quæ pulue-  
 re sit obsita, terrestriusabit oleum. Longè ergo satius fuerit scalas in trian-  
 gulum ætas subicere, & latos asseres superimponere, quibus insidentes legu-  
 lum apibus baccas distringunt. Nunc de capulatoris, & custodis officio dicen-  
 dum, quod ex Catone mutuabimus. capulator est, qui capulis oleum deplet.  
 capula Varroni vasa sunt, à capiēdo dicta, quod capi facile possint, quod an-  
 sata sint. Quam mundissimo, purissimoq; fiat vase aheneo, neq; nucleis ad o-  
 20 leum vtatur: nam si vtetur, oleum male sapiet. Corrinam plumbeam in lacū  
 ponito, quod oleum fluat. Vbi factores vectibus prement, continuo capulator  
 concha oleum quā diligentissimè poterit, tollat, nec cesset. Amurcam caue-  
 at ne tollat. Oleum in labrum primum indito. Inde in alterum dolium indito.  
 De his libris fraces amurcamque semper subtrahito. Cum oleum sustuleris de  
 corrina amurcam dehorito. Oleum frequenter capulet. Factoribus det in sin-  
 gulos factus, olei sextarios, & in lucernam, quod opus sit. Fraces quotidie e-  
 neat, amurcam commutet vsq; adeo, donec in lacum, qui in cella est, postre-  
 mum peruenerit. Custos seruet diligenter cellam, & torcularium. Caueat  
 quā minimum in torcularium, & in cellam introeatur. Quæ in torculario  
 30 vasa erunt, puta habeat, curetque vti olea bene perficiatur, beneq; siccetur.  
 Ligna in torculario ne cadat. In torculario, & in cella caueat diligenter, ne  
 quid olei surripiatur.

*Acerbi, vel viridis olei faciundiratio.* C A P. XXXI.

**T**RITA olei genera apud authores traduntur, acerbum, viride, & matu-  
 rum. De acerbo oleo Cato hæc habet. Quā acerbissima olea oleum  
 facies, tam oleum optimum erit. Columella: Ante Decembris mensem acer-  
 bum oleum fieri debet, quod vocatur estiuum. Sed acerbum oleum facere pa-  
 trisfamilias rationibus non conducit, quoniam exiguum fluit, nisi bacca tem-  
 pestatibus in terram decidit, & necesse est eam sublegere, ne à domesticis pe-  
 40 cudiabus, ferisve consumatur. Et alibi: Nouembri olea distringenda est, ex



qua velis viride oleum efficere, quod sit optimum, ex varia oliua, cum incipit  
 migrescere: nam acerbum nisi ex alba olea fieri non debet. Plinius ab his. Ole-  
 um quam acerbissima oliua optimum fieri. Sed media oliuitas plerunquæ aut-  
 thore Columella, initiū mensis Decembris, & circa hunc mentem viride pre-  
 mitur. Viridis autem nōtā conficere, vel maxime expedit, cum & satis fluat, &  
 pretio penē duplicat dominū red-tum. Cato ita facere docet. Oleum viride sic  
 facito: Oleam quamprimum ex terra tollito. Si inquinata erit, lauito, à foliis  
 & stercore purgato. Postridie, aut post diem tertium, quam lecta erit, facies.  
 Domino de matura olea oleum fieri maxime expedit. Si gelicidia erunt, cum  
 oleam coges, triduum, aut quatrimum post oleum facito. Eam oleam, si vos 16  
 les, sale inspergito. Quam calidissimum torcularium, & cellam habeto.  
 Olea ubi lecta fiet, oleum sit continuo, ne corrumpatur. Cogitasp quor-  
 tannistempēstates magnas venire, & oleam deicere solere. Si cito sustuler-  
 ris, & vasa parata erunt, damnum nihil erit ex tempestate, & oleum viridius  
 & melius fiet. Ex quavis olea oleum viridius, vel bonum fieri potest, si tem-  
 porifacies. Sed Columella exactius docet. Necesse est, ut vniuscuiusque diei fru-  
 ctus molis, & prælo statim subiiciatur, sed quia aliquando accidit, ut multitu-  
 do baccarum torculariorum vincat laborem, necessarium est tabularum, quo fer-  
 ratur olea, & habeat lacusculos tam multos, quam postulant oliuæ: modum  
 ut vniuscuiusque diei coactura separetur. Lacusculorum solum lapide vel ter- 28  
 gulis construi oportet, & ita decliue fieri, ut omnis humor per canales defluat.  
 est enim amurca oleo inimica, quæ si remansit in bacca, olei saporem corrumpit.  
 Super lacusculorum solum asserculos inter se distantes semipedalibus  
 spatiis ponito, & cannas spissè textas iniicito, ut pondus sustinere, nec bac-  
 cam transmittere possint. Sub ipsis canalibus concavum pavimentum esse de-  
 bet, in quod defluat, & exlauriri possit, quicquid deflexerit. Sed modum ex-  
 quamur. Baccas diligenter purgatas in torculari deferri, & in fiscinis novis in-  
 cludi, prælisq; subiici oportet, ut paulisper exprimantur. Postea resolutis corri-  
 culis emolliiri debebunt, adiectis binis sextariis integri salis in singulos modios  
 & sampsa exprimi. Quod primum deflexerit in rotundum labrum capulato- 30  
 depleat, & inde in fictilia labra defundat. Sint autem in cella olearia tres la-  
 brorum ordines, ut vnus primæ pressuræ oleum recipiat, alter secundæ, tertius  
 tertiæ; Nam refert non miscere iterationem, longe enim melioris est saporis,  
 quod minore vi præli, quasi lixiuium, deflexerit. Cum paululum in primis la-  
 bris constiterit oleum, eliquate id capulato in secundam labra debet, & inde in  
 sequentia vsq; ad vltima, nam quanto sæpius ventilatur, tanto fit liquidius, &  
 amurca liberabitur. Singulis ordinibus tricena sint labra. Si verò frigoribus  
 cum amurca oleum congelabitur, plusculo sale cocto vitoretæ enim res resolu-  
 uit oleum, & purum facit. Nec verendum, ne salsum fiat, nam quantumcunq;  
 adieceris, eius saporem non recipit. Si nec hoc modo resoluetur, tosturni 40  
 trum inspergitur, & commiscetur. Alii integram baccam prælo non subiici-



ut sit, existimantes aliquid olei deperire, nam præli pondere non solum amurca exprimitur, sed secum pinguidines attrahit. Cauto ne fumus, aut fuligo, dum id cõfretur in torculari, admittatur, aut in cellam, nam est utraq; res huic torinimica, & vix ad lucernam opus fieri permittitur, & ob id ad eum cœli statim torcular & vella construenda est, qui maxime à frigidis ventis auersus est, ut ne ignis desideretur. Palladius aliqua de nouo addit. Octobri mense oliuam quàm recentissimam, cum varia est, colligis, si diebus aliquot collegeris, expandis ne calefiat. Si qua ibi putris, vel sicca est, remoues. Vbi compleueris modum factorii, sales tritos in eandem mittis, per decem modios tres salis, & molis primo, & sic salitam in nouis canistris esse patieris, ut pernoctet cum salibus, ac mane premi incipiat, olei meliorem fluxum redditura, salis sapore concepto. Hoc non propius ad mouebis, ne olei saporem fumus inficiat. Plinius ex his omnibus breuissime colligens describit, quod quum nil noui habeat, consultis omnibus. Apuleius omphacinum oleum ita conficit. Viride oleum ex acerbis oliuis, quas omphaces Græci appellant, fit. Decerptas oleas viminea crate expandito, quod aquositas ex ipsis remittatur, & ne ex mutua caliditate noxa accedat. Segreganda sunt earum folia, & virgulta ipsis admista: nam si remanent, olei diuturnitati obstant. A vespere acceptas sale conspersas mola iniecit, leuiterq; molito, ne nuclei conterantur: nam oleum corruptum, sed solum caro, & cutis, quod moliturum est, parulis peluibus in torcular transportato, leueq; pondus superposito, nam quod ex leui cõpressione profluit, & tenue & iocundum est, ac in vasa transfusum seorsum adseruabis. Reliquas violentiore pondere exprimes, ac priuatim recondes, nam semper dehinc deterius profluat. Vtrisq; parum salis, & nitri adiciatur, & rude oleagina permisceto, & quiescat: nam pingue supernabit, aquosum subsidebit. Separat, & serua vase vitreo, quo gaudet oleum, quia frigidum est, vel fictili gypso sublinito, locisq; siccis ad arctum versis reponet.

*De maturi olei conficiendiratione.* CAP. XXXII

**P**ost viride oleum, fit maturum. Quum enim vasta sunt oliueta, necesse est ut aliqua pars earum maturo fructui reseruetur. Cato: Olea ubi matura erit, quamprimum cogi oportet, quamminimum & in terra, & in tabulato esse oportet, quia putrescit. Nohito credere oleum in tabulato crescere posse: Quàm citissime conficies, tam maxime expediet, & totidem modis collecta, plus olei efficiet, & melius. Oleum si poteris bis in die depleto. Nam oleum quàm diutissime in amurca & fracibus fuerit, tam deterimū erit. Columella de eo: Post mensem Decembrē, circa calēdas Ianuarias distringenda est olea, & statim exprimēda, nam in tabulatū reposita celeriter cõcalescet, quoniā hyemalibus pluuiis amurca plus concipit. Si ex ea fieri oleū cibarium volunt, prius illata de agro bacca, cōmolita, & expressa sit. Pleriq; credidere oleū in tabulato crescere, quod tam falsum est, quàm frumētū in arca crescere.



Idq; mendacium vetus Cato refellit. Ait enim in tabulato corrugari oliuam, minoremq; fieri, propter quod rusticus, cum facti vnus mensuram sub recto reposuerit, & post multos dies eam molere voluerit, oblitus prioris mensuræ quam intulerat, ex alio aceruo, quantum mensuræ defuit, supplet, ob id videtur plus olei quæra, quàm recens bacca reddere, cum longè plures modios acceperit. Vnde si quid ponderis, aut mensuræ oleo accedit, si portionem velis in factum adiectæ bæcæ computare, non prouentum, sed detrimentum senties. Quapropter non verendum lectam oliuam subito commolere, præloq; subiicere. Si vermiculis exesa, aut tempestatibus oliua decidit, & in lurum defluxit, calida aqua eluantur bæcæ, quo commodior gustus olei fiat, non feruenti, nam vermiculorum, & immunditiarum saporem contraheret. Cibarium, & improbum oleum non iisdem fîcis premi oportebit, nam veteres ad caducam oliuam, noui autem cibario, oleo aptari debent, & cum expresserint facta, feruentissima aqua bis, terve elui debent, & profluentibus aquis immorari. Palladius eadem habet. Nos hic oleas trapeto confractas in lacum indimus ex cannabino filo contextum, ac calida aqua superius iniecta pedibus calcamus, comprimendosq; oleum cum aqua exprimimus, facit enim calida aqua, vt defluat, inde aheneo vase incoquimus, & quod supernatat clarum, & purum tollimus.

*Purgandi modi à vitiiis oleum.* CAP. XXXIII.

**O**LEUM, vt cæteri liquores, quamplurimis vitiiis obnoxium est, tum in ipsa confectioe, tum postquam confectum fuerit, cui, vt in reliquis, eandem operam impendimus, vt medeamur.

*Si sordet oleum.*

Tostos, & adhuc calentes sales Tarentinus iniicere iubet, ita mundum post exiguum tempus pollicetur. Purgat idem nux pinea igni candens, si oleo restinguatur. Emendat & citri radix in oleum demersa. Et sæx olei torrefacta oleum limpidius reddet. Quod ab eo etiam Palladius habet.

*Ad oleum rancidum.*

Oleum rancidum idem sic posse curari ait. Albam ceram mundam, & optimo oleo resolutam, adhuc coctura liquentem in oleum immitti iubet, tunc sales frictos calentes addi, sic fieri vt oleum purgetur, sapore & odore mutato. Neq; ignorandum eius esse naturam, vt sole, vel igne curetur, vel aqua feruenti, si simul misceantur in vasculo. Oleum tamen omne fictilibus, non æreis, aut aheneis esse seruandum. Rancori quoq; medetur immersum anisum. Et non rancescet oleum, in quo prius anisum maduerit. Palladius ex hoc eadem recenset, sed addito sale fricto operiri vas, & gypsari iubet, & terrenis locis esse seruandum.

*Si fetidum oleum sit.*

Si fuerit oleum odoris horrendi, præcipit idem author virides oleas sine osibus



libus tundi, & in vasa per solis calorem mitti. Si baccæ defuerint, caules tenerissimos oleæ simul esse tundendos. Nonnulli vtraque permiscunt, adiecto etiam sale, sed omnia in tra linteum clausa suspendunt, atq; ita in vas olei demittunt, postea tribus diebus exactis auferunt, & agitantes, ubi conquieuit, in alia vasa transferunt. Quidam mittunt vetustum laterem torrefactum, pleriq; panes hordeaceos breuiter friatos, & raro linteolo inuolutos mergunt, & novos subinde permutat: ubi hoc bis, aut tertio fecerint, salis callos, vel micæ mittunt, & in alia vasa translatum paucos dies subsidere patiuntur. Alii ferrulam campanam oleo delibutam interdiu, noctuq; macerant. Palladius

10 ex Græcis eadem.

*Aliquod animal in oleum illapsum, si eius odorem vitiauerit.*

Quod si aliquod animal fortè deciderit, & oleum putri nidore vitiauerit, iubet Democritus coriandri manipulum in olei vase suspendi, atq; ita paucis diebus manere: si nihil de nidore decesserit, immittendum est coriandrum, donec superetur hoc vitium. Quidam fœnigræci semen siccum, tritumque permiscunt, vel incensos oleagineos carbones in oleo frequenter extinguunt. Si acerbus odor fuerit, vutæ acinos, quos gigarta Græci vocant, præcipiunt tussos, & in massam redactos mersari, & post denos dies gigarta eximunt, agitantq; oleum, & in vasa munda decapulantur. Palladius eadem ex Græcis transfert.

10

*Ut oleum turbidum sedetur.*

Si oleum turbulentia vexet, Tarentinus suadet in fideliâ amplioris coniectam oleum inferuescere, tenuissimumq; sale m frictum inspargi, & ubi substiterit, spurcum oleum elutriari. Pellucidum efficies oleum: si corticem, & ramos oleaginos cum sale detritos, & linteo conclusos in vase suspendas.

*Ut oleum Hispanico simile facias.*

Damigeron oleum Hispalensi simile conficiebat hac ratione, Oleo sincero, & omni purçitiâ repurgato, ubi efferbuerit, triplum aque minimè feruentissimæ, & exiguum sale in farinam detritum confundebat, & tantisper conturbans agitabat, dum in vnum coire perciperet: tum spatio quodâ conquiescere patiebatur, donec iniecta aqua instar amurcæ subsideret, dein oleum concha deplebat, idque iterum faciebat, postremo succum recentium foliorum oleæ commiscebat, ut amarulentiam quandam oleum contraheret, & post triduum, ubi constitisset, ad vsus depromebat. Alii in pilam eodem succo prolitam oleum defundebat, & cum vocaret necessitas, Hispani vice in vsu veniebat.

*Alba oliua quomodo condiantur. CAP. XXXIV.*

ADMONET me scribendarum rerum ordo, ut de condiendis oliuis edisseram aliqua, cum maiores nostri, qui de agricultura scripserunt, olearum condituras præcipue docuerint, ut crebrior sit eius vsus, qui patrifamilias per necessarius videbatur, & inter eas, quas recensuimus oleæ dotes, ob

40



id præsertim commendauimus, quodd secundis mensis inseruiat. Hæ enim ante omnia edulia comestæ, si Paulo credimus, cibi appetentiam comouent. Sed diuersæ sunt, ut earum genera, conditura, nam alia in cadiuis, alia in lectis, alia in albis, nigrisve erat. Et primo de cadiuis dicendum, quam M. Cato edocet, nulla collectionis, aut temporis, utpote propter illarum casum, perscripta ratione. Pulmentarium familia, inquit, oleæ caducæ quamplurimum condito. Postea olea tempestiuas, unde minimum olei fieri poterit, eas condito, & partito, uti quàm diutissime durēt. Docet & alibi. Oleæ albæ, antequam nigra fiant, contundantur, & in aquam deiciantur, crebro aquam mutet. Deinde ubi satis macerata erunt, exprimat, & in acetum coniiciat: oleum addat, & salis selibram, in modium olearum feniculum, & lentiscum seorsum condat in acetum. Si vnâ admiscere voles, cito utitor, in orculam calcato manibus sicis: cum uti voles, sumito. Olea albam, qua uti secundum viridentiam voles, sic condito, musti tantundem addito, quantum aceti. Cetera item cōdito ita, uti superscriptum est. Oleæ orchites, posæ optimè conduntur, vel virides in muria, vel in lentisco contusæ. Et ab eo eadem M. Varro recitat. Columella sampas vocat olearum carnes comminutas sine ossibus, quæ condiuntur, & ad cibi usum reponuntur: docetque quomodo fieri possint, ut tertio die uti possis. Mense Septembri pauseam acerbam cōrunde, & aqua calida paululum maceratam exprimo, feniculiq; seminibus, & lentisci cum cocto sale permistam reconde in fideiā, & mustum recentissimū infunde. Inde, ut mergantur oliuæ, fasciculum viridis feniculi superpone. At si toto anno uti voles: Pauseam orchitem, radiolum, vel regiam contunde, illico in frigidam muriam iniice, amphoræ imo aridi feniculi fasciculum subterne, exemptas de muria exprimito, & in vas cū viridis fenicali & lentisci seminibus districtis permisco, dein recentis musti partes duas, & vnā duræ murie adiecito, & serua. Alii non contundunt oliuas, sed arundine infecant, & cādidior remanet oliua. Ac si lautioribus mensis adhibere velis, & ut contusa quaecunq; recipiat conditura: Pauseas vel regias integras eligito, coniucito in amphoram ut diximas, inde duram muriam adiecito, ut ad summum amphoræ labrum perueniat, & cū res exigit, de amphora promito. Olea posæ cū decolorantur, cum periolo leguntur, & in oleo seruantur, ut post annum representent viridem saporem, ac trito sale aspersas pro nouis apponunt. Palladius ad idē Oliuas quasi acnes repereris, rugis contrahentibus crispas colligis, & salibus tritis respersas expandis, donec sole inarescant. Tunc substrato lauro alternas crates baccarum sæpius ordinabis. Tunc defrutum cum sarureia fasciculo duabus, aut tribus vndis feruere patieris. Et postquam tepuerit, supra compositas baccas refundes admulto sale paululo, & origani falce coniecto, supra ius omne perfundes. Florentinus, Albæ oliuæ aqua marina sex diebus macerantur, mittuntur in vas, & mustum superfunditur, non repletur vas, ne in fetore effundatur mustum, ubi inferbaerit, oblinunt. Alii salis pugnum ptæmittunt. Plinius



us, Fiunt & præcoces feruenti aqua perfusa quamlibet immaturæ. Nos nostræ  
 æui condituram apponemus, vt breui tempore condiantur, viridi colore ser-  
 uato. Sumito vitæ calcis libras sex, querni cineris duodeviginti, admisce a-  
 quam, quantum ad dissoluendum sufficiat, & in ea macerentur libræ viginti  
 quinque, selectarum olearum, accommodando ne se inuicem premant, lignea  
 rude leniter permiscendo, post diei medietatem exime, & vide an pulpa ab os-  
 se recedat, quod est optimæ macerationis signum. Inde lauentur aqua, & in  
 ea quinis, vel senis diebus macerentur, sæpius aqua permutata, exinito post,  
 & condito in muria, in qua ferbuerit feniculus in plures partes dissectus: ser-  
 ueturq; siccili, sed ternis quibusque mensibus immutetur muria.

*Nigra olina conditura. CAP. XXXV.*

**C**ATO docet. Orchites vbi nigra erunt, & sicca, sale confricato dies du-  
 os, postea salem excutito, in solem ponit obiduum, vel sine sale in de-  
 fructum condito. Eadem habet ab eo M. Varro. Columella ita docet. Pausias,  
 orchites, & nazuias, cum nigruerint, & immatura fuerint, sereno cælo manu  
 distinctas secernere conuenit à vitiosis: dein in singulos modios oliuæ salis in-  
 tegriternas heminas adicere, & in vimineos quatos confundere, finito tri-  
 ginta dies confudascere, & amurcam exillare, postea in alueum diffundere,  
 spongia salem munda, & in amphoram iniice, sapa, vel defruto reple. Alii  
 tres partes defructi, & vnam aceti, alii duas, & vnam aceti miscent. Alii eodem  
 modo saliant, & collocant in qualis, immistis seminibus lentisci, alterna tabu-  
 la oliuarum, & salis, & post quadraginta dies mundas oleas in alueum de-  
 fundunt, adiecto defruto, vel sapa, vel melle. In singulos modios oliuæ sin-  
 gulos sextarios maturi seminis anisi, lentisciq; , & ternos cyathos seminis fe-  
 niculi, salis cocti non moliri ternas heminas admisceri, & in amphoras condi,  
 feniculi fasciculis obturari, & quotidie per terram volutari, & tertio aut quar-  
 to die, quicquid amurcæ est mitti oportet. Post quadraginta dies in alueum  
 diffundi, & à sale separati, sine spongiis, & in amphoram condi. Didymus: Vi-  
 nacea recentia prius quam exprimantur, vnâ cum oliuis vicissim interpositis  
 in vas condas, & oblines. Florentinus: Oliuas longas nigras, pulcherrimas,  
 cum ramulis integras accipe, & aqua frigida lotas in cratibus siccato, dein in  
 poluim mittito, affuso oleo, ac sale trito chœniis mensura ad nouem oliua-  
 rum, leniter manibus commouero, in vas translatis acetum mulsum affan-  
 dito, vt supernatet liquor, & feniculo obturatum vas reponatur. Plinius:  
 Sidicina sale priuatim condiuntur, & vt reliquæ amurcæ, sapaue.

*Colymbades olina quomodo fiant. CAP. XXXVI.*

**D**IDYMVS ita docet. Oliuas ppè maturas cum pediculis suis lectas, fri-  
 gida aqua lotas, per diē vimineis cratibus assiccato, leniter cōuertendo,  
 ac animum vasis sale immulo, muria congiis quatuor, & aceti heminis tribus.



infusis, olearum chœnices viginti mittito. Expletum vas commoueto, & ius superemineat. Alii in marinam aquam oleas immittunt, post dies quinque, vel septem eximunt, & in vase cum muria coniectas reponunt, idq; cum solstitium est, faciendum. Palladius Nouembri mense. Colymbades oliuę sic fiunt. Alternis cratibus oliuarum puleium spargis, & mel, & acetū, & sales modice, stratura intercedente suffundes. Item sternes oliuas supra furculos feniculi, vel anethi, siue lentilci, & ramulis oliuę subditis, aceti heminam, & muriam superfundes, & has constructiones vsque ad vasculi plenitudinem patiens insurgere. Columella, Maturam oliuam in stratura factam colymbadem de muria tollito, spongia tergito, deinde canna viridi scindito duobus, vel tribus locis, triduo in aceto habeto, quarto die spongia extergito, in vrceum nouum mittito substrato apio, & modica ruta: concisis deinde pleno vase oliuis immitte de frutum vsque ad os. Lauritiones mittito, vt oliuas deprimant, post dies viginti vtere. Plinius: Nec non aliqua oleo suo sine accersita commendatione purę innatant colymbades, franguntur eadem, herbarumq; viridium sapore condiuntur.

*De amurca.* CAP. XXXVII.

**D**IXIMVS de oleo, dicemus de amurca. Ex olea enim fructus duplex, vt M. Varro inquit, oleum quod omnibus notum, & amurca, cuius utilitatem licet videre ex torculis oleariis fluere in agros. Dicitur Græcis amorgi, & trix, à qua tragœdiam primum denominatam dicunt, auctore Donato, quod ea scenici ad personarum vsum ora sua perluerent, quod primo Æschylum reperisse dicunt. A quo Horatius,

*Ignotum tragica genus inuenisse Camæna*

*Dicitur, & planstris vexisse poemata Thespis:*

*Quæ canerent, agerentq; peruncti facibus ora.*

Latinis amurca dicitur. Plinius: Amurca est oliuę sanies amara, quæ fit ex aquis, ideo siccitatibus minima, riguis copiosa. Est enim sedimentum, & fax olei amara, vetustate fit melior. Cato, vt ab eo initium sumamus, summis laudibus extollit, quas omnes Plinius in vnum collegit: Dolia olearia, cadosq; illa imbui, ne bibant oleum. Amurca subigi areas terendis messibus, vt formicæ, rimæq; absint. Quin & lutum parietum, ac tectoria, & pauimenta horreorum frumēti, vestiariū etiam contra tereidines, ac noxia animalia, amurca aspergi: semina frugum perfundi: morbis quadrupedum, arborum quoq; illa mederi, efficaci ad vlcera interiora humani quoque oris. Lora etiam ac coria omnia, & calceamina, axesq; decocta vngi, atq; aramenta contra æruginem, colorisq; gratia elegantioris, & totam supellectilem ligneam, ac vasa fictilia, in quib; sicum aridam libear asseruare, aut si folia, baccasq; & virgas myrti, aliudve id genus simile. Postremo ligna macerata amurca, nullius summi tedio ardere. Præterea amurca olearum radicibus infusa, feraces, & meliores.



meliores efficit. Et fici grossos continebunt eadem radicibus satiatis. Conuol-  
 ulus in vinea non nascitur, si vitem circum caput, & brachia perunxeris a-  
 murca. Pecudes & oues detonsæ ea illinuntur, nec scabræ fiunt, nec ricini mo-  
 lesti erunt. Boues, qui cibum fastidiunt, si pabulum amurca conspergas, magis  
 cupide appetunt, & corpore valebunt. M. Varro ait amurcam non solum de-  
 nigrare terram, sed multitudine facere sterilem, cum is humor modicus, cum  
 ad multas res, tum ad agriculturam pertineat vehementer, quod circum arbo-  
 rum radices infundi solet, maxime ad oleam, & ubicunque in agro herba no-  
 cet. Idemq; de ea promenda, & tuenda hæc habet. Amurca cum ex olea ex-  
 pressa est, qui est humor aquatilis, ac recrementum conditum in vas fictile, id  
 quidam sic solent tueri: diebus 15 ex eo, quod est leuissimum, ac summum, de-  
 pletur, ut traiciant in alia vasa, & hoc iisdem interuallis duodecies. In sex men-  
 sibus proximis id faciunt. Cum id nouissime faciunt potissimum traiciunt, cum  
 senescit luna, tunc decoquunt in ahenis leui igni duas partes, quoad regerunt:  
 tum deniq; ad vsum rectè promittitur. Virgilius amurca profundi iubet fabam,  
 ac sic grandescere promittit.

*Semina vidi equidem multos medicare ferentes,  
 Et nitro prius, & nigra perfundere amurca,  
 Grandior ut fœtus siliquis fallacibus esset.*

20 *Columella* utitur ea contra animalia, quæ segetes carpunt, eroduntq;.  
*Sed ne dira nouas segetes animalia carpant,  
 Profuit interdum medicantem semina pingui  
 Palladia sine fruge salis conspergere amurca.*

Neq; hac libenter carerent medici, si quot, & quanta ad morbos quam-  
 difficillimos curandos præstet remedia, scirent.

*De aliis olei generibus. CAP. XXXVIII.*

30 **N**ON erat Catonis æuo fictitium oleum, ob id arbitratur Plinius nihil ab-  
 eo dictum, sed Plinij tempore genera plura, nostro plurima: primumq;  
 persequemur ea, quæ ex arboribus, postmodum ex herbis, & primo de nuci-  
 bus. Fit ex nucibus iuglandibus, quod caryinon vocant, iners, & graue sapore,  
 40 enimvero si quid in nucleo putridi fuerit, totus modus deperit. Nunc Cisalpi-  
 na Gallia utitur ad lucernarum lumina, & ad esum. Ad lumina secernunt vitio-  
 sas ab integris, & illæsis, his secundis mensis, illis ad effusionem vtuntur. Lu-  
 men clarum efficit, nec est inter omnia, quæ copiosius oleum effundat, nam  
 fere tota in oleum vertitur, ut libra vna mundatarum nucum, uncias ferè olei  
 decem fundat. Sequitur auellana, quæ copiosum, odoratum, & optimum o-  
 leum effundit, quo etiam ad cibarium vsum vti poterimus, & libra vna octo  
 uncias olei fundit, quod superior ætas ignorauit. Amygdalinum oleum ex dul-  
 cibus optimum est, ex amaris ad medicamenta vtimur. Dioscorides conficiendi  
 40 modum demonstrat. Amygdalæ amaræ sextarios octo purgant, assiccantq;: vbi



exaruerint, pistillo ligneo in mortarium collaras contundunt; quoad massa fiat. Hanc heminis duabus feruentis aquæ aspersam, semihoram dimittunt, ut perbibat, postea vehementius iterum tundunt, deinde ad tabellam prementes cremorem excipiunt, & quod in digitis pingue adhæsit, in cornicula effingunt, ac tergunt, rursusq; in id, quod presserunt, heminam aquæ vnā infundunt, & spatio ut combibat interposito, iterum exprimunt, forma, qua prius. Iustum est ut octo sestarii heminam reddant: eodemq; nos extrahimus modo. Ex pistaciis etiam optimum elicitur ad esum, & ad remedia. Ex fructibus nucis pineæ, scilicet ex nucleis oleum ad lumina satis copiosum elicitur, ex viticis cum seliguntur. Plinius Indos ex castaneis oleum facere dicit, quod difficillimum videtur, cum experientia non successisset, saltem perparum. Ex roborum glandibus elicit oleum Cisalpina Gallia, quo ad lucernatum lumina versatur, sed valde paucum. Plinius: Inopia cogit aliquando luminum causa & è platani baccis fieri, aqua, & sale maceratis: sed etiam perpaucum. Sed ex figina glande copiosum, optimum elicitur, & ad cibarium vsum, & ad lumina: humen clarum reddit, & sapore est, ut dulcium amygdalarum, totaque fere in oleum absumitur, ut nuces iuglandes. Quo verustior, eo copiosius oleum promittit, & expressis fraces saginandis bubus, & subus egregiæ. Paruo impendit colligitur, mundatur, tunditur, exprimiturque. Laurinis è baccis, priusquam maturæ sint, iam tum colorem mutantibus. Has in aqua decoquito, pinguedine quæ dâ cortices reddent, euocabitur ea diuerberatis manu, tum cremor è cornu colligito. Palladius ferè ut Dioscorides: Ianuario mense lauri baccas quamplurimas, & maturitate turgentes in aqua calida bullire facias, & ubi diu febuerint, olei, quod ex se dimiserint, supernatantis vndam, pennis leuiter coegentibus in vasa transfundes. Lentiscinum ex maturis lentisci seminibus eodem instruitur modo, ut de lauro diximus. Palladius præcisus dicit: Grana matura lentisci quamplurima colligis, & vna die, ac nocte supra se acervata esse patieris, deinde sportam grani eidem plenam cuicunque vasculo superponis, & calida adiecta calcabis, & exprimes. Tunc ex eo humore, qui de fluxerit, supernatans oleum lentiscinum, sicut laurinum colligetur. Memento autem, ne rigore possit astringi, aquam calidam super suffundere. Ex roso hoc nostro Surréno tractu copiosum eliciunt: simili etiam modo fit terebinthinum, quod docet Damageron: si terebinthi fructus in mola quemadmodum oliva, molitur, & exprimatur. Ipsi autem nuclei in porcorum cibum veniunt, atque igni etiam alimentum sufficiunt. Expressimus etiam ex arbore pseudocômoro quam vocant: quippe semine copiosissima, & hyeme eius rami onerati seminibus solis conspiciuntur. Februario mense collegimus, & fruiimus, os in sex vel septem partes rumpitur, nuclei pyro assimilantur, tunduntur, & atheno callefacti, prælo subiecti, oleum remittunt, claram lucem efficit in lucernis, quartamque partem seminis olei effundunt. Ex sanguinea arbore etiam bonum ad lumina oleum exprimitur. Septembriis medietate acini maturi ex corymbis decerpan-



decerpantur, finito paucis diebus siccescāt, tundantur, ac aqua aheneo vase per horam ferueant, præleque subiiciantur, oleum viridis coloris habebis, septimam teie partem seminum: hoc vtuntur monticolæ. Ex vuarum acinis, siue seminibus, quæ Græci gigarta vocant, oleū exprimitur. Cisalpina Gallia ex con-  
 10 tulsis iis, calefactis, & torculari expressis, sed paucū excipit. Verū luminibus aptissimum, quia clarissimum lumē reddit. Ex herbis copiosissimum extrahitur. Proximum fit è cici (vt Plinius inquit) arbore in Ægypto copiosa, alii crotonem, alii trixin appellant, ibique non pridem. Et in Hispania repente prouenit altitudine oleæ, caule ferulaceo, folio vitium, semine vuarum gracilium,  
 20 pallidarumque. Nostri eam ricinum vocant à similitudine seminis. Coquitur in aqua, innatansque oleum tollitur. At in Ægypto vbi abundat, sine igne & aqua sale aspersum, exprimitur, cibus scdum, lucernis vtile. Dioscorides clarius docet, Ricinos eius maturos in solem conferto, expansosque vuarum modo sternito, vt perarescant, nec dimoueto antequam cortex sponte rumpatur, & cadat, tum fraces eorum collectas in mortarium diligenter contundito, & in leberem plumbatum relatas, igne inferuefacito, vbi verò succum omnem ita reddiderint, ignem subtrahito, arque oleum omne, quod innatat, tollito, & in parua colligito cornua. In Ægypto vbi abundat, aliter elicitur. Repurgati, de-  
 30 glubii que ad trusatiles molas feruntur, vbi diligenter frangantur, pinlitos in sportulam coniiciunt, deinde machinamētis cremor omnis exprimitur. Tempestiuitas ricini ad decerpendum, cum folliculi, quibus ambitur, abscedunt. Scribit Plinius ex oleo fieri obscurum lumen propter nimiam pinguedinem, ob id, llychnia ex vua fieri, claritatis præcipuæ. Nos Septembris hic medietate collegimus, tunc cum spinoso operculo, & tunica semen integre spoliatur, calido aheno facillime mundatur, olei pondus seminis medietatem refert. Bis tunditur, exprimiturque. Ex sesama Indi oleum facere dicuntur: fit, vt superiora fieri diximus, copiosum & optimum remittit. Plurimum in Ægypto ex raphani semine, vtunturque obsonandis cibus vnà decocto. Cisalpina Gallia ex raphani, & raparum semine elicit. Sed rapæ Nouembri mense solo  
 40 euelluntur, ac sabulo obruuntur, cum suis frondibus, Martio mense plantantur, vt Maiō semen proferant: nam nisi euellantur, hyemis frigore gelantur. Sed aliud est rapigenus, quod Iulio ferunt, sarculatur, vere profilit, Maiō reddit semen. Ex quarta modii parte duodeniginti olei libræ eliciuntur, bonum luminibus, & cibus plebis. Si huiusmodi semine integrum iugerum seminabis, quinque seminum onera colliges, & ex vnoquoque olei libras ducentas percipies. Aratur, sarculaturque solum. Ex myagri semine copiosum elicitur oleum ad lumina. Cisalpina Gallia ex quodam semine, *dradella* dicto, aurei coloris, copiosum sibi comparat oleum. Folia sunt ei laciniata syluestris erucæ, quod inter legumina ferunt. Eodemque modo ex vrticæ, & sinapis semine, &  
 49 lini fere vbi que, quod lucernis plus durat. Ex oriza Indos oleum facere scribit Plinius.



**D**E olea, & oleastri materie hæc habet Theophrastus. Olea spissa est corpore, atq; crispa, ideoq; ex radicibus olearum minora simulachra sculpebant, quod carnis æquabilitate constarent, neque dehiscerent in rimas. Eius materiem perpetuam dicunt amaritudinis causa, neq; tineæ rodit, neq; terebinto exest. Medulla eius orbicularis non est, quia medulla carere omnino existimatur. Nec distrahi posse autumant, id est ut mota medulla, contorqueatur materies. Pondus sustinere non valide potest, & nonnunquā rumpitur. Malleus & terebra ex oleastro optime fiunt. Ignem quamvis optimè subditum excipiat, quod pingui, & spissa materie sit, ignariis tamen suo virore æterno ineptissima habetur. A quo Plinius. Nec carnem, nec adipem habet olea, nec medullam, minimumque etiam sanguinis. Cariem vetustatemq; non sentit oleaster, & olea. Rimam, fissuramq; sponte non capit. Omnia in maritimis navibus obnoxia teredini tradunt, præterquam oleaster, & olea. Incuruatur, ceditq; ponderi. Terebris vaginas ex oleastro, & malleos utilissime fieri dicunt. Lignum ex quo Vlysses Polyphemo oculum transfixit ex olea fuit, auctoribus Homero, & Euripide. Et securis manubrium, quod Vlyssi Calypso dedit eodem scribente, etiam oleagineum fuit. Fumus, qui ex olea exurgit, caput grauat, & caliginem ob oculos obducit.

*Super olei natura veterum Philosophorum aliqua notatu digna.*

CAP. XL.

**Q**UÆRIT magnus Peripateticus, cur oleum facile stet, & vinum rarerer congelascit. Vinum iccirco minus cito coalescit, quod semina quadam caloris in se habet, estque natura ignitius, ob eamque rem ab Homero dictum æthopa ænon, id est calidum vinum, potumque calefacit corpora, sed oleum quoque caloricum est, nec minorem vim corporibus calefaciendis habet. Sed si isthæc, quæ calidiora sunt, difficilius gelu coguntur, congruens est, ut quæ frigidiora sunt, facile cogantur, acetum autem omnium frigoricum est, atque id nunquam tamen concrevit. Num igitur magis causa oleo coaguli celerioris in leuitate est, faciliora enim ad coeundum ideo videntur, quæ leuiora, leuioraque. Ad explicandum quoque olei naturam & illud pertinet, quod potum vomitum cit, & præsertim flauam bilem: cuius ratio est, quod leue sit, & superna petens, cibos ipsos elicit, ad stomachum eleuans, stomachus verò grauat, vim egestiuam ad vomitum exulcit, præcipue flauam bilem, utpote leuem, tenuissimam, ac facile sursum euadentem. Quæritur etiam cur oleum inter cætera liquida non remisceatur: quoniam glutinosum est, & in se reductum nequit disseari in minutiores portiones, reliquisque liquoribus immisceri. Quæritur etiam vinum cur medium optimum, melimum, oleum superfluens? Inquit enim Hesiodus, cum ad medium dolii peruentum est,



est, comparandum, ceteris eius partibus ad satietatem abutendum, optimum proculdubio vinum significans, quod in dolii cōsisteret medietate, quod symposiorum septimo idem comprobatur Plutarchus. Cuius ratio est. Quod mel quoniam crassum sit, & terrestrem prorsum naturam resipiat, melius in imo est. In oleo, quod superfluit ideo creditur præcellere, quoniam aerium sit, ac proinde superna scandat, naturæ suæ vi, comparati ratione vinum in proprietatis vtriusque participatum veniens ad dolii mediana creditur præcellere. Plutarchus verò inquit, quod vini vis calida censeatur, ob id ad medium sese colligere videtur, inibi que bonitatem confouere: nam quod inferius est, quia faculera impuritate permixtum est, sapore deterius sentitur: quod verò in summo est, ex aeris conuicia facile corrumpitur, & illius permissione diluitur.

## IOAN. BAPTISTAE

PORTÆ NEAPOLITANI

## VILLAE

LIBER SEPTIMVS

SIVE

VINEA.

PROOEMIUM.



Am oliuetum clausimus, ordo flagitat, vt vineam aperiamus, vt vuarum & vini voluptatem, & vtilitatem degustemus. Absoluta enim arborū commentatione, ad cetera è terra nascentium genera perueniamus. Eum tamen rogatum velim, qui hanc nostram ingreditur vineam, ne ipsum vlla sui honoris gloria defraudatum iti sibi persuadeat, si in septimū librum reiecerimus, quum maximus Cato in iuris censu principem ei locum assignauerit, nam vt & stirpium dignitati & scribendorum seriei, vno eodemque tempore consuleretur, nunquam præstare potuimus. Viris enim neq; arbor, neq; frutex, suffrutex, aut herba est, sed variæ veterum agricolarum sententiæ, medium inter hæc quoddam esse censuerunt. Theophrastus quod simplici caudice, ramis brachiata, surculosa, dissolutuque contumax assurgat, eam ar-



Boré appellat. Columella verò libro de arboribus arborem ficū, & oleā vocat, rosam fruticē, vitem autem tertis quiddam, quod neq; arbor neq; frutex propriè dici possit. Cōsultò igitur post arbores de vite dicemus: frutices, & herbas, dicturi in subsequētib. In præceptionib. Theophrastū, & Columellā sectabimur, qui inter ceteros de vinea diligentius, accuratiusq; scripsisse visi sunt.

*De vitis & vini laudibus. C A P. I.*

**V**ITIS laudes à iucunditate, utilitate, & necessitate desumemus, quas humanis corporibus affert, & adeò insignes, vt ad humanā vitā commoda, maxima Dei benignitate fuisse elargitam agnoscere debeamus. Vitris fructus (vt hinc incipiam) estate optimus esu, iucundissimè sapit, nutritq; & in arbore sua vsq; ad hyemem viuit, inde laqueatibus suspēsus, vsq; ad aliorum prouentū viridis suas prorogat moras, vt vetus simul, & nouus conspiciatur: mox passus, assiccatusq; non solū anno, sed pluribus annis asseruatur, vt commodè in alias regiones transferatur. Ex eius succo fit vinum, cuiusmodi liquor tantum tribuisse ferunt Æsculapium, vt aqua illum cū numinibus lance statuerit. Homerus Deum fecisse scribit vinū, curis mortaliū & mœsticijs dissipadis.

*O Menelae di fecerunt optima vina,  
Qua tristes hominum curas dispellere possint.*

Plato vinū remediū vocat senectutis: nā eius potu mœsticijs obliuione capiuntur senes, vt iuuenescere videantur. Niceratus à Poetis nil optimū fieri posse dicit, nisi prius biberint, ac plus etiam quā sit aquum. Alexis eos, qui se largius inuitant, vinum loquaces reddere. Vnde author in Cratinum.

*Vinum equus est lepidò promptus, veloxq; Poeta,  
Si potantur aqua, nil paris egregium.*

Diphilus comicus ait vinū conciliari bibentibus risum, sapientiam, docilitatem, & bona consilia.

*Prudentibus, ac cordatis omnibus amicissime  
Bacche, atq; sapientissime, quam suavis es,  
Abieci magnificè vt sentiant de se, tu solus efficis,  
Superciliosis & reetricis persuades, vt rideant,  
Ignauis vt audeant, vt fortes sint timidis.*

Est enim liquorū omnium suauissimos, purissimum generat sanguinē, ocysimè vertitur in alimentum, concoctionē adiuuat, cerebrum purgat, intellectum auget, cor exhilarat, spiritus viuificat, flatu discutit, innatū calorem roborat, cibi appetentiam inuitat, obstructions aperit, & calorem conciliat. Auicēna semel saltem in mēse ebrietas ē admitti debere iubet, vt inde insignē sequatur humanæ vitæ emolumentum: nam animalibus virtutibus leuamentū, & quies inducitur, somnus profundior conciliatur, ac sudore, quæ superfluerint, resoluit. Vita conciliator etiā est: nā veneno obluētur, & quæ veneno obluēantur, vitæ salutaria censentur. Cicuta homini venenum est, cicuta vinum mox haustum. Plato libro de legibus inquit, ad bonam valetudinē vsum



Vini conducere, vnde de dando eo volumen Asclepiades scripserit. Nec solū gustatum corpus egregiē alit, sed eius exhalans odor spiritus excellenter nutrit, voluptate sensus omnes deliniciens, calidum, odorum, ac nitens. Macsithenus ad remedia mille pręstare ait,

— *vinum Deos*

*Mortalibus monstrasse rectē vtentibus,*

*Illos enim, modeste qui bibunt, alit,*

*Animumq; pariter, & corpus roborat,*

*Ad vsus medicina varias est utilissimum.*

*Miscetur iis, quę propinquantur pharmacis,*

*Ulcera lauare corpus vino expedit,*

*Animum exhilarat.*

*Quapropter Bacchum omnibus in locis vocant*

*Medicum, quibusdam verō edixit Pythia,*

*Bacchum vocandum sanitatis presidem.*

Horatius nullam esse posse hilaritatem in eo, qui aquam bibat, inquit festiue ad Męcenatē:

*Prisco si credas, Macenas docte, Cratino,*

*Nulla placere diu, neque viuere carmina possunt,*

*Quę scribuntur aquę potoribus.*

Socrates apud Xenophontem, vinum, ait, non aliter męrori mederi, quā mandragorę hominibus, latitiāq; non aliter excitare, quā oleū inspersum igni flammā adiuget. Apud Philostratū vinitor sub vite confidendū Phœnici suadet, quod ex ea spirare soleat latitia. Et Salomon ait, Exultatio animę & cordis vinum moderatē sumptum: ad iucunditatem enim creatum est. Maro,

*Adsit latitia Bacchus dator.*

Apud Homerum si aliqua celebratur hilaritas, ipsa pauimenta vino nātant, & musica, quę ad hilaritatem comparata, nullo alio magis stimulo comparatur, quā vino Ouidius,

— *nec non & carmina vino*

*Ingenium faciente canunt.*

Tibullus O sirim vitifatorem laudans, ita cecinit.

*Ille liquor docuit voces inflectere cantu,*

*Monit & ad certos nescia membra modos.*

Si vtilitatē autem, quā ex vitibus percipimus, inspexerimus, vberiorē cęteris rebus reditū percipiemus. Proinde M. Caro & illū sequutus Varro, singula iugera vinearū sexcentas vini urnas prębuisse scribūt. Narrat Columella vitē effudisse vuarū numerum duorū millium, & apud eum octogena stirpes insitę intra bienniū septenos culleos per aquarū, vt primę vineę cętenas amphoras iugeratim pręberēt. Probauitq; Iulii Gręcini calculo, si quis agri iugera, & dotē, & pedamenta, & vinina cōparauerit, pretiūq; vsurę soluerit biennii temporis,



quo vinea, velut in infantia, cessat à fructu, etiam vinitoris mercedem soluendo, ac omnium vsuram, redditum è vineis sortem & vsuram longè superare. Vnde ipse nil magis rusticis conuenire quàm vitem colere praecepit. Idemque refert Paridium quendam Veterensem duas filias, & vineis confitum habuisse fundum, cuius partem tertiam nubenti maiori filiae dedisset in dote, ac nihilo minus æquè magnos fructus ex duabus partibus eiusdem fundi percipere solitum. Minorem deinde filiam nuptui collocasse cum dimidia parte reliqui agri, nec sic ex pristino redditu detraxisse.

*De vitis, & vini inuentore: C A P. II.*

**A**THENÆVS Dipnosophistarum libro 2. refert, Hecataum Milesium dixisse in Ætolia vitem primum inuentam fuisse: Oresteia Deucalionis filium ad Ætoliae Regem venisse, illique caudicem suam canē peperisse, quem quū defodi iussisset, natam ex eo vitem vuis onustam, ac ideo gnatum suum *φύπov*, id est satorem appellasse, nepotemq; ex illo genitum OEneā, à vite scilicet, quam prisci Græci *οὐνάδα* nuncupabant, Ætolumque ab OEneo fuisse procreatum. Virgilius Bacchum primum vino aquam miscuisse dicit,

*Liber, & alma Ceres, vestro si munere tellus:*

*Chaoniam pingui glandem mutauit arista,*

*Poculaq; inuentis Acheloiā miscuit vnīs.*

Ex quo Probus hæc notat: Ætolus pastor Staphylinus nomine, quū OEneus capellas in pabulum deduceret, notauit vnā præcipuè egregiè lætiore, ac ceteris se in præsepia seriùs recipientem, cuius rei vt causam cognosceret, sequutus eā clam est, & in remota stirpe animaduertit vnam edentem, pomum ei inco-  
gnitum, substulit ergo, & OEneo Regi protulit, qui expresso humore delectatus est, quumq; eum vetustate cognosceret mitescere, Libero patri, à se hospitio accepto apposuit, cuius rei cultū quū demonstraret Libero, vt perpetua inuentorū esset gloria, constituit, vt ab OEneo cœnon appellaretur vinū, à Staphyle, vna staphylis. Varro Bacchum vitis repertorē vocat: nā quum capræ vitis virgulta carperent, eamq; corrūperent, esse institutum, vt Libero patri vitis repertori hircus immolaretur, videlicet vt capite pœnas daret. Ex Theopompo accepimus apud Chios vitem primū nigram esse inuentam, quin eosdem omnium primos ab OEnopione didicisse vitē colere: Philonides Medicus tradit vitē à Baccho in Græciam è mari rubro translata, quapropter Græci, quū remetum inter cœnandum infertur mensæ, elato clamore bonū Deum vocāt illius inuentorem Bacchum. Tibullus Osirim vitisatorē laudat. Sunt qui Rheg vitem sacram dicant. Et eiusmodi deæ de vitē fieri simulacrum tradit Ephorion. Accius in Bacchis Dionysium primum vitem plantasse ait: O Dionysie: pater optime vitisator Semele genitus. Ouidius idem putat,

*Additur his Nyseus, in tonsuq; Thionens;*

*Et cum Læneo genialis consitor vna.*

Recitatq; de eo hanc fabulā. Quum amaret Iuppiter Semelem Cadmi filiā,

& ipsa



& ipsa ex eo concepisset, accessit ad eam Iuno, formam gerens Beroës anus,  
 initoque cum ea colloquio, perquisiuit num à Ioue diligeretur, cui respondit,  
 arbitrari se diligi. tunc docet Iuno, vt cognoscat si ametur, vt promittat Iup-  
 piter eo pacto secum coniungi, quo cum Iunone coniungeretur, interposito  
 Stygis iuramento. Semele experientiæ auida, venienti deo iuramentum, &  
 inde munus poposcit; condolens Iuppiter ne aduersus iuramentum ageret,  
 fulminauit, & è mortuæ vtero filium traxit, suoque apposuit femori, donec  
 tempus partus perficeretur. Hunc primum Iuno nutriuit, mox Nymphis tradi-  
 dit, quæ ei alimenta dedere, & ne à Iunone inueniretur, hederis occultauere.  
 10 Sed per hanc fabulam quid Physici intelligant enucleemus. Per Bacchum vi-  
 num intelligitur, per Semelem vitis, quæ ex Ioue, id est, ex calore in altum hu-  
 morem terræ immixtum per vitis poros trahente, se prægnantem, vel turgi-  
 dam facit, & in palmites, botrosq; succos, tanquam in conceptum fœtum e-  
 mittit, tunc fulminatur, quum adueniente autumnali calore, non in maturi-  
 tatem, sed potius in corruptionem conceptum fructum ducit, vnde aufera-  
 tur necesse est, & femori Iouis, id est, alteri calori applicetur, quod euenit  
 quum pressum vinum ad bulliendum traditur, donec bullitione defacatum,  
 potui aptum reddatur. Iuno in contactum fert, ne à Iunone, id est, ab aëre cor-  
 rumptatur, scilicet in vegete seruetur. Vel aliter sic. Semele prægnans ex Ioue,  
 20 id est, vitis vere turgens, fulminatur, id est, æstiuo calore concoquitur, tunc  
 apertis botris conceptum emittit, qui Iouis femori, id est, calori applicetur,  
 vt quod ex matre non habuerat, in vegete maturitatem concipiat. Iuno eum  
 occulit, id est, pampinis regitur, illum nutriunt Nymphæ, id est, nocturnis hu-  
 miditatibus instauratur, quod diurno calore fuerat exustum. Silenus senex  
 eius alumnus est, quod senes non esca, sed potu sustentantur. Semper Bacchus  
 est iuuenis, quod vini vires nunquam senescant. Nudus est, quod omnia se-  
 creta propalet. Græci Bacchum dicunt primum vitem plantasse Thebis, eisq;  
 primò vini usum demonstrasse, sed longè prius apud Hebræos. Noe vineam  
 plantasse certissimum est. Sed Phænedemus apud Athenæum aliam affert in-  
 30 terpretationem, dicens Athenienses haustum è dolis mustū ad ædem Bacchi,  
 quæ est in Limnis, deo miscuisse, deinde ipsos bibisse, ac propterea fuisse vo-  
 catum Bacchum Limnæum, quoniam aqua mista tum primum temperatum  
 mustum biberunt, eademq; ratione fontes, ac Nymphas, Bacchi nutrices ap-  
 pellari, quoniam aqua permista vinum augetur: quum igitur bibissent vinum  
 sic temperatum, læti ac hilares Bacchum versibus canebant. Philonides verò  
 ait, quibusdam ad litus maris compotantibus, intemperati vini voluptate de-  
 linitis, quum alii furiis acti insanirent, alii obruti vino, & crapula mortuis si-  
 miles conciderent, ingruente pluuia, poculum, in quo parum vini relictum  
 fuerat, aqua repletum fuisse, deinde factò sereno cælo, conuiuas in eundem  
 40 locum reuersos vinum dilutum gustantes, miram voluptatem sensisse: qua-  
 propter inter cœnandum quum infertur mensæ, clatò clamore Bacchum re-



pectorem inuocant, & Iouem seruatore, pluuiæ largitore, & vini moderatore. Infans etiam Bacchus effingitur, quia bibentes insanire facit. Cornutum pingebant, quia antiquitus cornuum bubulorum pro poculis usus erat, antequam inuenta alia essent vasa, & in Cizico tauri effigie colebatur.

*De vitis nomine. CAP. III.*

**H**ECATÆVS Milesius, ut diximus, auctore Athenæo à priscis illis Græcis vitē *οἰνός* dici, ab O Eneo satoris nepote ait. Ab aliis *ἀμπλος*. Latinis vitis dicitur. M. Varro à vino ferendo, siue quod inuitet ad spem percipiendarum vuarum. Alii vitem dictam dicunt, quasi vitam, propter multam humanæ vitæ quam affert vtilitatem. Vel vitis primū dicta videtur, quod inuitetur ad vuas pariundas. Et à pariendo parilema, ex imminutis literis, ut in multis dictæ præcepta est palma. Italis *vite*. Eius fructus succus à Græcis *αἶνος*. Colophonius Nicander vocatum censet ab O Eneo.

*Qui vinum pateras O Eneus diffundit in amplas*

*Οἶνον, quod retinet, nomen dedit.*

Idem recitat Melanippides Milesius. Plato in Cratylo vocis *οἶνος* rationem & originem indagans, sic dictam fuisse inquit, quod animum nostrum implet atq; *αἶνος*, id est, arroganti de nobis ipsis opinione, vel *οἶνος*, id est, vilitate, quam ex eo percipimus. Latini vinum. Itali *vino*.

*De vitis generibus, & primò de escariis. CAP. IIII.*

**V**IRGILIUS Maro vitium genera omnia colligere, nec vtile esse, nec possibile dicit,

*Sed neque quàm multa species, nec nomina quæ sint*

*Est numerus, neque enim numero comprehendere refert.*

*Quem qui scire velit, Libyci vel: æquoris idem*

*Discere quam multa Zephyro turbentur arena,*

*Aut ubi nauigiis violentior incidit Eurys,*

*Nosse quot Ionii veniant ad litora fluctus.*

Columella, Vniuersæ regiones, regionumq; penè singulæ partes habent propria vitium genera, quæ consuetudine sua nominant. Quædam enim stirpes cum suis locis vocabula mutauerunt, quædam propter mutationes locorum, etiam à qualitate sua discellerunt, vnde nec numerum, nec appellationes certa fide referre quis potest. Nos Plinium imitabimur, qui ait: Genera vitium numero cōprehendi posse vnus existimauit Democritus, cuncta sibi Græcia cognita professus: cæteri innumera, atq; infinita esse prodiderunt, quod verius apparebit ex vinis. Nec omnia dicentur, sed maximè insignia, quippe quæ totidem penè sunt, quot agri. Quamobrem celeberrimas vitū, aut quibus est aliqua proprietate miraculum, ostendisse satis erit. Nos primū vitis genus in satiuum & syluestre diuidemus, de satiuo primū, mox de syluestri dicturi. Sati-



unum genus aliud ad escam, aliud ad effusionem est, vocabant prisce escarias  
 vuas, quæ ad esum erant: ad effusionem, quæ vino effundendo plantantur. Lu-  
 bet Columella ad escarias vuas, non instituenda vineta, nisi quum tam subur-  
 banus est ager, ut ratio postulet, inconditum fructum mercantibus velut po-  
 mum vendere. Ex quæ non solum iucunditate saporis, sed etiam specie com-  
 mendentur. Nos à præcocibus incipiemus. Præcoces vites sunt, quæ ante con-  
 suetum tempus maturitatem sentiunt. Quæ prima nobis maturatur *Gingliese*  
 dicitur, quia Iunio mense mitescit, specie & sapore commendabilis, sed præci-  
 pue, quia prima exoptata venit: adhærent in racemo prægrandes, & minimi a-  
 cini: puto Plinii leptoragam. Est & illa natura lasciua, ut prægrandibus adha-  
 reant parui, mites & suauitate certantes, leptoragas has vocant. Apiana è præ-  
 cocibus est, præcipui gustus celeberrima, ad escam, & ad effusionem. Columel-  
 la ait: Magnis etiam dotibus tres apianæ commendantur, omnes feraces, iu-  
 go quæ & arboribus satis idoneæ: generosior tamen vna, quæ nudis foliis est,  
 nam duæ lanatæ quamvis frondibus, & palmitum pari facie fluxuræ, quali-  
 tate sunt dispariles, quum tardius altera recipiat cariem verustatis. Pingui so-  
 lo feracissima, mediocri quoque fecunda, præcoquis fructus. Ideoque frigi-  
 dis locis aptissima, vini dulcis, sed capiti, nervis, venis quæ non apta, nisi ma-  
 ture lecta: pluuiis, ventis quæ & apibus afferunt prædam, quarum vocabulo  
 propter hanc expopulationem cognominantur. Plinius: Apianis apes dede-  
 re cognomen, præcipue earum auida. Ex his duo genera lanugine &  
 ipsæ pubescunt. Distant quod altera celerius maturescit, quamquam & al-  
 tera properante. Situs frigidus non respuunt, & tamen nulla celerius im-  
 bre putrescunt. Florentinus præ cæteris eam celebrat. Ex omnibus vitibus,  
 quæ Myrsicis appellatur, præstantissima est: hæc est enim, quæ in Bithynia  
 vinum deandrogaleum appellatum facit, & rursus in aliis eius regionibus  
 riarenum vocatum. In Tio verò Paphlagonia rianum, & in Heraclea Pon-  
 ti præstantissimum vinum, & omnino ubicunque huius vini planta fue-  
 rit confecta, fructum multo aliis præstantiorem producit: nam & vua ipsi-  
 us in cibo iucundissima, & nectarea existit, ut etiam apes inde pabulum pe-  
 rant. Est autem & fertilis valde, ut per omnem caudicem botros ferat,  
 eos quæ rotundos, acinos verò perspicuos, ut & vinacea, & pelliculæ transpa-  
 reant. Cæterum appendices ex quibus dependent botri, ut plurimum duras &  
 lignosas habet. Gaudet autem maxime arboribus, & eiusmodi altitudine, &  
 frequenti pampinatione. At verò vinum ex his assidua defæcatione delecta-  
 tur. Græci stichit vocant. Nos Neapoli vulgò vuam moschatulâ dicimus, ab in-  
 signi moschi odore, quum estur. Maiores nostri moschum ignorabunt, ob id nequæ  
 his nequæ moscho redolentibus fructibus à moscho nomen imposuerunt. Duo-  
 rum est generum albi nigri quæ. Est & aliud genus vuarum omnium nobilissimum, quo-  
 solum ad escam vrimur (quum prædictis generibus ad escam, & effusionem vta-  
 mur) duro, & calloso corio, carne quæ, magnitudine cæteras antecellens, odorato



acnectareo succo, colore verè aureo : vulgo *moscarellone*. Ex temporaneis præcipuè duracina est. Plinius, Vua non aliubi gratior calla, vt inde possit inuenisse nomen, duracina. Constat enim carne, & duro corio, magno acino, saporis dulcissimi, coloris aurei nigriq; , maturatur æstate, magnatum mensis carissima, vulgo Neapoli *vua duraca*. Est & alterum genus minoris acini, sed durioris corii, quod in arbore sua vsque ad hyemem durat, suspensum verò laquearibus, vsq; ad nouarum prouentum. De his videtur Cato intellexisse, inquiens, Vuas, quas suspendas duracinas. Et ab eo Plinius : Duracina sine vllis vasis in vite seruabilis, tanta est contra frigora, æstus, tempestatesq; firmitas. Vesuuius vulgò dicuntur *rostole maiorine*, & *minorine*. Est & apud Columellam pergulanæ memoria. Nam has nuper mihi cognitæ, pergulas dico : ob id non faciliè asseuerem, quo gradu habendæ sunt. Dictam puto pergulanam, quòd pergulis viuat, retinetq; adhuc nomen *Romæ* : nam vulgò *pergolese* vocatur, præcipua apud Tiburinos. Neapolitani *vua groia*. duratq; suspensa vsque ad aliarum prouentum. Bumastos inter escarias vuas Columella cõnumerat, & specie insignes. A Virgilio inter præstantissimas cõnumeratur,  
 ——— *Tumidis bumasteracemis*.

Varro bumaminam vocat, atq; à magnitudine sic dictam putat, & à boue dici pleraq; magna, vt *βύσσυλον*, *βύπεινα*, *βύλιμον*, *βοῶπιν*, & vuam quoq; bumaminam. Plinius de eiusmodi vua, Tument verò māmatarum modo bumasti. Græcis *βύμας*, quasi bouis, siue vaccæ mamminam dicas, est enim mammarum modo figurata & magna. Retinet adhuc Neapolitanum vulgus priscum nomen, nam *vua mennanacca* vocat, *menna* enim vbera dicit, quasi vaccarum vbera. Duplex genus, album nigrumq; , quod non tacuit Plinius. Et bumasti totidem coloribus, scilicet albæ nigræq; . Sequitur Plinius : Et magis purpureæ cognomine bimammix, quando non racemos, sed vuas alias gerunt. Macrobius bumammiam non bimammiam dicit, nominis vicinitate deceptus. Hæc in Vesuuii monte reperitur, innominata & escaria. Prælongo constat racemo, acini non infarcti, vt in cæterarum racemis, sed bini acini à principio racemi vsq; ad finem, purpurei coloris. Sunt & ceraunix. Columella inquit : Nos vuam corneolam vocamus, Græcam nomenclaturam sequuti. *αίγας* enim cornu instar curuatur. Apud nos albæ, nigræq; est, & triferi prouentus. Quæ sit Columellæ vncialis declarat Plinius, velut à pondere acini. Neapoli vulgò dicitur *vua pruno* : nam acini prægrandes instar pruni, vt ab vnciali pōdere parum distent. Tripedaneæ nomen Plinius à mensura dici confirmat, nam longitudinem trium pedum racemus æquat. Sed harum apud nos multæ sunt species, vt non solum trium pedum longitudine sint, sed pondere triginta librarum. Inter alias vna est, quæ *vua San Nicola* vocitatur. Stephanitæ sunt Columellæ vuæ, de quibus Plinius, & coronatio naturæ lusu stephanitis, acinos foliis intercurrentibus. Hanc ipse non vidi, nec contigit ab amicis visam audire, sed plerasque conspexi, acinos foliis intercurrentibus, casu enatis. Nec reticebo speciem



Speciem nostris hortis familiarem, cuius acini immaturi nigri sunt, maturi  
 verò albescentes, ad illudendos amicos peridoneam, nam maturam ex colo-  
 re putantes, in os iniecta, illud acerbissimo sapore conturbat. Quæ fortasse  
 Theophrasti capnia vua erit, quæ ex nigro racemo candidum, & ex candido  
 nigrum præstat. Insanas vuas memorat Theophrastus, suiq; generis esse, quæ  
 non solum germinant, sed coquunt & florent, & racemantur, & si quid aliud  
 ad florem usq; tantummodo veniat. Plinius ab eo: Vites quidem triseræ sunt,  
 quas ob id insanas vocant, quoniam in iis alia maturescunt, alia nigrescunt, alia  
 florent. M. Varro author est, vitem fuisse Smyrnæ apud mare biferam.  
 10 Hæc apud nos vulgaris est, diciturq; *vua tre volte l'anno*. Germinat primò &  
 floret cum aliis, inde octavo calendæ Iunii circa festum diui Ioannis inci-  
 dunt palmitem supra florent, inde denuo germinans secundo floret, inter-  
 ea prima maturatur, tertio paulo post iterum floret, sed tertia vua hyemis  
 superuentu non maturatur, sed acerba tota hyeme in arbore asservatur. Sed  
 puto Plinii tempore non fuisse in Italia; quum quæ scripsit de ea, à Theo-  
 phrasto & Varrone mutuetur, (si de eâ intellexerit Theophrastus) tanquam  
 de re peregrina loquentibus. Numerantur quoque dactyli à Columella in-  
 ter vites bonitate, & specie commendabiles. Plinius ab eo: Prælongis da-  
 ctyli porriguntur acinis. Et alibi. Dactylides gracilitate digitali. Dactylos Græ-  
 ci vocant digitos, ob id palmæ fructus Græci vocant dactylos à digitorum si-  
 militudine. Hodie Neapoli *vua digitella* dicitur. Sunt enim acini digitis simi-  
 les, utriusque speciei albæ, nigræve, & æstate maturantur. Sunt & Virgi-  
 liæ Thasiæ, & Libycæ, Columellæ venuculæ & nemesiæ, Plinio etesi-  
 æ, & conseminæ, & talpanæ: Athenæo staphylæ, nicostratiæ, & in fine aliæ,  
 20 quas longum esset recensere.

*De vnâ ad effusionem.* CAP. V.

**D**IXIMVS vuas ad escam eligendas, nunc quæ eliquescent in potum. Pri-  
 ma omnium se offert aminea celebratissima. Virgilius:

*Sunt & aminea vites, firmissima vina.*

30 Cato, In loco ostento soli amineum minusculum conferito, qui si crassus,  
 & nebulosior, ibi amineum maius. Quæ in vllis, & ollæ in vinaceis recte con-  
 duntur. Columella hæc habet de amineis: Sole traduntur amineæ excepto  
 cæli statu nimis frigido, vbi cunq; sint, etiam si degeneret, sibi comparata, ma-  
 gis aut minus probi gustus vina præbere, & ceteras omnes sapore præcedere.  
 Ex eum sint vnus nominis, non vnâ speciem gerunt. Duas germanas co-  
 gnouimus, quarum minor ocyus & melius deflorescit, habilis arbori, nec non  
 iugo, illic pinguem terram, hic mediocrem desiderat, longeq; præcedit ma-  
 iorem, quia in bres & ventos fortius patitur: nam maior celeriter in flore cor-  
 40 rumpitur, & magis in iugis, quàm in arboribus, ideoq; non est vineis apta. vix  
 etiam arbusculo, nisi præpingui, & vuida terra: nam nec mediocri valet, multoq;



minus in exili, prolixarum frequētia materiarum, foliorumq; & uuarum & acinorum magnitudine dignoscitur, internodiis quoq; rarior, largis fructibus à minore superatur, gustu non vincitur, & hæc quidem utraq; amineæ. Verūm & aliæ duæ geminæ, quæ ab eo, quod duplices uvas exigunt, gemellæ vocātur, austerioris vini, sed æquē perennis. Earum minor vulgò notissima, quippe Campaniæ celeberrimos Vesuuii colles, Surrentinosq; vestit. Hilaris inter æstiuos Fauonii flatus, austris affligitur, cæteris itaq; partibus Italiæ non tam vineis quàm arbusco est idonea, quum prædictis regionibus commodissimè iugum sustineant materiam fructumq;, nisi quòd duplicem, non ab similem minori germanæ, quæ tamen minor, hoc melior est, quod fecundior etiam mediocri solo: nam illam nisi præpingui terræ non respondere iam dictum est. Lanatam quoque amineam quidam maximè probant, quæ hoc vocabulum non ideo usurpat, quòd sola ex omnibus amineis, verum quòd præcipuè canescit lanugine. Sanè boni vini sed leuioris, quàm superiores, crebram quoque materiam fundit, atq; ideo propter pampini densitatem, sæpè parum recte deflorescit, eademq; maturo fructu celeriter putrescit. Super hunc numerum singularis habetur aminea, maiori geminæ non dissimilis, primūm specie pampini, & trunci, sed vini sapore aliquanto inferior, quamuis generosissimus sit, proximæ præferenda etiam propriis virtutibus, nam & feracior est, & flore melius exuitur, spissasque & albas uvas, ac tumidioris acini gerit, gracili aruo non desiscit, atque ideo inter vberriimas vites numeratur. Ab eo Plinius: Principatus datur amineis propter firmitatem, senioq; proficiente vini eius ubiq; vitam. Quinq; earum genera. Ex iis germana minor acino melius deflorescit, imbres, tempestatesq; tolerat. Non item maior, sed in arbore, quàm in iugo minus obnoxia. Gemellatum, quibus hoc nomen uas semper geminæ dedere, asperimus sapor, sed vires præcipuæ. Ex iis minor austro læditur, cæteris ventis aëtur, ut in Vesuuii monte, Surrentinisque collibus, in reliquis Italiæ partibus non nisi arbori accommodata. Quintum genus lanatæ, ne Seres miremur, aut Indos, adeò lanugo eam vestit. Prima ex amineis maturescit ocyssimè atq; putrescit. Sed videamus num concere poterimus, quale nostris temporibus amineum sit vinum. Seruius in Virgilium, dicit amineum vinum dici quasi sine minio & à dictione priuatiua, & minio siue rubore, quasi album, non rubrum vinum sit. Macrobius inquit amineum vineum nuncupari à regione: nam Aminei populi sunt, ubi nunc Falernus est. Nos verò ex noris, quas affert Columella, dicimus amineum vinum esse nostrum vulgare Græcum: nam nobilissimæ notæ est inter cætera, diutiusque in vetustatem asseruatur, ut etiam centum annorum reperiatur. Inter cætera id peculiare habet, quòd uvas geminas ferat, nulliq; nisi ipsi contingit, scilicet racemum in duos diuisum. Duas solū species vidimus, minorem, quam græcam dicimus, maiorem græculam. Eius vites Vesuuium montem conuestiunt, repēdentem fructu illata damna, ut inueniat apud posteros gratiam,



gratiam, cinere & conflagratis saxis, & calore suo vino vim tribuit. In patria  
 potum caput tentat, mare transuectum, vi domita, mirefcit, fitq; suauius. Pu-  
 to alias species prope Beneuentum reperiri: nam ibi fimillimas nostris vuas  
*ammignas* vocant, nobilissimumq; vinum fundunt, etiam nostro Græco si-  
 millimum. Sunt & Columellæ heluolæ, quas ab aliis varias dici testatus est,  
 neq; purpureæ, neq; nigræ, ab heluo, ni fallitur, colore vocitatæ, melior est  
 nigrior abundantia vini, sed hæc sapore preciosior: color acinorum in neutra  
 conspicitur æqualis, vtraq; candidi musti, alterna vice annorum plus, aut mi-  
 nus afferunt; melius arborem, sed & iugum commodè vestiunt, mediocrā  
 10 quoq; solo fecundæ. Ab eo Plinius: Insignes iam colore, inter purpureas, ni-  
 grasq; medio heluolæ, sæpius varianti, & ob id varianæ à quibusdam appella-  
 tæ. Præfertur in his nigrior, vtraq; alternis annis fertilis, sed melior vino, quum  
 parcior. Athenæus: Heluolū principio nigrum, aliquot post annis, non ita mul-  
 tis albescent. Apprimè bonum est, & delicatū. Ergo nostras hellanicas helu-  
 colas antiquorū dicerē. Duæ sunt species, altera altera nigrior, & extra Cam-  
 paniam vidi dilutioris coloris, in Surrentinis vineis propè album vinum pro-  
 ducit; purpureiq; sunt coloris, alternis annis fertiles, ob id apud nos alternis  
 annis putantur: & si sint qui singulis annis parcius rescent, Vinum quod fun-  
 dunt, Vesuuiio *lachrymam* dicunt, secundæ post græcum notæ. Oleagineam  
 20 Columellæ, & Plinii, dictam putant à similitudine oliuæ, nuper inuentam.  
 Apud nos adhuc suum retinet nomen, nam vua oliuella dicimus, vrimurque  
 eadē effusionem, Plinio alopecis dicitur caudam vulpium imitata, hæc etiam  
 vsq; ad præsens tempus à vulpine caudæ similitudine, *coda volpe* vocatur. Sunt  
 & alie, quas longum esset recensere, & lectoribus nauseam potius, quàm v-  
 tilitatem parerent, ob id consulto omittimus,

## De vinis. CAP. VI

Nunc aliqua vinorum genera, & præcipuè insignia, à maioribus de-  
 scripta recensere conabimur. Plinius, Gauranas vites, à Falerno agro  
 translatas, vocari falernas, celerrimè vbique degenerantes. Falernus ager à  
 30 ponte Campano læua petentibus vrbānam coloniam Syllanam nuper Ca-  
 puz contributam incipit. Secunda nobilitas Falerno agro erat, & ex eo ma-  
 xime Faustiano, cura, culturaque id collegerat. Exolescit hoc quoque, co-  
 pia potius, quàm bonitati studentium. Faustianus autem circiter quatuor mi-  
 liaria à vico prope Cedis, qui vicus à Sinuessā v i millibus abest. Nec vlli  
 in vino maior authoritas, solum vinorum hoc flamma accenditur. Tria eius  
 genera, austerum, dulce, tenue. Quidam ita distinguunt. Summis collibus  
 Gauranum gigni, mediis Faustianum, imis Falernum. Non omittendum au-  
 tem, nulli eorum, quæ celebrantur, iucundum saporem vix esse. Dioscorides  
 inter alia vina principem locum obtinere dicit, quod facile coquatur. Græci



phalernum vocant: duo eius genera; austerum, ac subdulce: quod sit eiusmodi, si per vindemiam Auster fiat, & vinum nigrius sit: alio tempore & vento, quum est vindemia, tum austerum vinum fit, ex colore giluum. Athenæus ex Galeno. Hodie ager, ubi falernum nascitur, vulgò *alla falorni* dicitur, *alla rocca di Mondragone*. Ex eo non multum colligitur vinum, ut vix triginta vegetes impleat. Album est vinum & optimum. Malleoli variis in locis translati degenerant, & vernaculum vinum fundunt. Plinius, Ad tertiam palmam varia venere. Albana vrbi vicina, prædulcia, ac rara in austero. Hæc Romæ placent, sed non conferenda cum Neapolitanis. Item Surrentina, in vineis tantum nascentia, convalescentibus maxime probata propter tenuitatem, salubritatemque. Tiberius Cæsar dicebat, consensisse Medicos, ut nobilitatem Surrentino darent, alioquin esse generosum acetum. C. Cæsar, qui successit illi, nobilem vappam. Dioscorides & Galenus: Surrentinum post annum vigesimum quintum incipit aptum esse potui. Vix sanè hoc maturescit, quia valde squalidum, & omnino pinguerudinis expertus: solum propemodum ex omnibus, quum inueterascit, assiduo potu salubre. Nunc non solum tertiæ notæ, sed ne dignum quidem inter præfata numerari, idque euenisse puto, vel antiquos gustu caruisse, vel vitibus, quæ vinum illud fundebant; nunc locus omnino destitutus: nam diximus ex Columella, Vesuvii & Surrenti colles amineis vitibus plantatos: nunc ex vernaculis leue vinum fundunt, agris propinatur, quod facile concoquatur. Iuncta his præponi solebant calena, ait Plinius. Vbi Calenus ager fuerit alibi Plinius. Hinc Setini, & Cæcubi obrenduntur agri. His iunguntur Falerni, Caleni. Dein conturgunt Massici, & Gaurani Surrentinique montes. Locus hodie *Cacinola* vulgò dicitur, vel stellatus ager. Vinum est optimum, nec à Falerno longè distat, vulgò *vinno di Carinola*. Antea Cæcubo erat generositas celeberrima, in palustribus populeis, sinu Amyclano, quod iam intercidit, incuria coloni, locique angustia, magis tamen fossa Neronis, quam à Baiano lacu Ostiam usque nauigabilem inchoauerat. Ob fossam igitur, quam Nero perducere ætterni animo cogitauerat, Amyclensium ager deuastatus est, & sic cæcubum vinum disperiit, hodie incognitum, indictumque. Plinius de Mamertinis: Quartum curriculum publicis epulis obtinuerit à Diuo Iulio (is enim primus auctoritatem his tribuit). Mamertina circa Messanam in Sicilia genita. Mamertinum hodie Siciliæ celeberrimus locus, *Sanoca* dicitur, vulgò *vin di Sanoca*, prope Mamertum. Optimæ quoque notæ censebatur vinum trifolinum. Galenus libro de antidotis trifolinum collem in agro Neapolitano esse dicit, & Neapoli imminere, à multitudine trifolorum ibi nascentium dictum putat, scilicet asphaltitis. Athenæus, Serius peruenit ad vigorem trifolinum, Surrentino crassius. Mons Neapoli imminens dicitur hodie, *monte di San Martino*, prope Antinianum, & mari immi-



imminens, vbi villa mea, optimum vinum ex omni vua, & cum cæteris certans  
 producit. Trebellium è Neapoli, temperatis viribus est, ori iucundum, ansicum  
 ventriculo. Trebula olim in apertis campis inter Capuam, & Sueffulam stetit,  
 nunc solo æquata, vbi cadauer iaceat ignoratur. Plinius: Campania nuper ex-  
 citauit nouis nominibus auctoritatem, siue cura, siue casu, ad quartum à Nea-  
 poli lapidem Trebellicis, iuxta Capuam Caulinis, & in suo agro Trebularis,  
 alioqui semper inter plebeia, & trifolinis gloriata. Nec hodie spernendum vi-  
 num fundit ager iste, vnde à similitudine puto vinum *trebianum*, quod è Flo-  
 rentia affertur. Creticum ad nos è Creta aduehitur, dicitur hodie *maluasia di-*  
 10 *Candia*. Putat Hermolaus monobasitis vocabulo corrupto, *maluasia* dici,  
 coniecturæ causa, quòd locus vbi Tanarum in Laconia monstratur, Mono-  
 basia dicitur, vnde in Cretam directo ferè cursu nauigatur. Forteque mono-  
 basites vino datum est nomē, non quod ibi nascatur, sed quod illuc primum è  
 Creta comportaretur. Vites, quæ illud fundunt, videtur Plinius græculas ap-  
 pellasse. Græcula non inferior amineis bonitate, præterea acino, & vua tam  
 parua, vt nisi pinguisimo solo colere non proffit. Apud nos hæc vua maluasias  
 vulgò dicitur, tenera, & paruo acino, & dulcissima, sed apud nos tam austerum  
 vinum, vt in Creta non profundit. Rhetia, oppidum apud Veronam, vbi cele-  
 bratissimum vinum nascitur, ibi *veraccia* vocat, sed nescio an cum brutio con-  
 20 tendere possit, omnium optimum & celebratissimum.

De vitis descriptione. C A P. VI.

SE D vitis figuram, Theophrasto describente, ad eam. Vitis arbor est, sim-  
 plici caudice assurgēs, ramosa, nodosa, surculosa, nec facile dissolubilis. Cor-  
 tex multiplici tunica cingitur, qui radicis speciem gerit, qui humore, & neruo  
 constat. Medulla carnosa. Flagellis longè, lateque vagantibus, sarmentis la-  
 ta fronde lasciuiantibus, aliquatenus scissā, longis pediculis pendente, car-  
 nosa, nervosa, corticosaq; & tremula. Sed caduca. Ad Elephantidem verò, &  
 circa Memphim, Deltam, & Tylum quoque indecidua. Flore sanguineo, qui  
 fructum ambit. Fructus ex pluribus acinis acervatus aquosus. Seminibus tu-  
 30 nica clausis. Exceptis quibusdam vitibus, quæ ad fructum peruenire nequeunt,  
 sed ad florem vsq; perueniunt. Ramuli, qui nuper proueniunt, nodosiores &  
 tactu asperrimi sunt, vt enim nodus in cæteris, ita gemma in vite, & geniculum  
 in arundine, minimum enim in iis internodium interiacet, si continuò ramos  
 succidas purgēsve, excelsa prouenit, si relinquant, brevis assurgit. Auctu facilis,  
 quia natura humida, solutaque est. Brevis eius vitæ tractus, diurna enim per-  
 petuaque fœtura solutione, natura exhausta fathiscit, quoniam vis omnis ab-  
 sumitur, quod & in animalium genere patet, nam quæ plura patiunt, celerius  
 consenescent, & pereunt. Radices habet tenues. Prolem sursum versus pro-  
 creandi vim obtinet. Ex supernis partibus nascitur. Fructificat ex nouello, & si  
 40 aliquando ex caudice fœtificat, ex rei temeritate potius euenit. Amplexi cau-  
 lis est, semper enim cui adnataur quærit, vitam enim super aliud ducit, si peda-



mentum desit, humi repit. Dedit ei Natura capillamenta quædā, quasi manūsculas, quibus præsidia applicet, vel se aduoluat palis. Varro ex Theophrasto Ad Elephantinam vites non amittunt folia. Propter eandem causam vites sunt biferae apud mare Smyrnæ. Parit capreolum. Is est coliculus nitens intortus, ut cincinnus, is enim vites ut teneat, serpit ad locū capiendum, ex quo à capiendo capreolus dictus. Cicero ita depingit: Vitis natura caduca est, nisi fulta sit ad terram fertur, eadē ut se erigat, clauiculis suis, quasi manibus quicquid est nacta complectitur, quam serpentem multiplici lapsu & erratico, ferro amputans coercet ars agricolarum, ne in omnes partes nimia fundatur. Ita quæ ineunte vere, in iis, quæ relictæ sunt, existit tanquam ad articulos sarmentorum ea quæ gemma dicitur: à qua oriens vna se ostendit, quæ & succo terræ, & calore solis augescens, primò est peracerba gustu, deinde maturata dulcescit, vestitaq; pampinis, nec modico tempore caret, & nimios solis defendit ardores. Qua quid potest esse tū fructu latius, tū aspectu pulchrius? Plinius ab his: Folio longo pediculo innixo. Sola bis parturit, quū primū emittit vna, iterū quū digerit. Statim ingermine floret, properatq; in eo, sed maturascit tardē. Cortex membranaceus, qui spontē rumpatur. Succus fructuum aquosus. Natura sublimitatis avida, vites arboribus nubunt, maritasq; complexæ, atq; per ramos earum procacibus brachiis geniculato cursu scandentes, cacumina æquāt, in tantū sublimes, ut vindemiator aut horatus rogem, actu mulum excipiat. Nullo fine crescunt, diuelliq; aut auelli nequeūt. Villas, & domos ambiri singularū palmitibus, ac sequacibus loris Valerius Cornelius existimauit: subdiales inambulationes umbrolis pergulis opacat vna vitis Romæ.

*De cælo vitibus conuenienti. CAP. VII.*

**N** Vn e idoneū vitibus cælū eligemus. Theophrastus loca vitibus determinare haudquaquā facile esse dicit: nā & differentiæ ratione Solis ascendentis, vel occidentis, vel mediū cælum tenentis vel aliquammodo se habentis scire nimirum condecet, tam ex toto, quā in iis, quæ genus idem consortiuntur. Cato, Quia infinita sunt vitium genera, unicuiq; suum cælū tribuit. Locus, qui ostentus Soli, amineo minusculo, & gemino euganeo & heluolo minusculo tribuatur. Si crassus, aut nebulosior, ita amineū maius, aut murgentinū, aut apiciū leucanū serito. Varro vineis collinas tribuit. Columella inquit. Vitis, cū omni penè regione, & omni declinatione mūdi, nisi tantū glaciali, vel perferuida curæ mortaliū respōdet, et si tā felix campis, quā collibus provenit, & in densa non minus, quā in resoluta terra, gracili, pingui, sicca, vliginosaq; refert tamen cuius generis, aut quo habitu vitē pro regionis statu colere cōteas, neq; enim omni cælo, solove cultus idē, neq; est idē stirpis eius genus, sed suū cuiq; regioni magis, aut minus aptū esse docet vsus. Exploratū habebit prudēs agricola. Genus vitis habile cāpo, quod nebulas, pruinam, cæli siccitatem ventosq; patitur. Pingui agro dabit gracilem vitē, nec nimis fecundam, macroferacē, densæ terræ vehementem, multaq; materie frondentem, resoluta & lato sol-



Iorari sarmenti, humido loco fructus non teneri, & amplioris acini, sed callosi, & angusti frequentisq; vinaces, sicco contribui diuersæ naturæ semina. Frigido, nebulosoq; duorum generum vites aprabit, seu præcoques, quarum frugum maturitas præcurrit hyemem, seu firmi, duriq; acini, quarum inter caliginis vix deflorescunt, & mox gelicidiis ac pruinis, ut alia, caloribus mitescunt. Ventoso quoq; & tumultuoso statum cæli fidentes easdem tenaces, & duræ acini committet, rursus calido, vberiores, tenerioresq; concredet. Sicco destinabit eas, quæ pluuiis, aut continuis roribus putrescunt: rosido quæ siccitatibus laborant, gradinosis, quæ duris foliis latisq; sunt, quo melius protegant fructum. Placida & ferena regio omnes recipit, sed commodissimè eam, cuius vel vix, vel acini celerius decidunt. At si voto eligendum vineis cælum, neq; glaciale, neq; æstiosum desiderat, calido tamen potius, quàm frigido lætatur, imbribus magis, quàm serenitatibus offenditur, per flatu modico leniq; gaudet, procellis obnoxia est. Et alibi ex opinione Salernæ refert: Vineæ solis ortum spectabit, mox deinde meridiem, tum occasum. Sed Tremellius Scrofa præcipuam positionem meridianam censet. Virgilius de industria occasum repudiavit:

*Nève tibi ad solem vergant vinea cadentem.*

Democritus & Mago laudant cæli plagam septentrionalè, quia existimant et subiectas vineas feracissimas fieri: sed bonitate vini superantur. Sed ipse præcipit Frigidis locis vinea meridiano subiiciantur, tepidis orienti, si non instent austro, euroque. Si prædictis ventis obnoxie fuerint, melius Aquiloni, vel Faunio: feruentibus regionibus, ut Ægypto, & Numidia vni septentrioni. Plinius à Columella hæc habet: Vinearum ratio est, quas in horas spectare debeant. Virgilius ad occasum feri damnavit. Aliqui sic maluerè quàm in exortu. A pluribus meridiè probati aduerto, nec arbitror perpetuum quicquam in hoc præcipi posse. Ad soli naturam, ad loci ingenium, ad cæli cuiusq; mores dirigenda solertia est. In Africa meridiè spectare vineas, & si viti inutile, colonis salubre est, quoniam ipsa meridianæ subiaceret plagæ, quapropter qui ibi in occasum, aut septentriones cõferet, optimè miscebit solùm cælo, quum Virgilius occasum improber. Nec de septentrione relinqui dubitatio videtur. At qui in Cisalpina Italia magna ex parte vineis ita positis, compertum est nullas esse fertiliores. Multum rationis obtinet venti. In Narbonensi prouincia, atq; Liguria & parte Hetruriæ contra Circium ferere imperitia existimatur, eundemq; obliquum excipere, prouidentia: is namq; æstates ibi temperat, sed tanta plerumq; violentia, ut auferat recta. Palladius in Ianuario, & Februario Columella præcepta recitat. Democritus præter ea, quæ Columella dixerat, hoc habet noui. Maritimi loci ad vitem apti sunt, tum ob caliditatem, tum ob humiditatem, quæ latenter è mari excurrentis plantas nutrit. Sed & venti marini vitibus sunt commodissimi. Plerisque videtur vicinum fluvium non esse habendum, multò magis paludem ob nebulas, & ob frigidas auras. Inde enim assidue respirant, simulque exurgunt rubigines, vitem & sata obledentes. Scire expedit, quod quæcumq;



vites à ventis eiusmodi lædi consueuerant nebula, & rubigine, hæ arboribus maritate amplius non lædentur. Quintilii non spernenda dicunt: Concauæ regiones multum vinum faciunt, sed vitiosum, altæ verò melius, nimirum cocto fructu à vento, & alio aëris temperamento, & maximè à Solis potentia. Sol si multum calefecerit, validius, potentius & dulcius vinum facit. Luna sola vuas maturas facit, calida, & humida existens. Multa insolatione, & perflatione opus est, quo durabilius fiat vinum, & citius ad vigorem perueniat. Ex calidis regionibus durabilius vinum, & cruditatem aliquam habentibus, exoletum, & infirmum. Si vitis paucas vuas produxerit, potentius producit vinum, utpote alimento, & viribus omnibus in fructum illum absumptis. Virgilius 10  
colles vineas amare cecinit,

*Bacchus amat colles.*

Quicquid ex physiognomoniam vitis de cælo ei conuenienti conici potest, optime à Columella exaratum est. Frigido, & nebuloso, quæ hyemem celeri maturitate præueniunt, quæ duris acinis, inter caligines securius florent, ventoso stabiles & tenaces, calido grani tenerioris, & humidi, sicco ex, quæ pluuias ferre non possunt.

*De soli qualitate vitibus conuenienti. CAP. VIII.*

**Q**UO T genera telluris, tot vitium genera affirmat Theophrastus, quæ si secundum naturam seruntur, frugifera prodeunt, quum præter natu- 10  
ram, facile sterilescunt. Serit enim solo sitienti, & solido vites solidas, tam generis nigri, quàm candidi, sed ex toto ferè nigrum solidius est. Solo autem pluuiio solutas committit. Dignosci densæ atq; solutæ suis possunt medullis, quas in abscissis nouellis palmitibus scrutari oportet. Habet enim, quæ soluta est, plus medullæ, quàm ligni, contrà quæ densa, plus ligni, quàm medullæ. Quod utraq; solo illi conueniat, his rationibus constat: quibus enim plus inest medullæ, his meatus ampli, multiq; sunt, quibus autè minus, his angustii, & pauci, quo fit ut minus alimenti desiderant, quæ denso corpore constant, & simul humorem ad æstatem seruare facile possint, sol enim ob densitatem haud æquè potest educere. Quum igitur tam exigua detractio fiat, radices quantum 30  
satis sit, ad fructificandum suppeditant, solutæ autem illæ, quum detractio largè, accessio parce ob telluris siccitate magatur, palmites imbecilles, fructusq; imperfectos progenerant. At agro pluuiio genus id conuenientissimum est, utpote, quod copiam alimentum largam desideret, & quàmuis multum adimatur humoris, tamen quò sol magis educit, eò vis plus & in amplitudine proficit, & in fecunditate: pabulo enim abundat, idque exuperat, facillimeq; percoquit. Solum prætense iccirco vitibus optimum habetur, quia non modo facile multumq; pingue, sed etiam humidum sit. Vitis enim plurimam desiderat aquam, eo quod in suo fructu humoris plurimum habeat, & imbris 40  
certè vi sui humoris maximè resistere potest. Sin autem ager, neque au-  
dus



10 *us neq; pluuius sit, sed medium teneat, media conferenda sunt, id est, quæ neque densa sint, neq; soluta. Et alibi. Pratenſe, & arenaceum vitibus percommodum est, & ad summam quod solutum, leue, tenue, atque humidum, ita ut aqua cœlestis intestino humori valeat permisceri. Vitis nanq; largam copiam alimenti desiderat, quia calida, laxa, humida, & fœcundissima est, forsitan & ob hæc eadem fœcundissima. Ad hæc radices humidarum plantarum haud facile putrescere possunt, quemadmodum illarum quæ suapte natura siccescunt, itaque attrahere, & resistere, & transmittere nimirum valent. Aliisq; in locis eadem dicit, solidas spissasq; vites loca montana amare, solutas verò & humidas planis gaudere. Virgilius agrum describit vitibus aptum:*

*At quæ pinguis humus, dulciq; vligine lata,  
Quiq; frequens herbis, & fertilis vberè campus,  
Qualem sæpè cana montis sub valle solemus  
Despicere, huc summis liquuntur rupibus amnes,  
Felicemq; trahunt limum, quique editus Austro,  
Et felicem curuis inuisam pascit aratris,  
Hic tibi præualidas olim, multoq; fluentes  
Sufficiet Baccho vites: hic fertilis vna.  
Quæ tenuem exhalat nebulam fumosq; volucres,  
Et bibit humorem, & cum vult ex se ipsa remittit,  
Quæq; suo viridi semper se gramine vestit,  
Nec scabie, & salsa ledit rubigine ferrum.  
Illa tibi latis intexet vitibus vltimos:  
Densa magis Cereri, rarissima quæq; Lyao.  
Salsa autem tellus & quæ perhibetur amara,  
Nec Baccho genus, aut pomis sua nomina seruat.*

20  
30  
40 Columella ex Græcini sententia decernit nimium calidum solū non posse tolerare vitem, quia inurit, neq; prægelidum, quoniā velut stupentes & congelatas reddit radices: neq; humidum, quoniā quum se promūt vites, modico tepore euocāt humorem terræ iueto maiorē, qui putrefacit deposita semina. Nimiam siccitatem destituere plantas naturali alimento dicit, aut in totum necare, aut scabras & retorridas facere. Perdensam humum cœlestes aquas non sorbere, nec perflari, perrūpi, & præbere rimas, quibus sol ad radices penetret, eademq; clausa semina comprimere, & strangulare: ratā transmittere imbrem, ac sole & vento siccati, grauē cultura non vincibilē, leuem vix sustineri, latā luxuria, macram ieiunio laborare, sed inter has medio temperamēto opus esse. Alibi habet, quæ ex Theophrasto excepit. Pingui, & vberi agro dabit gracilē vitem, nec natura nimis fœcundā, macro feracem, terræ dēta vehementē multaq; materia frondentē, resoluta & læto solo rarifarmēti, humido loco sciet nō rectē mandari fructus teneri, & amplioris acini, sed callosi, & angusti, frequentisq; vinacei. Sicco diuersæ naturæ semina cōtribui. Celsus gi-



tur ita eligit. Nec densum nimis, nec resolutū, soluto tamē propius solum, nec exile, nec latissimū, proximū tamen vberi. Nec campestre, nec præceps, simile tamen edito cāpo. Nec siccum nec vlginosum, modicē tamen roscidū, quod fontibus non in summo, non in profundo terræ scaturiat, sed vt vicinū radicibus humorē subministret. Eumq; nec amarū nec salsum, ne saporē vini corrūpat. Et alibi, Locis pinguibus planis & humidis, præcoques vites serito, raris acinis breuibus nodis imbecillas: nam tali generi vitiū eiusmodi ager aptus est. Locis aridis, & macris, & siccis vitem serere, natura feracē, & validam crebrisq; acinis conuenit. Quod si pingui agro validas vites deposueris, pampinis magis luxuriabuntur, & qualemcunq; fructū rulerint, ad maturitatē non producēt. Rursus imbecille exili agro celeriter deficient, exiguumq; fructū dabunt. Palladius id noui addit: Tosus & alia duriora, vbi gelū relaxantur, & solibus, pulcherrimas vineas ferunt, refrigeratis æstate radicibus, & humore detento. Sed & solus glareæ, & calculosus ager, & mobiles lapides (si tamen hæc omnia glebis se pinguibus miscuerint) & lilex, cui terra superpe sita est, quia frigidus est, & humoris tenax, radices æstate sitire non patitur. Item loca, ad quæ decumini-  
bus terra decurrit, vel valles, quas fluminū saturabit aggestio, sed hoc in iis locis, quæ gelu, & nebulis infecta esse non possunt. Argillosa terra commoda est, argilla autē sola grauitè inimica. Niger sabulo, & rubēs vtiles est, sed cui fortis terra permista est. Carbunculus nisi stercoretur, macras vineas reddit. In rubrica difficiliter cōprehendunt, quāvis postea nutriantur. Sed hoc genus terræ operibus inimicū, quia paruo humore nimis madescit, & paruo sole nimis durefcit. Maximè vtile solum, quod inter omnes nmiētates tēperamentum tenebit. Optimam terram Florentinus probat, quæ nigra, non densa, nec glutinosa, humida, dulcis aquæ: nam talis terra susceptum imbrem trāsmittit, nec in superficie detinet: aqua in superficie detenta putrefacit stirpes. In prædicta terra alba vitis plantanda, quia copiosiore alimento è terra indiget, solida, densaq; existens, & ægrè nutritibilis. Argillosa terra nisi valdè tenuis fuerit, & irrimas laxata, vites albas suscipit, sed arida, tenui, & arenosa terræ eiusmodi vites non conueniunt, sed quæ densi s habent acinos, & albam medullā, vt plurimum nigra vna talis existit, bonū, & multum, & durable vinum produuens; contrario modo habens ad albas natura ægrè nutritibilis. Humidas vites in squallidis, frigidis, aridisq; locis plantabis, siccas in humidis, vt quod vitibus deest, soli natura expleatur. & cætera habet, quæ ex Columella diximus. Eadem quoq; Plinius. Nec erit necesse nobis physiognomiā tradere vitiū, vt quali terra delectetur cognoscām, quū vberimè à Columella tractatū sit, & Theophrastus. densioris ligni vites solidū solū, laxioris verò humidū expetere & similia.

*Quid vinea, & quot eius species.* CAP. IX.

**I**A m ad serendi modum deuentum est, sed dicere prius oportet, quid vinea, & quot eius species. Vineam dicimus locum, in quo multitudo vitiū constituta est. Vinerum vero locum vineis abundantem. Columella inquit: Cui vine-  
tafa.



20 *ta* facere cordi est, faciat vitiatum, ex quo possit agrum vineis vestire. Varro vinearum species recenset: Vinearum multarum species, alia humilis, & sine ridicis, ut in Hispania, alia sublimis, quæ appellatur iugata, ut pleræque in Italia. Sublimis, quibus stat, pedamenta dicuntur, quæ transuersa iunguntur, iuga & inde iugata. Iugorum genera quatuor, pertica ut in Falerno, arundo ut Arpino, restes, ut in Brundusino, vites, ut in Mediolanensi agro. Iugationis species duæ, vna directa, ut in agro Canusino, altera compluviata, in longitudinem & latitudinem iugata, ut in Italia pleræque. Primum genus iugorum est pertica, quarrit salicta, secundum arundineta, tertium iuncera, quartum arbuta, ubi traduces vitium fieri possunt, ut Mediolanenses faciunt in arboribus. Pedamentum quatuor generum, vnum robustum, fit è quercu, vel iunipero, alterum è pertica, melior è dura, quia diuturnior, tertium in horum subsidium mittit arundinetum, aliquot enim libris colligatas, dimittunt in tubulos fictiles cum fundo pertuso, quæ humor aduentitius transire possit. Quartum est natium, ubi ex arboribus in arbores traductis vitibus fit vinea. Vinearum altitudinis modus, longitudo hominis. Interualla pedamentorum, quæ boues victi arare possint. Vineæ minus sumptuosa, quæ sine iugo ministrat vinum Cuius genera duo, vnum in quo terra cubilia præbet vitis, ut in Asia, alterum, quæ vitis è terra sustollitur bipedalibus furcillis, quas facta vindemia, reducunt hybernatum in teeta, ut alio anno uti possint, ut Reatinum in Italia. Vbi terra humida, altius vitis tollenda est. Columella de cultura prouincialium vinearum ait: vites vel breui crure per se stant, deinde quæ pedamentis adnixæ, singulis iugis imponuntur, quas rustici canteriatas appellant. Mox, quæ defixis arundinibus circumuinctæ per statumina calamorum materiis ligatis in orbiculos, gyrosque, flectuntur. Vltima est conditio stratarum vitium. Plinius ab Varrone: Vinearum quinque generum. Sparsis per terram palmiribus, aut per se vite subrecta, vel cum adminiculo sine iugo, aut pedata simplici iugo, aut compluviata quadruplici. Quæ pedata ratio erit, eadem intelligitur eius quoque, in qua sine adminiculo vitis per se stabit, id enim non fit, nisi pedamenti inopia. Simplici iugo constat porrecto ordine, quem canterium appellant. Melior ea vino, quando sibi ipsa non obumbrat, assidueque sole coquitur, & afflatum magis sentit, & celerius rorem dimittit. Pampinationi quoque, & occationi, omni que operi facilius. Super cætera de flore scit utilius. Iugum fit pertica, aut arundine, aut crine, funiculove, ut in Hispania, Brundusioque, Compluviata copiosior vino, dicta à cauis adium compluuiis. Diuiditur in quaternas partes, totidem iugis.

*Quod modis nascantur vites, & de earum satione. CAP. X.*

40 **V**ITIS primò semine nascitur, omne enim quod semine fert, è semine nascitur. Theophrastus huc sationis modum improbat: nam omnino degenerare ait, quia ex vige nobili, ignobilis nascitur, & sæpè diuersa genere exit, nonnunquam nil penitus urbanum, sed planè syluestre prouenit, & adeò quandoque,



ut fructum perficere minimè queat. Quædam fructum ne compilare quidem valent, sed ad florem vsq; tantummodo veniunt. Ab eo Plinius: Ex semine autem quanquã dissimili ea quoq; quæ & aliis modis feruntur, ut vites. Nascentur & auulsione. Idem, Et aliud genus simile naturam ostendit, auulsiq; arboribus stolones vixere. Quo in genere & cum perna sua auelluntur, partemq; aliquam è matris quoq; corpore auferunt secum simbriato corpore, & hoc modo plantatur vitis. Nascentur quoq; ex surculo. Quæ ex supernis partibus nascuntur (inquit Theophrastus) paucissima sunt, quemadmodum quæ ex palmitibus vitis proueniunt: ista enim nec ex prora, sed ex palmitibus exeunt. Impossibile enim est ex mediis nasci, quoniam eiusmodi partes mediæ exuæ, lignosæq; sint, & asperæ, contra verò facilè, quæ summæ, teneræ humectæq; sint, ceu palmes & crada. A quo Plinius: Vitibus media licciora, & è summa parte conceptus, idè illinc surculi petuntur. Plinius: Vitium numerosior satus. Primum omnium nil feritur ex his, nisi inutile, & deputatum in sarmento, ut videbimus in sequenti.

*De vitis & malleoli electione & quid malleolus. CAP. XI.*

**D**IXIMVS vitæ ex superiori surculo optimè generari, & hic modo tutior, vsitatiorq; nunc de vitis, & malleoli electione differemus. Ex Columelle doctrina duplex electio facienda est, & vitis, ex qua semina petantur, eiusq; partiū, quæ genitales, & maximè fertiles: & malleoli. Vitis, cuius progeniē studemus submittere, fœcunda non tantum eò existimari debet, quod vvas cōplures exigat, potest enim id ex trunci vastitate, & palmitū frequētia euenire, nec ferax, quod in singulis sarmentis singulæ vuæ conspiciantur, sed si per vnumquemq; pampinū maior vuarū numerus depēdeat, si ex singulis gemmis compluribus materiis cū fructu germinet, si deniq; etiā è duro virgam cum aliquibus racemis citet, si etiā nepotum fructu gruida sit, ea destinari debet legendo malleolo. Nec item ancipitem habeat floris euentū, ne difficulter acinis ingrandescant, ne aut præcoquem, aut seræ maturitatis fructum afferat: nam illa volucris, hæc tempestatibus hyemis infestatur. Nec vitis ipsa vna cōprobeatur vindemia: nam vel anni prouentu, vel aliis causis etiā infœcunda poterit semel exuberare. Sed pluriū emeritis annotū stipendiis indubitata fides cōstituat. Nec tamē ultra quadrienniū talis extenditur inquisitio: nam id tempus stirpium omnium generositatē declarat, quo sol in eandē partem signiferi per eosdem numeros redit, per quos cuius sui principium cœperat, quem circuitum meatu dierum integrorum mille quadringentorum sexaginta vnus, *annus solis* vocant studiosi rerum cœlestium. Ex hac, fœcundissima stirpe legendum censemus malleolum. Malleolus est nouellus palmes innatus prioris anni flagello, cognominatusq; à similitudine rei, quod in ea parte, quæ deciditur ex vetere sarmento, prominens utrinque malleoli speciem præbet. Nunc ex ea vitis parte palmites legamus, qui futuram fœcunditatem promittant. Non igitur ex extrema eius parte, quam caput vitis appellant, eligendum est



Sarmentum, quodd in eo productissimo vuarum numerus conspiciatur: id e-  
 nim accidit nō ex palmitis ingenita fertilitate, sed loci opportunitate, quia re-  
 liquas trunci partes alimentum, quod à solo ministratur, transcurrit, dum ad  
 vltimum perueniat, quod quum peruenierit, ibi consistit, atque consumitur.  
 Nec in crure vicino radicibus, quia terræ proximum integro atq; illibato suc-  
 co alitur. Mediæ partes macerrimæ, quia transcurrit hinc parte aliqua inter-  
 ceptus, illinc à se tractus humor. Sarmentum igitur, quod media vite situm,  
 numerosoq; fœtu benignitatem suam ostendit, eligatur: hoc translatum ra-  
 rius degenerat, quum ex deteriore statu meliorem sortitur: siue empastinato  
 10 deponatur, siue trunco inseratur, longioribus satiatur alimentis, quàm prius,  
 quum esset in egeno. Ex humerosis igitur partibus vitis semina eligamus, ta-  
 men quæ attulisse fructū antea animaduertimus: nam illud quod loco ste-  
 rili latum sine fructu processit, fallacem fœcunditatis imaginem præfert, nec  
 vllam generandi vim possidet. Plinius ad hæc: Serere è pampinariis sterile est,  
 nec nisi fœcundo oportet. Quæ raros habent nodos, infœcundæ iudicantur,  
 at densitas gemmarum fertilitatis indicium est. Quidam seri vetant nisi eos,  
 qui floruerint, surculos. A Columella Palladius in Februario & Octobri.  
 Quintilii aliqua addunt, ob id præcepta huc afferenda duximus. Quando vi-  
 tes iam perfectum reddiderint fructum, contemplari oportet quæ fructifere,  
 20 & multis oculis præditæ sunt, & nulla clade affectæ, eas notare, vt tempore  
 plantationis ex ipsis plantas accipiamus. Neq; ex nouellis vitibus neq; inuete-  
 ratis: nam illæ infirmæ, & hæ infrugifere, sed ex eis, quæ in suo vigore existunt.  
 aut parum quidem ultra excesserunt. Sarmenta non ex summis, neq; infernis  
 partibus accipienda, sed media vite. Quod latum, ferulaceum, raros habens  
 oculos, & contractas radices, abiiciendum: sumendum rotundum, laue, so-  
 lidum, oculis densum, & nouas gemmas plurimas habens.

*Sarmenta non colligenda, nisi tempore plantationis, & quomo-  
 do transferenda. C A P. XII.*

30 **S** A T T I O N I S tempore sarmenta colligenda esse præceperunt maiores. Ait  
 enim Plinius, surculos inseri eodem die, quo deponentur, vtilissimum, si  
 multo postea necesse sit serere, custoditos, vti præcepimus, cauere vtique o-  
 portet, ne extra positi sole itarescant, ventove, aut frigore hebetentur. Qui  
 diutius in sicco fuerint, priusquam serantur, in aqua pluribus diebus reuire-  
 scant. Alibi docens inserendos surculos decisos à matre, diutius custodiri pos-  
 se ait: Quod si longius afferantur pomorum calami, rapo infixas optimè cu-  
 stodire succum arbitrantur, seruariq; inter duos imbrices, iuxta riuos, vel pi-  
 scinas, vtrinq; terra obstructos. Quintilii hoc modo docent: Quod si diutius  
 seruare plantas necesse sit, in dolio humorem non habente deponantur, ter-  
 ra substrata, & rursus iniecta, vt vndequa; terra fruantur. Dolium verò dili-  
 40 genter luto oblinire oportet, vt neq; ventus, neq; aër inspirare possit. Hoc e-



nim modo etiam ad duos menses illæsa manebunt sarmenta ad plantas deleta. At verò quæ ex multo locorum distantia exportantur sarmenta, quidā in scyllam impolita, aut in bulbos cibarios, viridia conferunt. Quæ autem tempore læsa sunt, aut aridiora facta, in aquam per diem, ac noctem cōiecta plantato. Si verò aridior sit terra, etiam sana sarmenta rigare melius est, atque ita plantare. Animaduertendum autem, ne sarmenta, quæ plantabimus, ante plantationem germen emittant, talia enim corrumpentur.

*De pastinatione, sulcis, & scrobibus, quibus vinea ponuntur.* C A P. XIII.

**P** O S T malleoli electionem, docendum quomodo ponantur. Columella tribus modis feri dixit, optimè in pastinato, proximè in sulco, nonissimè in scrobe. De pastinatione dicemus. Primum ex omni siue arbutuuo, siue sylvestri loco, quem vineis destinauerimus, omnis frutex, vel arbor, submoueri debet, ne fossorem morentur, vel pastinatum solum molibus imprimatur, aut exportantium truncos ingressu proculcetur. Multum refert inspenissimum esse pastinatum, & vestigio quoque inuiolatum, ut mota æqualiter humus, nonelli seminis radicibus, in quamcumque partem prorepserint, molliter cedat, & tenero, velut nutritio sinu recipiat, cœlestesque admittat imbres, ut suis viribus ad educandam prolem conspiret. Campes tris locus altè duos pedes, & semissem infodiendus, ac cliuis regio tres, præruptior collis in quatuor pedes vertendus, quoniam quum à superiore parte in inferiorem detrahitur humus, vix iustum pastinationi præbet regestum, nisi multo editiorem ripam, quàm in plano feceris. Depressis vallibus minus altè duobus pedibus deponi vineam non placet: nam præstat non conferre, quàm in summa terra suspendere. Primum autem prædicti operis exordium est, æqualiter linea posita rectis lateribus perpetuam fossam educere, & post tergum motam humum componere, atque in tantum deprimere, donec altitudinis mensuram datam ceperit, tum per omne spatium gradus æqualiter mouenda linea est: obtinendumque ut eadem latitudo in imo reddatur, quæ cœpta in summo mox sulcum vacuari, ac spatium trudi fossam cum immota iam terra committi, monendo necubi scamna omittantur. Ad hoc opus exigendum quadam machina utitor. At qui pastinationis huius impensam reformidat, sed aliqua tamen parte pastinationem imitari studet, paribus alternis omissis spatiis ternum pedum latitudinis sulcos dirigunt, fossiuntque, & exaltant in tres pedes, ac per latera fossarum vitem, vel malleolum disponunt. Auarius quidem dupondio, & dodrante altum sulcum, latum pedum quinque faciunt, deinde ter tanto amplius spatium crudum relinquunt: atq; ita sequentem sulcum infodiunt, quod quum per definitum vineis locum fecerint, in lateribus sulcorum viuunt radices, vel malleolos erigunt, confitis compluribus inter ordinaria semina malleolis, quos postquam conualuerint, crudo solo, quod emissum est, transuersis scrobibus spargent. Quibus



Huius verò mos est scrobibus deponere, ferè per tres longitudinis pedes, perque  
 duos in altitudinē cartato solo, quantum latitudo ferramenti patitur, malleo-  
 fos vtrinque iuxta latera fossarum consternunt, & aduersis scrobium frontibus,  
 curuatos erigunt, duabusque gemmis supra terram eminere passi, reposita hu-  
 mo cetera coequant, quæ faciunt in eadem linea, intermissis totidem pedum  
 staminis, dum peragunt ordinem: tum deinde relicto spatio, prout cuique mos  
 est vineas colenti, vel aratro, vel bidente per æquantem ordinem insistant. Et si  
 flosore terra versetur, minimū est quinque pedum interordinium, septem ma-  
 ximum: si bubus & aratro, minimū est septem pedum, satis amplum decem.  
 Aliqui per denos pedes vitem in quincuncē disponunt, vt noualium more ter-  
 ra transuersis, & aduersis sulcis, p̄scindatur. Idque in lato solo faciendum, sed in  
 terra humida amplas, & profundas scrobes faciendas verat Theophrastus, ne  
 multis collectis aquis putrefiat planta. Et si pluuius ager sit, ne faciundas qui-  
 dem censuerit, sed adactis paxillis aditum parare surculo demittendo, nec eo-  
 dem anno terram aggerendam neque postero, vt sole humus assiccetur. Sin au-  
 tem siccum & squallentem colis, contra agendum est, si fieri possit, in scrobes  
 defodere, satius est, vt omni ex parte aquam suscipiat. Sed si minus facere ita  
 possis, tunc profundissimas fossas arboribus circumducere, fossæ namque exce-  
 ptis, ac seruatis aquis æstus arcebunt. Cætera ad hanc normam præparasse o-  
 portet: nam illud verissimum est, culturæ interesse: humidus ager siccandus,  
 siccus humectandus. A quo Plinius: Vineæ tribus seritur modis, sulco, scrobe,  
 & pastinato. Sulco latitudo palæ satis est, scrobibus ternorum pedum in quaque  
 partem. Altitudo in quocunque genere tripedalis, ideo nec vitis minor trāsferri  
 debet, ex tatura etiamnum duobus gemmis. Emolliri terram minutis in scro-  
 be ima sulcis, fimoque misceri necessarium. Cliuosa altiores poscunt scrobes, præ-  
 terea puluinitis à deuexitate labris: quæ ex his longiores fient, vt vites binas ac-  
 cipiant: è diuerso alia locabuntur. Vineas limitari decumano x v i i i pedū la-  
 titudinis, ad contrarios vehiculorum transitus, aliisque transuersis limitibus de-  
 nū pedum distinguere per media iugera. Aut si maior modus sit, totidem pedum  
 cardine, quot decumano limitari, semper verò quintanis semitari, hoc est, vt  
 quinto quoque palo singulæ iugo paginæ includantur. Solo spisso non nisi repasti-  
 nato nec nisi viuiradice feri, tenero, & soluto vel malleolū sulco vel scrobe. In  
 colles sulcos agere transuersos melius, quam pastinare, vt de fluuiis paliscorum  
 contineantur. Florentino autem videtur, non minus quatuor pedum altitudi-  
 ne vitium scrobes faciendos esse; quæ enim in superficie plantatæ sunt, cito se-  
 nescunt, & fructum corrumpunt, modicum alimentū in modica terra sortitæ,  
 & æstate exuruntur. Oportet igitur in quantum calor penetrat solis, in tan-  
 tum effodere, & plantare, ultra autem prædictam mensuram solis, calorem  
 non plus penetrare affirmant, nisi fissuras terra habeat, si minus profundè  
 plantaueris, inutiles vites, & cito senescentes habebis. Scito igitur vsque ad  
 quatuor pedes effossam terram nutricem plantarum esse, inferiorem esse



sterilem. Sed effossionem pedum altitudinis non est improbanda. Id tam enī non omittitur ex Columella: iugerum repastinabitur in altitudinem pedum trium operis octoginta, sulcum tertium pedum, duorum altum, & longum septuaginta, vna opera effodit, serobes ternarios, id est, quoquouersum pedum trium vna opera facit x v i i i, vel si cui cordi est laxius vites ponere, serobes quaternarios, id est, quoquouersus pedum quaternum vna opera x i i facit, vbi bipedaneos quoquouersus vna opera x x effodit.

*De tempore ferendi malleoli.* CAP. XIII.

**N** V N c docenda est ratio plantandi ad tempora secundum earum naturam. Ex Theophrasti doctrina. Si in humida, & frigida regione seres, facito ante vernum æquinoctium, subeunt enim calor, & liccitas. Sin in sicca, & calida, post solstitium: imminet enim pluvia, quate plus proficient. Aliarum rationes ad hanc normam institues. Virgilius vere præcipit melius, sed probabilius autumnō:

*Optima vinetis satio, cum vere rubenti  
Candida venit auis, longis inuisa colubris:  
Prima vel autumnī sub frigora, cum rapidus sol  
Nondum hyemem contingit equis, iam præterit aestas,  
Veretument terra, & genitalia semina poscunt.*

Columella ex Theophrasto excipit: Opus conferenda vineæ vere, vel autumnō. Vere melius, si aut pluuius aut frigidus status cœli est, aut ager pinguis, aut campestris, & vliginosa planities: rursus autumnō si sicca, si calida est æris, qualitas, si exilis, atq; aridus campus, si macer, præruptusve collis. Vernæque positionis dies ferè quadraginta sunt ab idibus Februariis vsq; in æquinoctium, rursus autumnalis ab idibus Octobris in cal. Decembris. Ab eo Plinius: Aquoso cœlo, vel sicco solo, malleolos ferere autumnō, nisi si tractus ratio mutarit, siccus enim & calidus autumnō poscit seri, humidus frigidusque etiam veris exitu. In arido solo viuiradix quoq; frustra seritur. Male & in siccis malleolus nisi post imbrem: at in riguis vel frondens vitis, & vsq; ad solstitium rectè, vt in Hispania. Cassianus hæc habet: Quidam vere inchoante conferunt, Fauonio tamen spirante. Quidam non statim veris principio, sed vbi ad germinationem spectant plantæ, alii post vindemiam plantant, quum folia vitibus defluunt, alii inchoante vere. Ipse autem experientia edoctus in locis non irriguis autumnō plantandam vitem: tunc enim sarmenta post vindemiam ab onere racemorum liberata, propriam vim temperantia, & à glacie nondum male affecta citius terræ coalescunt, & natura tunc magis radices nutriende. Ratio cur locis nō irriguis autūno plantant: quo inopiam rigationis imber per totam hyemem delapsus expleat. Sed post æquinoctium vernum non est plantanda vitis. Lunarem quoq; rationem in consuetudine obseruandam iudicarunt maiores. Columella: Plantaria facito ab exoriente, & à decima Lu-



na, & à vigesima. Anatolius, Multi ex veteribus affirmant à prima Luna vsq; ad quartam vites plantandas, aliqui verò in omnibus eius augescentis diebus plantare consulunt, alii augescente ipsa plantandum minimè censent. Hoc verò in confesso est, quòd Luna sub terra existente depangere vites oportet. Sotion verò ait, In illunibus diebus, hoc est prima & secunda die, vites nequaquam plantandas esse, itemq; reliquas arbores priusquam luna hominibus apparet, quæ enim his diebus plantata sunt, omnia non comprehendunt. Anatolius verò etiam desinente Luna plantauit, nec pœnuit. Verùm Sotion inter illunes dies etiam vigesimam nonam, & trigessimam locat. Oportet tamen Luna deficiente sarmenta accipere, tum quæ plantantur, tum quæ inferuntur. Nec omittendum quod Columella & Plinius non omittunt, in plantatione ne semina exarescant, immodicum ventum, solemque vitare, qui vterque non incommodè arceretur obiectu vestis, aut cuiuslibet densi tegminis. Veruntamen præstat eligere sationi silentis, vel certè placidi spiritus diem: nam sol vmbraculis faciliè depellitur. Plinius, Quiescere ventos sationis die vtilissimum. Pleriq; austros optant, Cato abdicat.

*Malleoli quomodo ponendi. CAP. XV.*

**D**E malleoli positione non minima inter maiores disceptatio fuit. Quidam totum flagellum, vt erat matri detractum, per gemmas quinas, vel  
 20 septas partiti complures taleolas terræ mandauerunt, quod Columella minimè probat, assentiturq; h s, qui eam partem quæ est iuncta cum vetere sarmento probauerunt, & sagittam repudiauerunt. Sagittam vocat nouissimam surculi partem, siue quia longius recessit à matre, & quasi emicuit, atq; profiluit, seu quia cacumine attenuata prædicti telis speciem gerit. Ratio est quia fecundus pampinus intra quintam, aut sextam gemmam fructu exuberat: reliqua pars vel sterilis, vel perexiguos ostendit racemos. Alii nouellum sarmentum pangebant, vt pars aliqua ei veteris hæreret. Sed id damnauit vsus: nam quicquid ex veteri materia relictum est, obrutum, celerrimè humore putrescebat, proximasque radices teneras, & vix dum prorumpentes vitio suo enecabat, vnde  
 30 superior pars retorrescebat. Iulius Atticus, & Cornelius Celsus Safernam sequuti quicquid residui fuit ex vetere palma per ipsam commissuram, qua nascitur materia noua, resecant, atq; cum suo capitulo sarmentum deprimunt. sed nouella semina cum vetere sarmento deposita cito comprehendunt, & valenter crescunt, sed celeriter senescunt, at quæ sine vetere sarmento panguntur, tardius conualescunt, sed tardius deficiunt. Iulius Atticus præ torto capite, ne pastinum effugiat, semen demergit. Pastinum vocant agricolæ feramentum bifurcum, quo semina panguntur. Idq; etiam à Columella improbat multis rationibus. Primùm quòd omnis stirps integra, & inuiolata antequàm deponatur melius prouenit, quàm quæ vexata, & infracta. Deinde re-  
 40 curuum, & sursum spectans demersum, quum tempestiuum eximitur, repu-



gnat obluentanti fossori, & prærumpitur, præterea maiorem partem radicis amittit. Præterea si secunda pars infra quintam, vel sextam gemmā est, qui malleolum contorquet, secundam partem consumit, meritiq; oculi non materiam, sed radices creant, gemmæ cacumini proximæ pampini pullulant, vel steriles vel minus feraces. Demum plurimum interest, ut ea parte qua est à matre decissus malleolus coalescat, & cicatricem ducat: sin minus, per apertam vitis medullam humo trahitur, qui truncum cauat, unde formicis latebræ parantur, quæ vitium crura putrefaciunt. Quare optima ratio recti malleoli, cuius imum caput confectum angustis ferramenti faucibus deprimitur, nam citius coalescit, & cicatricem obducit. In scrobibus malleolos utrinq; iuxta latera fossarum consternunt, & aduersis scrobium frontibus curuatos erigunt, duabusq; gemmis supra terram eminere passim reposita humo cetera coarquant. Longitudo quæ debet esse malleoli, parum certa est, quoniam si crebras gemmas habet, breuior faciendus, seu raras, longior, attamen nec maior pede, nec dodrante minor esse debet: hic ne per summa terræ sitiat æstatibus, ille ne depressus altius, quàm adoleuerit, exemptionem difficile præbeat. Sed hæc in plano: nam in cliuosis ubi terra decurrit, potest palmipedalis deponi. Vallis & vliginosi campi situ serimus etiā trigemmem, qui est paulo minor dodrante, longior utiq; semipede. Et alibi idem docens: Virgam malleolarem, non amplius, quàm sex gemmarum esse cōuenit, ita tamen si breuia internodia habeat, in maiorem partem, quam demissurus es, iuxta nodum, ne gemmam ladas, rotunda plagā amputato, tum rectum defigito, ne minus quatuor gemmæ abscondantur. A quo eadem refert Palladius in Februario. Et Plinius: Solebat capitulatus utrinq; & duro furculus feri, postea anelli cum sua calce, nec est aliud viuacius, tertium genus adiectum expeditius sine calce, propter quod sagittæ vocantur, quum intortipanguntur, iidem quum recisi, nec intorti trigemmes. Plures autem ex eodem furculo hoc modo fiunt. Sagittas ferere minus vile, quoniam in transferendo facile rumpitur, quod intortum fuit. Seruntur pedali, non breuiore longitudine, quinque, sexq; nodorum. Pauciores tribus gemmis in hac mensura esse non poterunt. Quintilii admonent illam partem potiorem esse ad plantationem, quæ vni vsq; ad septem oculos iuncta est, aliud autem inutile. Quare non recte faciunt quidam, longiora sarmenta in duas, aut tres partes secantes, atq; ita plantantes. Nos in Surrentino tractu vineas sic instituere solemus. Ad agri longitudinem longos ducimus scrobes, quatuor pedum profunditatis, & latitudinis, intervallum inter utrosq; solidum octo pedum relinquimus. Idq; post vindemiam agimus. At Ianuario, vel Martio mensibus, binos malleolos eligimus, & imum solum scrobis per semipedem effodimus, & dextro scrobis latere infigimus, & per latitudinem scrobis prosternendo, ad sinistrum latus erigimus. Mox bipedali spatio antegradiendo, denudum imum solum effodimus & terram super malleolos iam prostratos inspicimus, & cooperimus, & aduersa frontis parte binos alios infigimus, & ad dextram erigimus, idq; dum scrobs cōpleatur, & sic

semiob-



semiobrutos relinquimus vsque ad Martii calcem, vt aquam combibat. Tunc circa malleolos solum excauamus, & commouemus, & ad summum aquamus, ac binis oculis supra terram relictis, reliquum recidimus, ac per triennium intactos malleolos relinquimus; non nisi constitutis temporibus solum pastinando. Deinde tertio anno viticulas omnes recidimus, non nisi duobus oculis parcimus, fustici castrare dicunt. Eo anno oblongos palmites procreabunt, autumnò excuamus solum vsq; ad imum, & malleolos propagamus, ternos quaternosve palo adiungendo & colligando.

*Quid faciendum ad celerem vitium radicationem.* CAP. XVI.

**P** RÆSTAT enim vt posita semina celeriter radificentur. Ad id non pauca à nostris maioribus adinuenta sunt experimenta. Prodidit Mago Pœnus iuxta latera fossarum paruos lapides disponere plantandis viuiradicibus, qui singuli non excedant quinquelibrale pondus. Hos aquas hyemis & vapores æstatis propulsare radicibus; quem sequutus Virgilius sic præcipit,

*Aut lapidem bibulum, aut squallentes insade conchas.*

*Inter enim labentur aqua, tenuisq; subibit*

*Halitus, atq; animos tollent sata, iamq; repertæ.*

*Qui saxo super, atq; ingentis pondere teste*

*Virgerent: hoc effusos munimine ad imbres.*

**Idemq;** Pœnus author probat vinacea permixta stercorei depositis seminibus in scrobem vites mouere, quòd illa prouocent, & eliciant nouas radículas, hoc per hyemē frigentem, & humidū scrobibus inferre calorē tempestiuum, ac per æstatē virentibus alimentū, & humorem præbere; si verò solum, cui vitis committitur, videtur exile, longius accersitam pinguem humum scrobibus inferre censet, vel malleolū amputatum statim simo bubulo linito, tum in terrā benè pastinatā, & stercoreatam defigito. Palladius refert, quæ Columella habet. Plinius emolliri terrā iubet minus in scrobe ima sulcis, simoq; misceri necessariū ducit. Quintilii à Magone, *Qui vitē plantant*, summas sarmentorū partes stercore bubulo liquido prælinūt: aiunt enim reptilia & vermiculos odore abductos nō accedere. Oportet autem in omnibus plantis quercinæ glandis contusa, magnitudinem fabæ, & eruum fractum & semel molitū, ita vt solum fractum sit & diuisum, simul miscere, & plantarum locos inde conspergere. Hæc enim ad radicationem, & ad vini vetustatem, & ad fertilitatem conferunt. Quidam leguminum paleas maximè fabarum, vnā cum plantis coniiciunt, tales enim per hyemem calefiunt, & ferarum nocumenta arcent. Quidam vrinam iniiciunt. Oportet autem & vinaceorum terrefactorum pugillum in singulos scrobes iniicere, ad nigra genera albarum vuarū vinacea, contrā ad alba nigrarum. Licet rectum plantare sarmentum, præstat obliquum: citius enim radicanitur obliqua, sed res aut quatuor lapides manuales circumponendi, deinde adiacēte aggere adobruēdi, vt vnā cū stercore equaliter consulemus, & obseruemus, ne quæ oculum iuxta terrā excacemus, deinde alios



Lapides imponemus conculcato, magnitudine prioribus pares. Stereus igitur simul iniectum fouet, & firmat plantam. Vinacea citius radicē spargere faciunt. Lapides autem prohibent ne spatiosa terrę amplitudo illabatur, & state verò radices perfrigerant. Sotio enim cedria quàm minima summam plantę sedem, ac basim illinere iubet: nam hæc putrescere non finit, & reptilia adrepere prohibet suo odore.

*Quòd in vinea diuersa sint vitium genera plantanda, eaq; distinde ponenda.* CAP. XVII.

**P**RVDENTIS est agricolæ, refert Columella, diuersa vitium genera in vinea deponere: non enim vnquam tam temperatus erit annus, quin nexet aliquid vitis genus: nā siue siccus erit, quod humore perficit, cōtristatur, seu pluuus, quod siccitatibus gaudet, seu prunosus quod non est patiens vredinis, seu feruens, quod vapores non sustinet: si igitur vnum seuerimus, quū id acciderit tota vindemia priuabimur, at si varii generis vineta fecerimus, aliquid ex iis inuiolatū erit quod fructum proferat. Non tamen ea de causa nos cōpellamur ad multas varietates, sed sat erit per quatuor, vel ad summū quinq; genera vindemię fortunam experiri. Pręterea per species digerendę vites in proprios hortos, cuius rei faciendę nos vtilitas multis de causis compellere potest. Primum quòd ad omnem vitę rationē prudentem delectant impensius ea, quę propriis generibus distinguuntur, quàm quę passim, velut abiecta, & quodammodo confusa sunt. Deinde quū in agrum quis consitum venerit, summa cum voluptate miratur, quū istinc bituricę, hinc paresiis heluolę respondent, illinc arcelanę, rursus illinc spionię, basilicęq; cōueniant, vel generis albi, vel flauentis, ac rutili, vel purpureo nitore micantis, vndiq; versicoloribus pomis gaudus collucet aut ūnus. Sed hæc quāuis plurimum delectent, vtilitas tamen vincit voluptatē. Diuersę stirpes non pariter de florescunt, sed ad maturitatem simul pueniunt, quā ob causam qui separata generibus vineta non habet, aut serum fructū cum præcoque eleuet necesse est, quę res acorē facit, aut si maturitatē serotini expectet, amittat præcoquem vindemiā, præ populationibus yolucrum, pluuiis, ac ventis lacescita dilabitur. Si verò cuiusq; generis fructum matureat, quū diuersę notę sint, melioris gustus ab deteriore corrūpitur, cōfususq; in vnū multarum sapor, vetustatis impariēs fit, atq; necessitas cogit agricolam musti annonā expedire, quū plurimū pretio accedat, si venditio in annū vel in æstatē differri possit. Generū separatio hanc cōmoditatem habet, quod vinitor suā cuiq; putationem reddet, quū scit cuius sit notę hortus, quod in vinetis nō consensu obferuari difficile est, quia putatio administratur, quādo vitis folium nō gerat, multumq; interest plures aut pauciores materias submittat. Quinetiā quā cœli partē vnū quodq; genus vineti spectet plurimū refert, neq; enim omnis calido statu, nec frigido letatur, sed proprietas in vitibus, vt alia Meridie, alię Septentrione gaudeāt, alię oriētis, vel occidētis tēperamento. Has igitur differētiās seruāt, quo locorū situ, qui genera per hortos separant. Illam quoq;



quoque non exiguam sequitur utilitatem, quod laborem vindemiæ, & minorem sumptum patitur: nam quæ maturescere incipiunt, tempestiue leguntur, & quæ nondum maturitatem ceperunt vix, sine dispendio differuntur. Nec pariter verus, atq; tempestivus fructus præcipitat vindemiam, cogitq; plures operas quantocunq; pretio conducere. Iam & illud magnæ dotis est posse gustum cuiusq; generis non mistum, sed merum condere, siue bituricus, siue basilicus, siue spionius, quæ genera sic diuisa, quia nil interuenit diuersæ naturæ, per potus nobilitantur. Quare utilissima est generum dispositio, quam si obtinere non possis, secunda est ratio, vt conseras vites, quæ saporem consimilem fructumq; maturitatis eiusdem præbeant. Ad hæc Florētinus, Quia non eiusdem naturæ vites, oportet harum misturâ deuitare, vt ne melius ammixto peiore lædatur. Nihil enim adeo vinum oblaedit, vt quum præcoces vix cum serotinis leguntur. Omnium verò maximè obseruandum, ne alba cum nigris calcentur, multo melius si non simul calcentur. Habent enim quandam naturalem aduersus sese contrariam affectionem. Didymus consultissimè facere dixit, qui tria, aut quatuor vitium genera separatim in vinea plantant, aut enim omnia simul comprehendunt, aut non simul omnia spem frustrabuntur. Et enim ad vnum aliquod genus animum conuerttere non est tutum. Neque oportet fusim, sed singula genera separatim plantare: nam vinum ex diuersis vitibus factum plurimam differentiam habet. Hæc eadem Palladius habet in Februario.

*De nouella vinea fossione. CAP. XVIII.*

**F**IRMITAS vitis maioribus nostris non lætitiæ solum, sed laboris symbolum, siquidem nulla arborum maiori indiget cura, vt nisi diligentissimè excolatur, pergulis sustentetur, palis, vel arboribus maritetur, talce singulis annis præcidatur, multo denique labore custodiatur, breui admodum tempore pereat. Quare non imperite dixit Hesiodus,

*οἷα δὲ βύσσος, δῶκε δὲ δρᾶσι χάρμα, καὶ ἄχθος.*

Lætitiâ, & laborem hominibus simul Bacchum dare. Vnde vinea iâ maleolis confita non debet eam agricola, antequâ pubescat, destituere, annum sumptum refugiens, vt disertissimus Columella monet. Res est tenera, infirma, iniuriæ maximè impatiens, quæ plerunque nimio labore, & nimia vbertate sua consumitur. Quum tamen aliquatenus se confirmauit, & veluti iuvenile robur accepit, negligentiam sustinet, nouella dura adolescit, nisi omnia iuste perceperit, ad maciem redigitur, & sic intabescit, vt nullis deinceps impensis recreari possit. Igitur summa cura, quasi infantium membra à primo die constitutionis formanda, ne impensa in cassum recidat. Ex kalendis igitur Martiis, vsq; in Octobres, trigesimo quoq; die nouella vineta confodere oportet, omnesq; herbas, & præcipuè gramina extirpare, quæ nisi manu elignantur, & in summum reiciantur, quantulacunque parte adobruta, reuiuiscunt, & vites



ita perurunt, vt scabra atq; retorrida fiant. Quæ ab eo excipiens Palladius, in Martio mense commemorat: ac puluerationem vocat. Martio enim menses nos solidum inter ordines positum crebris fossionibus resolvimus, & in puluerem redigimus. Theophrastus verno tempore pascinari quàm altissimè iubet, vt spiritus abunde permistus pabulum præbeat, quippe aer quoque alimentum præstare potest.

*De malleolis pampinatione facienda.*

CAP. XIX.

**O**PTIMUM est malleolum sic formare ab initio, vt frequenti pampinatione supernuacua detrahatur, nec patiamur plusquàm in vnam materiam vires, & omne alimentum conferre: primo tamen bini pampini submittuntur, vt sit alter subsidio, si alter fortè deciderit. Quum deinde paululum induruerit virgæ, tum deteriores singula detrahuntur, ac ne quæ relicta sunt ventorum procellis decutiantur, molli & laxo vinculo adsurgentes subsequi conueniet, dum clauiculis suis, quasi quibusdam manibus adminicula comprehendant. Pampinationis tempestiuitas ea est, dum teneri palmites sunt, vt leui tactu digiti decutiantur: nam si vehementius induruerint, aut maiore nisu conuellendi, aut falce deputandi, quod vtrumque vitandum est, alterum quia lacerat, alterum quia matrem sauciat, quod in immatura adhuc stipe fieri est noxium, nam a stiuis caloribus impressum vulnus, latius inarescit, ita vt non minimam partem de ipso matris corpore enecet: vnde si duris caulibus falcem adhibere necesse est, si paululum ab ipsa matre recidendi, & velut reseces relinquiendi, qui caloris iniuriam excipiant, eatenus, quæ nascuntur à latere palmitis: ultra enim non serpit vaporis violentia. In malleolo eadem ratio pampinandi: si eo velimus vt adminiculo, in longitudinem eliciamus materiam. At si bino vti velimus, quum ad vnum pampinum redegeris, & ipse excesserit pedalem longitudinem, decacuminare conuenit, vt in ceruicem confirmetur, & fiat robustior. Palladius à Columella Augusto mense frigidis locis vineam pampinari debere dicit, ac siccis obumbrari potius vva, ne vi solis areseat. Magnus Theophrastus, Resecari plantas breui relicto palmite præstat ubique, vt radices vires incrementaque capiant. Tempus tamen putandi ferè idem omnibus statuunt, sub ipsam scilicet germinationem, vt planta plena humoris protinus exiccetur, vt germen optimè prodeat: quippe putationem ipsam non fructus, sed germinis gratia faciunt, autumnalem verò fructui præparant, vt dicemus. Cassianus in Maio mense pampinationem vult perfici, prominentes nouellarum vitium tusiones auferri, & si quid in supernis partibus præterea excreuerit. Vno enim tusione contentam esse nouam vim conuenire.

*De nouella vinea ablaqueatione.* CAP. XX.

SEQUENTI



**S**EQVENS verò tempus ampliorem curam deposcit: nam post idus Octobris priusquam frigora inuadant, vitis ablaqueanda est quod opus ad opertas ostendit æstiuas radículas, easque prudens agricola ferro decidit: nam si passus est conualescere, inferiores deficiunt, atque euenit, vt vinea summa parte terreni radices agat, quæ & frigore infestentur, & caloribus maiorem in modum æstuent, ac vehementer sitire matrem in ortu caniculæ cogant, quare quicquid intra sesquipedem natum est, quum ablaqueaueris recidendum est. Sed minime applicandum ferramentum ipsi matri, quoniam si iuxta truncum radices præcideris, aut ex cicatrice plures nascentur, aut aqua, quæ ex pluuiis consistit in lacusculis ablaqueationis, brumæ congelationibus noua vulnera peruret, & ad medullam penetrabit, vnde recidere ab ipso codice vnus digiti spatium conueniet, sic non amplius pullulant, & à noxa truncum defendunt. Postea si hyems in ea regione placida, patens vitis relinquenda: sin violentior, ante idus Decembris prædicti lacusculi æquandi. Si verò prægelida frigora regionem infestabunt, aliquid fimi, vel columbini stercoreis, aut in hunc usum præparatæ veteris vrinæ senos sestarios radicibus infundes, antequam adobruas. Ablaqueare omnibus autumnis oportebit primo quinquennio, dum vitis conualescat, vbi truncus adoleuerit, triennio intermittenda est. Quæ iisdem verbis in Octobri recenset Palladius.

**De nouella vineæ refecatione. CAP. XXI.**

**S**iv e malleolum, siue viuita dicem conserueris, censet Columella, primi anni malleolorum formare incrementa, non pati vitem superuacuis frondibus syluescere, nec in tantum coercere, vt totam superficiem amputemus: sed mediocratio sequenda est, vt annotato superioris anni pollice, supra ipsam commissuram veteris sarmenti vnâ, vel duas gemmas relinquamus, ex quibus germinet. Virgilius ad id:

*At dum prima nouis adolescit frondibus ætas,*

*Parcendum teneris, & dum se latus ad auras*

*Palmes agit, laxis per purum immissus habenis,*

*Ipsa acies falcis nondum tentanda. sed vncis*

*Carpenda manibus frondes, interq; legenda.*

**De nouella vitis putatione. CAP. XXII.**

**A**BLAQUEATIONEM sequitur talis putatio, vt à primo anno ad vnam virgulam reducendam dicat Columella, nec recidendam totam. Anno secundo expleto, quia vel intereunt vites in totum recisæ, vel infœcunda sarmenta producant, quæ amputato capite, velut pampinaria de duro coguntur exire, propterea iuxta commissuram veteris sarmenti vnâ, vel duas gemmas censemus relinquendas, quod in viticula fortiore



Seruandum. Sed nec verno tempore omnibus regionibus melior putatio est, nam vbi cœlum frigidum est, ea sine dubio eligenda est. Vbi verò aprica loca sunt, mollesque hyemes, optima, & maximè naturalis est autumnalis. Putatio fieri non debet secundum articulum, ne reformidet oculus, sed medio ferè internodio ea plaga obliqua falce fit, ne si transuersa fuerit cicatrix, cœlestem superincidentem aquâ contineat. Sed nec ad eam partem, qua est gemma, verùm ad posteriorem declinatur, vt in terram potius deuexa, quàm in germen delachrymet: nam defluens humor cæcat oculum, nec patitur frōdescere. Eadem ab eo Damageron.

*De vite formanda. CAP. XXIII.*

**D**E vitis formatione hæc affert Theophrastus. Vitis verò subtus circum sua crura instituenda, formandaque est. Nam si vndique laevis, expoliataque sit, melior fœcundiorque euadet. Nec difficulter possit ita formari, si quis non eos reliquerit palmites, qui perpulchrè excurrerint, sed illos qui aptissimi ad formationem destinata constituerint, quippe singulas gemmas singulis reliquisse abundè est. At si nec istud certò fieri posset, quia scilicet vitis non per eandem tulerit partem, gemmæ prorsus internæ tollendæ sunt, vt ad exteras alimentum excurrrens, vitem scindat in brachia: semper enim ad partem viuam, atque capacem perfluitur. Quamobrem pro voluntate vitem formare facilè est. Sed hoc in agro humecto, atque frugali: sicco enim, squalenti-  
que palmites, qui optimè prosiluerint, reliquisse necessarium. Quum enim  
siccus ieiunusque sit, nunquam alios facilè profert: quapropter factum impetum conspectari satius est. Quin & afflatu umratione rescidisse decet, nec præter naturam quicquam est enitendum.

*Quomodo plantanda, & alliganda sit nouella vinea.*

*CAP. XXIIII.*

**P**VTATIONEM sequitur pedandæ vineæ cura. Verùm hic annus nōdum vehementem palum, aut ridicam desiderat, itaque arundines binas singulis vitibus applicabimus, quibus adnectantur singulæ transuersæ perricæ in imam partem ordinis, quod genus iugi canterium vocant: refert enim vt paulum infrà curuationem vitis prorepens pampinus statim apprehendat, & in transuersa potius, quàm in edita se fundat, atque cauterio subnixus, facilius ventos sustineat: iugum intra quartum pedem conuenit alleuari, dum se vinea corroboret, in pedationem. Deinde sequitur alligator, cuius officiū, vt rectam vitem producat in iugum, quæ si iuxta palum posita est, obseruet qui adnectit, ne in alliganda materia flexum pali sequatur. Recta arundo stirpi adiungenda, ita per crebra retinacula in iugum producenda. Nouella vinea quam lentissimo nec tendenda vinculo est, quia si viminibus salicis, aut vlnis ligaueris, incrementum vitis se ipsam præcidit, optima est genista, iuncus, vlua & arundinum folia



lia in vmbra siccata. A quo eadem Palladius in Martio mēse. Damageron per-  
ticam adiungit corticem non habentem. In cortice enim cantharides, & quæ-  
cunq; vitem vastare solent subtergrediuntur. Ipsam verò plantam extentā pa-  
xillo alligare oportet. Viti enim perfectæ sex annorum putationem in hume-  
ros ter, aut quater iuxta facultatē plantæ adhibere oportet, & unicuiq; sarmē-  
to humeralem paxillum apponere, qui sarmentum, & racemos ferre queat.

*De vitario constituendo. CAP. XXV.*

**S**ATIŌNIS alterum genus est viuiradicis: plurimis enim diebus præstat vi-  
uiradix, inquit Columella, minus enim interit, quum & calorem & frigus,  
10 & cæteras tempestates propter firmitatē facilius sustineat, deinde adolescit  
maturius, ex quo euenit, vt celerius quoq; sit tempestiua ædendis fructibus. A-  
liam rationē addit Theophrastus, quòd viuiradices solo pluuiō deponendas  
potius, quàm cætera semina censent. Radices enim quas illa dimiserit imbe-  
cilles, humor nimirum putrefacit, viuiradices verò solidiores sunt, statimque  
comprehendunt, vt impunè valeant perdurare. Vnde qui vineā, vel arbustum  
constituere volet, seminaria prius facere debet, sic enim sciet, cuius generis  
vitē positurus sit: nam quæ pretio parata disponitur, certam generositatis  
fidem non habet, quoniam dubium est, an is qui vendidit, legendis seminibus  
20 adhibuerit diligentiam, tum etiam quod ex longinquo petitur, parum fami-  
liariter nostro solo venit, propter quod difficiliter conualescit alienum exte-  
regionis. Igitur eodem agro, quo vitē dispositurus es, vel certè vicino fa-  
cere seminarium, idque multum refert loci natura. Nam si colles vineis, vel  
arbutis occupaturus es, prouidendum est, vt siccissimo loco fiat seminarium,  
etiam quasi ab incunabulis vitis exiguō assuescat humori, aliter quum trans-  
tuleris de humido in aridum locum, viduata pristino alimento deficiet: at si  
campestres, & vliginosos agros possidebis, proderit quoque seminarium si-  
mili loco facere, & vitē largo consuescere humori: nam exilis, quum in a-  
guosum agrum transfertur, putrescit. Ipsum autem agrum, quem seminario  
destinaueris planum, succosum, sat erit bipalio vertere, ea repastinatio altitu-  
30 dinis habet plus sesquipede, minus tamen quàm duos pedes. Eiusmodi bipa-  
lio iugerum agri vertitur operis quinquaginta. Collem autem & cliuum mo-  
dum iugeri continentem duobus pedibus altè repastinabis operis sexaginta.  
Vel si eodem loco, quo vineam ordinaturus es, facere voles seminarium, tri-  
bus pedibus altè repastinabis iugerum operis octoginta. Iubetque alibi idem  
Columella, seminario latissimum locum non destinandum, nam si depositæ  
stirpes celeriter prosiliunt, si transferantur retorrescunt. Rursus nec tenuissi-  
mum locum, quoniam malleolorum pars maior perit, & quæ superest, tarde  
fit idonea translationi, & prudentis est coloni potius ex deteriori in melio-  
rem, quàm ex meliore in deteriorem transferre. Ergo mediocris ager vitatio



Plin. 17.  
21.

est aptissimus. Sic in pastinato agro tripedaneis relictis spatiis, per quæ semina excolantur, in singulis ordinibus, qui ducenos quadragenos pedes obtinent, sexcenteni malleoli pangendi sunt. Is numerus consumat per totum iugerum seminum millia quatuor, & viginti. Bithyni, Didymo auctore, plantaria vocant, ubi plantæ præfaginantur. In profunditatem non minorem pede poni debere, & ut faciliè per ligonem refodiantur, & semper à sole calefiant. Quod superfluum est in augescēte per manum auferre oportet, (stuporem enim inducit ferri contactus,) quò vitis in crassitudinem crescat. Quidam secundo, aut tertio anno transplantant, sed triennales generosiores. Plantaria rigare non opus est, nisi & ipsas vites rigare velis. Omnia enim quæ in plantatio fiunt, & in eadem vinea facere oportet. A Columella Palladius in Februario trāsferunt. Plinius: subtilitas parsimonix compendia inuenit, quum vinea in pastinato seratur, obiter seminarium faciendi, ut viuiradix loco suo, & malleolus qui trāsferatur, inter vites ordine seratur. Quæ ratio in iugero circiter xvi m. viuiradicum donat. Interest autem biennium fructus, quo tardius in satō prouenit, quàm in translato.

*De viuiradicibus transferendis, plantandisq.* CAP. XXVI.

**N** V N C viuiradices transferre, & plantare docebimus, & à serobibus incipiemus. In macro solo quinque pedibus inter ordines omissis, mediocri senis, in pingui verò septenum pedum spatia danda sunt, quo largiora vacent interualla. Hæc in quincuncem vinearum metatio expeditissima ratione conficitur, quippe linea per totidem pedes, quot de stinaueris, inter ordinum spatii, purpura, vel quolibet alio conspicuo colore insuitur, eaque sic denotata per repastinatum intenditur, & iuxta purpuram calamus defigitur, atque ita paribus spatiis ordines diriguntur, quod deinde quum est factum, fossor insequitur, serobemque alternis omissis per ordinem spatiis à calamo ad proximum calamum non minus altum, quàm duos pedes, & semisse in planis locis refodit, accliuibus in dupondium & dodrātem: præcipitibus etiam in tres pedes in hanc mensuram serobibus depressis viuiradices ita deponuntur, ut à media scrobe singulæ, & in didersum sternantur, & contrariis frontibus fossarum ad calamos erigantur. Satoris officium est eodem momento, si fieri possit, quo serere velit, de seminario transferre plantam diligenter exemptam, & integram, deinde eam totam exputare, & ad vnā materiam firmissimam reducere, nodosque & cicatrices alleuare, si quæ radices laborauerint, eas amputare: sic deinde curuatam deponere, ne duarū vitium radices implicentur: id vitabitur per imum solum iuxta diuersa latera fossarum dispositis paucis lapidibus, circapondo quinque. Quum semina depones imum serobem bidentibus fodito, mollemque reddito. Vitem, quam ponis, fac ut ad Orientem spectet, ad miniculo religata. Mago Carthaginensis adificat, ut semina ita deponantur, ne proxiuus totus serobis terra repleatur, sed dimidia pars sequente bien-



nō paulatim adæquetur: sic enim cogit vitem radices deorsum agere. Sed id siccis locis vtiliter fit, vliginosis verò, aut vbi cæli status imbifer, minimè faciendum: nam in scrobibus nimius humor consistens imbecillia tūc semina necat, quare vtilius erit, deposita stirpe scrobes repleri, & quum semina comprehenderint, post æquinoctium autumnale ablaqueari, recisis in summo radiculis, post paucos dies adobruui. Locis verò vbi cæli clementia permittit, tota hyeme adoperras radices relinquere conueniet. Id præcipuè obseruandum est, ne in scrobe supina vitis deponatur, sed ab imo vsq; recta materies erigatur, calamoq; applicetur; nā si in alueo re-umbet, quādo ablaqueatur, vulneribus obnoxia est, & nonnunquam præciditur. Tempora serendi docet Theophrastus, non eadem vtrique solo reddi. Pluuium enim & frigidum, paulò ante æquinoctium seri debet, quippe tunc siccissimum atque calidissimum est: siticulosum & feruidum post solstitium. Id enim quò amplius imbrem senserit, eò melius germen effundet. Reliquis omnibus ad normam eorum temporum moderando, serendi tempus accommodabitur. Addit: Crassitudo plantarū solo pluuio non ineprè decernitur, viribus enim maximè opus est, sed squalienti neq; crassas, neque nimium tenues statuere debes: altera namque ne putrescāt, altera, id est tenues, atque imbecilles, ne priusquam cœperint germinare, exarescant timendum est. Hesiodus, & ab eo Virgilius Lunæ dies in quibus plantanda sint vires, adiiciunt,

*Septima post decimam felix, & ponere vites.*

Didymus differentiam ponit inter viuiradices, & sarmenta. Viuiradices hoc præstare ab his, quæ à sarmento videntur, quod viuiradices auctiores sunt, utpote quæ radices egerunt, malleoli verò radicationem expectant. Præterea transplantatio meliorem fructum & vberiore facit. Viuiradices secundo, aut tertio anno fructifera, malleoli vix tertio, aut quarto anno. Et Februario mense transplantandas non anniculas, sed duorum, aut trium annorum. Palladius quæ à Columella excepit, in Februario habet.

*De vinearum generibus, & primum de iugata. CAP. XXVII.*

**I**A M vineam constituimus, nunc de singulis eius speciebus. Diximus vinearum plura genera: sed in vsu tria sunt, iugata, humi proiecta & subrepta. Iugata plus aeris recipit, altius fert fructum, æqualius concoquit, sed difficilior eius cultus. De ea ita præcipit Columella, Quum mensem trigessimum excesserit posita vinea, id est tertio autumno, vehementioribus statuminibus impédanda est, idq; non fortuito, siue prope truncum defigitur palus, sed pedali spatio recedendum est, ne radicem vulneret, & fossor ab omni parte semina circumfodiat, eo modo, ut Aquilonum excipiat violentiam, vitemque protegat: siue medio interordinio pangatur, vel defodiendus est, vel prius paxillo perforato solo altius adigendus, quo facilius & iugum, & fructum sustineat. Statuminibus iuga sunt alliganda, vel saligneis perticis, vel complu-



ribus quasi fasciculis arundinum connectuntur, ne pandantur onere fructuum; nam binæ iam materiæ singulis seminibus submittendæ erunt, nisi gracilitas vitis angustiores putationem desiderabit, cuius unus palines, & paucorum oculorum erit relinquendus. Arundines conuersis cacuminibus vincienda, ut æqualis crassitudo iugi sit, & quum iugum in fascem pluribus arundinibus ab æterna cacuminum vice ordinatum est, ferè quinquennii præbet usum. Sunt qui non iugum in stellam decussari, sed simplici ordine contenti sunt: verum stabilior est vinea & oneri farmentorum, & fructui ferendò, quæ ex utraque parte iugo deuincta pari libramento, velut anchoris distineretur, quàm quæ simpliciterio stipatur. Potest tamen vinea si non lata, nec fructuosa, & cælum non procellosum, vni iugo contenta esse, sed ubi magna vis pluuiarum, ubi præcipitibus clinis præsidia vitis desiderat, ibi quasi quadrato agmine circumfirmanda. Calidis, & siccis locis in omnem partem iugum porrigendum, ut prorepentes vndique pampini iungantur, & condensati cameræ more, sitientem terram obumbrent. Contrà frigidis, & pruinosis regionibus simplices ordines instituendi: nam sic facilius insolatur humus, fructus percoquitur, perflatum salubriorem habet, flossores libetius iactant bidentes, melius custoditur, & commodius à vindemiatore legitur. Neq; est alia ratio putationis, aut ceteræ culturæ, quàm quæ primi biennii. Nam & autumnalis ablaqueatio sedulo faciendâ, nec minus vacantiibus palis propagines applicandæ. Hoc opus nunquam intermittendum, neque enim quæ seruntur, immortalia esse possunt, attamen eorum æternitati sic consulimus, ut de mortuis seminibus alia substituamus, quine etiam crebræ foliiones danda, pampinationes sæpe adhibendæ, neque enim satis est semel tota æstate viti frondem superuacua detrachere. Decutiendæ etiam sunt omnia, quæ infra stettere apertè germinauerint. Item si oculi singuli sub iugo binos pampinos emisserint, quamuis largos fructus ostendant, detrahendi sunt eis singuli palmites. Post quadragesimum & alterum mensem instituenda est putatio, ut submissis pluribus flagellis vitis in stellam diuidatur. Sed putatoris officium est pedali ferè spatio circa iugum vitem compescere, ut à capite quicquid tenerum est, per brachia emissum prouocetur, & per iugum inflexum præcipitetur, ad eam mensuram, quæ terram contingere non possit. Sed modus pro viribus trunci seruandus, ne plures palmites submittantur, quàm quibus vitis sufficere queat. Prædicta ætas lato solo, trunco quæ tres materias, raro quatuor desiderat, quæ per totidem partes ab alligatore diuidi debent. Iugum à terra leuandum est quatuor pedum humillimum, septem cellissimum. In nouellis seminibus vitandum: sed per longam annorum seriem ad hanc altitudinem vitis perducenda est. Si solum humidius, cælum, & venti placidiores, altius attollendum iugum, nam fructus à terra summus minus putrescit, & hoc modo perflatur ventis, qui nebulam & rorem adsiccant, & ad deflorescendum, & vini bonitatem conferunt. Verum exilis terra, accliuis & torrens æstu, vel procellis obnoxia,



obnoxia, humiliter iugum poscit. At si cuncta ex voto, iusta altitudo vinearum pedum quinque. Sed vires melioris saporis mustum præbent, quæ in editiora iuga confurgunt. Quæ Plinius & Palladius habent, à Columella omnia didicere.

## De tempore putationis. CAP. XXVIII.

**P**UTATIO necessaria vitibus est, tum recenter enatis, tum perfectis: reciditur nouella, ut vires concipiat, & intra se pascat, sustenturas oneri, aliâ festinatione pariendi gracilis, ac emucida, ne cohibeatur castigatione tali, in fœtum exeat tota. Nihil audius nascitur, ac nisi ad pariendum vires feruentur, tota fit fœtus. Theophrastus de putationis tempore hæc habet. Alii sunt, qui maturè illas recidere iubent, quæ in solo sicco, & calido, quum primò sua folia dimittere cessauere; quæ in frigido, & pluuiæ positæ sunt, has paulò ante germinationem. Ratio quia in solo sitiente, humorem suum seruantes, meliorescunt, & fructum vini suauioris progenerant, quæ in frigido sunt, emisso humore, fructus fit incorruptior, & vini suauioris efficiens. Medium & temperatum agrum obtinentibus medium tempus statuitur. Sed non desunt, qui maturè amputari præcipiant, quòd palmites crassiores efficiantur, & nulli oculi obtundantur, & si tempus serenum contingat, plagæ siccantur. Quæ omnia plurimum prosunt; nam hyberno tempore gemmæ pereunt frigore magna ex parte, & plagæ vi siccescentes rumpuntur. Vere lachryma fluit, & per multi oculi excæcantur. Columella ita determinat: Si mitis, ac temperata permittit in ea regione, quam colimus, cœli clementia, facta vindemia secundum idus Octobris auspiciari putationem placet, quum tamen æquinoctiales pluuiæ præcesserint, & sarmenta iustam maturitatem cœperint: nam siccitas seriozem putationem facit. Sin autem cœli status frigidus & pruinofus hyemis violentiam denunciat, in idus Februarii hanc curam differemus. Sed id in exiguo possessionis modo, at ubi ruris vastitas temporis electionem neget, valentissimam vineti partem frigoribus, macerrimam vere, vel autumnò. Quin etiam per brumam meridiano axi oppositas vires, Aquiloni per ver, & autumnum deputari conueniet. Sed quanto maturius detonsa sunt, plus materia, quanto serius, plus fructus afferunt. Hesiodus Lunæ dies addit,

*Vnaq, post decimam felix incidere vites.*

Et alibi:

*At dum sex decies sol arduus occidit undis,  
Hybernum post solstitium, sacrosq, relinquens  
Oceanus fluctus sublimi Arcturus olympo  
Exoritur, primumq, cupit splendescere sydus,  
Tunc vites incide; noui neque nuncia veris  
Antiquos iterans quæstus precedat hirundo.*

**P**amphilus inchoat à Februario & Martio, à decima quinta Februarii, vsq.



ad vigesimam Martii. Alii post vindemiam, attritione sarmentorum vitem exonerari dicentes, & non vere lachrymantem alimentum perdere. Quæ in autumno putatur, vere citius germinant, & si ver frigidum & pruinofum, aduruntur. Quapropter frigidioribus locis vites præsecant, non amputant, vere postmodum putant. Putationem mane exoriri conuenit, vbi pruina à sole dissoluta, & sarmentum tepefactum. Palladius quæ habet ex his excepit.

*De vineatica falcis figura. CAP. XXIX.*

**V**INEATICA falcis figura est, vt capulo pars proxima, quæ rectam gerit aciem, culter ob similitudinem nominetur, quæ flectitur, sinus, quæ à flexu procurrit, scalprum, quæ deinde adunca est, rostrum appellatur, cui superposita semiformis Lunæ species, securis dicitur, eiusq; velut apex pronus imminens, mucro vocatur. Harum partium quæq; suis muneribus fungitur: nam quum in aduersum pressa manu defecare quid vinitor debet cultro vititur, quum autem retrahere, sinu, quum adleuare, scalpro, quum incauare, rostro, quum ictu cadere, securi, quum in angusto aliquid expurgare, mucrone. Maior pars operis in vinea ductim potius, quàm celsim faciendæ est: nam ea plaga, quæ sic efficitur, vno vestigio alleuatur, prius enim putator applicat ferrum, atq; ira, quæ destinauit præcidit: qui casim vitem petit, si frustratus est, pluribus ictibus vitem vulnerat: turior igitur putatio, quæ ductu falcis, non ictu conficitur. Insuper duro, tenuissimo, & acutissimo ferramento opus est exequendum, hebes falx putatorem moratur, plus laboris, & minus operis affert, & plagæ asperæ, & inæquales vitem lacerant: nam non vno, sed sæpius repetito ictu res transigitur & accidit, quod præcidi debet, perfringitur, sic vitis laniata, & scabra putrescit: quare monendus putator prolixi aciem ferri, ac nouacula similem reddat.

*Quæ vniuersè & peculiariter ad vitium putationem attinent.*

*CAP. XXX.*

**N**OS vniuersè primò, deinde particulariter putationem aggrediemur. Theophrasti doctrinam afferemus omnium principis, & præceptis. Vitibus, inquit, perfectis, primum ac summum putatio dabitur: quippe quum bene vitis putatur, germen & fructum melius affert, & diutius perennat. Omnes vites culturæ ingenium, modum & rationem exposcunt. Differentiam verò quam in operibus locorum ratio facit, cum in omnibus constat, tum in putatione. Quidam igitur determinant locis æstuosis, & siccis vites rescari ad breuem palmitem, ita enim fecundiores redduntur, quia vberius alere possunt; contra in humidis atq; succosis locis vites, quæ natura humida, ad longum, quia summa potius parte fructificant. Quidam in vniuersum de omnibus statuunt, non agri ratione, sed generum qualitatumq; iubetq; obseruari medullam in abscissis palmitibus: nam si multum medullæ habent, multos



tos breuesq; palmites relinqui oportet, vt vitis breuitate alere possit, multitu-  
 dine longè fructificet: sin autem parum medullæ multum palmitis anniculi  
 gerant, pauciores quidem, sed longiores palmites relinquendi, eoq; longiores  
 vbiq; quo minus inest medullæ. Mensura palmitum semper ad rationem me-  
 dullæ ita capi omnino debet, vt palmiti amplectenti, medulla in latitudine re-  
 spondeat. Prorsus si medulla partem maiorem cęsurę occupet, fructus vberes,  
 palmites imbecilles creari, propter alimenti tenuitatem existimant, contrā si  
 palmes recisus solidus, & iuuenili corpore constet, parum fructus, à parua me-  
 dulla: creari vnam à medulla, & palmitem à palmitē amplectente medullam:  
 10 argumentoq; vitem ipsam potissimo esse. Germina enim omnia, quæ nouellę  
 annotinis protulerunt brachiis, fructu carere propter exiguitatem medullæ,  
 & nouellas minus fructificare, quā veteres, scilicet eadem de causa, quum  
 carnem, & vinaceum medulla progeneret. Sed hoc minus verum apparet, si-  
 quidem medulla detracta creetur caro, vinaceum nequeat generari, nisi forte  
 in intima parte medulla detracta sic fiat. Columella autem: Vinitor tria præ-  
 cipuè in putatione custodiat, primum vt fructui consulat, deinde vt in sequen-  
 tem annum materias hinc eligat, tum etiam vt stirpi perennitatem acquirat:  
 nam quicquid ex his omittitur, magnum affert domino dispendium. Vitis,  
 quum sit per quatuor diuisa partes, totidē cœli regiones aspicit: ea igitur bra-  
 20 chia, quæ septentrioni obiecta sunt, paucissimas plagas accipiant, ne ingruen-  
 tibus frigorebus cicatrices inurantur. Itaq; vna materia iugo proxima, & vnus  
 infra cultos submittendus erit, qui vitem in annum reuocet. At per meridiem  
 plures palmites submittantur, qui æstiuis feruoribus matrem opacent, nec pa-  
 tiantur fructum inarescere. Orientis, atque occidentis haud magna est in-  
 putatione differentia, quoniam solem pari horarum numero sub vtroq; axe  
 accipit. Modum materiarum dictabit humi atq; ipsius plantæ lætitia. Hæc in-  
 vniuersum: illa per partes custodienda sunt. Igitur ab imo vitis, quasi à funda-  
 mentis circa crus dolabra terra dimouenda est, & si soboles radicibus adheret,  
 diligenter resecanda. Truncus deinde circumspiciendus, ne aut pāpinarius pal-  
 30 mes internatus, aut furunculus relinquatur, nisi si iugo superiecta vitis delide-  
 rabit ab inferiore parte reuocari. Si trunci pars, sole aut aquis peraruit, dola-  
 bella expurgabis quicquid emortuum est viuo tenus, vt à viridi codice du-  
 cat cicatricem, mox plagam terra, quam prius amurca madefeceris linies,  
 nam teredinem, formicamq; prohibet, solem & plunias arcet. Cortex dein-  
 de aridus, fissusq; per summam trunci dependens, corpore tenus delibrandus  
 est, quod & melius vitis sordibus liberata conualescit, & minus vino facis  
 affert. Si muscus comprimit, ferro eradendus est. Hæc de ima vitis parte.  
 Plagæ, quas in duro vitis accipit, obliquæ, & rotundæ fieri debent, nam  
 citius conualescunt, & quandiu cicatricem non obdlexerint, commodius a-  
 40 quam fundunt, transuersa plus humoris excipiunt, & continent. Sarmenta  
 lata, vetera, male nata, contorta, deorsum spectantia recidito, nouella, &



fructuaria recta submittito, brachia tenera, & vitiſſe ſeruato. Vngues cuſto-  
 dum annotinos reſecato. In quatuor pedes ſupra terram vitem elatam toti-  
 dem brachiis componito, quorum ſingula ſpectent decuſati iugi partes, tum  
 vel vnum flagellum, ſi maior vitis erit, vel duo, ſi plures, brachio cuiq; ſub-  
 mittito, eaq; iugo ſuperpoſita præcipitato. Sed meminiffe oportet, ne in ea-  
 dem linea, vnoq; latere brachii eſſe duas materias, pluresve patiamur: nam id  
 maximè vitem infeſtat, vbi non omnis pars brachii pari vice laborat, atq; æqua  
 portione ſuccum proliſuæ diſpentat, ſed ab vno latere exugitur. Vocatur et-  
 iam focaneus palmes, qui ſolet in bifurco medius prorepere. nominis ratio,  
 quòd inter duo brachia enatus, veluti fauces obſidet, atq; vtriuſq; alimenta  
 præripit, amputandus igitur, priuſquam corroboretur. ſi tamen roboratus,  
 vt alterum brachium affligerit, illud tollitur, & focaneus ſummittitur. Igitur  
 caput vitis pendens infra iugum conſtituito, vnde ſe pandant quatuor bra-  
 chia in quibus quotannis vitis renouetur, amputatis veteribus, & ſubmiſſis  
 nouis palmitibus, quarum delectus ſcitè faciendus. Nam ſi magna materiarum  
 facultas, putator cuſtodiat, ne aut proximis duro id eſt ab trunco, & capite  
 vitis relinquat, aut ruruſus extremas: nam illæ exiguum fructum præbent, hæ  
 vitem exhauriunt; ſe nimio fœtu onerantes, & ſe extendentes. Quare medio  
 in brachio commodiſſimè palmæ ſubmittentur, quæ nec ſpem vindemiæ de-  
 ſtituant, nec emacient ſtirpem. Subſidiarius idemq; cuſtos in pollicem reſe-  
 cari non debet, quum palmæ ex quibus fructus ſperantur, idoneo loco ſitæ  
 ſunt: nam vbi ligaueris eas, & in terram ſpectantes flexeris, infra vinculum  
 materias exprimes. At ſi longius, & à vitis capite emicuerit, & in aliena iugo-  
 rum compluuiâ brachiis proreperit, cuſtodem validum, iuxta truncum duo-  
 rum articulorum, vel trium relinquemus, ex quo proximo anno citata mate-  
 ria formetur in brachium. Sed in ſummittendo cuſtode hæc maximè ſunt ob-  
 ſeruanda. Primùm ne reſupina cœlum, ſed prona plaga terram ſpectet, ſic go-  
 licidiis ſe ipſa protegit, & ſole: deinde ne ſagittæ, ſed vngulis ſimilis fiat reſe-  
 ctio, nam illa celerius emoritur, hæc tardius reformidat. Maximè vitandum  
 eſt, ne cuſtos iuxta articulum recidatur: nam plurimum officit, quoniam ſe-  
 cundum plagam gemma poſita, frigore, & æſtu laborat, igitur medio inter-  
 nodio palmes attondetur deuexè, ne lachryma obcæcet oculum. Si reſecis ſa-  
 cultas non erit furunculum remittamus, ſi neq; is reperiatur, ſaucianda ſer-  
 ro eſt vitis, ex ea parte qua pampinum elicere ſtudemus. Palmiteſ quos vinde-  
 miæ præparamus, clauiculis & nepotibus liberandi. Quicquid è trunco pro-  
 ceſſit, eraditur, quo celerius obducatur cicatricem. Quicquid è tenero proces-  
 ſit, parcius detonderetur, quum coniunctam gerat ab latere gemmam. Materie  
 longitudini difficile eſt modum imponere, ſunt qui in tantum prouocant, vt  
 præcipitata per iugum nequeat terram cōtingere. Sed prius vitis habitus con-  
 ſpiciendus, nam ſi robuſtus, ampliores materias ſuſtinet: deinde ſoli pingue-  
 dinem, quæ niſi adeſt, proceribus flagellis emaciatam necat. Longitudo pal-  
 mitum



mitum non mensura, verum gemmarum numero aestimabitur, nam si maiora internodia, eo usque materiam producere licet, dum terram contingat: at ubi spissa, multis palmitibus virefcit, numeroso quoque fœtu exuberat. Consideret præterea vinitor, proximi anni magna nec ne, fuerit vindemia: nam post largos fructus, parcendum est vitibus, idè angustè putandum, post exiguos imperandum. Palladius quæ à Columella excepit, Februario mense habet.

*De pampinatione. C A P. XXXI.*

**S**ECVNDVM & quodammodo putationi proximum pampinationem esse dicit Theophrastus. Enimvero in hac etiam scire necessarium quænam reliquissè, quæve detraxisse conducatur, tam ad fructuum rationem, quàm ad vitis naturam. Quum vites germinant, omnia quæ fructu carent detrahi censent, quæ fructum gestant demutilari, quum vva floret, ut nec vitis ad abscissum palmitem incrementum compellat, & quantum alimenti supersit, in eadem parte coactum vvam augeat. Semper ex recisione querendum, id est, ut & vitis conualescat, & fructus copia consequatur. Iustum igitur pampinationem aggredi, quum fructus incipit provenire, mox vinea confodienda profectò est, tunc enim fructus novus, & recens editum germen, sarculum tempestivè recipiunt, quum maxime augeri contendunt. Post hæc iterum pampinare convenit, antequam florere incipiant: interim enim pendula racemi augescere solet, quia nondum acina constiterant, post ubi defloruerint, vva pendula iam constitit, acina consistere, atque augeri incipiunt. A quo Columella. Vineam quàm benè putare, tam diligenter pampinare vtile est, nam & materia, quæ fructum habent, melius conualescunt, & putatio sequentis anni expeditior fit, tum & vitis minus cicatricosa, quoniã id, ex quo viride & tenerum decerpitur, protinus conalescit. Super hæc quoque melius vva maturescunt. Ante dies decem, quàm vinea florere incipit, pampinatam habeto, quicquid superuacuienatum fuerit tollito, quod in cacumine, aut in brachiis natum erit, decerpito, duntaxat quæ vvam nõ habebunt. Cacumina virgarum, ne luxurentur, demutilato. Vvas, quæ meridiem, aut occidentem spectabunt, ne perurantur, suo sibi pampino tegito. Sotio germina adhuc tenera oportere auferre dixit: ita enim perspirationem viti exhibebis: pampinatio per manus fit, eiusdem experientia est putare, & pampinare, quapropter experti aliquando sarmentum fructum habens auferunt, & non habens sinunt. A recenti vite plus germinum auferendum est, ne grauetur. Quum caliditas solis hebescere incipit, folia auferre oportet, quo omnes racemi à sole calefiant, & percocti maturescant. Paxamus addit: Vites quæ fructum putrefaciunt, & vix aliquando maturum reddunt, ob terræ humiditatem, & foliorum densitatem, triginta diebus ante vindemiam præpurgare oportet, foliis ex obliquo & à latere detractis, quo inspirantes venti vvam refrigerent. Verum folia in summitate relinquenda sunt, quo aduersus excellentem æstus vigorem protegentia.



foli in summo vitibus incumbenti umbram obliant. Si multus imber in autumnino fiat, ut intumescerent acini valde augeant, etiam folia circa verticem tollenda sunt, ne vinum acescat. Plinius, Pampinatio verna in confesso est, ab idibus Maiis intra dies x, utiq; antequam florere incipiat, & eam in fra iugum debere fieri. De sequente variant sententia: Quum defloruerit, aliqui pampinandum putant, alii sub ipsa maturitate. Sed de his præcepta Catonis decernunt. Sed Cato hæc habet. Vbi vinea frondere cœperit, pampinato. Vbi vva varia fieri cœperit, vites subligato, pampinatoq;

*De propagatione. CAP. XX XII.*

**P**ROPGATIONVM tria genera, inquit Columella. Vnum, quo virga re-  
 edita à matre sulco committitur; alterum, quo ipsa mater prostermitur, atq;  
 in plures palos per suas virgas dividitur: tertium, quo vitis scinditur in duas,  
 vel tres partes, si diuersis ordinibus diducenda est. Hoc genus tardissime con-  
 nalescit, quia vitis diuisa medullam amittit. Si virgam à matre in terram depri-  
 mere voles, scrobem quoque uersum quatuor pedum facito ita, ut propago  
 non lædatur alterius radicibus. Deinde quatuor gemmas, quæ in imum scro-  
 bem perueniant, relinquito, ut ex iis radices citentur, reliquam partem, quæ  
 continens matris est, abradito, ne superuacua sarmenta procreet; diuersa au-  
 tem, quæ supra terram extrare debent, ne passus fueris plus, quam duas aut  
 tres gemmas habere: reliquas quæ in terram absconduntur, exceptis quatuor  
 imis, fac abradas, ne in summo radices creet. Hoc modo tertio anno à ma-  
 tre separabitur. Sin autem ipsam vitem sternere voles, iuxta radicem mira, ne  
 ipsam lædas, curiosè fodito, & vitem supplantato, ne radicem abrumpas.  
 Quum eam straueris, & videris quousq; possis pertingere, sulcum vnum fa-  
 cies, in quem vitem dimittas, deinde ex sulco, quasi ramos fossarum facies,  
 per quos utriusq; virga postulauerit propagetur, atq; ita terra adoperies. Sin  
 autem vitis exiguum materiam habebit, & in diuersos ordines diducenda  
 erit, neq; aliter potuerit palos, ad quos perducitur, pertingere, quam ut dif-  
 fluat, curabis ut quàm acutissima falcè ab ea parte, quæ bifurca est, findas, &  
 eodem ferro acuto plagam emendes, sicubi inæqualiter findi videbitur, sic  
 diducta poterit in plures ordines diuidi. Non inutilis est etiam illa propaga-  
 tio, quam ipse reperit, si quando in ordinem vitis deest, neq; est tam proceræ  
 virga, quæ quum in imum scrobem demissa fuerit, retorqueri, & erigi supra  
 terram possit. Breuitatem ne reformidaueris, sed qualemcunq; virgam, cuius  
 cacumen in imum scrobem peruenit, deprimito, & obruito, deinde gemmas,  
 quæ secundum ipsam matrem sunt, submitto, ut materias à superiore parte  
 citent. Tum demum post triennium à matre amputato, & ad suum palum  
 eam partem, quam à matre præcideris, reducito, & caput vitis facito. Pro-  
 paginis scrobem ne minus triennio paulatim completo, summas radices  
 præcidito, crebro fodito. Præsidarii malleoli hoc modo propagantur. Ex 40  
 ordinaria



ordinaria vite in alterum palum mergus est attrahendus. Mergi genus est, vbi supra terram iuxta suum adminiculum vitis curuatur, atque ex alto scrobe summersa perducitur ad vacantem palum. Tum ex arcu vehementem citat materiam, quæ protinus applicata suo pedimento ad iugum euocatur. Sequente deinde anno infecatur superior pars curuaturæ vsq; ad medullam, ne totas vires matris propagatum flagellum ad se trahat & vt paulatim condiscat suis radicibus ali. Bima deinde præciditur, proximè palmam, quæ ex arcu submissa est, & id quod à matre abicissum recens erit, confestim altè circumfoditur, & scrobiculo facto, ad inuicem solum præciditur, adobruiturque, vt & radices deorsum agat, nec ex propinquo diligenter in summa terra resectum progerminet. Tempus autem idoneum hunc mergum amputandi ab idibus Octobr. in Idus Nouembr. vt hybernæ mensibus suas radices consummet: nam si vere id fecerimus, quo gemmate palmites incipiunt, matris alimento subito destitutus languescit. Anatolius aporygem palmitem sic propagat. Scrobem pedali altitudine effodit, ipsumque sarmentum inclinatum non decidens, sed deflectens in scrobem imponit, & aggesta effossa terra conspicuam sarmentipartem supra terram eminere sinit, ita vt altera ipsius pars viti coniuncta, velut ab vbere alimentum trahat, altera verò in terra nutriatur, & sic radices agat à duabus matribus coactum. Quæ hoc modo plantata erunt, fructum facile ferunt, & vberissima proueniunt, vt pote maternis, & propriis radicibus connutrita, triennio transplantantur. Palladius quæ à Columella habet, in Februario recitat. Cato vites in quasilis propagat, quam cationem quia sapientis hoc libro recensuimus, hic conticendam duximus.

*De puluere vitibus excitando.*

C A P. XXXIII.

**Q**UVM nigrescere vna incipit primis temporibus Theophrastus damna-  
re videtur pulueris excitationem, quousq; ad maturitatem perueniat. Motus enim percoquendi, motu altero auocatur, vetaturq; quæ de causa nec herbam euellendam per id temporis cēsent: At verò inutilem, noxiāve putari, nulla ratio est. Vfus enim, & quod in aliis fieri solet, vilem esse planè confirmant, cucumeres namq; puluere occultati nutriuntur & meliores fiunt, sed mirum videretur, quū puluis aridus sit, quomodo nutrire possit. Ratio est, quia citata humo vaporati cuiusdam aëris alimentū reddatur, vt de solo vaporoso retulit: & quia fructus obiectus puluere, defendatur à solis feruore, & quia leniter molliorq; siccescens, amplius à vite attrahere pabulū possit, quippe hæc omnia cū ad copiā alimentī, tum ad facultatē coquendi nimirū adiuuant. Columella autē: post pā, inationem pubescenrē, & quasi adolescentē fructū conuenit religare, foliisq; omnibus nudare, tū & crebris fossionibus implere: nam sit vberior puluationibus. Nec inficiatur maiores tribus fossuris contentos fuisse, quū Celsus, & Atticus tres esse in vite motus dixerint, seu potius in omni



furculo naturales, vnum, quo germinet, alterum, quo floreat, tertium, quo mature scat, hos ergo motus censent fossionibus concitari. Nō enim natura quod vult satis efficit, nisi eam labore, & studio iuueris. Alibi verò: Simulatq; vna variari cœperit, fodito tertiam fossuram, & quum iam mature scet, ante meridiem prius, quàm calere incipiet, & quum desierit post meridiem, fodito, puluerēq; excitato, ea res & à sole, & à nebula maximè vuā defendit. Finis autem fodiendi nullus est: nam quanto sæpius foderis, tanto vberiore fructum reperiēs. Plinius: Sunt qui puluere quoq; vuas ali iudicēt, pubescentesq; puluerent, & vitium arborumq; radicibus aspergant, quod certum est Narbonensi prouinciæ, & vindemias certius sic eo coqui, quia plus puluis ibi, quàm sol confert. Cassianus Iulio mense vites fodit: nam puluis maximè vuam maturam reddit & magnam, quapropter vitis iuxta viam sita vberiore & pleniorē fert fructum, propter excitatum à prætereuntibus puluerem, & solē vitium illē fossione non indigent. Virgilius,

*Sollicitanda tamen tellus, puluisq; mouendus.*

*De per se stantis vineæ cultura, & brachiata & capitata:*

#### C A P. XXXIII.

**N** V N c ad alias vinearum species transeamus. Vitis, quæ sine adminiculo suis viribus consistit, solutiore terræ scrobe, denfiori sulco ponenda est. Scrobes & sulci plurimum profunt, si in temperatis locis ante annum fiant. Ac si ieiuno, & exili agro semina deponentur, sub ipsum tempus sationis scrobs aut sulcus faciendus. Scrobs in longitudinem, altitudinemq; defossus tripedaneus abundè est, latitudine tamen bipedanea, vel si quatuor pedum spatia inter ordines relicturi sumus, cōmodius habemus eandem quoquo uersus dare mensuram scrobibus, non amplius tamen, quàm in tres pedes altitudinis depressis. Cæterum quatuor angulis semina applicabuntur, subiecta minuta terra, & ita scrobes adobruentur. Si aratro vineas culturi sumus laxiora interordinia relinquenda, si bidentibus, angustiora, sed neq; spatiosiora, quàm decem pedum, neq; contractiora, quàm quatuor. Multi ordines ita disponunt, vt per rectam lineam binos pedes, aut plurimum ternos inter semina relinquunt. Transuersa rursus laxiora spatia faciant, per quæ vel fossor, vel arator incedat. Depositam ergo stirpem formare sic conuenit, vt vitis sine pedamine consistat. Adminiculum teneræ viti contribuemus, quod vel infantiam eius tueatur, producatq; vsque in sesquipedem. Quum deinde robur accepit, sine adiumento consistere valens, aut capitis, aut brachiorum incrementis adolescit (nam duæ species huius cultura sunt) alii capitatas vineas, alii brachiatas magis probant. Brachiata ita componitur, à summa parte, qua decisa nouella vitis est, quicquid iuxta cicatricem citauerit, conseruatur, & in quatuor brachia pedalis mensuræ diuiditur, ita vt in omnem partem cœli singula aspiciant. Sed hæc brachia non statim primo anno tam procera submittuntur, ne oneretur exilitas vitis, sed compluribus putationibus



tionibus in prædictam mensuram reducuntur, deinde ex brachiis, quasi quadam cornua prominentia relinqui oportet, atque ita totam vitem omni parte in orbem diffundi. Putationis autem ratio eadem, quæ in iugatis vitibus, vno tantum differt, quod pro materiis longioribus pollices quaternum, aut quinum gemmarum relinquuntur, pro custodibus autem bigemmes reseces fiunt. In vinea, quam capitata diximus, iuxta ipsam matrem usque ad corpus samentum detrahitur, vna, aut altera gemma relicta, quæ trunco adhæreat, sed hoc in lætis locis fieri potest, vbi vis terræ fructum & materias præbet. Eiusmodi vinea aratris excolitur, detrahunt enim vitibus brachia, quod ipsa capitata sine vlla extantia, neque aratro, neque bubus obnoxia sunt: nam in brachiatis, crure & cornibus bouum ramuli vitium plerunque defringuntur. Sed hæc cultura brachiatis, & capitatis vitibus, antequam gemmæ, adhibetur, quum deinde germinauerint, fossor insequitur, ac bidentibus eas partes subigit, quas bubulus non potuit perungere. Mox vbi materias vitis exigit, sequitur pampinator, superuacuos abscindit & fructuarios submittit, qui quum induruerunt, velut in coronam religantur. Hoc duabus fit causis, vna ne libero excursu prorepant, & alimenta pampini absument, altera vt religata vitis aditum bubulco & fossori præbeat. Pampinandi modus, vt opacis locis æstate vitis nudetur, locis calidis vix contegantur, si desint frondes, adnectis muniantur. In Batica vites regetibus sub ortu Caniculæ obumbrantur. Libro de arboribus multa addit. Si vitem in se consistere voles, in orbem quam rectissime formetur: nam sic composita speciosa erit, & minus laborat, quum vndique æquilibrio stabilita in se requiescat. Sat erit quum primò brachia submittentur, singulas gemmas singulis samentis relinqui, ne onere grauetur, post vineam bidentibus fodito, vel si latè disposita sit, aratro. Ab Idibus Octobr. ablaqueare incipito, ante brumam ablaqueatam habeto. Post brumam vitem ne colito, nisi eas radices prosequi velis, quæ in ablaqueatione apparebunt, sed ita reseces, vt instar vnus digiti à matre relinquant. Peracta ablaqueatione ante brumam tertioquoq; anno macerati stercoreis, ne minus binis sextariis, ad radices vitium posuisse conueniet. Post brumam ante æquinoctium vernum octauo Cal. Aprilis ablaqueationem adæquato. Post idus Aprilis terram ad vitem aggerato, æstate sæpissime occato. Iugerum vineæ quinque operis ablaqueatur, quinque foditur, tribus occatur, quatuor putatur, sex alligatur. Anatolius iubet post ablaqueationem stercoreare, bubulo aut ouillo, aut suillo stercore, aut aliorum pecorū. Columbinum calidissimum existens ad celerem germinationem idoneum, sed vino incommodum. Singulis vitibus quatuor heminas cuiuscunq; ex prædictis, paulò longius à trunco, nec nudis radicibus iniiciendum, nam eas adurerent. Si sterco deerit, paleæ fabarum aliorumque leguminum pro eo succedent, nam contra glaciem, & reptilia profunt. Vinacea etiam valent, & verus vrina. Si glacies concreseat, etiam circa truncos sterco conuenit. In terra arenosa stercore ouillo aut caprino vtetur, in argillosa bubulo.



*De prostrata vinea cultura, & characata. CAP. XXXV.*

**S**UPEREST prostrata vinea cultura, quæ, ut Columella inquit, nisi violentissimo cœli statu suscipi non debet: nam & difficilem laborem colonis exhibet, nec vnquam generosi saporis vinum præbet. bipedaneis ergo scrobibus malleolus deponitur, qui quum germinauerit, ad vnâ materiam reuocatur, eaque primo anno compefcitur in duas gemmas, sequente deinde quum palmites profudit, vnus summittitur, cæteri decutiuntur: at ille, qui summus est, quum fructum edidit, in eam longitudinem deputatur, ut iacens non excedat interordinii spatium: nec magna est putationis differentia cubantis, & stans rectæ vineæ, nisi quod iacenti viti breuiores materiae summitti debent, resces quoque angustius in modum furunculorum relinqui, sed post putationem, quam vtrique autumnio in eiusmodi vinea fieri oportet, ut vitis tota deflectatur in alterum interordinium, atque ita pars ea, quæ fuerat occupata, vel foditur, vel aratur, & quum exulta est, eandem vitem recipit, ut altera quoque pars excoli possit. De pampinatione talis vineæ parum inter auctores conuenit, alii negant esse nutandi vitem, quod melius contra iniuriam ventorum ferarumque fructum abscondat. Aliis placet parcius pampinari, ut & vitis non in totum superuacuis frondibus oneretur, & tamen fructum vestire, aut protegere possit. In characatis vineis prolixos palmites, quasi propagines summo solo adobruunt, deinde rursus ad arundinem erigunt, & in fructum summittunt, idque simplici ex causa, quod existiment plus alimenti terram præbere fructuariis flagellis: & post vindemiam, velut inutilia decidant, & à stirpe summovent: sed ipse præcipit easdem virgas à matre præcisas, sicubi demortuis vitibus ordines vacent, aut si quis nouellam vineam instituit, pro viuiradice ponere. quoniam ea pars, quæ fuerat obruta, radices habet, quæ deposita confestim comprehendet. Palladius habet, quæ à Columella excepit.

*De ratione pedaminum, & viminum. CAP. XXXVI.*

**I**AM vineæ pedaminum iugorum, & viminum tradenda ratio est hæc enim quasi quædam dotes vineis ante præparantur, quibus si deficiat agricola, causam faciendæ vineæ non habet, quum omnia, quæ sunt necessaria, quæenda sint extra fundum. earum enim comparatio molestissima, translatio hyberno tempore iniquissima, quare castaneta, saliceta, arundineta, & vimina consuetò conferenda sunt. Viminalium singula iugera, quinis & vigenis iugeribus ligandæ vineæ sufficere possunt, arundineti singula iugera vigenis iugandis, castaneti iugerum totidem pedandis, quæ arundineti iugandis, quorum rationum rationes iam suis locis redditæ sunt, & superfluum puto hac afferre. Per arida loca, quæ id genus virgultorum non recipiunt, genistam postulant, eius quum sit satis firmum, tum & lentissimum est vinculum. Seritur autem semine, quod quum est natum, vel defertur bima viuiradix, vel relictæ quum id  
tempus



tempus excessit, omnibus annis more segetum iuxta terram demeti potest. Cætera vincula quali sunt ex rubo, maiorem operam, sed in egeno tamen necessariam exigunt. Castanea roboribus proxima est, & ideo stabiliendis vineis habilis. Potest & quercus simili ratione seri, verum biennio tardius, quàm castanea deciditur. Castanea pedamentis omnibus præfertur à Plinio, facilitate tractatus, perdurandi peruiacia & regerminatione cædua, vel salice latior. Esculus cæsura triennio serior, nimis morosa nasci, hoc pedamentum minime putrescit, la sum que maximè fruticat. Præter hæc sunt cædua fraxinus, laurus, persica, corylus, malus, sed tardiùs nascuntur. Sambucus firmissima ad palum. Didymus paxillorum supernas partes feruenti pice illinit, non eas, quas in terram depangimus. Stent perticæ rectæ, neque inflectantur, vt nec vites similes sibi ipsis faciant.

# IOAN. BAPTISTAE

## PORTÆ NEAPOLITANI

### VILLÆ

LIBER OCTAVVS

SIVE

ARBVSTVM.

PROOEMIUM.

10



Ad eam vineæ speciem deuentum est, quæ viuo innititur pedamento, eamque arbustum veteres vocarunt. Res proxima, cognataque, ob id post vineam de arbusto dicemus. Ita vites arboribus maritantur, vt fœminæ viris, & arbores vitibus orbatæ, viduæ dicuntur. Horatius,

*Ergo aut adulta vitibus propagine,  
Altas maritat populos.*

Et alibi:

*Et vitem viduas ducit ad arbores  
Populos.*

30



Maritantur enim vites arboribus, non tam ut fructus edant, quàm ut eos edant meliores: nisi enim arboribus sublimarentur, humi repentes, longè posteriores vuas, & fatuas ederent, nullum saporem habentes, seroque ad maturitatem peruenirent. At arboribus maritæ, ab aëre perflantur, fouenturque à sole, quare nobilia vina non nisi arbutis gigni longo tempore decretum est. Sunt enim arbores eo ingenio, ut nisi propè satas quasdam habeant, & occulta quadam fortasse vi se muniò adiuuantes sterilecant, ut vitibus contingere videmus, quæ arboribus indigent ad nobiliores fructus edendos. Vires natura sublimitatis avidæ, nullo fine crescunt, ut per arborum ramos scandentes cacumina æquant, in tantum sublimes, ut vindemiator autoratus rogem ac tumultum excipiat. Miratum altitudinem earum Aricia ferunt legatum Regis Pyrrhi Cyneam, facetè luisse in austeriore gustum vini, meritò matrem eius pendere in tam alta cruce. Cato arbusto octauum locum tribuit, congruitque cum octauo nostræ villæ libro. Fundum suburbanum arbustum maximè conuenit habere, ut ligna, & virgæ salicti venire possint, & lucrum domino fiat, qui utatur. Tradit Plinius arbusti rationem mirum in modum damnatam Sæternæ patri, filioque, celebratam Scrofæ, vetustissimis post Catonem, peritissimisque, ac ne à Scrofa quidem, nisi vni Italiæ concessam, quum tam longo indicetur æuo, nobilia vina non nisi in arbutis gigni, & in his quoque laudatiora summis, sicut vberiora imis: adeò excelsitate proficitur. Nihil ibi malleolis, atque pastinatione opus est, nulla fodiendi impendia, utpote quum arbusti ratio hac peculiari dote præstet, quod in eodem solo seri fruges, & vitibus prodest. Superque, quod vindicans se altitudo, non, ut in vinea, ad arcendas animalium iniurias, pariete, vel sepe, vel fossarum utique impendii muniri se cogat. Florentinus Græcus de arbusto loquens, Arboreæ vites omnibus commodiores sunt: nam & melius, diuturnius, & dulcius vinum efficiunt: & ex interuallis positæ, terram in ipsis quarto quoque anno seminari permittunt.

*Quid sit arbustum & arbores arbutine. CAP. I.*

**L**OCA vitiferis arboribus confita veteres arbuta vocarunt. Alii intelligunt per arbustum arbores in aciem dispositas ad vites sustentandas. Sed Calliclorus Iureconsultus in titulo de Terminis moto fruticosas arbores intelligit, ex arbore vna arbustum facere. Quod arboribus maritari vites desiderant, ostendit earum physiognomoniam. Videmus enim tam esse sublimitatis avidas, ut in magnam altitudinem exeant, ut saepe ex se domorum tecta scandant: nullum finem ascendendi habent. Dedit quoque videmus eis Naturam capreollos, quos clauiculas & pampinos vocamus, Græci helicas, Varro codiculos, virescentes intortos ut cincinni, à capiendis dictos, quoniam ad locum capiendum sursum versus serpant, ex his altissimis arboribus maritandæ, & sic nobilissimum vinum ferunt. Quod si eis non dederis quibus fulciantur adminicula, improbo reptatu per arua vagantur, succumque terræ passim bibentes, ignobile vinum ferunt.



Ferunt. Sed arbutiuas arbores, quæ sint, indicat Columella: Opulus maximè vitem videtur alere: sed quia raram, neq; idoneam frondem pecori præbet, à plerisq; repudiata est, immò Gallico arbusto peridonea, quod vocatur rumpotinum, id enim desiderat arborem humilem, nec frondosam. Vlmus, quod & vitem commodissimè patiatur, & iucundissimum pabulum bubus afferat, variisq; soli generib. proueniat, à plerisq; feritur. At fraxinus, quia capris, & ouibus gratissima est, nec inutilis bobus, locis asperis, nec montosis, quibus minus lætatur ulmus, rectè feritur. Quin etià cornus & carpinus, & ornus, nonnunquā salix à plerisq; in hoc ipsum disponitur, sed salix nisi aquosis locis, vbi alia arbores difficilius comprehendunt, ponenda non est, quia vini saporem infestat. Plinius has recēset: Prima omnium ulmus, excepta, propter nimiam frondem, atrinia, deinde populus nigra eadem de causa minus densa folio: nō spernunt pleriq; fraxinū, ficumq; & etiam oleam, si non sit umbrosa ramis. Transpadana Italia præter supradicta, cornu, populo, tilia, acere, orno, carpino, quercu arbutat agros, Venetia salice propter viginem soli. Florentinus has decernit: Non omnes arbores vitibus arboreis supponere, & adiungere oportet, sed quæcunq; vnā radicem habent, velut est alba populus, aut quæ radices habent contractas, & comam non valde profundam, vt ne penitus vitem obumbrant. Sunt autem eiusmodi vlmi, populi nigra, fraxini, aceres. Cognouitq; in Bithynia vitem arboream ceraso delectari, & maximè escariam, & amineam, quæ & multi fructus, & multi vini causa existit. At terram hæc etiam quarto quoq; anno seminare licet, & non solum vitem non offendi, sed etiam præstantius vinum inde fore promittunt.

*Differentia inter vlmum, & populum.* CAP. II.

**V**ETERVM & neotericorum calculis sancitum est inter arbutiuas arbores primas partes vlmum & populum sibi vendicare, sunt qui vlmum præferant, Columella nigram populum ab arbusto abdicat, nobis autem videtur reicienda ulmus, recipienda verò populus. Plinio vlmi umbra videtur leuissima, etiam nutriens quæcunque opacat, sed Attico hæc quoque videtur è gravissimis, nec dubitat Plinius, si emittantur in ramos: constricta verò vlmi noxiam esse non arbitratur. Sed profectò qua id dixerit ratione, facile nescire confitemur, quum omnibus agricolis in confesso sit, & quotidiana nobis experientia manifestum, vlmorum vmbra non nutricem, sed nouercam esse; & vuas ab vlmorum frondibus opacatas, nunquam maturitatem recipere, etiam post vindemiam. Folia ramulosa ferr, densa, breui, firmoq; pediculo appensa, copiosa, nullis ventis mobilia, auctu morosa, radicibus prælongis, crassis, vltro citroque vagantibus, validis vt macerias & muros terebrent, densam sobolem pullulantibus, vt locum, in quo crescat, radicibus compleat, & irritat, vt atrum remoretur, vt multo alimento quo indigeat, omnes in sua vitia macrescere, & arescere cogat. Obuiam quamque arborem radicibus



circundat, & strangulat. Sæpius videtur contingit vitem nulla de causa exarescentem, tunc ablaqueatam ab vltimi radicibus complexam, obstructam, strangulatamque conspeximus, & securi radicibus præcisâ aliquando conualuit. Infelices illi, sæuique dici possunt complexus viti, quibus obstructa vxor præsecatur. Nimia zelotypia vxor demactatur, non alitur. Prædensa, callosa que etiam sua fronde ventos arcet, qui & alere, & maturare solent fructus. Contra verò ad vitem alendam, idonea & egregia omnia populus habet. Fronde leui, parua, longo pediculo, eodemque ventis omnibus semper ludenti, mobilissima, ut non solum nullam umbram facere dici possit, sed crebro iactatu solem temperet. Vnde soli, & ventis omnibus semper prostrata, suaque per brachia repens, ad cælum pergit. Radice breui, gracili, nuda, nec repullulante, paucioque indiget nutrimento, ut vxor non surripiat. Alias rationes omitimus, ne prolixius euagemur, quam par sit. Igitur omnibus consulendum indicauimus, nunquam nisi vbi necessitas cogit, in montuosis arbutum ex vltimis conferi debere.

*De agro arbutis idoneo eligenda. CAP. III.*

**E**T si ager vineis aptus idem & arbutis idoneus censeatur, tamen est aliquid arboribus indulgendum, quibus arbutum constituatur. Virgilius,

*Qua tenuem exhalat nebulam fumosq; volucres,*

*Et bibit humorem, & quum vult ex se ipsa remittit:*

*Quæq; suo viridi semper se gramine vestit,*

*Nec scabie, & salsa ladit rubigine ferrum.*

*Ille tibi latu intexet vitibus vltimos.*

Colomella præcipit locis pinguibus conferendam vltum, vel etiam medioeribus, sed asperis, & siticulosis neque opulus, neque vltum tam idonea, quam orni, & fraxini: Florentinus verò Græcus, Arboreas vites in campestris, & concauo, & plano loco plantandas ostendit. Meminisse enim semper, & peculiariter obseruare oportere, quod humilibus vitibus illa terra aptior est, quæ in obliquis, leuiter accliuibus, altioribus, & siccioribus locis existit: hæc enim æstatem leniorem habebit, probeque perflabitur. In campestri verò plana que, & humida terra, arboreas vites plantare oportet: & calidioribus locis, vbi venti non valde vehementes sunt, & ipsas in arboribus eleuatas, placide perflantes nutriunt. In frigidis locis, & ventosis arboreas vites læduntur.

*Conferendarum arborum ratio in arbutis. CAP. IV.*

**Q**UOD OMNINO autem arbores in quincuncem ordinatæ in arbutis disponeretur, iam quarto libro demonstrauimus: & quamplurimis in locis in Neapolitanis agris nostra manu consita elegantissime visuntur. Interualla verò arboribus præcedenda ex soli qualitate, & cultura perdiscuntur. Sed &

maiori.



maioribus ediscamus. Varro de formæ cultura hæc dicit, quæ specie fiant venustiora, sequi, vt maiore quoque fructu sint: vt qui habent arbuta, si sata sunt in quincuncem, propter ordines, atque interualla modica. Columella de interuallis loquitur: si frumentis consulendum, vberi solo intra quadraginta pedes, exili verò, vbi nihil feritur, intra viginti arbores disponantur. Et alibi: Arbustum inter quadragenos pedes dispositum esse conuenit: sic enim & ipsæ arbores, & appositæ vites melius conualescunt, fructumque meliorem dabunt. Segetes enim, quæ in eo erunt, minus ymbra laborabunt. Ab eo Plinius: Interuallum iustum arborum, si aretur solum, quadrageni pedes in terga, frondemque, in latera vicini: si non aretur hoc, in omnes partes. Nec omittenda aliqua, quæ Florentinus Græcus habet. Ordines habeant interualla cubitorum quindecim: ita enim & melius vinum erit, & copiosius. Cæterum in his spatiis arbores fructiferæ paucarum radicum plantari præcipit: velut est malus punica, malus quæcunque, & cotonea: oleam etiam in his interuallis plantare licet, & si à quibusdam improbetur. Quidam ficum interserunt: sed hoc falsum experientia conuincitur, quapropter præstat foris circumplantare. Plinio autem videtur ficorum leuis ymbra, quamuis sparsa, ideoque & inter vites ferri non vetat. Sed hoc falsum est, nam præ longis, crassissimisque radicibus infestat, & densiori latorum foliorum ymbra. Quincuncialis ordo sic instituitur. Linea per totidem pedes, quot destinaueris interordiniorum spatiis purpura, vel quolibet alio colore insignitur, eaque sic denotata, per repastinatum intenditur, & iuxta purpuram calamus deligitur, atque ita paribus spatiis ordines diriguntur. Signatis igitur locis, in quibus arbores plantandæ, qui arbustum constituere velit, ante annum quàm deponat arbores, scrobes faciat quatuor pedum quoque versus, deinde circa Calen. Martias in eandem scrobem vlmum, opulum, vel fraxinum deponat, vt si vlmus defecerit, opulus, vel fraxinus locum obtineat. Si autem vtræque vixerit, altera eximatur, & alio loco deponatur, sed vlmus autumnî tēpore melius, quàm vere disponitur. E seminario igitur, vbi translationi idonea est, ex eo tempore autumnî vsq; in verum tempus, antequam radix vلمي delibretur, quo terra imbribus permaduerit, rectè scribitur, Plinius: In arbustum quinquennes vلمي transferuntur, aut (vt quibusdam placet) quæ vicenum pedum esse cæperunt, sili o, qui nouenarius dicitur, altitudine pedum trium, pari latitudine, & eo amplius, circa politas pedes terni vndique è solido adaggerantur. Arulas id vocant in Campania. Populos, & fraxinos, quia festinantius germinant, disponi quoque maturius conuenit, hoc est ab Idibus Febr. plantis & ipsas nascentes. Præfodere scrobes ante (si fieri posset) tanto, donec pingui cespite obducantur. Mago ante annum iubet, vt solem pluiasque combibant, aut si id conditio largita non sit, ignes in medio fieri ante menses duos, nec nisi post imbres in his feri.



**A**R BUTIVÆ arboris formationem augustissimè Columella recenset, à quo omnes exceperunt, nec quicquam addendum, vel demendum iudicamus. Quamcumque arborem seueris, eam biennio proximo putare non oportet. Postea verò si vlmus exiguum incrementum recipit, verno tempore antequam librum demittat, de cacuminanda est iuxta ramulum, qui videbitur esse nitidissimus, ita tamen ut supra eum trunco stirpem quadrantalem relinquas, ad quam ductus & applicatus ramus deligetur, & correptus cacumen arbori præbeat. Deinde stirpem post annum præcidi, & alleuari oportet. Quod si nullum ramum arbor idoneum habuerit, sat erit nouem pedes à terra relinquere, & superiorem partem derruncari, ut nouæ virgæ quas emiseric, ab iniuria pecoris sint tutæ. Sed si fieri poterit, vno ictu arborem præcidi, si minus, serra defecari, & plagam falce alleuari oportebit, eamque plagam luto paleato contingi, ne sole, aut pluuiis infestetur. Post annum, aut biennium, quum enati ramuli rectè conualuerint, superuacuos deputari, & idoneos in ordinem demitti conueniet. Quum iam adolescere incipient, falce formandi, & tabulata instituenda sunt (sic vocant ramos & truncos prominentes) eosque vebpropiùs ferro compescunt, vel longiùs promittunt, ut vites laxius diffundantur. Hoc in solo pingui, illud melius in gracili. Tabulata inter se minus ternis pedibus absint, atque informentur, ne superior ramus in eadem linea sit, quam inferior: nam demissum ex eo palmitem germinantem inferior atteret, & fructum decutiet. Igitur nouellam vlmum sic formare conueniet: Loco pingui octo pedes à terra sine ramo relinquendi, vel in aruo gracili septem pedes, supra quod spatium deinde per circuitum in tres partes arbor diuidenda est, ac tribus lateribus singuli ramuli submittendi, primo tabulato assignentur, mox de ternis pedibus superpositis, alii rami submittendi sunt, ita ne vlsdem lineis, quibus in superiore, positi sint. In eademque ratione vsque in cacumen ordinanda erit arbor, atque in frondatione cauendum, ne aut prolixiores pollices fiant, qui ex amputatis virgis relinquuntur, aut rursus ita alleuentur, ne ipse truncus lædatur, aut delibretur: nam parum gaudet vlmus, quæ in corpus nudatur: vitandumque ne de duabus plagis vna fiat, quum talom cicatrice non faciliè cortex comprehendat. Arboris autem perpetua cultura est, non solum ante diligenter eadem disponere, sed etiam truncum circumfodere, & quicquid frondisenatum fuerit alternis annis aut ferro amputare, aut astringere, ne amula umbra vitinoceat. Quum deinde arbor vetustatem fuerit adeptæ, propter ramum vulnerabitur, ita ut excauetur vsque in medullam, qua sit exitus humori, quem ex superiore parte cōceperit. Plinius ab eo. Et vlmus de truncata à media in ramorum scamna digeritur, nulla ferè xx pedū altiore arbore. Tabulata earū ab octauo pede altitudinis dilatantur in collibus, siccisque agris à x i in cāpestribus, & humidis. Meridianū solem spectare palmites debent.



bent. Rami à projectu digitorum modo subrigi, consilium in his tenuium quoque virgultorum barba, ne obumbrent. Florentinus in bona terra ut arbusculæ arbores excrecant permittit, verum in tenui à pedibus octonis abscindit, ne omnis vis terræ in arbores absumatur.

*Quomodo vites arboribus maritandæ. C A P. VI.*

**I**A si formata arbori vitem adiungemus, quam, ut Columella inquit, antequam ex toto arbor præualeat, conferere conuenit. At si teneram vltimum maritaueris, nouam sufferet: si verustam vitem applicueris, coniugem inecabit, ita sibi pares esse ætate, & viribus arbores, vitesque conuenit. Sed arboris maritandæ causa, scrobs viuiradici fieri debet, latus pedes duos, altus leni terra, totidem pedum, graui, dupondio, & dodrante, longus pedes sex, aut minimum quinque. Absit autem hæc ab arbore ne minus sesquipedalispacio: nam si radicibus vltimi iunxeris, malè vitis comprehendet, & quum tenuerit, incremento arboris opprimetur. Hunc scrobem si res permittit, autumno facito, ut pluuiis & gelicidiis maceretur. Circa vernum deinde æquinoctium binæ vites, quo celerius vltimum vestiant, pedem inter se distantes scrobibus deponendæ, cauendumque ne aut septentrionalibus ventis, aut rorulentæ, sed sicca ferantur. Quum de seminario eximuntur, rubrica notetur vna pars, quæ nos admoneat, ne aliter vites constituamus, vel arbores, quàm quemadmodum in seminario steterint. Plurimum enim refert, ut eam partem cæli spectent, cui ab tenero consueuerunt. Melius autem locis apricis, ubi cæli status neque prægelidus, neque nimium pluuius est, autumnis tempore & arbores, & vites post æquinoctium deponuntur. Sed ex ira conferendæ sunt, ut summam terram, quæ aratro subacta sit, semipedem altè substernamus, radicesque omnes explicemus, & depositas stercoremus (ut ipse existimat) si minus, terra subacta operiamus, & circum calcemus, ipsum seminis codicem. Vites in vltimo scrobe deponi oportet, materiasque earum per scrobem porrigi, deinde ad arborem erigi, & ab iniuria pecoris caueis emuniri. Locis autem feruidis semina septentrionali parte arbori applicanda sunt, locis frigidis à meridie, temperato cæli statu, aut ab oriente, aut ab occidente, ne toto die solem, aut umbram patiantur. Plinius ab eo aliqua addens: Singulis arboribus iam plantatis, denas sæpè adnutrunt vites, damnato agricola minus ternis. Maritare nisi validas inimicum, enecante veloci vitium incremento. Serere tripedaneo scrobe necessarium, distantes inter se arboremque singulis pedibus. Florentinus hoc modo vitem deponendam censet: Alii radicata plantas, viuiradices appellatas transferentes ponunt, alii perfectam fermè vitem floridam perpurgantes, & radicibus extrahentes cum propria terra in fossam iuxta arborem sitam imponunt. Deponit autem aliter. Spatio trium cubitorum ab arbore plantat, deinde ubi probè coalita haerit, ut iam sufficiens sit, quo arbori vniatur & maritetur, (quod ex crassitudine indicatur) totam prostratam, & de-



Fossam arbori adiungit, pedis spatium ab arboris radice, reliquo palmiti libero relicto, & quoscunque oculos relictos esse contingit, eos omnes vngue ademptos excecat, quo vnum aut alterum germen in summa parte relictum vberius augeat, quod deinde ubi auctum fuerit, sensim arbori adiungere, ut in ea conquiescat, conuenit. Quandoquidē verò contingit vitem arboris truncō circulariter adhaerentem, ac circumscitam hocq; modo in altum ascendentem, temporis progressu comprimi & quodāmodo suffocari propter vnicuique nem, quam ad ipsum truncum habet, pleriq; in Bithynia inter vitem, & arborem cuneum inferunt, atq; ubi hoc modo vitem ab arbore disparant, leccesum & torulum ipsi viti subornant, in quo requiescat.

*De arbutina vitis putatione. CAP. VII.*

**I**AM ad putationem deuentum est, difficillimam cultus vitis partem. Columella vtilissimè putat primo quoque tempore faciem vitibus adinuocare, nec superuacuis sarmenis pati syluescere, sed eam quoq; quæ primo submititur, materiem ferro coercendam censet vsq; in alteram, vel tertiam geminam, quo robustiores palmites agant, qui quum primum tabulatum apprehenderint, proxima putatione disponentur, omnibus annis aliquoties superius tabulatum excitabitur relictæ semper vna materia, quæ applicata truncō cacumen arboris spectet. Iamque viti constituta certa lex ab agricolis imponitur: plerique ima tabulata materiis frequentant vberiore fructum, & magis facilem cultum sequentes. At qui bonitati vini student, in summas arbores vitem promouent, ut quæq; materia se deuectæ in cellissimumque perque ramum extendunt, sic ut summa vitis summam arborem sequatur, id est, ut duo palmites extremi trunco arboris applicentur, qui cacumen eius spectent, & prout quisque ramus conualuit, vitem accipiat. Plenioribus tamis plures palmites alius ab alio separati imponantur, gracilioribus pauciores. Vitis nouella tribus toris ad arborem religetur, vno, qui est in crura arboris, à terra quatuor pedibus distans, altero, qui summa parte vitem capit, tertio, qui mediam vitem complectitur. Torum imum imponi tum oportet, quum vites viti adimit: interdum enim necessarius habetur, quum aut arbor sine ramis truncata est, aut vitis praua in luxuriam euagatur. Cætera putationis ratio talis est, ut veteres palmites, quibus proximi anni fructus pependit, omnes recidantur, noui, circumcisis vndique capiteolis, & nepotibus, qui ex his nati sunt, amputati committantur, & si læta vitis est, vltimi potius palmites per cacumina ramorum præcipitentur, si gracilis, trunco proximis, si mediocris, mediis, quoniam vltimus palmites plurimum fructum affert, proximus nimium, vitemque exhaurit, atque attenuat. Maximè prodest vitibus omnibus annis resolui: nam & commodius enodantur, & refrigerantur, quum alio loco alligatæ sunt, minusque læduntur, & melius conualescunt. Atque ipsos palmites ita tabulatis super-



superponi conuenit, ut à tertia gemma, vel quarta religati dependeant, eosque non constringi, ne sarmentum vimine præcidatur. Quod si ita longè tabulatum est, ut materia parum commodè in id perducì possit, palmitè ipsum viti alligatum supra tertiã gemmam religabimus. Hoc ideo fieri præcipit, quia quæ pars palmitis præcipitata est, fructu induitur: at quæ vinculo adnexa sursum tendit, ea materias sequente anno præbet. Sed ipsorum palmitum duo genera sunt, alterum quod ex duro prouenit, quod quia primo anno plerumque frondem sine fructu affert, pampinarium vocant, alterum, quod ex anniculo palmitè procreatur, quod, quia protinus creat, fructuarium appellant, cuius ut semper habeamus copiam in vinea, palmitis partes ad tres gemmas religandæ sunt, ut quicquid intra vinculum est, materias exigat. Quum deinde annis, & robore vitis conualuit, traduces in proximam quamquæ arborem mittendæ, easque post biennium amputare, simulatque alias teneriores transmittere conuenit: nam vetustate vitem fatigant: nonnumquam enim quum arborem totam vitis comprehendere nequit, ex usu fuit partem aliquam eius deflexã terræ immergere, & rursus ad eandem arborem duas, vel tres propagines excitare, quò pluribus viribus circumuoluta celerius vestiatur. Viti nouellæ pampinarium dimitti non oportet, nisi necessario loco natus est, ut viduum ramum maritet: veteribus vitibus loco nati palmitres pampinarij viles sunt, & plerique ad tertiã gemmam resecti optimè submituntur: nam in sequenti anno materias fundant. Quisquis autem pampinus loco natus in exputando, vel alligando fractus est, modo ut aliquam gemmam habuerit, extolli non oportet, quoniam proximo anno vel validiorem materiam ex vna creabit. Præcipientes palmitres dicuntur, qui de hornopinis virgis enati in duro alligantur, hi plurimum fructum afferunt, sed plurimum matri nocent. Itaque nisi extremis ramis, aut si vitis arboris cacumen superauerit, præcipitari palmitem non oportet. Quod si tamen id genus colis propter fructum summittere quis velit, palmitem intorqueat, deinde alliget, & præcipitet, nam & post eum locum, quem intortens, lateri materiam citabit, & præcipitata minus vitium in se trahet, quamuis fructu exuberet. Præcipientem verò plus anno pati non oportet. Alterum est genus palnikis, quod de nouello nascitur, & in tenero alligatum dependet (materiam vocant) ea & fructum, & noua flagella bene procreat, etiam si ex vno capite duæ virgæ summittantur, tamen utraq; materia dicitur: nam pampinarius quam vim habeat, supra docuimus. Focaneus est, qui inter duo brachia, velut in fure de mediò nascitur, eum colem deterrimum esse comperit, quòd neque fructum ferat, & utraq; brachia, inter quæ natus est, atrenuet, itaq; tollendus est. Plerique vitem validam, & luxuriosam falsò crediderunt feraciorem fieri, si multis palmitibus submissis oneretur: nam ex pluribus virgis plures pampinos creat, & quum semper multa fronde cooperit, peius defloret, nebulasq; & rores diutius continet,



omnemq; vnam perdit. Valida ergo vitem in ramos diducere cenſet, & traducibus diſpergere, atq; diradiare, cæterosq; vinearios colles præcipitare, & ſi nimis luxuriabitur, ſolutas materies relinquere, ea ratione vitem feraciorem facere. Sed vt denſum arbuſtum commendabile fructu, & decorum eſt, ſic vbi vetuſtate rareſcit, pariter inutile, & inuenuſtum eſt. Quod ne fiat diligentis patrisfamilias eſt primam quamq; arborem ſenio conſectam tollere, vt in eius locum nouellam reſtituere vitem queat, nec iam viuiradice frequentare, quàm ex proximo propagare. Plinius ab eo, & ab uſu ſui temporis de arbuſti putatione hæc retulit: Vites ſpectare Aquilonem debent ipſæ: Palmites autem earum ad meridiem. Non eſt feſtinandum ad putationem nouellæ, ſed primò in circulos materies colligenda, nec niſi valida putatio admouenda. Seniora ferè anno ad fructum arbuſta, quàm vitis iugata. Sunt qui omnino putari vetant, priuſquam arborum longitudinem equauerint. Prima falce ſex pedes à terra recidatur flagello infra relicto, & naſci coacto in curuatione materiæ. Tres ei gemmæ non amplius deputato ſuper ſint. Ex his emiſſi palmites proximo anno imis inferantur ſcamnis, ac per ſingulos annos ad ſuperiora ſcandant, relicto ſemper duramento in ſingulis tabulatis, & emiſſario vno, qui ſubeat uſq; quo placuerit. De cætero putatione omni flagella, quæ proximè tulerint, recidantur: noua, circumciſis vndiq; capreolis, ſpargantur in tabulatis. Eſt quorundam imperitia, ſub ramo vinculo ſuspendendi, ſuffocantium iniuria, quando contineri debet vimine, non arctari. Quin immo etiam quibus ſalices ſuper ſint, molliore hoc vinculo facere malunt, iunco, cypero, vluæ. Liberam quoque vinculo per aliquot dies vagari, & inconditam ſpargi atq; in terra, quam per totum annum ſpectauerit, recumbere. Namq; vt veterina à iugo, & canes à curſu volutatio iuuat, ita tum & vitium porrigi lumbos. Arbor quoq; ipſa gaudet aſſiduo leuata onere, ſimilis respiranti. Nihil eſt in opere naturæ, quod non exemplo dierum & noctium aliquas vices feriarum velit. Ob id protinus à vindemia putari & laſſas etiamnum fructu ædito improbatur, vt putatæ ruruſus alligentur alio loco: nanq; orbita vinculi ſentitur vexatione non dubia. Palladius nil, niſi quæ Columella.

*De arbuſto Gallico. C A P. VIII.*

**E**ST & alterum arbuſti genus, authore Columella, quod rumpotinum vocatur. Id deſiderat arborem humilem, nec frondolaſam, cui rei maximè videretur idonea opulus. Poſſeſt & vlmus ſic diſponi, vt adhuc tenera decacuminetur, ne altitudinem quindecim pedum excedat: nam ferè ita conſtitutum rumpotinetum animaduertit, vt ad octo pedes locis ſiccis, & cliuoſis, ad duodecim locis planis, & vliginoſis tabulata diſponantur. Plerunq; autem ea arbor in tres ramos diuiditur, quibus ſingulis ab vtraq; parte complura brachia ſummittuntur, tum omnes penè virgæ, ne vmbrent eo tempore, quo vitis putatur, baraduntur. Arboribus rumpotinis, ſi frumentum non inferitur, in v-

tramq;



tramq; partem viginti pedum spatia interueniunt, at si segetibus indulgetur, in alteram partem quadraginta pedes, in altera viginti relinquuntur. Cetera simili ratione atq; arbusco Italico administratur, vt vites longis scrobibus deponantur, vt eadem diligentia curentur, atque in ramis deducantur, vt noui traduces omnibus annis inter se ex arboribus proximis connectantur, & veteres decidantur. Si tradux traducem non contingat, media virga inter eas deligetur. Quum deinde fructus pondere vigebit, subiectis adminiculis sustineatur. Hoc genus arbusci, ceteræq; omnes arbores, quanto altius arantur, & circumfodiuntur, maiore fructu exuberant.

*De vitium insitione.* CAP. IX.

**E**T si superiori nostro libro de insitione, satis superq; in vniuersum de ea loquuti fuerimus, lubet hoc loco & decet de vitium insitione singulariter loqui: & primo dicamus quo tempore inferenda sit vitis. Tempus idoneum, quod scribit Theophrastus, est vere, autumno & caniculæ exortu. Neq; omnibus locis, ac generibus idē. In sicco, macro loco, & argilloso, quod minus habeat humoris, vernum tempus idoneum. In terra bona & pingui, autumno, quod vere nimius humor: quam sationem quidam inertiuntur ferē diebus triginta. Varro à Theophrasto desumit. Cato hæc habet: Vitē inferi oportet Luna silenti, post meridiem sine vento Austro. Vitis insitio vna per ver: altera est, quando vua floret, ea optima est. Plinius quæ Cato recitat. Florentius insitionis tempus vere determinat, glacie iam cessante, quando dum inciditur vitis, humorem neque multum, neque aquosum, neque crassum, & glutinosum remittit. At Luna desinente sarmenta decidere oportet ad insitionem, ita enim robustiora sunt. Quidam non solum vere, sed & post vindemiam insitionem faciunt: tunc enim vitis densiorem imperum, ac concitatiorem habet. Tempus inferendi Iulius Atticus tradidit à Calen. Nouembribus in Calendas Iunias, quoad posse custodiri surculum sine germine, affigat. Eoque debemus intelligere nullam partem anni excipi, si sit sarmentis alendis facultas. Sed Columella in aliis stirpium generibus, quæ firmioris, & siccioris libri sunt, posse id fieri concedit, in vitibus verò nimis temere id permissum, non quod ignoret brumæ temporibus aliquando insitam vitem comprehendere, sed quod quid certa ratione plerunq; proueniat præcipiendum sit. Idem per brumam negat rectè putari vitem: quod merito prohibetur, quod frigoribus omnis surculus rigore torpet, nec propter gelicidia corticem mouet, vt cicatricem consanet. Verior itaque ratio est inferendi tepentibus iam diebus, post hyemem, quum & gemmas, & corticem naturaliter mouent, nec frigus ingruit, quod possit aut surculum insitum, aut fissuræ plagam inurere. Permiserit tamen festinatibus autumno vitem inferere, quia nō dissimilis est eius aëris qualitas vernæ. Sed quocunq; quis tempore destinauerit inferere, non aliam sciat esse curam surculis explorandis, quàm quæ



tradita est, quum de malleolis eligendis præcepit, quos ubi generosos, fecund-  
 dos, & quàm maturissimos viti detraxerit, diem quoq; tepidum, silentemq; à  
 ventis eligat. Tum consideret furculum teretem, solidiq; corporis, nec fungo-  
 se medulla, erebris etiam gemmis, & breuib; internodiis, nam plurimum in-  
 terest non esse longum sarmentum, quod inferatur, & rursus plures oculos, qui-  
 bus egerminet, ineffe. Itaq; si sunt longa internodia, necesse est ad vnam, vel  
 summum duas gemmas recidere furculum, ne proceriorem faciamus, quàm  
 vt tempestates, & ventos, & imbres immobilis pati possit. Sed insitiones  
 tradamus. Cato tres vitis insitiones tradit. Præcisam, per contactum, & te-  
 rebrationem. Sed quæ per rescissionem, frequentior est, & omnibus agric- 15  
 lis cognita, de ea prius edisseremus. Ita igitur inquit. Vitem sic inserito: Præ-  
 cidito quam inscrescamque per mediam diffindito per medullam, eò furcu-  
 los præcutos arcito, quos inferes, medullam cum medulla composito. Mi-  
 nius isdem verbis refert. Sed quod à Catone & Plinio edocetur falsum est,  
 nam si medullam insiti cum medulla vitis coniunges, non comprehendet in-  
 situs furculus: nam vt diximus, medulla vitalis pars non est, sed cortex. Sed  
 modus à Columella edocetur. Reciditur vitis plerunq; supra terram, non-  
 nunquam tamen & infra, quo loco magis solida est, atq; enodis. Quum ita-  
 que iuxta terram insita est, furculus adobruitur cacumine tenus, at quum e-  
 ditior est à terra, fissura diligenter subacto luto linitur, atque superposito 20  
 musco ligatur, quod & calores, & pluuias arceat. Temperatur ita furcu-  
 lus, vt calamo non absimilis coagmentet fissuram, sub qua nodus in vite  
 desideratur, qui quasi alliget eam fissuram, nec rimam pariatur vltra pro-  
 cedere. Is nodus etiam si quatuor digitis à resectione abfuerit, illigari ta-  
 men cum prius, quàm vitis findatur, conueniet, ne quum scalp-  
 fuerit iter furculo, plus iusto plaga hiet. Calamus autem non amplius tri-  
 bus digitis debet alleuari æqualiter ex ea parte, qua raditur, vt sit levis,  
 eaque rasura ita deducitur, vt medullam contingat vno latere, atque al-  
 tero, paulò vltra corticem distringatur, figureturque in speciem cunei,  
 sic vt ab ima parte acutus furculus, latere altero sit tenuior, atque altero 30  
 plenior, perque tenuiorem partem insertus, eo latere arctetur, quò est  
 plenior, & vtrinque fissuram contingat. nam nisi cortex cortici sic appli-  
 cetur, vt nullo loco transluceat, nequit coalescere. Vinculi genus ad in-  
 sitionem non vnum est. Alii viminibus adstringunt, nonnulli circumdant  
 libro fissuram, plurimi ligant iunco, quod est aptissimum: nam vimen,  
 quum inaruit, penetrat & insecat corticem, propter quod molliora vin-  
 cula magis probamus, quæ quum circumuenere truncum, adactis arun-  
 dineis cuneolis arctantur. Sed antiquissimum est, & ante hæc ablaquea-  
 ri vitem, radicesque summas, vel soboles amputari, & post hæc adobru-  
 i truncum, isque quum comprehendit aliam rursus exigit curam: nam fa- 40  
 pius pampinatus est, quum germinat, frequentiusque detrahendæ sunt  
 soboles



soboles, quæ à lateribus, radicibusque prorepunt, tum quod ex insito profundit, subligandum, ne vento surculus motus labefacteretur, aut explantetur tener pampinus, qui quum excreuit, neporibus orbandus est, nisi si propter penuriam, & caluitium loci sumitur in propagines. Autumno dein de falcem maturis palmitibus admouet, sed putationis insitis custoditur ea ratio, vt vbi nulla desideratur propago, vnus surculus euocetur in iugum, alter ita recidatur, vt adæquetur plaga trunco, sic tamen ne quid ræquatur ex duro. Pampinandum non aliter est, quàm in nouella viuiradice. Putandum verò sic, vt vsque ad quartum annum parcius imperetur, dum  
 10 plaga trunci ducat cicatricem. Theophrastus hæc addit: In insitione humoris quoque modus obseruari oportet, qua de causa vitem aliquot antea diebus præsecant, vt lachryma effluat, neque putrescat, neque vermiculetur. A quo Varro: Vitem triduo antequam inserant, desecant, vt qui in ea nimius est humor, defluat ante, quàm inseratur, at in qua inserunt, in ea paulò infra, quàm insitum est, incidunt, vnde humor aduenticius effluere possit. Referemus quæ Florentinus habet, nam aliquid noui dicit. Qui vitem inserere velit, crassum truncum deligat, qui vnum atque alterum sarmentum suscipere queat. Quidam igitur in terra inserunt, ad semipedis altitudinem descendentes, & ferè in vitis fundo insitionem faciunt.  
 20 Quidam verò in planitie inserunt, id quod optimum existit, quod verò in alto inseritur, difficulter coalescit à ventis agitarum. Si autem necessitas cogat in alto insitionem facere propter leuitatem existentem in profundo, præparatum palum habeto, quo ad ipsum deliges, quod in alto insitum est, propter ventos. Quidam etiam in humeros trunci insitionem faciunt. Sarmenta ad insitionem accipienda sunt rotunda, solida, densis oculis, maximè ex brachiis. Sufficiunt autem sarmento oculi duo, aut tres. Si verò terra obruatur, tres, aut quatuor. Cæterum ab vno sarmento plures, quàm duos surculos secare ad insitionem non conuenit. Quod enim post primos septem oculos superest, sterile & inutile existit. At  
 30 verò firmitus coalescent noua sarmenta, perysini sarmenti partem habentia. Neque verò statim vt ablata sunt à vite, sarmenta inseremus, sed post sectionem obrecta plaga in dolio deponemus, vt ne transpirent, prius tamen quàm germen fundere incipiant, & dum adhuc clausa sint, inseremus. Quæ igitur ad terram ad ipsum vitis fundum inserimus, firmitus vtique inferentur, eleuata simul terra ad ipsorum enutritionem, verum fructum tardiozem reddent, velut alia in terra plantata sarmenta: quæ verò in altiore parte insita sunt, difficulter coalescent, à ventis quassata, citius tamen fructum producent, oportet autem ea, quæ in alto inseruntur, esse leuia & plana, crassitudine pollicari. Aspretudinem autem  
 40 a terra acuta falee lauigare expedit. Porro sarmentum quod inserendum est, ad duorum & dimidii digiti longitudinem ex vna parte deradere oportet,



quemadmodum formatos videmus calamos scriptorios, ita ut ex vna parte medulla illa sa appareat, ex altera verò ipse cortex. Deponendum est autem sarmentum totum, quatenus dera sum est, ut ne quod inter truncum & sarmentum medium est, hiet, explendumq; argilla: prohibebitur ita humor, & is, qui in ipso est, humor custodietur. Cæterum pars trunci post plagam liganda est vinculo simplici, sed infra cto, deinde luto glutinoso illinenda. Quidam etiam bubulum stercus ad lutum ammiscunt. Quæ igitur hoc modo insita sunt, eorum vinculum aqua per spongiam irrigamus sub crepusculum vespertinum in æstatis maximè vigore. Vbi autem iam germinans quatuor digitorum fuerit, radicem iuxta defigere oportet, & alligare, ut à ventis sit securitas. Quum germen auctum fuerit, vinculum falce dilsecare conuenit, ut à coarctatione liberetur, & humor ex trunco in sarmentum distribuatur. Plinius Catonis verba recitat, id ex suo adiicit: Vt gemmascere incipiet, legatur calamus, nec plus quàm binis ab initio emineat oculis, vlmeo vimine alligatus, binaque circumcidatur acie à duabus partibus, ut inde potius distillet humor, qui maximè vites infestat. Deinde quum eualerint flagella pedes binos, vinculum insiti incidatur, vberitati crassitudine permissa. Satiæ plantæ si syluestrium radicibus inferuntur, degenerant in feritatem. Reliqua cælo constant. Aptissima insitis sicritas: huius enim remedium, appositis fictilibus vasis, modicus humor per cinerem distillat.

*De altera vitis insitione.* CAP. X.

**A**LTERA insitionis species à Catone apponitur. Si vitis vitem contingat, vitis vtriusque latus alterum præradito obliquè, & inter se medullâ cum medulla libro colligato. Plinius eisdem verbis recitat. Si inter se vites contingant, vtriusque in obliquum latere contrario adraso, iunctis medullis colligari. Sed quid vterq; dicat, ignoro: nisi id docere voluerint, quod Varro docet, non in vite solum, sed aliis arboribus. Ex arbore, à qua quis vult habere surculum, in eam, quam inferere vult, ramulum traducit, & in eius ramo præciso, ac diffisso implicat: tum ramuli locus, qui contigit ex vtraque parte, qua fissuram intrat, falce extenuatur, ita ut ex vna parte, quod cælum visurum est, corticem cum cortice exæquatum habeat. Eius autem ramuli, quem inseret, cacumen ut directum sit ad cælum, curat: postero anno quum comprehendit, unde propagatum est, ab altera arbore præcidit. Sed hunc insitionis modum replicat Columella libro de arboribus, & nos exactissimè docuimus libro de insitione.

*De insitione per terebrationem.* CAP. XI.

**T**ERTIA Catonis insitio est: Terebra vitem, quam inferes pertūdico, cōduos surculos vitigineos, quod genus esse voles, insertos obliquos arcito



ad medullam, facitoque, ut medullæ medullam coniungas, arcitoque ea, quæ terebraueris, alterum ex altera parte. Eos surculos facito sint longi pedes binos, eos in terram demittito, replicatoque ad vitis caput, viti que vinclis alligato, medios in terram defigito, terra que operito. Hæc omnia luto oblinito, alligatoque, integitoque ad eundem modum, tanquam oleas. Id exactius docet Columella. Primo ex vicino fructuosissimam oportet considerare vitem, ex qua (velut traducem inhaerentem matri) palmitem attrahas, & per foramen transmittas. Hæc enim tutior, & certior est insitio: quoniam & si proximo vere non comprehendit, sequente certè, quum increuit, cõiungi cogitur, & mox à matre reciditur, atque ita superficies insitæ vitis vsq; ad receptum surculum obtruncatur. Huius traducis si non est facultas, tum detractum viti quàm recentissimum eligitur sarmentum, & leuiter circumrasum, ut cortex tantum detrahatur, aptatur foramini, atque ita luto circumlinitur resecta vitis, ut totus truncus alieni generis viti seruiat, quod quidem non fit in traduce, qui à materno sustinetur vbere dum inoleseat. Sed aliud est ferramentum, quo priores vitem perforabant, aliud, quod ipse vsu nunc magis aptum comperit: nam antiqua terebra, quam solam veteres agricolæ nouerant, scobem faciebat, perturebatq; eam parrem, quam perforauerat, deusta porro rarò reuiescebat, vel cum priore coalescebat, in eaque nec insitis surculus comprehendebat, tum etiam scobis nunquam sic eximebatur, ut non inhaereret foramini: ea porro interuentu suo prohibebat corpus surculi corpori vitis applicari. Ipse terebram, quam Gallicam dicit, ad hanc insitionem commentus, longè habiliorè, vtilioremque comperit; nam sic excavat truncum, ne foramen inurat, quippè non scobem, sed ramenta facit, quibus exemptis, plaga leuis relinquitur, quæ facilius omni parte sedentem surculum contingat, nulla interueniente lanugine, quam excitabat antiqua terebra. Igitur secundum vernum æquinoctium perfectam vitium insitionem habeto, locisque aridis, & siccis nigram vitem inserito, humidis albam. Plinius ab utroque: Tertium genus est terebrare vitem in obliquum ad medullam, calamosque addere longos pedes binos, atque ita ligatum insitum, intritaque illitum operire terra, calamis subrectis. Nostra aras correxit, ut Gallica vteretur terebra, quæ excavat, nec vrit, quoniam adustio omnis hebetat. Didymus: Optima mihi videtur insitio per terebrationem, neque enim vitis in qua insitio fit, interim ociosa manet, sed similiter fert fructum, & sarmentum coactum simul augefcit, vite nihil offensa ex terebratione, neque compressa ex coarctatione. Fit insitio per terebrationem hoc modo: Truncum vitis terebra Gallica appellata perforato, & præstantioris in proximo sitæ vitis ramum attractum in foramen immittito, non ab antiqua matre decisum: sic enim sarmentum viuet, tum à veteri parente nutritum, tum viti, quæ ipsum suscepit, coactum & concretum. Intra duorum verò annorum spatium sarmentum impositum vnietur, tunc ipsum post cicatricem inductam sarmentum decidere oportet, quod adhuc ex veteri matre detinetur, & trun-



cum vitis, in quam insitio facta est, quantum supra terebrationem extat, serrā desecare, vt de cætero sarmentum insitum principalis vitis pars existat.

*De vitis insitione per infoliationem.* CAP. XII.

**M**ODVS, quē retulimus, ab antiquis magnopere celebratus, inanis & puerilis est nostris tēporibus, quum nemo tam sit agricolationis ignarus, qui eo vtī velit, quum alii & præstantiores habeantur. Quod ad vitis medullam peruenturus sit surculus inferendus, vana est animaduersio: nam sufficit corticem cum cortice exæquatum habear, & si hoc modo vites comprehendant, non satis proficiunt. Sed qui nouellos palmites inferunt, scilicet præcis, & discissis per medullam, surculum eiusdem magnitudinis adigentes, vt vndique surculi cortex matris cortici insideat, & circumligantes, frustra laborant: nam imbecillæ viti coalitus surculus nunquam proficiet. Sed nos ætatis tempore inoculationem in vitibus satis feliciter vsurpauimus. Initionis per inoculationem maiores non meminere. Nouellis igitur vitibus, vel nouellis, vetularum palmitibus, scilicet biennialibus, nitidissima in parte, in qua præcipua cernatur hilaritas, cultro linea per transuersum secetur, à cuius medio per internodii longitudinem descendat altera linea, ita vt ferè vltra corticem non descendat plaga, inde summa cultri acie cortex à ligno delibretur, inde ex nouello palmite circumrasa scutula eximatur diligenti in annis librametox, cum sua gemma: & in hiuleam incisæ vitis partem intrudatur, digitorum compressu densata compage, vt vndique nouus cortex ligno adhæreat, inde fasciis vltimis restringes, vt vnitio fiat, ne humore, aut aere intrusis pereat. Sic felix comprehendet, & germinabit.

*Vi vua complura acinorum genera habeat.* CAP. XIII.

**T**HEOPHRASTVS libro de plantarum causis declarat exemplum de vuarum diuersis in eadem vite coloribus. Inquit enim. Vt eadē vitis candidas ferat, & nigras vuas, & in eademq; vua acina alia nigra, alia candida co-hæreant, Duo sarmenta diuersi coloris vuas ferentia superiori parte contundunt ab latere, deinde coniūgunt qua parte hiant, quaq; communicari succus potest, & sic alligata defigunt, sic ex vtroq; compages vna coagmentatur. Ratio est, quòd omne viuum cum viuo sociabile sit, & maxime quæ societatem generis habent, cum colluxata in naturam conflantur vnicam, sed vtrumque per se alimentum sine confusione transmittit, itaque fit, vt fructus reddatur varius, prout vtrique conueniat. Quod etiam fluij faciunt inuicem concurrentes Cephissus, & Melas in Bœotia: seruat enim vterque suum meatum, in his tamen nec inuicem alimenta iunguntur, sed æquè distantia deriuantur, & perfluūt. Columella verò hoc tali ratione efficit, quòd vuas tales creat, in quibus varii generis, colorisq; reperiūtur acini. Quatuor, vel quinque, siue etiam plures voles, virgas diuersi generis sumito, easque diligenter & equaliter compositas



positas colligato, deinde in fictilem tubulum vel cornu arctè inferito, ita vt aliquantum extent ab vtraque parte, easque partes, quæ extabunt resolutis, in scrobē deinde imposito & terra stercoreata obruito, & rigato donec gemmas agant. Quum inter se virgæ cohaerint, post biennium aut triennium, facta iam vnitate dissolues tubulum, & circa medium ferè crus, vbi maximè videbuntur coisse, vitem serra præcidito, & plagam leuato, terramq; minutam aggerato, ita vt tribus digitis altè plagam operiat. Ex eo codice, quū egerit colles duos optimos submittito, reliquos deicito, sic vna nascentur, quales proposuimus. Ab his Plinius: Est & luxuriosa ratio vites inferēdi, vt quatuor maleoli vehementi vinculo colligentur in parte luxuriosa, atque ita vel per ossa bubuli cruris, vel per colla fictilia traiectione obruantur binis eminentibus gemmis: humescunt hoc modo, recisiq; palmitem emittunt. Postea fistula fracta, radix liberè capit vires, vnamq; fert, & omnium corporum suorum acinos. Sed hucusque vana, & impossibilia dicta sunt, quæ Palladius affert veriora sunt. Vt vitis botryones & albos afferre possit, & nigros: Græci hoc fieri debere iasserunt. Si vicinæ sunt vites, nigra & alba, quum putantur, sarmenta vtriusque inter se diuisa sic iunges, vt medios vtriusque generis oculos equando reddere possis vnitati. Tunc papyro ligabis itricto, & molli atque humida terra curabis adlinire, & interiectis ternis diebus adaquare, donec germen nouæ frondis erumpat. Hinc exempto tempore si libuerit, genus efficiet per plura sarmenta. Hic modus est verus, & à me expertus. Didymus cum superioribus errat. Accipienda sunt duo sarmenta diuersi generis differentia, eaque findenda per medium, cum animaduersione ne in oculos fissura perueniat, neque quicquam de medulla excidat, atque ita alteri alterum adiungere oportet, & adglutinare, vt oculi coincidant, & quantum possibile est se mutuò contingant, vt duo oculi quasi vnus fiat. Inde verò validè constringere sarmenta cum papyro oportet, & scylla integere, aut glutinosissima terra, atq; ita plantare, & interiectis tribus diebus, aut quinque irrigare, vsquequo germen producant. Quæ Theophrastus affert valdè ridicula sunt, virgæ enim noxam ex contusione recipiunt, vt interire potius, quàm viuere condiscant: atque longo temporis intervallo opus est, vt concipiant, vniantur, secentur, & colē ex omnibus emittant. Columella & Didymi ratio eodē morbo laborat. Nos vicinarum vitium duo sarmenta eligimus, alba nigreque vna, & vbi cohaerere sunt gemina diuidimus, vt tertia ferè oculi pars remaneat, sic æqua labra labris cotiungimus rectè abrafo, ac lanato vulnere, vinculo arctè constricto, ne libertatem dehiscendi habeant, & obseruato vt ex duabus gemmis vnus colis nascatur: & eodem anno vna eiusmodi proferet: hoc sarmentum alteri eodem modo addimus variū generis, sic vna botryonem efficiemus, vt non solum rotundos, sed corniculatos acinos, eosdem alios albos, alios nigros, alios multifu-

40 dos habeat.

*De clastrophylo, & vna myrtea.* CAP. XLIII.



**N**ON est silentio prætereundum, quod de vitis & oleæ naturali cōcordia Africanus Florentini testimonio fretus posteritatis memoriæ mādauit, scribens oleam, si viti inferatur, non vuas modò sed & oliuas quoque parere. Addit se vidisse hanc arborem apud Marium Maximum, qui quum fructum eius degustasset negauit vnquam se quippiam comesse, quod magis oleam, vt tuamque resiperet, tam exactè simul vtriusq; sapor linguæ representabatur. Nasci huiusmodi arbores in Libya, gentiliq; voce vbolima nominari. Perticæ subiiciendæ sunt, quæ possint brachiorum onus fulcire. Si verò alio modo quouis inferantur, longuriis non erit opus. Ergo propter terram vitem rebebramus, & oleæ ramulum imponimus, simul vt à vite dulcedinem, simul vt 10 ab humo vernaculum alliciat nutrimentum, vt tandem eius iucundiore cibo fruamur. Postremo si non dum ferentis viticulæ sarmenta fructuaria transferantur, misturam progenitorum seruabunt. Porro fructus à promiscua parentum conditione in sitoris vtriusque nomen adoptauit, elæostaphylos Græcis, quasi dicatur vuolea nominatus. Docet & Tarentinus monstratam vitis insitionem, promittens vuam fieri posse, quæ in imo suo fundo myrti baccas habeat. Id autem fieri si in myrtum arborem ipsa vitis sarmenta inferas, sic fiet vua myrto mista.

*Quomodo vitem præcoccem, & serotinam efficiamus.* CAP. XV.

**F**IT etiam insitione, vt præcox vua nascatur. Præcoccem vuam nigra vitis, vt 20 Tarentinus monet, creabit in vere, si ceraso inferatur, si quidem eodē tempore feret vuam, quo cerasus arbor sua mala gerit. Eadem Florētinus, & Pamphilus tradidere. Fit & aliis artibus. Celerrimè idem vitem germinare promittit, si trito nitro & aqua, vt mellis crassitudo contrahatur, permistis post purificationem protinus gemmantes oculi largè linantur, germina intra septem dies citabit. Præcoccem itidem fieri tradidit, si dulces vinacei, hoc est nō calcati, cum plantulis abundè coniiciantur; aut quum panguntur, scrobiculis accumulentur. Serotina efficitur vitis, eodem authore, si racemos, qui primum natifuerint, auferes, rursus enim alii pro ipsis nascentur. Insuper & plantæ multam curam habeto: iterum enim racemos producet, qui maturifacsi, serotini erunt. 30

*Quomodo vua vinaceis vacua fiat.* CAP. XVI.

**Q**UAMQVE semen naturæ opus proximius sit, nos fructus, inquit Theophrastus, qui nucleo vacant, præcipuè quarimus quoad possumus, & tales vt fiant operam damus, vt quum vuas sine vinaceis nasci molimur, quod euenit detracta medulla palmitis, qua vinaceum gignitur. Columella, vt vuæ sine vinaceis nascantur, ita docet. Malleolum scindito ita ne gemmæ lædantur, medullamque omnem eradito, tum demum in se compositum colligato, sic ne gēmas allidas, atq; ita stercoreata terra deponito & rigato, quum coles agere cœperit, sæpe & altè refodito. Adulta vitis tales vuas sine vinaceis creabit. Ab eis Plinius: In alio genere inuentu nouitio finditur malleolus, medullaq; erasa 40 in



in se colligantur ipsi caules, ita vt gemmis parcatur omnimodo. Tum mal-  
leolus in terra fimo mista feritur, & quum spargere cœperit caules, deciditur,  
foditurque sæpius. Talis vuæ acinos nihil intus ligni habituros Columella  
promittit, quum viuere semina ipsa per quàm mirum sit, & medulla adempta  
nasci. Sine granis interioribus vuas arte nasci posse Democritus Græcus docuit  
hac ratione. Sarmentum quod est obruendum, quantum latebit in terra, tan-  
tum findi debet omni sublata medulla, ac diligenter exculpta membra diuisæ  
partis iterum cogi, & vinculo constricta deponi. Vinculum papyro iubent fa-  
ciendum, humidoque solo figendum. Aliqui reuinctum sarmentum quan-  
10 tum fuerit excisum intra scillæ bulbum demergunt, cuius beneficio sata omnia  
facilius comprehendere confirmant. Alii iam putatę vitis fructiferum sarmen-  
tum in ipsa parente non diuisum, sublata medulla quàm altè possunt excauāt,  
& adfixo adligant calamo, ne possit inuerti: tum in foramen Cyrenaicum lac,  
vel succum suffundunt ex aqua ad sapæ spissitudinem resolutum. Hoc idem  
transactis diebus octonis renouant, & tantisper dum vitis nouella pariat ger-  
mina. A quo Palladius: Est pulchra species vuæ, quæ granis interioribus caret.  
Hinc efficitur, vt summa iucunditate sine impedimento sorberi possit, velut  
vnum omnium corpus vuarum. Fit autem Græcis authoribus hac ratione  
per artem succedente natura. Sarmentum quod obruendum est, quantum  
10 latebit in terra, tantum findere debemus, & medulla omni sublata, ac dili-  
genter exculpta, membra iterum diuisæ partis adunare, & vinculo constricta  
deponere. Vinculum tamen papyro asserunt esse faciendum, & sic in humida  
terra esse ponendum. Diligentiùs quidam sarmentum reuinctum, quantum  
excisum est, intra scillæ bulbum demergunt, cuius beneficio asserunt sata o-  
mnia comprehendere posse facilius. Alii tempore quo vites putant, sarmen-  
tum fructiferum putatę vitis in ipsa vite, quàm possunt de alto sublata medul-  
la excauant non diuisum, & calamo affixo alligant, ne possit inuerti. Tunc *αυπλωαίον*,  
quod Græci sic appellant, in excauata parte suffundūt, ex aqua prius  
ad sapæ pinguedinem resolutum, & hoc transactis octonis diebus semper re-  
30 nouant, donec vitis germina nouella procedant. Sed lignum in fructibus non  
puto nisi ex siccitate gigni, argumento quòd siccis temporibus gigartorum  
maior copia, & magnitudo. Crassior enim succus ab anni squallore minus ad  
pulpam aptus est, accessio verò ad pulpam fit ex fusiori liquidiorique materia,  
ex humidiori aëris constitutione proueniente. Ob id ex fossione, irrigatione,  
stercoratione, calidæ aquæ affusione, vt diximus alibi, testæ, & gigarta fru-  
ctuum sunt minora. Sed ex abstractione medullæ quod fiat vuæ sine interio-  
ri acino, omnino falsum: nam omnifariam periclitantibus falsum occurrit.  
Sunt tamen apud nos vuæ, quas Corinthiacas dicimus, hæ pusillos continent  
acinos. Et apud Orientales legimus vuas grandissimos acinos habentes inter-  
40 nis lignis carere. Sed medullæ abstractione factas esse non credimus.



**D**ICEMVS de vite medicata, scilicet theriaca, purgatoria, & vnguenta nra, alteriusq; efficacia, vt lubitum fuerit. Plinius, Mira est vitium natura saporem alienum in se trahendi: qualē & salicum redolent Patauinoiū in palustribus vindemiæ. Sic & helleborum seritur in Thaso, aut cucumis syluester, aut scammonia, quod vinum phthorium vocant, quoniam abortus facit. Scribit Florentinus animalia venenum ei aculantia frequenter agricolas infestare, vt viperæ, phalangia, serpentes, mures atanei venenū iaculantes, & scorpia etiam si domestici fuerint, & persuasos esse agricolas oportere vitem theriacam ad omnes horum animalium morsus sufficientem curationem præstare. Non solum enim vinum vitis theriacæ con morsu dolorē sedat, sed ex eadem acetum, & vua ipsa, atque vua passa: foliorum etiam & sarmentorū vstorum cinis morsui impositus, dolorem sedat, & hominē seruat. Vitem theriacam ita fieri docet. Sarmentum, quod pangendum est, trium digitorum spatio in ima parte findatur, & sublata medulla theriacę medicamē addatur, tunc terræ mandetur vinculo papyri diligenter adstrictum. Aliqui eadem sarmenta iam antidoto satiata intra scyllæ bulbum recondunt, & terris supradicta ratione committunt. Aliqui medicamentum, vt combibant radices vitis, infundunt. Sanè sarmentum si de hac vite sumatur ad transferendum, aut inferendum, potentiam materni medicaminis non tenebit, processuque temporis adsciticiam vim exspirabit. Ex his Palladius: Thyriacam vitem sic facies, cuius iste profectus est, vt vinum eius, vel acetum, vel vua, vel sarmentorum cinis proficiat cōtra morsus omnium bestiarum. Fit autem sic. Sarmentum quod pangendum est, trium digitorum spatio in ima parte findatur, & sublata medulla, ad eius vitem thyriacę medicamen addatur. Tunc terræ mandetur vinculo diligēter adstrictum. Aliqui eadem sarmenta iam medicamine satiata, intra squillæ bulbum recondunt, terrisque prædicta ratione committunt. Aliqui antidoti eius affusione radices vitis infundunt. Sanè sarmentum, si de hac vite sumatur ad transferendum, potentiam materni medicaminis non tenebit. Oportebit autem thyriacę affusione assidua vim succi senescentis iterare. Possumus & vitem purgatoriam facere sic ex Catonis doctrina. Vinum si voles concinnare, vt aluum bonam faciat, secundum vindemiam, vbi vites ablaqueantur, quantum putabis circi satis esse vini, tot vites ablaqueato & signato, earum radices circumfarrito, & purgato. Veratri radices in pila contundito, eas radices ponito circum vitem, & his stercus vetus & veterem cinerem & duas partes terræ circumaddito. Radicibus vitis terram insuper iniicito. Hoc vinum seorsum legito. Si voles seruare in verustatem, ad aluum mouendam seruato, nec commisceas cum cætero vino. De eo vino cyathum sumito, & demiscero aqua, & bibito ante cœnam. Sine periculo aluum mouebit. Et alibi. Vites quum ablaqueabuntur, signato rubrica, ne admisceas cum cætero vino. Tres fasci- culos veratri circumponito circum radices, & terram insuper iniicito. Per



vindemiam de his vitibus quod delegeris, seorsum seruato, cyathum in cæteram potionem indito, aluum mouebit, & postridie perpurgabit sine periculo. Ab eo Plinius, Fieri elleboriten ex veratro nigro circa radices vitium sato, Cato docet. Sic fit & scammonites. Florentinus purgatoriam vitem facit eo modo, quo & theriacen fecerat, scilicet veratrum in fissum sarmentum subdens. Sed vnguentariam vitem facere docet Paxamus, si odoratam fieri vuam velis, quæ suauitate locum impleat: in fissa sarmenta, modo quo supra dictum, odoriferum omne quod velis vuam olere, coniici poterit. Melius fieri putat idem si odore prius imbuta sarmenta materentur, quàm pangantur, vel inserantur.

*De vitium morbis, & medelis.* CAP. XVIII.

**N**unc de vitium morbis, & medelis dicemus: Theophrastum sequemur, qui omnium primus, & morbos, & medelas descripsit. Et primò de articulatione. Articulatio accidit vitibus ex nimietate, & quæcunque fructificare nequeant, propter luxuriam germinis, eodem proculdubio pertinent. Nec enim ista pabulum excoquere possunt, sed ad germinandum vis tota conuertitur, quasi detracta fluxu rapido nimii alimenti. Remediū esse potest, vel quum nimia nutrimenti vbertas detrahatur, vel quum arbor firmior, atq; robustior redditur. Depampinatio quoque vitium & prægrandium foliorum contortio per totam æstatem identidem facit. Item resectio summarum radicum & sarmenta superiniecta, & demissæ propagines eodem proculdubio pertinent. Adde suffossiones, & ablaqueationes, quibus radices dereguntur, vt flaribus, atque frigotibus assuescant, cauendo ne quid paxillus officiat, hæc omnia alimentum diminuunt, viresq; augment. Aliam quoq; addit morbi rationem. Vitis articulatio venit, aut flatu ablati germinibus, aut imperitia culturæ concisus, aut tertio in supinum excisis. Sic enim humor largus collectus, vehementer ad germinandum excurrit, ita vt nil queat fructificare. Plinius ab eo: Vitis morbus peculiaris articulatio tribus de causis. Vna vi tempestatum germinibus ablati, altera, vt notauit Theophrastus, in supinum excisis, tertia, culturæ imperitia laxis: omnes enim eorum iniuriæ in articulis sentiuntur. Ad hæc Palladius: Locis calidis, & apricis, vites, quæ fructu carent, fronde luxuriant, & pauperiem sætuum compensant vbertate foliorum. Nouembri putare prellius conuenit, frigidis verò mense Februario. Si permanebit hoc vitium, circum fossas arena fluuiali, vel cinere debebimus aggerare. Quidam lapides inferunt inter flexuosa radicum. Sotion Græcus: Effundentes se in multam materiem vites, breuius præsecare oportet, sarmentis enim priuatæ quiescunt. Si verò adhuc non cessent, facta past natione, hatenam fluuialem aggeremus, & modicum cinerem. Alii circum radices lapides ponunt, quo vitem perfrigerent. Accidit & rotatio, cuius gemina causa est, aut enim quod rores statim post florem inciderint, aut quod exuperantia fuerit. Quod si ita



fit, aerem dixerim in profluvio floris humidiorē, velut eruginem procreare: exuperantia verò quasi auocare dimouereque alimentum videtur. Itaque utraque de causa defluere acina, quæq; permanere potuerint esse exigua, ratio est. Hæc Theophrastus. Plinius ab eo: Siderationis genus est vitibus de florescentibus roratio. Aut cum acini priusquā crescant, decoquuntur in callum. Sotion hoc affert remedium. Vites rhyadas Græcis appellatas, Latinis defluæ, siue fluxæ vocari possunt, à defluxu, quasi fructum non continentes, ex foliis cognoscēs subalbidis, & subarefactis, sarmentis latis, mollibus & in lori modum tractabilibus. Medeberis igitur cinere, aceto acerrimo subactō illinens stirpes, & irrorans, quæ in ambitu sunt trunci. Ipsæ enim vites cinere liquido facto respergendæ sunt. Quidam verò marinam aquam radicibus affundunt, aliarum arborum summas partes auferunt. Est quoq; vuarum morbus crambus vocitatus à Theophrasto: Hoc animal est erugini simile, nascitur quum tempore humido, residente humore, Sol acrior consequutus inussit, quod etiam pampinis accidere constat. Plinius: Sunt & eadē causā nascentes & erucæ, dictum animal, eroduntq; frondem, aliæ florem, ac depastam arborem turpi facie relinquunt. Nascitur hoc animal tempore humido, & lento. Fit aliud ex eodem, si sol acrior insecutus inussit ipsum vitium, ideoq; mutauit. Africanus ad erucas, pediculos, & ad glaciem hoc affert remediū. Vt si no adipe corticem illinito, & vitis pedunculos non producet, aut adipe vt si no falces vngito nemine sciente, quibus vites putaturus es, sic neque pedunculi, neq; glacies vitem iniuria afficient. Aut falces oleo, in quo allium contritum sit, illinito. Si verò erucas, quæ in rosis reperiuntur, in oleo coxeris & inde falces illeueris, neque ab alio animalculo, neque à pruina vitis iniuriam perpetierit. Aut adipe hircino, aut sanguine ranarum falces inungito. Aut corticula cinerum cū oleo perlita falces acuito, vitis sarmenta vsta, & vitis lachryma permista cū vino in mediam vineam deponito, & vermes non enascentur. Pessimum est vitibus, si dum florent, impluerit. Defluunt enim flores & fructus, causa imbecillitatis. Plinius à Theophrasto: Pessimum est inter omnia quum deflorescentem vitem percussit imber, quoniam simul defluit fructus. Theophrastus, Caudicis fissionem citra iacturam sustinet, & corticis quoque detractionem citra noxam patitur, quod arborum plerisq; exitiale est: sed non principis illius, atq; vitalis, verum externi, & qui plerunque subnascente nouo decidit. Ratio est quod partes disiectas celerrimè comprimit, & coagmētat, atque tenaci compage constat. Sed dimutatione nouella vitis maxime interit, etsi quid tenellum, imbecillum, atq; rectifluum sit. Hæc enim istis moriendi causam donant. Ex his primis germinibus nihil amplius germinatur, sed protinus ipse germinandi effluxus cessat, extinguiturq; quasi vitis excrata & manca quodammodo fuerit. Principiū enim & validissimū & infirmissimum est, non tamen modo eodem: nam vitem fertilem admodum germinibus esse, germinationes sequentis temporis latissimè indicant. Plinius ab eo: Intereunt pleraque fistula



- stirpe, excepta vite. Idem si vites sint lachrymosæ, earum radicibus aquam sal-  
sam iubet affundi. Sotion Græcus : Vites lachrymam emittentes, quantum  
vix credi par est, & in totum corpus vitis non distributam abiiciunt. Falce igitur  
truncum incidemus, & exulcerabimus, sinu in ipso facto, si nil profuerit,  
radicum crassitudinem exculpemus, aut aliquo modo vlcerabimus : & amur-  
ca ad medietatem cocta, ac perfrigerata, plagas illinemus. Subrectum verò cē-  
suræ oculum foris inungemus : quod multo melius esse experimento constat.  
Palladius : Vites, quæ lachrymarum nimietate tabescunt, & deplorando vim  
roboris sui auertunt à fructu, trunco earum lacerato, Græci sinum fieri iubent.
- 10 Si hoc minus proderit, radicum robur pingue rescindi, vt afferat medicinam,  
vulnus impressum, tunc insulsa amurca ad medietatem decocta, & refrigera-  
ta plagæ excisio perlinetur, & sub hac acetum acre fundatur. At si quæ fru-  
ctum ostendunt vites ad maturitatem non perducunt, sed prius quàm mite-  
scant vix, inarescunt, hoc modo emendabuntur. Quum scipiones amplitu-  
dinem acini habuerint, radice tenui vitem præcidito, plagam acri aceto pari-  
ter, ac lotio veteri permista terra linito, eodemq; radices rigato, sæpe fodito.  
Hæc materias citant, vixq; succum perferunt. Ab eo Palladius : Ægras vites,  
vel quibus fructus arescit, circumfodies, & vrinam veterem suffundes. Item  
cinerem sarmenti, vel quercus aceto mistum subiice, aut incisas circa terram
- 20 latamine refoueto, & quæ germinant fortiora dimitte. Vindanionius Græ-  
cus : Quum acinus racemi cuius magnitudinem indeprus siccari incipit, tunc  
omnem arescentem racemi partem deradito, & à sana, siue potius à saniore  
vicina arescenti admito : indeq; casuram cinere acerrimo aceto misto linito.  
Præstantior autem cinis est sarmentitius. Sic enim quæ ægrotatura erant in  
racemo illita, cladem ampliorem evitabunt. Truncus autem vitis similiter ob-  
linatur. Quidam & infernas stirpis partes circa radices vrina veteri, & acerrima  
conspargunt. Ex hac enim medela non solum fructus servabitur, sed &  
ipsa vitis diuturnitatem recipiet. Ab his Plinius : Quod si fructum non matura-  
rent, prius inarescentem præcisarum ad radices plagam, fibrasq; , aceto acri,
- 30 & vrina vetusta madefacere iubent, atq; eo luto obruere, sæpe fodere. In fru-  
ctuosas vites Columella ira fecundas facit. Vites quum exiguum dant fru-  
ctum, aceto acri cum cinere rigato, ipsumq; codicem eodem cinere linito. Ab  
eo Plinius : Si verò fertiles non sunt, aceto acri subacto cinere rigari, atq; obli-  
ni. Damageron, Ægrotantē vitem cinere sarmenticio, aut quercino cū aceto  
misto ad truncum consperso curabis. Valdè prodest & vrina hominis radici-  
bus affusa. Quidam ægrotas vites excidunt iuxta terram, deinde leniter obru-  
unt terra adiacente, modico stercore ipsi ammixto : & quum turiones eger-  
minauerint, debiles quidam extirpant, generosos sinunt, & sequenti anno,  
commodiorem ex relictis eligentes, reliquos tollunt. Sterilibus vitibus De-  
mocritus hoc affert remedium : Truncum scalpro, aut serra, vel quercino cu-  
neo findito, lapidem in fissuram indito, vt partes trunci inuicem disparentur,



& in ipsum urinam humanam veterem infundito ad mensuram heminarum quatuor, ita ut eam sensum omni trunco circumfundas, ut etiam radices inde perfusæ in integrum restituantur. Deinde iniice stercus terra mistum: oportet tamen eos, qui lapidem in truncum imponunt defodere, & vertere ea, quæ sunt circa radicem. Id in autumno facito. Sunt etiam quædam vires quæ fructum recens productum putrefaciunt, priusquam racemi connutiantur, & maturescant. Talibus igitur medeberis portulacæ folio. Alii autem polentam portulacæ ammistam trunco circumlinunt. Alii portulaca dimidiam racemi partem illinunt. Quidam cineris veteris heminas quatuor radicibus iniiciunt, aut etiam arcnam. Palladius ad id: Vitis cuius fructus humore putrescit, per latera pampinanda est ante vigesimum vindemiæ diem, & sola frons illa seruanda est, quæ in summitate posita solem nimium defendit à vertice. Vites quoque algore intereunt, hoc quidem est quo deprehenditur soli vitium, quoniam non euenit nisi in frigido: itaque per hyemem cæli rigorem probamus, non soli. Ne igitur rubigo vineam vexet, docet Columella palearum acervos inter ordines verno tempore positos habere in vinea. Quum frigus contra temporis consuetudinem intellexeris, omnes acervos incendi, ita fumus nebulam, & rubiginem remouebit. Diophanes, ne à pruina & rubigine vires lædantur, docet ita: Stercus aridum per diuersa spatia in vinea deponito secundum venti ventum, ubi incumbentem pruina videris, stercus succendi, fumus inde elatus pruina disperget. Quæ verò à pruina aduruntur vires, tardius putare oportet, quum ad germen fundendum concitantur, sic enim tardius efflorescunt. Hippuris vitis tardius germinat, ob id credita est minus pruina curare calido iam sole existente. Quidam fabam in vineis serunt, & vires à pruina illasas futuras putant. At si contigerit vires à pruina lædi, incidendæ sunt, & valde breuiter præsecandæ, ut vis earum permaneat: nam & sequenti anno priorem fructum reddent. Alii miricæ cinerem in vinea ventilant, nam oculis cinis insidens, illabentem pruina pellit. Aliud affert Berytius. Simul ut videris rubiginem in aëre congregari, statim bouis cornu sinistrum unà cum bubulo stercore vrito, & fumum multum per ambitum arui, secundum ventum facito, quo ventus omnem fumum ad rubiginem ferat, nam disperget. Apuleius tradit trium cancrorum vstorum cum bubulo stercore, aut paleis, aut stercore caprino, fumum sufficienter iuuare. Si verò anticipet rubigo, damnum refarcies hoc modo: Cucumerum sylvestrium, aut colocynthidis radices, aut folia contundito, & aqua macerato, indeque apprehensa à rubigine irrorato ante solis exortum. Idem facit cinis ficulneus, aut quercinus maceratus, & irroratus. Prodit Apuleius: Si lauri ramulos in aruum proieceris, transire in ipsos rubiginis noxam. Nosse operæ pretium est, quod pleniluniis omnia rubigine afficiuntur, præcipue frumentum, propterea quod tunc Luna calidissima,



lidissima, & humida, noctuque fructus putrefacit. Quidam silurum piscem concisum vrunt secundum ventum, per omnem regionis partem odorem spargentes. Quin & per naturam contraria affectione resistit, si in cribro phocæ pellis circumponatur, perforeturq; ita vt per cribrum semen excutiat, & terra conseminetur. Idemq; grandinem cadere non sinit naturali proprietate. Plinius, Simili modo ne conuoluolus fiat in vinea, amurcæ congios duos decoctos in crassitudinem mellis, rursus cum bituminis tertia parte, & sulphuris quarta, sub dio coqui iubent, ne excandescat sub tecto. Hoc vites circa capita, ac sub brachiis vngi, ita non fore conuoluolum. Quidam contenti sunt fumo huius mixturæ suffire vineas secundo flatu continuo triduo. Plerique non minus auxilii, & alimenti arbitrantur, in vrina, quàm Cato in amurcæ, addita modò aquæ pari portione, quoniam per se noceat. Nunc remedia contra animalia describemus. Contra sorices id affert Columella, Vites quæ secundum ædificia sunt, à soricibus, vel muribus infestantur. Id ne fiat plenam lunam obseruabimus, quum erit in signo Leonis vel scorpionis, vel sagittarii, vel tauri, & noctu ad Lunam putabimus. Genus est animalis, volucra appellatur: id ferè prærodit teneros adhuc pampinos, & vuas, quod ne fiat, falces quibus vineam putaueris, peracta putatione sanguine vrsino linito, vel si pellem fibri habueris in ipsa putatione, quoties faciem acueris, ea pelle aciem detergito, atque ita putare incipito. Plinius ab eo: Alii voluocem appellant animal prærodens pubescentes vuas, quod ne accidat, falces, quum sint exacutæ, fibrina pelle detergent, atq; ita putant. Aut sanguine vrsino liniti volunt post putationem easdem. Ne formica vitem ascendat, iubet Columella lupinum teri, & cum fratribus misceri, eoq; imas vitem linea circumlini, vel bitumen cum oleo coqui, eo quoq; imas vites tangi: formicæ non exedent. Plinius: Sunt arborum pestes & formicæ. Has abigunt rubrica, ac pice liquida perunctis caudicibus. Nec non & pisces suspenso iuxta in unum locum congregant. Aut lupino trito cum oleo radices linunt. Africanus contra bestiolas vites vastantes hæc docet: Enecabuntur vermes vitem infestantes, aut vineam sua habitatione egram reddentes, fimo bubalo secundum ventum suffico. Quidam galbanum, aut cornu cerui, aut vngues caprinos, aut eboris scrobem, aut libi radicem in vinea suffiunt. Fugabis etiam muliebris pilis suffitu. Alii pæoniam, vel personariam suffientes. Alii succum cyrenaicum, & oleum coquunt & truncos vitium illinunt, à fundo paulo superius initio factis. Alii allio trito vires illinunt contra erucas. Alii cantharides oleo macerant, inde cotem, in qua falces exacuunt, illinunt contra easdem. Quidam contra maiora animalia stercore canino vrina veteri macerato, ac dissoluto, omnia per ambitum respergunt. Democritus: caneros fluuiales plurimos, aut paguros marinos, non pauciores quàm decem in vas fictile cum aqua indico, & addito operculo sub diuum exponito, vt ad decem dies insolentur. Deinde quæcunq; illa facere volueris, hac aqua conspergito, idq; alternis diebus, donec adoleuerint. & mi-



haberis rei efficaciam. Plinius: Contra vespas remedio est oleo aspergi ex ore vuas. Tradunt succo cucumeris sylvestris tactis radicibus vitium, non attingi vuas ab auibus. Vuæ flores in cibis edere gallinacei, vuas non attingunt. Vites casas bidente curare docet Palladius: Quum vitis bidente læditur, aut ferro, plagam, si terræ iuncta est, adline stercore ouillo, vel caprino, tunc terram circumfossa ligare curato. Si in radice laesa est, operiens liquidum latamen admisce. Eadem Cassianus Græcus.

*De vitis inimicitia cum brassica, & aliis. CAP. XIX.*

**B**RASSICA & laurus vitem offendunt, succoq; suo & odore deteriorem faciunt, nam & eam allicere, & olfacere dicunt, quamobrem cum germeniis propius accesserit, auersum retrograditur, inimicum fugiens odorem. Ideo Androcides sapientia clarus brassicam aduersari vino, ac ebrietatem arceri hoc prodidit exemplo, quod vitis etiam viuæ brassicæ fugetur odore, ut ex Theophrasto habetur. Plinius sylvestrem brassicam vino inimicissimam prædicat, quam præcipue vitis fugiat, aut si non possit fugere, moriatur. Berytius scribit, Maxime cauere homines debent brassicam inter vites ferere, velut natura siccam, & naturaliter contrariam affectionem aduersus vitem habentem. Si autem contingat complantata esse ex propinquo vitem & brassicam, vitis ipsa augescens, ubi brassicæ appropinquat, non amplius directe procedit, sed retrouertitur, contrariam affectionem ad brassicam habens. Inquit Timæus, Athenæo referente, vineam, in qua brassica nascitur, vinum exilius proferre. Odit præterea maxime corylum. Iubente Virgilio,

*Nè ve inter vites corylos fere.*

A quo Plinius: Vitis odit corylum, & ni procul absit, tristis, & ægra. Odit & cupressum, ut diximus in eius capite.

*Prognostica ad cognoscendas vini vbertates, vel caritates ante vindemiam. CAP. XX.*

**I**NTER Democriti scita connumeratur illud, ut qui cognosci possit ante vindemiam futuram vini vbertatem, & bonitatem, vel contrariam prauitatem hoc modo. Acinum, hoc est, vuam particularem de racemo leniter per digitos detrahito: si quidem igitur quiddam exilierit, vbertatem ostendit. Quidam si multum frumenti prouenit, etiam liquidum fructum abundaturum pollicentur. Cæterum vinum bonum, & potens futurum coniectamus, si per vernum tempus imbres plures fiant. Idem futurum indicant imbres oborti, quum erui magnitudinem vuam habet, & adhuc acerba existit. At verò quæ ad ipsum vindemiæ tempus oboritur pluuia, non solum aquosum, sed & deprauatum vinum ut vappam faciet. Plinius. Vinearum conceptus Vergiliarum exortu incipit, ad v i idus Maii. Aliud hoc quatrimum est, quod neque rore sordere velint, exhorrent enim frigidum sydus Arcturi postridie occidens,



cidens, & multo minus plenilunium incidere. 1111 nonas Iunii, iterum aquila exoritur vespere, de cetero die florentibus vitibus, si plenilunium in eum incidat. Equidem & solstitium v 11 calend. Iulii in simili causa duxerim, & canis ortum post dies à solstitio x x 1111. Sed interlunio accidente, quoniam vapore constat culpa, acinique præcoquuntur in callum. Rursus plenilunium nocet ad 1111 nonas Iulii, quum Ægypto canicula exoritur, vel certe x v 1 calend. Aug. quum Italia. Item x 1111 calen. Aug. quum aquila occidit, vique ad x calen. eiusdem.

*Maturitatis vuarum tempus quomodo cognoscatur. CAP. XXI.*

IN TANTE vuarum maturitate, docendum est quo tempore vindemiarum celebrandæ sint. Canit Hesiodus,

*Dum tamen in media cæli statione refulget  
 Syrius, Orionq; loco splendet eodem,  
 Et rosea Arcturi cernit Pallantias astrum:  
 Tunc vuas tenero abscindens de corpore matrum,  
 Per bis quinque dies tepido sub sole iacentes  
 Pande. Dies etiam mollescant quinque sub umbra.  
 Dehinc torque, & capiant vegetes incunda Lyæ  
 Munera.*

Varro vuas legere, & vindemiam facere iubet inter æquinoctium autumnale, & Vergiliarum occasum. Columella calendis Octobris fieri vindemias pluribus regionibus inquit: Vuarum maturitatem alii aliter interpretati sunt. Quidam quum vidissent partem aliquam vuarum virescere, crediderunt tempestivam esse vindemiam. Quidam quum coloratas, & perlucas vuas animaduertissent, nonnulli etiam quum pampinos, ac folia decidere considerassent: quæ omnia fallacia sunt, quoniam immaturis vuis omnia eadem possunt accidere propter intemperiem solis, & anni. Itaq; nonnulli gustu explorare maturitatem tentauerunt, vr siue dulcis esset sapor vuæ, siue acidus, exinde æstimarent: sed & hæc ipsa res habet aliquam fallaciam: nam quædam genera vuarum nunquam dulcedinem capiunt propter austeritatem nimiam. Sed hoc modo ipsa naturalis maturitas consideratur: scilicet quum expresseris vinacea, quæ acinis celantur, si iam infuscata, & nonnulla propemodum nigra fuerint: nam nulla res colorẽ illum afferre potest, nisi maturitas, quum in media acinorum parte sint, vt à sole estuante & ventis protegantur, humorque ipse non patitur ea percoqui, aut infuscari, nisi suapte natura. Diophanes Græcus adhuc: Non facile est cognoscere, quando vindemiandum sit: nam alii ante maturitatem vuas legentes, infirmum, & non perenne vinum faciunt: alii tardius vindemiantes, non solum vitem lædunt, vltra tempus onus gestantem, sed & si grandio, & glacies oboriretur, iniuriæ expositum vinum habebunt. Cognoscitur igitur opportunum tempus visu, & gustu, aliisque



notis à veteribus proditis. Democritus & Africanus sex tantum dies & non plures rectè permanere vuam maturam tradunt. Si igitur vinaceus non amplius viridis pellucet, sed nigricans, vuam maturam esse significat. Alii acinos premunt, & si vinaceus exhiberit nudus, circa omnem carunculæ circum se complexum, maturas ad vindemiam esse vuas iudicant. Si verò profuerit vinaceus partem carniū secum trahens, maturas negant. Quidam quòd passa fieri incipiat, maturam coniectant. Alii hoc modo: Vbi densissimus est racemus, inde acinum vnum eximunt, & post vnum, aut alterum diem racemum respiciunt, & contemplantur. Si in eadem figura permanerit locus, velut vicinis, & iuxta sitis acinis, nullum augmentum capientibus, vindemiam accelerant. Si verò exempti acini locum minorem factum viderint, velut circum sitis acinis auctis, vindemiam inhibent, donec augmentum progressum fecerit. Zoroaster verò addit, quòd vindemiare oportet Luna existente in Cancro, aut Leone, aut libra, scorpio, capricorno, aut aquario. Diligenterque providendum ut desinente ipsa, & sub terra existente vuarum collectionem absoluiamus. Plinius, Iustum vindemiæ tempus ab æquinoctio ad Vergiliarum occasum dies XLIIII. Musta calcari debere quum Luna sub terra, x i calend. Septembris. Cæsaris & Assyriæ stella, quæ vindemiator appellatur, exoriri mane incipit, vindemiæ maturitatem promittens. Eius argumentum erunt acini colore mutati. Vindemiam antiqui nunquam existimauere maturam ante æquinoctium: iam passim rapi cerno. Quamobrem & huius tempora notis, argumentisq; signentur. Leges ita se habent. Vuam calidam ne legito, hoc est in eius siccitate, ac nisi imber interuenerit. Hanc ne legito rorulentam, hoc est si ros nocturnus fuerit, nec prius quàm sole discutiatur. Vindemiare incipito quum ad palmicem pampinus procumbere cœperit, aut quum exempto acino ex densitate interuallum non compleri apparuerit, acinum non augeri. Asino plurimum refert, si coningat crescente Luna vindemiare.

*De vindemia facienda. C A P. XXII.*

**C**A T O, Columella, Varro, ceteriq; multa vasa preparari iubent ante vindemiam, sed quia aliena sunt ab his, quæ nostris temporibus habemus, superuacuum duximus recensere. Didymus torcularia viginti diebus ante vindemiam aperienda esse dicit, quo perflectur, & transpirent, aqua marina respergenda, suffumigandaq;. Apuleius: Qui corbibus præfecti sunt, folia eligant, & si quis racemus acerbus, aut acidus afferatur. Oportet & calcantes, si quid cophinis præfectos sefellerit, eligere: nam folia cum vuis contrita, vinum magis alstringens, & corruptibile faciunt. Ex acerbis, & siccis racemis detrimentum accedit. Iniectas in torcular vuas, statim pedibus conterant, qui ad hoc destinati sunt, omnesq; acinos æqualiter concutâtes, vinacea extrahant, quo plurima liquoris pars in subtorcularios lacus defluere possit, & vbi ite-  
rum.



rum calcantur discedant: & quum calida, & non valdè humecta fuerint vinacea, sub lignum præli imponent: calida enim, & mollia existentia fluidiora sunt. Si valdè humida superponantur, necesse est onere imposito distrumpi, ac disparari composita. Ingredi autem calcatores oportet torcularios pedibus benè lotis: neq; in torculari quicquam edant vel bibant, neq; sapè ingrediantur, & exeant, & si qua necessitas abeundi fiat, nudis pedibus ne abeant. Sine calcatores induti, oburgentes sudores. Bonus odor in torculario sit oportet ex thure, vel aliquo alio suffumigio. Varro vindemiam ita fieri oportere dicit, ut videas à quo genere vuarum, & à quo loco vineæ incipias legere, nam & præcox multo ante coquitur, quo prior legenda, & quæ pars arbuti, ac vineæ magis aprica, prius debet descendere de vite. In vindemiam diligentius vua non solum legitur ad bibendum, sed eligitur ad edendum. Itaq; lectius defertur in forum vinarium, vnde in dolium inane veniat, electa in secretam corbulam, ut condatur. Quæ calcata vux erunt, earum scopi cum folliculis subiiciendi sub prælum, ut si quid reliqui habeant musti, exprimatur in eundem lacum. Quum desit sub prælo fluere, quidam circumcidunt extrema, & rursus premunt, & rursus, quum expressum, circumcisitum appellant, ac seorsum quod expressum est servant, quod resipit ferrum.

*Lora optima quomodo fiat. CAP. XXIII.*

**A**VARRO NE docetur lora quomodo fiat. Expressi acinorum folliculi in dolia coniciuntur, eoq; aqua additur, ea vocatur lora, quod lota acinu, ac pro vino operariis datur hyeme. Columella expressius docet. Quantum vini vno die feceris, eius partem decimam quot metretas efficiat considerato, & totidè metretas aquæ dulcis in vinacea, sed quibus vnius diei vinum expressum erit, addito. Eodem & spumas de fruti, siue sapæ, & facem, ex lacu confundito, & permisceto, eamq; inritâ macerari vna nocte finito, postero die pedibus proculcato, & sic permistâ prælo subucito. Quod deinde fluxerit, aut doliis, aut amphoris condito, & quum deferbuerit, obturato. Commodius autem servatur in amphoris. Hanc loram Columella suus patruus ex vetere aqua faciebat, & non nunquam plus biennio innoxiam servabat. Anatolius ita facit: Vinacea post musti defluxum è vestigio deicienda sunt, & in dolia indenda, ac postea conculcanda, etenim fax ex his non iniucundus potus fuerat alibus: ipsa que deinde remanentia vinacea abundans alimentum brutis præbent. Oportet autem statim, ut vinacea ex torculari ablata sunt, & torcular, & lacus subtorcularioseuertere, & aqua marina, aut muria per spongiam expurgare, & suffumigare: humor enim remanens omnino corruptus ac escit, & proinde fructum, qui sequenti die calcatur, corrumpit, & culicem gignit, quod signum est vini in vappam peruersi. Plinius. Non possunt iure dici vina, quæ Græci deuterias appellant, Cato & nos loram, maceratis aqua vinaceis, sed tamen inter vina operaria numerantur. Tria eorum genera. Decima parte



aquæ addita, quæ musti expressa sit, & ita die ac nocte madefactis vinaceis, rursus prælo subiectis. Alterum quomodo Græci factitauerunt, tertia parte eius quod expressum sit addita aquæ, expressoq; decocto ad tertias partes. Tertium est fecibus vinum expressum, quod fecatum Cato appellat. Nulli ex his plus quàm anno vsus.

*Quomodo mustum in dolia condendum.* CAP. XXIII.

**P**OST perfectam vuarum calcaturam, quomodo mustum in dolia condendum sit, docet Diophanes. Dolia ante vini infusionem meraca muria, per spongiam emundare oportet, & thure suffumigare. Oportet neque valde plena facere, neq; nimium vacua, sed coniicere quantum verisimile est mustum efferuescens augmentum facere posse, vt ne superfundatur, & vt spuma vsq; ad labia eleuata, quod solum est impurum expuat. Purgandum est consequenter mustum in doliis ad dies quindecim, & tum manibus, tum scyphis spuma auferenda, & si quid aliud superfluum fuerit: purgamenta verò omnia extra locum, in quo dolia sita sunt, exportentur, & valde procul reiciantur. Si enim in vicino manserint, culices ex ipsis corruptis enascuntur, & malus factor excitatur, quæ ambo vinum in vappam conuertunt: quare bonum odorem in torcularibus, & cellis vinariis procurandum. Florentinus ne vinum superfundatur, hoc adinuenit: Coronam ex pulegio, aut calamintha, aut origano ad colla vasorum circumponit. Quidam interna doliolorum labra calceobubulo perlinunt, cohibet enim intro musti ipsius feruorem. Docet Democritus mustum, quod per pluias frequentes imbecillitatem contraxit, crebro imbre perfusa vua, quod probari ipsius gustu poterit, sic curari debere. Statim atq; primum efferbuerit mustum, in noua dolia transferunt, in fundo enim sidit suo pondere feculentum omne & aquosum, atque in metretas decem vini tres salis heminas adiiciunt. Vel mustum decoquunt, donec pars eius vigesima possit absumi. Melius fieri dicunt si centesima gypsi pars adiiciatur. Lacedæmonii eo vsque decoquunt, donec vini quinta pars pereat, & quarto anno vsibus ministrant.

*Quomodo vina elutrianda.* CAP. XXV.

**V**INUM elutriari oportet, Zoroastræ doctrina, borealibus ventis spirantibus, nequaquam verò australibus, infirmiora vere, fortiora astate. Quæ verò in squalidis locis nata sunt, post hyemale solstitium. Vinum plenilunio in alia vasa transfusum acescit. Nolle oportet: vinum à fece, vnde alimentum habet, liberatum, tenuiorum partium, & imbecillus redditur. Prouidendum est hyeme calefiat, astate frigescat. Inter mæstruo quum Luna silet, elutrianda vina. Sorion in prælunaribus maxime diebus, hoc est prima, & secunda die priusquam Luna hominibus appareat, transfusionem fieri tradit. Obseruari præterea exortus syderum, & emersus, in iis enim facem moueri volunt. Item quum rosa floret, aut germinat vitis, qua seom  
deme



dehinc consulunt sapientes, præsertim Hesiodus, aperto dolio, summū in umq; vinum expendendum quod medias tenet dolii partes, seruādum utpote quod & validius, atq; durabilius, ac vetustatis patiens existimetur. Quod enim summis vasis faucibus residet, aëris consuetudine vires exhauriente, degenerat in vappam, quod fundo sidit, fecis vicinitate vitiatur. Quod ita cecinit Hesiodus,

*Principio vasis saturum, & sine esse iubemus,*

*In medio parcum.*

Vasa non ad summum vsq; labrum replenda, sed faucibus tenus, ne occluso spiritu strangulentur, coercitaq; suspiret aura. Addit Plinius. Vinum transferre in vasa, in quibus acetum fuerat, melius, quàm in ea, in quibus dulce, aut mulsum.

*Prognostica vinorum durabilium, peruertendorumq;.*

CAP. XXV.

**T**RANSFUSO in dolia vino, monet Africanus, fex ipsa in dolio relinquatur, ac diligenter dolium cooperiatur, frequenterq; olfactu experimentum sumendum est, an aliqua transmutatio secum fiat, ut si culices, aut eiusmodi quippiam gignatur, id signum vinum corruptum iri, si nil tale contingat, permansurum. Alii pertusam harundinem ad faeces vsq; dimittunt, supernūq; harundinis foramen digito magno obturāt, mox ablato digito per foramen olfaciunt, vel aliquid faecis exugunt, & ex faecis qualitate quale futurū erit vinum coniiciunt. Alii parum de vino seruefaciunt, & refrigeratum gustant, & ex sapore de cætero quale vinum futurum sit iudicant, verū de medio vase vinum accipiendum ad experimentum. Alii ex operculis vasorum prognostica concipiunt. Detecto enim dolio, humiditatem ipsam inhaerentem degustant, & tale vinum fore coniectant: nam si vinosus est sapor, optimi vini signum, si æquosus, peruersuri. Alii à sapore auspicantur præagia: nam si austerrum sapit, securitatem indicat, si molle, contrarium. Licet idem ex supernatante flore coniicere. Si mollis, latus, & purpurei coloris, securius vinum promittit, si glutinosus, reprobū signum: si niger, imbecille: albus diuturnum vinum significat. Si telæ araneæ contextus, acoris indicium. Rursus si serpentem viti implexum vindemiæ tempore videbis, vinum acidum expectabis. Si dum calcatur mustum, aut in dolia conditur, crassum & glutinosum fuerit, quod tactu deprehendes, durabilius vinum erit: si tenue, facile peruersurum. Vinum in musto austerrum, perenne, & in posterum iucundum fore, dulce verò nō durabile. Tactu etiam cognosces, vas tactu calidum, nō firmum vinum, frigidum contra diuturnius. Vinum gustu calidum, vel frigidum idem ostendit. Operculum dolii siccum, firmissimum vinum indicat, si humidum, peruersum. Si aceti mulsi odorem habebit, transuafari ostendit, vas talis odoris causam scito. Alii manus in vinum immergunt, iisque exiccatis ex odore coniiciunt: peruertendi enim vini acidior olfactus. Alii super harenam vinum coniiciunt,



& percolant, si non transmutabitur, probatissimum habent. Vina quia perueriti solent in solstitiis, & vire gerimen fundere: ob id eo tempore probationis talia experimenta sumunt. Alii laminas ex plumbo, stanno, vel ære faciunt longitudine, & latitudine trium digitorum, & deterfas operculo doli adglutinant, & opercula doliis obdunt, & post quadragesimum diem aperiunt, si laminas puras reperient, vinum dulce, odoratum, & sanum iudicant, at si plumbea albescentem, in cerussa speciem, si stanneam, nigrescentem, si æneam, in bullas erumpentem, non sanum. Alii polentam ammiscunt, & ubi defecerit, gustant. Alii apii semen, hordei furfures, lauri folia, vitis nigra sarmenta in effervescens, & bulliens vinum iniiciunt, & refrigeratum gustant: & hoc modo experimentum capiunt. Plinius. In vitium inclinantis vini experimentum est lamina plumbea mutatus in eo colos. Flos vini candidus probatur, rubeus triste signum est, si non is colos vini sit. Item vasa incalescentia operculave sudantia. Quod celesriter florere cœperit, odoremq; trahere, non fore diutinum.

*De tempore, & modo gustandi vinum.* CAP. XXVI.

**S**UNT & fraudes œnopolarum, quæ peruersum vinum optimum gustantibus demonstrare possunt, non quod ipsi eiusmodi imposturas aliis faciamus, sed ne per tales circumueniamur & ne ab eis fallamur, eas nos docet Florentinus. Qui borealibus ventis flantibus vina degustant, qualia sint non cognoscunt, quia tunc incommota manent. Sed experti œnopa Austrospirante gustant, quia auster vinum commouet, & quale sit arguit. leiuus vinum ne gustet, tunc enim gustus est hebes, neq; a crapula id degustandum. Oportet gustantem, neq; acres, neq; falsos cibos, qui comedentis gustum immutant, præsumpisse: sed paucissimum cibum, eumq; nondum concoxisse. Emptoribus borea spirante, vinum ad gustandum exhibeto. Alii emptoribus imposituri, doliu nouum habent, quod optimo, vetere, ac odoratissimo vino replent, & ita faciunt gustantes, putantes odoris fragrantiam contineri vini esse, quum in dolo diutius ea qualitas inhæreat. Caupones caseum, & nuces exhibent potantibus, quo exactus sensus gustus corrumpatur. Zoroaster syderum exortu dolia aperiri non debere admonet, tunc enim motus fit vini, & non cõuenit ipsum cõrectare. Et si in die doliu aperies, soli vmbrosu aliquod oppones, ne splendor vino illabatur. Si noctu, necessitate urgente, doliu aperturus, aduersum lumẽ Lunæ inde excipies. Laborat vinum, ut Paxamus tradit, occasu Pleiadum, ite bruma, vel quum flore vitis exiit, æstiuo solstitio, vel exortu Canicula. Sentiunt vitia, quum eolum incendio flagrat, quum etiã nimio frigore riger, quum vehementer incesserunt pluuia, item quum duro tonitru cõcutitur aut violentis coruscat fulgetris. Plinius. Bruma aperiri verant, nisi sereno die: verant Austro flante plenave Lunæ.

*Quomodo mustum dulce toto anno habeamus.* CAP. XXVII.

**M**VSTVM ut semper dulce, & tanquam recens toto anno permaneat, sic facito. In amphoram mustum indito, & corticem oppicato, demittito in pilcia, post trigesimum diem eximito, totum annum mustum erit. Caro, Vel



Vel antequam prælo vinacea subiiciantur de lacu quàm recèrissimum addito mustum in amphoram nouam, eamq; oblnito, & picato diligenter, ne quicquam aquæ introire possit. Tunc in piscinam frigida, & dulcis aquæ totâ amphoram mergito, ita ne quæ pars extet, dein post quadraginta dies eximito, & vsq; in annû dulce permanebit. Hæc Columella à Florentino Græco. Mustum prochyma dictum Græcis, quod sponte distillat antequâ calceretur, eodem die in vas intus, & extrâ picatum conde, vt ad medietatē vas repleatur, & addito operculo diligenter obline gypso. Ad multū enim tempus mustum dulce permanet. Diutius permanebit, si vas per pelliculâ obturatū, & conclusum in puteū per triginta dies dimittatur, propterea quod nō effteruescit, & semper mustū erit. Si quis etiā leniter vuas calcauerit, vt nō premâtur, hoc ipsum habebit. Alii in vetus vas à vetere vino mustum infundunt. Alii vas intra & extra picatū in puteū imponunt, vt labra tantū superemineant. Alii in humidâ arenam vas infodiunt. Alii super vas vinaceis obrutū harenâ humidam accumulunt. Alii in vas non picatū mustum condunt, & nitro Alexandrino tuso adiecto in vmbra deponūt. Experimentū suprâ descriptū probauimus, & verū inuenimus, immo etiam per bienniū sub aqua latuit, & optimū repperimus. Alio quoq; artificio dulce vinū Columella facit. Vuas legito, in sole triduū expādito, quarto die meridiano rēpote calidas vuas proculcato, mustū lixiuium, antequâ prælo sit pressum, de lacu tollito, quū deferbuerit in sextarios quinquaginta itim benè pin-  
28 sitâ nec plus vnciæ pondere addito. Vinū à fœcibus eliquatū diffundito: hoc erit suaue, firmum, & corpori salubre. Didymus ita facit. Triginta diebus antè vindemiâ sarmentum ferens botros intorquēt, omniaq; folia auferunt, quo illa-  
bens sol humorē consumat, & vinū dulce facit, quemadmodū per cocturâ nos facimus. Intorquent sarmenta nimirum, vt racemos ab humiditate, & alimento, ex vite abstrahant. Alii postquâ racemos foliis denudarunt, & vuae iâ corrugari incipiūt, collectas racematim ad solem exponūt, donec passæ fuerint, post  
sub eodē meridiano sole sublatis in torcular transferunt, & reliquam diem ac  
insequentē noctem sinunt, & sub diluculū calcant, vel iâ expressum, & in do-  
30 liis conditū mustum, per triduū deoperta relinquūt, mox opercula addunt nō valdè osculis congruentia, sed virgis interpositis superpendētia: post quintum diem opercula exacte obdanda, cinere aqua subacta illita, paruis foraminulis relictis, quæ & post septimum diem claudantur. Et si dulcius quæris, ad dies quinque dolia deoperta finito, mox opercula addito. Plinius Mediū inter dulcia vinumq; est quod Græci aigleuces vocāt, hoc est semper mustū. Id euenit cura, quoniâ feruere prohibetur: sic appellant multi in yina transitū. Ergo mergūt è lacu proximus in aqua cados, donec bruma transeat & cōsuetudo fiat algēdi. Est etiamnum aliud genus eius per se, quod vocat dulce Narbonensis prouincia, & in ea maximè Vocōtici. Aseruatur eius gratia vua diutius in vite pediculo in-  
40 torto. Ab aliis ipse palmes inciditur in medullâ, ab aliis vua torretur in tegulis.

*An vinum habeat ammistam aquam.* CAP. XXVIII.



**P**YRA sylvestria, hoc est crudissima: Sotion in mustum coniecit, & si aquam habuerit, ad fundum merguntur. Democritus verò inquit. Si scire cupis emptor, si nullam mistionis fraudem vinum experitur, mala, aut pyra sylvestria, aut locustam, aut cicadam in vas mittito, quod si supernatauerint fluitantia; meri sincerique putat indicium, si demergantur, aquam contineri. Aliqui arundinem, papyrus, fœnum, lignum, aut aliquid sarmentosum oleo illitum dolio mandant, deinde extrahentes considerant, si oleo guttulæ aquæ stilatim congelæ cohereant, quod si deprehendatur, aquam contineri certum est. Vel si in ollam nouam antea nullo perfusam humore biduo vinum adhibeatur, ea mistam aquam extillabit. Alii calefactum vinum sub dio in nouum mittunt fictile, si aquam habeat degenerat in acetum. Alii in viam calcem vinum iniiciunt, si sincerum est, hanc cogit: si aquosum, diffundit. Porro si in sartagine feruens oleum capientem vinum aquam habens funditur, obstreper, & bullans exiliet. Alii spongia oleo imbuta spiraculum vasis obturant, & inuertunt, si aqua insit, à spongia manans effluet. Africanus in dolium vini liquidum alumen infundebat, & penicillo oleo peruncto dolii spiraculum operculabat, per quod inclinatum sola profluebat aqua. Adhæc Cato: Si voles scire in vinum aqua addita sit nec ne, vasculum facito de materia hederacea. Vinum id, quod putabis aquam habere, eodem mittito. Si habebit aquam, vinum effluet, aqua manebit, nam non continet vinum vas hederaceum. A quo Plinius: Ederæ mira proditur natura ad experienda vina. Si vas fiat ex ligno eius, vina transfluere, ac remanere aquam, si qua fuerit mixta. Sed hoc falsum est, nam quum experiremur, aqua effluit, vinum remanet. Sed lignum viride sit oportet. At quomodo à vino aqua separetur, in Naturali Magia longius exequuti sumus.

*De defruto coquendo. CAP. XXIX.*

**V**ASA, quibus defrutum coquitur, aut sapa, plumbea potius, quàm ænea esse debent: nam in coctura aruginem remittunt ænea, & medicaminis saporem vitiant. Odores qui cum defruto apti sunt coquantur, iris, fœnum græcum, schœnum. Harum singulæ libræ in defrutarium quod ceperit musti amphoras nonaginta, quum iam deferbuerit & expurgatum erit, tum adiaci debent. Deinde si natura tenue mustum erit, quum ad tertiam partem fuerit decoctum, ignis subtrahendus est, & fornax aqua refrigeranda. Quanto plus decoquitur (si modo non adurit) melius, & spissius erit. Plinius: Decoquitur mustum vsque ad tertiam partem mensuræ. Quod ubi factum ad dimidiam est, defrutum vocamus. Omnia in adulterium mellis excogitata. Ipsa quoque defruta ac sapa coquunt quum sit cœlum sine Luna, hoc est in syderis eius coitu, neque alio die coqui iubent. Præterea plumbeis vasis non æreis, nucibus iuglandibus additis: eas enim fumum excipere. Campaniæ nobilissima exposita sub dio in cadis verberati Sole, Luna, imbre ventis aptissimum videtur.

Tempus



Tempus defrutum coquendi, noctu silente Luna, aut si interdiu plena, ceteris diebus, aut ante exortū Lunæ, aut post occasum. Ne de nouella vite, aut palustri, nec nisi è matura vua, nec nisi foliis despumandum, quia si ligno contingatur vas, adustū ac fumosum fieri putant. Leontius sapam docet. Musti optimi sextarios v i i, vini optimi sextarios centum, si ad tertias decoxeris, & despumaueris, sapam egregiam parabis.

*Remedia ad vina. CAP. XXX.*

**M** VLT X sunt apud antiquos rei rusticæ scriptores ad vina remedia, nos ea tantum, quæ ad vsum nostri tēporis esse possunt, huc afferemus. Columella affert remedia acescentis vini. In quo agro vinū acescere solet, curandum vt quum vuam legeris, & calcaueris, priusquā vinacea torculis exprimantur, mustum in corbem defundas, & aquæ dulcis puteanæ ex eodem agro partem decimā adicias, & coquas, donec aqua quā adieceris, decocta sit. Quum refrixerit, in vasa defundas, operias, & oblinas, ita diutius durabit, & detrimenti nihil fiet. Meliuserit, si aquam pluribus annis seruata addideris: longè melius si nil aquæ addideris, & decimam musti decoxeris, frigidumq; in vas transfuleris, & si in sextarios v i i musti heminā gypsi miscueris, postquā decoctum refrixerit. Mustum reliquum, quod è vinaceis fuerit expressum, primo tēpore absumito, aut ere cōmutato. E Frōronis doctrina: Gypsum iniectū à principio quidem acrius vinū facit, progressu temporis acie quidem transpirat. Vtilitas autem de gypso resultans ad multū tempus perseuerat, durabile vinū facit, & acescere non permittit. Vino quod acorem quendam iam concepit, vt anthor est Tarentinus, medetur ollula aquæ bonæ plena, quæ diligenter operta in dolium demergatur, modica tamen respiratione relicta dolium occludatur. Post triduum inuenietur ab acore vinum sese recollegisse, & aquam olere, si pristinum robur resumpserit. Quare vsq; quò vinū perfectè conualescat, hoc facito. Alii lactis caprini quinquagesimam partē infundunt, & integunt, post quinq; dies elutriant. Diximus suprā vina laborare, quū cælum tonitru cōcutitur, aut crebris coruscat fulgetris. Arcere tonitrus, & fulguris noxam credidit Zoroastres, ferrū operculis doliorū superpositū. Alii admosos lauri ramulos ceca naturarū discordia vinū ab huiusmodi iniuria vindicare scripserunt. Vitiū musto quibusdā in locis iterū sponte feruere, qua calamitate iterū deperit sapor, vappæq; nomen acquirit. Docet Fronto: vinū peruersum in vappā, si à propria vitiosa fæce segregetur, & super vini boni fæcē fundatur, diuturnū erit. Quidam tedas accensas in musto exstinguunt, & vinū transmutari non permittunt. Alii ferrum candens. Quidam cedri fructū, & gallas tostas, alii thus poricū vstu n, alii cinerem sarmentorū vino iniiciunt. Alii in vasa recentia transfundunt, & in aliā domum transferunt, si à caliditate laesa sunt, in frigidos locos deponunt, si ab humiditate & frigiditate, in calidos & siccos. Alii fructum, aut lignū quercinū vrunt, & cinerem in vinū mittunt, alii nucleos oliuarum combustos vino cocto, sapa, defruto exstinguunt, & rufos in vinū diffundunt. Sal tostus iniectus



vinum in vappam abire prohibet, impedit autē feruorem vltra quā cōueniē extendere, & spumam vberiore superstare. Ob id Plinius: Vinorū medicaminis tanta cura est, vt cinere apud quosdam instantentur. Sed cinerem ē vitis sarmentis, aut quercu praeferunt. Quum & marinam aquam eiusdē rei gratia ex alto peti iubent, seruariq; ab æquinoctio verno, aut certē nocte solstitio & Aquilone flante hauriri, vel si circa vindemiam hauriatur, coquit. Ob id vt diurnius vinum fiat, idem Fronto amygdalas dulces in vinum nigrum coniicit, vel vuam passam sua sponte in vite factam, exempto vinaceo, cum harena madafacta musto, aut sapa, vel vitis radices, oleum stillaticium cum sapa infusum, veratrum nigrum & album modicē inditum, cicet nigrum, modicē tostum & molitum, sapa, lini semen musto ammissū, picem brutiam, contusam, & per  
cribrum excussam, pinus resinam, & alumen scissum. Turbulentiā vini confestim residere promittit Anatolius, si decoctē ad tertias amureæ singulas heminas in singulas vini metretas quis infundat. Fronto tradit argillam postquā vina deferbuerūt immissam ipsū purgare deferentē secum turbidum ad scē, atq; id magis tostam. Itē candida ouorū tria in vas coniecta, vt spumescent, conturbato, adiectoq; salem album, & vini partem, atq; emolito, donec quā albiissima euadāt, deinde vino vas impleto, & in doliū sic diffundito ac reposito. Si situm oleat vinū, aut asperginē sentiat, iubet Apuleius tædas pingues igni flagrantes in doliū coniici, & accensas in vino restingui. Alii candentem testā immergunt. Alii vas continens aquam obruunt, & post triduū liberari vitio ex-  
periuntur. Alii apii semen, & folia intingunt, alii recentis casei serū permiscēt. Salignum lignū vino inditum omnem nequitiam tollit. A serpente immissum virus, vt Democrito placet, ferreus anulus elicit. Sed aliud ad id affert Columella praestantius. Si quod animal in mustum ceciderit, & interierit, vti serpens, aut mus, sorēxve, ne mali odoris vitium faciat, ita vt repertum corpus fuerit id igne aduratur, cinisq; eius in vas, quod deciderat, frigidus infundatur, atque rutabulo ligneo permisceatur, ea res erit remedio. Sotio remedium affert, quo vinum florem non habeat. O Enanthem siccata in vinum inspergito, aut farinam erui, vbi verò infra secesserint flos & farina, vinū in aliud vas transfundito. Columella monet, Si vinum florescere incipiet, sæpius curare oportebit, ne  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  
100  
105  
110  
115  
120  
125  
130  
135  
140  
145  
150  
155  
160  
165  
170  
175  
180  
185  
190  
195  
200  
205  
210  
215  
220  
225  
230  
235  
240  
245  
250  
255  
260  
265  
270  
275  
280  
285  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  
325  
330  
335  
340  
345  
350  
355  
360  
365  
370  
375  
380  
385  
390  
395  
400  
405  
410  
415  
420  
425  
430  
435  
440  
445  
450  
455  
460  
465  
470  
475  
480  
485  
490  
495  
500  
505  
510  
515  
520  
525  
530  
535  
540  
545  
550  
555  
560  
565  
570  
575  
580  
585  
590  
595  
600  
605  
610  
615  
620  
625  
630  
635  
640  
645  
650  
655  
660  
665  
670  
675  
680  
685  
690  
695  
700  
705  
710  
715  
720  
725  
730  
735  
740  
745  
750  
755  
760  
765  
770  
775  
780  
785  
790  
795  
800  
805  
810  
815  
820  
825  
830  
835  
840  
845  
850  
855  
860  
865  
870  
875  
880  
885  
890  
895  
900  
905  
910  
915  
920  
925  
930  
935  
940  
945  
950  
955  
960  
965  
970  
975  
980  
985  
990  
995  
1000

*Variū acetum conficiendi modū. CAP. XXXI.*

**S**E p res ex postulat, vt quomodo acetum fiat differamus ex vino, atque non  
Sex vino commentitium multis modis. Est acetum vini vitium, quod ad luxuriam cessit hominibus, tot ad vsus expetitur, vt sine eo vita mitior exigi non  
posset. Acetum subitō sic fieri Cassianus ex Varrone promittit, si rufam betæ  
radicem



radicem in vinum cōieceris, post horas tres in acetum degenerabit. Quod si in pristinum statum restitui voles, brassicæ radicē indidisse satis est. Mirū acorem concipere tradit Sotion, si aridi vinacei, aut pauci vix acerbæ acini demittantur. Pyrethrum infusum acorem supra modum accendit, si cū vna parte feruefactum reliquæ miscueris. Acerrimum idem fieri putat, & suaue, vetustis graminis radicibus, aut immerso lactis sero, aut cinere querno, aut candentibus carbonibus in eo restinctis, aut si ciceribus, testisve igni fragrantibus acetum vratur. Diu suum acorem tueri refert Apuleius, si fabæ cū citrii mali succo vasi cōfundantur. Si scire vis acetum an aquam habeat, iniecto alumine si tanquā

10 feruescens intumuerit aquam continere, Apuleius existimat. Dulce sic fieri acetū Sotion docet, quo post triginta dies quis vratur: Multi quod vuarū calcatu confluxit vnā metretam in duas aceti addūt, simulq; coquūt vt triens modo super sit. Alii mensurā multi duplam, aquæ potabilis triplā ad aceti vnā partem discoquunt, dū totius modi dimidiū restet. Alii acerrimi aceti amphorā & multi tantundē miscent, pice vase oblito, & post idē tempus vruntur. Duplicati acetū promittit Africanus, si conspicuā mensuram aceti acceperis, velut metretā, & ad ipsam aquæ marinæ ad dimidia coctæ metretā vnā adieceris, & permista in vase reposueris. Quidam ordeum macerāt, & percolāt, & ex cremore metretā ammiscēt, & simul agitant, & salis torrefacti adhuc calentis partē sufficientē superingerunt, quo facto vasi operculū obdunt, ipsumq; ad dies octo

20 relinquūt. Fit cōmentitiū ex non vino, hoc modo: Persica mala mollia, & torrefactū hordeū in vase mistim cōputrescere sinunt: expressus fisco succus, acorē concipit. Alii sine vino ita acetū confingunt. Fici veteres & torridū ordeum, & citriorū malorum interna caro crebrius subacta, cōturbataq; colis exprimuntur, vt in aceti vicem succus cedat. Alii marinā aquam, & gypsum coquūt, admistaq; aqua fluuiali percolant in aceti vsum. Alii ex ficibus, quas in arboribus commadefactas in aquā coniciunt cōputrescereq; sinunt, acetū efficiunt. Ficulneū acetum ita exactius docet Columella. Sunt quædā regiones, in quibus vini, ideoq; & aceti penuria est. Itaq; hoc eodē tempore ficus viridis quā maturissima legenda est, utiq; etiam si iam pluiæ inceserint, & propter imbrem in terrā decidit, quæ quum sublecta est, in dolium vel in amphoras conditur, & ibi sinitur fermentari: deinde quum exacuit, & remisit liquorem quicquid est aceti diligenter colatur, & in vasa bene olida diffunditur. Hoc primæ notæ acerrimi aceti vsum præbet, nec vnquam situm, aut mucorem contrahit, si non humido loco positum est. Sunt qui multitudini studentes, aquam ficis permiscant, & subinde maturissimas ficus recentes adiciant, & patiantur in eo intretabescere, donec satis acris aceti sapor fiat. Postea in iuncis fiscellis, vel sparteis saccis percolant, liquatumq; acetū infetuefaciunt, dum spumam & omnem spurcitiam eximant, tum torridi salis aliquid adiciunt, quæ res prohibet vermiculos, aliave innasce animalia. Acetum de pyris ita componit Palladius:

40 Pyra syluestria vel alperi generis matura in cumulo reseruantur per triduum.



Deinde mittuntur in vasculo cui fontanea, aut pluuiæ aqua miscetur, & opertum vas per triginta dies relinquitur, ac subinde quantum sublatum fuerit acetum ad usum, tantum redditur aquæ ad reparationem. Plinius, Vasa mellaria, aut fauos lauari aqua præcipiunt, & hac decocta fieri saluberrimum acetum.

*Quomodo citra uuam vinum fiat.* CAP. XXXII.

**S**ORTION: Myrti, & corni recens fructus molitus, & expressus vinum facit. Similiter vinum faciunt grana mali punici pura expressa, ablatiis his, quæ in medio granorum existunt. Quidam & à viridibus ficibus vinum faciunt, explentes ipsis dimidiam vasis partem, ac reliquam aqua pura superfusa complentes, assidueq; ex gustu experimetur sumunt: quum enim vinosus apparuerit sapor, excolato vtuntur. Fit etiam potus è frumeto & ordeo, quo maximè vtuntur barbari. Fit ex olyra & auena parata, fit ex panico & milio. ex Berytio. Palladius ex pyris vinum fieri dicit, si contusa, & sacco rarissimo condita ponderibus comprimantur, ac prælo. Hyeme durat, sed prima æstate acescit. Februarius mense, & Octobri, ex omnibus pomis vina conficit. Plinius Indos vinum ex palmis exprimere dicit. Carioræ maximè celebrantur & cibo pridè, sed & succo vberriam, ex quib. præcipua vina Orieti, iniqua capiti, vnde poma nomen.

*Quomodo vinum album fuscum facias, & vicissim nigrum album.* CAP. XXXIII.

**I**N album colorem nigrum mutari vinum asserit Cassianus ex Varrone, si salis sordidi drachmas octo in decem heminis vini nigri miscueris. Idem contingere dixit, si serum lactis vino infuderis. Si quis vitis albae sarmenta vsserit, cineremq; in vas indiderit, & commoto probè vino, ad dies quadraginta siuerit, vinum album erit. Contra verò album reddetur nigrum, cinere sarmentorum nigrorum in ipsum coniecto. Palladius in Octobri ex his. In album colorem vina fusca mutari asserunt, si ex faba lomentum factum vino quis adiiciat, vel ouorum trium lagenæ infundat alborem, diuq; commoueat, sequenti die candidum reperiri: quod si ex asra pisalometum adiciatur, eadem die posse mutari. Vitibus quoq; hanc esse naturam, vt alba vel nigra si redigantur in cinerem, vinoq; adiciantur, ei vnamquamq; formam sui coloris imponere, vt ex nigra fuscum, candidum verò reddatur ex alba, ea ratione scilicet, vt combusti sarmenti cineris modii vnus mensura mittatur in dolium, quod habebit amphoras decem, & triduo sic relictum post operietur, ac lutetur. Album vel (si ita visum fuerit) nigrum reperiri quadraginta diebus exactis.

*Quomodo vna in sua vite usq; ad ver permaneant.* CAP. XXXIV.

**S**ERVANTVR & vna in sua vite, & à vite collectæ. Asserit Berytius vnam in sparente seruari usq; ad veris initia, si loco vmbroso scrobè fodis altitudine binum cubitorum, & missò sabulone adminicula figis, quib. interques assidue sarmenta fructibus plena, & illæ sis vuis alligabis vt solū non contingat, & cooperies, vt imber eò penetrare nō possit. Itē Tarentino docere, vnas in vite si diu  
seruare



seruare volueris, vasculis clausas fictilibus, ab ima parte pertusis, diligenter à summo rectas suspēde: sic in longā seruantur ætatem. Sed id exactius docet Columella. Nihil est tamen certius, quàm vasa fictilia facere, quæ singulas vuas laxè recipiant. Ea debent quatuor ansas habere, quibus illigata viti dependeant, itemq; opercula eorum sic formari, vt media diuisa sint, vt quum suspensa vasa singulas vuas receperint, ex vtroq; latere appositi operculi duæ partes coeant, & contegant vuas: & hæc vasa, & opercula extrinsecus & intra diligenter picata esse debebunt. Deinde quum contexerunt vuas, luto paleato multo adoperiri, sed vuæ dependentes à matre sic in pultarios condi debebunt, ne  
 10 quæ partes vasa contingant. Tempus autem quo includi debent, id ferè est, quo adhuc siccitatibus, & sereno cœlo crassa, variaq; sunt acina. Plinius, Est duracina sine vllis vasis in vite seruabilis: tanta est contra frigora, æstus, tempestatesq; firmitas. Durant vuæ per hyemem pensili concameratæ nodo. Palladius, Vt vuam serues in vite vsq; ad veris initia: Circa ipsam vitem, quæ fructu plena est, loco vmbroso scrobem defodies altitudine trium pedum, latitudine duorum, & mittis sabulonem, & ibi calamos figis, in quibus retorques assidue sarmenta fructibus plena, & illæsis botryonibus alligabis, vt solum non contingant, & cooperies, vt imber eò penetrare non possit. Quæ huc  
 20 vsq; recitauimus maiorum adiumenta fuere, quæ difficilis operationis incommodaq; sunt. Nos nostro inuento vsque ad Maium, & Iunium menses adseruauimus integram, vt vnà vetus vua & recens, vno, eodemq; palmitè visceretur. Vitium, quæ prope domum consistunt, quum iam vindemiatur tempus recessit, sarmenta, flagella, flexilia per fenestram in contactum intorqueamus, ac domicili laquearibus, genistæ iuncis, qui loci vicem expleant, diligenter alligamus, vt immotæ permaneant, sed aptè vt fenestræ referari, & claudi possint: hoc modo frigoris tyrannidem, & sauitiam anteuertendo, ab aui-  
 bus custodiendo, ne eis depascantur, quum venti & gelicidia sauiant, fenestras claudito, tepido, & sereno cœlo eas aperito, idq; vsq; ad ver. Quum iam vitis noua germina & frondes ostendit, eam aperto cœlo crede, & tepidis so-  
 30 libus apricari finito, iam noua pullulante, vtramq; eodem palmitè habebis. Nobis etiam aliter licuit idem facere. Putationis tempore iam aduentante, eligito bina sarmenta in vite, quæ certam spem fructus pariundi spondeant, desecato cacumina vtriusque, duos vel tres oculos relinquendo, ne tamen à sua matre reseces, ea per cretacei vasculi pertusum fundum traducito, ac vbi paululum supra vasis ora extabunt, repleto vas terra. Et si certius ac citius quoad fieri poterit id agere concupieris, æstate vas aqua plenum supra id accommodato, vt per laneam linguam paulatim, & continuò aquam in vas instillet, sic radices vegetius iniicies, & induet se in frondes & fructus. A vindemiis sub vase sarmenta abscinde, & in contactam domum feras, loco sicco, & tempesta-  
 40 tibus tuto, videlicet cellis vinariis. Fenestras retibus obtegito, ne aues eas deuorent, hyeme serenis diebus apricari finito: vbi gelicidia horrent, in calidio-



ribus locis adseruato, & vsq; ad Augustum seruabis, vt simul vno palmite, & noua & vetus vua vigeat, colore, & vigore seruatis.

*De variis vuarum condituris.* C A P. XXXV.

**C**A T O amineas maiusculas, & minusculas, & apicias condit in ollis, ollas in vinaceis. Eadem in sapa, & musto rectè condi dicit. Quas suspendas duracinas, amineas maiores, & stantianas opportunissimas esse. Columella ita seruat. Vuas bumastos, duracinas, & purpureas quum desecueris à vite, continuo pediculos earum impicato dura pice: deinde labellum fictile nouum impleto paleis, quàm siccissimis cribratis, vt sine puluere sint, & ita vuas superponito, tum labello altero adoperito, & circumlito luto paleatq; atq; ita in tabu- 10  
lato siccissimo cōposita labra paleis siccis obruito. Omnis autē vua sine noxa seruari potest, si luna decrescente, & sereno cœlo post horam quartā, quū iam insolata est, nec roris quicquam habet, viti detrahatur, sed ignis in proximo decumano fiat, vt pix ferueat, in qua pediculi vuarum statim demittantur. In dolium benè picatū defruti amphoram coniicito, deinde transuersos fustes spisse arctato, ita vt defrutum non contingant, tum superponito fictiles nouas patinas, & in his sic vuam disponito, vt altera alteram non contingat, tū opercula patinis imposito & linito. Deinde alterum tabulatum & tertium, & quamdiu magnitudo patitur dolii, similiter instruito, & eadē ratione vuas componito, deinde picatum operculum dolii defruto largè linito, & impositū cinere ob- 20  
turato. Nonnulli adiecto defruto contenti sunt transuersas perticas arctare, & in his vuas ita suspendere, ne defrutum contingant, deinde operculū impositum oblinire. Quidam vuas in vmbra refrigerant, & dolia noua sine pice in sole siccant, furfures ordeaceos adiiciunt, & vuas ita superponunt, vt altera alteram non comprimat, tum generis eiusdem furfures infundunt, & alterum tabulatum vuarum eodem modo collocant, idq; faciunt vsq; dum dolium alternis furfuribus, & vuis compleant, mox opercula imposita linūt, & vuas siccissimo & frigidissimo tabulato reponunt. Quidam eadem ratione arida populnea, vel abiegna scrobe virides vuas custodiunt. Nonnulli sicco flore gypsi obruunt vuas, quas non nimium maturas vitibus detraxerunt. Alii fortici- 30  
bus si qua sunt vitiosa grana ex vuis amputant, atque horreo suspendunt, in quo triticum suppositum est. Sed hæc ratio rugosa facit acina, & tam dulcia, vt passa. Vel ex ea creta, ex qua fiunt amphoræ, lata vasa in modum patinarum fieri iubebant, eaque intrinsecus, & extrinsecus crassè picari, tum vuas picatis pediculis in prædictis patinis separatim cuiusque generis ita componi, ne vux inter se contingerent, posthæc opercula superponi, & oblini crasso gypso, tum pice sic picari ne quis humor transire possit. Tota deinde vasa in aqua fontana, vel cisternina, ponderibus impositis mergi, nec vllam partem earum pati extare: sic optimè seruatur. Sed quum est exempta, nisi eo die consumatur, acescit. Illud præcipiendum ne eodem loco mala 40  
&



& vix componantur, nec malorum odor ad eas possit peruenire: nam huius-  
 modi halitu acina corrumpuntur. Sed rationes, quas retulimus, non omnes o-  
 mnibus regionibus aptæ sunt, sed pro conditione locorū, & vuarum aliæ aliis  
 conueniunt. Quibusdā in locis sereno cœlo, quū iam sol rorem sustulit, quarta  
 vel quinta hora, Luna decrescēte, & sub terris existente, modicè maturæ le-  
 guntur, in cratibus separatim ponuntur, sub tectum referuntur, arida tollun-  
 tur acina, & quum paulū sub vmbra refrixerint, ternę aut quaternę in ollas de-  
 mittuntur, opercula pice obturantur, ne humorē transmittant, vinacea in do-  
 10 lio substernuntur; & deorsum versus spectantes ollæ cōponuntur distantes, vt  
 interculcari possint vinacea, quę vbi conspissata primū tabulatum fecerūt, alię  
 ollæ eodem modo componantur vsq; ad summum labrum, & superposito o-  
 perculo cinere doliū linitur. Didymus vuas desecari à vite ad hunc vsum prę-  
 cipit decrescēte Luna post horam quartam, cœlo sereno aut discussis à vento  
 roribus. Similiter deligi è locis siccioribus ante perfectam maturitatē, addito  
 vt Luna infra terrā sit, vuas cum malleolo sarmenti sui duro, demptis forcipe  
 corruptioribus acinis tabidis, & adhuc pubescentibus, sic ne vitium tabis pro-  
 ximi sentiant. Falcis acie citra violentiam secari, & illius pice igni resoluta sur-  
 culis seorsum, ita ne se contingere possint, pauimento substratis paleis, si fieri  
 possit, maximè lupinorum, collocari, siquidē & duriores, & sicciores eæ existi-  
 20 mātur, & mures infestos abigunt. Sin desint lupinorū paleę, fabagineę aut er-  
 uineę, aut reliquorū leguminum inuicē substituuntur. Ordeaceę in frumenta-  
 ceo genere præcellunt. Si desiderentur, fœnū quā siccissimū in minutas dis-  
 sectum particulas substernitur. Simili ratione frondosos palmites pauimento  
 spargere, vel suspendi conuenit. Alii vuas suprà paululum obruunt. Sunt qui  
 malunt in picatis capsis vuas in scobe, ramentisve siccis piceæ, abietis, popu-  
 li, vel milii farina recondere. Alii in marinam aquam fetuentem, aut si non  
 adsit, in muriam, permisto vino macerantes immergunt, & ita ordeaceis  
 paleis seruant. Quidam in cinere vitigineo, vel ficulneo lixiuio tingunt,  
 mox in sole siccant, tum inuolutas paleis stipant. Sunt qui in granariis  
 30 protinus suspendi iubeant, quibus frumentum vannis agitatur, quoniam  
 optimo sit operimento puluis insidens pensilibus: ita longissimo tempo-  
 re seruari volunt. Alia custodiendi ratio. Aquam ad tertias incoctam mox  
 sub dio refrigeratam in dolum picatum fundunt, postea maturas vuas, so-  
 lidos acinos habentes, detractis putribus & immaturis obruunt ita, vt su-  
 perueniat aqua, nec fluitent, gypsatoq; diligenter operculo, vas loco frigi-  
 do, solem diei non admittente, quo etiam nullus succendatur ignis, reponitur.  
 Vinosa reperietur aqua, fallendæ laborantium siti non inutilis. Pensiles quoq;  
 in tabulatis custodiantur. Alii mustum habentibus doliis, dum ne contingant  
 ipsum vix, suspendunt: quo genere tales remanent, quales à vite fuerint de-  
 40 ceptæ. In dolio quoque picato exclusa omni aura, gypsato diligenter oper-  
 culo, integræ, quæ nulla in parte senserunt offensam, appenduntur. Simili



modo litæ figulino luto, sic subactò, vt mellis referat crassitudinem, intinctæ pendeant, & ad vsum eluantur. Item porrulacæ succo illitæ penfiles diu custodiuntur. In solidum annum vuas seruabis, si ante vindemias paulo lectas aqua calida alumen continente demerferis, & protinus raptas sustuleris. Seruantur etiam in melle. Palladius hæc in vniuersum. Vuas quas seruare volumus, legamus illasas, neq; acerbitate rigidas, neq; maturitate defluentes, sed quibus est & granum luce penetrabili splendidum, & tactus cum molli iucunditate callosus. Si qua sunt corrupta vel vitiosa resecemus, nec patiamur interesse, quibus inexpugnabilis acerbitas contra blandimenta æstiu caloris induit. Tunc incisos botryonum tenaces, calida pice oportet ambiri, atque ita in loco sicco, frigido, & obscuro, sine luminis irruptione suspendi. 10

*Vua passa faciendaratio.* CAP. XXXVI.

**A**PATIENTIA nomen acinis datur passis. Ita facere docet Florentinus passam vuam. Melioris acini, dulcis, & lucidi pediculos vuarum in parente torqueri, & vt sponte inarescant pati, deinde sublatas in vmbra suspendi, constrictasq; substratis pampinis algore sicco frigentibus componi, & impleto vase operculari, statimq; loco sicco, quem nullus fumus infestet, recondi. Columella. Albæ, dulcissimi saporis, maximis acinis, nec spissis, Luna decrescente, sereno & sicco cælo discussis toribus leguntur, & paulisper sic, ne inter se pondere suo pressæ possent collidi, in sabulas porriguntur. Deinde in ahenò, vel olla fictili noua, lixiuium cineris sarmenti calefieri conuenit, quæ quum feruebit, exiguum olei quàm optimi adiici, atque permisceri. Deinde vuas pro magnitudine binas aut ternas inter se colligatas, in ahenum feruens demitti, & exiguum pati, dum decoloremur, nec rursus committendum, vt exeoquantur, nam quadam moderatione, temperamentoq; opus est. Exemplæ dein in crate, rarius quàm vt altera alteram contingat, disponuntur, & post tres horas vnaquæq; sic tamen ne eodem vestigio cohereant, conuertitur, ne in humorem, qui defluerit, vitietur: noctibus contegi debent vt à rore vel pluuia tutæ sint. Quum modicè tamen atuerint, in vasa noua, sine pice operculata, & gypsata recluduntur. Quidam vuam passam foliis ficulneis inuoluunt, & alliccant, alii foliis vitigineis, nonnulli plataninis semiuieras vuas contegunt, & ita in amphoras contegunt. Sunt qui culmos fabæ exurant, & ex eo quem cremauerint cinere lixiuium faciant, deinde in sextarios decem lixiuiæ salis tres cyathos, & olei cyathum adiiciant, tum adhibito igne calefaciant, & cætera eodem modo administrent. 30

*De vitis materie.* CAP. XXXVII.

**N**Ec de eius materie tacendum est. Theophrastus hæc de eius materie habet. Viris lenta materies, qua de causa scuta ex ea facere solent. Icta enim protinus plagam contrahit. Sed quæ minus fructificat, solidior est. Pli-  
nius.



nius. Iouis simulacrum in vrbe Populonia ex vna conspiciamus vite, tot ævis incorruptum. Item Massiliæ pateram: Metaponti templum Iunonis vitigineis columnis stetit. Etiamnum scalis tectum Ephesiæ Dianæ scanditur vite vna Cypria, vt ferunt, quoniam ibi ad præcipuam amplitudinem exeunt. Nec est ligno vlli æternior natura. Verùm ista ex syluestribus facta crediderim. De simulacro Dianæ Ephesiæ ambigitur. Cæteri ex ebено esse tradunt. Mutianus ter consul, ex his qui proximè viso eo scripsere, vitigineum, & nunquam mutatum, septies restituto templo.

## IOAN. BAPTISTAE

10

PORTÆ NEAPOLITANI

## VILLÆ

LIBER NONVS

SIVE

HORTVS CORONARIVS.

P R O O E M I V M.

20



30

RVSTO vix egredientis flores ex proximo coronario horto miris suis illecebris visum, olfactumque ceperunt odoris effluuiis, & inenarrabili colorum varietate. En hortum referamus, ingredimini hilares, licet spatari, & eius iucunditate frui. Nullibi enim maior, quàm ex aspectu, odore, & viribus nostri animi recreatio accedit: flores enim tam vario colorum ornatu lasciuens natura depinxit, vt nulla in re tam magno suæ fertilitatis gaudio eousque luisse videatur. Nec maius ornamentum ex vllis quàm uis artificiosè contextis topiariis, aliisve operibus, hortis accedit, quantum ex odoratis coronariis, sine quibus horti gratia, & amœnitate destituuntur. Eorum odore spiritus refouetur, torpens animus exhilaratur, collapsæ vires redintegrantur, & subinde somnus conciliatur. Omitto medices materiæ utilitatem, vt nulla pars corporis male affecta sit, quin ex floribus remedium adhiberi nequeat. At si quis hoc munus agricolis minimè conuenire dicat, nōne Cato in horto suburbano coronamentorum omne genus conferi debere præcipit? Et Plinius hortis coronamenta conuenire scribit, quibus apes depascantur, præ-



eipui quæstus, compendiiq; Decebat quippe Campanum hominem antho-  
logicò scribere, quum antiquitas Ægyptum terrarum omnium accommoda-  
tissimã vnguentis habuerit, & Campaniam rosarum copia celebrauerit. Sed  
quem seruaturi sumus ordinẽ, pronunciemus. In arbusto & vinea de vite dixi-  
mus, media inter herbas & arbores, utpote frutice, sed medii inter frutices &  
herbas suffrutices sunt: vocat autem Theophrastus coronarios flores suffruti-  
ces: id tertium est ex generibus, in quæ principio plantas digessimus. Hortus  
hic herbas coronarias, & flores cõtinebit, dicemusq; de corollis, quæ ex his ne-  
ctuntur. Nos de floribus primò, post de herbis. Sed flores vel odorati, & hi ver-  
ni, ut rosa, liliũ, leueoiũ, viola, narcissus: vel æstiu, ut iasmes, & flos caryophyl-  
lorũ odore, vel hybernũ, ut crocus. Vel inodori & verni, ut hyacinthus, chakra,  
gladiolus, helyochrysus, vel æstiu, ut cyanus, lychnes, & amarantus, vel autu-  
mnalis ut anemone, petilius, vel hybernũ ut cyclaminus, hedera, cilicia, spina,  
ægyptia. Herbe vel odorata, ut abrotonum, serpillum, amaracus, sisymbrium,  
heleniũ, trifolium, baccatis, libanotis, melissophyllon, conita, lauandula, vel  
inodora, ut hedera. Sed floralia ingrediamur, & primum coronas nectamus.

*De corollis, earum usu, & inuentoribus. C. A. P. I.*

**C**OROLLAS breuiter attingemus: esset enim frivolum amplam de iis su-  
scipere tractationem, quum ab Athenæo, & aliis satis amplè tractatum  
sit post de floribus, quæ digna videbũtur, memorabimus. Tenuioribus corol-  
lis utebantur antiqui, strophia appellantes, unde nata strophiosa. Quũ vel de  
floribus fierent sarta, à serendo seruiæ appellabantur: paulatimque & Romæ  
coronæ subrepsit appellatio, corollis inter initia propter gracilitatem nomi-  
natis, mox & corollariis. Hæc Plinius. Sunt qui coronas à choro dictas putent,  
licet aspiratione careat, siue quod honorent eos, quibus imponuntur. Aucto-  
rem & inuentorem coronæ lanumbiformem Græci prædicant, eãq; in Græ-  
cia factitatam à Stephano primum asserunt, ob id & nomen sortis datũ ut ste-  
phani vocarentur. Oleagineis coronis ministri triumphantium donabantur,  
quòd Minerva dea belli esset, & oleæ præflet. Obsidionalis corona è gramine  
erat viridi, ex eo loco decerpto in quo erant inclusi, dabatur Imperatori, qui  
liberauerat obsidione hostibus obseis, & magnæ authoritatis fuit. Ciuita-  
tiligna fuit, frondem habens perennem. Hanc dabant testem vitæ, salutisque  
pæceptæ ciui, à quo liberatus fuerat in prælio: è fronde quernatexebatur, quo-  
niam antiquissimus cibus ex quercu capi erat folius. Myrtea corona Papyri-  
us usus est, quòd Sardos in campis myrteis superasset. Quantis etiam myrtea e-  
rat, quæ gerebant Imperatores, qui urbem ouantes introitẽt, quum bella sine  
sangine cõfecta erant. Transiere deinde ad rosarias, eoq; luxuria processit, ut  
non esset gratia nisi mero folio. Laudatissima habebantur, quæ ex folio nardi  
necterentur. Mostamen antiquis inoleuit, ut post cenã circumferrentur con-  
uiujs, sed aut hedera, aut lauro, aut herbarum floribus versicolore commistu-  
struebantur: quæ ludicra, & puellares vocabant. Liber vini repletor, quòd me-  
dicamentum



Hicamentū suauissimum simul, & vehementissimum adinuenisset, fertur hederā suis viribus huic repugnātem, in honorem ac pretium adduxisse, eāq; coronari debacchantes edocuisse, quo minus vini noxam sentirent, hederā suo frigore temulenciam restringente. Iuglandē è coronamentis abdicarunt, quæ *καρύα* à capitis grauitate propter odoris virus dicitur. In cœnis quum merum caput occupat, arcemq; sensuum obsederit, hominē conturbat, cui mitis aura florum naribus hausta succurrit, caputq; ab ebrietate propugnaculi vice tutatur, quia si flores calida præditi sunt natura, laxant spiracula, quibus vinosus euadat vapor. Si frigidi vt rosæ violisq; coronæ struuntur, astringēti sua vi noxiōs halitus repellunt, & capitis grauitatem corrigunt. Ligustri, croci, & baccharis flores, odore somnos alliciunt, & ad placidam quietem potos perducunt: expirant enim lenem auram, ac blandum odoris effluuium, quo in temulentorū corporibus inē qualitates obortæ sensim dissipantur, & excoquantur, vt conciliata tranquillitate crapula retundatur. Sic flores bifariam coronamētis inseruntur, vel vt capitis grauitatē abigant, aut somnum placidum accersant. Verū quæ floribus concinnatæ, ceruici colloq; tanquam pensiles gestantur, Græcis *ὀμφυλῆς* appellantur, hinc odores naribus rapti, suo calore cerebrum feriunt. Cæterū coronarium, quæ sola varietate placent, duo genera: nam aliæ flore, aliæ folio constant. Florem dixerim genitās: namq; in iis decerpitur laureus, item rhododendrō. In vepribus nascitur cyclaminū, cuius flos colossinus in coronas admittitur. Folia smilacis, & hederæ se coronamentis dedere, coronarum obtinent principatum. In coronamenta folio venere cunilago, melissophyllon, & melilotō, quod fertulam Campanam vocant. Coronas ex hac antiquitus factitatas indicium est nomen fertulæ, quod occupauit: placet maximè foliis breuibus, & pinguiissimis. Folio coronat trifolium asphaltriō maiore folio, quo vtuntur coronarii, vtūtur hederæ foliis, corymbis, & flore purpureo, in iis color tantū delectat, odor abest. Helichrysi flore immortali aureo se plerosq; coronare Theophrastus scribit, vt gratiam inean, & vitæ gloriā concilient, & cætera quæ longi esset laboris describere. Aristoteles & Ariston Peripateticus, vterq; libro amatoriorū secundo scribit, ob dolorē & grauitatem capitis à vini potu molestam, vinculū quoduis tēporibus antiquos admouisse, quod eā ligaturā prodesse crederēt, posteros autē vt quidpiam ornatus adderent, tēporibus quod cōporationis oblectamentū est, coronas excogitasse, quod tempora, & frōtem vinciri ad vini noxam conducatur. Ad id Anacreon,

*Superciliis ex apio corollas superimposuimus,*

*Latumq; Baccho festum, & conuiuium celebranimus.*

At quæ odore caput feriunt, & quicquid grauare, aut opplere alioqui posset, reiecerunt, vt ex lauro & amaro. Sed hæc sufficiant, si quis plura volet, adeat Athenæum libro decimoquinto.

*De Flora dea, & floralia quomodo celebrarentur. CAP. II.*



**L**ACTANTIUS Firmianus refert Floram ex arte meretricia magnas opes sibi comparasse, & populum Romanum hæredem scripisse; certamque pecuniam reliquisse, ex cuius annuo scœnore suus natalis celebraretur, ludorum editione, quos floralia nuncupauerunt. Quod quum senatui nō satis decorum immò flagitiosum potius videretur, ab ipso nomine argumentum summi placuit, ut pudendæ rei dignitas quædam adderetur. Vnde deam esse finxerunt, quæ floribus præflet, eamq; oportere placari, ut fruges cum arboribus benè, prospereq; florent. Ovidius nobiliori fictione prosequutus est in Fastis, non ignobilem nympham dicit, Clorim vocitatam, à Zephyro vim passam, quam duxit, hæc à viro dotis loco id muneris accepit, ut supra flores potestari haberet. Floralia igitur in honorem Florę celebrabantur, ut arbores optimè efflorescerent, deflorescerentq;, & ad iustam fructus magnitudinem accederet. Instituta autem fuere vr̄bis anno sextodecimo ex Sibyllæ oraculis, & quarto Calendas Maii fiebant. Ovidius,

*Exit & in Maias festum florale Calendas.*

Hanc verò diem Varro determinat, sole partem quartamdecimam possidente. Ergo si in hoc quatrimum plenilunium inciderit, quæ florescunt lædi necesse est. Ob id Varro in limine statim de re rustica sui libri Robigum, & Floram adueneratur, quibus propitiis rubigo frumenta non corrumpat, & omnia tempestiuè floreat.

*Qui locus, quod cœlum & solum horto deputetur.* CAP. III.

**I**N suburbano horto Caro genus omne coronamentorū seri iussit. Florentinus locum intra domesticam habitationē, si id fieri commodè potest, deligere debet, aut si id nō detur, ex propinquo, ut non solum oculis spectantium intra ædes iucunditas hauriatur, sed etiā ambiens aër ex fragrantia plantarum infectus, salubrem habitationē, ac totam possessionem reddat. Ipsæ verò plantæ non inordinatæ, neq; mixtæ plantentur, tanquam sanè, quod aiunt, plantarum diuersitas decorem inducat, sed secundū genera separatim singulæ plantæ ponantur, ne minora à potentioribus superentur, aut etiam alimento priuentur. Nos areas interstinguere solemus, ut ex quadrangulis areis in rotundas, ex rotundis rursus in angulares, & ex iis in alias progressus detur, quæ neq; totæ rotundæ, neq; rectis lineis concludantur. Theophrastus libro de causis, de cœlo loquens floribus coronariis cōuenienti, ait. Quæ sic caneis tractibus, quibus placidior attidet aura, suauiora, odoratiora que profiliunt: quippe quum exhausta humoris parte quadam, calor melius suo fungitur munere, reliquias concoctui cedentes perficit. Siccitas enim non parum odori suffragatur, eo que spectant odorata, cuius rei fidem facit, quod æstuosis regionibus, meliora odorum genera proueniunt. In Ægypto flores, cæteraq; coronamenta omnium ferè deterrima gignuntur, quia cœlū caliginosum, & calidum habeatur, in quo nullus penè odor contrahi potest, quippe coquendi



abest facultas : aridis longè melius excoquitur. Quæ verò circa Cyrenam proueniunt, non nisi ratione siccitatis odorata consistunt, tum cetera, tum vel maximè rosa, & crocum. Ager enim tenuis, siccus, nec nimio feruore flagrans, cælo puro, sitienti quæ lustratus, odoribus creandis aptissimus iudicatur. Videtur & annus ad bonam olentiam referre, quum scilicet talis aut talis incesse- rit, non imbrum, squallorum quæ; tantum ratione, sed etiam quum tempus certum, & aque, & flatus, & in totum cæli commodè mutationes accessere. Quæ dilutis, & opacis tractibus degunt, in odora percipiuntur : etenim humor sese largius immiscens, odorem obtundit, & eius hebetat acrimoniam. Caterum genus syluestrium aridius cernitur, ieiunior donatum habitu, nec silens à flatu, sed magis, atque magis auræ patens, hinc feruentior natura. Et tandem de corona- riis loquens quibusdam : Quæ locis circumseptis, apricisque continentur, ut cœnantha, & viola nigra, & alia quædam assidue florere videntur. Locis enim huiusmodi pleraque exeunt, quæ alibi nasci nequeunt, & fructum eadem affe- runt, quum cetera generis eiusdem aliis locis afferre nequeant, & præflorant, & prægerminant prius, quàm reliqua. Varro apricis locis hortum locat, ubi se- rat violam, quia ea omnia sole nutricantur.

*De generatione, & cultu florum coronariorum. CAP. III.*

20 **C**OMMUNIS plantarum generatio ex semine est, nam quæ semen ferunt, è semine quoque nasci oportet. Ex semine exeunt viola, lous flos, iphyum, flammula, elium : nam & ipsa, & eorum radices ligno nimirum constant. Na- scuntur & auulsione, sed quod auellitur, radicis, aut stipitis aliquid habere o- portet. Abrotonum, sisymbrium, serpillum radices è germinibus suis quamprimum dimittunt, non secus ac hedera. Abrotonum lignosum est : verum spissi- rate, acoreque suo seruari aliquantulum temporis potest, nam hæc defixa quo- que erumpere valent. Communis coronariorum cultus rigatio, stercoratio, & sarcitio, alia propria generatim habentur, ut purgatio in coronariis pariter, at- que oleribus. Quippe serpillum obarescit, nisi purgetur, sisymbrium, & cæte- ra. Rosas non solum præcidunt, verum adurunt, desinunt enim florere, sylue- 30 scuntque pastus fecunditate, nisi ita tractentur. Intempestiui imbres pessimi, atque ex toto inopportuni, qui circa floris exortum accesserint, omnia nanque imbecillia redduntur, pereunt, deciduntque : partim rubigine, partim nimio hu- more : quæ resistere poterunt, deterius florent.

*De rosa. CAP. V.*

40 **Q**VONIAM rosa inter flores facile principatum obtinet, eiusque nimius in coronis est usus, cogit me, ut ab ea initium auspicemur. Achilles Ta- cius libro amorum Leucippes, & Clitophontis ait, Si floribus Iuppiter vellet Regem imponere, rosa quippe regnum inter flores obtineret, terræ est orna- tus, plantarum lumen, oculus florum, prati iubar, pulchritudo coruscans, amo- 40 tis igniculum, veneris conciliatrix. Anacreon Poeta Græcus :



*Rosa flos odorq; diuinus,  
Hominum rosa est voluptas,  
Decus illa gratiarum,  
Florente amoris hora.  
Rosa suauium Diones,  
Rosa opus laborq; vatium,  
Et amica planta Musis.  
Est grata colligenti,  
Licet ante spina pungat  
Mordacibus rubetis.  
Est grata eam fuenti  
Manu subinde molli,*

*Eadem decens coronis:  
Et expetita mensis,  
Solemniibusq; Bacchi.  
Rosis quid absq; fiat?  
Aurora nonne feritur  
Rosea manu decora?  
Roseisq; nonne nymphe  
Spectabiles lacertus?  
Rosicolor ipsa Cypris,  
Vocitata nonne doctis?  
Quid plura? nonne multis  
Medicina certa morbis? &c.*

Rosam antiqui Veneri dicarunt: nam ea considerata tum venustatis, tum amoris symbolum ostendit, quod omnium in se amores trahat, omniumq; sibi animos conciliet. Poeta:

*Ros unus, color unus, & unum mane, duorum,  
Syderis & floris est domina vna Venus.  
Forsan & unus odor: sed celsior ille per auras  
Diffiatur, spirat proximis iste magis.  
Communis Paphia dea syderis, & dea floris,  
Precipit unius muricis esse habitum.*

Philosophi ille veteres, qui rerum omnium originem altius perscrutati sunt, odorem, coloremq; illum à Veneris ipsius stella proficisci autumant, & Maro Venerem semper ore loqui roseo dixit. Fingunt Poeta Gratiarum esse tres, ex Libero patre progenitas, quarum in Elide, atq; in foro templum fuit, & illarum simulacrū, cuius vultus, manus, & pedes ex candido marmore fuerunt, vestimenta autem aurea. Harum vna sola rosam tenebat, media talum, tertia myrturam, hoc modo effigiatæ, quod rosa & myrtus Veneri dicatae sunt. Præterea ut quemadmodum rosa breui tempore durat, ocyus floret, ocyssimè marcescit, sic homines admoneantur fortunam & veneream voluptatem cito perire. Rubet etiam, pungiq; , sic & libido ipsa verecundiæ opprobrio erubescit, acutoque stimulatur aculeo. Philostratus Cupidini, non eius matri donauit, quem tota facie æmulari videtur. Primum enim paruo tempore permanet, & recens semper sit oportet temporis non sentiens senium; ita Cupido recens, atq; semper iuuenis, mollisq; est. Coma eius aurea est: nam & rosa aureum quid in flosculo habet. Pro spinis rosæ, iaculum fert, pro foliis alas, pro facibus fulgorem. Rosam multiplex comitatur fabula, non nisi candidam per initio fuisse, mox vulnerato Veneris pede, dum Adon diu operam latura præcipiti cursu per dumentatam rapitur, adrubuisse. Alii sanguine Cupidinis, ut Ausonius. Graci admirandam illam pulchritudinem, odorisque suauitatem à Venere contributam fingunt, quando deam Adonidis amore captam Mars deperibat, qui zelotypus, Adonidis



donidis morte initam consuetudinem solum iri sperans, Adonim interfecit. Venus resciscens gestum facinus, dum omni studio, diligentiaque propere fertur subsidiū allatura, in rosæ frutices irruens, pedem nullo munitum sandalio eius spinis transfigit, ita rosæ pristinum candorem, in profusi cruoris memoriam, in ruborem conuertit. Alii aliter fabulantur. Cupidinem quum in deorum conuiuio lasciuus salrationibus indulgeret, pateram nectaris plenam alæ concussu subuertisse, nectar inde fusum humi florem rosæ rubicundum reddidisse. Rosam prius albam mox ictō Veneris pede aspergine tinctam cecinere Poetæ.

*Ille quidem studiosa suum defendere Adonem,*

*Gradinus stricto quem petit ense ferox.*

*Affixit duris vestigia ceca rosetis,*

*Albaq; diuino picta crnore rosa est.*

Ambrosius dum de rosa philosophatur, spinam tanquam humanæ vitæ speculum ostentare dicit, quæ etsi summam suauitatem præ se ferat, finitimis curarum stimulis sæpè compungitur, vt amatescere videatur, vitæ elegantiæ vallata est, & sollicitudinibus quibusdam oblecta, vt tristitia semper adiuncta sit hilaritati. Quare non illepide Catullus Venerem, quæ iucunditatis, hilaritatisque auctrix præcipua habetur, spinosas ait in pectore curas ferere. Nec reticebimus rosam sordidissimum animal scarabeum, cui res plurimum est cum stercore, suo odore enecare, vt tradidit ex Aristotele Cassianus. Ob id Democritus apud Absyrtū, rosæ radicem, torquis modo, seu alio quouis modo portatā veneficii scorpionis esse amuletum dicit. Tarantius apud eundem ictos à serpente seruari contendit, qui rosæ radicem amuleti vice gestauerint. Palladius apes ex rosis mel colligere dixit, quod à Varrone excepit.

Rosam Græci ῥόδον vocāt, ὅτι ἐν ῥοῖα πλὴν ὁ ὀσμῆς ἀπὸ τοῦ ῥοῖου, quod ingentem odoris redundantiam distillet, authore in Symposiis Plutarcho, aut ῥοδὸν ὁ ῥοῖος ὀσμῶδης, quod odoris effluxum emittat. Timachides in cœnis scribit rosam ab Arcadibus vocari ῥοῖομαχον, id est odoratam. Latinis, & Italis rosa.

Duplicē rosæ florem Theophrastus esse inquit, quū in flore aliū florem insidentem habeat. Flos tantum odore iucundus, reliquæ partes ignauæ, quod excoctioni tribuendum est. Nouissima inter vernos flores erumpit, ita prima desinit, parum enim temporis durat eius preuentus. Semen fert sub flore. Serenis diebus lecta, odoratio. Recens longè redolet, sicca non nisi propius admota. Sicca suum odorem tuetur, dum deficiat penitus. Ratio quod indurata quodammodo proprii caloris inopia halitum efflare nequit, nam ad vsum quidem vnguentarii eas quoque aliquatenus siccare consueuerunt, vt odorem sinceriorem relinquunt. Vibana odoratio. Plinius ita describit. Nascitur spina verius quàm frutice. Germinat omnis primo inclusa granoso cortice, quo mox intumescente, & in virides alabastrōs fastigiato paulatim rubescens debescit, ac sese pandit, in calycis medio sui stans complexa luteos

Nomen

Descriptio



apices. Longè olet recens, sicca propius. Dubitat Aristoteles cur rosæ suauius olent, quibus vmbilicus asper, quàm quibus leuis. An quòd suauius olent, quæ modum consequuta sunt suæ naturæ? rosa autem spinosa natura est, suauissimè ideo olent, quod magis secundum naturam constiterint. Nos ita describimus. Flammeo colore rutilat rosa virginis genis, & malis concolor. Pars, quæ calycem ambit, aperta rosa in quinque pinnulas finditur, globulus in ima rosæ parte solidus, quem si aperueris lanugine quadam refertum reperies, foliis & floribus substratum, ceu basis totam rosam substinens. Capillamentum quod subtile est veluti filum, florum fulcrum est.

Genera.

Eius genera quamplurima. Nos primò in syluestrem partiemur, & satiuam. 10  
Syluestres, Theophrasto authore, ex toto asperiores tum virgis, tum foliis, odore, colore, & magnitudine superantur. Plinius *κυνόρῳδον* vocat, tale nomen adeptū, quòd canis rabidi moribus auxilio sit. Alterum genus est rubi, in quo rosa nascitur. Gignit pilulam castaneæ similem, præcipuo remedio calculosis. Insanabilis ad hosce annos fuit rabidi canis morbus, pauorem aquæ, potusque omnis afferens odinum. Nuper cuiusdam militantis in prætorio mater vidit in quiete, ut radicem sylvestris rosæ, quam cynorhodon vocant, blanditā sibi a spectu pridie in fruteto, mitteret filio bibendam. In Lacetania res gerebatur, Hispaniæ proxima parte, casu accidit, ut milite à morfu canis incipiente aquas expauescere, superueniret epistola orantis, ut pareret religioni, seruatusque est 20  
ex insperato, & postea quisquis auxilium tērauit. Aliàs apud authores vna medicina cynorhodi erat, spōgiolæ, quæ in mediis spinis eius nascitur, cinere cum melle allopecias capitis expleri. Nos has spongiolas in sylvestri rosa Baroli Apuliæ vidimus, magnitudine castaneæ, villosas, colore in fuluo rufescentes, nascuntur vere. Satini permulta genera, quæ odore, colore, & magnitudine, foliorum numero, asperitate, & læuitate differunt. Inter celeberrima rosarum genera Plinius Campanā præfert, quæ præcox est. Apud nos Cāpanos *rosa canina* vulgò dicta est, dicta canina quod horridis spinis armetur. Vniuerso nostro tractu præclara, præcoci partu cæteras antecellit, Aprili florens, quinque 30  
seu foliis, cuius pars ima scabra, suauissimi odoris indicium. Athenæus ex Theophrasto, suauius olere scribit, quibus folia quina, & scaber est cortex inferior. Proxima trachinia, minus rubens, inquit Plinius. Neapoli vulgus *rose maiatiche* dicit & *incarnate*, quod sint candore, & rubore cōfusæ, & Maio floreat, nobilitate dictis proximæ. Malū quod sub flore gerit magis rotundum, eique duodena folia. Milesia sera est, cuius ardentissimus colos, nec excedens duodena folia, ut ex Plinio habemus. Hanc affirmare ausim, quam *incarnata nera* vocamus, quæ in purpura sanguinea saturatè punicat, vltimo Maio efflorescens, duodenorum foliorum. Celebratur prænestina, quæ nouissimè deficit, Plinius dixit. Neapolitanis *damaścena* vocata, cæterarū odoratissima, germinatu postrema, continuò & diutius florer, & hyeme tepidioribus locis bi- 40  
fera, foliis circiter viginti, ex rubro candicantibus, ramorum proceritate cæ-

teras



cæteras superans: nam surgit crassis & lignosis virgis, vt ea sit, cui Athenæus chamæcerasum similem arborem dicat. Apud nos celeberrima. Elicitur ex ea odoratissima aqua vitreis organis. Huic dicit Theophrastus plura folia. Nunc ad albas transeamus. Theophrastus rosas esse ait numerosiore folio, quas centifolias dicant, quæ ex Philippis in Graecia à Pangeo monte vicino translaticæ sunt, numerosis foliis, sed paruis, nec odore, nec specie commendabiles. Athenæus fert eadē. Plinius in Cāpania Italiæ esse ait, & Cæpio Tiberii Cæsaris principatu negauit centifoliam in coronis addi, præterquā extremos veluti ad cardines, nec odore, nec specie probabilē. Apud nos Campanos copiosa est centifolia, & vulgò *rosa a cento frondi* dicimus: sed folia interiora parua sunt, ita enim oriuntur, vt alia intus, alia extra emicent, non iucundi odoris, nec amplæ magnitudinis. Herodotus in Macedonia in Mediæ hortis dicit rosas esse sexagenum foliorum. Alabandica vilior, albicātibus foliis ex Plinio. Est Alabanda regio Asiæ, ex qua aduectæ fuere. Nos *rosa bianca* vulgò vocamus, similes centifoliis odore, coloreq; , sed vicenis, circiter foliis. Vtuntur ex ea stillatitia aqua vitreis organis pro morbis oculorum: quia frigidior. Didymus. Ros ille, qui insidens rosis inuenitur hætere, munda pinna lectus, & specillo genarum palpebris instillatus, oculorum lippitudini medetur. Zoroaster anno toto oculos eius dolorem sentire negat, qui calyces ante, quàm in flores explicentur, leui tactu lustret, tribusq; earum alabastrulis visum detergat, relictis in pariete rosis. Inter has media magnitudine autumnalis, quam coroneolā vocant. Omnes sine odore præter coroneolā, Plinius dixit. Hanc Neapolitani ab insigni moschi odore, quem redolet, *rosa moscatella* dicunt, ita strenuè olet, vt caput feriat: non ambigo Plinii coroneolam esse, nā pauca & mediæ magnitudinis folia affert, ab æstate vsq; ad hyemem, & interdū tota hyeme floret. Odoratissima est, spinis & virgis syluestrem quodāmodo rosam æmulari videtur. Rosæ plurimæ sunt vna cohærentes. Inter cæteras arborefcit. Sunt præterea alui subductione insignes sine molestia. Nostri pharmacopœi persicas vocāt, nam in Camolanga Indiæ persicas vocant. Nescio cur Matthiolus hanc Plinii spineolam vocet, quum è minutissimis dicat. Nos hanc etiam centifoliam habemus, & spectabilissimi odoris, valentius mouet aluum, & diutius floret. Sunt & apud nos rosæ crocei coloris, eiusdem cum reliquis floris, sed planta odoris medicati, floris inodori.

Rosas cælo gaudere calido, & meridionalibus partibus exposito tradidit Colum. Plinius, vt libero sole fruantur, sic enim & germine, & floribus luxuriant. Carthagine Hispaniæ præcox tota hyeme visitur. Locis siccis quàm humidis odoratior, ob id quæ apud Cyrenam proueniunt, odoratiores sunt: ager enim ille tenuis, nec nimium feruidus, aëre puro, sitienti q; ambitus. Contrà quæ in Ægypto minus odoratæ, quia cælum roscidū, & caliginosum est. Præterea montibus longè deteriores emergunt. Ex Theophrasto. Nicander ex Athenæo,

*Operisq; principio precibus Themidem Oleniam venerare:*



*Alendas deinde rosas cœlestibus dimitte pluviiis,  
Semper illa augeſcent ſolis circumſpecta comantibus,  
Poſt Olenum ſecundas tenet Megara Niſæa: at nec Phæliæ,  
Nec Leucophrys improbanda, ſi cui placet earum ſuus.  
Prouenit & optimè roſa ad Magnetis aquas Maandri.*

Ætbius Saurius in libro de iis, quæ Sami pulchra & rara ſunt, præter cætera roſas biferas naſci ſcripſit. Polybius, Luſitania roſas non minus, quàm tri-  
meſtri ſpatio durare. In Peſto Calabrię oppido, aëre placido, benigno quæ, bis  
florēt roſæ. Virgilius,

— *biferiq; roſaria Peſti.*

Solum.

Seri nec pinguibus vult, nec argilloſis locis, nec riguis, contentatariis, pro-  
prie quæ ruderatum agrum amat, ex Plinio. In ſuburbano horto roſam Cato  
ſeri præcepit, vt poſſint illicò venundari, decerpta enim non patiunt moram,  
quin ſubito marceſcat.

Satio.

Naſci ex ſemine dixit Theophrastus, quod flor ſubditum ſuo in malo cne-  
teum, vel acanaceum lanugine quadam obductum gerit, vt primis ſeminibus  
proximum ſit. ſed tardè perficitur. Palladius, Semine ponuntur roſa. Semina  
autem roſarū non putemus medios floſculos eſſe aurei coloris, quos roſa fe-  
runt, ſed baccas nutriunt, quas in breuiſſimi pyri ſimilitudinem plenas ſemini-  
bus poſt vindemiam reddunt maturas, quarum tamē maturitas ex colore fu-  
ſco, & mollicie poterit æſtimari, quæ ſulco breuiſſimo, aut ſcrobibus ponen-  
da ſunt. Plinius, Proueniūt tardiſſimè ſemine, quod in ipſo cortice eſt, ſub ipſo  
flore opertum lanugine. Sed apud nos nemo eſt, qui roſam ſemine ſorat, quod  
raro & ſine colore naſcitur, vt ſylueſtris penè videatur. Seritur & conchiſo cau-  
le ex Theophrasto, vt gramen. Varro ita docet. Roſa conchiditur radicitus in  
virgulas palmares, & obruitur, hæc eadem poſtea transfertur facta viuira-  
dix. Plinius. Surculis quaternum digitorum longitudine, aut ampliore, poſt Ve-  
giliarum occaſum ſata, dein per Fauonium translata, pedibus interuallis, cre-  
bro quæ circumfoſſa. Didymus. Alii in palmares taleolas cum ſuis radicibus in  
ſubolis modum cubitali interuallo deponūt, & crebris irrigationibus, & ſter-  
core iuuant. Nicander ſecundo libro Georgicorum ſuorum,

*Præterea roſa ſpinis armata exciſa germina.*

*Terra tumulus inſige, ad duos palmos aperta via.*

Palladius ita exactius docet: Si indigus plantarum volueris ex paucis virgul-  
is habere copioſa, Februario meſe, ſed locis calidis & apricis, a quæ mariti-  
mis Nouembri, quaternorum digitorum ſurculos gemmantes cum geni-  
culis ſuis debetis excidere, & in modum propaginis ſternere, & ſtercore ac  
irrigationibus adiuuare. Vbi anni ætatem compleuerint, pedis ſpatio inter  
ſe transferre diſiunctos, atque ita ſolum, quod huic generi deputabis, implere.  
Seritur ex Plinio ocellis radicis, vt harundo. Alio item modo Didymus. Non  
nulli vt maiorem odoris fragrantiam adſciſcant, intertextas iis coronas ſimul



adobruunt. Theophrastus caule toto propagato nasci dixit. Palladius, Februario mense rosaria quæ rara sunt, possunt virgarum ducta propagine reparari. Quintilii plantant Februario mense, angescente Luna. Apud nos viuiradicibus seruntur. Post quinquennium à quo plantatæ fuerint pastino trium vel quatuor digitorum altitudine sub terra inciduntur, & viuiradices plantantur, calidis locis, Septembri, vel Octobri, frigidis Februario vel Martio, sed quæ Martio plantaueris rosas producent, nam quod alibi conceperint, hic patient. Sed loca quibus rosas excideris, iniectis stramentis comburantur: nam hoc modo radicum reliquæ luxuriosius repullulabunt, & densius germina sobolescent.

Rosæ vita quinquennium est, non recisæ, nec adustæ: relicta pluribus annis sylvestris euadit, & priorem gratiam exuit, eo enim modo vegeta iuuenescit, hos senesceris deterior transferendo pulchriorē rosam effundit, ex Theophrasto. Plinius: Omnis autem adustione, atq; recisione proficit, translatione quoq; ut vitis optimè ocysimeq; prouenit. Rosa & quinquenniū perfert, nec recisa, nec adusta, illo enim modo iuuenescit. Rosaria à Fauonio fossa oportet esse, iterumq; solstitio. Et id agendum, ut intra id tempus purgata, ac pura sint. Fodiuntur alius quàm fruges, leuius quàm vites. Columella, Omnibus annis fodiri ante Calen. Mart. & interputari oportet: hoc modo culta multis annis potennat. Palladius, Februario mense, si qua sunt antiqua rosaria, hoc tempore circumfodiuntur sarculis, vel dolabris, & ariditas vniuersa reciditur.

Florentinus est author florem rosæ inoculationis modo cortici mali infusum, eodem quo malus tempore, partus suos excludere. At si maturius producere velis in amygdalæ corticem, idem experieris. Rosæ inuicem inoculari possunt mense Martio, & Aprili, & in sylvestres optimè apprehendunt. Fieri posse iudicamus, ut in eodem surculo alba simul, & rubra rosa emergat, & in eodem flore alba simul & rubra folia nascantur, eo artificio, quo perlica fieri diximus, videlicet diuisis oculis, & simul coalitis. Moscatulam in sylvestrem sepibus nascentem inseruimus, & optimè concepit, nam florem illa in odorum producit: idq; videretur Plinius intellexisse: vnum genus inseritur pallidæ spinosæ longissimis virgis quinquefoliæ, quæ è Græcis altera est.

Didymus author est. Præcox emerget rosa, si pedali scrobe ab radice facta calida infundatur. Dēmocritus fruticem bis in die rigatum Ianuario mense rosas ædere promittit. Præterea si fistilibus, & cophinis plantaueris, eademque curæ eas digneris, quali cucumeres, & cucurbitas tractare solemus, idem efficies. Et si velis sine temporis intercapedine eis frui, singulis mensibus plantato, & stercoreato. Plinius: Qui præcocem faciunt, pedali circa radicem scrobe aquam calidam infundunt, germinare incipiente calyce. Theophrastus odoratiores prouenire ait, si capas vel alia iuxta eas plantaue-  
ris, cuius rationem libro de causis reddidit: nam aut quantum illis mali odoris adsit, detrahunt, quum vnumquodque resimili; alatur attrahitque



sibi cognatum, aut quod sua caliditate, edacitateq; locū exiccarnam siccis locis omnia odoratiora proueniunt. Odoratiores fieri rosas Didymus affirmat, quibus allia propè fuerint confita. Palladius, si rosam temporius habere uolueris, duobus palmis ab ea in gyrum fodies, & aqua calida bis rigabis in die. Nos rosam bruma hoc modo naëti sumus, vel non multo ante. Plātam ipsam dum in eo est, ut erumpat in flores, amoue loco, atq; in alium transfer, modò non incommodum: nam rosa calycem non aperit nisi prius cōfirmetur. Sunt & sexcenta ferè lenocinia rosarum ad colorem, odorem, magnitudinem, & foliorum numerum demutandum, quæ toto hoc opere in aliis docuimus.

*Cōditura.*

Rosas nondū perfectas seruare docet Palladius, si in canna viridi stāte fissas recludas, & fissurā coire patiaris, eoq; tēpore cannam recidas, quò rosas virides habere uolueris. Aliqui olla rudī conditas, ac benè munitas sub dio obruūt, ac ita reseruant. Quæ ex Didymo excepit. Quidam rosas conseruant recentes, calycibus in viridem plantam harundinem fissam immisiss, & harundine leniter per papyrus obligata, ut perspirare possit. Alii ut diu seruentur, ordeum dum in herba est, cum radicibus euulsū, in fictile non picatum demitti, rosamque priusquam dehiscens se pandat, operiri præcipiunt. Alii virentem ordeī segetem paulo loco sternunt, & rosas ipsas recondunt. Conseruabis etiam recentes & in vigore, si ipsas in amurcam immiseris, ita ut liquor eis supernatet.

*De lilio. CAP. VI.*

**L**ILIVM rosæ nobilitate proximum, eiusq; flos etiam in coronis venit, & ut coronā elegantius contexamus, purpureis aderunt lilia mista rosis. Perhibent Græci Iunonis lacte natum, respersa terra: nam Herculem, quē ex Alcmena Iuppiter sustulerat, quum vellet immortalitati donare, dormiētis Iunonis vberibus clām admouit, & quum lacte se repleisset, post suctum digressus, mamma copiosè profluxit: quod in cœlo à puero perfusum est, galaxiam, id est lacteam viam, quod humi respersum, florem liliū, lacteo colore nitentem creauit. Fuit antiquitus pulchritudinis symbolum: siue formam, siue colorem, aut odorem contemplare. Susas Persiæ urbē, vbi hyberna regia erat, ob amœnam & mitissimam cœli plagam, id nomen adeptam tradunt, quod Persarum lingua liliū significet. quāuis Stephanus à multitudine liliorum ita dictā scripserit. Nicander in alexipharmacis ait liliū Veneri inuisum, quòd de forma, & candore ausum sit secum certare: hinc mediis eius foliis scæda probra obiecit, id est deformem illic rudentis asini clauam, id est genitalia crescere fecit.

*Quoniam Dina colos hic placet, at in floris medio turpe*

*Armamentum rudentis asini prominet, quod membrum dicitur.*

Quærit Aristoteles cur aliqua germinare possint non terra cōtenta, sed abscessa, euulsa, vel condita, ut caules liliorum. An quod alimentum in se contineant? crescere autem vnumquodque potest, non eò, quòd in se continet alimentum, sed quòd decoctum iam & digestum illud pabulum est. Continent



gitur vel antehac alimentum, sed augeri tum duntaxat incipiunt, quum tempus ad id adest, cuius opera res illa effici potest.

Græcis *κείνον*, planta *κείνον* dicitur. Dioscorides *λείον* quasi *ῥουῶ* ob diuini Nomen. odoris effluuium. Nicâder Aphrodites charma, id est Veneris volupe. Vocant & Iunonis rosam, è cuius lacte effuso, vt diximus, lactea via in æthere, candido colore visenda est. Græci etiam *αἶθος αἶθων*, id est florum florem vocant. Alia nomina recenset Nicander.

*Lilia, quæ laria vocant alii Poeta:*

*Ambrosiam alii, multi Veneris oblectamentum.*

- 10 Idemq; scribit apud Coos è capite statuae Alexandri enatam fuisse, quam vocant ambrosiam, vt Carystus etiam suis commentariis memorat. Latini lilium vocant, alii regium florem, quod sua proceritate supra alios flores atollatur, & regia quadam celsitudine, & maiestate præstare videatur.

- Simplicililium caudice assurgere dixit Theophrastus, raro duplici, singulis caulibus lilia modo singula, modo plura sustinentibus, quod & rarius est. Parte postrema florescit. Radice copiosa, carnosâ, orbiculatâq; adhæret. Fructus detractus germinat, & lilium reddit, verum minus. Facit & lachryma cæcum quoddam confluuium, quod etiam serunt. Vere exit paulò post albam violam. Caules plantis abscissi seruare suum vitale principium possunt, ita vt 20 ad germen excitandum mouere se valeant. Adde: eius caules solstitiis florent, quod per mirum est. Plinius ita describit. Nulli florum excelitas maior, interdum cubitorum ternum, languida semper ceruice, & oneri suo impar. Flore emaculati candoris, foliis striatis, & ab angustis in latitudinem paulatim se laxantibus, effigie calathi, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo, & semine, stantibus in medio crocis. Ita odor, colorq; duplex, & alius calycis, alius staminis, differentia angusta. Est & flos non dissimilis illi in herba, quam conuoluolum vocant, nascens per fruteta, nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, ac veluti naturæ rudimentum, lilia facere condiscens. Surgit apud nos recto, cubitali, vel bicubitali caule. Foliis pallido virore nitentibus, 30 carnosiss, & secundum longitudinem striatis. In cuius summitate flores emicant intaminati candoris, blandi, & concupiti odoris, senis foliolis compacti, sed repandi. Fibræ, vel crocea stamina è medio educuntur, radice bulbacea, è quamplurimis nucleolis squamatim compacta.

Theophrastus liliorum genera variari dixit: nam & purpurea lilia non desinere audiuit. Plinius, Est & rubens lilium, quod Græci *crinon* vocant. Nos non nisi album vidimus. Genera.

Laudatissimum Plinius ait esse in Antiochia, & Laodicea Syriæ, mox in Calum. Phaselide. Quartum locum obtinere in Italia nascens.

Non nisi pingue, & stercoreatum solum mihi exposcere videtur.

- 40 Plinius omnibus modis feri dixit, sicut rosâ. Vnde & semine plantari affirmat. Vere post foliorum delapsum, vasculum oblongum remittit, pomi figu-

Solum.  
Satio.



ta, simile prorsus illi, quod in aristolochia, in quo quædam videntur semina. Id confirmare videtur Anatolius: nam dum lilia purpurea facere docet, ait, Cauliculos ipsorum accipies, supra fumum suspēdes, sic remittēt ex cauliculis bulbos quosdam, quos plantabis. Seritur & caule conciso, ut rosa, & ut gramen exit. Et ut rosa etiam propagatur ex Theophrasto. Fitque hoc modo. Prius quàm dehiscens se pandat, propagetur caulis in terram diligenter ne à bulbo diuellatur, & unusquisq; ex nodis bulbos remittet. Est & peculiaris generatio, quæ fit è lachryma sua, quum id quod defluxit, sole exaruerit, ut olusatrum, exco quodam confluio, ex Theophrasto. Cuius rationem reddit libro de causis. Lachryma enim caulibus planè respōdet. Nihil enim aliud, quàm quod illarum quoq; fœcundum principiū coactum esse oportet: nō enim sine calore, humoreq; generatio talis cōsequitur. Sed cur non omnes lachrymæ vim obtineant eandē, fit quod non omnes eandē vim sortiantur. Plinius ab eo: Seritur amplius & lachryma sua, ut hipposelinum. Seritur & bulbis suis: nihilq; est fœcundius vna radice quinquagenos sepe emittente bulbos. Varro inter Vergiliarum occasum & brumam illud serit. Palladius Februario ponit. Bulbi à matre subtracti, atq; in alios digesti ordines, noua liliata formabuntur.

*Cultus.*

Bulbos, qui positi sunt, Februario mense summa cum diligentia sarriemus, ne oculos circa radicem nascentes, & minores bulbos sauciemus. Ex Palladio.

*Art.*

Anatolius purpurea lilia facere docet. Deni, vel duodeni eorū scapi in fascēs, vel scopas vnā colligati, dum floruerint, fumo suspenduntur, qui radiculos, vel bulbos inibi iaciūt, quumq; pangendi tēpus appetiuerit, in fœce nigri vini macerātur, dum infecti colorē purpureum cōtraxerint, eoq; intinctu affatim saturētur: mox scrobiculis deponūtur, effusa largius fœce, & ita flores nascentur purpurei. Plinius ab eo. Inuenta est & in his ratio inferēdi, monstrificis hominum ingenijs. Colligantur namq; mense Iulio scapi arescentes, liliaq; suspendūtur in fumo, Dein nudantibus se nodulis in fœce nigri vini vel Græci, mense Martio macerantur, ut colorē percipiant, atq; ita in scrobiculis seruntur, hemibnis fœcis circūfufis. Sic fiunt purpurea lilia, mirumq; ita tingi aliquid, ut nascatur infectum. Rubra fieri lilia confirmat Florentinus, si inter cortices cinnabaris infundatur, hac tamen obseruatione, ne bulbi quouis modo vulnerentur. Et si quemuis alium colorem ebiberint, par erit enim referre, quo delibut fuerant lilia. Caterum ut vicissim, & variis temporibus flores pariant lilia, bulbi ita seruntur, ut aliqui duodecim digitorum altitudine obruantur, alii octo tantum, alii quatuor duntaxat profunditate mergantur, sic diuersis diebus dabunt lilia. Quod & in alijs floribus fieri pollicetur.

*Cōditura.*

Lilia, ut idem Anatolius testatum reliquit, totum annum viridia durabunt, si quum oclusa silent, nec dum parentia debiscunt decerpta, nouis fictilibus nō picatis, indito diligenter operculo, recondantur: sic clausa perpetuum annum vegeta manebunt. Sed ut intermedio tempore ad vsum promuntur, statim ad solem producta, quum senserint eius calorem, aperta panduntur.



*De leucoia. CAP. VII.*

**A**NTIQVVS post rosam, & lilium proximus bonos violis fuit, ideo post illa, de violis tractabimus. Nec solum coronamentis, sed etiam aluearia curantibus conueniunt. Putant Græci Io puellam, quam Iuppiter adamabat, quum eius esset compressu gruida, ne à Iunone probris incessetur, cum stuprum celare cuperet, ab eo in iuuentam mutaram fuisse. Terra Ioui gratulans, florem eiusdem nominis bouis pabulum fuisse dicitur, puellæ conditionem exprimens: nam viola ruffa, vt virgo pudore perfunditur, purpurea purpurascit, vt bos, cædida candicat, vt in sydus relata, atq; vt fecunda humi germinat.

30 Græcis *μυκθιον*, & si nomine ipso albam violam significat, pro lutea, carulea & purpurea, siue nigra semper capitur. Columella candida leucoia dixit. Latini violam, quasi vitulam, detricta t litera Græca imitatione appellasse videri possunt, ab Io vitula, siue vacca in illum florem conuersa, sic etiam vaccinia. Neapolitanis *fior di vacca* & *fior vaccino*, in quo etiam nomine prisca fabulæ, vt diximus, de Io in vaccam mutata relucet vestigia, quasi vaccinum florem dixeris. Ad hanc fabulam, & vulgare nomen Virgilianus Corydon (nam Virgilius vixit Neapoli, & mortuus est) allusit, vocando hos flores vaccinia:

*Alba sinistra cadunt, vaccinia nigra leguntur.*

Nam quum se negligi ab Alexi videret, (nam fuscus erat) facta amatoria, & rustica comparatione inter duos fibres I gustum album, & vaccinia nigra, ait, 20 I gustri flos etsi albus, pastoribus intactus, arescere incipiens, ac humore destitutus, caducus labitur, vnde vilissimus habetur. Contrà vaccinia, & si nigra, ad coronas texendas, decerpuntur, & in pretio habentur, vt coronarius flos fuerit. Subscribit nostro iudicio Seruius grammaticus, nam per vaccinia violas intellexit, quas purpurei coloris esse constat. Sed ne aliquis in eundem, in quo alii, errorem impingat, scito violarum duo esse genera, alia enim scissiles sunt, quas posterius describemus, alia autem leucoi: vtraq; enim eiusdem coloris. Idemq; expressit Virgilius,

*Sunt & viola nigra, & vaccinia nigra.*

30 Sed nescio cur Hermolaus, & eum sequutus Ruellius Serni opinionem distorqueant, quum ipse vaccinia purpureas violas esse dicat, ipsi verò iacintum dixerint, conanturque persuadere Romanorum vaccinium iacintum esse, auctore in spuris nominibus Dioscoride: quum ignorent de quo vaccinio loquatur Dioscorides, ac Plinii testimonium adferant de vaccinio loquentis, quod seratur ad aucupia, & ad vestes seruorum tingendas. Theocriti versus, quos alii adducunt, contra eos sunt,

*Viola nigra est, & inscriptus iacintus,*

*Sed tamen in coronis in primis leguntur.*

40 Quum Theocritus de poetico iacinto loquatur lilii forma, & inscriptio, vt mox videbimus, non de Dioscoridis iacinto loquitur de quo est contentio, & Virgilius Theocritum imitatus est, non interpretatus.



Descriptio.

Theophrastus ita depingit: Suffrutex leucoium est, lignosis nimirum radicibus surgens, flore odoris iucundi, reliquis partibus ignavis, cuius rationem in rosas reddidimus. Florum prima ver nunciantium, repentibus verò locis, ante exactam hyemem emicat. Vita ei longissima à trimatu est, ab eo enim tempore senectam sentiens degenerat, ac incanos senio fert flores. Cæterum debilius odor ut fugax, ita celeriter euanescit, ut leucoia, viridia enim à longe gratum odorem iaculantur, sicca non nisi propius admora. Ratio quia iam durata vernaculi caloris inopia, halitum efflare nequeunt. Apud nos cubitali prosilit altitudine, ramosa: folio molli, canescente, & potius à foliorum canitie, & cineritio colore leucoion dictum, quàm à floribus albis. Flore quadrifolio, semine foliaceo, quod tenuibus quidem, sed quincuncialibus siliquis continetur. Inter duotegmina siliquarum sepimentum aliud habet, separatq; hinc inde semina, ne se inuicem contingant. Post triennium senescit, & desciscit in flores, albis lineis interlitos, post dimidiatos albos, demum pallescentes.

Genera.

Theophrastus genus variatiliquido dixit. Dioscorides quatuor genera facit, sola florum diuersitate inter se differentia, quoniam candidum, luteum, purpureum & cæruleum fert florem. Purpureum & album genus simile est, frondibus & arbore, tamq; sunt visu grata, ut à mulieribus in fictilibus fenestris alantur, omniumq; manibus verno tempore versentur. Luteo verò folia oblongiora, numerosiora, & nigricantia, ut flos odorata. Plinius sylvestres & satiuas dixit. Earum plura genera, purpureæ, luteæ, albæ. Sed satiuas maximè authoritas luteis. Genera iis Tusculana, & quæ marina appellantur, folio aliquanto latiore, sed minus odorato. In totum verò sine odore, minutoq; folio calathiana, munus autumnii, cæteræ veris. Apud nos iutea maceris, & muris ædificiorum familiaris hæret, licet quoque hortis vbique acilic, habitu & statura humiliore, viridiore folio, flore minore, vehementi tam spirat odore, ut caput feriat. Cærulea quæ sit apud quemquam non constat. Plinius eius non meminit, neq; Paulus, neque Actius, qui Dioscoridem transcribunt, nisi pro cæruleo colorem intellexerit, maximè purpureum, ut ad cæruleum vergat, nam inter purpurea genus est gratissimum coloris ad cæruleum vergētis.

Cælum.

Cælum apricum desiderat, nam locis tenuibus & admodum sitientibus, ubi cælum vehementer feruet, minus odorata sentitur, quum nimium resiccerit. Montibus longè deteriores proueniunt Theophrasti authoritate. Varro aprico loco feri præcepit.

Solum.

Pingue querunt solum, & repastinatum, ex Columella.

Satio.

Semine feri Theophrastus dixit, quum eorum radices nimium lignosæ sint. Tempus ferendi ut plurimum, autumnus. Hæc enim primùm feri nimirum properant, cæterum vere etiam feruntur. Leucoion, ut Tarentinus scribit, purpureum, luteum, rubrum post idus Martias plantantur, & post calen. Martias albū, sulcis seritur, transfertur à Ianuario, vsque ad idus Februarias. Columella



mella ita ferere docet. Violam qui facturus est, terram stercoreatam, & repa-  
stinatam minimum alte pedem in puluinos redigat, atq; ita plantas horoti-  
nas scrobiculis pedibus factis ante cal. Mar. dispositas habeat. Semen autem  
violæ sicut olerum in areis duobus temporibus feritur, vere, vel autumno.  
Theophrastus è supernis etiam partibus nasci scripsit, vt sisymbrium, serpil-  
lus, aliæve suffrutices.

Columella coli eodem modo, quo & cætera olera, vt runcetur, vt sarria- *Cultus.*  
tur, vt interdum etiam rigeretur, scribit.

*De leucoio altero bulbaceo Theophrasti. CAP. VIII.*

10 **N**ON est, vt putat doctissimus Fuchsius diuersum Theophrasti leucoion  
à Dioscorideo, & à communi, quum Dioscorides lignosas radices ei  
tribuerit, & suffruticem dixerit, & Theophrastus bulbaceas: nam duplex est  
apud Theophrastum leucoii genus, & lignosas radices habens, & bulbaceas.  
Septimo enim libro inter bulbacea bulbacei leucoii meminit, & libro sexto  
florere post narcissum dixit bulbi florem, quem quidam coronariis inserunt.  
Habet enim hoc folia porro similia, tenuiora tamen & molliora, & radice  
bulbosa proueniens, pediculum etiam profert dodrantalem, tenuem, ac ferè  
incuruum, in quo candidus flos est, in medio croceus, purpureatum violarum  
odorem referens, quo decidente capitula nucis auellana quantitate erum-  
20 punt, in quibus semen sinapi haud dissimile continetur. Februario florere, A-  
prilis calce tabescit, ac semen capitulis ostendit. Emicat ubi cælum apricum,  
& ubi clementius fuerit, citius florere, prouenit enim syluosis & umbrosis lo-  
cis. Matthiolus inter narcissi species locat.

*De viola. CAP. IX.*

**V**IOLÆ nigra in coronis auidissimè expetuntur, vt ab Theophrasto ha-  
bemus, & cum imitato Athenæo, tū sua pulchritudine, tum suauis odo-  
re crapulam, & capitis grauitatem corollis impositis, olfactuque discutiunt.  
Sed Athenæus in comperationibus inutilem è violis coronam dicit, quod ve-  
hementi odore caput feriat, vt etiam ex lauro, & amaraco. At Athenæus non  
30 de hac sessili, aut nigra viola, sed de leucoio loquutus est, & præsertim luteo,  
quod vehementissimè olet. Icesius leucoia præstantissimum odorem iacere,  
& suauē, sed breuissimo tempore, & idem de viola nigra dicit, sed huius odorem  
esse, quàm illorū gratiorem. Vitruuius docens purpureū colorē facere, quum  
rectores volunt lilaticum imitari, violā aridam coniicientes, cum aqua con-  
feruescere faciunt ad ignē, deinde quum est temperatum cōiiciunt in linteum,  
& inde manibus exprimentes recipiunt in mortarium aquam ex violis colo-  
ratā, & ex ea eretriā infundentes, & eam terentes, efficiunt lilis attici colorem.

Theophrastus μέλανιον vocat à nigricante purpuræ colore. Nicander in Ge-  
orgicis τὸν dictam Græcis putat, quod quædam Nymphe Ionæ Ioui primum  
40 muneri dederint. Versus sunt:

*Nomen.*



*Tonidas nympha puram ac renidentem corollam Ioni  
Texere, quum cuperent, in Pise hortis,  
Et terra flores peperit: tum autem Ion cum canibus venatus,  
Suorum membrorum sordes abluebat in Alpheo,  
Ad vesperam cum Iaonibus nymphis dormiturus.*

Plinius solas Græco nomine à cæteris discerni dicit, appellatas *ia*, vt ab his ianthina vestis. Columella sarranas violas vocat, vnde sarrana purpura. Latini violas dicunt, vulgus quia ramis caret, sessiles, siue loripedes vocat. Itali *virole*.

**Descriptio.** Theophrastus violas ita describit. Humilis est, latiore folio, statim ab radice multa exeunte, sine tamis, perpetuo virens. Flos eius duplex: nam in flore alterum florem medium insidentem gerit. Floret post vitifloram ante iacinthum. Odorem longinque halat, propius hebescit, cuius rationem reddit libro de causis, quod ad remotiorem locum merus odor, sincerusque defertur: manant enim à cæteris partibus herba nonnulla, quæ permeare longius nequeunt, quod terrena, crassiorque, constent natura. Vetustate flores fiunt inolidi. Ratio est, quum debilius odor fugax sit, ita celerrime evanescit, ac vernaculi caloris inopia halitum efflare nequeunt. Flos olet, planta minimè. Aristoteles in problematis quærit, cur odores aliquorum florum, & suffimentorum è proximo minus suaves spirant. An quod portio terrena vnà cum odore se defert, quæ vt in proximo mista vim hebetat, sic in longinquo purior defertur? Hinc etiam flores contusi suum odorem amittunt. Nicander humiliacenes vocat.

*Humiliacenes viola,*

*Quas colligebar atra Proserpina.*

Dioscorides, Folio minore, tenuiore, nigriorique, quam hederæ. Stylus à radice medius profilit, & in eo flosculus, suauiter olens, purpureus. Flore hipericæ. Plinius. Floret primò viola alba, postea quæ appellatur purpurea. Ex his verò quæ sponte apricis, & macris locis proueniunt, purpureæ, latiore folio, statim ab radice carnosæ exeunt. Sed Plinius perperam ab radice carnosæ Theophrastum interpretatus est, nam de foliis non de radice protulit. Addimus nos. Semen minutum in folliculis, vasculisque rotundis, extrema ferè æstate producens.

**Geneta.** Syluestres specie, nec aliam generum differentiam nouit Theophrastus, immo quò syluestriores, eò odore præstantiores: nam quum odor ex humiditate, & siccitate exoritur, quumque viola non multum alimenti desideret, quum satis ex se habeat, his locis moderatur: quomobrem genus satium suæ alimonie copiam excoquere nequit, & hinc fit vt cinerem alii congerant, alii respergant. Vidimus ex his luteas, pallidasque.

*Solum.  
Colum.*

Opacis & asperis Dioscorides nasci dixit. Odoratissimæ quæ apud Cyrenem nascuntur, Theophrastus dixit, & prouide illic vnguentum suauissimum.



num faciunt. Montibus longè deteriores exeunt Athenæus ab eo. Præstantissima odore Cyrenis, quamobrem suauissimum illi vnguentum, & eximius odor.

Tarentinus post idus Martias, & calendas Marias plantari iubet. Nascitur vitis modo è supernis, quasi è puppidicas, non prora: ex Theophrasto. Satis.

Quæ locis apricis, & circumseptis satæ sunt, assiduè ferunt, & si certo genere colatur, perpetuo viret, & toto anno ferre spondet. Theophrastus. Adiciamus nos: si fictilibus vasculis colatur, hyemes, æstusque vitabimus, serenis diebus hyeme soli ostendendo, æstu umbra, & aquationibus adiuvando, quantum fieri possit. Varro in fundo violaria facere non esse utile dixit, ideo quod necesse est à terra ad ea obruenda pulvinos fieri, quos irrigationes, & pluitæ, & tempestates abluunt, & agrum faciunt minorem. Tradit idem Theophrastus violas iuxta capæ, vel allium satas fragrantiores fieri, curas rationem reddidit in rosis. Plutarchus ubi ea recitat commodæ, & utilitates, quas ex inimicis consequi possumus, dicit nos fieri vigilantiores ad vitia declinanda, & ardentiores ad capeflendam virtutem & illustriores, atque id violas capis insitas optime hieroglyphico demonstrare posse. Cultus.

### De viola flammea. C A P. X.

**M**EMINERIT & alterius violæ coronariæ, flammeæ dictæ, Theophrastus flores namq; tricolori elegantia variegatos profert, ut venustas eorum oculos longe alliciat, blandiaturque.

Theophrasto φλόξ, & φλόγιον dicitur, Theodorus flammeam vertit. Plinio quoque phlox dicitur. Italis *viole di tre colori*. Aliqui iaceam vocant. Nomen.  
Theophrastus vere nonnunquam cum viola alba, vel post lilium exire dixit, sylvestris duntaxat, nam cæteris omnibus, quibus coronarii videntur, longè præcurrit. Plurimum durat, sine odore. Plinius, Colore tantum placet luteis flos, odor abest, sicut & illi, qui Græcè phlox vocatur. Florum prima viola alba, post purpurea, postea flammea, quæ phlox vocatur. Nos hanc violam putamus esse, quæ in flore triplicem colorem ostendit, candidum, luteum, & cæruleum, videturq; non potuisse decentiori vocabulo à Theophrasto nominari, quàm flammea, quum in lucernæ siue lignorum flamma, terni eiusmodi colores conspiciantur, cæruleus in imo, luteus in medio, candidus vel rufus in cacumine, ut & in iride cælesti. Sunt ei folia oblōga, modicè per ambitum serrata, caulis angulosus, genicularis, flores longiusculis pediculis pendentes, triplici colore donati, radiculis fibrosis, plurimum florens durat. Descriptio.  
Theophrasto sylvestris tantum, ex Plinio. Apud nos duo visuntur genera: alterum maius, alterum minus, in cuius flore bini conspiciuntur colores, cæruleus, & candidus, aut luteus, & candidus. Genera.

Seritur semine ex Theophrasto: & colitur, ut cætera quæ diximus. Satis.



**A**NTÈ QVAM è violis discedamus, de iasme dicemus, et si odoris & similitudinis nonnihil nancisci viderur, nomen tamen odoratam violam retonat, & si veteribus frutex hic vtarbitor fuerit incognitus, volumus tamen in coronario hoc nostro horto eleganter vireat, & latè loca suo suavissimo odore repleat. Frutex hic harundineos parietes, hortorumque testudines, & concameratos sinus topiario opere conuegit: hic apibus gratissimum fert florem, quum ad eum avidissime aduolent apum examina: hic vnguentariis sua odoris iucunditate maximè est expetitus & oleo conficiendo, & odore chirothecis conciliando.

Nomen.

Quamquam Græcis indictum existimerur, Græcam tamen eius nomen videtur originem subolere: iasmes, quasi odoratam violam dicas. Sunt qui dicant iosmenon, apiariam, quod eius flos apibus gratissimus existat. Mauritaniam zambac eorum lingua dicunt, & ieleminum. Neapolitani has voces imitantes *gelsomina* vocant.

Descriptio.

Frutex attollitur sambuci caudice, sed procero, flagellis sequaci lentitria flexibilibus, foliis septem ex vno pediculo prodeuntibus, in viridi nigricantibus, oblongis, in mucronem sed languidum illico properantibus, lentisci magnitudine rosacei, sed angustioribus, floribus in caulium summitate racematim prodeuntibus, candidis, quaternis, quinis, vel senis foliolis constantibus, præcipue suauitatis, Maio, & Iunio florentibus.

Genera.

Duo primum iasines fastigia, sylvestre & satium. Sylvestre tria etiam genera continet, colore differentia, alba, lutea, & carulea: alba passim conspicua, lutea habemus, sed inodora, & dissimili frutice nascentia, carulea videre non contigit, etsi Babylonico agro, & Ægyptio, & in oriente vulgaria esse dicant. Satium florem longè maiorem habet & diuiniore odoris, Augusto, Septembri, & interdum tota hyeme placida florescens.

Calum.

Calidos, & amœnos tractus amat.

Solum.

Solum pingue, & humidum, proinde æstate rigationibus, hyeme siccitate foueri debet.

Satio.

Semine non nascitur: nam non perficit, sed suis plantis seritur: nam secundissimè sobolescit. Seritur & propagine, nam præ longis suis caulibus sustinere non valet, nec vt vitis clauiculas, aut hedera radiculas habet, quibus alteri hæreat, vel amplexetur, vnde caducus prorepit, & vbi terram attingit, ibi rubi more radicatur. Vel prosternitur planta more vitis, & post annum, vbi radices iniecerit, transplantatur. Serendi tempora vere, & autumnò. Sylvestre seritur suis flagellis vel taleolis, melius tamen si in calce aliquid veteris inhaerit.

Infula.

Satium in sylvestre inseritur fisso ligno, mense Martio, & optimè apprehendit. Nos Iulio, & Iunio inoculamus, in eodem anno comprehendit, & flores



florēs fert. Sunt qui in vitabulā inſeri dicant. Nobis non ſucceſſit. Luteum dicunt procreatum ex inſitu geniftæ, à nobis multifariam probatum eſt, & luſu experientia.

De flore cariophyllorum odoris. CAP. XII.

**N** V n c de eo flore noſter erit ſermo, qui ab inſigni cariophyllorum odore à noſtris cariophylli dicuntur: quū illuſ veterum nemo, quod ſciam, meminert: etſi ſylueſtres in montibus & ſyluis latè floreſcant, vnde dubitatur utrū illis fuerit incognitus. Nos inter coronatioſ flores repoſuimus, quū totis pulchritudine, amplitudine, & varietate inferiores minimè videri poſſint, immò cum eis de principatu uſque ad victoriam certent. Roſa ad marceſcentia concitè properat, longiſſima enim decerptæ dieſ mora, venerem, deſcenditque facilè deperdens, huic diuturnior mora, ſupra triduum vita, vigorque durat, aliquibus præterea magnitudo tanta ineſt, ut orbis utramque manū compleat. Superat & colorum varietate. Sunt albi, rubore miſti, nudam carnem referentes, *incarnati* dicuntur. Sunt vermiculati, qui candidi ſanguineis venis diſtinguantur, ruſſi, vinei, dilutius purpureſcentes, aut intenſiore virore nitentes, ſunt & punctorum purpureorum aſpergine verſicolores. Sunt quibus foliorum luxuriam calyces capere nequeant, at à latere rumpantur. Et eūdem cæteris floribus menſtrua, vel ſeſqui menſtrua ſit duratio, ii vernas, æſtiuas, autumnales & hybernas coronas replent, nec niſi ſeſqui menſe ſilent. Et ſi noſtra aras coronarum uſum aboleuit, nunc manibus omnium ſerè iuuenum, & magnatum continuò geſtantur, neque viridaria, vel in fenestris edium hortuli penſiles, vel fictilia vaſa viſuntur, quæ hiſ non ſcateant.

Recentiores ab inſigni, & ſuaui cariophyllorum odore, quem halant, cariophyllos dicunt, Fuchſius veronicam alteram Plinii vocat, alii cantabricam. Caulibus aſſurgit ſeſquipedalibus, teretibus, geniculatis, foliis ex ſingulis geniculis binis, porraceis, oblongis, anguſtis, incuruis, & per extremum mucronatis, colore caſiſ, floribus omnium ſpecioſiſſimis, cariophyllorum odoratu, ſed longè odoratiſſimo, calathis teretibus, longiuſculis, orbiculo ſuperiore denticulatis, à quo quina, ſenave folia prodeunt, lente quidem ſimbriata, & interdum vicena: geminis utrinque emicantibus ſtamineis apicibus, radice promiſſa, ſimplici & geniculata, ſemine in calathis minimo.

Species primū dux, ſatiua vna, altera voluntaria & fera. Hæc maceris familiaris, vel petreis montioſis, ſponte natura creſcit, cuius ſpecies dux colore diſcernuntur, candidiſ & purpureiſ floribus, paruiſ, oblongiſ, per ambitū magis diſſectiſ, inodoriſ, in calyciſ medio ſui complexa cæruleoſ apiceſ, nec à ſatiua niſi ſeritate diſſidens. Vidi Neapoli, & vaſculiſ colui, quiniſ foliolis, adeò diſſectiſ, ut capillacea viderentur: in foliorum umbilico varietas iſcundiſſima colorum conſpicua, ex auro, cæruleo, albo, & purpureſcente, ut pauonum pectora, & cauda colorata. Cauliſ luncæuſ, folia, & genicula, ut ſylueſtrem habi-

Nomen.

Descriptio.

Genera.



tum referret. Modici, sed suavis odoris. Satiua licet à priore oriunda, cultura diligentia latius assurgit, colorum varietate diuerlificatur. Flos enim aliter cocco rutilat, alius saturatus nitet purpura, alius emaculato blanditur colore, alius versicolori variegatur mistura. Est & in foliis differentia, nam alii constant leuiter fimbriatis, alii profundioribus incisuris crenantur, alii paucioribus, alii numerosa foliorum serie stipantur, vt quum fuerint prorsus explicata radiantem orbem concinnent. Sunt & trifero prouentu, vt qui flores continuo gerant. Præterea quorundam flos mirabili cultura ratione, descescente alabaistro, in ipso staminum loco alterum alabastrum ostendit, pendentem se paulo post in florem, cauliculo priore contescente. Apulia Baroli videtur, & locis calidis.

*Celum.* Cælo gaudet aprico, & sole illustrari, vnde etsi locis à frigore tutis seruetur, hyeme tamen si frigida, continuè profert flores.

*Solum.* Et solum pingue, vel fimo saturatum, & humidis, vel continuis rigationibus adiutum amat.

*Satio.* Semine seritur. Calidissimis locis, vt in Apulia semen perficit exiguum, nigrum, oblongis in vasculis clausum. Sed ad agrestem naturam redit, & mirabiles diuersitates efficit. Si seras rubrum, album producit, & vermiculatum, vel eodem in palmitate album, rubrum, & mistum florem. Sed frequentius auulsione seritur. Mulieres enim (muliebre est opus) ineunte autumnò vel vere, sobolem à radice copiosam, in patulis fictilibus, vel turbinibus cadorum in terram pingui latamine saturatam pangunt, & quum hyemis gelicidia incresecunt, recondunt sub tecta, quum sol illuxerit, vel cælum serenat, reuocant in apertum, & illuc sinunt apricari. Si pluuia incesserit, cœlestem pluuiam haurire sinunt, vnde cellis vinariis & fruticare, & flores interdum parere potest. Qui in arceis pangunt, per hyemis si igora latamine muniunt, quo ab insuria gelantis cœli seruari possint.

*Cultus.* Maximis artibus aqua saturari, frigoribus verò fimo oportet. Sæpius diuellere, & plantare: nam si diutius steterit, vt de violis leucois dixit Theophrastus, degenerat, & syluester euadit, continuò flores minores profert, minus odoratos, & ex rubro, inter liros albis venis, demum extoto albescentes.

*Ars.* Refert Matthiolus seminibus diuersorum florum simul constrictis effici posse, vt versicolores nascantur, sed id sine doctrina, & experientia scripsit, fieri enim non posse demonstrauimus. Facilius id fieri potest, radicibus dimidiatis, & sub terra propagatis, donec vniantur. Et hoc modo factum est, vt anno vno florem candidum, altero purpureum, tertio colorum varietate promiscuum, & quod mirabilius videtur, ramulus idem niueum, rufum, & vermiculatum proferat florem. Olitores factis stylo foraminibus in radicibus Indicos cariophyllos adegisse creduntur, quo illorum odorem flores alliciant, & naribus repræsentent, vt ex syluestri herba, & flore minus odore nouitaris studiosi odoratum florem tali lenocinio mentirentur. Vt hyeme continuò



flores promat, & stare germina decutiunt, dum calyculos ostendunt, sic enim noua promendo, seram maturitatem vsque ad hyemem retardant.

*De narcisso. CAP XIII.*

**N**ARCISVS fert florem pulchrum, & odoratum, quem dat coronis, puellis maximè expetitur, quo se coronent. Narcissi fabulam talem reperies in Græcorum monumentis. Fuit & ipse Cephei amnis, & Liriope nymphæ filius, sui corporis forma excellenti à multis nymphis fuit adamatus: in aquis propriam imaginem conspiciens, ac sui amore irretitus, quum vmbra suam nesciret à se distinguere, eam amplexando periit, & contabuit, & in florem sui nominis conuersus est. Hoc inuolucro innuentes Poetæ adolescentem in tenui corporis fluxu vmbra propriam inspexisse, id est corporis vitam, quæ animæ idolum est, eam quum is perinde ac veram, puramque amplexari arctius festinasset, id est quum vitæ corpore totus inhaesisset, præfocatus interiit, quum animalem per inscitiam amisisset. Theocritus Europam narcissos carpentem cecinit. Proserpina etiam dum narcissos legeret, capitur à Plutone. Coarguit hanc fabulam Pamphilus Poeta vetustissimus, quum Proserpinam multis annis ante, quàm Narcissus esset, à Plutone raptam dicat. Palladius narcissum apibus gratum dixit.

Theophrastus *νάρκισσον*, & *λελειον* vocat: vt ipsemet testatur. Narcissum alii *Nomez* num vocant. Quod etiam Iulius Pollux annotauit: Et Homerum Iirii appellatione complecti omne genus florum dixit. Plutarchus in Sympotiacis ita dicitur censet, quod nervos hebetet, membrisque torporem sensus sopiens afferat: odore enim est tam acuto, vt sæpius odoratus, caput tenter ac feriat. Plinius à narce dictum putat, caput grauate, non à fabuloso puero illo. Athenæus ait, Theophrastus de plantarum historia dicit, narcissum etiam dici leirium: dein de progressus, tanquam inter se discrepent, vtrumque seorsim nominat. Eumachus Corcyraeus in Rhizotomico, & acacallidem, & crotalon vocari narcissum, tradit. Et Sophocles magnum deorum terrestrium coronamentum dicit, quod scilicet defuncti, & morte torpidi, torpido flore meritò coronentur. Apuleius *αὐτογενή* vocat, id est à se ipso genitum, quum sese ipse propaget, & ferat suo semine. Latini narcissum vocant. Itali *narcisso*.

Plura sunt narcissi genera. Multa Theophrastus, multa Dioscorides, & *Genera* multo plura nostra obseruauit ætas. Ordine recensebimus. Ex Theophrasti descriptione. Narcisso folium angustū, frequēs, & pingue, caulem tantū floris fortitur, vt crocum. Mirum quod caulis, & cum eo flos erumpit antequam folium. Ter floreando, tria fationum tempora demonstrat, primò primam, secundo mediam, tertio nouissimam. Quum senuerit, foliorum exortum incipiat, fructumque inconspicuum parit, quia caulis cum suo flore emoritur, quod non antequam reforescat cernitur. Germinat post scillam, folium large emittens. Radix neque parua, neque magna, bulbo assimilis, nisi quod non est squamata. Vere post lencoion, & phloga floret. Alterum ita describit.



Narcissus folium albus habet, terra proximum gerit, sed latius ut lilium, caulem sine folio herbaceum, in cacumine florem ferentem, in membrana, seu vasculo inclusum, ampliusculum, nigricantē, oblongum, qui decidens sponte germinat, præsertim defixus in terram manu. Seritur & radice ampla, carnosa, rotundaq; . Serotinus admodum, post Arcturum, & circa æquinoctium florens. Alibi habet. Narcisso folium angustum, frequens, & pingue. Huius serò florentis meminit Virgilius,

— *Nec fera comantem*

*Narcissum, aut flexi tacuissim vimen acanthi.*

Dioscorides tria genera descripsit, duo calycis colore differentia. Vni enim intus croceo, alteri purpureo. Folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora, caulis vacuus, & sine foliis, supra dodrantem attollicur, intus croceus, in quibusdam purpureus. Radix intus alba, rotunda, bulbosa, semen velut in tunica, nigrum, longum. Cæteri porrum imitantur, atq; herbaceum virus olent. Purpurei narcissi meminit quoq; Virgilius, lutei Ovidius. Virgilius,

*Pro molli viola, pro purpureo narcisso.*

Ovidius,

*Nusquam corpus erat, croceum pro corpore florem*

*Inueniunt, foliis medium cingentibus albis.*

Plinius à Theophrasto. In coronamentorum genere narcissus: nam ter floret, primoq; flore primam arationem ostendit, medio secundam, tertio nouissimam. In Italia floret post rosam. Narcissi alterum genus flore candido, calyce purpureo. Differentia à liliis hæc est, quòd narcissis folia in radice sunt. Tertio generi cætera eadem, calyx herbaceus. Omnes serotini: post arcturum enim florent, ac per æquinoctium autumnii. Croceus narcissus apud nos floret, adeò flagrantissime semini odore, ut sæpius odoratus caput feriat & tenet. Sed hic primo vere floret, non ter, ut dicit Theophrastus, nec possibile videtur, ut ter eodē caule florere possit. Sed verisimilius est, quòd ex circa agnascensibus bulbis variis temporibus florent, & vnus putetur.

Cælum.

Solum.

Satio.

Dioscorides in montibus nasci dixit. Sed croceum & purpureum, Græci anydros vocāt, id est siccitate gaudentes, nos arenaceis & siccis locis vidimus.

Sponte nascitur, & semine seritur, & qui legunt defigere eum solent. Nec simul eodem anno ex iisdem seminibus nascitur, sed partim anno primo, partim secundo. Radice etiam sata proueniunt, extra terram perdurant, ut quæ radice capitata constant, crassa carnosaq; & tunicata, & simul lentitiam quandam habente, denique carnis & succi bonitate vacare minimè debent, ut ad perdurandum valeant, ut lilium. Hæc Theophrastus. Didymus, Martio mense viuit radix plantari debet, & transplantari.

Ars.

Iactant se quamplurimi florum mangones olitores, cultura lenociniis eiusmodi narcisos posse à pristina effigie deflectere, & in aliam mutare nouā, & visendam, insitis bulbo seminibus quibusdam, atq; insertis pullulationibus, ut flores



flores multiplices producant & foliosos, ad lusus & artis ostenta demonstranda. Vnde numerosissima nunc sunt narcissorum genera, vt non facillè scripturæ cancellis claudi queant.

*De croco. CAP. XIV.*

**C**ROCVM flos coronarius, sed ad hybernas coronas venit, tunc quum alii desunt flores. Idque etiam Athenæus annotauit ex Nicandro:

*— Acanthus.*

Haud minus quàm populus, viuaces sunt, diuturnus etiam crocus, vere abditus. Plinius, in coronas venire scribit ad arcendam ebrietatem, & qui biberit eum prius crapulam non sentire, præterea somnum conciliare leui blandoq; suo defluxu: herbæ vsus nusquã fuit in coronis, etenim folio angusto penè in capillamenti modum. Troianis temporibus iam erat honos ei, tres flores Homerus laudat.

*Lotum roscidam, & crocum, & hyacinthum.*

Columella crocum apud aluaria feri laudat, quòd coloret, & odoret mella. Idem ab eo Palladius, vt herba suauissimi odoris, & floris. Smilax virgo, vt fabulata est antiquitas, ob amorem iuuenis Croci mutata est in fruticem smilacis hædæ, vt dicemus in hederæ Cilicia, & Crocus puer in florem sui nominis. Quod Ouidius testatur,

*Et Crocon in paruos versum cum Smilace flores.*

Eiusmodi poëtices philosophiæ inuolucrum nil aliud innuit nisi abditam vim croci, Venereis voluptatibus celebrem. Nostra verò tempestate præcipui est vsus ad coloranda coquinaria condimenta.

Græcis κρόκος dicitur, vel quod κρόκη fila, villosamque tramam significet, cuiusmodi sunt croci stamina, vnde & villi, & flocci κρόκιδες dicuntur, vel ὅθεν τὸ κρόκει γάμειν, id est quòd frigore floreat, ex sententiâ scholiastæ in Callimachi hymno Apollinis. Latini crocum, Itali zaffarano.

*Nomen.*

Crocum, ex Theophrasti traditione, erumpit folio, et si ceteris bulbis angustior, ei tamen ad vsq; capillamenti penè exilitatem. Cauliculo tamè floris, quem sortitur, angusto. Germine & flore serotino aut præmaturo, vtro scilicet modo tempus acceperis. Floret quippe autumnò statim primis imbribus, Vergiliarum occasu, qui paucissimis diebus marcescat. Cum folio florem obiter expellit, quin & prius. Subest radix multa carnosæ & peruiçax. Plinius. Notabilis & croci natura, quod quum omnes herbæ folium primùm emittant, mox in caulem rotundentur: in eo caulis prior intelligitur, quàm folium: flos quidem caule impellitur. Carnosæ radix betæ, at magis etiam nũ croco: numerosiorq; radix quàm folium. Addimus, Foliatum crocum humi cubantibus foliis: cū flore stamina prodit aureo cruore virentia, flammeaq; crassiuscula in cacumine, terna, quaternave. Bruma spretis algoribus viret, vere crescit, deperditurque, tota æstate nullibi conspicua. Radice copiosa, viuaciq;.

*Descriptio.*



Genus.

Croci duorum generū meminit Theophrastus, montani, & sativi. Sed prius hebes, posterius odoratum: idemq; Crocum tam odoratum quàm candidum, & spinosum, quæ carent odore. Præterea crocum, agreste præstantius olere, quàm urbanum. Plinius. Sativum latius, maiusq; & nitidius, sed multò leuius degenerans, sed nec ubiq; fœcundum. Est & per se genus sativi blandissimum vulgò, quum sit medio candidum: dialeucon vocant. Montanum in Surrentinis collibus videre licuit autumno, præruptis locis, florem sine foliis gerentem, maiorem sativo, sed adeò frondes foris erant nigris maculis, lineis & lituris affabrè depictæ, ut nil gratius oculis occurri posset, sed in odorem.

Cultum.

Cælo puro, sitienti q; nec nimium feruido gaudet crocū, quæ ad odorem creandum aptissima sunt: ob id quod apud Cyrenam provenit odoratū consistit inter cetera: ex Theophrasto. Dioscorides optimū Coryceum dicit, è tractu Lyciæ cōtermino. Tertiū Lycium è monte Olympo, dein Ægibus Æroliæ. Cyrenaicum, & Centuripinum Siciliæ infirmius. Plinius ab eo. Non fœcundum Cyrenis, ubi semper flores laudatissimi. Prima nobilitas Cilicio, & ibi in Corico monte, dein Lycio, monte Olympo: mox Centuripino Siciliæ, aliqui Phlegæo secundum locum dedere: Virgilius Tmolus Ciliciæ montem laudat,

— non ne vides croceos ut Tmolus odores.

Agrum siccum & tenuem laudat Theophrastus: nam crocum paruo alimento indiget, ob id Cyrenaicum cæteris laudatius. Agreste suavius redolet: nam & sativum suam excoquere alimoniam nequit, & hinc fit, ut cinerem alij congerant, alij respergant. Iuxta semitas & fontes latissimum nasci idem dixit, quando calcari gaudet, & atteri pede, sed temporibus nostris notissimū, & optimū crocum non solum regiones ad Meridiem, sed etiā ad Septentrionem sitæ abundè dant, ut Brutia tellus & Samnitum: ut in Aquila Vestinorū vrbe,

Satis.

Satus ex Theophrasto radicibus fieri solet. Plinius, Scribitur radicis bulbo sylvestre ferere in Italia minimè expedit, ad scrupula vsque singula areis de eoquentibus. Mucianus author est, in Lycia anno septimo, aut octavo transferri in locum subactum, atque ita degenerans renouari. Viret bruma, & colligitur. Palladius Februario mense ferendos bulbos monet, & ante satos faciendos. Nos autem hîc ita scriimus.

Tertio vel quarto à satione anno, quum iam bulbi perfectam maturitatem consequuti fuerint, à terra eruuntur, & a state tota in horreis, vel calido loco reponuntur, substratis herbis, vel tabulis, ne soli humiditate corrumpantur. Deinde vltima Augusti parte, vel prima Septembris in sulcis, pedis intervallo, alter ab altero deponitur, altitudine non plus quatuor digitis sub terra, Maio, Iunio, & Iulio mensibus. Sarritionibus herbæ tollantur, repastineturq; terra, modò ne bulbi sauciantur, inde Augusti, vel Septembris fine herbis mudentur, ut flores facilius colligi possint: demum elapso triennio, vel quadriennio coherentes bulbi, quibus caput extumuit, seorsum distincti separantur, ut subinde creare novam lobolem possint.

Florem



Florem tunc meti debere, Florentinus est auctor, quum media floris stamē- *Cōditura*  
 ma grato colore nitent, & nutant: detractis à medio flore capillis, triduo, aut  
 quattriduo resiccatis, cacumē croci repurgatur, & si quid albi hāsit detrahatur,  
 & vasis ad vsum reconditur. Diophanes in vmbra siccandum, & refrigerandū  
 esse ait. Croci odor, ait Theophrastus, tam acris, & validus est, vt ad quoddam  
 vsq; temporis spatium odoratus reddatur: nā terrena parti vis quā dā aquosa  
 permixta est, eaq; siccatur, inueteraturq; vnā, & quantum aquosi humoris est,  
 exhalatur, &imenti cessat aētio, & quādam veluti concoctionis aliquid per  
 se ipsa recipiūt. Plinius. Adulteratur nū a quē. Probatio sinceri, si impotita ma-  
 nu crepat, velut fragile: humidum enim, quod tuenit adulteratione, cedit. Al-  
 tera probatio, si manu prolata ad ora leuiter faciē, oculosq; mordeat. Optimū  
 vbicunq;, quod pinguiissimū, & breuib; capillis, pessimū verò, qđ sitū redolet.

*De floribus non odoratis coronariis, & primum de hyacintho.*

C A P. XV.

**I**AM ad alteram diuisionis partem deuentum est, scilicet florum coronario-  
 rum non odoratorum. Ordinē hunc sequemur, quòd primo vernos, dein de  
 aestiuos, mox autumnales, & demum hybernos dicemus, vt etiam coronę an-  
 tiquitus necēbātur, & in coronas à montibus petebantur. Ab hyacintho ini-  
 tium aspiciamus. Palladius hyacinthum nutrire in hortis monet, quò ha-  
 beant apes, vnde mel colligant. Duplicis hyacinthi veteres meminere, histori-  
 ci, & fabulosi: prius de historico siue medico, in sequenti de fabuloso. Vnus ex  
 tribus est floribus, quos laudat Homerus. Pueris illita radix, eos mangonizat,  
 ita vt silens pubertas non erumpat. A Dioscoride Plinius, Mangonicis venali-  
 citis pulchrē nota, quę ē vino dulci illita, pubertatem coerces, & non patitur e-  
 rūpere. Quo inuolucro Poetę Apollinem semper imberbē figurant, & Hy-  
 acinthum puerum, vt in sequenti capite declarabitur.

Gręcis *ὑάκινθος*, Latinis hyacinthus, Dioscorides Romanis vaccinium nomi- *Nomen*  
 nari dixit, vt in leucoio dictum. Neapolitanis, *cepolla seluaggia*.

Dioscorides ita pingit. Folia fert bulbi, caulem dodrantalem, leuem, minimo *Descriptio*  
 digito tenuiorem, herbacei coloris, comam procumbentem purpureorū flo-  
 rum plenam, radice bulbacea. Theophrastus vere florere dixit cum violis, an-  
 terosam, plurimumq; durare. Addimus. Prouenit foliis porraceis, in terrā re-  
 flexis, caule læui, albicante, quem à summo tenus numerosi flosculi, spicatim  
 congesti amiciunt, in tantillis pedicellis lauendulę flores imitantibus, supra  
 comosam vmbellam, circinatam, deorsum nutantem efficientibus, ex violaceo  
 purpura suauis rubore permixtam, cępacea, quanta narcissi.

Columella duplex genus ponit, album & cęruleum. Nec non & niueos, & *Genus*  
 cęruleos hyacinthos.

In Galba eximie prouenire scripsit Plinius, hoc ibi pro cocco hygi- *Calum*  
 num tingitur. Color nanque hyacinthinus non solum ex hoc fit hyacintho,



sed è viola nigra, quæ syluestris hyacinthus quoque dicitur, vnde ianthinum potius, quàm hyacinthum dicere conuenit.

*Salis.*

Non scribitur, sed campestribus, & syluis sponte prouenit.

*De hyacintho Poetarum. CAP. XVI.*

**F**ABULOSVM hunc hyacinthum, quasi poeticum dicas, duplex fabula comitatur, luctum præferens eius, quem Apollo dilexerat, aut ex Aiæ cruore æditi, ita discurrentibus venis, vt literarum græcarum figura Α 1 legatur inscripta. Quum enim Ajax suo se ferro traiecisset, è cruore natum hyacinthum asserunt, ac in foliorum medio cernatur Α 1, quarum prior ad Aiæcem, posterior ad hyacinthum pertinet. Ouidius metamorphoseos decimo.

10

*Ecce cruor, qui fusus humo signauerat herbas,  
Definit esse cruor, Tyrioq; nitentior ostro  
Flos oritur formamq; capit, quam lilia, si non  
Purpureus colos his, argenteus esset in illis.  
Non satis hoc Phæbo est, (is enim fuit author honoris)  
Ipse suos gemitus foliis inscribit, Ε 1, Α 1,  
Flos habet inscriptum, funestaq; littera ducta est.*

Pausanias in Atticis, florem, qui natus est, extincto Aiæce, apud Salaminam ædium primò tradi refert, nec hyacinthum, sed florem in literis hyacintho similem ex candido rubeantem, ac lilio minorem fuisse dicit. Idem author tradit cōsuetudinem mosandalon dici florem apud Hermionenses, quem ipse hyacinthum interpretari videtur, eo flore coronatos festa, quæ cithonia vocant, agere. Hyacinthus enim puer, quum Apollini carissimus esset, & à Borea adamat, quumq; cum magis in Phæbum prouum Boreas videret, cum disco Phæbus cum puero luderet, discum iactum in eum retorsit, quo vulnere extinctus est: ex commiseratione demum ex humano cruore florem eiusdem nominis protulit. Narrat hanc fabulam Nicander in theriaca, & Ouidius,

*Expulit ipse cruor: rubefactaq; sanguine tellus  
Purpureo viridi genuit de cespite florem,  
Qui prius OEbalio fuerat de vulnere natus.  
Littera communis mediis pueroq; viroq;  
Inscripta est foliis, hæc nominis, illa querela.*

30

*Nomen.*

Theocrito ἰάκινθος, Theophrasto ἰάκινθον. Virgilio, & Ouidio hyacinthus, Neapolitanis giglio seluaggio. Hunc puto liliū rubrum Plinio dici, quod Græci crinon vocant, alii eius florem cynorrhodon.

*Descriptio.*

Nos ita describimus. Caule assurgit procero, & folio lilio simili, sed angustiori, & nigriori, circa caulem multo, ante eius exortum nullo flore, summo caule copioso, liliū forma, diuisura & magnitudine, colore rubro ad crocum inclinante, mukis exiguis, nigris, quasi punctulis literarum quarundam velut rudimentis resperso, vt in floribus fabarum serè similes conspiciuntur. Ra-  
dice

40



Sic bulbosa, ex multis nucleis coagmentata, ut lilii candidi, sed minore. Qui funestas verò literas inscriptas punctula illa inscripta non esse contendunt, si inspiciant quæso Plinium, qui de faba loquens, literas etiam lugubres in flore fabæ ex sententia M. Varronis reperiri tradit, in quo tamen flore non literas vllas, sed nigras tantum notulas inspicere licet: non temere igitur Virgilius, & Columella ferrugineum hyacinthum appellant, quum hilari purpura in flauum corusceret, ut ferrugo, quod idem Pausanias docet, & si Nonius ferrugineos hyacinthos caruleos interpretatus sit, ignorans poeticum hyacinthum à medico diuersum esse. Theocritus in epitaphio Dionis.

10 *Nunc hyacinthe loquantur tua litera, & plus ai, ai,*

*Accipe tuis foliis. Et suauiter rubens hyacinthus,*

*Et viola nigra est, & inscriptus hyacinthus.*

Sed tamen in coronis in primis leguntur. Virgilius,

*Et pinguem tedam, & ferrugineos hyacinthos.*

Columella,

*Syrpiculum ferrugineis cumulare hyacinthis.*

Vergilianus Menalca obicurum ænigma proponens Damææ, inquit,

*Dic quibus in terris nascuntur nomina Regum*

*Inscripti flores?*

20 Quod de Aiace, & Hyacintho, qui Regum filii fuerint, intelligit. Hoc rubens lilium puto à Dioscoride hemerocallida vocari. Caulem & folium lilii ferre dicit, herbacei coloris, ut porrum, florenti caule per singulos exornati terni, aut quaterni erumpunt lilii diuisura, quoties dehiscere cœperunt, colore perquam croceo, radix magna atq; bulbosa. Notæ omnes præter ramulares adnascencias, ex quibus terni aut quaterni flores erumpunt, huic conueniunt, nisi duæ fuerint hemerocallides, una apophyses, alia non habens. *ἡμεροκαλλίς* nomen apud Græcos traxisse videtur, quod flos fugax pulchritudinem suam interdiu tueatur, nocte verò apperente, languidius efflaccescat, ex Athenæo. Plinius addit, Pallidum ex viridi, & molle folium habet, radicem  
30 bulbosam, atq; odoratam. Sed Theophrasti hemerocallis, quam Theodorus elium vertit, alia est à prædicta, hæc & ramis & radice lignosa est, & semine exit. Cuius verba interpretans Plinius, ait: Hemerocalles folio coronat, surculosum rosæ modo.

### *De gladiolo. CAP. XVII.*

**Q**UVM gladiolus vere cum hyacintho floreat, & è syluestribus, & è montanis sit uterq; , post hyacinthum de gladiolo subnectemus. Inter coronatos flores à Theophrasto annumeratur, purpureo enim is placet floris colore. Palladius eiusmodi florem serendum suadet, quod apes ex eo trahant mella, vocat iridem, vel gladiolum à foliorum similitudine.

40 Theophrastus *ἔριον*, & *φάλαρος* idem esse ait, Theodorus illud pugionem, *Nomen.*



hoc enssem verterit, vi leturq; eodem auctore id nominis nactum, quod gladii speciem foliis præbeat. Dioscorides *μαχαίριον* vocat, & à Romanis gladiolum dici, & si Theodorus pugionem verterit, & segetalem ab aliquibus dici, quod segetibus nascatur. Latinis gladiolus. Italis *gladiolo*.

**Descriptio.** Theophrastus ita p. ngit. In caulem nimirum assurgit. Folium ad ensis effigiem, vnde ei nomen inditum. Floret cum viola nigra, sed vterque post anem. monem, comitatus hyacinthis. Radice rotunda & sine cortice, capillara fibris, vt gethyum. Scolopendraz frequentes in eam herbam conueniunt, mirumque in modum gaudent huius consuetudine frui. Radix dulcis, decocta, & commanducata panificiis, si trita farina misceatur. Germen ab radice laterale producit, quod è semine hoc idem euidentissimè facit. Dioscorides addit, quæ Theophrastus omiserat: ad clariorem illius delineationem, ait. Folia iridi similia, nisi minora, & angustiora viderentur, & in gladii speciem mucronata, neruosaque, in caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores in ordinem digesti inter se distant, rotundo semine, radicibus geminis, vna paruorum bulborum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis, superna habitior, & adultior. Matthiolus Plinium notat à Dioscoride dissidentem, quum gladiolum palustrem dicat, quem segetalem Dioscorides dixerat, non animaduertens Plinium Dioscoridis xiphyon, & Theophrasti phasganon, non cyperum describere, quem & gladiolum vocant Theophrastus & Dioscorides: decepit hominem vagum, & multis commune gladioli nomen.

**Solum.** In aruis nasci Dioscorides dixit, nos autem in copiosis Apuliæ segetibus frequentissimum obseruauimus, flore h. lari, saturaq; purpura rutilante: qui senis, septenisve foliis constar, ornithogali simili, sed minus repando, aut diuulso, ad vnam partem verso: geminis bulbis radix constar, quorum superior habitior, & corpulentior interdum, interdumq; inferior maior, fibrosa coma, villosa inuolucro, fuscoq; recta.

### *De ænanthe.* CAP. XVIII.

**O** ENANTHEM à nostro horto coronario non exclusimus, quum Theophrastus à coronariis floribus non excluderet, vrbani, & verni. Sed ænanthes nomen vagum, nam & florem quoq; labruscæ significat, quæ vnam suam ad maturitatem non producit, Dioscoride auctore.

**Nomen.** *Γράκι οὐράνιον*, vt si vini florem dicas. Theodoro vitifloram vertere placuit ex Theophrasto. Odor germinantis ei vix, vnde nomen, vt ex Plinio habemus. Latinis ænanthe.

**Descriptio.** Natura herbacea constar, flos ei candidus racematim coit, vt labruscæ, odor germinantis vix. Floret post narcissum, ante violam nigram, durare plurimum potest si florem auferas, nec sementescere sinas, nec solum desit aprium. Sicca odoratior euadit, quod euenit, quum sit terrena & humore copiosa,



pioſa, vnde ſiccata odoratioꝝ redditur. Quæ habet Theophræſtus Plinius ver-  
rit. Oenanthe maximè durat, ſed hæc ſi diuulſa prohibeatur in ſemen ire, o-  
dor ei germinantis vix. Nos in Apuliæ campis ſatis hilarè germinantem vidi-  
mus, floribus canſidis, exiguis, ſtellatis, in ſpicæ aut racemi modum conge-  
ſtis, ſuauiſſime quidem halantibus cuiusmodi ſilipendulæ, floret Maii initio.

Næſcitur, vt Plinius dixit, tepidis locis, at Theophræſtus, Si locum aprium, Cælum.  
& circumſeptum habuerit, cælum mite, & commodè temperatum, aſſiduè  
germinabit, & flores pariet: & floridior euadet.

Idem obſeri ſemine dixit. Satio.

### De helichryſo. CAP. XIX.

16

**N** V N c de helichryſo, ſine amarantho loquemur. Duplex enim eſt ama-  
ranthus, luteus vnus, purpureus alter: dicemus primum de luteo, dictu-  
ri paulo poſt de purpureo: vterque enim illud nomen ſibi adſciuit, quòd co-  
rũ flores nunquam marceſcant. E ſylueſtribus floribus eſt, eximium decus, ve-  
nuſtatemque corollis afferens, tum ſuis tuberibus ampulloſis auri fulgore  
ad ſolis repercuſſum radiantibus, tum immortalis floris corymbo per hye-  
mem, cæteraque anni tempora durante: nam exiccati aureum colorem diu-  
tius retinent, ob id deos eis coronabant, quod diligentiffime Ptolemæus  
Rex Ægypti obſeruauit, Plinio authore. Præterea veſtes odore commen-  
dat, non ineleganti, & ab animalium noxiſt tueretur, & eo flore coronatis exi-  
ſtimationem & gloriam parere ſcripſit Theophræſtus, ſi vnguento ſe pro-  
fundant ex auro apyro, id eſt ignem non experto. Philoſtratus & ama-  
rantho ſepulturas quoque coronari ſolitas affirmat, idque Theſſalos ad Achil-  
lis tumulum inſtituiſſe.

20

A Græ. is, vt Dioſcoride *ἐλὶχρύσων*, ab aliis *χρυσάνθεμον* dici inuenio, quali flos Nomen.  
aureus, quod auream & coruſcam lucem intuentibus vibret. A nonnullis  
*ἀμάρανθος*, immarceſcibilis, ſcilicet quòd diuturnam gratiam floribus ſuis  
tueatur: & ob id deorum ſimulachra coronet. Galenus, & Paulus ama-  
ranthum vocant, Ægineta chryſanthemon, quum huic eaſdem vires tri-  
buat, quas tribuit Dioſcorides. Plinius à ſole nomen trahens *ἡλιόχρυς* ſcri-  
bendum ducit, quod ad ſolis repercuſſum aureæ lucis in orbem, veluti co-  
rymbis dependentibus, ſplendear. Theocritus, & Nicander vetuſtiſſimi  
Poætæ *ἐλὶχρύσων* vocant: κατὰ τὴν ἑλὶχρύσων καλονομένην, id eſt hedera helichryſo im-  
plicata. Sunt qui ab *ἐλῆι*, palude, quam deamat, factum nomen exiſtiment.  
Theodorus Theophræſtum verè do aureliam vocat ab aureo fulgore. Athe-  
næus narrat, Themiftagoram Ephēſium in ſuo aureo libro ſcripſiſſe id no-  
men traxiſſe ab Elioſchryſe nymp̃ha, quæ hoc flore primum Dianam corona-  
uerit. Latinis & Italis idem nomen.

30

Theophræſtus ita ſuum helichryſon delineat. Flores auri modo fulget, folium Descriptio.  
candidum, fructus tenuis, & durus, radix tenuis ſummo terræ corio innixa.

40



Floret post violam nigram. Dioscorides addit folia angusta, ex interuallis abrotano similia, comam aureæ lucis in orbem, umbellam rotundam, aridis corymbis dependentibus, radicem exilem. Plinius. Ramulos candidos habet, folia subalbida abrotano similia: ad solis repercussum, aureæ lucis in orbem, veluti corymbis dependentibus, qui nunquam marcescunt, quæ omnia ex Dioscoride excepit. Floret post violam nigram, & syluestribus heliochrysos. Heliochrysos florem habet auro similem, folium tenue, cauliculum quoque gracilem, sed durum. Hoc coronare se Magi, si & vnguenta sumantur ex auro, quod apyron vocant, ad gratiam quoque vitæ, gloriamq; pertinere arbitrantur: hæc ex Theophrasto. Apud nos abundè nascitur cubiti altitudine, foliis abrotani, per interualla digestis in caule, quem rectum, & solidum habet, umbella in cacumine aurea, millefolii, aut eupatorii Mesues, flores diutissimè vigent, & aridi etiam suum colorem seruant. Exucca herba, florésve, ob id decerpti longotempore seruantur, odor non ingratus. Dioscorides in asperis, & torrentium alneis, & pratis nasci dixit, Plinius in frutetis. Nos in maceriis, montibus lapidosis, arenosis, & siccis locis.

*De bellio. CAP. XX.*

**P**LINIVS inter coronarios flores bellii meminit, hybernis nascentis coronis, nam hyeme tota floret, & vere.

*Nomen.*

Græco nomine destituitur, quum Græcis videatur indictus. Plinius bellium vocat. Vulgus margaritas vocat: videntur enim glomeruli illi, è cauliculis dependentes, veluti vnionis, è mediis foliis.

*Genus.*

Genera multa: nam & sponte nascentia, & urbana. Urbanaq; in varias differentias partiuntur discrepantes colore, magnitudine, & foliorum numero, sine barbularum stipatu densiore, in plerisq; punicei & versicolores flosculi, siue flocci spectantur.

*Descriptio.*

Maiores bellis procerius assurgit, folio non admodum à minori diuerso, altioribus duntaxat crenaturis laciniato, coliculis tenuibus, furculosis, cubitum altis, flore à minori non dissimili, maiore, paucioribus tantum barbulis, & in vniuersum candidis, medium luteum orbem concinne cingentibus. Maior mense floret, quo etiam mense carpi debet. Minor hortensis, syluestri, præter florem, qui rubicundus est, per omnia similis. Constant verò flores ii, interdum simplici, interdum multiplici foliorum contextu. Primo vere apparet, & tota ferè æstate durat. Syluestris Plinio auctore flore constat albo, aliquatenus rubente, quinquagenis ternis, interdum etiam quinquagenis quinis barbulis circinato, folio pingui, in terra iacente, in rotundum oblongo, leuissimè serrato. Neq; obstat, quòd bellio florem luteum esse tradat, quia non ad ambitum, sed ad discum, mediumque floris, quod sanè luteum est, respexit.

*Solum.*

Vterque in pratis nascitur.

Eiusmodi



Eiusmodi flores annua, & frequenti transplantatione, frequenti lata- *Cultus.*  
mine & irrigatione, maiores, habitiores, duplicati, triplicatiq̃ue & elegan-  
tiores euadunt.

*Decalcha.* CAP. XXI.

**E**ST flos, quem posthac caltham dicemus, speciosus tum croceo colore,  
tum odore, quamuis aliquantulum graui, non tamen ingrato, nulli non  
horto decora, & inquilina, paucis coronariorū elegantia & speciositate secun-  
da, vnde iis dotibus non immerito venit in coronamenta. Præterea cibo cedit,  
condimentis inditur, gustu & odore non ingrato, acetariis immiscerur, mu-  
10 lieribus amica, quod pensilibus hortulis, & testis eam ferant, & diligen-  
ter colant, nam icteritiæ fœdis coloribus vexatæ ea liberantur, & cymæ o-  
uorum luteo in placentulis immistæ, mansæq̃; menses nimis fluentes, cun-  
ctantesq̃; sistunt, impelluntq̃ue.

Dioscorides *χουάνθημον* caltham cognominare videtur, inquiring, chry- *Nomen.*  
santhemom, aut *κάλθα*, nonnullis buphthalmos: Quia flores admodum splen-  
didos & magnos ferat, magnos oculos, non bouis oculos vocat. Latini,  
vt Virgilius, & Plinius caltham vocant. Vulgò vbique *calendula*, quod sin-  
gulis mensium calendulis florere conspiciatur. Sunt qui caltham quasi ca-  
chlām, id est hiantem & apertam dicant, alii à calathō, siue calyce, quem  
20 ostētant flores. Neapolitani à Latina nomenclatione deducto nomine, *fior*  
*d' ogni mese* dicunt. Sunt qui solsequium putēt, quod flores sub vesperam con-  
trahantur, sub ortum pandantur.

Plinius ita describit. Proxima leucoio flauo caltha est concolori amplitu-  
dine. Vincit numero foliorum marinam, quinque non excedentem. Eadem  
odore superatur: est enim grauis caltha. Virgilius luteo colore eius florem ce-  
cinit tinctum,

*Mollia luteola pingit vaccinia caltha.*

Columella aureum, luteumve colorem floris inspiciens, & orbem circina-  
tum, vmbone in centro extante conspicuo, luminis, siue oculi magni in spe-  
30 ciem buphthalmum videtur vocare:

*Candida leucoia, & flauentia lumina caltha.*

Dicit Plinius, proxima violæ calatianæ, quam ipse odoratam, ac minuto  
folio inter cæteras violas dixerat, concolori amplitudine: nam lutei leucoii  
prius meminerat, & magnitudine calthæ consimilis: vincit numero foliorum  
marinam, quinq; non excedentem, calthæ verò foliola circa vmbonem supe-  
rant numerum duodenarium, & satius centenarium. Eadem odore supera-  
tur, nam marina viola inter cæteras odorata est, & caltha tam odore graui, &  
acuto est, vt caput feriat, non leuior ei, quam scopam regiam appellant, quam-  
quam folia eius oleant, non flores: & ipse regiam scopam alibi sideritim ap-  
40 pellat latifoliam, cuius folia si terantur, fœdi odoris dixit. Folio nempe cal-



tha surgit dilute virenti, multiplici, oblongo, aliquantulum lato, mollique ut leucosii, nonnihil lanuginoso, caule folioso, striato, flore in summo copioso, eleganti, eximio fulgore nitenti, amplum orbem effigianti, argutis, minutulisque crenulis laciniato. Semine in singulis floribus copioso. Radice fibrosa, & parua. Floret Martio, Aprili, Maio, usque ad hyemem, & interdum tota hyeme.

*Genus.*

Est genus duplex, sativum & sylvestre. Id passim nascitur. Sativum hortis colitur, duplici, tripliciq; florum vallo cingitur, speciosiusq; est.

*Cultus.*

Culta altero, aut tertio anno, pluribus, aut habitioribus floribus provenit, ac numerosiore foliorum floris stipatu: nam fera passim in incultis arvis, & ruderibus parua, & foliorum inops provenit.

*De anemone. C A P. X X I I.*

**O**B floris præstantiam, elegantiamve antiquitas anemones florem corollis dicavit. Fabulantur Poëtæ ex Adonidis cruore natum ab apro extincti, quod Ovidius expressit, & eo prior Nicander,

— *Sic fata cruorem*

*Nectare odorato sparsit, qui tactus ab illo*

*Intumuit, sicut pluvio perlucida cælo*

*Surgere bulla solet, nec plena longior hora*

*Facta mora est, cum flos de sanguine concolor ortus,*

*Qualem qua lento celant sub cortice granum*

*Punica ferre solent, brevis est tamen usus in illo.*

*Namq; male harentem, & nimia levitate caducum*

*Excitant iidem, qui perflant omnia, venti.*

Theocritus autem in bucolicis ex Veneris lachrymis Adonidem lugentis prodiisse finxit, eiq; epitaphium dicantis, hoc carmine,

*Quotq; cruoris agit guttas hic casus Adonis,*

*Tot Venus effudit lachrymas, quæ singula flores*

*Cespites demittunt, lachryma pariunt anemonem,*

*Sed cruor ille rosam creat.*

Hoc verborum figmento Poëtæ admonent, non esse pulchritudini fidendum, nam sicut anemones flores vento excutuntur, ita venustas per Adonidem figurata, fugax, ac brevi tempore durans. Ægyptii anemones florem pingunt, quoties hominum morbos intelligi volunt, ut ex Oro Apolline habetur. Flos anemones pulcher est, etsi cum multis de venustate certet, tamen rosis comparari nequit. Extrat antiquum proverbum, Rosam cum anemone confers; contra eos dictum, quires magnas cum parvis comparate velint. Nicander. Et anemonides fulgentes ipsæ, antequam contrectentur, splendidiore procul colore allicientes.

*Romæ.*

Græcè ἀνέμων dicitur ἀπὸ τοῦ ἀνέμου, id est à vento: nam, ut Plinius inquit,



quit, flores nunquam se aperiunt, nisi vento spirante, vnde & nomen accepit. Theophrastus anemones genus λεμονίαν vocari dixit. Sosibius anemones à Spartianis phænidas vocari tradit. Græci etiam anemones, & papaueris folium platagonium vocant, ὅθεν τὸ πλατῶσεν ἢ ῥωμὴ ἢ χεῖν, id est, à sono, quæ collisa faciunt. Iis siquidem periclitabantur ecquid amasiis suis forent grati, siquidem pollici imponentes ea, indici mox collidebant, quod si percerepuissent, amari se augurabantur, sin minus frustrati ingemiscebant. Latini anemone vocant. Theodorus vertendo Theophrastum fremium interpretatur. Itali vulgò *herba di vento* vocant, quia primo cuique, vt diximus, afflatui venti flores pandat, & reseret.

Plura sunt anemones genera, alia corollis, alia Medicinæ dicata. Quæ corollis dicata sunt, in duo genera diuidit Theophrastus. Vnum erumpit Autumno, primis imbribus post aphacam, cum croco, & cæteris hybernis. Aliud genus sylvestris anemones, quod limonium, siue palustre vocat, floret vere post narcissum, ante rosam. Edit florem suum haud multo post germen. Surgit à radice foliata. Et libro de causis. Quia natura herbacea & annua est, suæ debilitatis causa facillè germinat, vnde verno tempore floret. Hæc Theophrasti descriptio nimis brevis, & concisa est, addemus Dioscorideam, quæ etsi fortasse non eandem anemonem describat, nihilo tamen minus in dignoscendis earum generibus, & agnatis non parum afferet lucis. Dioscorides duo eius genera tradit, sylvestre, & in cultis nascens, & huius plures sunt species. Satiuum alterum phœniceum florem profert, alterum candidum, aut lacteum, aut purpureum. Harum folia coriandro similia, cæterum scissa tenuius, in terram inclinantur, cauliculi exiles, lanuginosi, in quibus flores, vt papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea, radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, veluti geniculis quibusdam distincta. Sylvestris amplitudo prorsus maior, latioraque folia, & duriora, caput oblongius, flore puniceo, tenuibus, & multis radicum capillamentis. Sed quia plerosque in errorem traxit similitudo, & colorum florum cognatio inter argemonem, & erraticum papauer, quod rheda vocatur, verum earum Dioscorides affert discrimen. Papauer, & argemone, colore minus saturato spectantur, & vtraque serius floret. Est & succorum distinctio: nam argemone croceum, & acrimonia insignem, papauer verò lacteum, anemone nec vllum quidem illorum fundit. Præterea si flos anemones papauerino similis est, non tamen capitulum ostendit, quale papauer, sed velut recens asparagi caput fastigiatur. In argemone latiusculum superne capitulum, in erratico papauere subangustum.

Dioscorides in aruis nasci dixit, nos in montibus, syluis, & frutetis vidimus. Solum.

*De flore cyano.* CAP. XXIII.



**C**YANVS flos quamquam inodorus, tum ob speciei formam, tum ob coloris gratiam, puellarum & rusticorum corollis inferitur, & hac etiā dote hortis feritur. Honorem, nomenq; dedit cæruleo colori. Si quis enim barbulas calycibus erutas ex candido oui liquore triuerit, in pingendis literis cæruleum colorem mentietur. Plinius, Flos iste & alii nō fuere in vsu Alexandri magni ætate, quoniam proximi à morte eius authores siluere de illis, quo manifestum est postea placuisse. à Græcis tamen repperitos quis dubitat? non alicuius Italia illorum nomina vsurpante.

*Nomen.*

Κύανος Græcis ex grato cyaneo colore, nomen flori cyanus: ex Plinio. Blaptisecula ruribus dicitur, quoniam secantibus, & metentibus officiat, retusa in occurfu eius falce, nam & seculam falcem veteres dixerunt: βλάπην Græcis nocere est. Neapoli *fior di liso*.

*Descriptio.*

Surgit caule bicubitali, anguloso, lanuginoso, folio oblongo, circa pediculum scisso, acutis laciniis sinuato, piloso, acuminato, in virore albicanti, calyce squamis foris compacto ex acerosis tessillis nitidis, plurimis stipatibus cæruleis barbulis, flore inodoro, semine paruo, forma oblongo, leui, splendido, superiori parte barbato, radice tenui, fibrosa. Floret Aprili, Maio, Iunio & Iulio mēribus vnā cum frugibus. Plinius, Rosam cyanus excipit, cyanum amaranthus.

*Genera.*

Huius diuersitates insigniores, hortensis, & erratici. Hortensis non diuersus foliis, sed maioribus, latioribus, flaccidis, minus laciniosis, floribus maioribus, speciosioribus, saturatiore cæruleo in purpuram vergentibus. Syluestris, ut diximus, cæruleis, senis ut plurimum foliolis constantibus. Hortensis minor nūcō conspectu, & purpureo niter.

*Calum.  
Solum.*

Erigidiusculis terris, in opportuno luxu segetes vbiq; necat.

*De æstiuis floribus, & primum de amarantho purpureo.*

CAP. XXIIII.

**S**VCCEDUNT vernis floribus æstiuū, qui mox dicentur. Quia post cyanum floreret, ideo post eum amaranthi meminerimus: est enim altera amaranthi species. Solo colore commendatur, quo nil gratius aspectu cernitur, quādo & purpuras Tyrias, Laconicasq; suo rutilanti nitore prouocer. Hac dote non solum hortis, sed fictilibus feritur, & fenestris asseruatur. Collectum & umbra, vel furni tepore siccatum, puellæ ad coronarios hyemis lusus recondunt, mirum postquā cuncti flores defecerunt, aqua madefactus reuiuiscit. Thessali ad tumulū Achillis libamina, & expiationes quotānis oraculi Dodonēi admonitione ferre iussi, quū omnia, quæ sacrificio rite operādo necessaria essent, ex patrio solo asportare cōsueissent, coronas insuper amaranthinas primi omnium excogitauerūt, easq; ad sacrū eiusmodi ferre sanxerunt, ut si fortē vēti nauem repulissent, aut alia quapiam de causa mora iniecta esset, coronæ tamen neque flaccidæ, neque deformes suspenderentur. At gyptii ū quem in offensa valetudine vixisse corporis ad extremum vsq; dignitate, viribusq; seruatis hieroglyphicè



phicè ostendere voluissent, amaranthi corollam capiti eius imponere moneat, quod minimè marcescat.

Græcis ἀμάραντος dicitur ἀπὸ τοῦ μὴ μαράναι, quod perennis, & immarcescibilis diutius perstet. Summa eius natura in nomine est, quia nō marcescat, decerptus maximè asseruatur. Dioscorides eius nō meminit, et si hac nomenclatura plures flores immarcescibiles complexus sit, ut chrysocomen, heranthemum, ageratum, aliosque pertinacis coloris, & decoris flores. Putant aliqui περρύειον Theophrasti esse, quam Plinius purpuram transtulit. Latini amaranthum, Neapolitani vulgò *fiornelluto* vocāt, quod ex coccineo serico, quod *cremesino* dicunt, cum quo de coloris principatu certat, conformari videatur.

Plinius ita describit. Amarantho non dubie vincimur, est enim spica purpurea veriùs, quàm flos aliquis, & ipse sine odore. Prouenit Augusto, durat in autumnum. Addimus, Prouenit ferulaceo caule, subrubenti, cubitali altitudine striato, foliis latis, acuminatis, mollibus, ocymo similibus, radicibus brevibus & fibrosis, semen spicis insidet, paruum, nigrum, nitens.

Plures sunt species. Vulgatiores holosericum vellere, mollitie, ac nitore prouocat. Maior floribus superna parte luxuriat multis pannulis, se mutuo implicantibus, spicatim inflexis, obsoletiore coccino nitet, iucundissimo spectaculo. Sunt & foliis versicoloribus. Sunt & sanguineis, tæniatis & reticulatis floribus. Sed ex Plinio palma Alexandrino datur.

Gaudet decerpi, & quo frequentius legitur, lætius renascitur.

#### *Delychnide.* CAP. XXV.

**H**ORTORVM, viridatiorumque deliciae sunt lectissimi lychnidum flores, ob id à Theophrasto, Dioscoride, Plinio, cæterisque inter coronarios flores ascripti sunt, suæ elegantiae illecebris. Amerias Rhizotomus lychnim è Veneris labro natam putauit, quum à Vulcano compressa se lauisset.

Græcis λυχνίς στεφανώματι, quasi coronaria lychnis. Viderur ex argumento lychnis appellata, nempe λύχνον Græcis lucerna dicitur, ἐμύχνιον funiculus, qui è gossypio paratur ad flammam nutriendam, quare quum antiquitus gossypii copia non daretur, innumeris quarundam herbarum foliis, utpote lychnidis, verbasci & aliarum utebantur. Sunt qui non à frondium tomento, sed à flammæ colore, lucido luculentoque dictas fuisse lychnides autumant. Alii quod noctu luceat, lychnidis nomen inditum. Theodorus in Theophrasti versione lucernulam interpretatus est. Latinis lychnis coronaria dicitur.

Theophrastus æstate florere ait. Dioscorides: flore est albæ violæ simili, syluestris in omnibus urbanæ similis. Plinius: nunquam excedens quina folia violæ magnitudine, odore nullo. Nos clarioris descriptionis gratia notas aliquas addemus delineando quandam herbam, quam veram lychnidem puramus, in tanta veterum scriptorum verborum caritate. Fruticosa herba, incaui caules, surrecti ramuli, tomentosi, geniculis pluribus donati, folia angusta, mollia.



Flores in summo apice rosea purpura rutilantes, ac veluti flammea, ut igneo micent aspectu oculorumque aciem perstringant. sed inodori. Radix fibrosa oblonga. Columella corymbem vocat.

*Nunc veniat quamuis oculis inimica corymbe.*

Nam & Dioscorides inter cætera eius nomina corymbion vocari testatur.

*Calam.*

Athenæus in Lemno, & Cypri gigni, itemque in Strôgile, Eryce, & Cythetis scribit. Eandem ex omnibus, quæ in Europa iucundius olent, vnguentis & odoribus solam immisceri. Optimam in Illyrico provenire, in locis editis, non procul à mari.

*Cultus.*

In hortis studiose culta adeo flores confectos, & ingeminatos fert, ut semine orbetur, exhausta pabulo in florum commodum absumpto. Sed quæ sponte oritur & negligitur, floribus obsoletioribus minimis, semine donatur. 10

*De malua rosacea hortensi. CAP. XXVI.*

**E**ST maluæ genus hortense dictum, quod florum gratia seritur hortis, ut æstivas coronasnectere possit. Flores venustate rosis non cedunt, & si suppeteret odor, de principatu certarent, nec fugax flos, sed diu vita, vigorque durat. Nunc de rosacea, de aliis suo loco dicemus.

*Nomen.*

Audio hortensem maluam, vel roseam vocari, quod flores rosei coloris elegantia, & similitudine ferat. Neapolitani *rose di Francia* vocant, fortasse quod illinc ad nos venerint. 20

*Genus.*

Trifariam in nostris hortis variat, prima purpurea saturata concolor, altera dilute rubet, tertia candida est, vel ex omnibus confusis coloratur. Est cui flos multiplicior, confertiorque structili foliorum serie aperiatur.

*Descriptio.*

Rosea malua in arboream proceritatem assurgit, cuius scapus tanta magnitudine crescit, ut baculi usum præbeat. Folia huic ampla, circinata & rotunditatis, multis in ambitu segmentis. Caudex à medio usque ad verticem pulcherrimis floribus decoratur, breui admodum pediculo dependentibus. Capitula primum prosiliunt, breuibus innixa petiolis, in mucrone fastigiata, iisque paulatim intumescantibus, prægnantia florum involucria fatiscunt, in quibus dehiscences rosæ se pandunt, & explicantur in folia quina calycibus paucos apices complexis, qui lutei è mediis emicant, iisque deciditibus, erumpunt purpurea stamina. His foetus succrescit, multipliciter runicatus, atque in umbilici formam numero semine coagmentatus, in quibus quum decussa sunt folia, reliquarum maluarum modo semina recluduntur. Floret Iulio, & Augusto. 30

*Solum.*

Pingui, & irriguo solo, quale hortense, proveniunt.

*Satio.*

Semine seritur, & si caulis post foeturam arescit, iterum vere rediuvius, ut semel sata pluribus annis perennet.

*De floribus hyemalibus, & primum de cyclamino.*

*CAP. XXVII.*



**I**AM dicentur hyberni, ne corollis eo tempore defint flores, vel ne tēpus in-  
 10 mittatur, habebimus & hyemales ipsos, & autumnales prorogatos, & si  
 cœlum clementius sit, & locus apricus, vernos præcoces: sic perpetua florum  
 coronatio, & contextus habebitur. A cyclamino incipiemus, & quū gratissimo  
 eius colossino colore à fertis non excludatur, nec à nostris hortis excludemus.  
 Præsertim quum iubeat Plinius in omnibus domibus serendam, nam vbi fue-  
 rit sata, nil nocere ei posse mala medicamenta. Præterea à terra erutā radicem,  
 vinoq; subactam, digestamq; in pastillos sicca fæcis vini, qua macula abster-  
 gūtur, ad amatoria valere author est Theophrastus, si in hoc ei fides adhiben-  
 20 da est. Pernicialia sunt etiam brassicæ & vitis odia, nam ipsum olus quo vitis fu-  
 gatur, aduersum cyclamino perarefcit.

Græcis *κυκλάμινος*, quasi sphæritus dicitur, siue orbicularia, tum à folii am-  
 bitu circinato, vel à circumacta orbis circinitate, *ἀπὸ τοῦ κύκλου*, vt ab orbe, orbi-  
 cularem dixerint. Latinis vt Plinio cyclaminus, & tuber terræ dicitur, ob id  
 Theodorus vertendo Theophrastum *κυκλάμινον* terræ tuber vertit. Roma-  
 nis terræ rapum dicitur, quoniam in terra velut rapum extuberat, vel terræ  
 tuber, quod in molem quandam intumeat, vel terræ vmbilicum, siue li-  
 beat intelligere vmbilicum mediam animantis partem, siue extremam vo-  
 luminis clausuram, quæ velut nodus opus finiebat. Appellare Campanos  
 30 piscatores terræ venenum Plinius retulit: nam eius radicem pisces summo-  
 pere expetunt, atque si contusam admista calce mari sparseris, aduolabunt  
 pisces cupiditate mira, continuoq; exanimati fluitabunt, idq; coram se  
 factum restatur.

Theophrastus terræ tuber olfactu odoratum dicit, gustu vehemēter ama-  
 rum. Colore nigrum. Constat cortice, & carne. Folio muris auticulæ simili, ra-  
 men rotundiori. Dioscorides tribuit ei folia hederæ varia, in quibus supra, in-  
 fraq; albicant maculæ. Caule nudo, quaternos digitos æquante, floribus in  
 eo purpureis, rosarum effigie. Radice nigra, aliquantulum lata, vt rapum videri  
 possit. Plinius folia ferre minora, quam hederæ tradit nigriora, & tenuiora,  
 40 sine angulis, in quibus albicāt maculæ, caule exiguo, inani, floribus purpureis,  
 radice lata, vt rapum videri possit, cortice nigro. Flos eius colossinus, in coro-  
 nas admittitur. Colossinus color, vt Straboni placet, à Colossis vrbe Troadis  
 dicitur, vbi præcipua lanicii commendatio erat, quem purpureum esse colo-  
 rem non ambigimus.

Theophrastus optimum in montibus nasci dixit, Dioscorides in vmbrosis  
 & maximè sub arboribus. Plinius in vepribus. Solum.

*De clematide daphnoide. CAP. XXVIII.*

**E**CORONARIO genere est clematis, hybernas sua fronde & flore co-  
 ronas textit: inopiā florum aliquando supplet, semper virens, authore Pli-  
 40 mo. Nostra ætate mulieres puellis, & puellulis virginibus funestas corollas  
 nectunt.



A Græcis *κλινμαπιδε*, quin sint dictæ à viticulatorum sarmentosa sobole, nullus est qui neget, *δελφονιδε*, à lauri forma foliorum. Plinius à Græcis chamædaphnem vocari dixit, quasi pumilam laurum. Ipse vincam peruincam vocat, quia obuia quæque vincit. Videturque ei alibi clematis Ægyptia dici, cognomine quod Ægyptus hanc maximè gignat, quum ab aliis daphnoides, ab aliis polygonoides vocetur. Folio lauri, lōga, tenuisq; Neapolitani vincam peruincam, & *trinencola* dicunt. In prouerbium vsque cessit, ita nominando eos, qui pro-cero & nigro sunt corpore, ut est apud Demetrium Phalereum, tales enim ab eo Ægyptiæ clematides nominantur. Sed hæc alia est à Theophrasti, & Dioscoridis chamædaphne, similis laureolæ, quam & Plinius descripsit.

Genit.

Apud nos albo, & caruleo flore viret hyeme, hyacinthino, vel subpurpureo. Dioscorides hanc humi serpere dixit, viticulas spargere crassitudine iunci exiguas, folio lauri, figura & colore multo minore. Plinius. Semper viret. In modum lineæ foliis geniculatim circumdata. Topiaria herba. Sed ne in posterum non dignoscatur, aliqua nos addemus. Virgis repit viticulosis, flexilibus, caducis, humi sparsis, sed non obuias plantas irretientibus, foliis ligustri lauri facie, ex interuallis binis ex aduerso. Floribus violaceis, quinis distinctis foliolis, ex oblongo, & viridi calyculo se pendentibus, longisque innituntur pediculis. Radice numerosa, gracili, & albicanti. Floret ineunte hyeme Nouembri, Decembri, & Februario. Dioscorides, lato pinguique solo prouenire, dixit, nobis in senticetis, & vmbrosis nemoribus passim obuia.

*De hedera Cilicia.* CAP. XXIX.

**E**SYLVESTRIVM genere in coronis flos venit smilacis, id est hedere Ciliciæ, ut Theophrastus inquit. Et Plinius. In coronamentis eorum corymbi obtinent principatum. Sed omnibus sacris, & coronis infauita, quoniam sit lugubris, virgine huius nominis propter amorem iuuenis Croci mutata in hunc fruticem. Id vulgus ignorans, plerunque sua festa polluebat, hederam existimando. Nam & Poetis, & Libero patri, aut Sileno, smilax iam pro hedera sacrabatur ab iis, qui omnino, quibus coronandi essent, ignorabant.

Meminit huius Ovidius,

*Et Crocon in paruos versum cum Smilace flores.*

Plinius ex ea fieri codicillos dicit, propriumque materiæ esse, ut auribus admota, leuem sonum reddat. Ex hac corona, impari foliorum numero facta, aiunt capitis doloribus medicinam venire.

Nomen.

Theophrasto *σμύλαξ*, siue hedera cilicia. Dioscoridi *σμύλαξ τραχεία*, id est smilax aspera, ab aculeis, quos habet. Galeno *μίλαξ*. Plinius, Nicophoros cognominatur. Et è Cilicia quidem primū profecta, sed in Græcia frequentior, quam vocant smilacem. Latinis smilax aspera.

Descriptio.

Ita describitur à Theophrasto. Amplexicaulis est, unde aliquid, cui incubat, querit, quod si deest, humi se proiicit, atque humi caulis fit. Fructus aculeatus, & velut



& velut præhorridus (sed corruptus textus Theodorum errare coegit, quippe non fructum spinosum dicit, quem paulo post spinis carere depingit, sed ramos spinosos, ut ex Dioscoride & Plinio corrigi potest) Folio in cacumine pinato quidem, sed in angulum depresso, nec tamen anguloso, hederaceo, paruo, & ubi pediculo adalligatur, ferè madido, medium callum, spinæ modo tenuem habente, staminaq; nō porrecta ex vno, ut in cæteris foliis, sed circa eum coacta in orbē ab annexu pediculi, ex quo & villus quidam gracilis, & conuolutus pampini modo emittitur, flore candido bene olente, verno tempore se prodente, fructu solani, aut melothri, etiamnum labruscæ racemis, ut hederæ, pendentibus, aut labruscæ potius, quoniam ab eodem pediculo acinorū prodeunt. Acinis color ruber, cōplexis nucleos binos, maioribus ternos, minimis singulos. Nigri sunt nuclei, atq; duri. Peculiare habet racemi, q̄ latera caulium sepiunt, quodq; vnus omnium grandissimus propēdet summo caule, ut in rhamno, atq; rubo. Hactenus ille. Dioscorides verò: Smilax aspera folia habet periclimeni, sarmēta tenuia multa, rubi modo, aut paliuri aculeata, arbores scandit ab imo ad summa perreptans, se conuoluenseis, fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumq; leuiter mordent. Radice dura crassaq; Plinius. Densis geniculata caulibus, spinosa, fruticosa ramis, folio ederaceo paruo, non anguloso, à pediculo emittente pampinos. Flore candido olente lilium, fert racemos labruscæ modo, non hederæ, colore rubro, complexa acinis maioribus nucleos ternos, singulos minoribus, nigros, duosque.

Duo eius genera Plinius recenset, alterum immortalitati proximū, in conuallibus opacis, scandens arbores, comantibus acinorum corymbis, alterum genus culta amare, & in his gigni tradit. Genera.

In opacis conuallibus nati dixit Plinius. Sed Dioscorides in palustribus, & asperis.

*De spina AEgyptia. CAP. XXX.*

**E**SYLVESTRIVM genere spinæ AEgyptiæ fructu, & ederæ ciliciæ flore in coronis utebantur antiquitus, ut ex Theophrasto habetur. Flos & coronis addi, & medicamentis petitus. A quo Plinius. Flos & coronis iucundus, & medicamentis utilis.

Theophrasto *ἄραβος* est, eoq; nomen accepisse tradidit, quasi tota arbor aculeis horreat, excepto caudice. Dioscoridi *ἀράβια αἰγυπτία*, spina Arabica. Plinius AEgyptiam vocat. Nomen.

Arbor tota, præterquā caudice, spinis horret, foliis ac germinibus aculeatis, magnitudine spectanda, ut cuius materies duodenum cubitorū proceritatem impleat. Fructū fert siliqua leguminū modo, quo incolæ coria perficiant vice gallæ. Flos aspectu pulcher, quo coronas nectant, ad medicamenta perutilis, qua de causa à medicis colligi solet. Ex ea tum sua sponte gummi profluit, tum arbore percussa. A cæsura protinus anno tertio resurgit. A quo Plinius. Descriptio.



leus spinarum in foliis, semen in filiquis, quo coria perficiuntur gallæ vice. Mænat ex ea gummi. Sed præcipua utilitas, quod cæsa anno tertio refurgit.

*Emera.*

Duûm est generum, candida, & nigra. Candida imbecillior, faciliusque putrescens: nigra incorrupta, & in aquis durior: ob id utilissima nauium costis, ventrisq; compagibus in fabrica. Plinius ab eo: Celebratur spina dumtaxat nigra, quum incorrupta in aquis duret, ob id utilissima nauium costis, candida facile putrescit.

*Calum.*

Numerosa omnino arbor, ingenti sylua eius Thebaica præfectura, vbi olea & quercus, & persea, loco non aquis fluiui riguo (distat enim plusquã trecentis stadiis) sed suis fontibus, quæ circa eû tractum per multi exiliunt. Ab eo Plinius. Circa Thebas hæc, vbi & quercus, & persica, & oliua, e e e à Nilo stadiis syluestri tractu, & suis fontibus riguo. Dioscorides in aquis nasci scribit.

*De herbis coronariis odoratis, & primum de abrotono. CAP. XXXI.*

**D**IXIMVS de coronarum genere, quæ floribus texebantur, nunc ad aliud genus deueniendum, quod scilicet solo folio coronat. Sunt enim suffruticum quorundam rami, folia, & in totum vniuersa natura odorata. Et primo in hortum nostrum abrotonum conferemus, tum ob sui odoris fragrantiam, tum quod serpentes fuget, & efficacissimam esse herbam dicant contra omnia veneficia, quibus coitus inhibetur, immo ramo putuinari subiecto, venerem stimulari, & armariis sparsum, vestes à tineis vindicare.

*Nomen.*

Nomen ἀβρότωνα sibi apud Græcos usurpauit, vt Nicandri scholiastes testatur in theriacis, quod conspectum tenerum, val delicatum habeat. Dioscorides à quibusdam thelyphthoron, & thelythamnon, & glycyancona dicit appellari. Saneque videntur ita ad historiam, & vetus proverbiu respicere. Ea est huiusmodi. Lydorum gens in libidinem effusissima, fœminas ingenuas constuprare in horris ad hoc flagitium quæ sitis amœnitatibus, aliquandiu impunè solita est. Demum Omphale mulier dominatione haud magno negotio, effœminatis illis, & luxu disfluentibus, excussa imperitare cœpit ipsa, & vbi eos cruciatibus variis affectos vltra est, in vxores eorum delauit, inclusas enim eas eisdem septis prostituit seruitiis, vnde viridario nomen glycyancon, & thelyphthori, & thelythamni vocabulo significatur, ceu fortasse abrotono consitus esset is locus. Sunt qui hanc herbam ab Abrotono fœmina in hanc mutata nomen adsciuisse credant. Neapolitani *canfarata* vocant.

*Descriptio.*

Theophrasto surculosus frutex est, minutisq; foliis præditus, immortalis viris corna. Radices rectas altasq; agit, & veluti vniustirps crassa scilicet illa radice, reliquis verò de illa exeuntibus spargitur, quod non sampso, neq; serpillio, neq; silymbrio, neq; helenio datum est, summo terræ radice leniter hæretibus, et si radices omnes sint lignosæ, longè magis abrotoni, magnitudinis, siccitatisque causa. Semine abundat, nec inodoro. A vetustate odor acutius validiusque vibrat, non hebescent, vt alii. Dioscorides. Fœmina quadam arboris specie fructi-

cans,



cans, candicat circa ramulos, foliis seriphii modo minutim incis. Floribus referta est, comacibus in summo fulgore auricorymbis, quod per astatem prodit, suauiter olet cum grauitate quadam. Plinius ab his. Abrotono radix vna altè descendens, cæteris in summo terræ leuiter hærens. Semē copiosum. Floret cum fraxino, acri odore.

Dioscorides genere distinxit, in marem, & fœminam. Plinius marem campestre vocauit, fœminam montanum, quod idem Nicander sentit. Genera.

Alfiosum admodum est, & frigus multum reformidat, ac sole nimio læditur. Miratur Theophrastus eiusmodi plantæ naturam, quæ quum calidiori vi prædita sit, & apricationem horret, & loca sole illustrata mirum in modum prosequitur, quod non nisi in plantæ infirmitate collocauit, quum viribus tum contra frigus, tum aduersus æstum deficiat. Dioscorides plurimum in Cappadocia gigni, & Galatia Asiatica, atque in Syria Hierapoli scribit. Col. sol.

Radice, & auulsione facile germinat. Etiam cacumine suo se propagat, nam quum lignosum sit spissitate acoreq; suo, seruari aliquantum temporis potest, modo hederæ: nã hæc defixa quoq; nimirum erumpere valet, vnde dicto modo feliciter, quàm semine germinare prodidit Theophrastus. Æstate seritur, quum semine diffusi ulter exeat, eoq; prius in testis viuiradicis gratia deposito, in quæ modum Adonidis hortulos pangebant. Nec sine negotio in plantaria transferretur. Vbi verò vegetum creuerit rutæ modo fruticat, sed surculosius, & squalidius. Plinius: Seritur autem semine melius, quàm radice, aut surculo, semine quoq; non sine negotio plantaria transferunt, sic & adonium. Vtrunq; astate. Alfiosa enim admodum sunt, & sole tamen nimio læduntur, sed ubi conuagere, ritum vitis fruticant. Sed Plinius contra quàm dixerat Theophrastus de semine protulit. Sed id potius librariorū incuriæ, quàm Plinio vitio vertendum est, qui totam germanam hanc Plinulectionem multifario lapsu peruerterunt. Sed.

### De serpillio. CAP. XXXII.

ET si Columella serpillum condimentatio vsui notissimam herbam esse, quum sit quibusdam esculentis aptissima, & magis aluearia curantibus, quàm olitoribus studiosè cõseri dixerit, nos, qui Theophrasti placita, Dioscoridis, & Plinij consectamur, qui eius ramos, & folia odorata, & proinde folia coronis quæ sita dixerunt, non alienum putamus inter odoratas & coronarias herbas in horto nostro locum illi dare. Nec admodum referre arbitramur, quo loco res dicantur, dummodo quæ dicenda sunt, non ineptè dicantur. Columella saporem præcipuum post thymum serpillio melli tribuit. Varro serpillum serere iubet, ut apes naturale pabulum habeant, & ab his Palladius eadē docet. 50

Græci *ἐρπύλλον*, Latini serpillum vocant à serpendo auctore Varrone. Dioscorides à serpendo nomē obtinuisse quoq; dicit, quoniã si qua eius particula terrā attingat, inibi radices dimittit, quod à Theophrasto excepit. Propriū quoddā ramulorum eius incrementum, quippe cum possit in quantā voluerit quiescere. Nomen.



piam longitudinē trahi, adiecto illi pedamento aliquo, aut si prope sepes plantetur, aut ex altiore loco deorsum demittatur, præcipuè in puteis, in longum protrahuntur, ut serpere videatur. Neapolitani *serpollo*.

*Descriptio.*

Theophrastus cremium dicit, lignosum, immortali virens coma, utpote omnia, quæ angustiorib. foliis pinguibus, & suaueolentibus cōstituuntur. Planta vniuersa odorata est, flos tamen inodorus. In agresti durus odor, & omnino expers dulcedinis. Ratio est, quia siccum plusquā modicū est. ob id acris odor, propter siccitatē: quum autem in vrbānum habitum traducitur, mollius redolet, moderationem autē causam tum odoris, tū coctionis existere nulli dubiū est. Semper nōnihil quærit, cui caducū incubet, vitam enim apud aliud agit, quod si obtinere non valeat, humi se proiicit, atq; humicaule fit. Radix ei lignosa, & multifida, sublimis, & retorrida, crescit in longitudinē. Dioscorides verò ita depingit: Serpillū hortense odore sampsucum imitatur, folia & ramulos origani habet, sed candidiores: sin maceris multo procerius assurgit, serpit humi. Syluestre zygis appellatur, non serpit, sed in altitudinem crescit, ramulos edēs tenues, surculosos, foliis refertos longioribus, quā rutæ, & durioribus, angustis. Flores iucundè olent, gustanti acres. Dioscorideæ opinioni subscribit Aërius. Plinius verò contra, Satiuum non serpit, sed ad palmi altitudinē increscit, quod syluestri euenit in puteis maximè: pinguius voluntarium, & candidioribus foliis, ramisq; Dioscorides nil aliud inter hortense, & voluntarium discrimē apposuit, nisi quod hortense sua cultu edomita feritate, horridiori deposita facie ad speciosiorē habitū se redegit, horriq; deliciis nimia humoris copia luxuriās, longè magis saturatū viret, sic fracto rigore pristino, delicatius factū per se stare nequit, sed vietum per terrā serpit. Voluntariū autem, quod vernaculus rigor tutatur, minus humi reptabit. Nescio igitur qua ratione duct<sup>9</sup> Plinius serpillū dixerit in hortis se in altū attollere, syluestre verò terrā lambere. Theophrastus in eo negauit discrimina, quū lignosa sint specie simplicia, neq; differentias aliquas sortiri posse, præterquā syluestre, & vrbānū, odoratū, & minus odoratū, quod diuerso solo, & cœlo, & cultu mangonio ascribendū est, & potius ex ferociū, quā vrbānorum genere esse, quum ipse serpillum comperrisset in montibus saturiæ odorem referens, nec vehementissimum illum quidem, sed mollem atque gratum, idque ferentes ex montibus deferunt, ut apud Sicyonem fieri solet, atque etiam Athenis ex monte Himetto, apud alios verò in Thracia. Sed nobis in Gargano monte, & in fageto Surrentino, aliisque syluestribus locis, tum etiam in hortis luxuriosissimè excoltis serpillum semper serpens, nec vnquam in altum surrectum, ac per se stans vidimus.

*Colum.*

Montes plerunq; eo scatere dixit Theophrastus, sicut in Thracia, Sicyone ex suis montibus, Athenis, ex Himetto. Montes item, & plana omnia serpillum scarere. Ocimum præterea soli expositum in serpillum transire, folio nanque minus, odoreque vehementius redditur, quippe cum alimenti minus habeat, quæ sicca sunt. Columella, locum apricum desiderare.

Squalorem



Squalorem patitur, aqua ei modica satis facit, & fimo præcipue iumento- *Solum.*  
rum gaudet. Columella ait solum neq; pingue, neq; stercoreatum desiderare,  
vt quod macerrimo solo per se maritimis plerisq; regionibus nascatur. Nican-  
der aliter sentit. Serpillum sese diffundit, viuaxq; vliginosam pascit humum,  
foliis radículas agentibus innixum, nam magna ex parte serpit. Palladius lati-  
us frondescere, si iuxta piscinam vel lacû, vel putei margines cõseratur, scribit.

Seminio comprehendere pertinaciter contendit Theophrastus: nam fue- *Satio.*  
runt qui tritum, exiccatumq; solo crediderint, nullum tamen erupisse germen  
restatur. Columella verò semine seri docuit, circa æquinoctium vernum. Pal-  
ladius Martio mense serpillum seri plantis, & semine, sed vetustate meliori.  
Varro à Fauonio vsq; ad Arcturi exortum rectè serpillum è seminario trans-  
ferri. Theophrastus quoq; auulsione seri dixit. Deferentesq; ex his auulsos  
ramos serit: nam & radices è germinibus suis quamplurimas dimittit, non se-  
cus ac hedera. Tempus serendi autumnò: hoc enim tempore omnes id serere  
properant, sed vere etiam seritur. Propagatur ex semetipso. Nicander, Folia  
radices agunt, nam magna ex parte terram lambit, & noua continuo sobole,  
vel propagine sese radicat: Interpres concinne subdit, non aliter quàm hede-  
ra: reliquis floribus sese quadam vertigine conuoluens adrepit, depascensq;e  
complectitur.

20 Transferendum id sæpius censent, quo latius surgat, purgariq;e oportet: *Cultus.*  
nam nisi purgetur, perarefcit.

### *Dethymo.* CAP. XXXIII.

**F**ERT & thymum ramos odoratos, quibus coronæ intorqueantur, vt Pli-  
nio placere videtur. Fert & odoratos flores apibus gratissimos, vnde odo-  
rata mella reddit. Virgilius,

— *Redolentq; thymo fragrantia mella.*

Redditq; eius sapor præcipui saporis mella. Florenti apes decerpunt flores,  
auguriumq; mellis est, prouentum enim sperant apiarii, largè eo efflorescen-  
te: si defloruerit, æstiuæ mellatio minus proba sequetur, Theophrasto autho-  
30 re. Aptissimum existimatur è thymo mel, coloris aurei, saporis gratissimi, thy-  
mosum non coit, ex Plinio. Varro optimum mel è thymo fieri dicit, sic Colu-  
mella & Palladius. Et condimentorum etiam gratia, quum sit condimentis  
aptissimum, studiosè nostro horto conferendum venit.

Græcis θυμός, ab excitando, quod θυών dicunt, nomen inuenit. Alii thymos, *Nomen.*  
quasi thyemos, hoc est, sanguinem impellens. Latinis thymus. Italis, *timo.*

Theophrastus serò florere, nam circa æstiuum, scripsit. Semen nullum o-  
stendi potest, sed floribus quodam permiscetur modo. Dioscorides. Sarcuto-  
sus frutex, exilibus foliis multis, & angustis circumdatus: capitulis in acumine  
purpureo flore refertis. Percontatur Aristoteles, cur in solo Attico ceteri  
40 fructus dulcissimi fiant, thymum inibi acerrimum? Diluit controuersiam,



quòd ager ille tenuis, siccusq; est quæq; in eo nascuntur, parum humoris possident, fructus, qui dulces sunt dulciore redduntur, qui verò sicci, sed minime dulces proueniunt, inopia sui humoris, retinent quantum suo conueniat generi. Sol dulcissimum, ac leuissimum eximit, quapropter qui superuacuo humore carent, acerrimi relinquuntur.

**Genera.** Duo genera describit Theophrastus, candidū, & nigrum. Plinius candidum radice lignosa, in collibus nascens, quod & præfertur, nigrum floris nigri.

**Celam.** Quòd flatus à mari peruenire nequit, illic nasci, durareq; posse omnino negant. Qua de causa nec in Arcadia saruteia & origanum prouenire possunt, dixit Theophrastus. Vidimus ex Aristotele in Attico solo acerrimum prouenire. Athenæus optimū prouenire in Himetto scribit. In Gaditano freto transfigurari in lapidem. Plinius. Mellis Attici in toto orbe summa laus existimatur. Ergo translatum est ex Attica thymum, & vix flore satum. Sed alia ratio naturæ obstitit non durante Attico thymo nisi in afflatu maris. Erat quidē hæc opinio antiqua in omni thymo, ideoq; non nasci in Arcadia Palladius aprium agrum quærere dicit. Thymum è Thyna laudatur ab Hippocrate. Est autem, ut inquit Galenus, Thyna quidam in Thracia locus.

**Solum.** Dioscorides gracili & petroso solo prouenire ait. Columella neque pinguem, neq; stercoreatum, sed macerrimum solum diligere ait, ut pote quod in maritimis regionibus reperitur. Plinius. Nunc provincia Narbonensi lapidei campi thymo scatent. Nos Garganum montem, & latos Apulæ campos thymo optimo scatere vidimus.

**Satio.** Semine feritur. Sed thymi semen fallit, nec potest comprehendi, unde flore sato nascitur, qui tamen Athenis deportare desiderant, quærent, atq; inveniunt. Thymū flosculis suis nascitur. Hæc Theophrastus. A quo Plinius. Semen thymi non potest deprehendi, cum origani perquam minutum, non tamen fallat. Sed quid interest occultasse id naturam? In flore ipso intelligitur, satoq; eo nascitur. Quid nō tentauere homines! Columella. Melius thymi nouellas plantas disponere, quæ quum subacto solo depressæ fuerint, ne tardè comprehendant, aridi thymi fruticem contundi oportet, atq; ita pinfito, pridie quàm volueris vti, aqua medicare, quæ, quum succum eius perceperit, depositis fruticibus infunditur, donec eos rectè confirmet. Palladius Septembri mense thymum serit, sed melius plantis nasci, quamuis possit & semine.

### *Desisymbrio.* CAP. XXXIIII.

**S**ISYMBRIUM quum odorata sit planta, vniuersa suis foliis coronat, ut Theophrastus, & ab eo Dioscorides, & Plinius docuerunt. Præterea eius cacumina, turionesque acetariis immiscentur, condimentisque & iuribus innatant, quamobrem alienum non videtur si nostro hoc in hortulo sibi locum vendicauerit.

**Nomen.** Græci σισυμβρον, Damageron verò σκίμβρον dicunt. Latini sisymbrium. Pu- 40  
tat



rat Varro à Sifymbrio, quæ fuit veteribus comædiis meretricula, nomen tra-  
xiffe. Nonnulli coronam Veneris vocant. Vel quod ob odoris suauitatem,  
quam præfert, eo iuuentus, quæ amoribus gaudet, coronata, in comessatio-  
nibus suis blando odoris oblectamento suas illecebras commendaret, vel po-  
tius quod sifymbrii caulis, articulatim per internodia verticillato florum am-  
bitu concinne coronetur, ab eleganti igitur corollarum venere nomen deri-  
uauit. Itali *sifymbrio*.

Et si Theophrastus simplex esse genere scripserit, quū lignosum sit, nec vr- Genera  
banū, aut syluestre, odoratum, aut minus odoratū esse, libro tamen de causis  
10 syluestribus, & latui meminit. Dioscorides aquatici, quod alii cardamina vocāt.

Cremium sifymbrium est. Radice lignosa, multifida, retortidaq; summo Description  
terre corio innixa. Planta suauiter olet, flores inodori, vt omnibus contingit.  
Atqui ratio exigit, vt quod in cæteris quamquā inodoratis odoratissimū est,  
idē etiam in odoratis sit odoratissimū. Hæc latui Theophrasti descriptio est.  
Dioscorides mentæ hortensis similitudine, dicit, odoratus, latiore folio. Pli-  
nius, Quod in ficco ortū, odoratum est, & inseritur coronis, angustiore folio.  
Addimus: folio serrato nigriore, & paulo rotundiore, caule quadratō, quadam-  
tenus purpurascēte. Flosculis internodia geniculatim cingentibus verticilla-  
to semper ambitu, reliquis mentā emulatur, sed odorem acriusculum vibrat.  
20 Syluestre Plinius à quibusdā thymbræū appellari ait, pedali non amplius ma-  
gnitudine. Aquaticū, quod alii cardamina vocant, Dioscorides riguis gaudere  
ait, iisdem locis quibus sion. Gustu nasturtiū representat, folia primū rotun-  
da, adukta eruce modo finduntur. Addimus, Caule profilit cauo sesquipedali,  
ima sui parte pluribus radicularum fibris subinde capillato, è cuius alarum ca-  
mis cirri frequentes sinuatim erumpunt, candido flore, folio inter initia quum  
emicat orbiculato, quum succreuit in erucæ folium laciniatim finditur, nec  
exactē sifymbrium aquaticum noueris, nisi iuuentam primam, deinde senec-  
tam accuratē inspexeris, quum folia mutant subinde faciem.

Damageron, Sicut gaudet aprico, sole iugiter illustrato, arboribus expedito, Columi  
30 quæ areas inopacent: nam latius prouenit, quum libero fruitur cælo. Plini-  
us, Sifymbrio montes pleriq; scatent, sicut in Thracia, vbi aquæ deferunt ex  
iis auulsos ramos, serunt que.

Dioscorides inculto solo nasci scribit. Alterum verō sifymbrii genus, quod Solum  
cardaminam vocant stagnorum vernacula, & laueris comes.

Semine non feritur: nam eo carere affirmant, sæpe enim exiccatum, tritūq; Satia  
seuisse se inquirunt, sed nūquam germen erupisse, & huius quoq; periculum se  
fecisse affir mant, vnde natura è syluestrium genere esse. Sed Damageron feri  
femine dicit, & tertio anno fructum dare. Cacumine feri etiam Theophrastus  
docet, radices eniq; è germinibus suis quamprimum emittunt, non secus ac  
40 hiedera. Damageron. Si quis à vertice radice, ex quo germen habet, quod qui-  
dam oculum appellant, plantent, eodem anno fructum producet.



Cultus.

Continuò rigari oportet, sin aliter, obarescit, & continuo transferri debet, nam si olitor non excoluerit, sed neglectum omiserit, odore in mètam deficiet, specie verò in calamintam, vt per multa etiam, quæ cultu omisso in syluestrem sortem redeunt: nam radices altius agit, in quam partem tota vis conuersa decumbit, eaque superiores partes spoliatę redduntur infirmiores, & illam odoris fragrantiam exuunt, quæ postquam exoleuit, reliquus odor elanguescens, edomitusq; , proximè ad mentam accedit. Argumento est, quod agreste sisymbrium talem reddit odorem. Speciem tamè calamintę accipit similem, omne nanq; in simile sibi quiddam mutatur, non in remotum penitus: quod ne eueniat, est apud agriculturæ consultos tradita ratio sæpius transferendi, vt sibi nouos natales quotannis adsciscat. 10

*De sampsuo, sine amaraco. C A P. XXXV.*

**S**AMPSCVM sua perpetuo virens coma, & odore, quem tota planta suauiissimum expirat, cæteras herbas antecedens, ad coronamenta quæ situm est, suisque ramis coronas intorquet Dioscoridis, & Plinii autoritate. Catullus etiam,

*Cingite tempora floribus  
Suaueolentis amaraci.*

Poëta de amaraci umbra, cuius opacitate mollior fieret Ascanii somnus, hæc cecinit: 20

*At Venus Ascanio placidam per membra quietem  
Irrigat, & fotum gremio dea tollit in altos  
Idalia lucos, ubi mollis amaracus illum  
Floribus, & dulci aspirans complectitur umbra.*

Amaracum comitatur hæc fabula. Amaracus Cynaræ Regis Cypri puer, dum ferret vnguenta, casu quodam lapsus, alabastrum confregit, qui quum nimio dolore confossus intabuisset, versus est in sampsuum. quæ herba ex eius nomine cœpta est amaracus appellati. Sed Athenæus autoritate Apollodori libro de vnguentis coronam ex amaraco compositionibus inutilem esse iudicauit, & quicquid grauare, & opplere alioqui posset. Palladius apibus gratissimum dicit. 30

Nomen.

Græcis σάμψυον, & ἀμαράκον. Dioscorides scribit: sampsuum gens Sicula, & Cyzicena amaracum appellat. Diocles libro de medicamentis lethalibus scribit amaracum à quibusdam vocari sampsuum. Plinius. Amaracum Diocles Medicus, & Sicula gens appellauere, quod Ægyptus, & Syria sampsuum. Latini sampsuum, & amaracum. Veteres Poëtæ modo sampsuum, modo amaracum vocant. Sed contraria sunt sententia Galenus, & Paulus, & longè aliter de amaraco sentiunt, nam à sampsuo & viribus & natura dissidere. Sed hi amaracum pro parthenio assumunt, vt videre est in eorum scriptis. Itali maiorana, & persa.

Sampsuum 40



Sampsucum suffrutex est ex Theophrasto, & perpetua fronde comatur. *Descriptio.*  
 Radix ei lignosa, retorrída, summo cespice leniter hærens, multifida. Floret æ-  
 state, non omne, sed quod Phrygium cognominant. Semen ei copiosum, odor  
 molliter iucundus: quia terreno aquosa vis admiscetur, ad vetustatem exare-  
 scens per quoddam temporis spatium, validius odorem vibrat, & acrem odo-  
 rem reddit. Vnà enim & quantum humoris aquosi est, exhalatur, & alimenti  
 cessat accessio, & quædam veluti coctionis, aliquid per se ipsa recipiunt. Vnde  
 fit, vt à suis decerpta arboribus odoratoria reddatur. A quo Plinius. Amaracus  
 acres habet odores. Dioscorides autem, Herba est ramosa per terram repens,  
 20 foliis calaminthæ tenuifoliæ hirsutis, & retorridis. Nos describemus nostram  
 maioranā, quam verum sampsucum credimus. Maiorana suffrutex est humi-  
 lis, cādicans, & suavis odoris, surculis tenuibus, in plures alas diuisis, circa quos  
 foliola penè rotunda, incaua, mollia. In summo flosculi candidi, pusilli, spicis  
 exiguis, oblongis, & squamatim cāpactilibus, radicibus tenuibus. Ramuli tam  
 obsequiosi, vt in quamcunq; volueris formam topiario opere, facile effigies.

Est apud nos maior, & minor species. Sed minor est foliis, & ramulis tenui- *Genera.*  
 or, odore præstantior, nobis dicta *maiorana gentile*, æstate florens, puto Theo-  
 phraستي sampsucum Phrygium, & Dioscoridis legitimum marum.

Athenæus tradit multos interpretari naucraticem coronam ex amaraco, *Calum.*  
 20 eumq; florem abundare in Ægypto. Plinius in Cypro laudatissimum esse, &  
 odoratissimum. Et quia ex Cypro antiquitus amaracus ad vnguenta expetita  
 fuit, Poëtæ adulati Cypro regi Cynaræ, fabulati sunt Amaracum puerum  
 alabastrulum vnguenti fregisse, præq; luctu intabuisse, & in amaracum ver-  
 sum, quam sampsucum Ægyptus & Syria dixere.

Seritur semine & auulsione. Sed planta transferenda est viuiradix, magno- *Satis.*  
 pere viuax, ex Theophrasto. Plinius ab eo. Seritur semine, & ramo. Floren-  
 tinus. Sampsucum ex semine seritur, & transplantatur Aprili, & Maio, iucun-  
 dum odorem habens, & calidissimum.

*De meliloto, siue fertula Campana.* CAP. XXXVI.

30 **V**ENIT & in coronamenta meliloton herba, quam fertulam campa-  
 nam vocant, coronas enim ex hac antiquitus factitatas indicium est no-  
 men herbæ fertulæ, quod occupauit, placetq; maxime foliis pinguiissimis, atq;  
 breuissimis, ex Plinio. Pherecrates in hominem, qui suauiter loqueretur, di-  
 cebat: melilotum loqueris; quòd herba suauiter oleret. Cratinus etiam recen-  
 set quòd coronaria esset herba.

*Et hedera floribus, meliloto circumsepiente caput.*

Præterea maximè aluearia curantibus conuenit meliloton serere, scribe-  
 bat Plinius. Coronas etiam texuerunt prisci, quibus caput redimendo febrile  
 æstus arcerentur.

40 Græcis *μηλίωτον*, Latinis melilotus dicitur, & fertula Campana. Cato fertu- *Nomen.*



Iam Campanicam vocat. Columella quum de fructu condimenta describit, eandem nominat. Plinius, ut diximus, causam nominis reddit, quod ex hac antiquitus fierent coronæ. Melilotum dixerunt, quasi melitam lotum.

*Descriptio.* Postquam inaruerit vegetiorem odorem reddere tradidit Theophrastus. Dioscorides, Eius odor vicinus est croco, boni odoris. Plinius, foliis breuissimis & pinguiissimis, odor eius croco vicinus & flos, ipsa caua: vbicunq; verò recens, nec candicans, & croco quàm simillima.

Fruticat ramosis cauliculis hinc inde defflexis, geniculis distinctis, vnde emicant folia in pediculis terna, flores lutei, pallidi, certa serie & modo, ut in securidica, semen fœnugræci in vaginulis contentum. Sunt & apud nos duæ aliæ species huic per similes.

*Calum.* Dioscorides in Attica laudatissimam dicit, & Cizico, & Chalcedone natam: nasci & in Campania circa Nola. Ab eo Plinius. Est in Campania Italiae laudatissima, Græcis in Sunio, mox Chalcidica, & Cretica.

*Solum.* Vbiq; verò asperis, & syluestribus nata. Melilotos vbiq; nascitur, ex Plinio.

### *De trifolio asphaltite. CAP. XXXVII.*

**F**OLIO etiam coronare trifolium, Plinius dixit. Minyanthes vocant Græci, alii asphaltion maiore folio, quo vtuntur coronarii.

*Nomen.* Græci τριφυλλον. Dioscorides manianten, vel asphaltion vocat. Plinius dixit serpentes nunquam in trifolio aspici. Præterea celebratis authoribus contra omnia venena pro antidoto sufficere xxv grana eius, quod minyanthes ex eo appellauimus, tradi. Asphaltion etiam dici, quod folia vbi adoleuerint, bitumen oleant. τριπίπλλον Nicandro dicitur in antidoto aduersus serpentes. Archigenes asphaltitin. Latini trifolium dicunt. Neapolitani *fasolara*.

*Descriptio.* Dioscorides ita illud delineat. Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, virgas habens tenues nigras, vnde ramulares adnascuntur appendiculæ, in quibus ter na singulis germinationibus exeunt folia, loto arbori similia: his recen- ter enatis, rutæ odor inest, vbi autem adoleuerint, bitumen olent. Florem edit purpureum, sed quadamtenus latum, subhirsutum, ex altera summitate exertum, antennæ modo corniculum gerens. Radix tenuis, longa, valida. Columella ita describit: Odore graui, nec absimili bitumini, longis hirsutis foliis, caulem robustiorem, quàm pratense habet. Nicander in Theriacis ita de eo,

*A* tribus hinc dictam foliis, si sumpseris herbam,  
Non leue praesidium contra illa venena pararis,  
Sunt, & qui minyanthes eam, sunt qui tripetelox  
Appellant, qualis loto est, apparet imago,  
Et similem rutæ, donec viget, edit odorem.  
At flores vbi magna suos, adnatæq; membra  
Ceperit, ingratum solet eructare bitumen.



Columella locis confragosis nasci ait. Totus Neapolitanus tractus his sca- Solum.  
 tet, immo mons Neapoli imminens ab eiusmodi trifolio, Trifolinus dictus.  
 Vnde solo potius tenui, & aprico gaudet.

*De lotofatina. CAP. XXXVIII.*

**T**ROIANIS temporibus erat honos floribus, quorū Homerus tres lau-  
 dat, & inter herbas subnascētes deorū voluptati, lotos prima nominatur:

*Quæ subter terra diuinis procreauit nonam herbam,  
 Lotumq; roscidam, crocum, & hyacinthum.*

10 Loti Theophrastus meminit inter herbas, quibus in vnguentis vterentur.  
 Λωτὶς Theophrasto auctore, æquiuocum nomen, formisq; pluribus con- Nomen.  
 stat. Dioscorides λωτὶς ἡμερος, Latinè lotus urbana. alibi trifolium vocat. λωτὶς  
 videtur dici, quasi voluptas, à verbo λῶ, videturq; Homerus allusisse ad deo-  
 rum lubescētiā, & vocat roscidum, vel quod paradisis, & lætioribus locis  
 oriatur. Latinè lotus urbana, ac trifolium dicitur. Hinc de flexo nomine Nea-  
 poli *tripoli* dicitur, quasi odoratum trifolium. Hodie colitur, decerpiturq;  
 ad odoratam aquam faciendam ab vnguentariis.

Dioscorides hanc describens paucis contentus est. Est herba tota odorata, Descriptio.  
 ex genere trifolii, caule bicubitali, & foliato, odore eximio ac suauī. Pedicu-  
 los, & folia è geniculis èducta trifolii pratensis, ambitu obliquè dentata, ha-  
 20 bitiora, subpallida: decerpta, & exiccata, etiam odorem retinet.

Loti herba non nisi post annum è suo semine nascitur. Satis.

*De helenio. CAP. XXXIX.*

**Q**VVIRAMI & folia odorata sint helenio, iure à Theophrasto inter coro-  
 narias herbas connumeratur, quæ folio coronat, itemq; Plinio. Narrant  
 Poetæ lachrymis Helenæ natum dum gubernatorem Canopum Hæmorrhoi  
 serpentis ictu exanimatum fleuisset. Celant sub hac fabula Poetæ huius herbe  
 in se medicā facultatem, quæ d faueat formæ, cutem in facie incomptam, reli-  
 quumq; corpus perpetua venustate condecorans. Præterea eius vsu quādam  
 gratiam iis, veneremq; conciliari putant. Attribuunt etiā hilaritatis effectum  
 30 eidem potæ in vino, cumq; quæ habuerit nepenthes illud prædicatū ab Home-  
 ro, quod eo tristitia omnis aboleatur. Animienim nubila præclare discutere ex  
 Hippocratis testimonio creditur. Breuior his est, sed torosior, amariorq; inu-  
 la, per se stomacho inimicissima, eadem dulcibus mixtis saluberrima. Pluribus  
 modis austeritate victa grariam inuenit: nanq; & in pollinē tunditur arida, li-  
 quidoq; dulci temperatur & decocta posca, aut asservata, vel macerata pluri-  
 bus modis, & tūc mista de fruto, aut subacta melle, vīsve passis, aut pinguibus  
 caryotis. Alio rursus modo cotoneis malis, vel sorbis, aut prunis, aliquando pi-  
 pere aut thymo variata, defectus præcipuè stomachi excitat, illustrata maxi-  
 40 me Iulix Augustæ quotidiano cibo. Docet & alia Columella ad inulę cōditu-  
 ras. Quum eius radicē mense Octobri, (quo maximè matura est) è terra erue-



ris, aspero linteolo, vel etiam cilicio detergito quicquid harenæ inherēbīt, deinde acutissimo cultello summatim eradito, & quæ plenior radícula fuerit, pro modo crassitudinis in duas, vel plures partes digiti longitudine, diffindito: deinde ex aceto modicè in cacabo æneo coquito, ita ne taleolæ inuri possint. Post hæc in vmbra triduo siccantur, & ita in fideliā picatā recondantur, adiecto passo, vel de fruto, quod supernatet, spissamentoque cunilæ imposito contactū vas pelliculetur. Alia inulæ conditura. Quū radices eius raseris, taleolas, vt supra, facito, & in vmbra triduo, vel etiā quatrīduo siccato, deinde siccatas in vasis sine pice, interiecta cunila, coniecto, cunila imposita, sex partibus acetī vna pars sapē misceatur cum hemina salis cocti, vt hoc iure macerētur taleolę, donec quam minimum amaritudinis resipiant. Postea exēptę iterum siccantur per dies quinq; in vmbra, tum crassamētum vini faculenti, nec minus, si sit, mulsi, & vtriusq; eorum quartam partem boni defruti confundito in ollam, quæ quum inferbuerit, taleolas inulæ adiecto, & statim ab igne remoueto, ac radícula lignea peragito, donec perfectè refrigescant. Postea transtūdito in fideliā picatā, operculo regito, tumq; pelliculato. Tertia eiusdem inulæ conditura. Quum radículas diligenter eraseris, minutè conscissas in muria dura macerato, donec amaritudinem dimittāt. Deinde effusa muria sorba quam optima, & maturissima semine detracto contere, & cum inula misce, tum siue passum, seu quā optimum defrutum adiecto, & vas obrurato. Quidam quum 10  
condiuerunt inulam, muriaq; macerauerunt, exiccant, & malis cydoniis tritis, quæ in defruto, vel melle decoxerant, miscent, atq; ita superfundunt passum, vel defrutum, & vas operculatum pelliculant.

*Nomen.*

Græcis ἐλέγιον dicitur, Latinis helenium à luctu vel fatu Helenæ, vel quia in Helena insula laudatissimum. Columella inulam vocat. Neapolitani *enula campana*.

Cremium esse narrat Theophrastus, radice lignosa, retortida, & multifida, summo terrę adherente. Ramis & folio odorato. Flore inodoro. Siccis locis acrius redolet, mollius autē, quum in vrbānū habitum traducitur. Dioscorides alterum helenium ita describit, quod Cratenas Medicus tradit. Herba est, cubitalibus ramulis, serpilli modo per humū repentibus, foliis lenticulæ circa ramulos, sed longioribus, crebris, radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassa, cortice nigro. Primū genus folia verbasci habet angustioris folii, asperiora, oblonga, caulem quibusdam in locis non emittit, radicem subalbidam, interdum subruffam, odoratam, subacrem, vegetam, magnam. Plinius de primo. Est succi prædulcis, radix est intus candida, & dulcis: breuior, torosior, amariorq; quā siser, per se stomacho inimica. Sed mendum in Dioscoride, quippe non verbasci angustifolii, sed platyphylli folia habet. Apud nos florem fert buphrthalmi aureum, stellatum, fundente scapo recto in summo lunio, & iulio, tres aut quatuor cubitos, aut plus procero, radicis amplæ, & crassioris, odoratæ, carpum ferè æquantis. 40

Quum



Quum lignosum sit simplex specie à Theophrasto ponitur. Agreste suauius Genera.  
oler. A Dioscoride tria recensentur genera.

Primum genus à Dioscoride in montibus vmbrosis prouenire dicitur, sic. Solum.  
coque solo. Secundum genus in Ægypto in maritimis collibus. Columella al-  
to, & pastinato loco. Plinius in Helena insula laudatissimum.

Theophrastus semine carere ait, saepe enim exiccata, tritaque seruisse se in- satio.  
quiunt, sed nunquā germen erupisse. Dioscorides: è suis radicibus agnatæ pro-  
pagines liliorum, aut ari modo seruntur. Columella, Quàm rarissimè ponen-  
da est, vt maiora capiat incrementa, trium verò interuallo pedum feri conue-  
nit, quoniam vastos facit frutices, & radicibus vt oculus harundinis serpit, nec  
est alius cultus ipsius, nisi vt sarritionibus herbae tollantur. Commodissimè  
autem deponentur prima parte Septembris, vel vltima Augusti parte. Palla-  
dus. Februario mēse inula ponitur, quo canneta ponuntur. Seritur oculis, sic-  
ut calami, quos abscindere, & terra leuiter debem⁹ obruere, terra fossa & sub-  
acta, excitatis ad lineam puluinis, quibus eius oculos oportet infodere, trium  
pedum spatio inter se separantur. Plinius, Superuacuum eius semen, quoniam  
oculis radice excisis, vt harundo seritur, vere, & autumnō, magnis seminum in-  
teruallis, nullāve minus, quàm ternorum pedum, quoniam spatiosè fruticat.

*De baccari. CAP. XL.*

20 **B**ACCARIS è coronario genere, vt Dioscorides testatur. Virgilius Maro  
non solum coronariam stirpem, sed fascini depulsoriam scripsit.

— *baccare frontem.*

*Cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.*

Dioscorides somnum suo odore accerlere scripsit, & Plinius. Cuius causam  
Plutarchus Sympotiacorum tertio quærit. Causatur enim leuem auram, &  
blandum floris effluuium, quo in temulentorum corporibus obortæ inæqua-  
litates, aspritudinesque sensim dissipantur, & exteruntur, conciliaturq; tran-  
quillitas, crapula retunditur, excoquiturq; , vnde ad placidam quietem potos  
perducit. Vestibus etiam odoris gratiam inserit, ex Plinio. Ex cuius radicibus  
30 vnguentum fieri apud Aristophanem antiquus comedie author testis est, &  
Athenæus idem memorat.

Dioscorides *Βάκχαειν* vocat, nos potius *πύρχαιν* putamus, nomenclatura in-  
dita propter eximiam fragrantie gratiam cinnamomeæ radicis, ex qua cum  
multa alia, tum vnguen conficiebatur. Et *πύρχαις* apud Athenæum legitur,  
ex qua ferta concinnabantur, qua tempora cingebantur. Latinis baccaris. Ita-  
lis *baccari*. Nomen.

Dioscorides ita delineat. Aspero fruticat folio, magnitudine inter violam  
& verbascum, anguloso caule, iustam cubiti altitudinem ex æquāte, subscabro,  
circa quem coliculi agnascentis modo sobolis fundatur, flore in purpura can-  
dicante, odorato. Radicibus veratro nigro similibus, quibus odor inest cina-  
40



trionio proximus. Plinius. Radices tantum odorata, odor cinnamomo proximus. Nos apud Gariliani fluminis pontem, via qua Romam itur, copiosissime fruticare vidimus. Erat enim foliis asperis, veluti lanuginosis, subrubenti caule, radice cariophyllata, odore halante præstantissimi & suavissimi cinnamomi.

Gracili solo, nec humido prorumpere scripsit Plinius à Dioscoride, qui squallidum, & asperum dixit.

*De rosmarino coronario. CAP. XLI.*

**L**IBANOTIS coronarius frutex non solum coronis acceptus, Dioscoride iuthore, quum eius folia thus redoleant, sed & topiarius: nam apud nos hortorum areas tam eleganti conuectit opere, ut nullum non animal olitoris mangonio suffragante confingat. Præterea fictilibus vasis plantatur, ut folio, quo semper comatur, & odore suo ædium fenestras exornet. Expertus etiam culinis, quum eo ad multa condimenta utantur. Præterea ad mellificia optimus: quippe Varro ex rosmarino apes mel spissum facere dixit: Columella idem scribit itemque Palladius. Libanotim hæc Græcorum fabula comitatur. Libanotim tradunt fuisse adolescentem Assyrium, deos studiosissime colentem, quem invidia mali homines peremerunt. Dolens eius vicem terra, in fruticem emortuo gentilis corpore transtulit, seruato priore eius ingenio, & desiderio, quod erga deos habuit. Hoc verborum inuolucro innuunt Græci thure nil esse diis gratius, unde thuriferis fruticum odoribus numinibus supplicandum Deumque thure nobis reconciliandum.

**Nomen.** Græcis *ῥοσμάρις* & *ῥοσμάριον* dicitur, quasi rosmarinus coronarius. Cassianus Græcus *ῥοσμάριον* vocat, quasi arborecentem, ad differentiam herbacci. Latinis libanotis coronaria accepto nomine à libani, sine thuris odore, quem redolet, adieciimus coronariam ad differentiam umbelliferarum libanotidum aliarum. Romani rosmarinum vocant. Neapolitani *rosmarino*.

**Descriptio.** Dioscorides ita describit. Ramos emittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incaua, supernè virètia, grauitè odorata. Addimus nos. Flore cæruleo, bis florens anno, vere & autumnò. Semine atro, exili, residet sub flore, calice triangulari, tria continens acina, quæ non ubique producit, sed Apuliæ vidimus.

**Celum.** Gaudet cælo aprico, calido, vel temperato. Frigidis regionibus Meridici exponatur.

**Solum.** Solo leui, & sicco, vel sterili, & collibus maritimis gaudet: unde nomen rosmarini.

**Satio.** Propagine, & auulsione feri narrat Plinius, quum semine careat. Democritus autem viuit radice, vel auulsis ramis in terra depactum, & humatum mense Martio. Sed ramulus biennalis, vel triennalis esse debet. Figatur solo, ac circum circa terra optimè calcetur, continuis aquationibus blandiatur, donec radiculas intecisse noueris: idque Martio mense, quum germinare gestiet. Postest



test & semine feri, quum semen habere compererimus. Iulio mense, quum maturum fuerit, colligitur, priusquam decidat, insolatur, inde altè pastinato solo, & in areolis diuiso seritur, leui terra superiniecta irrigando semper, idque Martio mense, vel Septembri. Cultu lætius luxuriat, adultior, & procerior perennat.

*De melissophyllo. CAP. XLII.*

**V**ENIT & in coronamenta folio melissophyllum, Plinii autoritate, idemq; apibus gratissimum. Hoc enim florente mirum in modum gaudent, ut ab eisdem nomen acceperit. Varro ait. Apes maxime sequuntur apiastrum, & examen ubi volunt considerare, eum raram, aliamve rem oblinunt apiastro. Idem Columella, Plinius, & Palladius. Virgilius item,

— in iussos sparge liquores,

*Trita meliphyllo, & cerinthe ignobile gramen.*

Præterea sale, oleo, & aceto condita in acetariis maximè expetitur.

Græcis *μαλισφόλλον*, sine *μελίφλλον*, siue melittena, id nomen ab apum delectatione sibi usurpasse ait Dioscorides. Apud Latinos apiastrum dici Plinii autoritate. Palladius mesphyllum, & citraginem ab odoris similitudine scribit: nam si nates consulantur, citreum malum olent. Varro apiastrum; ab citro Neapoli deflexo nomine, *citrara* vulgò dicitur.

**D**ioscorides ita delineat. Cauliculi & folia ballotæ similia essent, nisi maiora, tenuioraq; nec hirsuta ita spectarentur. Citreum malum olent. Addimus: fert flores albidos, in verticillis copiosos.

Duo apud nos genera, in hortis vnum, in syluis alterum: quod hortis seritur, citricum odorem magis refert, alterum veluti ocimum citratum olet. De hoc fortasse Palladius intellexit, quum citraginem à melissophyllo distinxit, herbas enumerando, quibus apes delectarentur, Aprili, & Iunio.

*De pseudonarda. CAP. XLIII.*

**P**SEUDONARDVS odora stirps flore, & fronde, tanti odoris fragrantia, ut flores omnes, & herbas prouocet. Huius maximus apud nos vsus: nam vestibus iniecta, eas odore cōmendat, & cacumina manipulatim in scopis cōposita ad varios odorū vsus repōnuntur. His dotibus nostro horto serēda venit.

Primum genus quia non minus, quàm nardus suauispirat odore, spicæ nomen sibi arrogauit, vulgò *sticados*. Alterum genus, quod folia, & flores minus suauispirant odore, pseudonardum vocare libuit, quod genuina nardus non sit, cuius veteres scriptores meminerunt. Saliuncaia esse Virgilianam multis eruditis suspicari placuit. Neapolitani *lavanda*, & *lavandula* vocant, quod balneis, & hominum lauacris expeteretur.

Stirps est humilis, virgas profert renes, quadrangulares geniculatas, cubitales, aut longiores, flores circa singula genicula bina, carnosa, oblonga, angusta, colore ab utraq; parte languido in candidū vergente, perpetua carēscēs.



coma, in summo frequentibus spicis in aristas sparsis, flosculis refertis purpureis, radice lignosa, in fibras diuisa, exitu veris, Iunio, & Iulio mensibus spicatur.

Solum.  
Satio.

Gaudet apricis, & petrosis.

Seritur viuiradicibus à matre diuulsis, Octobri ac Nouembri mēsis. Seritur & cacumine. Sed Martio mense, terra circum optimè calcata, vetustate deteriorescit. Eius vita ad quatuor annos. Sed cespes in plures plantulas diuiditur, & singulae quatuor pedum interuallo separatim plantantur.

*De hederæ.* CAP. XLIII.

**H**EDERÆ folia in coronamenta venere, eiusque corymbi in his obrinēt 10 principatum, vt author est Plinius. Placet corymbis & flore: nam odor abest. Ferunt primum omnium Liberum patrem coronam imposuisse capiti suo ex hederæ. Cyllon Liberi patris fuisse adolescentem, & saltatorem Græcia confinxit, qui coram Deo tripudians, allisus terræ periit. Terra in Bacchi honorem in sui nominis fruticem conuertit. Germen è terra progressum vitem amplecti solet, modo quo adolescens Bacchum in tripudiis amplecti consueuerat. Hæc in tutelam Liberi patris putabatur esse, tū quia primus in Græciam ex Indis exportauit, tum quia, vt ille iuuenis semper, ita hæc semper vitens, & sicut ille hominum mentes, ita hæc omnia illigat. Quærit Plutarchus, cur flamen dialis si hederam attigisset piaculum cōmisisset. An quod hederam tan- 10 quam sterilem, & hominibus inutilem, & propter fragilitatem adminiculo egentem, solum vmbra & viriditate oculos capientem non temere in ædibus aliatque innasci permiserunt? quippe quæ plantas complexa maximè noceret, nec solo extirpari facile possit, quo fit vt cœlestium templis penitus amoueatur, vt in æde Iunonis Athenis, ac Thebis in æde Veneris. Nocturnis verò Bacchanalibus adest, vt à Thyasis, & reliquis debacchanalibus abstinerent: nā mulieres bacchicis furoribus correptæ, ad hederam feruntur, & manibus abreptam diuellunt, & dentibus lacerant, vt non omnino incredibilia dicere videantur, qui asserunt hederam, quòd spiritum habeat, quo mentes in furorem conciter, & loco moueat, ebrietatem absque vino inducere, & hilares eos red- 30 dere, qui in furorem procliues fuerint. Andreas Medicus, quum aliquem fortè dolor capitis angeret, qui eius compressu leuatus fuit, vinculum intellexit esse doloris præsens auxilium. Hac igitur medicina opitulans, eorum, qui nimium bibissent, caput reuinciebat hederacea præcipuè corona, facie alioqui non inuenuista corymbis, & foliis virentibus frontem opacat, astrictionisque vehementiam patitur, & postremo refrigerat citra odoris grauitatem. Ob hanc rationem coronam illam vita Baccho dedicasse videtur, qui & potum inueni- rit, & malis inde nascentibus succurrat. Sunt & coronæ, quas tortiles Alexan- drini vocant. Harum ita meminit Chæremon,

*Hederæ, narcissi, & c. circumuoluto circulo*

Torti- 40



*Tortilium coronarum.*

- Hæc Athenæus. Ægyptii Bacchum hederam inuenisse asseriebant, quare illi dedicarunt, authore Diodoro Siculo, vocabantque illi chenoſirin, vt Plutarchus in Onoſiride testis est. Hæc enim vox Oſiridis plantam denotat. Oſirim autem eundem cum Baccho esse multi prodiderunt. Lucius Apuleius in somnis se vidisse Oſiridis sacerdotes dicit, thyrsos, & hederam ferentes, quemadmodum Bacchi sacerdotes faciunt. Sunt qui dicant hederam Baccho dicatam, cum ob historiam, tum ob hederæ naturam. Ouidius in Fastis Nyſiades nymphas Bacchum puerum (querente nouerca) in cunis hederæ cooperuisse scribit.
- 10 Pharnutus ad hederæ naturam retulit. Frequentibus est enim articulis nodosa, quibus significet ebriosos vacillare, & titubare, & portatu faciles, vel quod ebriorum vox, quasi articulata sit, ac titubans, nec vno contextu intelligibilis, quare thyrsus, cuius mucro labente hederæ protegebatur, Baccho dicatus. Eo enim, authore Macrobio, furoris impetus patientiæ vinculo obligandos esse significabatur: nam hederæ vinciendi naturam habet: ebriorum pedes parum suo funguntur munere. Alii contrariæ sunt opinionis, non quod ebrietatē repræſentet, aut quod vino aduerſetur, vt Plutarchus narrat, verum quod ille anni tempestates imitatus sit: nam quum vitigineam coronam deſideraret, & ex anni ætate vitis frondibus vidua eſſet, hederæ faciē cœpit adornare, quæ vitis vice v-
- 20 sus eſt, ſic etiam quod viti ſimilis ſit, & corymborum baccæ vinearum botris reſpondeant. Inimica arbor ſatis omnibus, ſepulchraq; ac muros rumpēs, ſerpentium frigori gratiſſima, vt mirum ſit vllum honorē habitum ei. Eſt & hederacea corona Poëtis aſcripta, nam vnà cum lauro eorum coronam perficiebat, non quia perpetuo virens, diuturna eorum opera futura oſtenderet, ſed per laurum inſitam ingenio vim ac facundiam, per hederam autem & induſtriam peruigili labore partam ſignificare volebant, cuius rei indicium, quod hederæ ſuapte vi admodum imbecilla humi reperet, neq; ſe vnquã attolleret, pertinaci tamen labore, artificioq; peruincit, vt parietibus adhæreſcēs, & paulatim irrepens, ſupra omne faſtigium victrix euadat: vtroque enim opus eſt, ſi
- 30 quis velit excellere, & niſi excelluerit nil proficiet. Eadem ſententia fuit Pindarus, Poëtas lacte, & melle paſci, lac ſæcunditatem ſignificare, mel autem artem labore partam. Athenæus Antocabalos lamborum Poëtas vocat, hederacea corona vti ſolitos. Virgilius ad id,

*Pastores hederæ naſcentem ornate Poëtam.*

- Phalangiū ceruis exitiale eſt, & ceruis medicina eſt hederæ adefa, ex Æliano. Harpæ aues, vt à nidis ſuis beſtiolas adigant, hederam ingerunt. Veſpertilioes hederæ ſuffitu necantur. Apri in morbis ſibi hederæ medentur. Agni morbo non laborant, ſi ſeptem dierum curriculo hederæ paſti fuerint. Vitis autem ſtirpem prope terram aduerſus cantharidas inungunt.
- 40 Græcis *μαρς*, vel *μῆρς* dicitur, quo nomine ſola rigens hederæ ſignificatur. *Nomen.* Sed aliquibus videtur *μαρς* potius dicta à poroſa textura & innumeris ſpira-



culis peruia, quàm à puero Citto saltante, vt fabulant Græci. Est & *κίτρινος* pumex, siue porosus lapis, quale Catoni cissymbion poculum. Dioscorides citharon, à corymbis, corymbia. *Κίτρινος* vt Pausanias tradit Bacchum appellat. Antiquissimi Athenienses *κίτρινος* & *κίτρινος* promiscuo vsu utebantur, quare *κίτρινος* & *κίτρινος* protulerunt. Alii Dionysiam appellauere, quasi Bacchicam. Latini hederam, Pompeius dictam putat, quòd hæreat, id etiam Apuleius confirmat. Alii ab edendo, etenim vetustiores maceries suis radicatis propaginibus enecat, & exedit. Alii hederam, quod edita loca petat, & altè diuagetur, altiores parietes conscendens. Itali *edera*.

*Em. &  
descriptio.*

Quum difficile sit valde describere species omnes separatim, ideo secundum Theophrastum vnâ describemus. Edera multigena est, quædam humi repens, quædam se in altum extollens. Excellarum genera plura, sed trina summa patefcunt, candida, nigra, & helix. Harum item species plures, quippe alia fructu candida, alia etiam foliis. Rursus fructum candidum ferentium, alia maiusculum, densum, & velut in globum circumactum fructum profert, quàm corymbiam quidam vocarunt. Athenienses acharnicam riguant eam appellant. Habet nigra differentias, sed non in hunc modum conspicuas. Sed helix maximis differentiis discernitur, etenim foliis plurimum distat, cum patuitate, tum quòd angulata, concinnioraq; sint, cum hederâ rotundiora, simplicioraq; habeat. Distant enim internodiorum longitudine, atq; etiâ sterilitate, quoniam fructum quædam non ferunt, quod non in hederam transfigurentur, vt quidam volunt, at verò si omnes hederascunt, vt aliis placet; ætatis certè, dispositionisq;, non generis erit discrimen, quemadmodum pyri ad pyrastrum. Tamen eius quoq; folium multum ab hederâ distat, verum id rarum, & in paucis euenit, vt vetustate permutetur, cœu in populo alba, & crotone. Ergo eliceis plura genera, sed quæ conspectiora, summaque occurrunt, tria sunt: Herbacea ac virens, quæ plurima est, secunda candida, tertia versicolor, quam Thraciam quidam appellant. Et harum quæque distare videtur, quippe herbaceæ quædam folio tenuiori, oblongiori, atque etiam densiori, quædam minus hæc omnia habens, & in versicoloris genere, alia folio ampliori, alia minori, macularumque habitu diuersa, pari modo, & magnitudine, colorève distant. Auctu perfacilis herbacea, inque plurimum venit: manifestam quæ hederescat affirmant, non tantum foliis, quæ maiora, latioraque habet, verum etiam germinibus, protinus enim erecta gerit, non inflexa gracilitate, & longitudine. Herbacea verò crassiora, brevioraq;, ac hederâ, vt ferre semen incipit, germen sublime, rectumque edit. Est quidem vniuersa hederâ radice numerosa, densa, flexuosa, furculosa, crassa, nec nimis alta, sed præcipuè nigra, & inter candidas, quæ asperrima, inmitissimaque habetur: quam obrem eius amplexus arbores omnes infestat, omnes enim necat, & exiccat, ablato alimento. Crassatur enim maiorem in modum, atq; arborefcit in tantum, vt per se ipsa hederæ arbor fiat. At-

tamen



tamen ex maiore parte semper super aliud viram degere solet, atq; (vt ita dixerim) amplexu capulis est, ita pro sua natura, vel quiddam eiusmodi illico gerit. Nam ē germinibus radículas assidue inter folia mittit, quibus arboribus, murisq; obrepit, quasi de industria à natura exhibitis, atq; ita humorem auferens, exhaustiensq; arefacit, & si inferius succidatur, nihilominus viuere, durareque potest. Habet aliud discrimen non mediocre in fructu: nam aliud dulcis, aliud vehementer amarus, tam in candida quàm in nigra, indicium quòd alium aues mandunt, alium minimè attingunt. Et si suffrutex sit, per adultam ætatem tantum sibi roboris vendicat, longitudine, crassitudineque proficiens, vt in arborem deficiat. Folia, quum primum pubescit, angulosa, quamplurimum in triangularem faciem exeuntia, vetustiori rotundantur. Pinguia, dura, immortali virore, longo pediculo, læuia superna parte habet. Flore lanugineo suo peculiari modo, etenim florem in toto fructu habet, sed neq; postremis insidentem, neque singulas partes ambientem, in medijs inculcatum, nisi fortè concerni nequeat propter lanuginem. Ab eo Plinius. Ederæ duo genera, prima, vt reliquarum mas, & fœmina. Maior tradit mas corpore, & folio duriori, ac pinguiore, & flore ad purpuram accedente. Vtriusq; autem flos similis est rosæ syluestri, nisi quod caret odore. Species horum generum tres. Est enim candida, & nigra edera, tertiâq; quæ vocatur helix. Eriamnum hæ species diuiduntur in alias, quoniam est alia fructu tantum candida, alia & folio: fructumq; candidum ferentium, alijs densus acinus, & grandior, racemis in orbem circūactis, qui vocantur corymbi. Item seneciū, cuius est minor acinus, sparsior racemus. Simili modo in nigra. Alicui & semen nigrum, alii crocatum, cuius coronis poëtæ vtuntur, folijs minus nigris, quàm quidam Dionysiam, alii Bacchicam vocant, maximis inter nigras corymbis. Quidam apud Græcos etiamnum duo genera huius faciunt, à colore acinorum erythranum, & chrysocarpum. Plurimas autem habet differentias helix, quoniam folio maximè distat. Parua sunt, & angulosa, concinnioraq; quum reliquorum generum simplicia sint. Distat & longitudine internodiorum, præcipue tamen sterilitate, quoniam fructum non gignit. Quidam hoc a tatis esse non generis existimant, primoq; helicem esse, fieri ederam vetustate. Horum error manifestus intelligitur, quoniam helicis plura genera reperiuntur, sed tria maximè insignia: Herbacea ac virēs, quæ plurima est, altera candido folio, tertia versicolor, quæ Thracia vocatur. Eriamnum herbaceæ tenuiora folia in ordine digesta, densioraq; In alio genere diuersa omnia. Et in versicolori, alia tenuioribus folijs, ac similiter ordinatis, densioribusq; In altera neglecta omnia hæc. Malora quoq; ac minora sunt folia, macularumq; habitu distant, & in candidis alia sunt candidiora. Adolescit in longitudinem maximè herbacea. Arborea autem necat candida, omnemque succum auferendo, tanta crassitudine augetur, vt arbor ipsa fiat. Signa eius, folia maxima, atque latissima, mammas erigentis, quæ sunt cæteris inflexæ, racemi stantes, ac subrecti.



Et quamquam omnium hederarum generi radicata brachia, huic tamen maximè ramosa, ac robusta. Ab ea nigra, sed proprium albæ, quod inter media folia emittit brachia, vtrique semper amplectens: hæc est & in muris, quamvis ambire non possit. Itaque etiam pluribus locis intercisa, vivit tamen duratq; , & totidem initia radicum habet, quot brachia, quibus incolumis, & solida arbores sugit, ac strangulat. Est & in fructu differentia albæ nigraq; edoræ, quoniam aliis tanta amaritudo acini, ut aves non attingant. Est & rigens hedera, quæ sine adminiculo stat, sola omnium generum, ob id vocata cissos. E diverso nunquam nisi humi repens chamæcissos. Dioscorides: Hedera differentias multas sortitur, summas autem genere tres. Nam quædam candida 10 est, altera nigra, tertia helix, candida fructum fert candidum, nigra nigrum, ac croci æmulum, quam vulgus dionysiam vocat: helix fructum non gignit, sed albas habet viticulas, & folia parva, angulosa & concinniora. Virgilius vtriusque hederæ, albæ nigræve meminit.

*Candidior cygnis hedera formosior alba.*

arque

— *edera pandunt vestigia nigra.*

Calum.

Hedera, ex Theophrasto, calores odit, frigus adamat, quare feruidis minus potest provenire. In Asia hederam enasci negant, sed in India visam in monte, cui Mero nomen affirmant, quo Liberum patrem ortum fabulæ aiunt. Quæ de causa Alexander, quum ex India aliquando descenderet, coronatus & ipse, 20 & exercitus ibat. Harpalus verò & in Media tantum locare eam contendit, serendo sæpe in hortis Babylonis, & curiose colendo, sed nihil efficere potuit. Hæc enim nullo pacto vivere valebat, sicut reliqua, quæ aduecta de Græcia sunt, hospitari patiebantur. Hæc igitur ob cæli conditionem regio recusat. Ab eo Plinius. Edera iam dicitur in Asia nasci. Negauerat Theophrastus, nec in India, nisi in monte Mero. Quin & Harpalum omni modo laborasse, ut sereret eam in Medis, frustra. Alexandrum verò ob raritatem ita coronato exercitu, victorem ex India rediisse, exemplo Liberi patris, cuius dei nunc & adornant thyrsos, galeasq; etiam & scuta, in Thraciæ populis in solennibus sacris. In frigidis terris nasci cecinit Virgilius. 30

— *at sceleratum exquirere frigus*

*Difficile est, picea tantum, saxiq; nocentes*

*Interdum, aut hedera pandunt vestigia nigra.*

Solum.

Cassianus aquosis agris gaudere dixit. Adreas apud Athenæum hederam citra cultum ubiuis copiosam provenire dixit.

Salio.

Cassianus plantari ante Calendas Nouembres, & à Calendis Martiis. Columella idibus Februarii, vel Calendis Maii seri oportere. Seritur & geniculis suis & ex his radices dimittunt, quum maximè omnium viuax sit, seu arbores scandens amplexu suo perstringat, seu in terra abdita ima subeat. Nam de fixa quoque nimirum erūpere valet: spissitate, ac ore quæ suo seruari aliquantulum 40 æpotis potest. Longè ab arboribus seri debet, obest enim maximè sua vicinia:

dumc-



numerosa enim radice cohaeret, multoque indiget alimento, quæ ascendere, amplecti, strangulare, atque irrepere apta est. Facilis est generationis, nam in multis creatur, & quod mirabilius, visam esse in cornibus cerui aliquando. Hæc Theophrastus. Plinius verò: Ac non in nouissimis cauetur, ne fabis florentibus attingatur hedera. Id enim noxium, & exitiale ei est tempus. Seritur etiam palo: ex qua satione insitio reperta est. Agricola sedulus casam sepi munimento cingens quo minus putrescerent sudes limen subdidit ex hedera. At illæ viuaci morfu apprehensæ, suam ex alieno fecere vitam, apparuitque truncum esse pro terra.

10 Hedera laborem omnem veretur, si Propertio credimus canenti:

Cultus.

*Aspice quos summittat humus formosa colores,  
Et veniant hedera sponte sua melius.*

Decoros dabit corymbos, inquit Cassianus, si ternum conchyliorum crematorum cinere conspergatur, aut alumine rigeretur. Nigra vertitur in candidam, si terra alba madens humore, octo dierum spatio radicibus infundatur.

Ars.

Theophrastus hederam calidam dicit, quod ex ea fiant ignaria. Ab eo Plinius. Calida hedera, & omnes, ex quibus ignaria fieri solent: teritur lignum ligno, ignemque concipit attritu, excipiente materia aridi fomitis, fungi, 20 vel foliorum facillimè conceptum. Sed nihil hedera præstantius, quæ teratur lauro, laurumque terat. Cato. Si voles scire in vinum aqua addita sit, nec ne, vasculum facito de materia hederacea. Vinum id, quod putabis aquam habere, eodem mittito, si habebit aquam, vinum effluet, aqua manebit: nam non continet vinum vas hederaceum. Ab eo Plinius. Ederamira proditur natura, ad experienda vina. Si vas fiat ex ligno eius, vina transfluere, ac remanere aquam, si qua fuerit mista. Sed id falsum diximus in Magia nostra naturali.

Materia.



# IOAN. BAPTISTAE

## PORTÆ NEAPOLITANI

### VILLAE

LIBER DECIMVS

SIVE

HORTVS OLITORIVS.

PRO OEMIUM



**E**CORONARIO horto egressi, olitorium ingredimint, ibi enim cremia, & frutices inspexistis, hinc herbacea conspicietis: nouissimum genus, in quod stirpes omnes, & 10 terra nascētes principio digessimus. Licuit enim mediocriter agrolationis rei imbuto simplicis cultus tractationē pramittere, vt quæ multiplicis operationis foret, facilius perdisceretur, ne vestra delusa spectatione delapsi videremur. Olitoriam rem aggrediemur, sanè perquam dignam, cui strenuam seduli operā nauemus. Marcus ille antiquissimus Cato secundum locum tribuit horro iriguo, & si suo tempore vinum tanto pretio non fuisset, vni horro principē locum tribuisset. Cicero libro de senectute: Nō segetibus solū, & pratis, & vineis, & arbutis res rusticæ laxa sunt, sed etiam hortis. Columella hortorum cultū insigniter neglectum fuisse quōdam 20 veteribus agricolis narrat, suo tempore vel celeberrimū, siquidem quum parciore apud priscos esset frugalitas, largior tamē pauperibus fuit vsus epularum, lactis copia, ferinaq; ac domesticarum pecudum carne, velut aqua, frumētūq; summis, atq; humillimis victum toleratibus. Mox quū sequēs, & præcipue suæ ætas dapibus libidinosus sua pretia cōstituerit, cœnæq; non naturalibus desideriiis, sed censibus æstimentur, plebeia paupertas summotā à pretiosioribus cibis, ad vulgares cōpellitur. Plinii tempore statim faciebant iudicium nequam 30 esse in domo matrem familias, (etenim hæc cura fœminæ dicebatur) vbi indiligens esset hortus. Horri maximè placebant, quia nō egerent igni. parcerētq; ligno, expedita res, & parata semper, vnde & acetaria appellantur, facilia concoqui, nec oneratura sensum cibo, & quæ minimè accenderent desiderii panis. Et si hortorum cultus diligentius Columellæ, quàm maiores tradiderint, præcipiendus fuit, quanto nobis copiosius pertractādus fœlici Campaniæ solo, indulgentissimoq; cœlo ortis erit? Vbi humi facilitate, cœliq; placiditate her- 40



bz sunt perennis prouentus, restibilisq; feracitatis, sibiq; gradatim succedunt, adeoq; lasciuiunt, vt idem olus ter, quater anno seratur, demetaturq; In quibus assiduus vsus, & esus multaadinuenit, nec parum multa inuenturus. Nos primum acetaria olera, post condimentaria, demum escaria, postremo cartilagineum genus, tum quod supraterram, tum quod sub terra conuascitur proferemus. Sed prius de cœlo, solo, & remediis horti aliqua prædicturi.

*Quid hortus, & de Priapo hortorum deo. C A P. I.*

**H**ORTI si plurali numero proferantur, non solum olerum, aliarumque herbarum, sed arborum quoq; constitutum locum significat, vt horti Alcinoi, Salustiani, Luculliani, & Pompeiani. Fuit etiam eius significatio, & si singulari numero proferatur, adeo latissima, vt etiam omnis villa comprehenderetur, Festo Pompeio authore. In duodecim tabulis legum nostrarum, inquit Plinius, nusquam nominatur villa, semper in significatione ea hortus. In horti vero herediū. Dicti horti sunt, quod ibi oriantur, qui arma capere possint. Ab aliis vero horti dicti, quod ibi olera nascerentur: olusq; dicitur Theophrasto omnis herba, quæ cibario vsui oritur. Alii ab alendo, quod oleribus alerentur homines, antequam fruges repertæ essent. Varro nomen ab olla deducit. Nonius & Festus inter aspirata connumerant. Sed si etymologie rationem spectemus, ortus sine aspiratione scribendum esset, à doctioribus vero receptus vsus fecit, vt  
 10 aspiretur, fortasse ad differentiam participii ortus. Nobis vero olitorius hortus erit circumscriptus in villa locus, in quo olera deponimus, nomenq; ab oriendo deducimus, quod in hac villæ parte festinanti, & copiosius quam alibi ro-  
 20 ro anno herbae oriantur. Sed de hortorum deo dicamus aliqua. Hanc rem, inquit Plinius, comitata est & religio quædam, hortosq; & fores tantum contra inuidentiū effascinationes dicari videmus. In remedio satyrica signa, quæquam hortos tutelæ Veneris assignante Plauto. M. Varro sui de re rustica libri initio Venerem adueneratur, cuius procuratio hortorum, quo nomine rustica vinalia instituta. Cateri autem Priapum hortorum deum voluerunt, & si M. Var-  
 30 ro inter deos Semnones adnumeret, qui neq; cœlestes, neq; terreni essent, à Græcis vero inter deos receptus, propter eam corporis partem, à qua omnium animantium sit ortus. Sed ratio cur hortorum præsidio Priapus fuerit, esse potest, quod sicut pars illa omnium fecundissima, & generationis causa existit, sic in villa nil hortis fecundius: nam & si ceteræ villæ partes semel quid annuatim producant, horti semper sunt perennes. Phurnutus ita eum depingit, vt omnis generis fructus in suo sinu gerat, quod fructuum indicet copiam, qui intra terre sinum nascuntur, & ostenduntur. Deus dicitur, quod eius sit & seruare, & tueri, quæ genuerit. Falcem manigerit, cuius vsus in putandis vineis, & arboribus est, vt putatione omnia fertilia reddantur. Egyptii, qui tum publicas, tum religiosas res non sine quadam naturali ratione figurant, aliter  
 40 eum depingunt; dextra sceptrum gestantem, perinde ac si ab eo omnia terra



marîq; genita sint. Sinistra sui ipsius ichthyphallum tenentem, quo semina ha-  
mo aspersa in apertum mittat. Columella de eius effigie,

*Sed truncum fortè dolatum.*

*Arboris antiqua numen venerare ichthyalli:*

*Terribilis membri, medio qui semper in horto*

*Inguinibus puero, pradoni falce minuitur.*

Dictus Græcis ἰθύφαμος: nam φαμός Priapus est, ἰθύς rectus, quasi columnam  
recti membri denotans. Item legitur,

*Astans inguinibus columna nostris.*

Apud Corinthios, ut Strabo refert, magna veneratione Priapus coleba-  
tur, nec in templo solum, sed in agrestibus locis, ubi caprarum pascua, & apum  
examina essent. Pausanias in Boëticis dicit, Ægyptios hircum vocasse ob eam  
corporis partem, à qua omnium sit ortus. Orpheus eum protogonon vocat.  
Apud Lampfacum Priapo lætabilis victima asellus erat, vel quia, ut Ovidius  
in Fastis, Lotus pudicitiae dum insidiatur Priapus, asini clamore excitata nym-  
pha, amatoris libido detecta est: vel quum, ut Higinius ait, inter asellum, &  
Priapum de virilis membri magnitudine ortum esset certamen, in eo su-  
perior fuerit asellus; vel, ut Lactantius, quum in hoc animali genitalis mem-  
bri magnitudo enormis sit, nulla huic deo victima aptior poterat sacrificari:  
vel, ut ego auguror, asellus hortos ingrediens, teneras & nascentes herbas pe-  
dibus conculcando, & dentibus detruncando auidissimè depascitur, unde &  
hortorum populator, hortorum custodi deo immolabatur, ut capra Miner-  
æ, deæ deuastratrix, & hircus Baccho vitium erosor: vel quòd nudata carne  
caluaria asini medio horti defixa contra eorum effascinationes sit amuletum. 10

*Quis locus hortis deputetur. C A P. II.*

**H**ORTI locum Græci pariter & Latini circa ædes eligunt, longè ab area.  
Cassianus. Horti constructio res per maximè necessaria in vita, consti-  
tuereq; eum conuenit, & ad sanitatem, & ad vires à morbis reficiendas non  
procul ab ædibus, sed in vicinia, ut & delectationem ex aspectu capiamus, &  
iucunditatis ex odoris fragrantia participes simus. Situs non secundum ven-  
tum arearum, ne à tenuissimis palearum particulis inde allatis herbae perdan-  
tur. Columella locum prius conuenire dixit, si permittit agri situs, iuxta vil-  
lam, præcipue pinguem, prouidendumq; ne hortus areæ subiaceat, ne per  
trituram venti possint paleas, aut puluerem in eum perferre: nam utraq; sunt  
oleribus inimica. Ab eo Palladius: Hortus domui proximus esse debet, ster-  
quilinio maximè subiectus, cuius succo sponte fecundetur. Ab area longè  
litus sit: nam puluerem palearum patitur inimicum. 20

*Quale solum, & cælum hortos deceat. C A P. III.*

**P**OSIT loci electionem, sequitur soli, & cæli: & si nos singularis cuiusque  
herbae peculiare solum, cælumq; designabimus, lubet tamen in vniuer-  
sum 40



sum aliqua præfari. Theophrastus pingue solum oleribus conuenire dixit, olera enim radices in profundum non adigunt, vnde id sugunt, quod summa tellure suppeditatur, quod neq; exiguum, neq; exutile esse debet. Cassianus suo de Agricultura libro terram describens oleribus aptam, probat eam, quæ æstu neq; resiccat, neq; magnis hiatibus rumpatur, neq; argillosam, vel asperam. Quæ enim per æstatem resiccat, implantata perdit, aut tenuia & imbecillia reddit. Quæ argillosa, si ex æquo sterco ei ammisceatur, vix idonea redditur. Quæ hiascit, inutilis penitus. Aspera neq; nutrire, neq; recipere quicquam potest. Asperi arenosiq; loci, qui multum limum recipiunt, pauci sunt oleribus idonei. Sed ita deprehendes aptam. Terram aqua dissolue, & laua, & si quid limi habere comperies commodam iudicabis, si plus aquæ, ineptam: eandem etiam iudicabis, si manibus, velut ceram emolliendo glutinosam comperies. Columella pingue solum oleribus tribuit, & quale oporteat esse, quibusve signis dignosci, carminibus elegantissime describit:

*Principio sedem numerofo prabeat horto  
Pinguis ager, putres glebas, resolutaq; terga  
Qui gerit, & fossus graciles imitatur harenas.  
Atque habilis natura soli, quæ gramine lato  
Parturit, & rutilas ebuli creat vuida baccas.  
Nam neque sicca placet, nec quæ stagnata palude  
Perpetitur querula semper conuitia rana.  
Tum, quæ sponte sua frondosus educat ulmos,  
Palmitibusq; feris latatur, & aspera syluis  
Achrados, aut pruni lapidosi obruta pomis  
Gaudet, & iniussi consternitur ubere mali,  
Sed negat helleboros, & noxia galbana succo,  
Nec patitur taxos, nec strenua toxica sudat,  
Quamuis semihominis vesino gramine facta  
Mandragora pariat flores, mæstamq; cicutam,  
Nec manibus mitis ferulus, nec cruribus aque,  
Terga rubi, spinisq; ferat paliuron acutis.*

Palladius, Et si terra omnis stercore mista horto conueniat, tamen hæc genera sunt in electione vitanda. Creta, quam argillam dicimus, atque rubrica. Cælum verò exoptat apertum, apricumq; arboribus liberum & omni vmbra, & temperatum. Nam calidis, siccisq; locis herba æstate ad extremum ariditatis perueniunt, intereuntq; nisi assidua pluuia, vel aqua organis hausta rigentur: contrà quæ locis frigidis, se sustinere non possunt. In locis vmbrosis parum vtilitatis excipimus: vnde temperatum cælum, vel calidum exposcunt, vt omni tempore conualescant. Humidis locis æstate valent, hyeme laborant, sic hyeme valent, æstate peruruntur. Terram emendare possumus, cælum nullo modo permutare, ob id circa cæli electionem laborandum.



*Quòd horti locus oportet sit irriguus. C A P. IIII.*

**Q**UOD maximè refert in horti electione est, ut locus sit irriguus, qui adueniente riuo, dicit Columella, vel si non sit fluens aqua, fonte putea-  
li possit irrigari. Sed ut certam perennitatis puteus habeat fidem, tum demum  
effodiendus est, quum sol vltimas partes virginis obtinebit, id est, mense Se-  
ptembri ante æquinoctium autumnale, siquidem tum maximè explorantur  
vires fontium, quum ex longa siccitate æstatis, terra caret humore pluuiali.  
In suis verò carminibus,

*Vicini quoque sint amnes, quos incola durus  
Attrahat auxilio semper sitientibus hortis,  
Aut fons illachrymet putei non sede profunda,  
Ne granis hausturistendentibus illa vellat.*

A quo Plinius, Hortos riguos maxime habendos, si contingat profluo  
amne, si minus è puteo pertica, organisve pneumaticis, vel rollenonum hau-  
stu rigandos. Palladius. Felix positio est, cui leniter inclinata planities cur-  
su aquæ fluentis per spatia discreta deriuat. Si fons desit, aut imprimendus  
est puteus, aut si nequeas hoc, piscina superius construenda est, ut illinc a-  
quas pluvia conferente, hortus per æstiuos rigeretur ardores. Si hac omni  
facultate carueris, semper altius tribus, vel quatuor pedibus ad pastini simi-  
litudinem fodies hortulum, qui sic cultus negligat siccitates. Sed Vindanio  
nius locis aquâ carentibus hortum tali artificio construit. Spatium terræ ad  
hortum electum, pedali, vel cubitali per funditate defodit, & ablata terra,  
regulas in effossum locum substernit, coniecit pinguem terram supra. Alii  
pro regulis pavimentum tectorio opere inducunt, complanantque, tum ter-  
ram supra, & sterces superiniiciunt: ambiatur etiam muris locus, ut nequa-  
quam aqua ad rigandum affusa foras distundi possit, deinde serunt, hyeme  
pluuiali aqua contenti, æstate rigantes, neque enim æstate indigent humore,  
quum hyberna humiditas loco conseruetur, ne in vicinos locos delabatur. Alii  
duos faciunt hortos, hyemalem, qui ex pluuiis opem sentit, alterum æstiuum  
in loco vmbroso, ad Arctum verso. Theophrastus narrat olera omnia aquam  
diligere. Aquarum optimæ, quæ dulces, & frigida sunt, pessimæ quæ salsa, &  
rarefactu difficiles notantur. Omnium optimæ, quas Iuppiter dederit: his e-  
nim animalia noxia interim creduntur. Salsa aqua vitanda sunt, quia dere-  
rius nutrire terrenas plantas queunt, quàm dulces, adurunt enim, augeri que  
prohibent. Quibusdam priuata naturæ oleribus, priuata alimenta exhibere  
par est, salisq; humoribus iuuantur, ut brassica, beta, ruta, eruca, quæ si salis  
aquis rigentur, meliora euadunt. Sed aqua potabiles frigida idoneæ sunt, &  
haud exiguas sibi partes vendicant ad alimenta, & incrementa olerum, per-  
coquunt enim propter caloris circumobstantiam, & propter radicum refri-  
gerationem: ob id olera his aquis rigata, meliora euadunt. Ex cœlestibus no-  
cturnæ,



Eurus, & aquilonia præstant, & ob eandem causam calidæ diffundunt, & hu-  
 mefaciunt, & insitum calorem debilitant. Aquarum mixtura utilis est, quum  
 altera dura, & incocta, altera mollis & placida, vel si terrenam misturam se-  
 cum ferant, ut in turbulentis, stercoreosisq; humoribus. Aquæ contumacia in-  
 iecto lino emollitur, & putealis tenuitatem admiscens scatebris lurulentis.  
 Rigandi hora vel matutina, vel vespertina, ne aqua feruescens sole officiat. A  
 quo Plinius. Peculiaris medicina raphano (brassicam intelligit) betæ, rutæ, cu-  
 nilæ, in salis aquis, & alioqui plurimum suavitati, & fertilitati conferunt, cæ-  
 teris dulcium aquarum rigua profunt. Vtilissimè ex iis quæ frigidissimæ, & quæ  
 10 potu suauissimæ. Minus utiles è stagno, & quas elices inducunt, quoniam her-  
 20 barum semina inuehunt. Præcipuè tamen imbres alunt: nam & bestiolæ in-  
 nascentes necantur. His horæ rigandi matutina, atq; vesperta, ne inferuescat  
 aqua sole. Apud nos si non est altius attollenda aqua, tympanis uliotes utun-  
 tur, hæc enim per aperturas hauriunt aquas in ambitu, redduntq; eas per co-  
 lumbaria secundum axem. Si verò altius attollendæ sint, rotæ ambitu affigun-  
 tur modiolis, ut pleni aqua, & in sublimè elati, reddant aquas in castellum. Sed  
 hoc frequentius organo utimur. Inuoluitur sparrea funis circa rotæ circumfe-  
 rentiam, demissaque ad imum putei collocantur in ea situla lignæ congioles  
 20 pendentes, ut rotæ versatione attollantur in summum situlæ, quæ denuo co-  
 30 gentur inuerti, & infundere in castellum aquam quam extulerant. Id interdum  
 faciunt quum solis feruore cessant ab opere. Vesperti verò ostiolum reserant  
 sub castello, quo reserato subiectus canalis excipit aquam ex castello effluen-  
 tem, ut circa hortum excernat. Alii deinde canaliculi excipiunt, & in areas im-  
 partiuntur ordine collocati, tota nocte residente in areolis aqua.

*De fimo oleribus idoneo. C A P. V.*

OLERIA omnia aquam, fimumq; concupiscere Theophrastus scripsit, &  
 magis quæ infirmiora sunt, quum maiori, copiosiori q; alimento indige-  
 ant: Hyberna magis, quam æstiuæ, ruta excepta, quæ fimi aspernatrice est. Fi-  
 mum stipularium maxime laudat, iumentorum vitiosum putat, quod maxi-  
 30 me inarescat. Fimum unà cum sacu intermistum potissimum disponunt. Qui-  
 dam inter serendum superiaciunt, & stercore humano inconcocto ad succum  
 probe conficiendum utuntur. Oleribus paratur succus simul à fimo, & ab aqua,  
 quum multum humoris ab eis appetatur: volunt enim foliorum usum præ-  
 bere, non fructum, quum folia tam elaborato succo non egeant, ut fructus.  
 Græci: primum sterces oleribus optimum, cinis tenuissimus, & natura calidus,  
 occidit enim pulices, & vermes, & eiusmodi bestiolas. Secundum colum-  
 binum, quod ipsum itidem bestias necare possit. Quidam columbino asini-  
 num præferunt, quod olera dulciora reddat. Optimum caprinum eadem præ-  
 stare valens. Sed in carentiis alia etiam stercorea, sed non recentia, in usum veni-  
 40 re possunt, recentia bestias gignunt: sint saltim annua, & ligonibus pertractata.



Ex his Fronto maximam iniuriam olitori fieri posse scribit, si anserinum ster-  
cus muria dissolutum, oleribus aspergatur. Columella optimum ster-  
cus asini  
ad hortorum vsum esse dicit, quia minimum herbarum creat, proximum vel  
armenti, vel ouium, si sit anno maceratum: nam quod homines faciunt,  
quamuis habeatur excellentissimum, non tamen necesse est adhibere, nisi  
aut nudæ glareæ, aut sine vlllo robore solutissimæ arenæ, quum maior scilicet  
vis alimenti desideretur. In carminibus tempus præsignat,

*Post ubi Rhypha torpentia frigora bruma*

*Candidus aprica Zephyrus relegauerit aura,*

*Sydereoq; polo cedit lyra mersa profundo,*

*Veris & aduentum nidis cantabit hirundo:*

*Rudere tumpingu, solido, vel stercore aselli,*

*Armentive fimo saturet ieiunia terra,*

*Ipse ferens olitor diductos pondere qualos.*

*Pabula nec pigeat fesso prabere nonali,*

*Immundis, quacunque vomit latrina, cloacis.*

*Pastinandi tempus, culius, & seminum ortus.* CAP. VI,

**P**ASTINANDI, pastinandi que tempora duo dicit Columella, quoniam  
duæ quoque sunt olerum sationes: nam & autumnò, & vere plurima se-  
runtur, melius tamen vere riguis locis, quoniam & nascentis anni clementia  
excipit prodeuntia semina, & sitis & statis restinguitur fontibus. Curabimus vt  
ager, quem vere conseri oportet, autumnò circa calendas Nouembris pasti-  
netur. Quem deinde velimus autumnò insituere, mense Maio conuertemus,  
vt aut hyemis frigoribus, aut æstiuis solibus, & gleba soluat, & radices her-  
barum necentur, nec multo ante stercoreare debemus, & quum sationis ap-  
propinquabit tempus, ante quintum diem exherbandus erit locus, stercorean-  
dusq;, & ita diligenter fossione iterandus, vt fimo terra commisceatur. Igitur  
solum, quod conserere vere destinauerimus, post autumnum patiemur estof-  
sum iacere brumæ frigoribus, & pruinis inurendum. Quippe è contrario sicut  
calor æstatis, ita vis frigoris excoquit terram, fermentatamq; resoluit. Palladi-  
us ab eo: Serendi tempora, licet per menses certa signemus, tamen secundum  
loci, & cœli naturam vnusquisq; custodiat. Frigidis locis autumnò satio cele-  
rior fiat, verna verò tardior. Calidis autem regionibus & autumnalis serior fi-  
eri potest, & verna maturior. Quæcunq; serenda sunt, quum Luna crescit, se-  
minentur: quæ secanda sunt, vel legenda, quum minuitur. Sementes horten-  
sium, Theophrastus inquit, quibus seri singula solent, tres certè notantur. V-  
na hyberna, altera æstiuæ, tertia quæ inter eas cadit post hybernū solstitium,  
quas ita appellant, non ratione satus, sed ortus, vsusq;. Satus enim in cōtrariis  
sermè temporibus consistit. Prima mense Iulio post æstiuum solstitium, quo  
brassicam, radiculam, rapam, & quæ sementis postera vocant, vt beram, lactu-  
cam,



ram, erucam, sinapi, coriannum, anethum, & nasturtium serere solent. Secunda post brumam mense Ianuario, qua seminant, defiguntq; porrum, apium, gethyum, & atriplicem. Tertia, quam æstiuam appellant mense Martio, qua cucumis, cucurbita, blitum, ocimum, portulaca, satureia seruntur. Sed prosequamur varias earum generationes, ex eodem: & primò alia semine, alia ab radice, auulsione, & ramo oriuntur. E semine maximè generalis est omnium generatio. E radice allium, cæpa, bulbus, & capitata omnia. Sed oportet quæ seruari ad sationem debent, vt earum interna humiditas pinguior sit: nam si est aquosa, dissoluitur, altera, vt tunicis muniatur, quatum præsidio intus humor cohibeatur, ne exhalet: nam quæ tenui cortice sunt, rugantur cito, 20 bit enim pars tenuis. Exemplum rapi, & raphani, sed bulbus & scilla quum munimentum aliud à natura comparatum habeant, scilicet tunicas plures, & lentorem, diutius viuunt. Brassica auulsione nascitur, ruta, sisymbrium, serpillumq;. Hæ nanq; decisæ, & depactæ radices fundunt, adolescuntque. Sed ocimum, & amatacum à summo recisa panguntur, & si exuētioris naturæ sunt, germina fundunt, cultumq; suscipiunt, vt diu incolumia perennent. Omnia translata meliora, grandioraq; fiunt: porrorum enim, radicumque magnitudo ex translatione. Omnia auctu faciliora, grandioraq; veniunt seminibus depositis, quàm fusim satis. Caule reciso omnia regerminant, exceptis 20 quæ ~~dicuntur~~ dicuntur. Sed euidentissima & vsitata, ocimum, lactuca, & brassica. Lactucæ quidem regerminatos caules suauiores affirmant, primos esse lactuosos, atq; amatos, utpote minus concoctos, alii è contratio volunt, secundos scilicet lacte refertiores constare, sed dulciores sentiri, quandiu teneri sunt. In brassica suauiores regerminatos caules omnibus constat. Radix & rapa si terra cooperiantur, vsq; ad æstatem durant, & crescunt, quod olitores de industria faciunt, non enim regerminant, nec folia promunt, nisi aggestam humum eieceris, quod etiam in reliquis deprehendi facile potest. Ab eo Plinius. Nascuntur omnia aut semine, aut auulsione. Quædam semine, & surculo, vt ruta, origanum, ocimum: præcidunt enim & hoc quum peruenit ad 30 palum altitudinis. Quædam & radice & semine, vt cæpa, allium, bulbi. Eorum verò quæ à radice nascuntur, radix & diuturna, & fruticosa est, vt bulbi, getbyr, scillæ. Fruticant alia & non capite, vt apium, beta. Caule reciso ferè quidem omnia regerminant, exceptis quæ non scabrum caulem habent. Et in vsum verò ocimum, raphanus, lactuca. Hanc enim suauiores putant à regerminatione. Raphanus utiq; iucundior detractis foliis, antequam decaulescat: hoc & in rapis. Nam & eadem direptis foliis cooperta terra crescunt, durantq; in æstate. Vtiq; meliora nascuntur acervatim sato semine, quàm sparso.

## De hortorum remediis contra cæli noxas. CAP. VII.

40 **N**unc afferamus remedia hortorum, ab antiquis rei agricolationis authoribus descripta. Sed quia circa duo videntur versari, & contra cæli



noxas, & contra innascentium animalium iniurias, indicabimus primò quò-  
modo à cœli noxis tueantur. Grandini obuiam ita credidit Philostratos, si  
quis speculum incumbenti nubi ostendat. Vel si hyænx, crocodili, aut phocæ  
pellem loco circumducas, eandemq; præ foribus domus suspendas. Vel si cla-  
ues multarum ædium per circulum regionis funiculis illigaueris. Vel si in do-  
mibus tauros statues ligneos. Vel si palustrem testudinem dextra manu supi-  
nam posueris, modica terra circum eam aggesta, ut se nequeat vertere, & abi-  
re. Sunt qui dicant hora sexta diei, vel noctis circumgestationem testudinis  
fieri oportere, & depositionem. Vel hippopotami pellis tegmina ad singulos  
horti terminos posita. Quæ valdè indecora opinor, vitanda, & non creden-  
da, sed adscripsi, ne quid videat eorum præterisse, quæ veteres prodiderunt.  
Palladius contra grandinem etiam multa scribit. Panno roseo mola cooperi-  
tur. Item cruenta secures contra cœlum minaciter leuantur. Item horti spati-  
um alba vite præcingitur. Vel noctua pennis patentibus extensa suffigitur. Vel  
ferramenta, quibus operandum est, sepo vnguntur vi sino. Grandini ereditur  
obuiare, si quis crocodili pellē, vel hyænx, vel marini vituli per spatia posses-  
sionis circumiterat, & in villæ, aut cortis suspendat ingressu, quum malum viderit  
imminere. Item si palustrem testudinem dextra manu supinam ferens vineas  
perambulet, & reuertus eodem modo sic illam ponat in terra, & glebas sordi-  
cis obiciat curuaturæ, ne possit inuerti, sed supina permaneat. Hoc facto  
fertur spatium sic defensum nubes inimica transcurrere. Nonnulli ubi instare  
malum viderint, oblato speculo imaginem nubis accipiunt, & hoc remedio  
nubem (seu ut sibi obiecta displiceat, seu tanquam geminata alteri cedat) a-  
uertunt. Item vituli marini pellis in medio vinearum loco vni superiecta vici-  
culæ, creditur contra imminens malum totius vineæ membra vestisse. Con-  
tra rubiginem hæc docentur à Columella in suis carminibus.

*Hinc mala rubigo virides ne torreat herbas,*

*Sanguine lactentis catuli placatur, & extis.*

*Hinc caput Arcadici nudum cute fertur aselli*

*Tyrrenum fixisse Tages in limite ruris.*

*Utg, Iouis magni prohiberet fulmina Tarchon,*

*Sape suas sedes percinxit vitibus albis.*

*Hinc Amythaonius docuit qua plurima Chiron,*

*Nocturnas crucibus volucres suspendit, & altis*

*Culminibus vetuit feralia carmina flere.*

Anatolius, Omnia semina tum hortensia, tum arualia ab omni bestia &  
integra, & illæsa conseruabis, si ipsa in succo cucumeris syluestris præmacera-  
ta seminaueris. Incorrota autem manent olera in testudinis testam consemi-  
nata. Floribus euadet hortus, si loto tusa, & in aquam coniecta eum resperse-  
ris, aut fœnogræco in aqua trito sulcos irroraueris, aut asini caluariam in  
medium hortum deposueris. Palladius. Omnia semina horti, vel agri ferun-  
tur



tur ab omnibus malis, ac monstribus tuta seruari, si agrestis cucumeris tritis radicibus antè macerentur. Item equæ caluaria, sed non virginis, intra hortum ponenda est, vel etiam asinæ. Creduntur enim ea fecundare sua præsentia, quæ spectant. Philostratus etiam hippopotami pellem intra regionem deponit, ne eò loci fulmen cadat.

*Remedia contra bestiolas horto innascentes. CAP. VIII.*

**N**UNC ad bestiolas hortis noxias noster se conuertat sermo, & primò ab erucis incipiemus: maxima & vniuersalis olerum lues. Theophrastus brallicis innasce erucas dixit, quas humor collectus interimit, & fimus aceruatim injectus. Anatolius Græcus ad eas fugandas hæc docet. Virigineum cinerem triduo macerato aqua, inde olera aspergito. Vel bitumine & sulphure ea suffumigato. Vel olerum semina ficulnei cineris lixiuio macerato, & serito. Vel vrina & amurca ex æquo mistis, vel alterius horti erucis exceptis, & aqua cum anetho coctis, & refrigeratis hortos irrorato. Vel menstruada mulier discalceata, crinibus pallis, palliolo induta, nullo circa pudenda perizomate, hortum circumiens per medium egrediatur. Vel fungos sub nucis arbore nascentes suffumigato. Quin & vespertilionis stercore, & alii lignis suffitis, vt vapor per hortum dispergatur, erucæ necabuntur. Columella. Vbi verò apricis regionibus post pluuias noxia incesse runt animalia, quæ à nobis appellantur erucæ, Græcè autem *καμπαι*, vel manu colligi debent, vel matutinis temporibus frutices olerum concuti. Sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius in superiorem partem prorepunt. Id autem superuacuum est facere, si ante sationem semina, vt iam prædixi, succo herbarum sedi macerata sunt. Nihil enim sic medicatis nocent erucæ. Sed Democritus in eo libro, qui Græcè inscribitur *ὑπὲρ ἀντιπράδων*, affirmat has ipsas bestiolas enecari, si mulier, quæ in menstruis est, solutis crinibus, & nudo pede vnamquamq; aream ter circumbeat, post hoc enim decidere omnes vermiculos, & ita emori. In suis verò carminibus elegantissimè eadem docet,

*Sed ne dura nouas segetes animalia carpant,  
Profuit interdum medicantem semina pingui  
Palladia sine fruge salis conspergere amurca,  
Innatæve laris nigra satiare fanilla.  
Profuit & plantis latices infundere amaros  
Marrubii, multoq; sedi contingere succo.  
Asi si nulla valet medicina repellere pestem,  
Dardania veniant artes, nudatæq; plantas  
Fæmina, quæ iustis tum demum operata iuuenta  
Leigbus obsceno manat pudibunda cruore,  
Sed resoluta sinus, resoluta mæsta capillo,  
Ter circum areolas, & sepem ducitur horti.*



*Quæ quum lustravit gradiens (mirabile visu)  
Non aliter quam decussa pluit arbore nimbis  
Vel teretis mali, vel tecta cortice glandis,  
Voluitur ad terram distorto corpore campe.*

Plinius. Raphano (brassicæ) innascuntur erucæ. Naporum medicina est. Siliquas vnâ feri, sicut olerum cicer, arcet enim erucas. Quo si omisso iam nata sint, remedium absinthii succus decocti inspersus, & sedi, quam aizoum vocant. Semen olerum si succo eius madefactum seratur, olera nulli animalium obnoxia futura tradunt. In totum enim nec erucas, si palo imponantur in hortis ossa capitis ex equino genere fœminæ duntaxat. Aduersus erucas & 10 cancrum fluuiatilem in medio horto suspensum auxiliari narrant. Sunt qui sanguineis virgis tangât ea, quæ volunt his obnoxia esse. Palladius ex his. Contra erucas semina, quæ spargenda sunt, semper uiuæ succo madefiant, vel erucarum sanguine. Cicer intra olera propter multa portenta serendum est. Aliqui cinerem de fico super erucas spargunt. Item squillam, vel in horto serunt, vel certe suspendunt. Aliqui mulierem menstruante, nusquam cinctam, solutis capillis, nudis pedibus contra erucas, & cætera hortum faciunt circumire. Aliqui fluuiales cancos pluribus locis intra hortum clauis figunt. Campas fertur euincere, qui fusticulos allii sine capitibus per horti omne spatiû comburens nidorem locis pluribus excitarit. Vel si ablatas de horto vicino cam- 20 pas excoquas aqua, & per horti tui spatia vniuersa diffundas. Campas nonnulli ficulneo cinere prosequuntur: si permanserint, vrina bubula, & amurca æqualiter mista conferueant, & vbi refrixerint, olera omnia hoc imbre consperge. Contra pulices radicibus, Theophrastus docet remedium, ne nocent, interficere eruum. Sed ne nascantur, nullum remedium repertum est. Anatolius. Olera à pulicibus non corrodentur, si seminibus ipsorum parum erui in seminando ammiscueris. Hoc rapis, & raphanis maximè conuenit. Alii erucam simul serunt; vel plantant, & præsertim cum brassicis. Hæc nanque à pulicibus infestantur. Omnia hortensia semina, & arualia ab omni bestia illaesa seruabis, si ipsa in succo syluestris cucumeris præmacerata seminaueris. In- 30 corrosa manent olera in testudinis testam conseminata. Palladius. Acre acetum succo iusquiami mistum fertur olerum pulices necare, si spargas. Vel amurca per pauimentum frequenter aspersa, vel cimino agresti cum aqua trito. Vel si cucumeris agrestis semen aqua resolutum sæpè infundas, vel aquam lupinorû psilotri austeritatibus iunctâ. Contra culices hæc habet Columella. Qui æstate seret, caueat, ne propter siccitates culex adhuc terrena folia prorepentia, consumat. Id quoq; vt vitetur, puluis etiam, qui supra cameram inuenitur, vel etiam fuligo, quæ supra focos tectis inhæret, colligi debet, deinde pridie, quàm satio fiat, commisceri cum seminibus, & aqua conspergi, vt tota nocte succum trahant: nam sic macerata postero die rectè seruntur. 40 Palladius. Culices galbano infuso fugantur, aut sulphure. Contra culices, vel



amurcam recentem, vel ex cameris fuliginem spargimus. Infestant & culices hortos riguos præcipuè, si sint arbusculæ aliquæ. Hi galbano accenso fugantur. Git culices suffitu necat. Fumus crematorum lupinorum culices necat, sic mali punici fumus. Nascuntur lactucis, & porris, aliisq; pluribus porricidæ appellatæ, ex Theophrasto. Has humor collectus interimit, & simus aceruatim iniectus. Industria enim bestiola condens sese, ut in stramento quiescit in stercore. Quamobrem venari facile est, aliter nulla venandi datur facultas. Diophanes ut blattæ necentur, hæc affert experimenta. Ventriculum ouillum recentem, stercore plenum, illotumq; defodito in superficie, inuenies enim ipsum prasocurridibus referrum. Si iterum idem feceris, omnes congregabis, & sic apprehensas perdes. Est enim stercoreis amans animalculum, semperq; in ipso degēs, hoc modo facile capitur. Palladius, ~~regnum~~ Græci vocant animalia, quæ solent hortis nocere: ergo ventriculum veruecis statim occisi plenum sordibus suis, spatio, quo abundant, leuiter debebis operire. Post biduum reperies ibi animalia ipsa congesta. Hoc quum bis vel tertio feceris genus omne quod nocebit, extingues. Plinius ex Theophrasto. Bestiolarum quoq; genera innascuntur raphano, erucæ, & vermiculi. Porro verò priuatim animalia, quæ facillimè stercore iniecto capiuntur, condentia in id se. Contra formicas Diophanes his vititur. Si formicas captas vsseris, reliquas fugabis, quæ res experimento constat. Ecauernis suis expelles, si cochlearum regmina cum styrace vsseris, & contusas in agmen ipsarum consperferis. Similiter origano & sulphure tritis, & circum aceruos ipsarum aspersis. Penitus intereunt; si succum cyrenaicum oleo dissolutum ipsis affuderis. Vel radice syluestris cucumeris suffumigata, aut siluro maxime Alexandrino suffito ad lentum rogam. Vna formica sublata, aliæ ultro relinquent latebram. Quod si formicæ exurantur, aliæ odore ipsarum diffugient. Palladius ab eo: Contra formicas, si in horto habent foramen, cor noctuæ admoueamus, si foris veniunt, omne horti spatium, cinere, aut cretæ candore, signemus. Formicas abiges, si origano & sulphure tritis foramen asperges. Hoc & apibus nocet.

Item cochlearum vacuas testas si vsseris, & eo cinere foramen inculces. Sabinus Tyro in libro Cepuricon, quem Mæcenati dicauit, Plinio referente, contra formicas, non minimum hortorum exitium, si non sint rigui, remedium monstrauit, limum marinum, aut cinerem, obturandis earum foraminibus, sed efficacissimè heliotropio herba necantur. Quidam & aquam dilutam latere crudo inimicam eis putant. Multa quidem veteribus prodita sunt arcendis lotustis, verum selecta, expeditioraq; ex Democrito describemus. Si lotustarum nebula accedat, omnes intus maneant inconspicui, & delirescentes, & præteribunt regionem. Si verò antequam hoc sit obseruatum, derepente institerint, nihil omnino contingent, si lupinis amaris aut cucumeribus syluestribus in muria feruefactis conspergantur, nam è vestigio moriuntur. Similiter præteribunt regionem, si captas vespertiliones ex sublimibus regionis



arboribus suspenderis. Si autem captas locustas offeris, ab odore vertigine affici-  
 entur, & partim moriuntur, partim dimissis alii venatorem expectant, & de  
 solo corrumpuntur. Fugabis locustas, si confecto ex ipsis garo, serobes effoderis;  
 eosq; garo resperseris, antequam preteribit dies, si accelleris reperies ipsas in  
 serobibus somno oppressas, ut facile perimas. Nihil omnino continget locusta  
 ex eis, quæ absinthio, aut porro, aut centaurea, aqua tritis resperseris. Palladius  
 ex eo, Opinio Græcorum est, si nubes locustarum repente surrexerint, latenti-  
 bus intra recta cunctis hominibus eam posse transire, quod si inobseruantes  
 homines sub aëre deprehendant, nulli fructuum noceri, si continuo omnes  
 ad recta confugiant. Pellii etiam dicuntur, amari lopini vel agrestis cucumeris  
 aqua decocta, si muria mista fundatur. Existimant aliqui locustas fugari pos-  
 se, si aliqua ex eis vrantur in medio. Nunc autem contra quadrupedes gran-  
 dioraque animalia remedia ex Græcis scribemus, quæ horto noxam inferre  
 possunt. Contra rurales mures admonet Apuleius bubulo felle semina illi-  
 cere, ut ipsa non contingant mures. Melius autem diebus canicularibus ci-  
 curæ semen cum veratro, & polenta: aut sylvestris cucumeris, aut hyoscy-  
 ami, aut amygdalarum amararum, & veratri nigri pares portiones contusas  
 polentæ miscere, & oleo subigere, & cauernis murium apponere: nam his  
 degustatis moriuntur. In Bithynia rhododaphnes folia in foramina obdunt,  
 quo mures prodire gestientes, illa dentibus contingant: ex contractu enim  
 necantur. Palladius ab eo. Apuleius aduersus agrestes mures asserit semina  
 bubulo felle maceranda, antequam spargas. Nonnulli rhododaphnis foliis  
 aditus eorum claudunt, qui rosis his, dum in exitu nituntur, intereunt. Mu-  
 res verò, qui hortis, & domibus oberrant, Paxamo auctore, ita necabis:  
 Veratro cum polenta obiecto, vel sylvestris cucumeris semine cum veratro  
 nigro, & colocynthide, & polenta: vel suffitu calcanthi, origani, apii semi-  
 nis, & nigellæ. Si quercinum cinerem cauernæ apposueris, incinerati scabies in-  
 festantur, intereuntq; Ferri scobe fermento admista degustata moriuntur.  
 Si excecæ libeat, rithymalum contusum cum polenta ac mulso mistam appo-  
 ne: nam ubi ederint, obæcabuntur. Idem describunt Anatolius, & Tarenti-  
 nus. Rubi radice cum butyro, pane, & caseo mista, gustata pereunt. Quidam  
 veratrum album, & cynocrambes corticem tustum cribratumq; cum polentis  
 & ouis, & lacte in massam redigunt, eamq; cauernis ipsorum immittunt. Ha-  
 matitæ lapidis, & viridis myricæ suffitu fugantur. Anatolius, & Didymus in pel-  
 uim æream amurcam infundere iubent, noctuq; media domo reponere, & ibi  
 congregabuntur. Palladius ab eis. Mures si amurcam spissam patinæ infude-  
 ris, & in domo nocte posueris, adhærebunt. Item necabuntur si helleboro  
 nigro caseum, vel panes, vel adipēs, vel polentam permisceas, & offeras. Et a-  
 grestis cucumeris, & colocyntidis suffusio sic nocebit. Mures rusticos si quer-  
 neo cinere aditus eorum satures, attractu frequenti scabies occupabit, ac per-  
 iunct. Talpas sic perdit Sorion. Veratrum album, & cynocrambes corticē con-



indito, cribrato, & cum polenta & ouis, in vino & lacte rigato, & subacta, in  
 mallis cogito, & ipsarum cauernis immittito. Vel vas angustum capito, & in  
 ipsum paleas, cedriam, & sulphur iniicito, & os in cauernam, vbi habitat talpa  
 accommodato, & alia foramina obtura, ne fumus egrediatur, quo facto insu-  
 flato, & fumus talpas omnes suffocabit, idem facito in aliis, & omnes disper-  
 des. Palladius ab eo. Talpas Græci hoc genere persequuntur. Nucem perfo-  
 rati iubent, vel aliquod pomi genus soliditatis eiusdem. Ibi paleas & ceram  
 cum sulphure sufficienter includi, tunc omnes paruulos aditus, & reliqua spi-  
 ramenta talparum diligenter obstrui, vnum foramen, quod amplum sit, re-  
 seruari, in cuius aditu nucem intus incensam sic poni, vt ab vna parte flatus  
 possit accipere, quos ab alia parte diffundat. Sic impletis fumo cuniculis, tal-  
 pas vel fugere protinus, vel necari. Contra mustelas Didymus vtitur sale am-  
 moniaco, & frumento simul commacerato, eisq; iuxta locum, vbi frequen-  
 ter discurrunt, disseminatis: nam aut his comestis morientur aut fugabuntur.  
 Vel vna capta ex eis, caudam, aut testiculos amputato, viuenteq; dimittito,  
 de cætero non amplius ipsas repertum iri in ea regione. Florentinus serpentes  
 fugare docet, si laseris succum, nigellam, & galbanum, cerui cornu, hyssopum,  
 sulphur, pyrethrum, peucedanum, & ungulas caprarum miscueris, tri-  
 ueris, aceto affuderis, & factis pilulis fumum excitaues. Nec in regione or-  
 runt, si abinthium, artemisiā, aut abrotonum circa prædium, aut villam  
 plantaueris. Abiguntur etiam suffita radices lilii. Tarentinus ait, oblitum sue-  
 co herbe dracontæ serpentem non accedere, neq; oblitos succo seminis ra-  
 phani, & si gustauerint tantum nulla iniuria affici. Non accedit serpens vbi iac-  
 cet cerui adeps, centaureæ radix, gagates lapis, aut dictamnium herba, aut a-  
 quila, aut milui stercus; eadem cum styrace suffita reptilia abigunt. Tribulum  
 herbam aqua terito, & ipsum cauernæ indito, & fugabis ipsos. Si dolia à salsa-  
 mentis inueterata circum prædium defodiantur, omne reptile in ipsa illabe-  
 tur, tu extra fines exures. Palladius ab eo. Serpentes propè omnia austeritate  
 fugantur, & nocentes spiritus innocentia fumi graueolentis exagitat. Vra-  
 mus galbanum, vel cerui cornua, radices lilii, capræ ungulas, hoc genere mon-  
 stra noxia prohibentur. Democritusq; allerit, neq; arboribus, neq; satis qui-  
 buslibet noceri posse à quibusque bestiis, si fluuiatiles caneros plurimos,  
 vel marinos, quos Græci *καυρὸς* nominant, non minus quàm decem fictili  
 vasculo in aqua missos regas, & sub dio statuas, vt decem diebus sole vaporen-  
 tur. Postea quæcunque volueris illæsa esse, ea aqua perfundas, & octonis die-  
 bus peractis hoc repetas, donec solide quæ optaueris adoleuant.

*De herbis acetariis dictis, & primo de lactuca.* CAP. IX.

SEd ad olerum historias transiendum, ex quibus aliqua sunt, quæ coqui  
 exigunt, Theophrasto auctore, vt caulis, beta, rumex: alia quæ cruda man-  
 duntur, & sale, oleo, & aceto condiuntur, cæteræq; initio apponuntur, ab ali-



quibus acētarias herbas dictas audio: nam ad cibi appetentiam concitandam, herbis, radicibus, sale, oleo, & aceto guttatim instillato antiquos vsos fuisse, testis est Plinius, de portulaca loquens. Stomachum, inquit, in acētariis sumpta corroborat. Et si suos hortos prisci acētaria vocabant, non ab aceto, ut quidam rari, sed ab accipiendo, quasi acceptaria, ut diximus. Nos acētaria olera vocabimus, quæ aceto, & oleo condita, cruda manderi solemus, & ab his incipiemus, & primo à lactuca, omnium optima, quæ in acētariis paratur. Galenus cæteris oleribus præferri ait, nec ullum quidem melioris succi inueniri, explodendamq; eorum censet opinionem, qui vitio vertunt, quod in huius oleris laudem cedere debeat, quum copiosum gignat sanguinem, nec improbum. Manditur cruda & cocta, garo, oleo, & aceto condita, Plinius. Est quidem natura omnibus refrigeratrix, & ideo æstate gratæ, stomacho fastidium auferunt, cibiq; appetentiam faciunt. Diuus certè Augustus lactuca conseruatus in ægritudine fertur, prudentia Musæ Medici, quum priores cauerent. Religione nunc omni caret, in tantum recepta commendatione, ut seruari etiam in alienos menses eas oximelite repertum sit. Sanguinem quoq; augere creditur. Ob id Columella in suo hortulo,

*Iamq; saluari properet lactuca sapore,  
Tristia quæ relenat longi fastidia morbi.*

Columella ita condit. Lactucæ caules ab imo depurgatos vsq; ad tenera folia in alueo salire oportet, diemq; & noctem finire, dum muriam remittant, deinde muria eluere, expressosq; cratibus pandere, dum assiccescant, tum substernere anethum aridum, fœniculum, rutæ aliquid & porri concidere, & miscere, tum siccatos coliculos ita componere, ut faseoli virides integri interponantur, quos antea die, ac nocte muria macerare oportebit, & assiccatos cum fasciculis lactucarum condi, & superfundi ius, quod sit aceti duarum partium atque vnius muria, deinde arido spissamento fœniculi sic comprimi, ut ius supernatet, & sæpeius suffundere nec pati sitire salgama. Platina & alio modo condit. Prohibet & lactuca ebrietatem, ob id succurrit ex historia vetustatis admiratio, siquidem ad eandem auertendam institutum, ut lactucis non cœnæ procœmio vescerentur, sicut ad conciliandam appetentiam nostra tempestate faciunt omnes, sed in fine, quoniam in fita frigiditate retundat ebrietatem, quod ex Athenæo patet tertio libro, & ex Marialis disticho:

*Clandere quæ cœnas lactuca solebat ænorum,  
Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes?*

Lactucis quoq; continue vscientes hebetiores in venerem fiunt. Nican- der Colophonius memoriæ scriptum reliquit, Adonidem Myrthæ filium, quum lactucam deuorasset, ab apro fuisse interemptum. Addidit Callimachus, Venerem eum sub lactuca condidisse. Quibus verborum inuolucris innunt Poëtæ eorum concubitus elanguescere, pigerrimosq; in coitum fieri, qui hoc olere continuò vescantur. Quare Eubolus graui conuitio coniugem incesse-



incedebat, quæ mensis lactucam obtulisset, simul quòd hac emarcescit cõ-  
eundi facultas, simul quòd emortuum Adonim sub hac abdidiſſe fertur Ven-  
nus, ideoq; feralibus epulis dicata, quare priores ob religionem minimè com-  
manducabant. Illud adiicit Cratinus Phaona inter lactucas absconditum pul-  
chras ab amante Venere. Tantus fuit lactucis honos, vt cognomina proce-  
rum inde nata videamus, Lactucinosq; in Valeria familia non puduisse appel-  
lari, ex Plinio.

Ob varias eius vtilitates, vsusq; multa obtinuit lactuca nomina apud Græ- Nomina.  
cos. Theophrasto *σπιδάξ*, & *σπιδάκινον* dicitur, *σπιδάξ* τὰ *σπιδά* fortasse, quòd folio  
76 ficulneo foret, vtpote lactis non experte. Athenæus Atticis sic dici testatur.  
Nicander Colophonius libro secundo de linguis lactucam asserit apud Cy-  
prios Brenthin appellari. Pamphilus ab Hipponacte *σπιδάκινον* dici, Clitarchus  
apud Phrygios sic etiam nominari. Ibiacus Pythagoricus lactucam caule vidu-  
am *εὐνύχον* dici, quasi spadoniam, & à mulieribus *ἀπιδάξ*. Latinis lactuca dici-  
tur, Palladius ita dici asserit, quod lactis abundãtia exhuberet. Apuleius quod  
lactis copiam mulieribus commanducata augeat. Italis *lattuca*.

Lactucæ complura discrimina, nos primo in syluestrem, & satiuam, vt Græ- Genera.  
ci pariter & Latini, diducimus. Syluestris, Theophrasto authore, folio pusil-  
lo, & vbi consummatum est, aculeato, caule breuiori, candidioreq; satiuo,  
20 lacte copioso, acri, medicatoq; ; quod carpitur per messes, radice breuiori, &  
supernè multicaulior, quàm satiuæ, sponte nascens in aruis. Ab eo Dioscori-  
des: Syluestris lactuca satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia,  
graciliora, & asperiora, amaro gustu, & lacteo succo. Tandem syluestrium  
notæ, candor caulis, cubitalis magnitudo, thyrsos, & foliis scabritia. Hanc syl-  
uestrem lactucam circi (accipitris genus) suis vidis propter blattas imponunt.  
Satiuæ genera tria monstrauere Græci: Theophrasto *πλατύκαυλος σπιδάκινον*, la-  
ticaulis lactuca: *στρογγυλόκαυλος σπιδάκινον*, rotundi caulis lactuca, & *λακωνική*, la-  
conica, cui folium carduo simile, & recta, ampla, & à caule minimè brachiata  
est. Inter latas adeò quædam laticaulis fiunt, vt pro valuis hortorum hisce  
36 nonnulli vtantur. A quo Plinius. Lactucæ genera tria fecere. Vnum laticau-  
lis, adeo vt hostilia olitoria ex his factitari prodiderint. Folium his paulo ma-  
ius herbaceo, & angustissimum, vt alibi consumpto incremento. Alterum ro-  
tundi caulis. Tercium sessile, quod laconicon vocant. Athenæus Theophrasti  
verba transcribens, non scolymi folia habere dicit, sed crispa, recta, quæ faciliè  
crêscant, nec repullulent ex thyrsos. Latini aliter genera diuiserunt. Plinius.  
Alii colore, & tempore satus genera discrepere. Esse enim nigras, quarum se-  
men mense Ianuario seratur, albas, quarum Martio, rubentes, quarum Apri-  
li: Diligentiores plura genera faciunt, purpureas, crispas, Cappadocas, Græ-  
cas: longiora his folia, caulesq; lati, præterea longi, & angusti, intubis simi-  
46 les. Est etiamnum alia distinctio, atræ, quæ meconis vocatur, à copia lactis  
soporiferi. Columella complura esse lactucæ genera dicit, quæ suo quoque



tempore feri oportet: eorum, quæ fusci & veluti purpurei, aut etiam viridis coloris, & crispæ folii, ut cæcilianæ, mense Ianuario rectè disseminantur. At Cappadocia, quæ pallido & pexo, densoq; folio viret, mense Februario, quæ deinde candida est, & crispissimi folii, ut in prouincia Bætica, finibus Gaditanæ municipii, mense Martio rectè pangitur. Est & Cyprii generis ex albo rubicunda, leui & tenerissimo folio, quæ in idibus Aprilis commodè disponitur. In suis carminibus:

*Altera crebra viret, fusco nitet altera crine,*

*Vtraq; Cæciliæ de nomine dicta Metelli.*

*Tertia quæ spisso, sed puro vertice pallet.*

*Hæc sua Cappadocæ seruat cognomina gentis.*

*Es mea quam generant Tarihæsi littore Gades,*

*Candida vibrato discrimine, candida thyrsos est.*

*Cypro item Paphio quam pingui nutrit in aruo,*

*Punicea depexa coma, sed lactea crure est.*

Neapoli complura habemus lactucæ genera, sed laticaulis, ex qua olitoria hostiola factitari prodidit Theophrastus, & Plinius, folio paulò maiori herbaceo, angustissimo, & alibi consumpto incremento nostris in regionibus non visitur. Laconica Theophrasti folio scolymi, recta, amplaque, nec à caulibus brachiata, quam Athenæus crispam dicit, quæ facile crescat, nec ex caule repullulet, quamq; Plinius sessilem dicat, Columella viridis coloris, & crispæ folii Cæciliam vocat, & quæ Ianuario seratur, apud nos *mortarella* dicitur, & à radicis breuitate, quæ innititur, *pede corta* etiam. Denso est folio, ac veluti crispo, sessilis, foliis in orbem conuolutis. Seritur Ianuarii sine, transfertur Martio, secatur Aprilis. Id habet peculiare, quod radice tenuis alias lactuculas proferat. De hac etiam Plinius. Rotundam ac minimæ radicis, latis foliis, astylidæ, quidam eunuchion vocant. Columellæ fusco quæ viret altera crine, fusco ac veluti purpureo, etiam cæciliæ dicta, quæ Ianuario seritur. Plinius purpuream dicit, maximæ radicis, ac cæciliam vocari. Apud nos *inconocchiata* dicitur, quæ & si Ianuario feri posset, nos ne quo desit lactuca tempore Augusto hanc serimus, terra pluuiis madefacta, transferimus Decembri, serimus Martio, & irriguis hortis, vbi helice aquas exhaurimus. Iunio serimus, ut transferamus Augusto, secemusque Decembri. Hæc germana iam dicta videtur, ut vtraque cæcilia dici possit. Cappadocæ, pallido, pexo, densoq; virens folio, seritur Februario, nos à Cappadocum corrupto nomine *cappuccia* dicimus, quasi capitatam, propter foliorum glomum conuolutorum, atque in sessilium patorum, quasi multæ tunice mutuò appressæ essent: insidet humi, sessilis vocata: albo, pexo, densoque folio viret, pexo scilicet, quod in medio ex tubercantia quædam habeat, in modum pexi panni, quam *frisatum* vulgò dicimus. Circumuoluuntur folia in globum brassicæ capitata modo, vel humi, ne capitis instat extuberat. Serimus hanc Augusto, transferimus Decembri, secamus



secamus Martio, semine est nigro, frigoribus obstat, semel anno seritur. Betica vero candidi, crispissimi folii, quæ Martio seritur. Videtur hanc Theophrastus nouisse, quum dixerit; Nigrarum candida dulcissima, & tenerissima est. Et Plinius, Et ecce quum maxime cœpit irrepere satiuus admodum probata, quæ cilicia vocatur, folio cappadocæ, nisi crispum, latiusq; esset. Has maximè celebres Neapoli habemus, vulgò dictas *lactuca creffa di S. Girolamo*, quam ex Hispaniis aduectam dicunt. Folio est crispo, & per ambitum laciniato, candidissima, tenerissima, ac omnium dulcissima perhibetur. Seritur toto anno, nō transfertur, nisi ut semen afferat, magnatum cœnis apponitur. Cypria Columellæ ex albo rubicunda, leui & tenerissimo folio, quæ Aprilis idibus commodè disponitur, quam Plinius rubetem vocat. Hæ Neapoli raro visuntur, foliis vsq; ad admirationem rubicundis, & rubeis maculis distinctis, quam ex Cypro adlatam ferūt. Aliud est apud nos genus satis nobile, quod *matatico* dicimus, quia Maio eo vescimur. Seritur Ianuario, transfertur Martio, semine nigro, foliis maioribus cæteris, viridioribusq; in oui modum conglobatis, capite patulo, non clauditur. Ligatur vinclis cacumen, sic candidior, & tenerior efficitur, terram adaggerando ad cacumen vsque.

¶ Eri prætereunda fuisse hortenſis, & esculentæ lactucæ descriptio, quum nullum olus frequentius, aut notius eo fuerit, è Theophrasto tamen adducemus. Perfectis foliis caulem profert, primo blandum, processu spinis horridulum. Breui innititur radice, breui tum ea, quæ recta deorsum mittenda est, tum iis, quæ in latus porrigi solent: fibræ tantum cohæret, quam obrem vni sit opem maximè dici conuenit. Semen lanugine occultitur. Addimus nos. Caule albicanti, sesquicubitali, recto, lacte turgente, foliato, in summo alio diuiso. In cuius cacumine flores copiosi, pusilli, luteoli, Iunio mense efflorescentes, postmodum in pappos abeuntes, atque subinde semen proferentes, oblongum, in acutum desinens, colore tum albo, tum nigro. Folia quam senescunt amarorem contrahunt.

¶ Columella aprico cœli, & calido statu gaudere dixit, & locis quibus aquarum copia est. penè toto anno seri posse. Hyeme non æquè commodè dispergitur. Plinius albas maximè hyemem tolerare. Diocles optimas lactucas in Smyrna nasci scripsit, Athenæo auctore. Neapoli toto anno seritur.

¶ Palladius amare solum subactum, pingue, humidum, & stercoreatum lactucas scripsit.

¶ Semine seri Theophrastus scripsit post æstiuum solstitium, mense Iulio ex prima semine, quarto die à semine erumpit. Columella de eius satione. Quum sex foliorum erit, transferri debet. Locis quidem apricis, & maritimis optimè autumnno ponitur, mediterraneis & frigidis contrà, hyeme non æquè commodè dispergitur, sed huius radix fimo lini debet, maioremq; copiam desiderat aquæ, sicq; sit tenerioris folii. Genera, quæ diximus, suo quoq; tempore seri oportet. Aprico cœli statim (ut diximus)



& vbi aquarum copia est toto penè anno feri potest. Duobus anni temporibus feri potest, autumno, & vere, vel circa calendas Septembris, vel melius antecalendas Martias Februario feruntur. Locis verò siccis, aut tepidis, quales sunt Calabria, & Apulia maritima, possunt circa idus Ianuarias terræ committi. Plinius. Seruntur lactuca toto anno latis, & riguis, stercoreatisq; binis mensibus inter semen, plantamq; & maturitatem. Legitimum tamen à Bruma semen iacere, plantam Fauonio transferre, aut semen Fauonio, plantam æquinoctio verno. Palladius, Mense Ianuario lactuca serenda est, vel Decembri, vt planta eius Februario transferatur. Itemq; Februario seritur, vt possit Aprili mense transferri. Sed certum est eam toto anno bene feri, si locus sit latus, stercoreatus, irriguus. Antequam pangatur, radices eius rescemus æqualiter, & liquido fimo linamus. Vel quæ iam pactæ sunt, nudatæ lætamen accipiant. Inter has herba manu euellenda est, non sarculo. Lætior fit, si rara ponatur.

Art.

Sed ad paratum accedamus, videamusq; quomodo teneritudo acquiratur, propter quam olera expetuntur. Theophrastus vñtatißimum esse ait caulium decerpitionem, suauioresq; haberi, qui coercitis primis, nouo pullulatu prodierunt. Priores illos lactuosos, & insuaues esse, vtpote minus concoctos, è contrario secundos lacte refertiores constare, suauioresq; sentiri, quandiu teneri. Cuius rationem libro de causis assignat: teneritatem humoris copia, & bona habitudine prouenire: bona enim habitudo propter mollitiem partem ex humiditate: acrimonia enim, & siccitas, & si alia lactuosi humoris qualitas sit, diluitur concoctione, alimentoq;. Validior facta radix caulium attonfione plus attrahit, vnde superioribus suppeditatur, & ex concoctrice facultate non solum mansum, sed præcoctum foliis alimentum ministratur. Palladius: Si vitio loci, vel temporis, vel seminis citò lactuca durescit, planta eius auulsa, & biduo posita teneritudinem consequetur. Aristoxenus Cyrenæus à patria desciscens philosophia, heluo euasit, qui quo deliciis, ac profuso luxui magis indulgeret, natus in hortis lactucas vesperi mulso vino rigabat, eoq; dum satis ebibissent, satiabat potu, vt postridie quum illuxisset, placetas virides à terra missas habere se venditaret, ex Athenæo. Vt sessilis fiat, & quodammodo se in latitudinem diffundat, aliqua sunt antiquorum experimenta. Columella, quo tardius caulem faciat, quum aliquod incrementum lactuca habuerit, exiguam testam media parte accipiat, eo quasi onere coarctata, in latitudinem se diffundit. Plinius. Seri etiam radices illitas fimo refert, & repleri ablaqueata humo. Quidam & aliter amplitudinem augent, recisis quum ad semipedem excreuerint, fimoq; suillo recenti illitis. Palladius. Lætior fit si rara ponatur, vel quum producere incipiet caulem, eo leniter inciso, gleba ponatur, aut testa. Sessilem fieri, nec caulem promere, sed conuolutis vnà foliis in globum extuberare, vel in orbem circumagi vult Florentinus Græcus, si translata radix, vbi ad palini altitudinem adoleuerit, ablaqueata  
bubulo



bubulo fimo recenti oblinatur, & aggere congesto rigerur, dumq; ad incrementum peruenerit, erumpens germen acie ferri præscindatur, demum testa fictilis non picata imponatur, ne in longitudinem, sed latitudinem augmentum capeßat. Candidæ etiam ab eodem fieri putantur, si fluminis arena frequenter aspergatur in medias, & collectis ipsæ foliis alligentur. Eadem ab eo Palladius. Candorem verò putat Plinius contingere iis duntaxat, quæ sint seminis albi, si arena de littore à primo incremento congeratur in medias, atq; incrementa folia contra ipsas religentur. Odoratam fieri Florentinus pollicetur, si citrii semen impositum vnâ seratur. Sed quomodo vna, eademq; radice, vt lactuca ocimum, apium, eruca, & alia olerum genera diuersa proueni-  
 18 ant, Græcus author Didymus ita scriptum reliquit. Caprinum, aut ouillum stercus accipies, & perforabis, & industriè euacuabis, sic antedicta, vel alia eiusdem generis semina, vel quæcunque velis in euacuatam partem impones, & profundè non minus duorum pedum depones, stercore raro substratò, inde tenui terra aggesta, sensim aqua rigabis, & vbi semen enatum fuerit, continuò stercus sparges, & quum in caulem excreuerit, multo plus diligentia adhibeto, nascerurq; lactuca prædictis seminibus simul concreta. Alii duobus, tribusve horum pecorum stercorebus contusis prædicta semina miscent, eaq; linteolo deligata obruunt, & reliquam adhibent diligentiam. Sic  
 20 multiplici forma, varioq; sapore tibi lactuca comparabitur. A quo Palladius: Item multis seminibus condita nascerur, si caprini stercoreis baccam subula subtiliter excauaueris, & in ea semen lactucæ, nasturtii, ocimi, erucæ, radicem immiseris, & tunc in uolutam fimo baccam, terra optimè culta breui scrobe demerferis. Raphanus nititur in radicem, cætera semina in summitate, lactuca pariter emergere profiliunt, singulorum sapore seruato. Alii hoc ita assequuntur. Auulsa lactucæ folia carpunt, quæ radicibus iuncta sunt, & in eisdem gradibus surculo punctis, præter raphanum semina supradicta deponunt, ac fimo adliniunt. Sic obruta iterum lactuca prædictorum seminum caulibus ambietur.  
 25 Theophrastus lactucis erucas, & vermiculos in nasci dixit, quos humor col-  
 30 lectus interimit, fimusq; acernatim iniectus. Stattis apud Athenæum ait blattas esse, quæ lactucas erodant, ob id thridacinedas dictas, quasi lactucarum interfectorices. Plinius ab eo: Nascuntur lactucis vermiculi, & erucæ, hoc amplius limaces, & cochleæ.

*Infectar.  
remedia.*

*De intubaceis, & primo de feri. CAP. X.*

**D**E intubaceis, siue cicoreaceis loquemur. Theophrastus intubacea vocat, quæ intubis folio proxima sunt, vt intubus aphaca, andriaula, porcellia, & senecio. Sunt enim intubi, Galeno authore, lactucis facultate proximi, & si suauitate desciscant. Plinius neq; ex eodem genere posse dici, neq; ex alio intubos, sed caule non minus gratos scribit. Sunt enim insignes ob singu-  
 40 larem corporibus salubritatem, quam præbent, nobisq; hyemalibus acetariis



olera subministrant. Et si fortasse hyemis intlementia nobis deneget, eorum salgamum docet Columella, eodemque modo, ut diximus in lactuca.

*Nomen.*

Theophrasto *κυχώρη* dicitur, et si hoc nomine totum genus complecti videtur, tamen ex descriptione, ut inferius videbimus, potius sylvestre genus intelligit. Dioscorides, quæ omnes postea sequuti sunt, *κυχώρη* sylvestre intelligit, satium verò genus *σίειν* vocat. Galenus nomine Latinogæco conflato intybolachana, id est intybolera vocat. E Latinis Varro herbam dicit, quæ seris vocatur, quod quum seridis natura agrestis videretur, ut mitior fieret, hortis sereretur, quod verbum etiam à Græco *σείρειν* manauit. Dixit, serunt herbam, quæ seris dicitur. Columella genus videtur intyba vocare, dicens: Per arua extirpemus rubos, virgulta, iuncos, alia per ver euellemus, ut intyba. Pro satiuo verò: Alia pabula conserantur, ut trifolium, fœnum græcum, sed præcipue genus intubi quam Græci *σίειν* appellant. Plinius domesticum intuborum genus serim appellat, sylvestre ambugiam, & in Ægypto cichorium dici. Intubæ autem à cauo tubæ specie caule videtur aliquibus nomen accommodatum, unde cichorii nomen notius in Ægypto, unde deinde in Græciam, post in cæteras nationes commigrauit. Horatius cichorea nominat: 10

*Cichorea, leucisq; malna.*

*Genus.*

Theophrastus genera non distinxit. Dioscoridis textus, in quo genera separantur, et si aliquibus mendosus, mancusque videtur, nobis tamen integer, & accommodatus, & adamussim intuborum generibus, quæ passim cōspiciuntur, respondens. Inquit enim. Seris duum generum est, Sylvestre vnum, hortense alterum, sylvestre pieris, & cichorion vocatur vnum, alterum verò satium, quod latioribus foliis constat, & stomacho, quam hortense vtilius. Hortense in duas item species digeritur: vna folio latiore prodit, lactucæ simillima, alia angustiore, & amaro. Sylvestris stomacho vtilior. De sylvestri in sequenti dicemus, nunc de hortensi. Est enim utraque Neapolitanis hortis notissima. De intubis Plinius: Erraticum apud nos quidam ambugiam appellauere, in Ægypto cichorium vocant, quod sylvestre sit, satium autem serin, quod est minus, & venosius. Seris & ipsa lactucæ simillima duorum generum est, sylvestris melior, nigra ista, & æstiuæ, deterior hyberna, & candidior. Vocauit satium, quod non nisi humana ope, cultuue prouenit, erraticum, quod sponte, & libere sub nulla olitoris lege vagatur, & errat. 20

*Descriptio.*

Hortensis seris lactucæ similis amplo surgit folio, candido, teneroque, in ambitu crispo, ac fibriato, caule cæteris maiore, crassioreque, frequentibus surculis brachiato, venoso, torulis prominentibus, & latioribus interueniis. Flos in ramusculis cæruleus: olitoris industria in hortis mitigata, gravioris est amaroris. Hæc à diminuto seridis nomine seriola dici cœpit: inde corrupto Neapolitanis nomine, *Scarola* dicitur, utimur hybernis mensis ad aceraria. Angustifolia dicta, angustiori est folio, sapore aliquantisper amaro, iam dictæ non dissimili, apud nos *scarola ischiana* dicta, colore nigrior, & præcocior est: 40

*nam.*



nam æstate prouenit. Hanc uto Plinium descripsisse, quum dixit, Syluestris melior, nigra ista, & æstiuæ, deterior hyberna, & candidior, sed deterior non sapore, sed salubritate, quum amarior sit. Sed non amplius generum discrimina, & formas pertractemus, sed ad eorum culturam veniamus.

Columella: eadem ratio lactuæ, & intubi, nisi quod hyemem magis sub- *Colum.* stinet. Sed Plinius hyemis impatientiores dixit.

Palladius. Amant humores, & terram solutam. Arenosis, & salis locis, atq; *Solum.* maritimis summa proueniunt.

Cassianus Iulio mense feri dixit intybum, & Augusto serotinum, & Se- *Satia.* ptembri transplantatur, brumale Octobri transplantatur, Nouembri transplantatur serotinum. Columella. Frigidis regionibus proximo autumnio feri potest. Et in hortulo, vere:

——— *Et torpenti grata palato*

*Intuba.*

Palladius mense Octobri serenda esse intyba dixit, ut seruiant hyeme. Area his planior apparetur, ne radices eorum, terra fugiente, nudentur. Quatuor foliorum transferantur ad locum stercoreatum. Aprili intyba secunda satione seruntur, quibus utamur æstate. Aliqui Martio serunt ad æstatem. Plinius. Seruntur verno plantæ eorum, ultimo vere transferuntur. Neapoli Iulio seruntur, decimo die decerpuntur frondes teneræ, ut aliis herbis immixtæ, acetariis veniant. Transferuntur Augusto, Septembri, & Octobri secantur, inde perarescunt. Vel seruntur Iulio, transferuntur Septembri, & Octobri secantur.

Columella de lactuca loquens, eadem de intubo docet. Quo tardius caulem *Art.* faciat, quum aliquod incrementum habuerit, exiguum testam media parte accipiat, eo quasi onere coercitum, in latitudinem se diffundit. Theophrastus ut amarorem intuba exuant, salis aquis rigari iubet, vel salis locis conseri debere: nam quæ de brassica præceperat, eadem intubis convenire dixit, cuius rationem trademus, quum de brassica loquemur. Olitores nostri terra, vel sabulo in *30* hortis obruunt, hoc enim artificio mirum in modum albescunt, & tenerissimi euadunt, & in totam hyemem asseruantur. Hoc artificium casus edocuit, quum sæpius accidat in campestribus, pluuiis, & fluminum inundationibus terra arenave obrutos candidissimos euadere, omniq; ex parte exui amaritudine. Ut ad hyberna seruantur acetaria, quum sua folia fuderint, & velut in orbem circumacta summatim tenui ligamento vinciuntur, & fictili vasculo harente semper, quo alimentum sugant radice, conduntur, ita & candorem, & teneritudinem summam contrahunt, & magnam amaroris partem exuunt. Sic ergo & incremento proficientes intubi hybernant; donec ad usum promantur. Alii leuiori *40* sumptu contenti, terra dumtaxat obruunt. Alii stramentis solis operiunt. Iam ferè nusquam non inualuit hac hyemandi ratio.



## De sylvestri intubo. CAP. XI.

**N**unc ad alteram intubi speciem. Plinius dicit succo rorius cum oleo perunctos, fauorabiles fieri, & quæ velint facilius impetrare. Eius flos nubo etiam die solis exortu panditur, & cum eo circumagitur in occasum, noctu semper compressus, interdiu dehiscens. Platina. Patinis vere caules, & stare folia, hyeme radices benè lotas, & excauatas intus propter amaritudinem, & duritiem, sale, oleo & aceto conditas donat, & cum passulis decoctas, vel aliquid de fruti, vel cinnamomi triti, quantumuis modici insparit.

Nomen.

Plinius in Ægypto cichorium dici, vel erraticum intubum, propter singularem salubritatem dicit, aliqui chreston appellant, alii pancration, quasi omnia complectens bona. A Latinis ambugia, quod etiam confirmat Celsus. Neapoli *cicorea*.

Genera.

Theophrasto cichorium duum est generum, satium vnum, aliud spontè nascens *πικρις* dictum, gustu amarum, vnde nomen accepit. Dioscorides: Seris duum generum, satia vna, sylvestris altera, quæ picris, & cichorion vocatur. Sed Plinius erraticum intubum in duo genera diuersa diuisit. Sylvestre *hedipnoida* dictum, latioris foliis, & cichorium.

Descriptio.

Theophrastus ita describit: Annuo constat folio, radice foliata, folio humi procumbente. Ineunte vere caulem, florémve simul edit, florumq; proventus. Germinat post Vergilias, et si cæterarum specierum caules simplices, minoresve sint, eorum tamen magnus, multisq; surculis brachiatus, ad vincetum quoque lentus, ac frangi contumax: qua de causa ad vincula vtuntur, radice quoq; germen laterale mittit, cuius prolixitate pertinaciter emoritur: decerptis enim, quæ ad vsum cibarium capi solent, reliquum rursus generationis capit principium. Euenit autem, vt pars eius alia, atq; alia floreat, idq; assidue fit vsq; ad autumnum, quanquam durus caulis esse videatur. Fert & siliquam, in qua semen per extremas caulium partes. Picris vere florere incipit, nec secus hyeme rota, vereq; toto perseverat, insignis amaroris, vnde nomen adeptum. Annuo foliatu & caulibus à radice, germinat post Vergilias. Caulis simplex, & minor, quàm intubis. Ineunte vere tum florem, tum caulem emittit. A quo Plinius: Intubus nascitur post Vergilias, floret particulatim, radix ei lenta, quare etiam ad vincula vtuntur illa. Sed quæ de caule dixerat Theophrastus, de radice transtulit Plinius, nescio an rectè. Cichorium circa terram folia habet, germinantia ab radice post Vergilias. Picris toto florens annuo.

## De chondrilla. CAP. XII.

**I**NTER intubaceæ meminit Theophrastus chondrilla. Dioscorides tam similem esse cichoreo dixit, vt nonnulli sylvestris intubi speciem esse pronunciarint. Galenus lactucæ similem facit, vt eodem capite vtriusq; meminerit. Non minus quàm intuba acetariis intromittitur, & si amarior sit. Mures agrestes à serpentibus læsos hanc esse dicit Plinius.



Theophrasto *χονδράς*, Dioscoridi *χονδρίαν* dicitur, quam aliqui cichoriū, alii *Nomen.* serim appellant. Apud Græcos nomen ab euentu inuenit, quod callum quendam, tuberculo fabæ similem, & gummi, quod Græci *χόνδρον* nominant, imis ramulis ostendat. Latini, vt Plinius & alii, chondrillam vocant.

Theophrastus ita describit. Annuo constat folio, ab radice foliata, germi- *Descriptio.* nat post Vergilias. Caule simplici, minori quàm intubo, propter amaritudinem ingustabili succo radicibus, lacteo, copioso, & acri. Ineunte vere, caule & flore nouo. Dioscorides folium, caulem, fl. sculum cichorio similem edere dicit; per omnia intubo tenuior est. E ramulis mastichen fundit, tuberculo fabæ. Galenus: Citius in caulem assurgit lactuca, lento quodam succo referta, alioqui cuiusmodi est tithymallorum, non tamen acer, perinde vt ille. Apud nos ea frequentissimè scatent arua, nec nisi exilitate foliorum, cauliumq; nitidorum elegantia à syluestri cichorio differre videtur: nam flores & radices non dispares habet, ob id seridi subalternam atque simillimam nemo est, qui ambigat. Dux à Dioscoride & Plinio recensentur species, apud nos tamen altera est bulbosa. Folio syluestris seridis diuisura, caule nudo, cuius summo flos luteus, in pappos euanescens. Radicibus vel imo cauli subsunt filamenta pleraq; , quibus per plures bulbuli appensi sunt, pellucidi, albi, succi pleni. Planta & bulbi lacte referti.

20 Dioscorides in terrosus & cultis nasci dixit.

*Solum.*

*De aphaca Theophrasti, siue Plinii hedypnoide.*

C A P. XIII.

**D**V M olerum meminit Theophrastus inter intuborum genera aphacam apponit, quū aphacæ folia & vniuersus habitus planè syluestre intubum imitetur. Aphaca etiam inter legumina ab eodem annumeratur, quod an diuersum sit, ambigit Hermolaus. Nos ne aliis ansam etiam dubitandi præbeamus, non prætereundum duximus manifestare aphacæ nomen vagum esse, quippe & leguminum generi à Dioscoride, Plinio, & ab ipso Theophrasto apponitur. In segete de eo describemus, si Deus votis fauerit.

30 De aphaca hæc Theophrastus. Annuo constat folio, ab radice foliata. Germinat post Vergilias, sicut cichoracea omnia, amaritudine ingustabili. Properat flos eius, sed celerrimè euanescit, & in lanugineos pappos soluitur, deinde alius subnascitur, atq; iterum alius hyeme tota, & vere vsq; ad æstatem. Flos luteus est. Et alibi. Imbribus statim primis ab æquinoctio germinat, sed intubi post Vergilias, vere ineunte, tam caulem, quàm florem mittunt. Aphaca cum croco erumpit, vt senecio, cæteraq; hyberna, & singulis floribus protentus prorogant suos, vt onocichlis, cichorea, & plantago. Plinius à Theophrasto historiam aphaces describens ait. Nascitur æquinoctio aphace, & subinde marcescēte flore emittit alium, tota hyeme, totoq; vere vsq; ad æstatem.

40 Amara est. Ex mitioribus paulo spinosis aphace est, anthemis, phillantes, &



anemone. Diuturnior ei flos per partes florens, ut ocimum, heliotropium, & conocichles. Sed nescio cur Plinius, Hermolaus, & Ruellius, & hos sequuti spinarum meminerint, quum nil apud Theophrastum, ex quo ipsi exceperunt, usquam reperiat. Nos vulgarem herbam *leonis dentem* dictam & Theophrasti aphacam iudicamus, & Plinii hedypnoidem, etsi Plinius (ut frequentissimus ei mos) de utraq; verba fecerit, cum aphacam ex Theophrasto exceperit, quæ fuerit ignorauerit. Plinius de hedypnoide. Et sylvestre cichorii genus, alii hedypnoida vocant, latioris folii. Nam foliorum ortus, positus, numerus, caulis, & flores sylvestris cichorii speciem imitatur. Differt quod huius omnia maiora, folia albidiora, latiora, & lenius laciniata, totique cauli adnata, papposi globi longe maiores, succo amaro turget radix. Foliis namque consistat circa radices humi accubantibus, denticulatis, serræ instar effectis, cauliculis diductioribus, concavis, lævibus, enodibus, lacteque prægnantibus. Primis imbribus germinat, eiusque flos properat, flore luteo, stipantibus in circumfoliis coronato, specioso, odoratoque, qui senescens in auras raptim fertur. Floret particulatim, tota hyeme & vere caulem & florem mittit, radice lactescente, & amara.

**Nomen.** Græcis ἀφάκη dicitur, Latinis, Plinio auctore, aphace, eodemque hedypnois, haud dubie alia ratione, quam quia suauiter halet, & somnum conciliet, & si durior sit ab odore interpretatio, quod præter alias seridis species odorem spiraret. Dens leonis, quod eius folium denticulatum sit.

#### De senecione. CAP. XIIII.

**E**TIAM inter intubacea Theophrastus senecionem commemorat, nec non raro nos in acetariis vescimur.

**Nomen.** Græcis νεκτάρων: Dioscorides id nomen sibi vendicasse ait, quoniam flores capillorum ritu vere canescunt. Et Græci nominum compositione tempus simul quo floret, & moris mox defloretis euentum indicare voluerunt, ut quo tempore quærenda, quibusve notis requirenda esset, noscerent omnes. A Latinis senecio, Plinio auctore, erigeron à nostris vocatur. senecio, Græci hoc nomen dederunt, quia vere senescat.

**Descriptio.** Theophrasti descriptio. Vere caulem & florem emittit. Germinat post aphacem, & crocum. Diutius floret in annuorum genere, cuius rationem libro de causis reddidit. Nonnulla in germinando, flore quoque plus temporis protrahunt, ut in annuorum genere senecio: patet ea de causa, quod mediocritatem quandam alimenti obtineat. Dioscorides: Cauliculo est cubitali, subrubro, foliis continuis, per extremitates eruca modo laciniatis, minoribus multo. Flos luteus, qui breui digestus euanescit in lanugines. Radice superuacua. Plinius: Herba est triflaginis specie, & mollitia, caulibus subrubentibus, caput eius numerosa, dividitur lanugine (qualis est spina) inter diuisuras exeunte. Quare Callimachus acanthida appellat. Alii eruca foliis esse dixerunt, alii roboris, sed minoribus multo, radice alii superuacua.



Æstus quoq; ac frigoris patiens: ob id qualibet ferè Luna flores luteos in- *Celum.*  
staurat nouos, qui in pappis breui abeunt.

Dioscorides in maceris, & circum oppida nasci scripsit. Plinius in regulis, *Solum.*  
& muris. Mihi videtur in quauis regionis, & soli conditione gigni.

*De soncho.* CAP. XV.

**E**STVR & sonchos, inquit Plinius, vt quem Theseo apud Callimachum  
apponat Hecale. Vterque albus & niger, lactucæ similes ambo, nisi spi-  
noli essent. Cheemporus nigro prohibet vesci, vt morbos faciēte, de albo con-  
sentiens. Galenus refert, quum tenera frondet, syluestrium olerum more e-  
ro di, quum perfectè autem adoleuerit, aculeati, & tunc cibus respui. Vtimur  
nos hyeme eo in acetariis, optimè enim olei, salis, & aceti condituram reci-  
pit, quum recentior viret. Lactucis similes essent, nisi spinis horrerent: ita en-  
diuiis propinqua, vt multi putent spinosam endiuia esse sonchum asperam,  
ideo eis subiungimus.

Græcis σῶγχος dicitur, ὅθεν τὸ σῶον χεῖν, quia salubrem succum de se fun- *Nomen.*  
dat, ad multa utilissimum. Alii σῶγχος, quasi σμῆδος ab inanitate caulium,  
quo nomine etiam sylvestris cicerbita nuncupatur à Romanis, Dioscori-  
de authore. Apuleio lactuca leporaria dicitur, quod quum leporis animus  
deficit æstu, hac sibi soleat mederi. Latini sonchum vocant, à Græcis nomi-  
ne mutuato. Columella cicerbitam vocat. Plerique lactucinam vocant, quod  
20 dissecti vulnus multum eructat lactei liquoris. Neapolitani *cardoncello* vo-  
cant, quod veluti paruus carduus spinosis foliis inhorrescat.

Theophrastus spinosis foliis acanaceis similibus dixit, caule foliato, cum ra- *Descriptio.*  
mulorum prouentu floscellus emergit, caule vt cnicum. Dioscorides, Cau-  
le cubitali, inani, interdum rubente, foliis in ambitu per interualla dissectis,  
tenerius esculentum, dissectus copioso diffluit lacte. Plinius, caule cubitali,  
intus cauo, sed qui fractus copioso manet lacte. Omnes flores gerunt in sum-  
mo melinos.

Sonchus albus & niger, albus, qui è lacte nitore nigro Cheemporus, vt *Genera.*  
30 diximus vesci prohibet. Dioscorides in duo genera dirimit, alterum sylue-  
strius & spinosius, alterum tenerius, esculentumque quæ nobis obuia pas-  
sim sunt.

Cultis & incultis locis, segetibus, vinetis, & hortis frequentissimus. *Solum.*

*De eruca.* CAP. XVI.

**D**IXIMVS de soncho, sequitur de eruca, præcipit enim Galenus non esse:  
erucam sine lactuca edendā, vt immodico calori additus aliorum excessum  
temperet. Plinius: Eruca diuersa est, quàm lactuca natura, ideo iungitur illi  
in cibo, vt nimio frigori par feruor immixtus, tēperamentum æquet. Proinde:



raro lactucas sine eruca edimus in acetariis, eiusq; semine utimur in condiendis obsoniis, ut Dioscorides ait, idq; ut diutius perennet, aceto, lacte ve maceratum in pastillos digeritur. Simulanda venerinata videtur, quod Martialis hoc carmine demonstravit,

— *Et Venerem renocans eruca morantem.*

Et Columella in suo hortulo Priapo vicinam ferendā ostendit, his versibus.

*Et qua frugifero seritur vicina Priapo,*

*Excitet ut Veneri tardos eruca maritos.*

Ovidius eruca abstinendum praecepit iis, qui ab amore desciscere cupiunt:

*Nec minus erucas iubeo vitare salaces.*

10

Frontonis extat sententia olera omnia in vniuersum iuuari, quibus vicina sata fuerit eruca.

**Nomen.**

Græcis *ῥαβδος*, & *ῥαβδος* dicta, quasi iuribus gratam dixeris. Plinius dicit: Tanta est condiendis obsoniis suauitas. Latini erucam dicunt, quod erodat, & profecto si degustaueris eam, os & linguam satis acriter vellicabit. Alii sic nominatam putant, quod vrendi licentiam sibi nanciscatur, quasi vracam dixeris, vin e versa. Nec desunt, qui quod edendo maximè sit, efucam primo dictam velint, dein facta si in r mutatione, erucam dictam contendant. Italis *rucchetta*.

**Genera.**

Et si Theophrastus generis diuersitatem in ea neget, tamen Dioscoridis testimonio in satiuam & syluestrem diuisa est. Apud nos duæ sunt species, communis vna, gentilis altera vocata, vel hispanica, & maior.

20

**Descriptio.**

Theophrastus, Non nisi lignosa radice, & semine ad perdurandum firmo. Nos sic describimus. Satiua surgit in hortis bipedali thyrsu, foliis longis, in profundas, sed rariores crenas laciniatis, gustu præter modum acri, & amari-uscule. Floribus in cacumine pallidis. Floret Martio, semine rapitio, vel sinapitio, in corniculis concluso, radice alba. Gentilis folio sisymbrii, semine nigro, floribus luteis, in condimentis lautior, & ad venerem vegetior extat. Syluestris foliis domesticis angustioribus, & frequentioribus laciniatis, gustu acriori, sapidiori q; , cauliculis numerosis, floribus luteis, paululum odoratis, florens autūno, corniculis sursum spectantibus, in vniuersa planta numerosis.

30

**Cælum.**

Plinius, Frigorū contemptrix. Dioscorides, Syluestris Hyberia familiaris, nobis familiarissima, & præsertim in maritimis.

**Solum.**

Palladius, Locis, quibus volueris erucam serere, nil moreris. Apud nos satiu pingui solo seritur, syluestris errat in siccis, aridisve locis.

**Satis.**

Theophrastus à satione tertio die etumpere dixit, esseq; è prima semente, videlicet hyberna, quæ Iulio mense seritur. Columella posse vere, & autūno conseri dixit, nec est alius cultus, quàm ut stercoretur, & runcetur. Palladius. Locis, & mensibus, quibus volueris serere, nil moreris. Satiuas nos Augusto serimus, prima floret, Aprili perit. Syluestris semel sata, septenis annis durat.

40

Theo-



Theophrastus libro de causis ait, salis aquis irrigatam longè dulciorem, & *Art.*  
meliozem euadere.

Anatolus, Si cum brassicis seris, eas à pulicibus liberabis.

*Insect. re-  
media.*

*De nasturtio. CAP. XVII.*

**P**OST erucam, nasturtium subiungemus. Dioscorides eius naturam sinapi, & erucæ simillimam dixit. Eo nos cœnam inchoare solemus, sale, oleo, & aceto parato, iucundo sapore, sed acris: sed pinguibus iusculis incoctum, magnam acrimoniæ partem deponit. Persas, quum principio frugalitatem amplecterentur, negat Xenophon, & Strabo post eum, quicquam ad panem  
10 adhibuisse, præter nasturtium cum sale, mox aucto imperio in genus omne luxus prolapsos esse. Idque effecisse, quo magis ab excreatione sputi, mucosonarium emunctu, & lotii profusione se vindicarent, quibus maxime noxiis iam pridem fuerunt opportuni. Sic & apud Plutarchum, & Ciceronem in Tusculanis traditur, eo vescentibus vegetiores inesse spiritus, sensusq; Vnde prouerbio fertur, nasturtium esse mandendum inertibus, ut eos exciter, animique torpores fuget. Optabile olus contra serpentes. Tradit Sestius, suffitu eos fugari, ad quod videtur alluisse Columella in hortulo,

*Spargantur cecis nasturtia dira colubris.*

Græcè καρδάμον dictum arbitrantur nonnulli ἀπὸ τῆς καρδίας, quod foueat *Nomen.*  
20 cor, & in syncope illa, quam cardiacam vocant, plurimum valeat. Alii καρδάμον dictum putant, quod caput edomet: nam mentis aciem obsidens sua acrimonia, & ignea vi feriens caput tentat. Sunt qui ἀπὸ τὸ καρδίας μῦθον, quod oculorum pupillas coeuntibus vnà palpebris abscondat, lumina enim ad motum conuiuere subinde cogit, è quo euentu καρδαμύθον verbum declinant, Latini conuiuere dicunt. Hippocrates, & Galenus sandicion dici in-  
quiunt à sinapi, quod sandion dicitur à similitudine. Latini nasturtium vocant. Plinius: Nasturtium nomen accepit à narium tormento. Et inde vigoris significatio prouerbio id vocabulum vsurpauit, veluti torporem excitantis.

Negat Theophrastus generis diuersitatem habere. Plinius duorum gene- *Genera.*  
30 rum dicit, mite vnum, ferum alterum. Prioris ratio duplex, albi scilicet, & nigri.

Quod etsi manifestius sit, quàm ut representari flagitet, volumus ta- *Descriptio.*  
men propter generum differentias eius picturam, quam Theophrastus, Dioscorides, & Plinius parui fecere, ostentare. Satiùs cauliculo assurgit sesquipedali, tenui, folio paruo, laciniato, flore albo, semine per ramorum latera copioso, in rubeum nigricante, folliculis orbicularibus, pressisq; contento, acrisapote, Iunio floret, sequenti tempore semine prægnans, sed antequam excaulescat, folia modice lata, diuisaq; habet, quum caulem ediderit, folia fiunt oblonga, digiti longitudinem æquantia. Theophrastus maximam eius se-  
40 mini firmitatem tribuit.



**Cultum.** Palladius nasturtium cœlo, quali placebit, feri posse dixit. Dioscorides optimum Babylonicum tradit. Antiphanes, Athenæo authore, Milesium. Iulius etiam Pollux Miletii laudatissimum nasci. Plinius in Arabia miræ magnitudinis nasci. Summis feruoribus, vel etiam brumæ rigoribus spretis crescit, quare tam hyeme, quàm æstate facillimè prorumpit.

**Solum.** Palladius ferit etiam solo qualicunque, solum non desiderat, humorem quamuis diligit, etiam deesse non curat.

**Satio.** Theophrastus è prima semente esse tradit, mense Iulio post æstiuum solstitium. Nascitur quinto die. Sed è veteri semine celerius. Columella primo vere ferendum in hortulo tradit,

—— *Pauco discrimine sulci*

*Spargitur.*

Palladius Ianuario & omni tempore ponendum tradit, & nasci ex veteri semine celerius. Si cum lactuca feratur, nasci egregiè: Septembri, locis temporatis, & calidis. Plinius, æstate vel hyeme facillime nasci. Nos Neapoli Ianuario, Februario, & Martio ponimus. Sic etiam Augusto, & Septembri. Nascitur etiam hyeme, sed nisi à frigore defendatur, exarescit, vel nisi aduclum fuerit. Rarius hyeme feritur, vt radix coarctetur frigore, & densius pullulen, vere spissius. Quæ Martio feruntur cito pereunt. Si eius semen lacte pridie maceraueris, dulcius nasci ferunt.

*De charephylo. C A P. XVIII.*

**C**HÆREPHYLLON à nobis studiosissimè colitur, omnesq; horti eo sca-  
rent, ne acetarius desit, omnesq; eo quotidie vescuntur, non solum eru-  
do, sed iuribus incocto, magna stomachi iucunditate: appetentiam inducit, &  
cibi fastidium dissiuit, odorato & quodam amariusculo sapore, vix sensibili,  
maximo est oblectamento. Sic enim aliis oleribus additum, ea gratiora red-  
dit. Aetius. Estur cum aceto.

**Nomen.** A multis gingidium existimatur, Ciliciæ, Syriæque vernaculum, ac eo  
nomine in Græciam, & Latium venisse, postmodum in omnes orbis tra-  
ctus commigrasse: nouoq; in Græciam, & Latium aduentu, pristinam ap-  
pellationem obsoleuisse, & charephyllon dici cœptū, dein Graia voce & La-  
tina coalescentibus in vnum nomen, chærefolium, quod luxuriosa foliorum  
fecunditate, & largiore coma gaudeat. Columellæ charephyllon, Plinio chæ-  
rephyllum, Palladio chærefolium. Neapolitani *cerefoglio*.

**Descriptio.** Columella ait quod largo foliati gauderet, & breui caule contentum es-  
set, & velut herba patia secum faciente, quæ quod à cauliculo dempserit, fron-  
dium vberitate comparet. Breue nominavit in hortulo,

*Iam breue charephyllum.*

Nos ita depingimus. Herba est tenera & fragilis, quinis ab vno pediculo fo-  
lis per ambitum incisis: sed incisuræ ita efformatæ sunt, vt foliola etiam qui-



na efforment, & hæc item alia, vt in staphilino, & multis videre est. Ramulis cubitalibus, pinguibus, subrorescentibus, inanibus genicularis, vmbellam in summo caule gerit, albis floscellis ornata, ex quibus tenuia, rectaque oriuntur cornicula, plura ex vno pediculo proueniunt, pilosa, rufescentia, & in cacumine aculeata, in quibus semen longiusculum, nigrum, radice parua, candida, subamara.

Palladius solum humidum, & stercoreatum desiderare dixit.

Solum.

Columella ex iis esse, quæ possunt duobus temporibus feri, autumnò, & vere. Vnde vel circa calendas Septembris, vel melius ante calendas Martias Februatio feritur. Locis siccis aut tepidis possunt circa idus Ianuarias terræ committi. Chærephylum circa calendas Octobris obrui oportet non frigidissimo loco: nam si regio sæuas habet hyemes, post idus Februarias semine differenda, suaque de sede partienda. Plinius quæ habet à Columella excepit, sic & Palladius. Apud nos Augusto feritur, & Decembri: nascitur post quintūdecimum diem, post mensem purgatur herbis, & lætamine inspergitur. Martio, & Aprili semen affert, & interit: qui Martio ferunt, tribus solis mensibus vescuuntur eo. Sed semel satum in hortis pluribus annis restibili fecunditate reuiuiscit.

Satio.

### Depimpinella. CAP. XIX.

**P**IMPINELLA nobis vulgò dicta estur quotidie in acetariis, non solum condimentum optimè recipiens, sed ea commendans iucundo peponum odore: pedibus quoque calcatu nobilis, quo pressa peponum odorem naribus eiacularur, & mira quadam iucunditate recreat. Platina ita condit, Collecta ac lota in patinam, ac suomet caule, si tenera est, reponi debet, sale, oleo, & aceto condiri: si præduri fuerint caules, folia tantum sumuntur. Vnde & cibi gratia, non solum quæ opacis locis, ac pratis nascitur colligimus, sed etiam in hortis studiosè colimus. Poculis etiam iniicere solemus, vt gratiam eis conciliet, sapore, & odore, & magnæ commendationis dotibus ad venena, vel febres exitiales.

Si diuinare licet, Theophrasto *ὑμνίς* est, nam eius interpretes Theodorus Nomen. bibinella vertit. Dioscoridi *αἰδύπινος ἄνθος*, quam Cratenas heracliam vocat. Apud nos id nominis adepta pimpinellæ, bibinellæ, pampinulæ, bipennulæ, quod foliorum binis ordinibus, pinnatim, plumatim, digestis videatur. Sanguisorba aliquibus dicta, quod vulneribus iniecta, spicula, & sanguinem sine dolore exigit, & internis externisque sanguinis eruptionibus opituletur.

Theophrastus spicatam dicit, vt cynops, alopecuros, ornoglosson, siue plantago, quæ neque spicam, neque acutam, neque aristam gerunt, sed his aristæ loco flosculus lanuginosus exir, & his similem facit. Nos à plantaginis spica, cui similem dixit bibinellam, conicere possumus, à bibinella vulgari nostra non multum distare. Plinius ab eo: Aliud rursus spicatorum genus est, ex quo cynops, alopecuros, itelephuros, quam ortyga vocant, alii plantaginē, & thryal-

Description.



lis: alopecuros spicam habet mollem, & lanuginē densam non dissimilem vulpium caudis. Proximum eis stelephuros, nisi quod illa particulatim floret. Dioscorides suam sideritim tertiam, vineis & maceris nascentē dicit, foliis ab una radice multis, coriandro similibus, circa coliculos dodrātales, leues, teneros, subcādidos, & subrubicundos, flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lenro. huius ea vis est, vt quamvis recenti vulneri imposita sanguinem supprimat. Nostra *pimpinella* ramulis nascitur à radice foliosis sesquipedalibus multis foliolis æquis spatiolis, binis ex aduerso positis, ambitu crenatis, pilosis. Thyrsuli quoq; rotundis flosculorum glomerulis micant ex castris candicantibus, quibus elapsis mori fructum exprimunt, radice crassa, longa, subpurpurea. Sed si quis hanc descriptionem Dioscorideæ repugnare dixerit, quippe cum coriandri foliola non rotunda & crenata, sed ferulacea sint, ei respondendum duximus, coriandro recenter enato, foliola verè nostra *pimpinella* vocata esse similia, & si coliculi duri sint, id accidit in senecta, at in iuuenta mollia sunt, teneraque.

**Genera.** Genera plura sunt, duo præcipua, maius, & minus, maius caule, folio, thyrsi, & omnibus maius.

**Solena.** Frequentissima ruri, & domi, quæ pensilibus hortulis colatur, & incultis, aridis, & squallidis collibus, & marginibus nascatur.

### De buglossa. CAP. XX.

**N** V N e quæ hortis vulgarissima seritur describemus buglossam, tribo gratissimā, quum & flos acetiariis spargatur, & folium tenerum, quod proprium odorem suboleat, vetustiora verò folia quotidianis obsoniis peculiarrem habent gratiam. Platinae condimentum apposuiamus. Conditur cruda, & elixa. Crudam benè lotam, & exprellam, reticulo ad id aptè facto, cum nepeta, menta, & petroselino in patinam indes, sale & oleum insperges, inuoluesq; quoad oleum imbibat, & remollescat eius asperitas, acetum postmodum infundes, & conuiuis statim appones: coctam, expressa aqua in patinam indes, sale, oleo, & aceto conditam conuiuis appones. Sunt qui huic aspergant modicum cinnamomi, vel piperis benè triti, & cribrati.

**Nomen.** Dioscoridi βούλωρος dicitur, quod bubulas linguas imitetur. Plinius euphrosynum vocari dicit, quod ei sit præcipuum, quod in vinum deiecta, animi voluptates augeat. Plutarchus symposiaca primo: Alii buglossam admiscunt vino, quod herbis huiusmodi consentaneum sit, lætitiæ conuiuis, & beneuolentiam coalescere. Ex Latinis Cato bubulam linguam vocat. Plinius buglosson, quod bouum linguis similis sit. Neapolitani *borraginem*, quali bonaginem dicas, versa & peruersa voce ex buglossa.

**Genera.** Genera duo satiuæ: nam altera caruleum florem, altera candidum profert: sed caruleum in Apulia in purpureum, & rubrum vertitur, nimii caloris vi, quod idem euenit, si in acetiariis aliquantisper immoratum fuerit.



Apud omnes constat veterum Græcorum βούλανον, & Arabum, esse vulgarem borraginem. Dioscorides verbasco similem facit, folium in terra sparsum habere, nigrius, asperum, bubulcas imitans linguas, Iulio mense colligi. Avicenna, Est herba lata lingua bouis, habens folium almaru, ad tactum aspera, & rami eius asperi sicut pedes locustarum, oportet autē vt illa administretur, quæ est in corasceni, crassa habens folia, super quorū faciem sunt puncta, quæ sunt radices spinarum, & pilorum exeuntium ab ea. Addimus nos, & si notior sit plebecula quouis olusculo. Nascitur foliis in cespite stratis, latis, subrotundis, hirsutis, in foliis eminentibus bullis, ac tenuissimis aculeis armatis, caule cubitali pingui, concavo, aculeis vbiq; scatente, & ramis brachiato, floribus stellatis, quinque foliolis æruleo purpuraque nitentibus. Floret Martio, semine nigro striato, radice alba, tenera, pollicari crassitudine, gustu subdulci, & lento. Dioscorides campestribus, & sabulosis locis nasci scripsit. Nos pingue, subactum humidum iolum in hortis damus, & vinearum, horrorumque rotulis plantamus, quibus semel saxa importuna fecunditate luxuriat, & ex seipsa se-ritur.

Riguis in locis toto anno feri potest. Semine seritur Aprili, & Maio, vt æstate fruamur. Vel Augusto & Septembri pro hyeme. Transplantatur, quū quinque foliorum esse cœperit, ac melius Octobri, ac Nouembri. Semina ne decidunt, colligantur immatura, ac triduo in fasces colligatæ resiccentur sole, vbi maturuerint, substrais linteis decutiantur: & biennio semen asseruatur: ne hyeme gelu adurantur, læta tamen aspergatur, hoc munimento aduersus frigora seuentur.

Satis.

*De batis, seu crithmo.* CAP. XXI.

CRITHMONESC, & conditura aptam protulit Dioscorides: estur enim crudum, coctūve olus, asseruaturque in muria. Plinius inter eas syluestres herbas esse scribit, quæ eduntur. Hanc certè apud Callimachum apponit rustica illa Hecale, speciesque est batis hortensis. Herba sponte nascens, cæque potius oblectamentum, quàm cibus. Hecale vetula Theseo apposuit apud Plutarchum. Nos in acetariis frequenter vtimur, & ad quotidianos usus hortis consistra: continuo spectatur. Columella sic condiri docet, circa verum æquinoctium. Battis, & eius coliculus in alueos componuntur, & sale conspersa vbi vmbra, dum consudent, reponuntur, donec tantum remiserint humoris, vt suo sibi iure abluui possint, sin minus, superfusa dura muria lauantur, & pondere imposito exprimuntur. Tum suo vase conduntur: & ius quod est mistum aceti duabus partibus & tertia muria, infunditur, fœniculiq; aridi, quod est per vindemiam proximo anno lectum, spissamentum imponitur, ita herbas deprimat, & ius vsque ad summum labrum fideliter perueniat. Sed Clumella marinæ batis conditura edocuit, non satiuæ: nam duodecimi libri vite tertriodecimo, olus cordum, quod quidam satiuam batim appellat,



muria nō conditi docuit. Sic Dioscorides & Plinius quū in muria olus seruandū prodiderūt, de marina bati loquuti sunt, nec fatiua vllā rationē habuerūt.

*Nomen.*

Dioscorides *κρίθμον*, seu potius, ut aliqui, *κρίθμαον*, vocat. Nomen à seminis figura Græci dixerūt: habent enim crithamum semen intus tritici, vel hordei figura, quod vocatur *κρίθι*, vel detortū *κρίθι* τὸ *κρίθμαον*, à secernendo vocabulum, quod rupto seminis inuolucro cerealem formam nucleus ostendat, excussūq; flatu seminibus à paleis, aceribusq; secernatur. Latini batim appellant, ex aduerso emendicata à Græcis appellatione, qui baton accessibilem dicunt: nā batis marina in scopulis, & inaccessis crepidiuis emicat. Ex aduerso igitur ab accessu nomen batis adinuenit. Lucius Columella fatiua batim-olus cordū appellauit, quasi serotinum olus, quod non nisi serò admodum appropinquante vindemia conditur, contra cæterorum morem, quæ appetente Iunio ante seminis maturitatem à salgamariis reponūtur. Plinius *serotinum cordū*, quod non præcoci, sed serotino partu in lucē editum esset, vocat. Plinio etiam crethmos dicitur, & à quibusdam appellari asparagum gallicam fatiua dixit. Neapoli *critamo*, *finocchio marino*, & *herba di san Piero*.

*Genera.*

Plinius duplicem batim nominat, hortensem & marinā, siccetiam & syluestrem alibi: an pro marina syluestrem posuerit, ambigo. Sed quæ marina quā unda est littoribus, apud nos in hortis cultu mitigat, feritate torore conuegit.

*Descriptio.*

Marinā Dioscorides ita depingit. Herbula fruticosa, & vndiq; foliosa ad cubiti altitudinē ferè ascendens. Foliis pinguibus numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, latioribus. Sed potius legendum *παχυπύρις, ὀνίαν πύρις*. Non sunt enim crithamo folia latiora, quàm portulacæ, sed crassiora, & longiora, salso gustu, flore cædido, semine ceu libanotidis, odorato, molli, rotundo, & quod siccatū rumpitur. Habet intus tritici modo nucleū, radicibus digiti crassitudine, tribus, vel quatuor, grati & iucundi odoris. A quo Plinius: Caulis vnus, palmū altus, semen ferens odoratū ceu libanotidis, rotundū, siccatū rumpitur, habet intus nucleū candidum, quæ aliqui cachrin vocant. Folia pingua albicant, veluti oliuæ, crassiora, & salso gustu. Radices digiti crassitudine tres, aut quatuor.

*Celum.*

Hippocrates batim Æthiopica m laudauit. Dioscorides nasci in petrosis, & maritimis dixit, quod ab eo etiam Plinius recensuit.

### De cappar. CAP. XXII.

**V**T I M V R & quidē frequentissimè in hybernis acetariis cappar. Paulus vsum eius cōmendauit ex oleo, & sale, quod appetētiam inuiet, & ciborū fastidiū discutiat. Vnde primus mensis sumitur, & cæteris d. pibus præponi solet. Dioscorides non solū floribus, & fructibus, sed etiā nouellis trionibus homines vesci scripsit. Quod etiā nostris temporibus obseruatur. Columella eius conditura proponit. Verno tempore capparim in vsum colligi, & reponi oportebit, & seruari hac cōditura: aceti duabus partibus & tertia duramuricæ sed quā plurimis diebus sub tecto seruari, dū flaccescat, inde in vasa cōdi, inde ius quod supra se ipsum est, infundi. At Platina quomodo cōdiatur mēh edo-

cet.



cer. Inde capparim in carabū aque non feruentis, sed apprimē calidæ: vbi tandiū fines, donec abundantē saltē dīnem dimiserit. Transferto inde in aquā recentē, inq; eam tandiū finito, quoad refrigerat, inde postremo auferes, expressum in patinas repones, infundesq; oleū, & acetum non multū. Sunt qui mentā huic edulio addant, nec incongruē quidē, vt & ad voluptatē, & valetudinem faciat. In Apulia aliter condiuntur. Primo in feruentem aquam coniiciunt, vbi copiosum sal sit dissolutum, inde eximunt, vt siccescant. Siccos in vasa condiūt, alternis vicibus sale, & floribus nondum patefactis. Porro quum mēsis apponuntur, bis tēve aquis abluuntur, vt saluginem eximant, vel aceto seruant.

2<sup>o</sup> *Græcis κάπριον.* Plinius, Capparim quidam cynosbaton vocāt, alii opheostaphylen. Latinis cappar. Columellæ cappar, Palladio cappar dicitur, & in raris. Itali vocant *cappari*.

*Nomen.*

3<sup>o</sup> *Theophrasto vni stirps.* Folium & caulem horridulū ac spinosum humilem spargit. Germen & flos estate, folium ad Vergilias vsq; viger, non annuus, sed diuturnior. Foliū iuxta caulem. Ramis aculeigera. Dioscorides, Frutex est senticosus, & humilis in orbē proserpit, ramis in rubi modum aculeatis, spinis aduncis, hamatisq;. Folio malicoroneæ circinato, horriduloq;, fructu oleæ rotundo, quo fathiscente emicat flos candidus, qui postquam excreuit decidit, glās oblonga exuberat, quæ aperta grana acinis puniceorum similia ostentat, parua rubicunda, radice lignosa multiplici, magnaque. Sed Dioscorides fructum vocat florem, qui adhuc clausus, non in folia dehiscens, quū fructus id sit, quod excluso flore glandis figura oblonga depromitur. Sed hos præcipuē cibus expetitur. Palladius astate florere ait, & arescere sub occasu Vergiliarum. Anticenna fructum cucumeri assimilat.

*Descriptio.*

4<sup>o</sup> Plinius cauenda eius peregrina genera dicit. Siquidē Arabicū pestilens est, Africū gingiuis inimicum, Maritanicū vultis, & omnium inflationibus. Apulū vomitus facit, stomachū & aluum mouet, italicum innocentius est. vbi clare apparet in textu mendū subesse, vbi Apulum vomitū facere, & stomachū & aluum mouere dicit, quū alibi italicum innocentius esse dicat, ac si Apulia Italicæ regio non esset, præsertim quum experientiam huic refragari liquidō constet, quū inter cæteras Italiæ regiones Apulia in hoc genere præcellat. Sed duo genera visuntur, maius, minúsve, minus verò in prima cōmendatione est, & pluris emitur, quàm maius, quia palato gratius est, nisi sapor asciticus sit à muria, vel ab aceto, quod quum paucioris carnis sit, penitus subit conditura.

*Genera.*

Plinius Ægyptium cōmendat, Galenus, qui in locis calidis nascitur, vt in Arabia, longē est acrior Pergameno. Ægyptium, quod nobis ex Alexandria defertur, optimum est. In Cypro plurimum prouenit. Apud nos in Apulia, vnde potius calidum, quàm feruidum, aut frigidum cælum flagitare videtur.

*Calum.*

5<sup>o</sup> Theophrastus gaudere arenaceis, atq; tenuibus dixit, cultis haudquaquam exire videtur, quum apud oppida, & loca plana proueniat, non laeseritii modo apud montuosa, hoc minus verē putarunt. Plinius ab eo; Sabulosis familiaris.

*Solum.*



finum. Dioscorides tenui solo, asperisque locis, in insulis, & iuxta rudera nasci. Columella siccum locum querere. Palladius ab eo, loco sicco, & gracili. Sed in oris Tyrreni, & Adriatici maris vberi prouentu fruticat, & in planis Apuliae æquoreis cæpis. In noualibus sponte prouenit, & optimi soli ibi est signum. Videtur tandem omni solo prouenire, melius sicco, quam humido, & parietibus saxosisque locis.

Satis.

Theophrastus, In cultis hospitari nequit, immo deterius cultu nascitur. Aristoteles in problematibus, huius rationem reddit, cur capparis locis prouenire cultis haud facile possit. Multi nanque tentarunt, & translata radice, & semine sparso, quum apud nonnullos commodior capparis sit, quam rosa, sed tamen nil efficere valuerunt: quid ergo causæ sit, ut cultis nesciat hospitari, inculta & auia prosequatur, & maximè sepulchris adhæreat? Igitur de hoc cæterisque generis eiusdem accepisse illud oportet, quod non omnia eadem ex materia consistere solent, aut augeri, sed sunt quæ ex aliorum corruptione, & principio consistant, & post augeantur, ut pedunculi, & pili corrupto alimento, aut aliqua alia labe corporis prodeunt. Ergo ut in corpore nonnulla excremento proueniunt alimenti, quod certe cruditas est, & ubi naturæ vires superare non queunt, abscedunt quidem in vesicam, vel aluum, quæ in promptu maximè sunt, aliqua verò animal producant: itaque in senectute, & morbis hæc augentur. Sic in terra alia concocto alimento, & consistunt, & augentur, alia excrementis, aduersaque concretionem oriuntur. Culturæ autem officium est, ut concoquat, reddatque efficax alimentum, quo genus mite, urbanumque; fructuum consistit. Quæ igitur mitigatione, informationeque; huiusmodi creantur, hæc urbani vocabulo significamus, eo quod solertia hominis educata quasi eruditaque meliora euadant: quæ autem cura adhibita mitescere nequeunt, aut etiam aduerso habitu loci sui generis prodeunt, hæc sylvestria sunt, & rustica, cultisque viuere nesciunt: cultus enim dum ea melioribus instituire moribus contendit, deprauat, atque peruertit, quippe quum à sua natura desciscere nequeant, quæ orta sunt ex corruptione, quo in genere capparis quoque profectum est. Columella: Leuissimo cultu, aut nullo contenta est. Quippe quæ res etiam in desertis agris citra rustici operam conualescit, plurimisque prouinciis sua sponte noualibus nascitur, sed quibus locis eius inopia est, si serenda fuerit, locus debet interea circumdari fossula, quæ repleatur lapidibus, & calce, vel punico luto, ut sit quasi quædam lorica, ne possint eam prærumperere prædicti seminis frutices, qui ferè per totum agrum vagantur, nisi munimento aliquo prohibiti sint. Quod tamen non tantum incommodum est (subinde enim possunt extirpari) quantum quod noxium virus habent, succoque suo sterile solum reddunt. Seritur utroque æquinoctio. Palladius: Septembri seritur capparis, latè serpit, succo suo terris nocet. Serendum est ergo, ne procedat ulterius circumueniente fossato, vel luto structis parietibus, herbas sponte persequitur. Plinius, Capparis seritur siccis maximè, area in defossu cauata, ripisque vndique;



Undique circumstructis lapide, al'às euagatur per agros, & cogit solum sterile-  
scere. Apud nos seritur semine Martio, Aprili, Maio, & Septembri, quod suis  
fructibus affert. Vbi maturuerint aperiuntur, tunc decerpuntur, insolanturq;  
donec siccescant. Seritur etiam radicibus suis, vel germinibus radicatis, & cau-  
liculi sati, vbi radices conceperint, sequenti anno transplantari possunt. Hye-  
me sicci caules secantur super terram, vt vere latius assurgant. Et si cultum a-  
spernari dixerint Aristoteles & Theophrastus, vidimus satos, & cultos opti-  
mos fructus attulisse, & longe minus agrestibus noxios.

Decoronopo. CAP. XXIII.

10 **C**ORONOPVM inter intubacea recenset Theophrastus, & inter annuas.  
Dioscorides in oleris coqui dicit. Nobis frequentissima in acetariis offer-  
tur, ob id hortis serimus.

Theophrasto κορωνόπος, sed Galeno, Aëtio, & Tralliano κορωνόπου Græca ap- Nomen,  
pellatione donata, quod cornicis pedis effigiem representent folia. Latini co-  
ronopum vocant. Theodorus Theophrastum vertendo silaginem vertit. Itali  
*herba stella* vocant, videturq; hodierni xui nomen antiquo, & spurio conue-  
nire, quippe astrion ab aliquibus dicebatur, vt in spuris Dioscoridis nomini-  
bus videre est. Vulgus etiam quod variè disiectū ceruini cornu imaginem ha-  
beat, cornu ceruinum vocant.

20 Theophrasto coronopus à radice foliata, amara, vt vniuersum intuborum Descriptio.  
genus, et si ab Hermolao, & aliis inter aculeatas, Theophrasti autoritate an-  
numeretur. Id apud eum nusquam reperietur. Dioscorides & si exactam in suo  
capite descriptionem non apponat, ex aliis herbis, quibus assimilauit, eam con-  
cinnabimus. Dicit enim. Coronopus oblonga herbula est, per terram strata,  
filiis foliis psillio non dissimilibus, non ita hirsutis, sed breuioribus, aut cata-  
nances primæ, sed non ita longis, aut minoris sesamoidis, sed maioribus, nec i-  
ta hirsutis, holerstio proximis, cui & viticulas similes habet, aut gramine. Radi-  
cem habet tenuem, astringentem, prouenit in aggeribus, locis incultis, & se-  
cus mare, Plinius hæc habet: Coronopus oblonga herbula est cum fissuris: a-  
30 culeatarum caules per terram serpunt aliquarum, vt eius, quam coronopum  
vocant. Nos herbam apud nos vulgò dictam *stella* ita depingimus. Folia fert  
longa, angusta, hirsuta, pingua, humi sparsa, vtrinque fissa, laciniata, verè cor-  
nicum ungues, aut ceruinum cornu præ se ferentia, ita inter se coherentia, vt  
cylindro æquata dixeris, in stellæ modum radiantia, caule, thyrsulo, flore, &  
spica plantagini simili, radice vnica, numerosis adnatis capillamentis.

Dioscorides in aggeribus prouenire dicit, ac protritit itineribus, incultisque Solum.  
locis. Apuliæ campi hac herba virent, ac pro segetibus triticeis optimi soli si-  
gnum habent.

Serimus Augusto, ac simo operimus, carpitur Septembri, Octobri vsq; ad Satie,  
40 Martium. Seritur etiam Martio, Aprili floret, Iunio profert semen.



**P**ORTULACA in acetariis sumptam stomachum corroborare auctor est. Nos in acetariis tota æstate utimur, esitamusq; tenellas cymas. Famofum est quod hæc mediam sanet, id est dentibus, qui stupore quodam obtorpescunt, remedio est, qui scilicet ab austeris, & acidis nascatur. Cuius causam Galenus reddit. Dentes nanque acrium occurfu præsiccati exasperantur, ita ut citra noxam atterendis cibis adbiberi nequeant, solidiorisq; cuiusque commercio concipiant dolorem, lentore quo sese ab siccorum iniuria vindicabant exucto. Nanque sicca nullo interiecto humoris nexu durius sese collidunt, unde sensus exasperationis noxiæ contrahitur. Damnum ergo saluarii lentoris, qui velut siccorum pignus intercedebat, glutinosa portulacæ succo quamoptimè refarcitur. Aristoteles dicit id fieri à lento humore portulacæ, qui à corpore educit acorem, quippe qui affinitate quadam coniungi valeat, argumento saporis, quem acidulum reddit. Sal verò macerat, liquefacitque, atque ita acorem quoque extrudit. Alexander Aphrodisæus hoc portulacæ munus cæcis rerum facultatibus delitescentibusve causis acceptum refert. Quoniam, inquit, modo stupori dentibus à frigidis fructibus adscito, portulaca, quæ frigida est, medebitur, quum contracta vitia nō consimilibus, sed contrariis abiguntur? Columella ita condit, sunt quædam herbæ, quas appropinquante vindemia ita condies, ut portulaca: Diligenter purgatur, & sub umbra expanditur, deinde quarto die in fundis fideliarum substernitur, & componitur, acetoq; infuso, iterum sal superponitur. Platina in acetariis ita parat: Portulaca benè lota, secretaque à præduro caule in patinam reponitur cum capæ minutatim concisa: sale, oleo, & aceto conditur. Sunt qui ad illius frigiditatem comprimendam, piper tritum, ac cinnamomum inspergant.

**Nomen.** Græcis αἰδράξην, Latinis ferè omnibus portulacæ nomine vocatur. Italica portulacæ.

**Genera.** Portulaca in duas species distribuitur, in sativam, & spontaneam. utriusque meminit Dioscorides, sativæ in peplo, & suo capite: sylvestris in semper vivo tertio.

**Descriptio.** Theophrastus breui radice inniti dixit, tum quæ in profundum descendit tum quæ è latere porrigitur. Dioscorides, etsi peculiari descriptione non dignatus fuerit, aliis tamen assimilando qualis sit patefecit. Portulaca capæ similis est, sed albidiora folia habet, similis telephio caule & foliis. Folia similia helioscopio tithymalo habet, sed crassiora, minusque rotunda. Folia tam similia peplo, ut sylvestrem aliqui portulacam appellent. Etiam terre stri tribulo, sed viticulis crassioribus, vel tertio semper vivo, qua similitudine sylvestrem portulacam vocauerunt. Sic etiam crithamo, sed minora, brevioraque. Nostra autem sativa teretibus viticulis, latis, carnosiss, succulentis, humi reptantibus luxuriat, lentè in puniceum vergentibus, foliis albicantibus quadam tenui aspergine



Aspergine cinerea, gustu salsissimo, flore pusillo, semine in theculis nigro. Floret Iunio, & Iulio. Sylvestris duplo minor, duntaxat tota rubentibus ramulis, gustu acidior, folio turbinatior etiam priori consimilis, ut qui unam norit, alteram non nosse non possit.

Aperto, apricoque cœlo gaudet, sub humido moritur.

Cœlum.

Pingue solum, & latamine saturatum exoptat, & præcipuè humidum: nam siccitatibus deficit: unde æstiuis ardoribus continuis siccitatibus blandiri oportet. Columella in suo hortulo.

Solum.

*Humidaq; andrachne sitientes protegit antes.*

80 Sylvestris squallidioribus locis, vinetis glareosis, & viarum stratis reptat.

81 Theophrastus ex æstiva semente protulit, quam tertiam vocat, celerrimè quarto, aut quinto die à satū erumpit. Apud nos omni tēpore seritur, sed præcipuè Aprili, Maio, & Iunio. Optimè seritur inter caules, carpas, & porros, ubi semel sata fuerit, semine per maturitatem caduco, ipsa se ferente, perennis est, nec vnquam deficit, densius sata, pusilla fit.

Selle.

### De oxalide. CAP. XXIII.

82 NE c ab iis remouenda herba est, quam oxalida vocant, quum nobis quotidie exploratum sit in acetariis mansam crudam magnam cum palato gratiam inire, suo enim sapore sal, & acetum refert, vnde in acetariis solo potest oleo condiri, quin plerunque iuribus incocta optimè sapit, & in carnibus inungendis succo viridi acramentum subministrat, nec aliud in obsoniis maiorem sibi vendicat auctoritatem. Platina illotam prima etiam statim mensa cum pane, & sine alio condimento concedit, æstate præsertim, ut cibi appetentiam inducat.

83 Dioscoridis est ὄξαλις, αἰαχουεῖς & λάπαθον, oxalis dicta, quasi acetosa, sed potest anceps vocabuli ὄξυς significatio trahi, & quod folia in mucronem desinant, & quod acidum saporem recipiat. Romani rumicem appellant, forsan quod ab ea succus non aliter atque mamma, quam rumen veteres dixere, à sitionibus exugi soleat. Vulgares nostri acetosella vocant, quod gratum acorem ori repræsentet.

Nomen.

84 Duo apud nos nascuntur genera, maius, minusve.

Genera.

85 Dioscorides lapathi species describendo suam ὀξυλίαν limita pingit. Folia exiguæ & sylvestri rumici similia, caule non magno, semine subacuto, rubente, ætri, in caule, & agnatis appendicibus emicante. Nos sic: foliis ima base lunatis, & pinnatis, caule striato succulento, colore rubello, radice fibrosa ex croco flavescenti, semine anguloso, acuto, quod foliaceo vestitur inuolucro, copiosoque. Minori folia longè minora.

Description.

86 Vbique pratis, & hortis, quolibet anni tempore viget, sed siccis præcipue locis, ut in collibus, & quibusvis squallidis, & macilentis.

Cœl. sol.



## Deoxy. CAP. XXV.

**O**XALIS iam dicta oxym in mentem reuocauit. Hæc tum sapore, seu leui acramento placet, tum quòd stomachum recreet: nam à Plinio dissoluto stomacho dari scriptū est, non minus, quàm prædicta acetariis expetitur, admiscetur que. Hæc futuræ prænuncia est tempestatis, siquidem ea imminente, surrigitur contra eam, tanquam tempestati colluctatura, quod sæpissimè obseruauimus. Obseruatum etiam à plerisque doctiorum, quod huius herbæ copiosi flores crebros illius anni imbres, & aquarum inundationes portendant, sic pauci siccitatem. Sic Plinius de pratensi trifolio dixit, in horrescere tempestatibus folio, & etiam nos obseruauimus. 10

**Nomen.** A Græcis ὄζυς, & Latinis dicta est, Plinio authore, quod acido sapore donata sit, aliquibus oxytriphylon, nō ab acutis foliorum, sed potius aciditate. Nobis *trifoglio acetoso*, & *allelnia*.

**Descriptio.** Plinius tenera folia habere dixit. Pusilla herba est, longis tamen pediculis iunceis, glabris, tenerisque, quibus singulis in extremitate tria insunt folia, quæ cordis figuram referunt, acidula. Flos quiuis foliolis stellatus luteus, nonnunquam cæcidus, simplici stylo inter folia profiliens, semen rufum in oblongiusculis thecis, quod ubi maturuerit, sponte, vel leui tactu aperitur theca, & longiusculè proiicit, etiam cum strepitu, non sine admiratione. Radix ima fibrosa, summa, squamatim loricata, rufa, floret Maio mense. 20

**Cæl. Sol.** Opaca, umbrosa que sequitur.

## Derapunculo. CAP. XXVI.

**N**unc de rapunculo dicemus, cuius folia, & præcipuè radices in acetariis diuitum lautarumque mensarum veniunt, & ieiuniis quadragenæ expectatissimæ. Sunt enim eius radices longè quouis rapo, raphanoque delicatiores, suauioresque.

**Nomen.** Recentiores napunculum, vel rapunculum vocant, siue quod putarint eandem, vel congenerem, siue quia figura, vel esu napulam, vel rapulam præ se ferat radix, quia oblongula, & in medio sui nonnihil ventricosa.

**Descriptio.** Herbula vires folio oblongo humi accubante, ubi excaulescit, longiori, angustiori, & hirsutiori, cauliculis gracilibus, cubitalibus, & pluribus ab vna radice prodeuntibus. Flore quatuor foliolis conformato, purpurascente. ad cartuleum vergente, campanulæ effigie. Semine in oblongis thecis pusillo. Radice pollicis longitudine, alba, tenera, crassiuscula, in media ipsius parte subdulci. Hyeme folia vires, vere exit in caulem, Maio floret, & subinde fert semen. Radix hyeme eruitur ad acetaria, æstate lignescit. 30

**Cælum.** Tepidum cælum exoptare videtur, quale Neapolitanum, in Apulia ubi ferret, non nascitur.

**Solum.** Solum gracile & solutum, & suspensum sequitur, ob id in syluosis, & sepibus



bus reperitur, in quo radices in profundum agit: in plano vbi solum durius, & compactius, si nascitur, quum in profundum teneræ radices subire nequeant, viridis coloris, & duriusculæ fiunt.

Seritur semine, & optime prouenit, sic etiam oculi circa radicem sati concipiunt vere. Semel sata diutius perennat, nam ad esum extirpatæ, abruptæve radices, remanentes fibrillæ, etiam frondes, & caules egerunt.

*De acumoscata. CAP. XXVII.*

**C**OMMENDATISSIMA inter acetarias herbas illa est, quam muscatam acum dicunt, geranii speciem odoratam illam à Plinio descriptam: quippe non modo, olei, acetiq; optimè recipit condimentum, sapidaque est, sed omnes alias herbas suo moschi odore fragrantiores reddit, auidissimè editur, studiosissimeq; in hortis seritur, aliturque.

Græcis *κεκρίον* à gruini capitis imagine, quæ summo eius capitulo est aptissima, per similitudinè dictum. Ab aliis acus moschata, quod & insigni moschi odore redolet, & acuto longiori mucrone in vertice acus modo inhorrescat. Apud nos *herba moschata* à moschi odore, vnde illi princeps nomenclatura.

Dioscorides secundam geranii speciem describens, hæc habet. Geranium alterum caulibus minutis, & pusillis sesquipedalibus, foliis maluæ in summis alis sursum spectantia gruui capitula insunt cum suis rostris, aut canini dentes, nullius in medicina vsus. Quam etsi alienam à medicina Dioscorides existimauerit, non tamen inficiatur edi posse ab iis, qui gulæ indulgent, quum sui odoris iucunditate in acetariis expetatur, etsi quoduis potius, quàm nostram acum moschatam exprimere videtur. Subdit Plinius, quæ etiam à Græcis excepit: Foliis candidioribus, paulò quàm maluæ minoribus, caulibus tenuioribus, pilosis, ramosis ex interuallis binum palmorum, & in iis foliis, inter quæ & in cacuminibus capitula insunt gruui. Sed nostri sic eam tradunt. Geranium alii myrrhim appellant, similis est cicute, foliis minutioribus, & caule breuiori, rotundo, saporis & odoris iucundi. Nos eam ita describimus. Geranium, vel si maioris gruaria, è radice exigua cauliculos proferit complures, graciles, rubentes, hirsutos, præcipuè adultos, è caule medio apice tenus folia exeunt myrrhidis, aut cicutæ, posita tanacetum, in plumam deducta, in caulium fastigiis flores, in quorum summo capitula ciconiæ, vel gruui cum rostellis ac longitudine emicant, in quibus semen occultitur.

Calido, temperatoque cælo emicat, locis omnibus obuia, sed in hortis latioribus foliis luxuriat.

Primis autumnii imbribus vsq; ad Februarium seritur, quum adolescere cœperit, latamine suffunditur, herbisq; nocentibus liberatur. Fructus sicut Maio ac subinde perarefcit. Suo semine se ipsa serit, vt vix semel sata amplius locum caliberaueris.



**S**UNT ferulæ cibo, & coronis commendabiles. Nobis veris initio prima ferulæ germina, quæ oui luteum referunt, sub cineribus excocta, charta prius, vel linteo madefactis inuoluta, mox pipere, sale, oleo, & aceto conspersa gratissimo sunt cibo. Ad hæc Plinius: Ferulæ caules pomum est, eduntur decocti, commendanturq; musto ac melle, stomacho vtilis, pluries sumpti capitis dolorem faciunt. Dioscorides muria caules cōdi scripsit. Columella eius docet condituram. Circa vernum æquinoctium colligito ferulas cum coliculo silentes, & hac conditura seruato, aceti duas partes, & tertiam duræ muria misces, ferulam quū legeris sub tecto exponito, dum florescat, deinde folia, & corticem omnem folliculorum detrahito. Caules si fuerint pollicis crassiores, arundine secato, & in duas partes diuidito: ipsos quoque flores, ne sint immodici, partiri oportebit, atq; ita in vasa condi, deinde ius, quod supra scriptum est infundi, & paucas radículas laferis, quod Græci *αἰνῶν* vocant, adiectas, ita spissamento aridi fœniculi contegi, vt superueniat ius. In hortu loverò dixit,

*Tempore non alio vili quog, salgama merce  
Capparis, & tristes inula, ferulæq, minaces  
Plantantur.*

Plinius coronarios vt ferulis & corymbis, & ignem optimè ferulis asseruati tradidit. Vnde quòd Prometheus primum extractum è silice ignem ferulis excepit, ansam præbuit Poëti fingendi, ferulam Phœbi rotis adinuisse, & accensam terris apportasse. Sunt qui arborum censui ascribendam censeant, quod temporis processu lignescat. Propterea Clearchus inter luforias questionis, quas Latini scirpos, Græci gryphos, & ænigmata vocant, ferulam dicit esse lignum, & non lignum, sicut pumicem lapidem, non lapidem, noctuam volucrem, non volucrem. Athenæo authore. Plinius. Ferulæ sunt asinis gratissimo pabulo, cæteris verò iumentis præsentaneo veneno, qua de causa id animal Libero patri assignatur, cui & ferula. Ferulæ Libero patri assignantur, de qua re alii alias referunt causas. Eusebius in præparatione euangelica *καὶ ποσειδῶν* Bacchum appellat, id est, feruligerum, rationemq; docet, quòd homines potu in furorem aguntur, ac se inuicem feriunt, vt se mutuis vulneribus confodiant; ferulis vtuntur, quarum ictus lentus, sed non letalis est. Plutarchus in Symposio aliam assignat rationem, ferulam, & obliuionem Baccho dari, ceu vel parum conueniat, errorum inter pocula deinceps committunt, si qua in parte peccatum sit, puerilis, & levis reprehensio sufficiat, quomodo & pueri ferula castigentur. Alii dicunt quòd ferula Baccho aptissima sit, vt infirmos ebrietate pedes leui hoc pedamento regant ebrii. Fuit & antiquitus ferula imperii nota. Leuis enim huius arboris ictus est, vt magis si ueri ac, quàm fustium atrocitate formidabiles sint ii, quibus Regum instar sepep-



conceduntur, nam legibus asperiores, sed pœna mitiores sint oportet. Fuit & pœdagogorum insigne. Martialis,

*Ferula minaces sceptrapadagogorum.*

Plinius. Ferulæ natura murænis infestissima est, tactæ siquidem ea moriuntur. Salpa piscis aliquibus obscœnus dictus, qui nunquam percoqui possit, nisi ferula verberatus.

Græcis *ῥάβδος*, quasi virgultum, vel batillum, aut thyrsus. Sic Latinis ferula dicitur, à ferendo, quòd illius caules senibus pedes, ac scipiones essent. Hippocrates non minus à feriendo, quàm à ferendo dictam videri voluit, qui etiam *plastiga* vocavit. Italica *ferola*.

Theophrastus ita describit. Ferula grandis admodum surgit, vnicaulis & geniculata, à genibus coliculi, & folia alternatim exeunt, mollia, grandia, multifida, capillamenti modo extenuata, maxima, ut quæq; terræ proxima sunt, caulem amplectentia, ut arundines, flores lutei, semen anethi obscurum. Germinat vere, primum folio, tum caule, qui ei annotinus est, radice singulari profunda. Eius teneritudo processu transit in lignum. In fruticum genere est. Sed inter fortunatas insulas Norion est, in qua ferulæ tanta crescunt altitudine, ut arbores fiant. Dioscorides: Ferula caulem affert ternum cubitorum, folia fœniculi longe asperiora, & latiora. Plinius arborum generi ascribit, quoniam lignum loco corticis habet, hoc est forinsecus. Ligna autem vice fungosam medullam, ut sambuci. Geniculatis nodata scapis. Agnibus exeuntia folia maxima, ut quæq; terræ proxima sunt: cæterum natura eadem, quæ anetho, & fructui similis. Nulli fruticum leuitas maior, ob id gestata facilius baculorum usum senectuti præbet.

Theophrastus ferulaceum genus in plures spargi species dixit, sed prius de eo, quod commune omnium constat dicendum est, scilicet ferula, & ferulagine, seu idem genus ambobus, differens magnitudine tantum, seu alterum sit, ut nonnulli putarunt. Ergo natura earum, quæ conspici possit, consimilis certe sentitur, præterquam ratione magnitudinis. Ferula assurgens in altitudinem finditur cacumine, inq; stipites quosdam haud magnos dispergitur, quibus flos semenq; insidet. Ferulago autem humilis est. Plinius: Quæ ab vno caule diuiditur in cacumine, fœmina putatur. Dum Apuliæ essem, multas, & propè infinitas species enumeraui, magnitudine, colore, semine, folio & huiusmodi similibus differentia.

Calidis nascitur locis: ideo Apulia ferularum maximè ferax. Præterea squalidis, celsis, præruptisque saxorum maritimis sinibus, ubi æstiu feruent soles.

#### *De dracone hortensi dicto. CAP. XXIX.*

EST & elegantioribus nostris olitoribus non incognita herbula quædam draco dicta, acetariis gratissima, quæ si sale, oleo, & aceto conditur,



nec sal nec acerum exigere videtur, quum vtriusq; saporem referat. Hanc antiquis incognitam dicunt, sed admirabili quodam modo olitoribus inuentam.

**Nomen.**

Draco nomen. Sunt qui putent tarchon Simeonis Serhi, vel Auicennæ, vel corrupto à tarchone nomine, vel quod acuto sapore linguam vellicet.

**Descriptio.**

Puilla herba. Folia angusta, crassiuscula, cuspidata, flosculi lutei in ramulis sparsi, caules cubitales, semen exiguum, & euanidum nigrum, radices humi reptantes graminis modo. Sapor aceti, & salis gustum linguam comburendo præfert.

**Salis.**

Quia semen euanidum, & non genitabile, propagatur radice, in varias partes diuisa. Habetur ex Hermolao doctissimo viro semine lini, raphani, scillæ bulbis incluso, & in terram obruto nasci. Alii semine inferto cuiusdam capæ, & tuberosæ radici, si quis in afflatu maritimo, & natalibus squillæ non auulsæ inferat. Vel si in raphano, aut capæ foraminulo factò adigatur lini semen. Sed id verum sit nec ne, arguere non ausim, quum vniuersæ Italiæ id pro certo persuasum sit. Nos quum sapius huius periculum fecerimus, & amicos nostros, ut idem experirentur hortaremur, sæpè luit experientia, & optato voto frustrati sumus: nam & capis, & alliis, & scillis geminum linum prognatum vidimus, nihil de scilla habentem.

*De herbis condimentariis, & primò de apiis, ac de hortensi apio. CAP. XXX.*

**I**AM escarias herbas, siue quæ coctæ siue quæ crudæ edantur, aggrediemur, sed prius de herbis aliquot condimentariis dicemus, quæ ad obsonia condienda, gulæ irritamenta: ab apio exoriri incipiemus. Plinius: Gratia apio vulgo est: namq; & rami largis portionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent. Quæ verba quid nisi vulgare nostrum petroselinum indicant? quum nobis olerum omnium familiarissimum in ciborum condimentis perpetuo habeatur. Ideo merito tacita coniectura potius, quàm certa vlla figuræ expressione verum antiquorum apium existimatur. Præterea pisces in piscina ægrotantes viridi, apio recreantur. Honos ipsi in Achaia coronare victores sacri certaminis Nemææ. Cæterum nil æquè suauitatis oris commendare prodiderunt Græci, si ab iis estur, quibus anima scæter, iisq; grauis halitus tædium emendare. Addiderunt meritorias mulieres apium comesse, ut graue virus odoris abigant, oraq; sua iucundiotem expirent auram, ex Florentino in Geoponicis Græcis. Apii coliculos seruare docet Columella conditura, quæ aceti partes duas, & tertiam duræ mutiæ recipiat. Verum apud eruditos nil aliud terra erutum in maiorum sententiarum varietate est. Chrysippus, & Dionysius ad cibum admittendum non esse: immo nefas: nam id defunctorum epulis feralibus dicatum esse dicunt. Plutarchus est author sepulchra apio coronari, unde vetus illud adagium de apio, de iis, qui profligata valetudine vtuntur.



Theocritus *σίλινον ἐνὸς μόνον*, id est, selinum odoratum vocat. Theophrastus *σίλινον* Nomen. eundem selinum urbanum. Dioscorides hortense. quum autem cæterorum meminert, oreoselini, eleoselini, & hipposelini, per hortense, & urbanum, non nisi nostrum peculiare petroselinū intelligi voluerunt. Nomen *σίλινον*, à palustri solo, in quo sapius provenire solet, deducunt. Videtur tamen posse deduci à formidando lunatico effectu, quem accersit esu. In puerperiis ab eo cibo comitiales fieri, qui vbera infantes hauserint, dicunt. Latini apium, & apius, sic Chrysippus, & Dionysius, Plinio authore. Itali, *petroselino*, *petroselo*.

Theophrastus ita apium depingit. Suffrutex est, cacumine perpetuo Descriptio. vi-  
rens, & si reliquum frondium iacturam faciat. Perfectis foliis, caulis con-  
uenienter assurgit, folio scisso per extrema, mespilo simili (quæ vulgò *azarolo*  
vocatur) Radix carnosa, dulcis, grataque palato est, folia sicciora, veluti a-  
criora. Causam reddit. Quia superior pars nimis sicca, inferior roscida est, sa-  
poritaque; neque in nimio humore, neque in siccitate residet, ita sit, ut radices escu-  
lentæ, dulcesque sint, superiores verò partes siccitatis causa insuaves, & insipi-  
dæ, ut in gramine, & reliquis eiusdem generis videre est. E radice, quæ in  
profundum agitur, & quæ crassa, è lateribus mittit ut beta. Vnde semel sa-  
tum, ubi radices iniecit, restibili fecunditate folia, caulesque producit. Dio-  
scorides etsi videtur suo peculiari capite descriptionem omisisse, aliis tamen  
sui libri capitibus optimè repræsentat. Apium est hipposelino, & eleoselino  
minus, folio angustiori, radix cruda, costave estur. Folium habet laserpitio si-  
mile, & folio huii, scilicet, quæ proxima sunt radici, vel caucalidis, vel smyr-  
nii, sed angustiora, minusque pingua, & eiusdem caulem, semen liso simi-  
le. Ab eo Plinius. Sapius parit, semel satum pluribus annis restibili fecundi-  
tate provenit. Fruticat, sed non capite. Proprium ei, quod colorem immu-  
rat. Semine nudo. Addimus nos. Antequam excaulescat, folia habet modicè  
lata, diuisa que, ac postquam caulem edidit, folia mutat, satis enim oblonga, &  
tenuia, digiti longitudinem æquantia habet. Caule cubitali, concauo, tenui-  
ter striato, foliis tripartito dissectis, oris leniusculè laciniatis, flosculo candido,  
& quo minutiorem haud temere reperias.

Chrysippus fœminam esse dicit crispioribus foliis, & duris, & crasso caule, Genera.  
sapore acri, & feruido. Dionysius marem nigriorem, breuioris radicis, vermi-  
culos gignentem. Plinio authore. Quibus verbis vulgare nostrum apium de-  
pingunt. Per marem enim vulgare petroselinum descripserunt, quod foliis  
minus crispis, caule minus crasso, sapore dulciori, nec tam feruido, colore albi-  
diori, & longiori radice. Plinius satiui huius apii differentias enumerare ge-  
stiens ait: Satiui autem differentia in folio denso, crispo, aut latiore, aut laui-  
ore. Item caule lentiore, & crassiore: & caulis aliorum candidus est, aliorum  
purpureus, aliorum varius. Quæ verba è Theophrasto excepit libri sept. capi-  
te quarto. Apiorum tum in foliis, tum in caulibus discrimen utique constat,  
aliud folio spisso, crispo, densoque, aliud rariori, latiori que, cauleque maiori.



Horum iterum aliud caudiditaculis, aliud purpureis, aut versicoloris. Verūm ad summam: eiusmodi omne sylvestris proximum est. Theophrastus non sariui, ut ipse putat, sed apiorum omnium differentias notat, videlicet eloselini, hipposelini, cæterorumq;. Dioscorides sylvestris apii meminit, secundo datur generi assimilando. Apud nos duo vulgaris petroselini genera sunt: maius, quod *petroselino di catalogna* dicimus, & vulgare minus.

**Calum.**

Locis calidis, & frigidis feri potest, dummodo iugis adsit humor, cuius rigatu facilius animatur, quamvis etiam in siccitate nasci non denegat.

**Solum.**

Columella. Secundum fontem commodissime ponitur, quia præcipue aqua lætatur. Palladius: Terra quali volueris, dummodo ibi sit humor; quamvis nasci, si necesse sit, & in siccitate non denegat.

**Satio.**

Theophrastus de seminibus secundæ sationis esse dicit, quæ post brumam Ianuario mense fit. Columella: Eius optima satio post idus Maias, vsq; ad solstitium, nam desiderat teporem. Possis quoq; plantis ferere, nec minus semine. Palladius, Locis calidis, & frigidis Aprili, & propè omnibus mensibus à primo vere vsq; ad autumnū feratur extremum. Plinius dicit ab æquinoctio verno ferri. Theophrastus: quinquagesimo à satudie, vel quàm celerimè quadragesimo, prouentu omnium difficillimum proditur. Sed è veteri semine celerius prouenit. A bimatu fructificat. Recipit in rigationibus salsam aquam. Vnde Aristoteles in problematis quatit, cur aquam salsam apium recipit, porrum recusat. An quod alterius radix imbecilla, alterius valida est? Impatibilis autem, quod validius. Plinius. Omnium difficillimum nascitur apium, quadragesimo enim die quàm celerimè, quinquagesimo maiore ex parte emergit. Ex vetere semine celerius prouenit.

**Arta.**

Grandius nascitur apium paxillo seminibus; quàm fusim satis, ex Theophrasto. Præterea ut in radices crescat, Quum transfertur palo cauerna facta tantæ crassitudinis, quantæ ipsum fieri volueris, ingesto fimo, apium adigas: radix enim totum locum implere faciliè poterit. Facta namque scrobe, adacto palo, totum spatium illud replebit radix, & fiet etiam, ut si qua figuræ species in ipso sit vacuo, radicis partibus subeuntibus communicetur. Docet etiam aliter, quomodo communicetur cum radicibus etiam germinum magnitudo. In linteolo plura semina colligata mandari terræ iubet, illa omnia coalescere in naturam vnā: sic radices, & germina ampliora euadent. Idem diximus de palmis in pomario, quæ res minime contemnenda, si vera esset. Cuius rationem assignat: plus enim valent quæ plura, atque ex his omnibus natura vna coalescit. Florentinus ab eo, magnum nasci apium suadet, si quantum seminis possis tribus digitis comprehendere, vetusto linteolo deligaueris, inde stercore inuoluto ligabis. Columella: Si quis velit id latifolium facere, quantum seminis possint tres digitis comprehendere, raro linteolo illiget, & ita in areolas dispositum religet. Palladius. Apios maiores facies, si semen, quantum tribus digitis comprehendi potest,



potest, lintheolo rariore clausuris, & breui fossa obrueris, ita omnium seminum germen capitis vnus soliditate dectetur. Sed tantorum virorum pace hoc falsum esse deprehendimus tum ratione, tum experientia: plura enim & separata potius nascuntur, quàm ex omnibus vnum, vt superius diximus. Extrat & aliud commentum radices augescendi, ab antiquis edoctum. Quærit enim Aristoteles in problematis, cur si quis apium radice tenuis circumfodiat, partiq; in ea panicum vndiq; ingerat, deinde terram accumularet, itaq; irriget: radices mira magnitudine adulescent. An quod natura panici fungosa, & calida pabulum attrahit, conceptumq; non sursum transmitti patitur: sed inter radicem contentum calore sibi indito concoquit, vt radice amplissimum sequi incrementum necesse sit. Theophrastus ab eo: Qui volunt apii radicem mira capere incrementa, circumfodiunt radicem tenuis, in id vacuū *καχέμιον* poni iubent, mox terram accumulante: ne quicquā ad germina distribuatur, prohibetur, cohibeturq; obiectu inspersæ terræ, vnde pars ea, quæ frondibus, & germinibus debebatur, radicibus absorbetur, sic maior sequatur accretio necesse est. Cachrylliū calidum densumq; est, magnumq; emolumentum à densitate habet, quia attrahit, & retinet caliditatis ratione: materia igitur attracta, & retenta, & calore concocta, superiores partes defraudando sequitur incrementum. Sed quid *καχέμιον* significet speculemur. *καχέμιον* diminutum est *καχέμιον*, quod hordeum significat, Pollucis & Suidæ autoritate, ex Aristophane, & Nicandro. Alii suffictum hordeum interpretantur. Sed hordeum neq; calidum, neq; siccum est, & Aristoteles panici raritate iuuari dixit. Est & *καχέμιον* ex Dioscoride in libanotide, qui maximè calidus est. Florentinus longè maius apium fieri tradit, si ablaqueatis radicibus, paleas adieceris, & ligaueris. Idem crispum apium pollicetur, si satum pauco solo cylindrum superuoluatur, sub terra enim coercitum, non habet quo se diffundat. Columella: Si quis apium crispæ frondis fieri maluerit, semen eius inditum pile, & saligno palo pinfitum, expoliatumq; similiter in lintheolis ligatū obruet, potest & citra hanc operam fieri crispum, qualitercūq; satū, si quum est natum, incrementum eius superuoluo cylindro coerceatur. Palladius: Crispi fiunt, si ante tundantur, vel si super areas nascentes aliqua pondera volutentur, aut pedibus proculcentur enata. Plinius: Semina paululū in pila pulsato, crispū sic putant fieri, aut si satū calcetur cylindro. Figurā quoq; sic induet nouā, auctore Theophrasto, & circumpositi vasis formā imitabitur. Quod ideo propterea eueniet, quia nutrimentū quum prohibetur, arceturq; à vase circūueniente, fertur ad id, quod aduocet libertatemq; luxuriandi concedit. Fit enim veluti tiuuli cuiusdā deductio, itaq; ambientis vasis figuram circumplectitur. Euenit hoc idem quodammodo & generi animalium in magnitudine, paruitate, breuitate, & longitudine.

De palustri apio, & capitato. CAP. XXXI.

40 **N** VNC ad aliam apii speciem deueniemus, scilicet palustrem. Ex ipsius specie est eleoselinum, inquit Palladius.



Nomen.

Theophrasto ἐλεοσίλινον, Dioscoridi ἐλεοσίλινον; quasi ἔλεος συνόμενον, hoc est, paludibus impulsum. Alii ὀδύροσίλινον, quasi humentium alumnum. Homerus ἐλεόπρεπον, quod paludibus gaudeat, ibiq; latius exurgat. Latini heleoselinum vocant, auctore Plinio, & palustre apium. Gaza confuso nomine paludapium verit. Neapolitani *accio*, & *apio*, ab apio detorto nomine.

Descriptio.

Theophrastus, Folio raro, nec hirsuto, simili apio sapore, figura, & odore. Folium frugifero rosmarino adsimile, sed multo minus. Dioscorides, satius grandius. Plinius: vno folio, nec hirsuto. Palladius helioselinon molli folio, & caule tenero. Hoc apium Chryssippi, & Dionysii consiliis à cibis abdicandum puto, tum quod ingrati saporis, odorisve sit, tum quia epilepticum paroxysmum excitet, & aciei obsit.

Solum.

Dioscorides in humidis nasci dixit, Palladius in lacunis. Plinius idem, sed Theophrastus apud aqueductus pulchrius prouenire.

General.

Sed aliud est eiusdem speciei apium capitatum dictum, quod in horris oppidi sanctæ Agathæ, item Theano, & aliis Apuliæ locis inuenitur à natura donatum, antiquis inuisum indictumq; quod crassa, quam possidet, radice rotunda, globosaq; hominis ferè caput æquet. Ipsa dulcissima, odorata, grataq; admodum palato est, fouèdo stomacho, ac habitu oris cõmendando apprimè commendata. Eius satio hæc est. Ineunte Ianuario spargitur semẽ. Februarii medio pullulat è terra, quadraginta diebus increescere sinunt, circa Martii calcẽ transferunt, solo altè ad sesquipedem pastinato, cribrata terra, ac stercoreata, distet alterum ab altero sesquipede. Transacta hyeme estur Martii initio, postea enim excaulescit, lignescitq; radix, aliis locis translatum degenerat, nil à vulgari apio nisi magna ac rotunda radice instar capitis distat.

*De hipposelino, siue olusatro.* C A P. XXXII.

**E**X apii genere hipposelinon est. Radix cruda, coctave vefcendo est. Columella eius condituram docet, Olusatrum quum legeris subsecato, exponito dum flaccescat: dein folia, & corticem omnem folliculorũ detrahit. Caulles si fuerint pollice crassiores arundine secato, & in duas partes diuidito, sic & flores, & in vase condito, dein ius, quod est mistum duabus partibus aceti & vna muria, infunditur, & fœniculi aridi spissamentum imposito, vt herbas deprimat. Idq; circa vernum æquinoctium antequam de folliculo exeat, vel prius quàm coliculum agat, radicem exerito Ianuario, vel Februario, & defricato, ne quid terreni habeat. in aceto & sale composito, post mensem corticem abiicito, & medullam concisam in fictilem conicito, & adicito ius ex sapæ, vel defruti duabus partibus, & aceti vna. Sumito mentiam, & vnam passam, & capam aridam exiguan, eamq; cum torrido farre ex exiguo melle subterito. Quum vti voles, suo iure ponito, & oleum adicito.

Nomen.

Theophrastus ἰπποσίλινον à magnitudine vocat: Græci enim magnis rebus ἰππο præponere solent, adeo vt nil aliud Latinis sit, nisi grande apium



aprium. Theodorus vertendo Theophrasto equapium vertit, nam ἵππος etiam equum significat, sed aptius magnapium dixisset. Ex hoc Nicander in Theriacis *μαχάρον σέλιον* vocauit. Sed Dioscorides Theophrasti *ἵπποσέλιον* vocat *σμίρνον*, *ἢ τὸ πύσμιρνον* à myrrha, quam odore æquiparat, & ab olitoribus Ciliciæ petroselinon vocari, & Romæ *ὀλέπεν* dici. Latini olus atrum, & olus pullum vocant: videturque atrioletis nomen iccirco sibi arrogasse, quod eius folia atro virore nigrescant. Plinius olus atrum, quod hipposelinon vocant. Neapolitania *alejano* vulgo ab Alexandria, corrupto nomine, vel *macedonio* à Macedonia.

- 30 Theophrastus ita suum hipposelinum describit. Hipposelinon palustri apio *Description.*  
foliis proximum est. Sed hirsutum, caule grandi constat. radicem crassam, modo raphani agit, sed atrani. fructum quoque atrum producit, magnitudine eruo amplio-  
rem. Lachryma ex eo myrrhæ similis defluit, quidā in totum myrrham esse affirmant. Folium ei cacumine perpetuum viret, et si reliquorum iactura fiat. Radix dulcis carnosæ, grataque palato est, sed reliqua minime radicibus respondent: nam folia sicciora, actioraque sunt, cuius rationem in hortensi apio diximus. Cortex crassus, & extricabilis, vt raphanus, sed betæ proximum dixeris. Lachrymam in radice habet, quam myrrhæ similem esse constat, quamobrem quum quidam hinc nasci myrrham vidissent, hipposelinum apud se  
40 prouenire putarunt. Vnde referunt ad vrinæ difficultates ex vino dulci albo, & ad pellendos calculos valere. Plinius hipposelinum describens suo more verba Theophrasti mutuatus, vertendo peruertendoque inquit. Hipposelinum simile eleoselino est, myrrhæ naturæ est, è lachryma sui caudicis nascitur; succum eius qui colligunt, myrrhæ saporem habere dicunt. myrrhæ sata natum, radices habet libanotidis, nil à thure differentes. Quæ vltima verba à Theophrasto excepit: vt videbimus in eleoselino. Dioscorides suum smyrnien describens, Theophrasti hipposelinum manifestat. Hoc caulem habet apii, stolonæque multos, folia latiora, & ad terram infracta, quadantenus pingua & robusta, iucundi odoris, cum quadam acrimonia, medicatique. Colore  
30 in luteum languescere, capitibus caulium orbiculatis, vt anethi, semine rotundo, simili braslicæ, nigro, gustu aspero, æmulante myrrham tam proxime, vt myrrhæ sata alterum quoque nascatur. Radix quoque odorata, mollis, succosa, mordet gulam transitu, cortex eius foris niger, intus viridis, & subalbidus. Medetur vrinæ angustius, semen renum & vesicæ vitis prodest. Plinius ita à Dioscoride transcribit, ita Dioscoridi smyrnion, & Theophrasti hipposelinum depingit. Smyrnum caulem habet apii, folia latiora, & maximè circa stolonæ multos, quorum à sinu exiliunt pingua, ad terram infracta, odore medicato, & cum quadam acrimonia iucundo, colore in luteum languescere, capitibus caulium orbiculatis, vt anethi semine rotundo, nigro, quod arcescit, incipiente æstate.  
40 Radix quoque odorata, gustu acri mordet, succosa, mollis, cortex eius foris niger, intus pallidus, odor myrrhæ habet qualitatem, vnde & nomen. Palladius:



Hipposelinum durius & austerius. Vulgaris nostri alexano veram delineationem ita repræsentamus. Caules edit, alasve multas, statim à radice striatos, bicubitales: sed Apulix tricubitales, & maiores vidimus, concauos. Folia apii palustris, sed maiora, rotundiora, lutida, vel ex atrore viridantia. Umbellas apii, semine copioso onustas, atro, pleno, graui, semiorbiculari, paululum in basi vtrinque retuso, gustu acri, medicatoque. Radix crassa, succosa, tenera, vesca, gustu grato, non nihil medicato, intus alba, foris pulla.

*Col. Sol.*

Theophrastus locis omnibus nasci dixit. Dioscorides saxosis locis, & humidis, & angulis terrenis, passimq;. In Amano monte laudatissimum. Columella pastinato loco iuxta maceriam, quoniam & umbra gaudet, & qualicumq; loco conualefcit.

*Satio.*

Seritur semine, radice, & lachryma sua, Theophrasti autoritate. Sed peculiaris eius satio est, lachryma sua prodire, veluti liliū, quū id quod sole refluxit, in lachrymam inaruit. Nec ratio abest, quod gummi eiusmodi caulibus responderet, principiumque à quo genitale seminum viger, coactum esse oportet: non enim sine calore, humoreque generatio talis consequitur. Cur autem non omnes lachrymæ generandi vim obtineant, ratio est, quod neque caules, neque radices vim eiusmodi sortiantur, & quæ sunt imperfectiora ex minimo principio valent generati. Plinius eius verba transcribens habet. Olusarrum miræ naturæ est, hipposelinum Græci vocant, alii smyrnion, è lachryma sui caudicis nascitur, succum eius qui colligunt, myrrhæ saporem habere dicunt, author est Theophrastus, myrrha sata natum. Columella semine feri, idque quum semel seueris: si non totum radicibus tollas, sed alternos frutices in semen summittas, æuo manet, patumque sarritionis exigit cultura. Sarritur à Vulcanalibus vsq; in Calendas Septembris, sed etiam mense Ianuario. Plinius: Veteres præceperant, in locis incultis lapidosis iuxta maceriam seri, nunc in repastinato feritur, & à Fauonio post æquinoctium autumnii. Seritur & radice.

*De hipposelino Dioscoridis. CAP. XXXIII.*

**D**IOSCORIDIS hipposelinon aliud est à supradicto: nam illud smyrnion vocabat. Sed Galenus ambos concordans dixit: Smyrnion agreste hipposelinum vocant, sarrionum verò quod odore myrrham æquiparet.

*Nomen.*

Dioscorides *ἡ ποτὶ αἶνον*, à Latinis olusatrū dicitur, ab aliquibus smyrnion, quamuis aliud sit, quod smyrnium dicitur. Galenus hoc agreste smyrnion vocauit.

*Descriptio.*

Dioscorides ita depingit. Est autem hipposelinon maius, & sarrion apio candidius, caule alto, cauo, molli, habente veluti lineas, foliis latioribus in puniceum vergentibus, coma roris marini, florum plena, dependentibus in cacumine corymbis, antequam deflorescat, & semine turgere nigro, oblongo, acrisolido, aromatico, radix dimittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commen-



dat, olerū generis. Vt apium radix cruda, coctave estur. Folia autem cum caulis decocta manduntur, & per se, aut cum piscibus præparantur. Cruda muria condiuntur.

In vmbrosis & palustribus nasci idemmet testatur.

Selma.

*De oreoselino. CAP. XXXIII.*

**M**EMINERVNT veteres Græci oreoselini, & Latini, sed quænam fuerit herba, verentur doctiores suam proferre sententiam.

Græci, ut Theophrastus, & Dioscorides ὀρεσίανον vocant, sed non hallucinari oportet oreoselinum esse petroselinum, quod in saxis nascatur: nam aliud est in Macedonia proveniens. Theodorus Gaza Theophrastum vertendo, confecto nomine montapium vertit. Palladius petroselinon vocat. Plinius Græcè oreoselinum.

Nomen.

Theophrastus oreoselinon maioribus differentiis distare dixit, folio namque cicuta constat, radice tenui, caule anethi, minutiori que, datur in vino austero gratia menstruorum. Dioscorides verò. Caule est dodrante alto, ab radice tenui exeunte, per cuius ambitum rami & capitula cicutæ, sed multo tenuiora, semine cumini oblōgo, acri & odorato, tenui. Semine, ac radice in vino potis menses trahit. Plinius: Oreoselinum cicuta foliis, radice tenui, semine anethi, minutiorè tamen.

Description.

Nascitur in petrosis, & montibus ex Dioscoride. In locis asperis, ex Palladio.

*De petroselino Macedonico. CAP. XXXV.*

**D**IOSCORIDES etiam Macedonicum petroselinum commemorat. Apud nos quia cœptum est coli, summoque studio illius culturæ indulgent, apponemus.

Græci Macedonicum Dioscorides vocat, quod Latinè saxatile apium sonat, vel petrapium dici posset. Plinius à Dioscoride, Alio genere petroselinon quidam appellant in saxis natum.

Nomen.

Dioscorides cumini semine, odoratiore, sapore acri, aroma olente esse dicit. Quod apud nos habetur, perparum à domestico distare videtur, folia confimilia, aut potius pimpinellæ iam dictæ, crispatis oris, & argutioribus incisuris. Caule tenui, umbellæ albicantes, semine tenui, pusillo, & evanido: nam satum non nascitur, ferunt è Macedonia accersitum semen.

Description.

Plinius post petroselini mentionem, ait. Addidere quidam buselinon, differens breuitate caulis à satiuo, & radicis colore rusto, eiusdem effectus.

Genera.

Nascitur in Macedonia præruptis crepidinibus, ex Dioscoride.

Loc.

*De fœniculo. CAP. XXXVI.*

**P**OST apia de fœniculo dicemus. Alexis in lebeate inter condimentarias herbas fœniculi meminit, ex Athenæo. Plinius. Fœniculum quum inaruit,



ad condimenta plurima. Condimentisquæ propè omnibus inferitur, oxyporæ etiam aptissimè. Quin & panis crustis subditur. Etiam fœniculum serpentes nobilitauere, gustatu senectam exuendo, oculorumquæ aciem eius succo reficiendo. Vnde intellectum est, homini quoque caliginem eo præcipuè releuari. Anguis hyberno situ membrana corporis obducta, fœniculi succo impedimentum illud exuit, nitidusquæ vernat. Exuit autem à capite primum nec celerius quàm vno die, ac nocte replicans, vt extra fiat membrana, quod fuerat intus. Idem hyberna latebra visu obscurato, maratro herbæ se affricans, oculos vngit ac refouet. Eadem Nicander exordio theriacæ: Quo tempore relicta arefcentium squamarum senectute torpidius, ac segnius ingrediens, verinaquæ tempestate cauum suum fugiens, hebetibus oculis cernit. verùm depastus fœniculi comosos ramos, celeriter visus aciem recuperat. Galenus, Fœniculi assiduus in obsoniis vsus apud nos: in hoc reponunt, nō secus ac piceum, ac terebinthum condientes, vt in totum annum vsu sit, quemadmodum & capas, & rapas, & alia eiusmodi, quædam in solo aceto, alia in oxalme asservantes. Veteres quum fœniculum legissent, sub tectum exponebāt, dum flaccesceret, deinde folia, & corticem omnem detrahebant. Caules si fuissent pollice crassiores, arundine secabant, & in duas partes diuidebant, ipsosquæ flores, ne essent immodici, partiri & diduci oportebat, atque ita in vasa condi, tū ius, quod erat mistum duabus partibus aceti & vna muræ, infundebatur, paucas radices laseris adiciebant, & spissamento contegebant, vt ius superueniret. Hæc ex Columellæ placitis. Platina tum semine, tum caule pro conditura obsoniorum, tum crudo, tum cocto vitur.

**Nomen.**

Græcis *μαράθρον* doctissimi quidam dictum volunt, quod emaridi, & arentis fœniculi ad condienda obsonia commodissimus sit vsus, & à Græcis Latini, quod sicut fœnum arefactum in hyemes, & marcidum reponatur, fœniculum dixerunt. Alii quod satum maximo cum fœnore semen reddat, dictum volunt. Itali *finocchio*.

**Descriptio.**

Theophrastus ita depingit. Suffrutex est è ferulaceo genere, & neruiculi. Folio thapsiæ simili, strictiori tamē, suaueolēti, dulci. Semine nudo. A quo Plinius. E ferulaceo genere fœniculum perquàm simile thapsiæ, semine nudo. Dioscorides variis in capitibus suam descriptionem reposuit. Folia seseli Massiliensi similia habet. Semen ligustico simile. Folia dauco Cretico, sed maiori, & crassiori. Caule elaphobosci, dauco primo simili. Addimus nos. Satium hominis plerūq; proceritatem superat, caule geniculato, fungosa intus medulla, læui exteriori cortice, & herbaceo, folio abrotoni, sed longiori, mollioriq; iucundo odore. Umbella rotunda, ampla, lutea, in orbem radiatim circinata, in qua semen. Radice longa, candida, odorata.

**Genera.**

Syluestre fœniculum Theophrastus & Dioscorides *ἰππομάραθρον* vocant, Gaza vertendo Theophrastum equifœniculum vocat. Nicander metri causa *ἰππειον μάραθρον* vocat, quasi equinum fœniculum dixeris. Galenus *ἄγιον μάραθρον*,



*ῥπον*, id est syluestre fœniculum. Dioscorides ita pingit: Magnum est, fert autem semen cachri simile, cuius radix iucundè olet. Plinius ab eo: Est in hoc genere syluestre, quod alii hippomarathon, alii myrsineum vocant, foliis maioribus, gustu actiore, procerius, brachiali crassitudine, radice candida. In Apulia cuique obuium. Dioscorides aliud tradit hippomarathi genus, longo, exili & angusto folio, semine corianni, rotundo, acri, odorato. Plinius: Diocles & aliud genus hippomarathi tradit, lōgo & angusto folio, semine coriandri. Satiū anethi folio, semine dulci. Syluestre semine acri, hippomarathi feruido.

Palladius loco aprico, & modice saxoso nasci dixit. Plinius hippomarathon <sup>Cal. Sol.</sup> nasci dixit in calidis, & saxosis. Sed satium pinguibus locis melius, & latius affurgit, in siccis ægrius. Syluestre omne substat cœlum, & solum, & præcipuè in squalidis, & siccis, & arenosis. Respuat argillaceum. Satium hyemes non perinde substat, ut vulgaris & syluestrius.

Palladius primo vere, vel Februario fœniculum serit. Nos primis autumnii <sup>Satie.</sup> imbribus serimus sulcis, à quintodecimo nascitur die: quum adoleuerit aliquantulum, quod in sulcis abundat, alio transplantamus, relinquendo in sulcis quæ satis fuerint. hæc citius spicam, illa serius proferunt. Viginti diebus adolefcere sinunt, inde fodiuntur, ac latamine saturantur. Nouembri secantur, vitimurq; iis in acerariis & ferculis, à sectione quintodecimo die pullulant, tunc <sup>30</sup> denuò pastinantur, mox aque humo cooperiuntur, ac latamine, sic secundo secantur Martio, & à duodecimo die repullulant, rursusq; fodiuntur, cooperiuntur, ac latamine teguntur. Aprili umbellas proferunt, sic Maio, & Iunio semen afferunt, si quadrima fuerint. Sin minus, tertio secantur, & repullulant à decimo die, eandem operam impendendo. Septembri denuò pro frondibus secantur, & iterum umbellam proferunt. Sic anno bis floreant, & hoc modo vsque ad sextum annum durat. Sed olitores tertio anno radicitus euellunt. Syluestre Augusto serimus, nullam denique curam adhibendo secamus illud Ianuario, Februario, & Martio: sed Augusto, & Septembri fert umbellas, & ubi vbum desinit, alterum incipit, sic omni tempore hîc flores habemus.

<sup>30</sup> Si bubulo latamine operiuntur, dulciora ferunt semina. Alii semen aridis <sup>Ari.</sup> ficibus indunt, feruntque, vel si eius semina mulso, vel lacte macerata sint, dulciorem suauioremq; proferre fructum referunt.

### De anetho. CAP. XXXI.

**P**OST fœniculum de anetho scribemus, cui & cognatum genus videri potest, figura & dote, Athenæus etiā Alexis autoritate in lebetes condimentis nasci refert. Plinius etiam culinæ nasci. Ideo & nos in nostro horro seremus anethum in condimentario vsu magnopere quæstum, Galenus in cōuiuiis antiquos etiam vsos fuisse coronis ex eo concinnatis, humidis adhuc, & roscidis, ad somnum conciliandum refert.

<sup>40</sup> Græcis *ἀνῆθον* quasi *ἀνιένον* dicunt, quod cibi appetentiam excitet, & *ἀνθεῖν* Nomen.



coitus est venerens, quem eius efus latecissit, at plurimus usus genituram hebetat. Latinis anethum. Italis *aneto*.

**Descriptio.** Theophrastus. Lignosa radice nascitur, non adeo prolixa, neque multis subnixa fibris, multicaule, ramosum, quapropter pars superior, non pro ratione inferioris extat, semine nudo, succo suaueolenti. Semen ferula simile, sed minus, & modo ferula laterales caules flores & fructus ferunt. Plinius ab eo: Anethum semine nudo. Dioscorides, etsi ut omnibus notis suam figuram neglexerit, quum alias plantas illi assimilauerit, exactam eius delineationem apposuit. Anethum cauliculum habet ligustici, capitulum seseli Æthiopico simile, & umbellam seseli Marsiliensi, aut dauco tertio, & semen, aut rithymalo helioscopio, vel orbiculata caulium capita, ut smyrnium, umbellam elaphobosci. Semen & florem buni. Nos verò: Tantopere fœniculo simile, ut ipsum olitorem, & pharmacopœum interdum deludat, nisi odor consulatur. Caulis sesquicubitali assurgit, exilitate folii in staminis penè modum extenuata, flosculo luteo, æstate florens, sapore ingrato, colore obscurius virente.

**Genra.** Theophrasto vni stirps, cui generum diuersitas non est. Plinius ab eo, Genere singulari.

**Cal. Sol.** Palladius omnem cœli statum pati dixit, sed tepidiori lætatur, sic omne folium.

**Relig.** Theophrastus è prima satione anethum esse dixit, post brumam mense Maio. Quarto profilit à satū die. Plinius ab eo: Quarto die à satū profilit. Columella: Seripote est verè, & autumno. Circa Calendas Octobris obrui potest non frigidissimo loco: nam si regio frigus habet hyemes, post idus Februarias semine differendum est, suaq; de sede partiendum. Palladius, Locis temperatis & calidis autumno feritur. Locis frigidis Februario. Rigitur, si se imber abstineat, seratur rarius. Alii semen eius non obruunt, opinantes, quod à nulla aue tangatur. Martio etiam feritur. Plinius: Alio comitatu æquinoctio autumni feritur anethum.

### De aniso. CAP. XXXVIII.

**A**NISVM anetho simile esse vberrius patet authorum lectione. Plinius: Culinis anisum nasci scripsit, cradum, decoctum, virens, aridum, parvis etiam crustis inferioribus subditum. Ægyptium ligustici vicem prabet in condimentis. Omnibus tandem quæ cōdiuntur, quæq; intinguntur desideratum, quin ipsum odoris halitum iucundiores facit, fœtoremq; tollit manducatum matutinis cum smyrneo, & melle exiguo, mox vino colluto, insomnia leuat suspensum in puluino, ut dormientes olfaciant, appetentiam ciborum præstat, quando id quoque inter artificia delicia fecere, ex quo labor desit cibum poscere. A Pythagora inter pauca laudatum. Corripit etiam comitiali morbo negat in manu tenentes. Ideo quamplurimum domi ferendum. Platina in tertiam mensam commodius edi memorat.



Theophrastus & Nicander in Theriacis *αἰών* vocant. Dioscorides *αἰών*, *anison*. Nomen.  
 nicetum, & hoc vocatur anethi, vt diximus, modo, quoniam appetentiam ciborum præstat, vel *ἰσχυρὸν*, quia laxat flatuosas tensiones, externas, internasve. Vnde & Latinis anisum, & anesum dicitur. Auicenna fœniculum romanum vocat. Neapolitanis Græco, & Latino nomine cognitum, *aniso*.

Ab antiquis prætermissa delineatio ob vulgarem eius notitiam. Nos ita describemus. Descriptio.  
 Caulem fert striatum, rotundum, multisque ramulis brachiatum. Folium vbi primum nascitur, rotundum, sed deinceps apii modo dissectum, florem candidum, muscarium fœniculi, totaq; herba aut aliter, quàm semen odorata est. Iunio ac Iulio mensibus florer, & semine prægnans est.

Dioscorides laudat primò Creticum, mox Ægyptium. A quo Plinius: Laudatissimum Creticum, proximum Ægyptium. Ob id calidum cælum optare videtur, & quippe Apulia anisum vberrius producit, & optimum. Cælum.

Palladius locum bene subactum querere scripsit, & cui latamen admisceas. Solum.  
 Apuli nigrum, tenerum, & optimè subactum querere dicunt.

Palladius Februario feri, & quod satum est, herbis purgari assidue docet. Satio.  
 Martio locis latioribus melius prouenit, itemque cæteris, si humore iuuetur & stercore. In Apulia, vbi feracissimè prouenit, ita satum obseruauimus. Solum nouale faciunt, & optimè subigunt, quum radices paruas, & delicatas possideat. Terra primum Decembris fine scinditur, post decimum diem iteratur. Tercio Ianuarii fine intersecatur. Quarto Februarii initio aratur, & seritur. Agri iugerum modii partem octauam seminis exposcit. A vigesimo die pullulat, quod seculo animaduertendum erit, aliqua eorū semina è terra eruendo, si iam germinare inceperit, id est si iam dum radículas egerit, tunc iterum aratur terra, & sine illius læsione, vt omnes penitus enascentes herbas euellat, & deleat: nam adeò tenella stirps est, vt minima quæque herba eam necet. Si post satam imber accesserit, destruitur: nam humi superficiem incrustat: quumque debile, & imbecille eius germen crustam penetrare nequeat, inarescit illicò. Vbi fuerit enatum post mensem, oportet herbas omnes denuo acutis falcibus secare: nam si eas eruis radicitus, possunt & illius radices contelli. Si Martio, & Iunio pluit, & inde calor insequetur, eum necat: nam infirmissimum est. Quum iam perfectè semen maturuerit, colligunt, in fasces & manipulos ligant, ibique relinquunt. Vbi optimè siccatum fuerit, defertur in aream, & excutitur semen: nam si in cumulos accommodabis, facillimè putrescit, & comburitur.

### De cumino. CAP. XXXIX.

**S**VBI VNGEMVS aniso cuminum, quum vtrique parsatio conueniat. Achenæus inter condimentarias herbas connumerat. Plinius de cumino loquens, condimentorum omnium fastidiis cuminum amicissimū (Dioscorides: bibentium, aut perunctorum colorem mutat in pallorem) omneq; pallorē bi-



benibus gignit. Itacerte ferunt Portii Latronis clari inter magistros dicendi adfectatores similitudinem coloris studiis contracti imitatos, & paulo antequam Julium Vindicem adfertorem illum à Nerone libertatis, captatione testamenti sic lenocinatum. Platina ait: Hoc hypocrita vtuntur, eius enim nimius vsus pallorem inducit.

**Nomen.** Græci *κύνισον* vocant. Sunt qui putent à *κύω* verbo manasse, quasi pragnans, tantæ est enim feracitatis inter oleracea, vt etiam maledictis satum vberissime luxuriat. Latini cuminum. Palladius ciminum. Itali *cimino*.

**Genera.** Theophrastus pluribus constare generibus dixit. Dioscorides & satium & sylvestre descripsit. Satium ori gratum, sed multo magis Æthiopicum, quod Hippocrates regium appellauit. Secundum locum tenet Ægyptium, reliqua sequuntur, sylvestre vnum & alterum satiuo non dissimile. Auicenna aliud Carmenum nigri coloris, aliud Persicum quod est fortius Scemio, aliud Stemmium citrini coloris. Urbanum inuenitur omnibus locis, & ex omnibus aliud sylvestre, aliud domesticum.

**Descriptio.** Theophrastus: Radice penitus exigua. Semen oblongum, canaliculatum, nudum adhaerens, vnde facile exiccatur: nam ubi planè accreuerit, defluit, & subricum procidit. Omnium fecundissimum est olerum, cuius rationem assignat libro de causis: Ratio, quod quæ exigua sunt, facilius suum finem consequuntur, quod etiam facile fit, sepius fieri potest, facilitas enim propiores habet fines principis suis: & quæ imbecillia sunt, paratiora, & obtemperantia ad opus sunt, & ab externis facilius patiuntur, scilicet aëre ambiente: vnde & tor auxilium adnata, aeris, & seminis exiguitate, nuditateque multum operis expediunt. Præterea vnico caule coherent, robusto & non lignoso, ab vna radice in plures ramos diffusos, nec frondibus confuso, ne quod fructui deberetur, multum opera & materie auferat. Accedit his radicem bona habitudo, ne sui succi cupida, auara, & tenax sit, sed succum seminibus satis large dispensando ministrat, quod in bulbaceis, & ferulaceis non euenit. Plinius ab eo. Nascitur in summa tellure vix hærens, & in sublime tendens. Est autem vnicaule, radice bulbo simili. Semen angustum, & canaliculatum. Dioscorides ait sylvestre cuminum frutice paruo esse, dodrantali caule, ac tenui, quaternis, aut quinis foliis, tenuibus, veluti serratis, & gingidii diuisione. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda, in quibus est semen acerosum, gustu satiuo acriore. Aliud sylvestre satiuo non dissimile, quod à singulis floribus elata promit cornicula, in quibus semen melanthio simile. Nascuntur apud nos omnia genera.

**Calum.** Dioscorides in Æthiopia, Ægypto, Galatia, Asia, Cilicia, Terentia, & plerisque aliis tractibus nasci scripsit. Sylvestre in collibus. Plinius calidis maxime locis. Auicenna in Carmania, Persia, Scemia, & apud Nabatheos.

**Solum.** Plinius non nisi solo gracili nasci voluit. Palladius locis latioribus melius prouenire, itemque ceteris, si humore iuuentur, & stercore, loco bene subacto, & cui latamen admisceas.



Theophrastus: Peculiare de cumino dicunt, imprecari nanq; & maledice-  
re ferendo oportere affirmant, quo latius, copiosiusq; proueniat. Plinius ab  
eo: Cuminum qui ferunt, precatur ne exeat: qua ratione & qui male precan-  
tur, dici possunt cuminum ferere. Eo verò vsus prouerbio Sophron, & Deme-  
trius Phalereus scribit *κύνων ἔσται*. Sed in Sympotiacis Plutarchus impreca-  
tionibus, conuiitiisq; feri cuminum approbat. Palladius benè feri scribit. Fe-  
bruatio etiam feritur, & quod satum est herbis purgatur assiduè. Plinius me-  
dio vere ferendum esse dicit.

Satio.

Morbi.

Theophrastus. Peculiares omnino morbi scabies, & falsilago, quibus affe-  
ctum perit. Plinius non idem subtrahit: Et necatur cyminū ab imo dorso nisi  
repurgetur. Alias priuatim cumini morbus scabies. Theophrastus: Quod na-  
scitur ab radice cumino hæmodorum vocatur. Sed quæ herba fuerit hæmo-  
dorū latius in segete suo capite differemus, quare illuc lectorem remittimus.

## De satureia. CAP. XL.

**S**ERITUR in hortis satureia, vt cibis gratior sit ad obsonia condienda: a-  
lioquin in montibus medicinæ utilior nascitur. Columella satureiam viri-  
dem esui iucundam, nec aridam inutilem ad pulmentaria condienda dixit.  
Nec solum apibus gratissimam, sed etiam medicamentosam, & quo ferula, eo  
modo satureiam cunilam condiri docet. A quo Plinius: Est & satureia dicta  
in condimentatio genere, origano æmula, nusquam vtrumq; additur, quippe  
similis effectus, & apum gratia feritur. Palladius apum gratia feri oportere di-  
xit, ac tertii meriti mella conficere. Vnde si prius asperis, saxosisq; locis nasce-  
batur, nunc his dotibus nostro hoc orto conferenda venit.

Theophrastus *θύμβρα*, & *πὶ θύμβρον* dicitur. Dioscoridi *θύμβρα*. Galenus  
thymbram thymorum nomine fuisse complexam videtur, quum pluraliter  
thyma vocauerit, nec alibi inter simplicia thymbræ meminerit. Latini satu-  
reiam vocant. Ouidius,

Nomen.

*Sunt qui præcipiant herbas satureia nocentes*

*Sumere.*

Sed an thymbra sit satureia apud Latinos, quum pleriq; doctiores confun-  
dant malè distincta veterum scriptorum thymbræ, & satureiæ nomina: nos  
vt omne nubilum discutiamus, latius euagari cogemur. Duo sunt apud Colu-  
mellam cunilæ genera, transmarina vna, nostras altera: transmarinam cuni-  
lam thymbram vocat, nostratem verò satureiam dicit, vt suis autoritatibus  
comprobabimus. Libri noni capite quarto, pabulationes apibus destinan-  
do, ait regionem fecundam oportere esse exigui fruticis, & maximè thymi,  
aut origani, aut thymbræ, vel nostratis cunilæ, quam satureiam rustici vocant,  
intelligens pro thymbra transmarina cunilam, & à nostrate cunila distinguens  
dictione illa, vel, quæ est distinctiua coniunctio. Hanc nostram opinionem  
ex eodem Columella demonstrabimus, quippe libro vndecimo, capite tertio



ait: Thymum, & transmarina cunila, & serpillum, sicut priore libro iam retuli, magis aluearia curantibus, quàm olitoribus studiosè conseruntur. Præterea loco prius citato ex lib. 9. cap. 4. paulò inferius, ubi frutices apibus destinabat, reddens notas mellis ait: Thymo deinde proxima thymbra, serpillumq; & origanū. Tertiæ notæ, sed adhuc generosè, martinus ros, & nostras cunila, quam dixi satureiam. Demonstrans maximè distare pro mellis notis thymbram, siue transmarinam cunilam, à nostrate cunila, siue satureia. In hortulo (quod clariùs considerari non potest) eam manifestissimè distinxit:

*Et satureia thymi referens, thymbræq; saporem.*

In condituris etiam herbarum, ut utraq; distingueret cunilas, vocat cunilam satureiā primò, & paulò post. Hac conditura potest commodè satureia viridis, & æquè viridis cunila seruari: ubi pro viridi cunila transmarinā intelligit thymbrā. Hanc etiam distinctionē Palladius annotavit: Quippe à Columella transcribēs mellis notas, secundi meriti, ait, thymbra, tertii meriti satureia: & in Februario mense tum satureiæ, tum cunilæ separatim sationes descripsit. Distinxit etiam Plinius ab utroq; transcribens. Thymbram verò, quæ sit cunila, hæc apud nos habet vocabulum & aliud, satureia dicta in condimentario genere. Q. Serenus satureiam thymbræ speciem dicit, & thymbram non absolute sed cephalotem thymbram dici. Thymbra natalis solis retinet appellationem: est enim (si Stephano credimus) Thymbra oppidum, in quo templum Apollinis sacrum, à quo Thymbræ retinet cognomē. Ager enim erat antiquo illo proximus, & Thymbræus fluvius, qui per eum in Scamandrum fluebat, ab Apollinis Thymbræi templo quinquaginta stadiis distabat, qui ager thymbræus dicebatur, si Seruio credimus. Satureia nomē à Satyris traxisse memoratur, quum satureia usque marcescentes coitus stimulet. Vnde Martialis,

*Improba nec profunt, nec satureia tibi.*

*Italiantoreggia. Neapolitani satureia.*

**Genera.**

Theophrastus satureiam in urbanam & sylvestrem discreuit, sylvestrē vicinam urbanæ, præterquam quod foliis minoribus, caulibusq; scabrioribus constat, & succo potissimum acriori, vehementiori; Dioscorides item sylvestris & sativæ meminit. Satiua sylvestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam in cibos recepta est. A quo Paulus: Sylvestris thymo similis, sativæ viribus ignavior, esuiq; cibario gravior. Plinius in sativam, & sylvestrem discreuit. Quæ sunt & sylvestria, eadem in sativis sicciora intelliguntur, & acutiora: sunt autem acres cunilæ.

**Descriptio.**

Acri succo Theophrasto describitur. Semine fecundo, eoq; ad perdurandum firmo. Ab eo Plinius. Acrisucco. Semine ad perdurandū firmo. Describitur nos. Oritur eleganti aspectu, virgultis exilibus, sarmentosis, lignosis, foliolis crebris, & angustis, spicam in summo gerentibus, copiosis flosculis intertextam, & obsoleta purpura albicantibus, gustu acri, & odore. Sylvestris aspectu, cicutula, nigricantibus foliis, floribus in purpura dilutis, primò herbaceis.

Locum



Locum satireia querit, quo statim à mari perueniant: nam si eo destitua- Colum.  
tur, illic nasci, durareq; posse negat Theophrastus, qua de causa in Arcadia pro-  
uenire non potest. Columella: Transmarina cunila apricum locum poscit, ut  
pote maritimis regionibus. Palladius loco aprico, vel melius mari proximo.

Montes exoptare satireiam prodidit Theophrastus, ibiq; gratà odore mol- Solum.  
lioremq; comperiri. Et libro de causis, cultu deteriore multo reddi, ut quæ  
freta, aeris, & amara sit, usumq; medicaminis præstet: hortis verò heberatur, ef-  
feminaturq; Columella suam transmarinam cunilam locum, neq; pinguem,  
neq; stercoratum querere scribit, ut quæ macerrimo solo, maritimisq; plerumq;  
10 regionibus nascatur. Ab eo Palladius, Locum neq; pinguem, neq; stercora-  
tum exoptat.

Satureiæ satio est ex æstiva semente ait. Theophrastus. Vnde Martio feri- Satio.  
tur. Ex veteri semine celerius, ad exeundum plusquam triginta dies dantur.  
Difficile nanque germinat, humorem enim habeat aptum, & non minus, sed  
forsitan magis temperiem ad agendum, ac patiendum oportet, quod germi-  
naturum facile, beneq; sit. Plinius ab eo: Cunila quidem post xxx dies nasci-  
tur. Columella, Calēdis Februarii satireiæ semen spargere conuenit, cum ce-  
pina intermiscendum, ut eam quoq; habeamus. Transmarina cunila & semine  
& plantis circa æquinoctium vernum seritur, cæterum viuacior est, ut impen-  
20 sius curanda sit. Palladius: Cum cepulla mista seminatur Februario. Cunila ex  
Februario seritur, & colitur eo more, quo allium vel cepulla. Sed locis frigi-  
dis, Martio seratur satireia, & cunila. Nouembri etiam, & Decembri, cunila  
seritur. Plinius: Ferro quoq; non expedit tangi cunilam, auctor est Sabinus  
Tyro in libro Cepuricon, quem Macenati dicauit.

Dioscorides dicit epithymum esse florem è thymo duriore, satireiæ simi- Epithym.  
le, capitula habet tenuia, & leuia, & in eis caudiculas, quasi capillamenta. Pau-  
lus quod supra thymbram nascitur epithymbram vocat. Nobis videre conti-  
git in Gargano monte Apuliæ supra thymum durius, sed potius thymbræ af-  
similabatur, quidpiam citrorum, modo comarum ramos, crebro volumine  
30 complicare, sæpenuero purpurascens.

#### De hyssopo. C A P. X L I.

**P**OS T satireiam de hyssopo dicemus, ei valde assimili, hortensi herba, quæ  
nascitur etiam culinis, condimentario vsu nota, est enim aliquibus escu-  
lentis apta. Clara Salomonis sapientissimi nomine, qui cuncta disseruit à Li-  
bani cedro vsq; ad hyssopum de pariete enascentem.

Græcis ὕσσωπος, & ὕσσωπον, quasi ὕψωπος ὅτι τὸν ὄψον, impluens oculos, aut vi- Nomen.  
sum, vel ὅτι τὸν ὄψον, quia raucam vocem pulmonemq; iuuat. Latinis hyssopus,  
& hyssopum. Itali hyssopo.

Duo Dioscorides hyssopi tradit genera, montanum & horrense. Genera.

40 Dioscorides hyssopo non dissimile origanum heracleoticū dicit, sed umbel- Descriptio.  
lā non trochoides, id est circinatam turbinatamve, qualis hyssopo, quin potius



umbellis veluti diuisum, aut disparatum, & in extremis virgis semen non densum: ac paulo post onitidem origanum describens ait. Candidiorem folio, & hyssopo similiorem, quàm heracleotico. Coma item corymborum specie chrylocomæ simili. Ex his patet vulgare hyssopum non esse legitimum Dioscoridis, sed Hebræorum. Plinius ei improprie baccas tribuit. Verùm apud nos nascentem ita describimus. Frutex à radice prodeuntibus pluribus surculis lignosis, sesquipedalibus, foliis oblongis, circumquaque caulem per interualla vestientibus, duris, odoratis, umbellam fert circinatam, turbinatamq;,, densam & congestam ex multis floribus purpureis, quibus maturescuntibus semina frequenti glomeratione coniunguntur in corymbi æmulationem: mitio 10  
tis saporis, & acrimoniæ, quàm Hebræorum.

*Calam.* Hippocrati præfertur Cilicinum, sed è Tauro monte, dein Pamphiliū, & Smyrneum. Archigeni Creticum commendatur ex Galeno. Dioscoridi Cilicum, ex his videtur calidum locum desiderare.

*Solum.* Solum neq; pingue, neque stercoreatum desiderat. Visitur enim in caulis, & maceris nali.

*Satio.* Seritur semine, & plantis circa vernum æquinoctium, quæ vbi comprehenderunt, viuaciores, quàm vt sequentem hyemem reformident.

#### De origano. C A P. XLII.

**D** I C E M V S de origano, quum & sapore etiam dictam cunilam imitetur 20  
authore Plinio. Alexis in excubiis, Athenæo authore, inter condimentarias herbas connumeravit. Idemq; ab Antiphane. A Theophrasto inter olera numeratur. A Plinio inter coronarios frutices. Columella gratissimum apibus dicit, reddereque saporis præcipui mella post thymum. Palladius item, atq; secundi meriti mella conficere. Pernicialia, inquit Plinius, brassicæ & vitis odia, ipsumq; olus, quo vitis fugatur, aduersum cyclamino & origano perarefcit. Origanum ciconiam depalci, & ea contra venenosa animalia pugnaturam muniri ait. Cassianus Græcus, ex delectis Græcorum placitis scribit, Testudo si à serpentum esu ægrotat, origanum superingressa, sana redditur. Aristophanes in ranis, *ορίανον βλέπων*, pro toruis oculis intueri, sumptum à 30  
planta eiusdem nominis, quæ intuentibus torua & inamabilis videtur. Quærit Aristoteles in Problematis quænam causa sit, quod origanus musto iniecta, vinum dulce efficiat. Duas enim heminas iniecisse in amphoram satis sit. An quod tollit, quantum est in musto, aquabundum, & sæculentum, sua siccitate in se ipsa recipiens, quibus scilicet saporem confici austerum censemus? Argumento quod vina si quid aquæ habent sibi illatum, minus mollia redduntur, atq; si diutius stare in face sinantur, itidem fiet, & quum vinum dulce molimur, vuas multum temporis soli exponimus, vt sol quantum sit dilutum auferat, & reliquum decoquat, hoc autem idem facere vel origanus potest, quippe quæ sit & sicca, & calida.



Theophrasto *ὀείρανον*, & *ὀείρανος*, appellationemq; apud Græcos inuenit *Nomen.*  
*ὄρος*, id est, à monte, & *ἄνθος*, quod gaudium significat, quod montosis gaudeat, editisq; natalibus. Herodianus quod visum exacuatur, nomen duxisset statuerat ab *ὀείρειν* videre, & *ἄνθος* clarifico, quod tradant scriptores visum illustrare. Theodorus Grammaticus nomen ex aduerso datum putauit ab *πῖζον*, quod est algeo, vnde *πῖζανον*, & adscita o principelitera *ὀείρανον* confictum nomen, quod minimè refrigeret, quum calida dote præditum sit. Alexandrides origanus virili genere vsus est, Aristophanes muliebri, quem omnes Attici sequuntur, & Plato acutissimum origanum dixit. Epicharmus, & Amypsias neutro genere *10* vsi sunt, Athenæo authore. Ita & Latini promiscuo genere vsurparunt. Columella & Palladius & Plinius origanum dixere. Alii origanus. Syluestre origanum Dioscorides panacem Heracleum, & cunilam à quibusdam vocari meminit, inter quos Nicander Colophonius,

— *Panaceamq; cunilam,*

*Et quam iam Heraclion origanon inde vocarunt.*

Diocles etiam cunilam, vt vetustissimus faretur interpres. Petricus in Ophio Conilon quendam hominem herbam inuenisse tradidit, inde nomen ei cunilæ. Alterum genus onopetalium vocat, quod asinis pabulo gratum sit: sequuta ætas ab eo onitum appellauit. Itali vocant *origano*.

*10* Theophrastus duo eius constituit genera, nigrum & candidum, priori nullum semen, candido perquam minutum. Genus syluestre esse indicauit & atnense nominauit, aspectu vicinum vrbis, præterquã quod foliis minoribus, caulibusq; scabrioribus constet, & succo potissimum acriori vehementiori; condatur. Dioscorides quatuor eius genera dicit: Heracleoticum, onitis, syluestre, & tragoriganum. Plinius quum superiori capite duo cneori genera constituisset, nigri & candidi, subdidit totidem origano in coronamentis species, alterius enim nullum semen; id autẽ cui odor est, Creticum vocatur. Quod ex Theophrasto transtulit, hoc autem ex Dioscoride: Origanum in medicina *Genera.* plura habet genera, onitin, prasion, tragoriganum, heracleoticum, quod etiam in tria genera subdiuidit, latifolium, tenuifolium, & medium.

*30* Suam origanum describens Theophrastus, hæc habet. Suffrutex est immortalis virens coma, & si reliqua decidant. Fœcundũ semine, acri succo. Dioscorides Heracleoticũ folia habet hyssopo non dissimilia. Umbella, quæ nõ in rotæ specie orbiculata, sed veluti multifida, semine in multis virgis haudquaquam denso. Onitis candidiori folio, hyssopo similior, semen veluti coniunctos corymbos habet, vis inefficacior priori. Tragoriganũ tenuis frutex, syluestri serpillio, aut origano, similis folio, & ramulis, quibusdã in locis latius, virentiusq; inuenitur, & leuioribus foliis satis glutinosum. Alterum exilibus furculis, ac tenuibus foliis, quod prasion vocauere. Plinius à Theophrasto: Folia à cacuminibus cadunt. A Dioscoride: Onitin appellant non dissimile hyssopo: tragoriganum simile est serpillio syluestri. Heraclium quoq; tria genera habet, *Descriptio.*



nigrius, latioribus foliis, glutinosum. Alterū exiliioribus mollibusq̃, sampsi-  
cho non dissimile, quod aliqui prasion vocauerunt. Tertium inter hæc medium.

*Solum.*

Non erumpit, Theophrastus ait, quod flatus à mari non accedit, ideo mini-  
mè fruticat in Arcadia. Plato acutissimū ex Arcadia origanum dixit, ex Athe-  
næo. Antiphanes origanum Tenedi laudauit, ex eodem. Dioscorides opti-  
mū esse Cilicum, Cretense, Smyrneum, & in Chio, Chooq̃; proueniens. Pli-  
nius optimum Creticum, proximum Smyrneum, dein Heraclioticum.

*Solum.*

Palladius loca aspera, & saxosa quærere dixit. Nos semper gracili solo vidi-  
mus.

*Satio.*

Theophrastus origanum semine feri dixit, sed germinatu contumax: à satū  
enim non ante trigessimū diem emicat. E veteri semine celerius exit. Desi-  
xus etiam humi surculus comprehendit, transfertur quum ad vnum pal-  
mum, vel plus altitudinis venerit, dimidiò abscisso. Difficile germinat: hu-  
morem enim habet aptum, & non minus, sed forsitan magis temperiem ad  
agendum, ac patiendum habere oportet, quod germinaturum facile, beneq̃;  
sit. Ab eo Plinius: Nascitur satum post trigessimū diem, è veteri semine ce-  
lerius prouenit. Surculo etiam seritur: pracidunt enim & hoc, quum ad pal-  
mum peruenerit altitudinis. Palladius: Seritur ante æquinoctium autumnā-  
le. rigari & stercorari, donec coalescat, oportet. Mense Martio transferri po-  
test. Octobri etiam seritur. Tradunt olitores nostri negle&am sampsuchum  
in origanum degenerare, frutice serpilli humi reptante, foliis sampsuchi, flo-  
re purpureo in umbella cineritia.

### De ocimo. C A P. XLIII.

**C**HRYSIPEVS ocimum grauitet increpuit, vt Plinius est author. Capras  
id aspernari, hominibus quoq̃; fugiendum censet. Adiciunt quidam tri-  
tum si operiatur lapide, scorpionem gignere: commanducatum & in sole po-  
situm vermes afferre. Alii verò, si eo die feriatur quispiam à scorpione, quo e-  
derit ocimum, sanari non posse. Quin immo tradunt, aliqui manipulo ocimi  
cum cancris decem marinis, vel fluuiatilibus trito, conuenire ad id scorpiones  
à proximo omnes. Florentinus Græcus, Argumentum malignitatis eius esse  
capram, eius noxā satis testari, quod quum ceteris omnibus pabulis auideve-  
scatur, hoc vno cognoscitur abstinere. Mansum autem, & in sole expositum,  
scorpiones gignere, tantamq̃; esse cum eo fœminarum discordiam, vt si pultario  
subiectum sit integrum cum radice ocimum, nec mulier id sciat, futurum, vt  
cibo manus nō admoliatur, priusquam subductum fuerit. Dioscorides ab ali-  
quis scribi ait, ocimum cōmanducatum, & in sole positū, vermiculos creare,  
atq̃; Afros adicere, si feriatut à scorpione qui ocimum ederit, nullo conflictu  
ri dolore. Galenus commentum esse ait, si fictili nouo tritum operiatur, breui  
præsertim insolatu, scorpionem gignere: sed hoc tam abesse à vero, vt nil tam  
repugnet. Sed quod Græci dicunt, nigrum habere naturali proprietate cum

fœminis



Sæminis controuersiam, res proflus digna risu est, quum naturali proprietate herbarum nulla sæminis magis placeat, quum res non sit, quæ tantopere ab illis colatur, quàm ocimum, nec quæ sigulinis vasculis, & pensilibus fenestrarum hortulis, tanto amore oblectentur. Narrat Plutarchus de eo rem non minore admiratione dignam, quod succinum leuissima quæq; & quisquillas omnes moueat, & alliciat, solos ocimi surculos à se abiiciat. Varro apibus gratissimum dicit. Inter olera hortensia colitur, & in cibis in acetariis, & condimentis, viridi & sicco continuo vtimur.

Nollem anceps huius ocimi nominis dictio tyronum animos diuexet: ocimum enim duo significat, hortensem herbam, de qua in præsentiarum sermo est, & pabulum, de quo in pascuis dicemus. Theophrastus *ἄνιμον* vocat Græcè, Varro tam ocimum genus pabuli, quàm ocimum hortense vult ab *ἄνις* dictum Græco vocabulo, quod valet, citò. Plinius verò: Varro appellatum vult à celeritate proueniendi, à Græco, quod *ἄνις* dicunt. Pompeius idem confirmat, quod omnium eorum, quæ in hortis nascuntur, celerrimè proueniat, dieq; à quo satum est, tertio erumpat. Sunt & viri non indocti, qui per z scribendum censeant, ozimum, dictumq; à Græco vocabulo putant *ἴζον*, quod est flagro, hæc enim herba flagrantissimi est odoris. quam opinionem fortasse plurimi sequerentur, nisi Plinii, Dioscoridis, cæterorumq; antiqui excussi, calamoq; exarati codices castigatissimi apertere refragarentur, vbi per secundam consonantè scribitur. Sotion Græcus *μαρδύλον* vocat, ab illo sæminarum odio. Heschinus à recentioribus Græcis *βασιλικόν* dici ait, quasi regium, quod nomen apud Italos hodie vsurpatur ab insigni odore, quòd regia domo, & regis manibus gestari dignum sit. Latini variis authoritatibus addicti, variè scribunt. Columella ozimum dicit, Palladius ocydum, Plinius ocimum. Itali *basilico*. Hæc habet Theophrastus de ocimi descriptione. Radix data est vna ocimo, quæ descendit in altitudinem crassa, cætera à lateribus exiles, & proluxæ, omnium radicum lignosissima. Foliis iam perfectis, caulis conuenienter assurgit, folio corchorum æmulatur. Floret contra quàm cæterum olus, primo parte inferiore, demum superiore, quo fit vt diutius quoque floreat, quemadmodum faba, & inter herbas heliotropium, & quædam de sylvestribus alia. Semine sæcundissimo, difficileque exiccatur, cortice obducto, ad perdurandum infirmo. Sub cane albescit. A quo Plinius: Surculosa ocimo radix; floret particulatim & ab imo incipit, qua de causa diutissimè floret. Semen cortice obductum, quæ in cortice sunt, difficillime marcescunt, maximeq; ocimum. Ad perdurandum infirmum est. Sub canis ortu pallefcit. Ad diuinus nos: Pedali ocimum altitudine proflit, surculosum, rotundis ramulis, folio mercurialis, parietaria, sed minori, & diluti viroris, flosculo & calyculis verticillatim caulem ambientibus, semine pullo, rotundo, odoratoq;. Iunio, & Iulio floret, dein semen producit.

Et si ex corrupto Theophrasti textu, Theodorus plura ei genera esse vertat, Genera.



negat tamen in eo generis diuersitatem. Quod Plinius ab eo trāscribens confirmat. Singula genera sunt ocimo, vbicunq; idem semper est, neq; aliud alio melius vnquam. Neq; Dioscorides generum distinctionē apposuit. Sed Neapolitani plura obtinent genera. Est genus vnum foliis magnis, longis, & crassiss, alterum ramis, & foliis longē minoribus, cuius duæ species, odore differentes: vna communis odoris, altera mali citrii, adeò simili, vt vulgus *citratum* vocitet, non vt Matthiolus, quod folia eius cum malicetrii foliis similitudinē habeant. Postremum foliis minimis, & angustis, sed odore & viribus cetera superās: vulgus basilicum nobile, & *garyophyllatum* vocat. Alterum est magnum foliis rubeis maculis notatum. Vltimum genus iam pridem Constantinopoli aduectum, cuius folia, tota q; planta quadruplo maiora, gariophylli cum citro confusa iucunditate. Studiosē in Neapolitanis hortis nuper feri cœpit. Omnium varietates etiam mulierculis notissimæ.

Cœlum.

Cœlo gaudet tepido: nam si sole continuò illustretur Theophrasto auctore, in serpillum transit, cuius rationem in libro de causis reddidit. In solationis causa vehementius exiccatur, vnd folii magnitudo decrescit, ac populante calore, alimenti inopia flagrantius redditur, quippe quum alimenti minus habeant, quæ sicca sunt. Sed eiusmodi mutationes ita euenire putandum, vt aliquid similitudinis faciant non vt omnino speciem exprimant alienam. Palladius autem narrat Martialem rem miram de ocimo affirmare, quod modo purpureos, modo albos flores, modo roseos pariat, & si ex eo semine frequenter seratur, quod simul atque solo creditum est, aqua calida perfuderis, modo in serpillum, modo in sisymbrium abire solitum. Plinius verò senectū in serpillum degenerare dixit.

Solum.

Columella profissum, riguumq; solum exoptare in hortulo cecinit,

*Tum quoq; profisso, riguoq; inpersa nonali*

*Ozima comprimite & grauibus densate cylindris.*

Satio.

Semine prodire scripsit Theophrastus. Item tertio die à satū prouenire, & æstate prodire, quod et si siccum & lignosum sit, attamen ante feruentes dies, vt perdurare atq; perfici possit, minime valet, cuius causa debilitas est. Ex estiuua semente est, ideo Martio seritur, estq; ex iis quæ per æstatem feri mos est, quod ex imbecillitate celeriter augescunt, & hyemem nequeunt tolerare, vel quod sicca sint, ceu ocimum, vel quod frigida, humidaq; vt cucumis, & portulaca. Plinius latius, & copiosius prouenire ait, si cum maledictis seratur, vt fortasse Persius hoc senariolo huc alluserit,

*Quum bene discincto cantauerit ocima verna.*

Vnde adagio confirmatum est, vt qui alicuius famam proscindere, & tenerimam veneni labem atfigere conatur, ii ocima serere dicatur. Columella: Semine seritur post idus Maias vsq; in solstitium: nam teporem desiderat, cuius semen obrutum diligenter inculcatur pauculo, vel cylindro: nam si terram suspensam relinquant, plerunq; corrumpitur, quod etiam suo hortulo docuit,

*Ozima*



*Ozima comprimite & granibus densate cylindris,  
Exurat sata ne resoluti pulueris aestus,  
Parnulus aut pulex irrepens dente laceffat,  
Neu formica rapax populari semina possit.*

Ab eo Plinius: Sato paucitur terra. Theophrastus, Germine nec nō ocimum  
prouenit: nam id quoque transfertur, quum ad palmum, aut plus altitudinis  
venerit, dimidioq; abscisso. Proximum inter olera ocimum est, hoc enim seri  
pro parte superna optimè potest, quamquam lignosum admodum sit, sed quia  
difficilius exiccare possit, eo prouenit, quam obrem & longum tempus perdu-  
rat, & tortum, & dimidiatum regerminat. Plinius ab eo: Prouenit surculo, præ-  
ciditur enim & hoc, quum peruenit ad palmum altitudinis. Incuruatoq; cacu-  
mine alicuius rami, quum attigerit terram, statim radicatur ocimum, nisi quod  
difficilius crescit.

Vni ocimo aquam in meridie dari iubet Theophrastus, quum cætera ma- Cultus.  
turinis rigentur. A quo Plinius: Omnibus hora rigandi matutina, atq; vespera,  
ne aqua feruescat sole, ocimum tum etiam à meridie. Ferro etiam tågere non  
expedit, auctor est Sabinus Tiro in Cepurico, quem Mæcenati dicauit. Colum-  
mella: Ocimum vbi satum est, sua sede immōtum permanet: neq; est eius cul-  
tus alius, quàm vt stercoratum runcetur.

Caule reciso regerminat. V sitatum euidentissimumque, in ocimo suauio- Ars.  
res esse caules regerminatos: cuius rationem reddidimus. Ab eo Plinius: Cau-  
le reciso ferè quidem omnia regerminant. Est in vsu verò ocimum, thapha-  
nus, lactuca. Hanc etiam suauiore putant à regerminatione. Parilibus opti-  
mè seri dicunt, quidam & autumnō, iubentque quum hyeme seratur, aceto  
semen perfundi. Etiam satum celerrimè erumpere putant, inter initia feruen-  
ti aqua aspersum. Palladius: Octobri mense seratur, citiusq; nasci dicit, si leui  
imbre aceti inspergatur infusum. Et si Aprili seratur, cito nasci dicitur, si statim  
quum seueris, aqua calida perfundas. Nos autem quia eius natura admodum  
sicculosa est, quod facile à sole patitur, nisi perpetuo rigetur, igitur è pelui a-  
quam panno aduoluto deducimus continua distillatione. Mulieres nostræ o-  
robanchem, vel vt rectius loquar, linobanchem serunt, enatam decerpunt, ac  
capreolum vnum inter virètem ocimum proiciunt, qui facile surculum illius  
aliquem capessit, ac se intorquet, inibi que crescit, crebro volumine se impli-  
cans, vt paucis diebus longè ocimum superet, & fictilia vascula, in quibus est,  
obuoluat tota, vt nil speciosius videri possit. Rectè id epiocimum dici pos-  
set. Fuchsius ex eodem genere tria genera nata recenset.

Sub Canis ortu pallefcit, quasi morbum sentiens, ex Theophrasto. Facile se Inf. rem.  
necat, degeneratque in serpillum.

*Depulegio. C A P. XLIII.*

ET inter herbas, quæ condimentario vsui inseruiunt, adnumeratur pule-  
gium. Plinius, Dignior corona vertigini è pulegio, quàm è rosa: nam & ca-



piris dolores imposita dicitur leuare: quin & olfactu capira tueri contra nimium frigus, æstusve: nec æstuate eos, qui duos è pulegio surculos impositos auribus è sole habeant. Mirum de eo tradunt veteres, quòd ipsa solstitii die etiam à planta abscissi ramuli florent. Quod percontatur Aristoteles in problematibus: Cur pulegium, liriū, & cepe suspensa florent solstitii tempore? An inest crudum in his alimētum, quod vt hyeme concoqui ex frigore nequit, sic solstitio ex calore concoquens, auget? Vtrum quia influxu carent assiduo, breui marcescunt? etenim, quæ nullum alendi initium, nullum influxū assiduum habent, intereunt exiccāturque: qua de causa accidit apud Scythas, vt frumentum diu in terra maneat propter copiā niuis, & vbi emergerit, celeriter crescat. Theophrastus, Pulegiū succum omnino sentitur, verūm quamuis ita sit, principium tamē quoddam eiusmodi habeat necesse est, quod vnà cum aeris mutatione, alterationeque moueatur. Mirum præterea, quod non remissa, sed potius intenta sæuitia temporis germinare incipiat, nisi fortè dies halcyonides suffecturas putaueris: nam ad imbecillorum exiguorumque mutationem, vel quantumlibet tēporis satis sit. Plinius ab eo: Pulegii natura sapius dicta est, in carnariis reflorescens. Et alibi. Miretur hoc, qui non meminerit ipso brumali die pulegium in carnariis florere, adeo nihil occultum esse natura voluit, & sciendi hoc igitur dedit signum. Sed parum videtur inter Aristotelem & Theophrastum, & Plinium conuenire: quum ille bruma florere tradat, immò brumali die suspensum florem edere fateatur, contra illi solstitio florem facere, quod fortasse in causa esse potest, vt biferum sit pulegiū, & quod bruma præcoci partu florem non fudit, ob calorem solstitio protulerit, sed qui brumali tempore mittitur flos, prioris autumnii redūdante tunc alimonia proficit, brumam ostensurus. nam vtroque tempore floret.

## Nomen.

Theophrasto βαλχῶν, & βαλχῶς, Theodorus blichon vertit, Dioscorides γανγῶν, & blechona dictum aliquibus vult, quia dū floret, gustatum à pecoribus, balatum extorquet. A quo Plinius: Gustatum à pecore, caprisve, balatū conicit. Vnde quidam Græci literas mutantes, blechon vocauerunt. Latini pulegium vocant, quia Plinio auctore, eius flos recens incensus, pulices odore necat. Itali *puleggia*.

## Descriptio.

Cretensi dictamno Theophrastus folia similia reddere ait. A quo Dioscorides, Dictamno Cretensi similia pulegii folia, sed minora. Plinius: pulegii color mentastri. Addimus nos: Fruticosum assurgit, subitali altitudine, surculis hirsutis, rubicantibus, per interualla purpureo flore coronatis. Radix illi gracilis, & capillata, quæ humi serpat. Tota planta gustu acris, ac non sine quadam amaritudine. Iulio, & Augusto floret.

## Genera.

Dioscorides satui pulegii meminit, & sylvestris in calaminta, vel secundam ipsius speciem facit. Plinius satium à sexu diuisit in marem & fœminam: mas flore candido, fœmina purpureo, sylvestri origano simile, sed foliis minutionioribus.



Prouenit cultis & aquosis locis. Arenosum potius, quàm pingue solum ex- *Cal, Sol.*  
poscit, solet enim in montosis exurgere.

Seritur vere suo semine, transplantatur tenerū, & sic optimè apprehendit. *Satio.*

*Dementia. C A P. XLV.*

**P**OST pulegium mentam trademus, & nepitam. Plinius. Congruit pule-  
gio. hæc quoque seruantur simili genere, mentam dico pulegiumque, &  
nepitam: atq; ad recreandos animi defectus magna cum pulegio mētæ, & ne-  
pitæ affinitas. Menta grato mēsas odore percurrit, & in rusticis dapibus. Ipsius  
odor animum excitat, & sapor auiditatem in cibis. Ideo & apud nos in condi-  
10 mentis, & acetariis familiarissima. Dioscorides vtilem in summo, & in condi-  
mentis peculiarem gratiam habere dixit. Strabo in Achaia montem esse iuxta  
Pitum scribit Mintham nomine, è Plutonis pellice in hanc herbam conuersa,  
Proserpinæ inuidia: quæ vocabatur à quibusdam hedyosinos. Ouidius,

*Fæmineos artus in olentes vertere mentas*

*Persephone licuit.*

Julius Pollux: Minthe Peloponesi mōs, in eo nemus Plutoni sacrū, vbi con-  
dimenta tractat. Tradit Oppiani interpres Mintham à Menta, quæ nympha  
fuit, appellatam videri, Cocyci filiam fuisse tradit, quæ vbi audiuiſſet amari à  
Plutone Proserpinam, indignata eo nomine constanter illi se præponere ausa  
20 est, dictitans, si inferos peteret, inimiciter interfecturam. Quo puellæ timore  
Ceres Persephones mater indignata, Mintham exculcans, in malam herbam  
deformauit. Hinc Pluto donum amoris petēti virile membrū tradidit, quod  
à sementulam nominauit. Sed cur Poetæ id confinxerint, sciscitemur. Dio-  
scorides enim & Plinius tradunt mentam efficere, vt lac in caseum non coa-  
guletur, eadem vi resistere & generationi creditur, cohibendo genitalia den-  
tari. Querit Aristoteles in Problematis, cur in adagium venerit, mentam  
belli tempore non edendam, nec ferendam. Quoniam inquit refrigerare  
solet, & absumere genituram. id quod fortitudini, & ferocitati contrarium est.  
Silymbrium quonam pacto mutaretur in mentam, diximus in coronariis.

30 A Theophrasto *μίνθη* dicitur, à Dioscoride *ἡδυοσμός*, ac si suavis odor dicere-  
tur, nomenq; ab odoris flagrantia inuenit. Aliqui dicunt *μίνθω*, dictam, quod  
*μίνθω* esset concolor, aut quia hirsuta, est enim *μίνθος* lanugo, quæ in sterquiliniis  
humēribusq; locis visitur, vt hirsuties illa quæ in nepita videtur. Latinis menta,  
non quod mentem percellat, quum odore oblectet: nam menthæ nomen, vt  
Plinius inquit, suauitas odoris apud Græcos mutauit, quum alioqui mintha  
vocaretur, vnde veteres nostri nomen declinauerunt. Itali *menta*.

*Nomen.*

Dioscorides in duo genera diuisit, in satium, & syluestre, illud mentam, *Genera.*  
hoc mentastrum appellans. Satiæ mentæ apud nos plura sunt genera, sed pa-  
rum inter se differentia. Vna crispioribus, & breuioribus constat foliis, alia ru-  
benti caule, & flore, alia verò albicante.

40



*Descriptio.*

Theophrastus odoratum olus vocat, quòd perinde in ea siccitas, acrimonia & acerbitas insit. Addimus nos, etsi notior sit, quàm representari digna sit. Herba cubitalibus flagellis, lanugine pubescentibus, folio sisymbrii, longiori, molli, semper odorato, flos circa calyculorum fastigia spicatur. Floret Iunio, Julio, & Augusto, inde profert semen, nigrum perexiguum, vt grana sabuli. Mentastrum ita Dioscorides depingit. Hirsutius est folio, & prorsus maiore, quàm sisymbrio, grauioris odoris. Plinius: Differt specie foliorum, quasi figura ocimi, pulegii colore, propter quod quidam sylvestre pulegium vocat. Nos autem sic: Vt à menta mentastrum defluxit nomen, sic sylvestriore habitu, rudiore, grauioreque odore, degenerasse videtur mentastrum, foliis maioribus, hispidioribus.

*Celum.*

Palladius apricum locum desiderare scribit, substinet quodcunque cælum. Sed melius calidum, nam frigido læditur, & pallefcit.

*Solum.*

Columella dulcem viginem desiderare dixit, quamobrem optimè iuxta fontem feritur. Palladius nec pingue, nec stercoreatū solum amare. Sed id mihi absurdum videtur, quum longe maius incrementum latamine capiat, & lætius virescat.

*Satio.*

Sunt qui mentham semine carere putent. Sæpe enim exiccatam tritamque seruisse inquirunt: sed nunquam semen erupisse, ex Theophrasto. Nos autem è mentha semen collegimus, illudque Martio mense seruimus, sed à mentha degenerauit, quippe pusillam, & degenerem mentham produxit, quæ odore tam verè nepitam æmulabatur, vt vnumquenque fefellerit, qui non inspecta stirpe, odore nasum consulere, quod mihi omnibusque mirum fuit. Columella sequitur: Cui fortè semina defecerint, licet de noualibus sylvestre mentham colligere, atque inuersis cacuminibus disponere, quæ res feritatem detrahit, & edomitam reddit. Quod nos experti sumus, optimè enim apprehendit, sed nil de feritate deposuit, vt eadem cum parente fuerit. Palladius, Aprili feri posse monet radice, vel planta. Februario plantis vel radicibus loco humido, vel circa aquas Octobri. Plinius. Ab æquinoctio verno feritur menta planta, vel si nondum germinat, spōgia. Minus hæc humido gaudet. Genus eius mentastrum, & hoc propagatur, vt vitis, vel si inuersi rami feruntur. Semel sata, diutina durat ætate. Nos hic cacuminibus ferimus Martio, optimèque apprehendit, facillimè enim propagatur. Semel satum locum vix poteris extirpare: nam serpendo radices è locis diuersis pullulat, vt rectè in hortulo Columella,

*Plantantur nec non serpentiagramina mentha.*

*Cultus.*

Plinius: Ferro tangi non vult, authoritate Sabini Tyrii in Cepurico. Triennio senescit, vnde radices in se ipsas reflectemus, perit cespes: sed post triennium suffodiantur, & disponantur in optimum, cultum, & stercoreatū solum.

*De calamintha. CAP. XLVI.*

**D**iximus de mentha, sequitur de calamintha eius specie.

*Nomen.*

Theophrasto καλαμίνθη, Nicandro καλαμίνθον dicitur, quasi bonam, & utilem



utilem mētham diceret, quum elegantiore aspectu, odoreq; delatiori, hilariorēq; habitu esset, quā mentha. Alii à *μάρι*, id est ligno dicunt, quasi lignosa mentha. Veterem Græciam cetrā appellasse author est Strabo, & Lacedæmoniam ab Homero cetoesiam nō à magnitudine, sed à calaminthe copia vocatam. Latini, authore Dioscoride, nepetam vocant, & Andromachus in sua Theriaca, Romana voce nepetam potius, quā Græca calamenthū vocauit. Itali *menta*, vulgus *herba digatti*, quod magna feles huius odore capiatur voluptate: nam si vulsa, vel hærenti contingat occurrere, ei statim sese affricant, & humo, quare sedet, iucundissimè suburantur.

20 Dioscoridi tria sunt genera: montanum, simile pulegio, & mentastro. Et *Genera.* capite de sampsuco aliam distinctionem accipere possumus, in tenuifoliam, & latifoliam.

Dioscorides montanam describit mōtibus familiarem, folia ocimi habentem incaua, surculos, & caules angulosos, purpureum florem, folia gustu impense feruentia, & acria, radicem superuacuam. Et folia item polemonia similia alibi scribit. Hoc genere Surrentinus tractus latè scatet, flore purpureo, odore cæteris suauiori, folio magis tenui, vnde leptophyllon videtur Dioscoridis suprā memoratū genus, vti sampsuchum comparat. Secundum pulegio simile est, sed maius, quā syluestre pulegium: nomen indiderunt, quod colore ipsum emuletur, nepetam Latini vocant, folia impēsē feruida, acria, radice superuacua, nobis vulgaris nepita dicitur, quæ siccis itineribus, & sepibus frequentissimè visitur. Tertia mentastro cognata est, foliis oblongioribus, caule & ramis maioribus, quā superiora: sed viribus inefficacior.

Dioscorides in campestribus, & asperis, & aquosis locis nasci scripsit.

Nicander illis riguos, & amnicos natales assignauit, in Theriacis.

*Calum.*

*Solum.*

Non opus est in huius satione latius euagari, quum passim nō lata nascatur.

*Satio.*

### Decoriano. CAP. XLVII.

30 **A**LEXIS in lebece, Athenæo autore, inter condimenta corianni meminit. M. Varro corianno subtrito in aceto carnem incorruptam æstate seruari putat. Idem Plinius.

A Theophrasto videtur appellari *κοριάννον*, & *κοριάννον*, à Dioscoride *κόριον* à cimicum putore nomen inditum verisimile est. Columella coriannum vocat. Itali *corianni*.

*Nomen.*

Theophrasto genere carere videtur. Plinius inter syluestria non inueniri tradit. Nos Melphi Apulie syluestre vidimus pessimè olens.

*Genera.*

Nudo semine nasci scripsit Theophrastus, ad perdurandum firmo, sub canis ortu salescit. Dioscorides in aliarum herbarum delineationibus illius meminit. Folia fert dauci tertii, thalitri paulo graciliora, fumarie similia, sed candida minus, angustiora quā ranunculi primi, vel anemones, minus scissa, aut parthenii, adianci. Umbella dauci primi, aut crebris in latere foliorum sectionibus.

*Descriptio.*



ut achillea, aut syderitis tertia. Nos hæc addimus: Caulis corianni exilis, sesqui- cubitalis, ramosus, folia, dum adoleſcit, adianti, fumarie, vel ranunculi, sed postquam excauleſcit, fœniculum æmularur, candida odore graui, viroſoq̃ue, radicem breuiusculam, ligneam, atq; admodum fibratam habet. Carpitur autumno, dum semine prægnans est.

*Cælum.* Cælum potius calidum, quàm frigidum amare videtur. Plinius Ægyptium præcipuum esse constare scribit.

*Solum.* Amat terram pinguem, sed etiam in macra nascitur, delectatur humore: Palladius.

*Satio.* Theophrastus. Ex prima sementi, quæ fit mense Iulio, post æstiuum solstitium. Nunquam nisi satum prouenit, prouentu cõtumax, quippe quod si nouum sit nasci recusat, nisi conuoluatur. Ex veteri semine celerius exit, dũ modo vetustate non sit exuctum. Difficillimè prouenit, haud enim germen emittit, nisi aqua præmaceratum, causam durities habet. Columella autumno, & vere feri posse dicit. Vbi satum est sua sede immotum permanet, neq; est eius cultus alius, quàm vt stercoratum runcetur. Palladius: à Martio vsq; ad Octobrem totum coriannum seritur. Semen melius putatur, quo vetustius fuerit. Satum benè cum olere quocunque nascetur. Seritur Februario, & Aprili.

#### De sinapi. CAP. XLVIII.

**A**THENÆVS sinapi inter condimenta connumerat. Plinius: Sinapis vsus etiam pro pulmentario in patellis decocto, cum oleo, & vino, & cum o- niâ; coquuntur & folia sicut reliquorum olerum. Sinapi quomodo ad salga- marum simul, & conuiuiorũ vsum conficeretur, docuit nos Columella: Semen sinapis diligenter purgato, & cribrato, dein aqua frigida eluto, & quum bene elotum fuerit duabus horis in aqua finito: postea tollito & manibus expres- sum in emundatum mortarium conuicito, & pistillis conterito: tũ totam intiri- ram ad medium mortarium contrahito, & plena manu comprimito, deinde scarificato, & subditis paucis carbonibus viuus aquam nitratam suffundito, vt omnem eius amaritudinem, & pallorẽ exinaniat, erectoq; mortario, vt omnis eliquetur humor, album, acre, acetũ aduicito, sic pistillo permixtum, colatumq; recondito. Cæterum qui ad vsus conuiuiorũ præparabant, quum exinaniuis- sent sinapi, nucleos pineos quàm recentissimos, & amyllum infuso aceto dili- genter vnà conterebant, hoc sinapi ad embammata non solum idoneo, sed et- iam specioso utebantur: nam si curiosè factum sit, candoris erit eximii. Ali- ter docet Palladius. Sinapi semen ad modũ sextarii vnus & semis redigere cu- rabis in puluerem, cui mellis pondo quinq; olei hispanici vnã libram, acetia- eris vnũ sextarium, miscebis, & tritis omnibus diligenter vteris. M. Varro ser- uari rapã in sinapi putat. Præterea de vniuersis radicib. Græci authores præci- piunt, vt cito continereſcãt. In ollam sinapi momentũ iniiciendũ est, & confe- ctum coctæ factiſcũt, quod si plusculum sinapis sit iniectũ, prorsus resoluta di- ſtineſcẽt, ex Democrito. Apud nos nil quippiã ad intinctus cibi ubiq; frequen-



his intermiscetur, gratissimo obsoniorū condimento: nihilque frigidis diebus magis epula inuenitur cōmendare. Preterea dum per vindemias semen musto immaduērit, toto anno assenatur, ut si ciborū gratia exolefcit, leuis ipsius acrimonia fastidiosus gustū recreet, & hoc veluti irritamento morosius palatum vellicante, elanguescens appetētia inuitetur. Id quia musto inditur, ex sinapis ardore cōfecto nomine, *mustardā* dicunt. Cuius vis per nares cerebrū penetrat, & vellicās sensum, lachrymas ciet, & sternutamentū. Testatur hoc Columella in hortulo: *Et laceffenti fletum factura sinapis.*

Apud Neapolitanos ex eo iactatum est adagiū, Hic callidior est sinapi, in signum alicuius veteratoris astutiam indicans, quum nullo asperi saporis pręuio odore, sua ignea vi, semen per nares cerebrū feriat, & lachrymas, & sternutamenta ciat, Plinius, florum sinapis apes auidissimas esse, inquit.

Græcè *σινάπι* & *σινάπις*. Athenæus dictum putat αἰς αἰών τὴν ὀνόμα, veluti officiēs oculis. Pleraq; Græcia *νάπι*, quasi napy ab v priuatiua particula, & *φύσις* natura, quod natura sit immitis, ob acrem quā possidet vim. Vel quod à napis seminis acrimonia distet. Plinius. Athenienses napi appellarūt, alii thlaspi, alii saurion. Latini *sinapis*, & sinapi dicitur, nomēq; è Græcia in Latinū venit. Vulgò *senape*.

Plinius tria genera facit, gracile vnum, alterum simile rapi foliis, tertium erucæ. Pythagoras principatum habere ex iis, quorum in sublime vis fertur, indicauit, quoniam nil aliud magis in nares, & cerebrum penetrat. Dioscorides hortensis meminit, quasi sit syluestre genus. Apud nos genus est vnum, caule, fronde, flore, siliquaq; rapacea, semine verò minore, acerrimo, oleosoq; ceteris maius, cuius tenera folia in acetariis mandimus, hoc Dioscoridis hortense putamus. Alterum quod tum fronde, caule, & semine gracile nascitur, quod syluestre putamus Dioscoridis, & Plinii primum. Tertium erucæ foliis, semine albo, minus aeri, putamusq; Plinii tertium.

Primum genus caulem habet hirsutum, longū, ramosum, folia rapi, minora asperiora, flores luteos, siliquas rotundas, ac hirsutas, plenas semine cādicante. Floret Aprili, affert semina Maio, eodēq; tēpore siliquas semine plenas affert. Nicander nigram sinapim vocat, ex Athenæo, hanc. Secundum genus erraticum est, quod folio, & tenui semine nascatur. Tertium genus itidem hirsuto caule præditum est, minore ramen, foliis erucæ maioribus, ac latioribus lacinatis, floribus albicantibus, crucisque effigiem referentibus, siliquis teretibus, & oblongis, semine pullo, rufescentique. Floret Iunio, & Iulio.

Antiphanes, auctore Athenæo, Cypri sinapium laudat. Plinius optimum Ægyptium dicit. Vnde etsi qualicumque nascatur cœlo, melius ex his in calido quàm in temperato proueniet cœlo, & melius temperato, quàm frigido, & aprico, quàm humido.

Palladius ait diligere terram aratam, & si fieri possit, congestitiam, quamuis ubique nascatur, nec minus humore gaudet.

Theophrastus ex prima sementi esse scribit, quæ fit post brumam mense



Marrio. Quinto die post satum erumpit, semine firmo ad perdurandum. Columella nō solum autumnō, sed vere conseci, ita ut satum sua sede immortum permaneat, neque est illius cultus alius, quā ut stercoretum runcetur. Plantæ quoque sinapis primō hyeme translata plus cimæ vere afferunt. Palladius Octobri serit, & ubi natum est, saculari debet assidue, ut respergatur pulvere, quo fouetur. Non minus gaudet humore. De quo semen eligere disponis, suo loco esse patieris, quod ad escam parabis, robustius facies transferendo. In sinapi verus semen inutile est, vel sationi, vel esui: quod dentibus fractum, si intus viride videbitur, nouum est, si album fuerit, vetustatem facietur. Martio mense seritur. Plinius: Sinapi nulla cultura, melius tamē plāta translata, quā ē diuerso, vix sato eo est liberare locum, quoniam semen cadens protinus viret. Si rara seratur melius euadit, si spissius, transplantanda & alibi ponenda. Si decrescente Luna colligitur semen, est acrius, & diutius conseruatur. Seruator mundi fidem grano sinapis assimilauit: nam et si exile est, virtute tamen, & credine magnum.

*Deruta.* CAP. XLIX.

**I**NTER olera Theophrastus rutam commemorat. Est & quibusdam condimentis aptissima, ob id Athenæus inter cōdimenta connumerat. Plinius Authoritas esculentis apud antiquos rutæ fuit. Inuenio mustum rutatum populo datum à Cornelio Cethego in cōsulatu collega Quinti Flamini comitiis peractis. Condiuntur eius folia, & seruantur in fasciculis. Columella rutā condire docet circa vernū æquinoctiū, quam sæpe diximus in olusatro, & cæteris. Est ruta fascinationis amuletū, cuius causam Aristoteles in problematis reddit. Nam effascinari se credunt, quum aut voraciter edunt, aut incommodorum quorundam suspitione tenentur, vel cibum, quem assumunt, habent suspectum, itaq; quum de mensa eadem quid priuati sibi capiunt, participem intuentem faciunt, affanturque quum impertiant, Ne me fascines. Ergo cibū cum perturbatione vorabunt, nec quid ebibent, aut esitabunt, sine turbatione & flatu, qui hauriatur vnā, & simul ingeratur. Quamobrem intruso spiritu, tormenta mouentur, & cruciatus excitantur. Igitur præsumpta ruta, suapte vi & calefactoria dote, vas, quod recipit cibos, elaxat, quo fit, ut inclusus spiritus facile per patēiores angustias euadat. Contra venena maximè rutā pollere veteres Græci memoriæ mandarunt, ut de famigerato illo pharmaco Mithridatico fertur, in quo inter prima miscetur. Theophrastus: Vipere, ubi noxium alium comederunt, ut noxa liberentur, rutam absumunt. Sic & mustela in murium venatu & cum iis dimicatione conferta, ex Plinio. Sic & cum serpentibus dimicatura, rutam prius edēdo se munit. Aristoteles enim in problematis quatit, Quæ de causa ruta, & nonnulla pigmenta sudores fœtidos moueant. Respondēt, quia quorum odor grauitatem præ se fert, hæc humoribus sordidis admista fœdum odorem mouere possunt.



Græcis *πύραρον*. Plutarchus purat à facultate dictam ἀπὸ τοῦ πύρην θάλει τὸ αἶμα, *Nomen*. quia semen genitale suo præsicco spiritu coagulet, quasive arcfaciat, vt sterilescent præsertim viri, ideoq; gestantibus vterum inimica, etiam coronis infesta putatur. A Peloponnesiis *ρύτον* appellari dicunt. Latine, & Italice *ruta*.

In duo diuisit genera Theophrastus, syluestre & satium, syluestris odoratior, sed eius odor tardio est; satium permissione terreni humoris temperata suauior est. Odor durus, & expers omnino dulcedinis. Dioscorides hortensis satium, & montanæ syluestris meminit. Plinius refert Pythagoram marem minoribus, herbaceiq; coloris foliis à fœmina discreuisse, etiam letioribus foliis, & colore. In satium item distinxit, & syluestrem: illi latiora folia, & rami fruticosiores, hunc horrida, & ad omnia aciora.

Ex Theophrasto descriptio. Frutex est, sed interdum arboris naturam adipsi conspicitur, vnde sunt, qui oleriarborem vocitent: semper virens, etiam affligatur, muteturq; furculosus, minutisque conditus foliis. Rutam et si Dioscorides suo capite describere dedignatus sit, vt pote triualem, aliis tamen comparando, examussim delineat. Foliis constat ambrosiæ, aut hipecoii, aut serpilli syluestris, sed breuioribus, mollioribus, & latioribus, aut hyperici, aut androsæmi, sed triplo, aut quadruplo minoribus, aut polimonie, sed minoribus, & breuioribus, aut poligoni maris, sed durioribus, & breuioribus, aut apios, sed breuioribus, aut latioribus, aut pepli, paulo angustioribus. Odor trifolii asphaltites, recenter enati. Plinius: Odoratissima inter olera, quæ sicca, vt ruta, & qui in siccis nascuntur. Floret cum fraxino. Addimus nos. Folio exiguo, rotundo, cæsi coloris, denso flore luteo, angulosis calycibus, cum capitularis siliquis, in quibus semen album, flore quaternis vel quinis foliolis diuiso, colore luteis, in iisdem lutei apices. Sepe in arborem transit. Diu floret Aprili, & Maio. Inde semē affert, gratissimi odoris, & saporis. Mirabilis magnitudinis visa est à Iosepho, Iudaici belli scriptore, Macheruti, quod olim fuit munitissimum Iudææ oppidum, in ipsa regia: à nulla enim ficu, vel celsitudine, vel magnitudine vincebatur. Ferebant autem eam ex Herodis temporibus perseuerasse, mansissetq; diutius, nisi à Iudæis, qui locum ceperant, excisa esset.

Athenæus in Smyri rutam in opus nasci author est. Cassianus in calidis, & apricis. Columella aprico gaudere cœlo. Plinius Galaticam laudat, & apricis & siccis gaudere, terra quam maximè lateritia.

Plinius: Odit humorem, ac fimum, terra gaudet quam maximè lateritia. cinere vult nutriri. Palladius, loca desiderat altiora, vnde labatur humor, folius cineris aspersione gaudere. In terra soluti lateris ponunt, quod prodesse certissimum est.

Theophrastus rutam semine nasci aliquos negare refert, verum tardè oriari, quæ de causa surculo eam ferere solent. Ruta non ex prora, sed ex palmitibus exit, & auulsione. Cassianus feliciter seriat. Columella, Autumno semine satam mense Martio deferre oportet in apricum. Februario prouenit se-



mine, vel plantis ruta. Plinius. Ruta quoq; seritur Fauonio, & ab æquinoctio autumni. Seritur è surculo melius in perforatam fabam indito, quæ succo nutrit comprehendendo surculum. Seritur & à seipsa, namq; incuruato cacumine alicuius rami, quum attrigerit terram, statim radicatur. Palladius, Martio mense, si ponas semina eius, adhuc clausa folliculis singulatim manu debet bis affigere, si iam minuta sunt, iactabis, & rastro obducta cooperies, caules eius, qui inclusis seminibus nati fuerint, fortiores erunt, sed serò nascentur, Ramuli eius cum aliqua corticis parte conuulsi, verno tempore pro plantis renebunt, tota verò translata morietur. Nonnulli ramulos eius perussæ fabæ inserunt, vel bulbo, atq; ita obruunt, alieno vigore seruandos.

*Culm.*

Aqua falsa rigaram Theophrastus rutam melius prouenire dixit. Cuius ex eo rationem in brassica adduximus. sic etiam cinere radicibus aggesto, qui facit siccitate sua vt radices neq; vermem, neq; putredinem sentiant. Et alibi, Cinis radicibus congestus, siue ne radices vermiculentur, seu etiam salugine coalescant: habet enim similem quandam vim calefaciendi. Rutam runcari etiam oportet, durefcit enim & exarescit, sed dimutilata, & in ramos dispersa, amplior, melior, sapidiorq; redditur. Cuius etiam rationem ex eo in brassica reddidimus. Aquam fimumq; sanè olera omnia diligunt, ruta excepta, hec enim fimi aspernatricis penitus est. Quæ omnia Plinius ex eo transtulit. Odit humorem ac fimum, cinere vult nutriri, hic & semini miscetur, vt careat erucis. Peculiaris medicina ruta in salsis aquis, quæ & alioqui plurimū sanitati conferunt & fertilitati. Cæterum dulcium aquarum rigua prosunt. Rutam furtiuam tantum prouenire fertilius putant, sicut apes furtiuas pessimè. Nec ferro tangi expedit rutam, author est Sabinus Tyro. Columella, Runcari debet ruta, donec coalescat, ne herbis enecetur, sed nec lata manu debet runcari, quam nisi contexeris, perniciofa nascentur vlcera. Sitamen per ignorantiam nuda manu runcaueris, & prurigo, atq; tumor incesserit, oleo subinde perungatur, Multis annis durare innoxia potest, nisi mulier, quæ in mensstrus est, contingat eam. Ab eo Plinius: Durata runcatur non sine difficultate, prouenientibus vlceribus, ni munitis manibus id fiat, oleo ve defensis. Florentinus Græcus: Fimum horret, ideo per hyemem cinere cupit ali, sic etiam natiuus calor frigoribus obstitit. Fictilibus melius seritur. Immundæ mulieris & accessum, & omnem prorsus attactum metuit, siquidem eo confestim enecatur. Palladius, Non effodi herba, sed oporat euelli, immundæq; mulieris reforescat attactum,

*Ar.*

Ficui insitam rutam optimè prouenire testantur authores. Aristoteles suis problematibus percontatur, Quam ob causam ruta insita in ficum, pulcherrima plurimaq; proueniat. Inferitur verò inter corticē, limoq; obducto fouetur. An quod rutæ radix fomentum, teporemq; desiderat, itaq; cinere quoq; circumdata iuuatur? ficus autē calida est, quod eius succus omnium acerrimus docet, & fumus, quem etiam abundè emittit: habet igitur calorem, atq; humorem talem, qualem etiam cinis, quamobrem si ille iuuare possit, multo magis ficus,



ficus, quæ copiam atq; vigorem eo magis præstabit, quo humor cineti non perpetuo affluit, fici autem irrequieto confluuiio manat: utpote cum arboris succus consumitur ex toto non possit. Theophrastus, Quicquid in aliud feri possit, melius redditur, ceu ruta in fico, sic enim optimam fieri posse creditur. Cortici infixam ferere, & terra occultare consuevere, euenit namq; ut humor lacteus ille fici super alimentum auxiliari quoq; suo calore valeat opportunè, sicut & cinis congestus radicibus, siue ne radices vermiculenter, seu etiã salugine coalescant: habet enim similem quandam vim calefaciendi. Plutarchus etiam in Sympotiacis causam affert, Ruta quæ sub fico profilit, aut innascitur illi, & suauior sapore, & mollior habetur, causamq; subiungit, quod vel eam ficus aliqua dulcedine recreet, vel grauitatem satietatēq; restinguat, nisi potius contraria ratione ficus alimentum alliciens ad se, simul acrimoniam aboleat. Sic utramq; sententiam Plutarchus confirmauit. Dioscorides eam solam rutam commendat, quæ prope arborem fiti subnascatur, reliquas ferculis abdicat. Plinius: Amiciria est ei & cum fico intantum, ut nusquam latior proueniat, quam sub hac arbore. Palladius: sub ficus arboris umbra libentius acquiescit. Proserpini maledictis quum ferunt eam certissimum est, ac melius furtiua proueniet.

## De salvia. CAP. L.

**D**IXIMVS de ruta, dicturi de salvia. Solebant veteres illi rerum scriptores in hortis rutam iuxta saluiam plantare: nam illa ut superius iam diximus suo odore serpentes ex hortis fugat, salvia serpentes & buffones accersit, ita & in hac nostra villa alteram iuxta alteram collocare statuimus. Theophrastus inter cetera connumerat, multisq; condimentis aptissima. Florentissimum lucum diffinim afferre apibus pabulum retur.

Græcis *ἰκελίω φάκος*, ex arenæ & cinereo squalore foliorum, qualis in torridis & exuclis montibus enatæ salviæ est, deducto nomine ab *ἰκελίω*, & *φάκος*, vocibus vnâ coalescentibus, quasi sole afflatam, rabefactam, ac syderatam dicas, vel à medendis sphacelo penè demortuis partibus, natium calorem, roburq; institum reuocando nostræ vitæ primordia. Latinis salvia dicitur, ex Plinio. Nostri qui sunt herbarii elelisphacon Græcè, Latine saluiam vocant. Diciturq; salvia, quod ad multa, & præsertim ad fecunditatem sit salutaris, & saluos & incolumes homines præstet: nam grassantem in Copto Egypti pestem innumeros penè mortales rapuisse ferunt, reparatamq; multitudinem coactis mulieribus huius herbar succo ad conceptum vti.

Theophrastus duo salviæ genera fecit, satium *ἰκελίω φάκος* vocauit, syluestre *σπάκελον*.

Sphacelus & salvia inter se distant, quasi alterum urbanum, alterum genus syluestre dixeris. Spacelo folium læuius, contractius, minusq; squalens, salviæ scabrius. Hæc ex Theophrasto. Dioscorides sic depingit saluiam. Frutex est ramosus, longus, virgas habens quadrâgulas, cauas, folia mali cotonei effigie, sed



longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attritarum quasi vestium scabritiem referant, hirsuta, subalbida, perquam iucundo odore, sed graui, semen summis caulibus syluestri hormino simile gerit. Plinius, Est & syluestris eleliphacos dicta à Græcis, ab aliis phacos, est & satiu lente leuior, & folio minore, atque sicciore, odoratiore. Est & alterum genus eius syluestris, odore graui, hæc mitior. Folia habet cotonei mali effigie, sed minora & candida. Saluiam mentæ similem, cauam, odoratam, sed Græcorum sphacos, & sphacelos nomina causam dederunt errandi Plinio, vt saluiam in frugum censu retulerit inter lentis species, & Theophrasti, & Dioscoridis delineationes de saluia hortenfi, & syluestri in vnum commiscuerit.

*Cælum.* Substinet quodcunq; cælum, & si apricum mihi desiderare videatur.

*Solum.* Dioscorides in asperis nasci dixit.

*Satio.* Seritur semine, Ianuario, Februariò, & Martio. Sic etiam Octobri, Septembri, & Nouembri. Seritur plantis & surculis. Sed melius Martio mense. Lixiuo & cinere fruticem muniunt olitores, & sic latiore prouenire testantur. Frigora non horret, hybernis temporibus viuit, in quibus premente olerum penuria iuribus innatat.

### *De siliquaastro. CAP. LI.*

**P** I P E R I S vice, quod ex India nobis defertur, herbæ cuiusdam siliquis, & granis, quod suo piperis gustu iura commendet, quam sæpissime in condimentis vtimur. Sunt qui putent Plinii esse siliquastrum, quum notæ aliquæ, quas suo siliquaastro ipse ascribit, huic nostro adamussim respondeant. Nos hortis nostris, & vasculis, tum plantæ spectaculo, tum culinis, eam ferimus, & colimus.

*Namen.* Plinius siliquastrum, & piperitim vocat: videturq; conuenientissimo nomine dictum: nam & siliquas nimium longas, & recuruas producit, eiusq; semine & siliquæ cortex gustu, maximam piperis acrimoniã & sapore præ se fert. Auicenna videtur appellare ziziber caninũ. Nos Neapoli *pepe d' India* dicimus.

*Genera.* Plura sunt apud nos genera. Est genus vnum, quod longas, aliud quod breues siliquas profert, aliud autem rotundas, maiores, paruas, & in modum cucurbitæ viatoriæ.

*Descriptio.* Siliquastrum, vel piperitim ita ex Castore delineat Plinius, caule rubro, longo, densis geniculis, folio latiori, semine albo, tenui, gustu piperis. Et alibi, gustu piperis, magis etiã siliquaastro, ob id piperitidis nomine accepto. Addimus nos. Consurgit caule cubitali, atq; etiam longiori quadrangulo, geniculis intersepto, ramis amplioribus brachiato: foliis hortenfi solano non dissimilibus sed maioribus, longioribusq; floribus candidis, pusillis, ex quibus vaginulæ oriuntur in mucronem sensim turbinatæ, nitido virore, & lauore, crasso pediculo innixæ, per maturitatem rubidæ, coralli modo, coriaceæ, quæ dehiscentes semen ostendunt candidum. Sed semen, vel valuulæ degustatæ, tanta sunt

comburendi



comburendi licentia, vt os, linguam, palatum igneo feruore conflagrare sentiatur. Æstate floret, dein in siliquis semen producit, radice vnica, subalba, capillamentis fibrata.

Solum putridum, & macrum, aut roscidum quærit, ex Plinio.

Cælum calidum videtur exoptare; quum nobis ex India adlatum sit.

Ex Plinio, semine feritur.

Solum.

Cælum.

Satio.

*De herbis escariis, & primò de brassica. CAP. LII.*

**A**CONDIMENTARIIS ad escarias herbas transeamus. Se offert omnium prima brassica, cuius à vino, atq; messe tertius est hic Neapolitanis fructus. Male nobiscum actum videretur, si sine aliqua laudis præfatione ad patri oleris historiam deueniremus. Cato brassicam omnibus oleribus antestare ait. Plinius, eius laudes longum esset assequi, dixit, quum & Chrysippus Medicus priuatim ei volumen dicauerit per singula membra hominis digestum, & Dieuches, ante omnes autem Pythagoras & Cato non parcius celebrarint. Iones iureiurando per brassicam suam fidem astringebant, vnde Nicander, & Hippocrates brassicam *μαρτυρ*, id est, vatem, quali sacram appellabant, Athenæi autoritate. Varro vtilissimam apibus tradit, immo ex ea duplex ministerium præberi, ceram & cibum. Fabulantur Græci Lycurgum à Libero patre vitibus adalligatum illachrymasse, è cuius lachrymis hoc olus natum prodidere, vt Nestor in libro, qui alexicephos inscribitur, narrat: innucentes his fabularum inuolucris pernicialia brassicæ, & vitis odia. Referunt Græci, quorum primus Theophrastus, rem sanè admirabilem, vt fascinum prope modum videri possit, vitem acri odore huius oleris fugari, & eius flagella intorqueri, inimicum fugiens odorem, & hoc argumento vsus Androcides contra temulentiam pollere credidit. Beritius autem: Si brassica fuerit viti adficta, luxuriantes eius palmites potius repandi curuabuntur, quàm recti velint propius accedere, tum quia siccæ naturæ, tum intestina qua flagrant discordia. Latini verò, è quibus Cicero libro de Natura deorum, iam verò vites sic clauiculis adminicula, tanquam manibus apprehendunt, atque ita se erigunt, vt animantes, quæ etiam à caulibus, brassicisque, si propè nati fuerint, vti à pestiferis & nocentibus refugere dicuntur, nec eos vlla ex parte contingere. Cato: Si voles in conuiuio multum bibere, cœnareque libenter, ante cœnam esto crudam quantum voles ex aceto, & ita vbi cœnaueris, comesto alia quinque folia, reddent re quasi nil ederis, biberisque, bibesque quantum voles. Idem Varro. Plinius ait vino aduersari, vt inimicam vitibus: antecedente in cibis caueri ebrietatem, postea sumpta crapulam discuti, & erraticam inimicissimam vino, quam præcipuè vitis fugiat, aut si non possit fugere, moriatur. Apud Ægyptios, qui magnopere vini sunt amatores, moris est, omnibus esculentis brassicam crudam, vel eius semina in cibatu præmittere, vt crapulam sedarent, quod & de Sibaritibus Timeus etiam



tradidit, immo vineam, in qua brassica nascitur, languidius affert vinum. Athenæus est auctor. Boninus item: Si quis feruentem in ollam brassicæ vini paululum guttatim instillat, ne amplius quidem excoquetur, sed suis viribus defuncta ad perniciem trahetur. Plinius: Brassica corrumpitur in dolio vini sapor, odore betæ foliis demeritis restituitur. Sed occurrit aliud ingens discordiæ miraculum: hoc olus, quo vitem fugari diximus, aduersum cyclaminum, & tri-gano arescit. Sed Aristoteles in problematibus causam exquirat, cur brassica vini noxas restinguat, atq; id fieri quod dulcem succum, discutientemq; obtineat. Vnde Medici eam alui infundunt; frigida autem ipsa est, argumento quod ad alui vehementes deiectiones Medici ea vruntur, excocta in plenum, & suo caule purgata, refrigerataq;. Fit igitur detentis à crapula, ut eius succus humores in aluum detrahat, qui vinosi crudiq; tenentur, & ipsa supra in ventriculo remanens, corpus refrigeret, quo fit ut tenues humores ad vesicam labantur, quod quum humor utrinq; educatur, corpus refrigeratur, rectè liberari à crapula possint. Vinum enim humidum, atque calidum est. Euenit ad hæc, ut quum humores deorsum se trahunt, atq; excernunt, flatum etiam secum deducant, qui si per vinum liceat, in caput se efferens, grauitatem creat: sin autem deorsum se vertit, corpusq; ob causam prædictam refrigeratum est, dolor crapulæ omnis tollitur. Est enim crapula feruor quidam, & desinens inflammatio, quæ plus conflictat, quàm temulentia, quod mentem illa quatit & alienat, crapula autem mente sibi constante, dolorem admouet: ut enim qui febre urgente, ludunt potius, quàm dolent, iidem ubi leuari malo fuere, atq; ad se redire, indolere occipiunt. Hoc enim in crapula quoque, ut in temulentia euenire solitum est.

*Nomen.*

Verus Græcia brassicam *ἐκράβη* vocauit, ut Aristoteles, & Theophrastus ex Polluce, Theophrastus etiam, quod testatur M. Varro. Apollodorus Caristius ad id, Raphanum quod vocamus nos viri, hoc vos externi brassicam vocatis, ut videre est apud Athenæum, quæ res ansam præbuit Plinio errandi, ut raphano ascripserit, quæ de brassica protulerit Theophrastus & alii, ut videbimus in hoc capite, & ubi de raphano loquemur. Subsequuta *κραμβή* vocauit, dictaque censetur, quod oculorum pupillas, quas Græci *κράμβη* vocant, obtundat, hebetetque. In hanc sententiam iuisse Columellam testantur carmina in suo hortulo,

*Nunc veniat quamuis oculis inimica corambe.*

Attici integro nomine *κραμβή*, sed priori etymi exemplo protulerunt, quasi *κράβη ἀμβή*, vel *ἀντίβη*, quod crapulæ aduersetur, qua quidem commutatione apud omnes notissima. Hæc tot exercuit, & excruciauit Grammaticos illo Satyrici senariolo,

*Occidit miseros cramberepetita magistros.*

Sunt qui brassicam dicant *ἀντίβη*, à vorando dici, quum à tota plebe, cum cruda, tum cocta, vel muria seruata edatur. Latini brassicam vocant, quasi



quali passica. Varro. Quod ex scapo minutarim præsecatur, & passa fiat, quod etiam Pompeius affirmat. *Italicæ*, Neapolitani *foglie* vocant, quod præ cæteris oleribus insigni caule, & folio vigeat.

Theophrastus multiplicia, variaque genera brassicæ dixit. Neapoli quam *Genera* plura brassicarum genera visuntur, omnia per censere odiosum duximus, sed quæ ab antiquis narrata, & nobis insigniora, satis erit attingere. Græci & Latini brassicam in tria partiuntur genera, in sylvestrem, sativam, & hanc in læuam, & crispam. Primo à sylvestri exordiemur. Sylvestris Theophrasto *πράμνη ἀγρία* dicitur, & hæc est eius forma. Folio læui, & breui, atque rotundo, copioso: fruticosaque, sapore aspero, & medicamento iustar ad eliciendas aluos. Caules peculiates sortitur, rotundos læuiore, quàm sativæ, & foliorum appendicem rotundior, folium minus angulatum, cætera scabra, tum foliis, tum caulibus, acrior, vehementiorque. Dioscoridi *πράμνη θαλάσσια*, id est, marina brassica, dicitur, prorsus à sativæ abhorret, quod folia ferat rotunda aristolochiæ, prælonga, tenuia, singula, à rubentibus ramul. sexeuntia, singulati ut hedera pediculo, albo succo prædita est, sed panco salso gustu, aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris, vehementissima, aluum ciet in cibo cocta. Cato *πράμνη* vocat, horumque verbis suffragatur. Minimis caulibus, tenerioribus foliis, & acerrima omnium, tenui succo vehementissima, & omnibus brassicis medicamentosior. Plinius à Catone describit: Sylvestris erraticæ, & peregrinæ. Folia habet bina, parva, rotunda, lævia, plantis oleris similior, candidior sativæ, & hirsutior. Neapolitani *soldanella* dicunt. Sed alia est sylvestris brassica à Dioscoride descripta, quæ rectius sylvestris dici posset, quum à sativæ nil, nisi feritate, & succi amaritudine discreper, prædicta verò est alieni generis à brassicæ. Ipse depingit hoc modo. Sylvestris brassica marinis, præruptisque locis magna ex parte gignitur, sativæ similis, sed candida, hirsutior, amara. Abundat his totus Surrentinus tractus, præruptis crepidinibus adnascens, mari imminentibus, quod nisi gustum consulueris, sativam existimabis. Neapoli vulgò *foglie seluaggie*. Satiuum genus in duo genera discriminabimus à foliorum differentia, unum crispis, alterum læuibus constans foliis. Crispum à Theophrasto *πλόκωμος ῥάφανος* dicitur, succi bonitate, & foliorum amplitudine læui præstantior est. Cato à Græcis *σαλινωδὴν* vocari scripsit, ab apii similitudine: aspectu, & natura bona, ad euacuandum valentior est læui. Athenæus *σαλινωδὴν*, Plinius selinada stomacho utilem, aluum mediocriter mollientem, & a ianæ dicit. Hæc apud nos duarum est specierum, alterius caulis eximescit in medio, qui iuribus incoctus, teneritudine & sapore cæteris antestat. Neapoli vulgò *foglie crespe torsite*. Alterius verò extenuatur. Brassicarum genus, quod læuibus constat foliis, Theophrasto *λειόκαυλος ῥάφανος* dicitur. Hanc Athenæus Eudemi autoritate omnibus locis nasci scripsit. Catoni *λῆα*, grandibus.



& latis foliis, caule magno. Et Plinius, quæ à Catone excepit, Extentis foliis, caule magno. Neapolitani vulgò *fogliacomone*. Nos hoc genus in plures species diuidemus, & inter eas, quæ à Columella & Plinio describuntur enarrabimus, nobisq; insigniores. Latem hanc brassicam in duas diuidemus, colore inter se differentes, in nigram videlicet & albam. Nigræ caulis semper tenuis, nec vnquam extumescit in medio, nec eadem teneritudo, quæ albæ, nec sapor dulcis, & delicatus, sed quodammodo acris, velut sylvestris species, huius aquam decoctæ maximè omnium fœtere humi affusam, etiam à Plinio narratur. Apud nos vili habetur pretio. Seritur tamen quia contra frigus peruitax genus est, & hyeme feritur, & plantatur, & etiam hyeme cauliculos, & cymas edimus, ne quis dies sine caulibus sit, quod non contingit in aliis generibus. Omnibus est & laus foliis, & consili cymarum luxuria. Seruntur locis frigidis, quibus albæ feri non possunt, vt circa Samnites, & Brutios. Columella in hortulo, *Brutia quæ tellus*.

A quo Plinius: Brutiani frigore asuntur, prægrandes foliis, caule tenuis, sapore acuti; flore albo. Neapoli *foglie nere*. Sub albæ brassicæ nomine, plures in eam familiam species venere. Meminit albæ brassicæ Cassianus, ac Februario feri debere. Inter eas altera, cui tenuis caulis: altera, cui in rapi modum extuberat. Hæc apud nos maximo habetur pretio, quippe tenerrima germina cauliculi: & pars ea in medio foliorum extuberans, pinguibus iusculis, & medulla incoqui solent, ac quotidiano nascuntur cibo. Imbecillis est, & frigora non tolerat, fleret flore albo, & luteo. à Columella Pompeiana dicitur, nomenque à natalibus locis usurpauit, quum ibi oriunda credatur.

*Quæ dulcis Pompeiæ palus vicina salinis*

*Herculeis, nuncq; Siler qui defluit amni.*

Vocat Pompeianum genus à Pompeianis Campaniæ populis, qui prope Neapolim fuerunt. Hercules enim debellatis Hispaniis, Geryonis Regis armenta exportans, in suam patriam rediturus, ad Vesuuium montem bello inualidos milites reliquit, & ibi constructis tectis, oppidum exadificauit, Heracliam nomine, promouens castra ad octauum lapidem: quum ad Saturnum ventum esset, veteranis alia mœnia extruxit, qui de triumphali Pompeia fuere Pompeiani dicti. Et quemadmodum Pompeianis & Herculaneis idem fuit ortus, idem fuit etiam occasus, quippe conflagens Vesuuus eis imminens, utrosque absumpsit. Nostri temporibus incendiorum iniuria versa sunt in vicos, vbi Herculani cadauer sepultum existimamus, vulgò *la torre del greco*, octauo à Neapoli lapide, Pompeiani verò *la torre dell' Annonciata*. Plinius Pompeianum procerius aricino, caule ab radice tenui, intra folia crassescit, rariora hæc, angustioraque: sed teneritas in dote fit, frigora non tolerat, Neapoli vulgò *foglie torsute bianche*. Hinc admittit licet Matthiolum suis in Dioscoridem commentariis scripsisse id brassicarum



carum genus antiquos latuisse, quū à Plinio satis clare describatur. Alba brassica tenuicaulis vñtatiſſima apud nos ob cauliculorum abundantiam, quam tota æstate largitur. Huius duo genera, depressus, & excelsus. Columella aricinum vocat in hortulo suo,

— *Et mater Ariciaporri.*

Plinius ab eo. Aricinum altitudine non excelsus, folio numerosius, quā tenuius: hoc vñtatiſſimum existimatur, quia sub omnibus penè foliis fruticat cauliculis peculiaribus. Neapoli dicuntur, *foglie branche non torsure*. Alterum genus excelsus attollitur, circiter quindecim pedum altitudinem, simplici stipite, crassitudine brachiali, leniter rubenti, folio prægrandi, carnosio ex cæſio candicante, in latus vtrunque diffuso, procurrentibus venarum toris, fruticante patula cyma, flore luteo, & albo. Nascitur Surrento & Stabiis. Serunt eas species, qui gallinas, aliasve aues cohortales alūt. Ab imis radicibus folia euellunt, vt alte extollatur. Neapoli satq̃ degenerant. Vulgò *foglie alte*. Est & genus vñm crispissimis foliis, satis à primo genere diuersum: nam ei per ora tantum frondium, huic in totum crispatur, folio satis amplo, ac duro, ac contra frigus peruiact, cauliculorum copiosissimum, qui inter cæteros sapidissimi sunt: in frigidis Samnitum regionibus perennat, illinc ad nos trāslatum. Neapoli vulgò *foglie cresse d' Apruzzo*. Columella in suo hortulo Sabellicos vocat.

20 *Qua duri præbent cymosa stirpe Sabelli.*

Plinius ab eo. Sabellico vsque in admirationem crispantur folia, quare crassitudo caulem extenuat, sed dulcissimi perhibentur ex omnibus. Sabellici enim populi montes incolunt inter Sabinos & Marſos, à Sabinis orti. Est tamen id genus obnoxium pediculis, qui sub rugis, & laciniis latitant. Brassica item familiarissima apud nos est, qua ferè toto anno victitamus, hæc enim in capitis formam extuberat, nonnunquam sesquipede crassi. Folia eius ambitu conglomerantur, exterius callosa, per ambitum erugata, multis intus carinarū voluminibus, externis semper interiora complectentibus, nunquam non nisi quum in florem exeunt, delitescantibus, quum gelicidia sentit, grata cibus, teneſcit frigore, humili caule, iis hyeme præcipua nobilitas. Columella has vocat lacuturres.

*Et turri lacus.*

Plinius ab eo. Nuper subiere lacuturres ex valle Aricinā, vbi quondam fuit lacus turrisq̃; quæ remanet, capite prægrandes, folio innumeri, alii in orbem porrecti, alii in latitudinem torosi, nec plus vñs capitis post tritium, cui pedale aliquando conspicitur. Cyma nullis serior. Hæc Nicandro & Galeno *παλιὰς γὰρ*, quasi capitulatū olus dixeris. Neapoli *foggie cappuccie*. Est & huius alterū genus, spurium dictū, nam superius recensitum legitimū vocant, desciscens ab eo nobilitate, folia habens nigriora; duriora, breuioraq̃; sursum repanda, quæ non in absolutū orbem coeunt, sed summam fatiscentia, breui interna, eorū spatio explicantur non vsq̃; adeò conuolutis foliorum panicu-



lis. Vulgò *foglie cappuccie bastarde*. Hasq; videtur Plinius innuere, quum dicit, Alii in latitudinem torosi, quum non clauduntur. Horum alterum est genus, quod nobis ex Liguria affertur, vasta magnitudine, eximio candore, miratae tueri tudine. Sed Neapoli satum degenerat, nec nisi magna folia, dura, & nigra affert. Neapoli *foglie cappuccie* & *Genona*. Aliud est genus brassicæ Cumanum ab antiquis dictum. Columella,

*Que pariunt veteres cespicio littore Cuma.*

Plinius: Cumanum sessile folio, capite patulo. Diphilus Syluius dulce, laudatissimumque, in Cumis nasci dixit, scribente Athenæo. Nicandro etiam

*Aspera nutritur Cuma prauisq; coloris,*

*Queis soleas sarcire solent, non esse videtur*

*Pellibus asinilis.*

Quantum verisimili coniectura assequi possum, genus vnum est præcor nobis dictum *foglie di Pozzuoli*. Sunt & aliqua à Columella descripta, scilicet quæ ex Marrucinis veniunt. Populi sunt prope Marfos.

*Que Marrucini, que Signia monte Lepino.*

Est tamen Neapoli genus vnum foliis laciniatis, imò scissis per totum & etiam spicis, omnium optimi cauliculi, quum facile coquantur. Vulgò *foglie francesche*. Genus est aliud huic cognatum, quod è medio folio cauliculos producit, miræ naturæ proprietate, ut carpophyllos dici possit. Alterum est genus, quod omnium nobilissimum iudicamus, puta ex specie lacuturrium. Grandi assurgit caule, folio lato cymosum, cuius cacumen omnium maximum, ut vix floremq; duobus, indice & pollice, diductis in circulum digitis complecti posses, prius subferuefactum, mox oleo & sale suffusum in acetariis magnatum mensis æponitur: ab huius floris excellentia, vulgo *caule fiore* dicitur. Huius oleris penuria apud nos est, solo & cælo repugnantibus, quippe semen è Cypro nobis aduectum primo anno coliculos & flores affert, secundo anno degenerat, & ad nostrates redit. Nec id nobis mirum videri debet, quum Athenæo auctore, secundum brassicæ è Rhodo in Alexandriam delatum, dulce primo anno brassicam, postea à bimatu regionis virium suscepit. Est etiã, Plinius inquit, sua gratia non nunquam plantæ habitu excellentibus, halmyrida vocat, quoniam nisi in maribus non proueniunt: navigatione quoq; longinqua vitidibus adseruatis. Statim defecti ita ne humum attingant, in cados olei quã proximè siccaros, obturatosq; conduntur, omni spiritu exluso. Eudemus Atheniensis brassicã in sua digressit genera, halmyrin, crispã & lauc, sed halmyrin ob suauitatẽ principatũ sibi vèdicare. Nascitur in Eretria Cuma, Rhodo, Gnido & Epheso, ex Athenensium

*Colum.*

Palladius caules omne cæli statum sustinere dixit, sed frigidum magis, contra Austrum positi, citius ferunt, contra Septentrionem ferius, sed hic caulis & saporis re, & robore vincit. In Germania optimi proueniunt, nec erucas gignunt, ut in calidis regionibus. Apud Samnites omnium sapidissimi dulcedine, & teneritate, ubi maximum frigus. In Apulia, ubi maximus est saporis amari, & degeneris.

Theo-



Theophrastus solum fabulosum amare dixit. Palladius stercore gaudere, & Solum.  
 solum pingue, & satis subactum diligere, argillam & glaream timere, sabulo-  
 ne & arena non delectari, nisi perennis vnda succurrat. Cliuis delectari, ideo  
 ponendas plantas per pulvinos arcarum. Plinius hos authores concordans  
 ait. Fimus humorque si defuere, maioris saporis gratia est: Si abundauere, la-  
 tior fertilitas, simum asininum maximè conuenire. Varro Nestoris sapientis-  
 simi carmina, quæ in Alexicepo scriptum reliquerat, interpretatus, brassicam  
 falsis locis feri iubet, dum trium foliorum erit, nitrum tritum, aut sal sugino-  
 sam terram cribro excussam aspergere, vt quasi pruina respersa videatur.

- 16 Theophrastus brassicam ex prima semine esse dicit, quæ post æstiuum sol- Satis.  
 stitium mense Iulio fit, decimoq; à sato die se demonstrat. Sed ne sit semen ve-  
 tustate exuctum: nā semen vetus tantum valet in quibusdā, Varrone authore,  
 vt naturam commutet: nam ex semine brassicæ vetere sato, nasci aiunt rapa, &  
 contra ex raporum brassicam. Videtur idem Theophrastus sensisse libro de  
 causis, In genere olerum quædam suā speciem seruant, vt brassica & alia, quæ-  
 dam mutari videmus. Cassianus brassicæ semen inueteratum non in rapam,  
 sed raphanum mutari dicit. Florentinus rapi semen post tres annos brassicam  
 producere, & vice versa. Palladius: vetustum semen brassicæ mutari in rapam.  
 Plinius: ex semine brassicæ veteri rapa fiunt, atq; inuicem. Quod etiā Auerroes  
 20 confirmat. Columella, Brassica quum trium foliorum erit, transferri debet,  
 frigidis & pluuiis regionibus, posicio eius optima post idus Aprilis, cuius de-  
 pressæ plantæ quum tenuerint, quantum olitoris ratio patitur, sepius sarrita, &  
 stercoreata, melius conualefcit, pleniorisq; incrementi, & coliculū facit, & cy-  
 mam. Nonnulli hanc eandem locis aprioribus à kalendis Martiis deponunt,  
 maior pars eius in cymam proficit, nec postea hybernū caulem amplū facit,  
 quum est semel defecta. Possis autem vel maximos caules bis transferre, idq;  
 si facias, plus seminis & maioris incrementi præbere dicuntur. Palladius, Fe-  
 bruario mense caules seremus, quin & toto anno feri possunt, gaudet stereo-  
 re, & surculatione. Rarius positus conualefcit. Ponendæ sunt plantæ maioris  
 30 incrementi, quia licet serius comprehendant, fortiores sunt. Si hyems est, te-  
 pido iam die, si æstas, quum sol in vesperam declinatur, planta pangenda est.  
 Iunio mense brassica feri debet, quam inchoante transferemus Augusto, vel  
 irriguo loco, vel pluuiâ initiantem madefacto. Sed vtilius Septembri mense se-  
 remus, vt plantas eius Nouembri inchoante transponas, de quibus & hyeme  
 olus, & vere possit cyma produci. Aprili vltimo, & vere transacto brassicam  
 serere possumus, quod cauli seruiet, quia cyma tēpus amisit. Plinius: Brassica  
 toto anno seritur, quoniam & toto secatur. Vtilissimè tamen ab æquino-  
 ctio autumnii. Transfertur quum quinque foliorum est. Cymas à proxima  
 40 satione præstat proximo vere. Hic est quidem ipsorum caulium delicatior, te-  
 niorque cauliculus, Apicii luxuria, & per eum Druso Casari fastiditus, non  
 sine castigatione Tiberii patris. Post cymam ex eadē brassica cōtingunt æstiuū



autumnalesq; cauliculi, mox hyberni, iterumq; cymæ, nullo eque genere mul-  
 tifero, donec sua fertilitate cōsumatur. Tertia circa solstitium, ex qua si humi-  
 dior locus est æstate, siccior autumnō plantatur. Humor fimusque si defuere,  
 maior saporis gratia est, si abundauere, lætior fertilitas. Fimum maximè asini-  
 num conuenit. Est hæc quoque res inter opera ganæ, quapropter non pige-  
 bit verbosius prosequi. Præcipuus sit caulis sapore, ac magnitudine, primum  
 omnium si in repastinato seras, dein si terrā fugientes cauliculos secas, à terra-  
 que proceritate luxuriosa attollentes se, exaggerando aliam accumules, ita ne  
 plus quàm cacumen emineat. Tritianum hoc genus vocatur, bis computabili  
 impendio, tædioque. Auulsione brassicam nasci tradidit etiam Theophrastus,  
 dummodo aliquid corricis adhareat. Suspicio quidem in textu mendū, quum  
 nunquam visum sit brassicam auulsione satam apprehendisse, impossibile e-  
 nim reor. Hæc maiores nostri de brassicæ satione: nos hic sationum tempora,  
 & modos ab earum generibus auspicabimur. Nigra Aprili seritur, transfertur  
 primis imbribus Augusti, Octobri secatur cyma, vnde foditur, ac stercoreatur,  
 colligunturq; cauliculi vsq; ad Martium, tunc efflorescens vsq; ad Aprilis me-  
 dietatē. Alba crassicaulis, quā vulgò *torfutam* appellari diximus, bis anno seri-  
 tur, primò Decembri, inde transfertur Febuario, Aprili secatur cyma. secun-  
 dò seritur Aprili, transfertur primis imbribus Augusti, secatur Octobri cyma.  
 Si cauliculos expectas, medio caule secabis, sic adferet cauliculos Ianuario, ac  
 Febuario. Sunt eius cauliculi albi, tenues, teneriq;, & omniū sapidissimi. Cas-  
 sianus album genus Febuario seri debere dixit, transferri Aprili, seri item Au-  
 gusto, transplantari Octobri, sed id in Constantinopolitano climate, vbi ma-  
 ximum frigus, hîc autem cœlū indulgentius. Alba tenuicaulis seritur, vbi prius  
 imbres Augusti terram madefecerint: transfertur Ianuario, & Aprili profert  
 florentes cauliculos, tum secatur cyma, totoq; anno cauliculos affert, secundo  
 anno secatur cyma Febuario, cauliculos affert Martio, secatur tertio Aprili,  
 sed singulis mensibus foditur, & stercoreatur. Præcox Puteolana seritur Se-  
 ptembri, transfertur Aprili, Augusto abscinditur cacumen. Septēbri florentes  
 cauliculos affert contra cæterorū morem. Quæ Aprili florescit, cauliculos af-  
 fert, Septembri, Nouemb. Decēb. & Ianuar. Hæc Neapoli successe sinē serūtur,  
 ne vnquam & cymata & cauliculi defint. Est & genus tertiū inter albam, & ni-  
 grā, inter tenuem, & crassicaulē, vulgò *castellonica*, cauliculos magnos affert,  
 & copiosos. Seritur Aprili, transfertur Augusto, quū madescit aër. Cauliculos  
 affert Febuario, Martio, & Aprili. Capitata siue lacuturris siccis locis Ianuario  
 seritur, transfertur Martio, secatur Maio, & Iunio, irriguis verò locis Augusto  
 seritur, transfertur Septembri, secatur Octobri, totaque hyeme, cauliculos et-  
 iam affert. Hæc toto anno estur: frigore citius clauditur, & melius, plantatur  
 crebrius. Sed quū tempus calidius erit, plantę teneriores sunt, quū plantantur,  
 si frigidius, crassiusculæ sunt, hæc magis frigori resistūt, illæ minus à calore exic-  
 cantur. In plātatione summæ radicularū partes truncantur, ne replicētur: nam  
 alioqui



alioqui humiles, & semper retorridas producent brassicas. Possunt simul cum aliis, capis interferi, ut quum extirpantur effœta, vacuū locum grandescantibus illis relinquunt.

Theophrastus ait falsis aquis oblectari, falsugineque multum adipisci *Cultus.* emolumenti: ideo Ægyptij nitro aquæ permisto brassicam asperguant, ut dulcior & tenerior euadat, sicut cum prius sale commacerata, aquis coquitur. amaritudo, quæ in brassica est, reſeratis falsugine meatibus absumitur, qua de causa falsis locis brassica optima est: amaritudo enim saporem, tum alimentum peruertit: ea igitur sublata, dulcior, tenerior, altiorque efficitur. *10* brassica, cæteris verò rebus deterior redditur, quoniam nil alienum educitur, sed hoc adurit, quod eius familiare nimirum est. Brassica suauior meliorque redditur falsugine. acritatem & amaritudinem brassicæ insicam falsugo absumit, tum etiā fragile quoddam efficit corpus totū nimio humore sublato: quippe sal ad trahendum, absumendumque humorem aptissimus est, patet hoc vel etiā cruda; frangi enim aliquas perhibent delapsas in terram. Quum igitur talis igni mandatur, facillimè coquitur, & tenera dulcisque sentitur, scilicet ut consentaneum est: nam & qui nitrum iniiciunt, hoc idem conantur efficere. Veruntamen non pridem incipiunt. Natura *20* verò iam pridem orſa, paulatimque prosequens, talem reddiderat. Quapropter neque id auersum à ratione est, ut circa solstitium, aut circa sydus, nonnusquam & omnino per æstatem meliorescat, ut apud Eretriam. Tum enim falsugo acrius agit, euincitque, utpote quum ea ipsa largior sit, humor autem contractior. In Ægypto quoque & locis eiusmodi omnibus optimam fieri ratio est. Salsugo autem siue à radicibus trahatur, siue à solis ardore ad summa ducatur, neutra sanè ratione immobilis esse possit in terra. Reciso caule regerminat, regerminatosque suauiores, & teneriores caules affert, ut tradit idem in historiis. Cuius rei rationem libro de causis explicat, prima à radicis potestate: decerpto enim caule, radix validior efficitur, plus attrahit alimenti, ut superioribus aliena concoctrix facultas per- *30* coctum alimentum foliis subministret. Præterea duris, lignosisque sublati, quum nil sit, quod amplius impediatur, & intercepti, quo minus feratur sursum alimentum, facilius proficit. Translatione meliorem, grandioremque fieri etiam tradidit. Plinius: Cuicumque generi plurimum suauitatis conferunt pruinae, & nisi obliquo vulnere defendatur medulla, plurimum nocet.

Columella docet: Quum transfertur, radix eius liquido fimo prius illita *Arr.* & inuoluta tribus algæ teniolis, pangatur. hæc enim res efficit, ut in coctura celerius madescat, & viridem colorem sine nitro conseruet. Palladius: Celerius enim coquitur virore seruato, si dum est trium, vel quatuor foliorum, nitrum tritum cribello desuper spargas, & speciem candentis pruinae imitetur. Plinius: Sunt qui plantam in transferendo alga subdita pediculo,



nitro ve trito, qui tribus digitis capiatur, celeriorē ad maturitatem fieri putent. Sunt qui semen trifolij, tritumq; simul nitrum aspergant folijs. Nitrum in coquendo etiam viriditatem custodit, aut Apiciana coctura oleo, ac sale, priusquam coquantur, maceratis.

*Dis. rem.*

Nascuntur brassicis eruce, atq; vermiculi, has igitur humor collectus interimit, & fimus aceruatim iniectus. Industria enim bestiola cōdens sese, ut in stramento quiescit in stercore, quamobrem venari facile est, aliter nulla venandi datur facultas. Anatolius: Brassica a pulicibus infestatur, erucam cum ipsa serunt, vel plantant.

### De beta. CAP. LIII.

**B**ETA hortensium leuissima est. vsus iis (cū prius de radicibus beta locutus esset) & cum lente, ac faba, idemq; qui oleris, & praeipuus, ut lenitas excitetur acrimonia sinapis. Medici innocentiorē, quā olus esse iudicauere. Quamobrem appositas non nemini degustare religio est, ut validis potius in cibo sint. Gemina iis natura, & oleris, & capite ipso exilientis bulbi. Mira differentia si vera est, candidis solui aluos modicē, nigris inhiberi. Et quum brassica corrumpatur in dolio vini sapor, odore beta folijs demersis restitui. Menander ē Græcis author est, Allium edentibus, si radicē bete in prunato stā superederint, odorē extingui, ex Plinio. Propter suam insipiditatē antiquitus vino & pipere coquebatur, ut ex Martiale elicitur,

*Vt sapiant fatuae fabrorum prandia beta,*

*O quā sapē petet vina, piperq; coquus.*

Apicius ita condit. Ut ex beta condimentum fiat gustui non ingratum, concides porrum, & contundes coriannum, cuminum, vnam passam, farinam, & omnia in medullam mittes, ligabis, & inferes ex liquamine, oleo & aceto. Aliter: Betas elixa, & sinapi, & oleo modico, & aceto benē inferūtur. Diogenes Cynicus molles & cinardos beta nomine non absq; felle videtur appellasse: nam quū ab aliquibus, ut canis incessetur, seq; obseruatuos dicerent, ne mordicus ab illo apprehenderetur, bono animo esse iussit, neque enim canibus esse in more vesci betis. Augustus betizare dixit, pro languere, & effæminari.

*Nomen.*

Theophrastus τεῦτλον, τεῦτλῆς, σεῦτλον, ab impulsu nominavit, etenim cultus ratione incrementum arboris capessit. Latini betam vocāt, quoniam B figuram, quum ab olitoribus deprimitur, refert, ex Columellæ auctoritate in hortulo, 10.

*Nomine tum Graio, seu litera proxima prima*

*Pingitur in cera docti mucrone magistri,*

*Sic & humo pingui ferrata cuspide ictu,*

*Deprimitur folio viridis pede candida beta.*

*Italibeteta, betola. Neapolitani foglia molle, quia mollit aluū. Dicitur & cicla*

*detor-*



de torto nomine à Sicula, siue Sicilia insula, vnde primū nomen habuit. Sed alij non à Sicilia, sed à sicula, diminutiuo à sica, & de virilitate dici.

Generis diuersitate constare Theophrastus est author, inter betas verò candida, sapore nigra præstantior, pauciorumque seminum est, quam siculam quidam appellant. Sed Theodorus vertendo Theophrastum in pudentum incidit errorem: betam sylvestrem reperiri dixit, ac fronde acutæ, quod Theophrastus de limonio protulerat, non de beta. Dioscorides duorum generum meminit, candidæ, nigræque. Eudemus libro de oleribus quatuor betarum genera scribit, vulsile, furculosum candidum ac populare, quod colore fuscum est, Athenæo authore. Plinius: Betæ quoque à colore duo genera Græci faciunt, nigram, & candidam, quam præferunt, paucissimi seminis, appellantque siculam, candoris sanè discrimine præferentes. Nostri betæ genera faciunt vernum, & autumnale à temporibus factis, quanquam & Iunio scribitur. Meminit alibi sylvestris betæ, quam & limonium à Græcis dici ait, quæ à Dioscoride de limonio proferente acceperat, ansamque errandi Theodoro dedit. Apud nostra habentur genera, album, nigrum, & rubrum quod è Germania delatum aiunt. Negauit Galenus vnquam esse agrestem repertam betam, nisi lapathum agrestis beta sit. Agrestis beta nulla est.

Genera.

Radix betæ vnica in longū protensa, ceu raphanus, è lateribus alia, item modo singulæ, modo binæ, nonnunquam ternæ funduntur, è quibus fibræ coherentes alligantur. Carnosa, gustu non iniucunda, & nonnullis grata cibo, vel cruda, cortex neque crassius, neque raphani modo extricabilis, sed plussatò quendam in modum similis: culturæ ratione incrementum capessit, vt in arborem defecisse videatur. Semen cortice obducitur, copiosum, ad perdurandum firmum. Caule, & folio carnosio, sed alio modo: nam caro in latitudinem distenditur, & in rotunditatem crassatur. Radix dulcis est, & caulis, sed folia non respondent radicibus, vt earum, quæ in paludibus, aut fluuijs cibo idonea proueniunt. Radices enim & caules plurimum dulces, aut cibo aptissimi sunt, folia minimè. Causa in his omnibus, aut quod superiora humidiora sunt, & dilutiora, vt cunctorum palustrium. Vnà enim & aquosa sunt & tenuia, & excoctione carent, vt efficeretur sapor datum est. Radix tamen & caulis, quia minus habent humoris, dulcedinem obtinere aliquam possunt. Fruticat non capite, siquidem radicem fundit, vnde folia, caulesque profiliunt, vt apium. Semini firmitas. Hactenus Theophrastus. Nulli hortensium, inquit Plinius, latitudo maior, in binos pedes aliquando se pandente. Semen cortice obductum fruticat non capite. Addimus nos. Caulis exilit striatus, bicubitalis, folio atriplicis, flores producit exiguos luteos, ex viridi luteolos, semen nigrum, lucidum, inuolucro herbaceo. Floret Iulio, & Augusto mensibus. Radice alba, digitum crassa, longa, fibrosa.

Descriptio.



- Cælum.* Athenæus Ascreas betas laudat. Plinius in Circeiensi agro amplissimas prouenire dixit. Mihi videtur quodcunque cælum substinere, sed melius frigidum.
- Solum.* Plinius locum humidum amare. In binos pedes aliquando se pandunt, multum & soli natura conferente eis. Palladius. Amat agrum putrem, humidum, lætum.
- Satio.* Theophrastus, In genus sementis primæ nomen habet, quod fit post æstiuum solstitium, mense Iulio: æstate sexto, hyeme decimo die prodit in terra, ex veteri semine celerius prouenit. Peculiare quoddam in beta tradunt euenire, quod non continuo singula, sed anno interim sequenti, sæpe tertio producantur, itaque ex copia seminis exigua pullulat. Cuius rei secundo de causis libro rationem reddit, semen frigidum, ac concoctu perdifficile habere dicens, ut diuturnitatem sequi oporteat exortum, ut serius hac de causa exeat. Betarum disparitas est, quum aliæ mense posteriori emergant, aliæ duobus mensibus post, aliæ pluribus, nonnullæ etiam annorum quod peruicaciam quandam ad germen edendum significat: quanquam hortus assiduè rigetur, colaturq;. Et alibi, Si semen frigidum, & concoctu perdifficile habeant, diuturniorem sequi oportet exortum, ut & alia serius hac de causa exeant: nam & betarum aliquas anno postero erumpere, germinareque afferunt, neque periculum esse, ut putrescant. Plinius. Beta æstate sexto, hyeme decimo nascitur. Ex vetere semine celerius exit. Mirum in betæ semine, non enim totum eodem anno gignit, sed aliquid sequente, aliquid tertio: itaque ex copia seminis modice nascitur. Columella, Beta florente punico malo semine obruitur, & simul atque quinque foliorum est, ut brassica differtur æstate, si riguus est hortus, at si siccaneus, autumno, quum iam pluuia inceserint, disponi debebit. Palladius: Februario mense, & si possit tota æstate seminari, transferenda est quatuor, vel quinque foliorum, radicibus fimo recenti oblitis. Amat frequenter effodi, & multo stercore satiari. Iulio mense betas rigandas ponunt, Aprili, Martioque. Plinius: Transferuntur in planta hæ quoque, & oblini fimo radices suas amant. Sunt qui betas punico malo florente optimè seri existimant, transferri autem quum quinque foliorum esse cœperint. Cassianus: Seritur Februario, Martio, & Iulio, transfertur Iulio, Octobri, Nouembri. Nos autem quas semini destinamus, Augusto serimus, Ianuario transferimus, ita enim nobilius semen producant, quæ primo anno excaulescunt, & semen proferunt, extirpantur ex horto, quæ gulæ nascuntur, Decembri, Ianuario, Februario, & Martio feruntur, & ferè omni tempore, si solum accommodatum: si densius nascuntur, aliquæ è medio tollantur, & alibi plantentur. Sunt quæ ex eodem semine nascuntur, & illo anno semen non adferunt, hæ cibo destinantur. Semen quadriennio asseruatur. Ait Crescensius ex Dioscoride, quod in eius stirpem rosæ surculus inseri possit, & inde roborari.



roboratus transferri, quod in Dioscoride nusquā legitur. Sunt qui dicant feri posse calyculis iuxta radicem adnatis.

Theophrasto authore, aqua salsa rigata melior euadit. Sotion Græcus, Si fuerit tibi cordi multo maiorem betam, eandemque iucundiores efficere, radices recenti fimo bubulo lines, & priusquam in caulem exeant, lapillum latiore, aut testam superpones, ita enim hoc pondusculo cohibitam betam, in latum se diffundere, & candorem contrahere affirmāt. Plinius. Species summa in latitudine ei contingit, vt in lactucis, quum cœperint colorem trahere, imposito leui pōdere. Peculiaris medicina betæ in salsis aquis, quæ & alioqui plurimum suauitati & fertilitati conferunt.

De asparagis. CAP. LIIII.

OMNIVM hortensium laudatissima cura asparagis, Plinius inquit. Nihil diligentius comprehendit Cato, nouissimumque libri est, vt appareat, repentinam & nouitiam viro fuisse curam. In his quoque aliqua sibi nasci tribus negant, caule in tantum saginato, vt pauperis mensa non capiat. Syluestres fecerat Natura corrudas, vt quisque demeteret passim, ecce altiles spectantur asparagi. Et Rauenna tribus libris rependit. Heu prodigia ventris. Plutarchus in coniugalibus præceptis ait. Bæotij asparagos in coronas detorquebant, quibus nouæ nuptæ donabantur. Huius gētilitij ritus rationem explicat, vt ex asperrima spina suauissimum fructū asparagus submitret. Sic sponsa non fugienti viro, nec indigne ferenti primam coniugis grauitatem, ac molestiam dulce præbebit commercium. Columella docet, vt condiri debeant. Circa vernum æquinoctium asparagos in vsum colligi, & reponi oportebit: aceti duas partes, & tertiam duræ muræ si miscueris, in alueos componuntur, & sale conspersi biduo sub vmbra, dum confudent, reponuntur: deinde si tantum remiserint humoris, vt suo sibi iure abluant possint, sin minus superfusa dura muria lauantur, & pondere imposito exprimuntur, tum suo quodque vase conditur, & ius quod supra dixi, quod est mistum duabus partibus aceti & vna muræ, infunditur, fœniculi que aridi, quod est per vindemiam proximo anno lectum, spissamentum imponunt, ita vt herbas deprimat, & ius vsque in summum labrum fideliter perueniat. Apicius: Asparagos, vt palato gratiores fiant, siccabis, & rursus in aquam calidam submittes. Platina: Incultum asparagi genus, quod alij corrudam vocant, gratius est. Asparagi in patinam extenduntur, sal, oleum, & acetum infertur. Sunt qui eos aromatibus conspergunt. Sunt qui addito vino coquant, quod eo modo salubriores sint. Asparagorum cauliculi cito coquuntur, diutiusque decocti in tabem fathiscunt: quare Drusus Imperator celerem rei successum demonstrans, dicere solebat, hoc citius fieri quam asparagi coquantur. Apud nos copiosissimus huius oleris est vsus: nam thyr-



fale confpersi eduntur, vel pingui inter pinguiusculè decocti sale, & oleo comeduntur.

## Nomen.

Græcis ἀσπάργος est. Nomen deduxerunt, quòd sine satù, sed sua sponte profiliat, nam altiles asparagos nō nouit antiquitas, quanquā tenellæ, & primum à satione erumpentes holeraceorum germinationes asparagi dicebantur, priusquā in folia exirent, quo nomine Paulus Aegineta betarū, laſtucz, bliti, atriplicis, malux, multarumq; herbarū recentissimòs turiones, vel primos cauliculorū partus, veterum & Galeni testimonio fretus, nominauit, & caput vnū dicauit. Plutarchus ἀσπάργος dixit, & Athenienses sic etiā Galeni testimonio vocant. Cratinus item, & Theopompus apud Athenæum. Vel etiā aphæresi ἀσπάργος dicunt. Syluestris asparagus à Dioscoride corruda dicitur, μαραίνδρα, à Galeno μαραίνδριον. Plinius, Syluestrem asparagū aliqui corrudā, aliqui libycum vocant, Attici orminū, alij myacæthōn. Sed Græci orminū vocant ab ὄρμῃ, id est ruo, quòd corruda vbi adoleuit facile corruat, & decidat. Libycū autē à patria. Latini asparagos vocant, à Varione sic dictos, quòd ex asperis virgultis nascantur. Appion Grammaticus spharagos vocat, vel apheresi sparagus. Columella syluestre asparagū à rusticis corrudam vocari dixit. Neapolitani, exuta principe litera, sparagi vocant.

## Genera.

Theophrastus corrudæ meminit, Dioscorides syluestris & altilis, Galenus regij, qui in hortis nascitur, & ἐλνῆ, id est palustris. Plinius: Syluestres fecerat natura corrudās, vt vnusquisque demeteret passim: ecce nunc altiles spectantur asparagi. Est & aliud genus incultius asparago, minus corrudā, passim etiā in montibus nascens, superioris Germaniæ campis, nō in faceto Tiberij Cæsaris dicto, herbā ibi quandam nasci simillimā asparago. Athenæus meminit palustris, altilis, & montani, quem viliorem dicit. Apud nostra tria genera, syluestre, altile, & Hispanicum, optimum, & magnū.

## Descriptio.

Theophrastus ita syluestres depingit, qui videtur altiles non cognouisse. Spinosi sunt asparagi ferè ex toto, vt scorpius. Post æquinoctium autumni florescit, præter aculeum, pusillum quendam producit, ex quo flosculus ille exit, radice alta numerosa que nititur, tam simul irretita, vt superior pars connexa, colligata que videatur, ex ea thyrsi emicant, exit vere caulis cibo idoneus, tum scabrescit, & processu in florem abit, qui non ex ipso solum, verum etiam de primoribus emergit caulibus, annum caulem habet. Dioscorides, Altilis asparagus est, plurimæ radicis, altissime que germinat. Viret thyrsis primus emicante, qui caulem educens, tempore ipso fastigiat in toros striatur. In totum spina est asparagus. Addimus nos. Primo vere emicantibus multis, crebrisq; tenellis thyrsulis, affecta postea ætate, multis fruticant ramulis adulti, densissimisq; foliorum exilium comis, flosculos edentibus oleæ luteolis, decussis floribus baculæ dependent, primum virides, quæ tandem maturitate rubescunt, seminibus refertæ. Ramuli per vetustatem occallescent in spinulas.



Athenæus. In Libya Getulia nasci dicuntur, qui calami cyprij magnitudinem consequuntur: & duodecim pedum longitudine in montibus crassitie magnarum ferularum, longitudine viginti ferè cubitorum. Plinius: Nullum gratius his solum, quàm Rauennatiũ hortorum. Et Rauenna ternis libris rependit. Sed qui in Neside Campaniæ insula nascitur, longè optimus existimatur. Martialis.

Calum.

*Mollis in aquorea qua creuit spina Rauenna,*

*Non erit incultis gratior asparagus.*

Didymus simplici gaudere solo scripsit. Cato locum subactũ, humidum, & crassum desiderare. Varro: Sic vt vmbrosis locis alia seras, vt corruda, quod ita petit asparagus. Palladius pingui solo, humido, & subacto. Corru-  
da in siccis locis, & saxosis sepibus, & frutetis.

Solum.

Cato. Locum, vbi asparagus seras, bene subigere oportet, qui habeat humorem, aut loco crasso, vbi erit subactus, areas facito, vt possis dextra, si-  
nistraq; sarrire, seu runcare, ne calcetur. Quum deformabis areas, interual-  
lum facito inter eas semipedem latum in omnes partes. Deinde serito. Ad  
lineam grana bina, aut terna palo demittito. Eodem palo cauum terra ope-  
rito. Deinde supra areas stercus spargito, benè serito. Secundum æquino-  
ctium vernum, vbi natum erit, herbas crebro purgato, cauetoq; ne aspara-  
gus vnà cum herba vellatur. Quo anno seueris, sub stramentis per hyemem  
operito, ne rigore peruratur. Deinde primo vere aperito, sarritoq; runca-  
toq;. Post annũ tertium, quàm seueris, incendito vere primo, deinde ne ante  
sarrieris, quàm asparagus natus erit, ne in sarriẽdo radices lãdas. Tertio, aut  
quarto anno asparagũ vellito ab radice: nam si defringes, stirpes fient, & in-  
ter morientur, vsq; licebit vellas, donicũ in semen videbis ire. Semen matu-  
rũ sit ad autumnũ. Ita quum sumpseris semen, incendito, & cum cœperit a-  
sparagus nasci, sarrito, & stercoato. Post annos octo, aut nouẽ, quum iam  
vetus est, digerito, & in quo loco positurus eris, terrã bene subigito, & ster-  
coato. Deinde fossulas facito, qua radices asparagi demittas. Interuallũ sit  
ne minus pedes singulos inter radices asparagi: vellito, & sic circumfodito,  
vt facile euellere possis. Caueto ne frangatur. Stercus ouillũ quàm plurimũ  
fac ingeras, id est optimũ ad eam rem. Aliud stercus herbas creat. Nunc de  
asparagi satiore Columellę placita referamus. Satiui asparagi, quã corudam  
rustici vocāt, semina ferè biennio præparãtur, ea cum pingui, & stercooso  
solo post idus Februarias sic obrueris, vt quantũ tres digiti seminis cõpre-  
hẽdere queũt, singulis fossulis deponas. Ferè post quadragesimũ diẽ inter se  
implicãtur, & quasi vnitatẽ faciunt, quas radículas sic illigatas, atq; cõnexas,  
olitores spõgias appellãt, easq; post quatuor, & viginti menses, in locũ apri-  
cũ & bene madidũ, stercoatumq; transferri cõuenit. Sulci autẽ inter se pedali  
mẽsura distãtes fiunt, nõ amplius dodrãtalis altitudinis, in quã ita spõgiolę  
deprimũtur, vt facile superposita terra germinẽt. Sed in locis siccis partibus.

Satio.



sulcorum imis disponenda sunt semina, vt tanquam in alucolis maneat, at  
 viginosis è cōtrario in summo poræ dorso collocanda, ne humore nimio  
 lædantur. Primo deinde anno, quum iam confita sunt, asparagum, quem  
 emiscent, infringi oportet: nam si ab imo vellere volueris, adhuc teneris,  
 inualidisque radiculis tota spongiola sequetur. Reliquis annis non erit de-  
 cerpēdus, sed radicitus vellendus: nam nisi ita fiat, stirpes præfractæ angunt  
 oculos spongiarum, & quasi excæcant, nec patiuntur asparagum emittere.  
 Cæterum stylus qui nouissimè autumnali tempore nascitur, non omnis est  
 tollendus, sed aliqua pars eius in semen est summittenda. Deinde quū spi-  
 nam fecerit, collectis seminibus ipsis, scorpiones, vti sunt, in suo loco peru-  
 rendi, & deinde sulci omnes consarriendi, herbaeque eximendæ: mox vel  
 stercus, vel cinis iniiciendus, vt tota hyeme succus eius pluuiis manans, ad  
 radicem perueniat. Vere deinde prius quàm cœperint germinare, capreo-  
 lis, quod genus bicornis ferramenti est, terra commoueatur, vt & facilius  
 stylus emicet, & relaxata humo plenioris crassitudinis fiat radix. Palladius  
 ab eo. Circa Apriles Calendas asparagos seremus pingui loco, humido, su-  
 bacto, ita vt minoribus fissulis ad lineam directis, bina, aut terna grana, semi-  
 pedis spatio discreta ponantur. Dehinc stercore solum tegatur, & herbae sub-  
 inde vellantur, vel per hyemem supra stramina iaciantur, primo vere tol-  
 lenda. Hinc post triennium nascentur asparagi. Sed expeditior ratio est, si  
 asparagorum spongas ponas, quæ cito fructum ministrent. Semina aspa-  
 ragi quanta tribus digitis comprehendere possis post idus Februarias pin-  
 gui & stercoreato solo in singulis fossis ponis, & leuiter obruis. His cocun-  
 tibus radix connexa nascetur, quæ appellatur spongia, sed & hæc moras ha-  
 bet: nam per biennium in seminario suo est stercore, & assidua runca-  
 tione nutrienda. Deinde post æquinoctium autumni transferatur, & vere  
 asparagum dabit. Has erit vtilius comparare, quàm longa expectatione nu-  
 trire. Eas tamen in sulcis disponemus, si loca sicca sunt, inter medios sulcos,  
 si humida, in summitate sulcorum. Humor spongas asparagorum transitu  
 suo debet tantum rigare, non sistere: asparagum, quem primo protulerint,  
 confringere debemus, non auellere, ne adhuc inualidam moueamus spon-  
 giam. Cæteris annis auellendus est, vt oculos suæ germinationis aperiat,  
 quia si deinceps refringas, loca, quæ fecunda esse cōsueuerunt, remanente  
 asparagi radice claudentur. Ministrabunt autē vere, & autumnis, reseruabis  
 eum, de quo sumpturus es semina, postea scopas eius incendes, tunc circa  
 hyemē spongiis adicies stercus, & cinerem. Plinius harundinē feri iubet in  
 humidis agris, bipaliis subacto prius solo, oculis dispositis interuallo ter-  
 norum pedum, simul & corrudam, vnde asparagi fiunt: concordare enim  
 amicitiam. De origine eorum in syluestribus curis abunde dictum, & quo-  
 modo eos iuberet Cato in harundinetis feri. Potest & semine feri. Nihil  
 diligentius comprehendit Cato, nouissimumque libri est, vt appareat re-  
 pentinam



pentinam ac nouitiam viro curam fuisse. Locum subigi humidum, & cras-  
 sum, semipedali vndique interuallo feri, ne calcetur. Præterea ad linea gra-  
 na bina, aut terna paxillo dimitti, videlicet semine tum tantum ferebatur.  
 Id fieri secundum æquinoctium vernum. Stercore satiari, crebrò purgari,  
 caueri ne cum herbis euellatur asparagus. Primo anno stramēto ab hyeme  
 10 protegi, vere aperiri, sarriri, runcari, tertio incendi anno. Quo maturius in-  
 census est, hoc melius prouenit. Itaque harundinetis maxime cōuenit, quæ  
 festinant incendi. Sarriri iubet idem, non antequam asparagus natus fuerit,  
 ne in sarriendo radices vexentur. Ex eo velli asparagum ab radice: nam si  
 defringatur, stirpescere, & intermori. Velli donec in semen eat. Id autem  
 maturescere ad ver, incendi quæ. Ac rursus quum apparuerit asparagus, sar-  
 riri, ac stercoreari. Ac post annos nouem, quum iam vetus sit, digeri, subacto  
 solo, stercoreato quæ. Tum spongiis feri, singulorū pedum interuallo. Quin  
 & ouillo limo nominatim vti, quoniam aliud herbasceere solet. Nec quic-  
 quam aliud tentatum postea vtilius apparuit, nisi quod circa Idus Febr. de-  
 fesso semine aceruatis paruulis scrobibus serunt, plurimum maceratum fi-  
 mo. Deim nexis inter se radicibus spongas factas post æquinoctiū autumnii  
 disponunt pedalibus interuallis, fertilitate in denos annos durante. Apud  
 nos syluestres spongiæ primo humescente Augusto aëre plantantur, vsque  
 20 ad Decembrem, Februario producit cauliculos quos velles, Augusti fine  
 runcantur & comburuntur. Quum cauliculos colligis, diligentius digitis  
 decerpes, ne stirpem euellas, nam citius alios producit.

Didymus plurimos nasci scripsit agrestium arietum cornibus tufis, atq; *Ars.*  
 sulcatim defossis, ac longè mirabilius, integra arietum cornua tusa si pan-  
 gantur, asparagos proferre. Dioscorides asparagum nasci prodidit arietum  
 cornibus contufis, atque defossis, quod quātum equidem sentio à veritate  
 abhorret. Plinius: Inuenio nasci arietum cornibus tufis, & defossis. Si cordi  
 fuerit toto anni decursu edulos habere asparagos, vbi fructum legeris, ra-  
 30 dices, quæ summo cespite teguntur, circumfodies, hoc cultus mangonio,  
 frutex nouos dabit cauliculos. Albos produces, si quum primum turiones  
 profiliant, in pertusam harundinem indes, legantur quæ quum vti velis.

De lupo salictario. C A P. L V.

Q V V M coquantur, & condiantur *lupoli* vulgò dicti, sicut asparagi, &  
 frixi, & elixati nō edi incommode possint, ac more quo asparagi eius  
 turiones colligantur, post de asparagis tractatum de lupulis subnectemus,  
 & si Plinius potius gulæ oblectamenta, quàm cibū esse inquit. Ex eo Ger-  
 mani suam ceruisiam condunt, frugibus admisto, & commendantur quo-  
 dam sapore vini, maceratis humore floribus. Eius etiam cauliculis in ace-  
 tariis vtimur.

40 Recentioribus Græcis βέρων, à brionia vtpote similitudine dicitur, & βέρ-



*Plin.* Plinius videtur lupum salictarium vocare, quod salices arbores se circumplectendo scandat. Rura bruscandulā vocant. Neapolitani *lupolo*, quod fortasse caule & foliis lupi colorem imitetur.

Descri-  
ptio.

Caulis totus aculeis horret, longè per vepres, & per salicta reptans, sese viticulosus sarmentis intorquens, per vertices rotatus multis implicat voluminibus, quasi gaudeat summam euagari. Folia brionie similia; sed paulo asperiuscula, & nigriora, cacuminibus asparagi modo in torulos turbineati, flore foliaceo, cinereo, ac multis exilibus flosculis squamatis compactis, qui allium vinumq; subolent. Floret Augusto, & Septembri mensibus; eius cauliculi colliguntur Martio, Aprili & Maio.

Solum.

Iuxta vepres, & salicta nascitur. Nunc ad hosce usus etiā hortis plantatur.

De carduo sylvestri. CAP. LVI.

NUNC carduorum genera attingemus, & primum sylvestre genus, ut clarius nostra, & nostrorum maiorum dicta percipiantur. Cardui talis assignatur origo, Pythia primum ligneum canem appellante: nam Apollinem consulenti Locro, redditum est oraculum, urbem inibi cōderet, ubi ligneo cane morderetur, tandem in crure cinara vellicatus, oppidum construxit. Et si Didymus Grammaticus cynosbaton potius, id est canis sentem intellexit, ex Athenæo. Sophocles in Phœnice. Est spina cuncta que tenet cynarus loca. Plinius, Scolymum in cibos recipit oriens, Eratostheni laudata in pauperum cœna. Venerem in vino stimulare dicitur Hesiodo, & Alceo testibus, qui florente ea, cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis avidissimas, virosq; in coitum pigerrimos scripserunt, velut providentia naturæ, hoc adiuumento tunc valentissimo. Commanducata odorem cōmendat oris, vulvis etiā conferre traditur, ut mares gignantur, ita enim Chereas Atheniensis, & Callimachus, qui circa carduos diligentissimus videtur fuisse. Inter morbos frugum, terraq; pestem connumerat carduos Virgilius.

Segnisq; horret in arvis

Carduus.

Nomen.

Græcis *σάλευρος* est. Nicander pyxacantham vocat, Latini sylvestrē carduum. Neapolitani *cardon seluaggio*, Appuli *scalaria*, *σάλας*, & *ἀσάληρος*, ut dicemus in cinara.

Descri-  
ptio.

Theophrastus hæc habet de scolymo. Id sibi peculiare scolymus vēdicat, quod radicē tum coctam, tum crudam vescendā subministrat, sed cibo gratissimā, quā florescit. Radix durata lacteum succum emittit, quā solstitium agitur, flos erumpit, sed carnosam, & cibo idoneā crassescētē partem sortitur. Ortum nō spinosum, sed oblongum habet, quod sibi duntaxat, velut propriū usurpavit inter ea, quæ in foliis spinosam lanuginē sortiuntur. Carduus nō aculeatis foliis est, ut etiā & limoniū, & pulchrē diuq; floret. Similis chamæleoni, sed chamæleon tametsi nō aculeato folio constat, tamen e-

ni spe-



ni speciem gerit, flos senescens in pappos amittitur. Mirum est, quod tota æstate aliud floret in eo genere, aliud concipit, aliud parturit. Aculei flaccescente folio desinunt pungere. Semen vliginosum, & armatum spina. Dioscorides ab eo. Folia feret hamæleontis, & spinæ albæ similia, nisi quod nigriora sunt, & crassiora, caule oblongo, folioso, in cuius vertice spinosum caput subrigit. Radice nigra, & crassa. Herba, quæ recens est, tenerescit, in cibis asparagi modo recipitur. In totum similis sylvestri acantho. Plinius, Frutex est nunquã cubitali altior, crispisq; foliis, & radice nigra, sed dulci. Et folio & caule carduus spinosas lanugines habet. Floret æstate serò, & diu. Carduorum generis est, & ab iis distat, quod radix eius vescendo est decocta. Mirum quod sine intervallo tota æstate aliud floret in eo genere, aliud concipit, aliud parturit: aculei marcescente folio desinunt pungere.

Sylvestriũ genera duo sunt, vnũ fruticosius à terra statim, alterũ vnicaule crassius, vtriusq; folia pauca, spinosa, muricatis cacuminibus, sed alter florẽ purpureum mittit inter medios aculeos celeriter canescentem, & ab eundem cum aura.

Genera.

Ad nos vnũ genus sylvestre adfertur ex Hispaniis, cuius foliis vescimur, Satis. seriturq; maxima diligentia. Martio seritur. Semen vnũ ab altero triũ pedum intervallo in sulcis ponitur: quũ agitur secundus sulcus, cooperiuntur iam prima semina sata. Viginti diebus nascuntur. Quũ sex foliorũ erit, foditur, stercoreatur, rigaturq;. Dein foditur Augusto, & Octobri, obruuntur terra, vt tenerescant & albescant, inde præciduntur radice. Radix inde sequenti Febr. emittit sobolẽ, inde eruuntur, & plantantur singuli. Radicibus singulis vnã dimittunt sobolẽ ad semen producendũ. Producit fructũ spinosum & ingustabile.

De carduo satino, siue de cinara. CAP. LVII.

TAM de altili carduo disseramus, qui in hortis cultus magonio, domita feritate mansuescit: erat enim ferus scolymus, nunc vrbana cinara, & hortensis euasit. Paulus Ægineta discriminẽ apposuit inter vtrumq;. Cinarã stomacho officere, scolymũ prodesse demonstrat, succũ creare improbum ait, cinaram cũ oleo, garo, & corianno decoctã præstabit cibis exhibere, quasi ista, simul decocta, leniter hanc noxã moliantur. Apud nos iuribus in cocta oleo, sale, & aceto in cõuiuiis venit. Fructũ suum tum crudũ, tum coctũ vescendum subministrat. Radices ineunte hyeme cultus magonio candidas, teneras, & amaritudine erutas reddunt, vt hybernis cibis gratius admittantur, & salis, & piperis polline secundis mensis edimus magno gula delectamẽto, nam sapore suo amariusculeo, palatũ & linguã vellicando, asperiusculũ reddens sitim inducit, & post illius esum sapida fit portio. Vnde Columella in hortulo.

Hispida ponatur cinara, qua dulcis laccho

Potanti veniunt.

Plin. Poterãt dici videri omnia, quæ in pretio sunt, nisi restaret res maximĩ q̃stus, nõ sine pudore dicẽda. Certũ est quippe carduos apud Carthaginem



magnā, Cordubāq; præcipuè sextertia sena millia ex iis aruis reddere, quoniam portenta quoque terrarum in ganeam vertimus, etiam ea, quæ refugiant quadrupedes conscia. Apitius, Carduos ex liquamine, oleo & vuis cõtulis edito, vel rutam, mentam, coriannum, & fœniculum omnia viridia conterito, adde piper ligusticum, vel liquamen, & oleum.

*Nomen.*

Theophrasto *χάκτος* est, satisq; verisimilibus cõiecturis adducebar vt dicerem Theophrasti *χάκτον*, Græcorum & Latinorum esse cinarā, quas buci afferre nimis molestum duxi, quod si quid animo adhæserat scrupuli, sustulit. Athenæus, qui inquit, *χάκτος* eadem, quæ Romanis carduus, qui nō procul à Sicilia absunt, & reliquis Græcis cinara. Siquidē mutatis duabus literis *κακτος*, & cardos in eadem voce cōueniunt. Edendo fuisse cacton satis Epicharmus testatur, qui post olera aspersas cactos retulit. Philetas Cous cactos vocabat. Phœnias Siceliam vocat spinosam plantam, Athenæo referente. A Galeno *κίναρα* dicitur. Cinaræ nomen, quod gentilem ei puellam in hanc herbam conuersam comminiscantur, dictam volunt. Sunt qui cinaram dici putant à cinere, quo gaudet. Sed horum sententiis non est accedendum, quum cinaræ vocabulum è Græcia venerit in Latium, quippe tum Poetæ, tum vetustissimi Græci oratores cinaræ vocabulum vsurparunt, vt Athenæus fatetur. Sosipater Paphius qui Alexandri Philippi Regis temporibus floruit, cinarā nominauit, itemq; Ptolemæus Euergetes Aristarchi Grammatici discipulus, aliiq; teneri edulesq; caules Theophrasto *πέρνιξ*, fructus *σκαλίς*, Athenæo *ἀσκαλίον*, vnde fortasse *scalaria* nomē apud Appulos, Plinio *ascalia* dicitur. Fructus Tralliano *κεφαλῶδες* dicitur, quia capitatus, & *ἀρτυρικόν*, vnde, vt spero, Italis nomē *articoce*. ab aliis *σπένδυλος* dicitur, quod struētili nucleorum serie pineam nucem videatur exprimere. Latinis carduus. Neapolitanis *cardoui*, *carcioffi*.

*Descriptio.*

Theophrastus ita cacton describit. Cactos in Sicilia tantum nascitur, suæ proprietatis & ipsa, in Græcia nusquā habetur, eius in terram proserpunt caules, & humi statim accubant à radice emissi, lato folio, & spinifero. Caules vocant cactos, quos desquamatos non fastidiunt in cibis, & vt amaritudinē exuant, muria seruant. Caulem, qui in rectum euehitur, appellāt pternica, eiusdē suauitatis, sed vetustatis impatientem. Inuolucris cortex, in quo semen residet, lanuginosus, echinata facie sæuit, quo detracto teneritas eadem inest, quæ palmarum cerebroscalia appellat. Plinius quæ à Theophrasto interpretatus est, eadem habet. Et cactos quoq; in Sicilia tantum nascitur, suæ proprietatis & ipsa, cuius in terra serpunt caules à radice missi, lato folio, & spinoso. Caules vocant cactos, nec fastidiunt in cibis, inueteratos quoq;. Vnum caulē rectum habent, quem vocant pternica, eiusdē suauitatis, sed vetustatis impatientē. Semen ei lanuginis, quam pappo vocāt, quo detracto, & cortice teneritas similis cerebro palmarum est, vocant ascaliā. Quæ dā spinosa foliata sunt, vt carduus, foliis inest aculeata mordacitas. Carduus & folio



& folio, & caule spinosas lanugines habet. Columella cinaram ita describit.

*Hæc modò purpureo surgit glomerata corymbo.*

*Myrtiolo modò crine viret, deflexaq; collo*

*Nunc adoperta manet, nunc pinea vertice pungit;*

*Nunc similis calathæ, spinisq; rigentibus horret.*

*Pallida nonnunquam tortos imitatur acanthos.*

10 Addimus nos: Cacuminibus squamosum extuberat globum, corticosis  
vnguibus squamatim compactilibus coagmētatum, vt pineam nucem ex-  
primat, flore eleganti, purpureo rutilante, celeriter circa solstitia canescen-  
te. Sed ne putes fructum esse florem, quippe fructus semē est, cui præit flos,  
sed flos globus ille est, quo delibratis frondibus vescimur.

20 Apud nos plura sunt genera. Vnum genus nigrum vocant, & Hispanicū, *Generas*  
cui frondes rectæ, non repandæ sunt, & spinæ in cacuminibus rectæ, in aliis  
verò repandæ terram versus, in aliis verò non nisi magnitudo fructus dif-  
ferentia est. Sunt & quæ spinis vacant.

In Sicilia nasci Theophrastus optimas dixit. Plinius apud Carthaginem *Cælum.*  
magnam, Cordubamq; præcipuè. In Apulia nō spernendas vidimus. Apud  
nos in Pithacusa, & Prochite: vt etsi quodcunq; cœlū sustinere videantur, a-  
pricum tamen & calidum exoptare videantur. In Mauritania tantæ proce-  
ritatis attollitur caulis, vt duodenos cubitos superet.

30 Columella multo cinere stercoreari iubet, idq; genus stercoreis huic oleri *Solum.*  
videtur aptissimum. Palladius, terram stercoreatam & solutā dicit, quam-  
vis in pingui posset melius prouenire. Et hoc alibi contra talpas prodest, si  
pangantur in solido, ne terra ab inimicis animalibus perforetur. Callima-  
chus edito tradit montes circa Areanicum mare spinosa cinara pubescere.  
Addit & Choras minorū agros hac spina passim vestiri, camposq; circa Indum  
amnem eadem virescere. Polemon est author, plerosq; tractus in horresce-  
re cinara, sed apud se montē ambitiosum iis vbiq; fruticibus rigere. Ptole-  
mæus Ægypti Rex memoriæ prodidit iuxta Berenicē Lybiæ magnā cinaræ  
vim plerisq; locis enasci, qua decerpta milites ipsum sequuti victitassēt, eiq;  
spinis adēptis vescendā obtulissent, alioquin mandi nō posset, ex Athenæo.

40 Columella duobus feri temporibus posse scribit, vere, & autumno. Sed *Satio.*  
semine cōmodius circa Calendas Martias seremus, eiusq; plantā circa Ca-  
lendas Nouembris disponemus. Sed sobolem melius per autumnī æquino-  
ctium disponemus. Palladius: Serenda sunt eadem Luna crescente, in area  
iam parata, semina spatio semipedis discreta. Cauendum est, ne semina in-  
uersa ponantur: nam debiles, incuruos & duos creabunt. Non altè impri-  
menda sunt, sed tribus digitis cōprehensa mergantur, donec ad primos ar-  
ticulos semen perueniat, tunc leuiter operiantur, & herbis liberentur assi-  
duè, donec plantaria solidentur, & rigentur si æstus interuenit. Octobri  
mense plantis ponuntur, quas cum ponemus, radices earum summas ferro



refecamus, ac fimo tingimus, ternū in pedū spatio tēperamus in crementū cau-  
sa, pedali scrobe depositas binas, aut ternas. Cinerē sepe sub hyeme diebus  
siccis, simūq; miscebimus. Plinius. Carduos duobus modis ferunt, autumnū  
planta, & semine ante nonas Martias, plantaq; ex eo disponūtur, ante Idus  
Nouemb. aut in locis frigidis circa Fauoniū, stercoratur enim, si diis placet,  
lātioresq; pueniunt. Cinara, vt Cassianus notat, Nouemb. mense deponi  
debet, vt vere suos fœtus largiatur. Vere sata, aut vix eodē anno fructū dabit,  
aut elanguescens gracilē, & litigiosum pmet. Soboles quæ vegetioribus ad-  
nascuntur caudicibus, falcis mucrone, diducta terrarū aliqua parte radicis  
sunt eruendæ, vt per alia spatia digerantur, sed solū benè subactū, & vetere  
fimo saturatum desiderant, iugiterq; quū æstus interuenit, rigentur, donec  
plantaria solidentur, ita curatæ tenerum & vberiore echinū exhibebunt.

Cultus.

Palladius: singulis sanè annis à radice auferendę sunt plantę, vt ne matres  
fatigētur, & soboles per alia spatia digerātur. Cum aliqua tamē radicis parte  
vellēdę sunt. Quos setuabis ad semina colligēda liberatos omnib; pullis, te-  
sta sup te gere debebis, aut cortice, nā solēt semina sole, vel imbrib; interire.

Ars.

Palladius, Si seminū cacumina cōfringas, spinis carebunt. Item si semina  
eorū madefeceris per triduū laurino oleo, vel nardino, vel opobalsamo, vel  
succo rosę, vel masticino, & postea siccata depresseris, eiusdē saporis orien-  
tur, cuius vnguēta semina cōbiberint. Cassianus: si semina madefeceris per  
triduū rosarum succo, aut liliorū, aut laurino, aut alterius cuiusq; suauiter  
olentis liquore, eiusdē odoris orientur, cuius semina laticē hauserint. Si se-  
minum cacumina lapidis attritu retundantur, spinis carebūt, annoq; toto  
per hunc modū cinaras creari cōfirmant. Affirmant alij q; quocunq; tem-  
pore cinarę plātentur, eodē & fructū edent, & ob hoc per totū annum possē  
cinaras haberi. Lauri refert odorē, si in baccā eius excavato foramine cinarę  
semina imprimātur. Si delibratę lactucę radix in tenues particulas dissecto-  
tur, & singula semina singulis indita segmentis obruantur, spinis carebunt.  
Dulces pueniunt, si semina lacte & melle maduerint, dein siccata ponantur.  
Apud nos hyeme ineunte eas humo obruunt, sic candorē asciscunt, & ama-  
ritudinem exuunt, vt in hybernos cibos gratius admittantur.

Inf. rem.

Palladius: Contra talpas prodest catos frequentes habere in medijs car-  
duetis, mustelas habent pleriq; mansuetas. Aliqui foramina earū rubrica, &  
succo agrestis cucumeris impleuerūt. Nōnulli iuxta cubilia talparū plures  
cauernas aperiūt, vt illę territz fugiāt, solis admissu. Pleriq; laqueos in aditū  
earū setis pendentibus ponunt. Cassianus: Radices teneras mures expetūt  
captiq; huius voluptate ad eam concurrunt, vorantq;. Arcet eorum insul-  
tum lana radicibus obuoluta. Item suillum stercus, vel ficulneus cinis radio-  
cibus appositus, cæca rerum discordia, vt volunt, incursum abigent.

De papauere. CAP. LVIII.

SEREMVS etiam papauera in nostro hortulo, quum antiquos fuisse, et-  
iam Romanos indicio sit Tarquinius Superbus, qui, vt inquit Plinius, le-



gatis à filio missis decutiendo papavera in horto altissima, sanguinarium illud responsum hac facti ambage reddidit. Periclitabantur antiquitus, an amaris suis forent grati iuvenes, essetq; affectus mutuus, foliis papaveris: si quidem pollici imponentes ea, & indici, mox collidebant, quod si percrepissent, amari se argumentabantur: sin minus, ut frustrati ingemiscebant. Quod planè significavit Theocritus his versibus,

*Cognoui prius aliquando periclitans si amares me,*

*Non autem telephylon collisioni insonuit,*

*Sed vanè molli in brachio conflacuit.*

- 19 Vbi interpret telephylon ramū papaveris esse autumat, dictumq; putat quasi *ἡλέφειλον*, quod amorē præmonstret, unde sunt, qui nō per v, sed per s scribendum astruant. Varro papaver apibus gratū dixit, item ex eo duplex ministerium præberi, quippe ex eo cerā & mel conficiunt. Columella vilioris notē nigri papaveris flores ponit. Theocritus, aliiq; poetę fingūt papaver natum ex Veneris lachrymis Adonidem lugentis cum rosa. Dioscorides scribit, huius semen in panem densari in vsum sanitatis. Mnesidemus olfactu solum probavit, vicius soporifera. Diagoras autem, & Erasistratus est aut hoc esse vi soporifera, & si plus iusto sumatur, læthifera. Plinius, Hoc scimus interemptum Licinij Cæcinnæ prætorij viri patrem in Hispania Baiulij, quum valetudo impatibilis odium vitæ fecisset. Item plerosque alios.

- 20 Græcis *μύκων* dictū *παρὰ τὸ μὴ κινῆν*, quod vincti papaveris sopore sensus, membraq; stupefacta nequeant quicquā agere. Vel dictū eadē ratione quacumque *κώπωση*, à vertigine & caligine, quam utrumq; inuehit, excæcari enim dicebat Andreas visum succo huius, apud Plinium. *μύκωνα* insula sic dicta, quod ibi primum papaveris fructū Ceres inuenerit. Latini papaver. Itali *papauero*. Plures sunt papaveris species. Sed quo clarius horū discrimina intelligantur, sciendū quod papaver prima sui diuisione diuidatur in satiuū, & agreste. Satiui plures species, vna hortensis, cuius semen album, cōmuniter est, à Dioscoride *δυσλακῆς* ab vitis forma, id est viticulariū. Plinius candidū vo-

- 30 cat: Apuleius vsuale, & folliculosum, cuius semen in sanitatis vsum pani inspersum cōpinsebatur, & cum melle in secunda mensa apud antiquos edebatur, unde forsan ab Apuleio vsuale, & folliculosum, quod in follis modū reformatū sit, à Theophrasto sæcundo semine describitur, cuius rationem assignauimus capite de cumino. Nec ei folia decidunt. Semen affert vasculis inclusum. Succus eius lacteo similis. Dioscorides verò: Capitulum habet longum, & semē candidum. Plinius: Candidi semen tostū in secunda mensa cum melle apud antiquos dabatur, hoc & panis rustici crustæ inspargitur, affuso quo in hærescens, vbi inferiorem crustam apium, gitq; cereali sapore condiunt. Satiuum omne magis rotundat capita, at syluestri longum, ac pusillum. Addimus nos, Foliis constat longis, per ambitum ferratis, nul-
- 40 lōye pediculo, caudicēve, ramis, floribus, vel candidis, vel ex candido

Nomen

Gen. Des.



leuiter purpureis, capitulis longis, in quibus semen atrum, vel candidum, æstate floret, ac subinde semen profert. Aliud genus est apud nos nuper aliunde allatū, in totum huic nostro persimile, nisi quod caput maius, nō nudum, sed multiplicibus foliis contextū, crispis, & copiosis diuersorū colorū. Non genus vnū, aliud enim candidis foliis, aliud rubicundis, aliud purpureis, & demum variatis, intus grana, vt papauer, sed caulibus & foliis longe nostrati maioribus. Dioscorides: Syluestri verò, caput insidens, dimissumq; & nigrū semen, pithitis nominatur, nōnullis tamen & ipsum rhæas dicitur, quoniā eius scapo lacteus succus emanat. Aliud genus syluestre, quod ad medicinas valentius, multò his longius, productiore capitulo. Dioscorides à dolij forma pithire, id est doliare dixit. Plinius verò hoc genus esse satiuū dicit, aliud est genus papaueris nigrū, cuius scapo inciso lacteus succus excipitur. Apuleius agreste, syluaticū, & rhæada vocat, & ex hoc opiū fieri, & meconium. Sed tertiū genus iis syluestrius, & medicamentosius, quod Plinius, contra quā Dioscorides & Apuleius tradiderunt, rhæada à Græcis, à nostris erraticū vocari dicit. Aliud genus Theophrastus erraticū vocat, his verbis: Aliud erraticū vocatum, nō absimile intubo erratico cōstat, quamobrē in vsum venit cibarium. Nascitur potissimū in aruis inter hordea, florē rufum producit, caput vnguis pollicaris magnitudine anget, colligitur ante hordei messem, estq; viridius, purgat inferius. E cuius penu hæc Dioscorides deprompsit: Papauer erraticū quod rhæada vocāt, vere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, vnde & nomen apud Græcos accepit, folia eruce, aut origano, aut cicorio, aut thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra, iunceus ei caulis, rectus, cubitalis, asper, flos syluestris anemones, puniceus, interdū albus, caput oblongū, sed quā anemones minus, semen rufum, radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Ex his Plinius: Tertiū genus satiuū, rhæam vocant Græci, nostri erraticū, sponte quidem, sed in harenis cum hordeo maximè nascitur, eruce simile, cubitali altitudine, flore rufo, & protinus deciduo, vnde & nomen à Græcis accepit. Et alibi. Inter satia, & syluestria medium genus, quoniā in aruis, sed spontè nasceretur, rheā vocauimus & erraticum. Aliud syluestre genus Theophrastus corniculatū appellauit. Folio constat verbasci nigri, sed minus nigro, caulis altitudo cubitalis, radix brevis per summa cespitū, fructus inflexi vt cornicula figurantur. Legitur circa messem, & aluū purgare potest. Folium albuginē ouibus aufert, nascitur iuxta mare, locis saxolis. Ex eo Dioscorides: Corniculariū folia habet candida, hirsuta, verbasco similia, in ambitu syluestris papaueris more serrata, caule nō dissimili, flore pallido, cauliculo scænigræci, in corniculorū modum inflexo, vnde nomē mutuatur, semine papaueris pusillo, nigroque, radice per summa cespitū nigra, crassa. Nascitur in maritimis, & asperis. Plinius: Syluestriū genus vnū, ceratitim vocant, nigrum cubitali altitudine, radice crassa, & cor-



& corticosa, caliculo inflexo, vt cornicula. folia minora, & tenuiora, quàm cæteris syluestribus, semen exile, tempus solum est messibus. Theophrastus: Aliud Heraclion nuncupatū, folio constat struthi, quo splendorem linteis tribuunt, radice in summa terræ eunte, fructu albo. Ex quo Dioscorides: Aliud papaueris genus aphrodes, id est spumeū vocatū, ab aliis Heraclium (intellige Theophrastū) caule dodrantali, foliis admodū paruis, radicule similibus, fructu inter ea candido: nam herbula alba tota est, & spumea tota: radice in summa cespice, legitur æstate: semen, quū integrè adoleuit, decidit exiccatum. Plinius ex his omnibus: Aliud è syluestribus genus, Heraclion vocatū, ab aliis aphron, foliis, si procul intuearis, speciem passerū representantibus, radice in summa terræ eunte, semine spumeco. Ex hoc lina splendorem trahunt æstate. Sed quæ Theophrastus de strutho radícula seu herba, & Dioscorides dicūt, Plinius de strutho aue intellexit, nam & auicula struthos dicitur, & lanaria herba est struthos dicta, cui cōparari debuit à Plinio.

Plinius optimum in siccis nasci dixit, vbi raro pluit. Ex Virgilio lætā terram exoptare videtur: nam vrere dicite eam. *Sol. Cal.*

*Vrit humum lini seges, vrit auena,*

*Vrunt Letheo persusa papauera somno.*

Cato de papaueris satione hæc habet. Si ligna, & virgas nō poteris vēdere, *Satio.* neq; lapidē habebis, vnde calcē coquas, de lignis carbonēs coquito, virgas & sarmenta, quæ tibi vstioni supererunt, in segetē comburito, vbi eas combusseris, ibi papauer serito. Columella, Circa calēdas Octobris obrui oportet papaueris semen, nō frigidissimo loco: nam si regio sæuas hyemes habet, post idus Februarias, semine differenda sunt, suaq; de sede partienda. Palladius, Locis siccis, & calidis Septembri seritur. Potest & cum aliis oleribus seminari. Fertur vtilius prouenire, vbi virgæ & sarmenta cōbusta sunt. Plinius: Cato virgas & sarmenta, quæ tibi in satione superiāt, in segete cōburito, vbi eas combusseris, ibi papauer serito syluestre. Vere papauer seritur, atq; vti nunc, etiā Transpadani seruant vsq; in quinquatrus. Sunt quædā comitātia aliorū satus, vt papauer: namq; cum brassica seritur, ac portulaca & cruca, cum lactuca. Vnum erit hoc idem tempus lino, & papaueri serendo.

#### *De atriplice. C A P. L I X.*

**E**T nostro hoc horto atriplicē seremus, postquā inter olera, quibus veteres vefcebantur, Theophrastus recenset. Dioscorides coctū edi, vt olerus tradidit. Galenus hanc herbā cum oleo, & garo miscet, & acetū quoque addit, quo facilius, & citius secederet à stomacho. Pythagoras accusauit (vt Plinius inquit) tanquā faceret hydropicos, morbosq; regios, & pallorē, & eoqueretur difficillimè. Addidere Dionysius, & Diocles plurimos gigni ex eo morbos, nisi mutata sæpius aqua coquatur. Præstat cibis vere, nam vt cito adolefcit, sic cito marcescit.

Hippocrates ἀτρίπλεον appellauit, Theophrastus ἀνδράσκηον, vel ἀνδράκα. *Nomen.*



ἐν alibi: nomē impositū ab ἀσπὺς αὐχέν, quod suā celerimē amplitudinē  
 assequatur, confestimq; incremento proficiat. Dioscoridi ἀτράραξις, & po-  
 stiores Græci Attici ὀλίτερα mutata in τριφύλον ἵτε χρυσοκόχανον Dioscori-  
 des dixit, id est aureū olus, vel à luteo flore, quē profert, vel quod ad capillos  
 aureo colore tingēdos optimū existat. Plinius, Latinis, authore Festo, atri-  
 plex, veteres verò atraplexū, sed à Græco nomine potius, quā ab atrore,  
 quē hominibus coelescētibus inducat, ut diximus ex Pythagorā. Itali atriplicei

**Genera.**

Theophrastus generis diuersitatē ei deesse scribit. Dioscorides in duo ge-  
 nera diuisit: sylvestre, & satiuū. Plinius item in sylvestre, & satium diuisit.  
 Apud nos sylvestriū plures species, & maritimū vnum in littoribus nascens,  
 quod à frondium, seminum, & radicis similitudine liquido apparet.

**Descri-  
ptio.**

Radix ei vna in altitudinem descendens, vnde fibratæ alię promuntur, ut  
 in beta. Lignosa, sed minus quā ocimo. Foliatū habet semen, & obductū  
 cortice, numerosum, racematimq; singulis ramis insidens. Vtraq; parte af-  
 fert: nam & fructificare ē suo latere potest: & sic copiosius. Ex Theophra-  
 sto. Plinius ab eo. Rectam atriplex habet radicē, statimq; plurimis nititur  
 capillamentis, ut blium. Semen cortice obductum. Dioscorides & si preu-  
 liari suo capiti descriptionē non præfixerit, possumus tamē ex aliis herbis,  
 quibus assimilauit, notas aliquas extorquere. Semen habet cernantes, folia  
 xanthij herbæ, sed secta. Addimus nos. Hortensis caule assurgit quadrato  
 & rubenti, ramis brachiato, folio caule tenui lato, in acutū desinente, sagi-  
 tarum more, succoso, pingui, quū pubescit herbaceo, quū senescit in lu-  
 teum ex viridi languescēte. Flore luteo, exiguo. Floret Iunio, & Iulio men-  
 sibus, inde semen profert, presso ac tenui folliculo incluso. Sylvestris non  
 nisi natalibus differt. proceritate luxuriosa tamen prodit, ut quaternos sæ-  
 pe cubitos excedat. Maritimum humi spargit caules, folia subalbicantia, ac  
 gustu salsa, ut in omnibus maritimis conspicitur.

**Colum.**

Plinius miratur, quod Solon Smyrneus in Italia atriplicem difficulter  
 nasci scripserit.

**Solum.**

Palladius pingue, & humidum solum amare scripsit, & assiduo humore  
 satiari, & succo lætaminis.

**Satio.**

Theophrastus octauo die nasci scripsit, eiusq; semen ad perdurandū in-  
 firmitatem habere. Plinius, Infirmiora sunt semina atriplicis. Columellā:  
 Circa Calendas Octobris obrui oportet, nō frigidissimo loco: nam si regio  
 sæuas habet hyemes, post Idus Februarias semina differenda sunt, suaque de-  
 sede partienda. Palladius, Aprili seremus, si rigare poterimus, & Iulio, & ex-  
 teris vsque ad autumnum. Semen statim quū spargitur, obruendum est,  
 herbæ ei subinde vellantur. Transferri necessarium non est, quū benefe-  
 ritur, tamen potest melius adolescere, si spatio rariore pangatur, ferro ta-  
 men refecandum est semper, quia ita pullulare non cessat. Plinius vult au-  
 tumni æquinoctio seri. Tam citq; crescit, & adole scit, ut quintodecimo die

sera-



seratur, & mandatur. Vnde eripit à cōfinio ceteris herbis alimentū. Vnde à Pythagora culpātū est in hortis, nil nisi quidem laquidum iuxta illud nasci.

De *Spinachio*. CAP. LX.

**N**EC ab atriplicis natura olus hoc, vulgò *Spinachia* dictū, multum diffidet: an veteribus minimè fuerit cognitum in dubium vertitur, quum intactū reliquerint, quum tam frequens olus mensis quotidiano vsui sit, & præsertim verna ieiunia saturet: vel forsan quòd cibo potius, quàm medicina natū sit, nec in ea quicquā illustre sortitū. Eruitur radicitus, abiectisq; radicis capillamentis, citrà aquā coquitur, vt pote quū magnā vim humoris inter coquendū remittat, & velut proprio contentū iure alienū aspernetur. Ligula subinde petcussū ab acto lēctore versatur, deinde in manuales globos expressa penitus sanie redactū, patinis in oleo, vel butyro frigitur, addito, quo magis palatū titillet, omphacio, vel acerbarū vuarū melligine. Atriplicis vires videtur sibi arrogasse, par ingenio. Videtur neglectū atriplex ieiuniori solo creditū, in hoc olus degenerasse, prioris naturæ nō oblitum. Sicut *lomachon* apud *Cassianum* reperias, quasi dicas maluacā betam, *Nomen.* quod vt reor parentum adulterio natū existiment: vel quod figura, & denticulato seminis habitu betā, & mollitie maluā mentiatur. Græcis etiā recentioribus *αράχα* haud dubie ab oleris raritate dictū, quū raro illo Medici vterentur. Vel quod verisimilius est ab aliis nationibus emēdicato *spinacco* nomine. Latinis *spinacia*, ab insigni seminis spiculatorū nota, & si ipsa herba glabra, & mollis sit: semen in spinas occallescit. Mauritanæ factionis principes Hispanicum olus appellauere, fortasse quod illic oriundū ad alias nationes commigrauerit. Itali *spinaci*. Exit folio primum triangulo, molli, sagittæ modo cuspidato, mox la-

*Descriptio.*

**38** Mas semen profert, foemina seminis infœcunda sterilefcit. Solum pingue, & benè pastinatum Neapoli concedimus, & si nullum so-

*Generatio.*  
*Solum.*

*Cassianus.* Aprili seritur *sentlomachon*, & mense Maio, & transplātur. Iunio etiam seritur, & transplantatur Iulio, Augusto seritur, & transplantatur. Seritur Septembri, & transplātur. Nos Decēbri, Ianuario, Februario, Martio, Aprili, & Maio mensibus serimus. Septimo à sātū die prodit. Quum carpitur, & si eius caulis inciditur, iterum pullulabit, & diutius perdurabit. Non horret hyemis frigora, vt possit verno tempore cibum suppeditare.

De *blito*.

## CAP. LXI.

**40** RECENSAT blitū Theophr. inter olera. Dioscorides itē vt olus edi. Galenus nō solū cū oleo, & garo, sed etiā aceto ob suā insipiditatē. Insi-



dum olus omnino est, ut rudes homines prouerbio bliteos nuncupemus. Scribitur à Plinio inde conuiuium fœminis apud Menandrum facere maritos. Apud Aristophanem *βλιτομάχας* pro stolidis accipitur, & apud Plautum in Truculento per conuiuium blitea vocatur meretrix, quod insipida, villis, & nullius pretij sit. Blitea & lutea est meretrix. Aprili ieiunia rusticorum implet, & olitorio foro apud nos ab infima plebe coemitur.

**Nomen.** Theophrasto *βλίτον*, Dioscoridi *βλιῖτον*, Suidæ *βλίτλον*, quum fatuum olus, & sine acrimonia possideat ingenium. Latini blitum, & blitus, Itali *blita* done, Neapolitani *aitillo*.

**Genera.** Apud nos duplex visitur genus, candidum & rubens: est & aliud ruberrimum, quod fictilibus vasculis à nostris mulieribus in fenestris asseruatur ob coloris præstantiam, cuius folia iuribus incocta, sic ea rubore inficiunt, ut sanguinis colorem repræsentent. Trallianus nigri bliti meminit.

**Descriptio.** Theophrastus ita delineat. Multicaulis est, foliis betaceis, & sine acrimonia fatuis, semine corticeo copioso, racematim singulis ramis insidentibus. Item inferiori, & superiori plætæ parte fruticat. Radice non vna nititur, crassa & in rectum tendente, ut beta & lapathon & blerum pars maxima, sed continuè proluxa, ac multiplici. Minus lignosa quam ocimo. Plinius, Quæ recta non habent radicem, statim plurimis nituntur capillamentis, ut blitum. Tam vulgaris notitiæ apud nos est, ut verè bliteus sit, qui illud non cognoscat. Candidum surculosius rubro, ramis vndiq; racemoso fructu scatentibus.

**Solum.** Palladius. Solo qualicunq; seritur, sed culto.

**Satio.** Theophrastus ocysimè nasci dixit, ut tertio die erumpat. Ex tertia est semente, quam æstiuam appellant. Mense Martio seritur. Plinius: tertio die erumpit. Palladius, Martio seritur, neq; runcari, neq; sarculari flatigat hoc olus: quum semel natum fuerit, ipsum se per multa secula seminis sui deiectione reparabit, ut id, si velis, vix possit aboleri.

#### De malua. CAP. LXII.

**E** Contrario in magnis laudibus malua est utraq; & satiuæ, & syluestris. De eisdem mira traduntur ab authoribus, sed maximè si quotidie quis succi eius sorbeat cyathum dimidium, omnibus morbis cariturum. Adeoq; maluæ Veneri nascuntur, ut semen vnicaulis aspersum genitali, fœminarum auiditates augere in infinitum Xenocrates tradat, ex Plinio. Maluæ vsum pro oleribus increbuisse satis testantur authores. Theophrastus dicit ex iis oleribus esse, quæ coquantur. Dioscorides, Satiua esui aptior syluestri. Vescebantur ea maiores nostri ad aluum subducendam in acetariis. Martialis,

*Vtere lactucis, & mollibus vtere maluis,*

*Nam faciem durum Phœbe cacantis habes.*

Celebratur ab Hesiodo in moralibus ad Persen fratrem suum, inquit,

*Haud norunt stolidi, quam toto dimidium plus,*



*Nec quam magna sit utilitas malue, asphodeliq.*

Græcis *μαλάχη*. Sed Antiphani, & Euplio *μολέχη*. Plinius ab emolliendo ventre dictam putat, *μαλάττειν* enim mollire est. Latinis malua. M. Varro maluam, quasi moluam dici, quod aluum molliat. Italis malua. Nomen.

Ex plurimorum authorum scriptis elicitur generum discrimen. Plinius. Genera.  
Duo genera earum amplitudine folij discernuntur, maiorem Græci malopen vocant in satiuis. Alteram malachen, ab emolliendo ventre. E sylvestribus, cui grande folium, radices albæ, althea vocatur ab excellentia effectus, à quibusdā aristalthea. Nos autē: Malua duplex, satiuæ, hortensis, quarum  
20 duæ in duas alias secernuntur, ex hortensibus prima, quæ rosas è maluaceo caule fundit. Diximus de ea in coronario genere. Secunda vesca est. Sylvestrium prima edulis est, altera medicæ tantū facultati inseruit, arborescens althea dicta.

Theophrastus annicaulem dicit. Cuius folia iter solis sequantur, seque eodem inclinant, quo sydus feratur, quod humoris detractiōni acceptum refert, eodem nanq; inclinari par est, quo sol humorem feruefaciens pronocarit, quod etiam Lucius Columella numeris tradidit, Descriptio.

*Et moloche prono sequitur quæ vertice solem.*

Et ob id ab Apulcio heliostrophos appellata. Nec silentio prætereundū  
20 quæ Phantias Græcus, Athenæo referente, prodit vernaculæ, urbanæq; maluz seminis formā placentam vocari, quod eius omnino referat imaginem, quam columna facit pectinatim denticulata, à qua per mediū placetæe molis foramen spiculū exeritur, vmbilicū exprimens, echinato basis ambitu, quod faciliè secanti circulantē seminis globulū liquido patebit. Addimus: sylvestris pumila, & humi repens, folio rotundo, nonnihil lacinioso, caule magno, floribus ex candido suppunicatibus, radice candida, floret per totā æstatē, maximamq; autumnī partē. Quæ faciliè potest cultus mangonio nimīū à sua natura desciscere, vt in aliud genus permeare videatur, quippe seminis septenisq; mensibus, tanta longitudine, crassitudineq; proficit, vt instar  
30 hastæ grandescat, arborescensq; ad vsum baculi veniat, & identidē adminiculi vice fungatur, ac longiusculo tempore maius incrementū capeſſat, ex Theophrasto. Plinius. Authores tradunt in Arabia maluas septimo mense arboreſcere, baculorū vsum præbere extemplo. Sed & arbor est malua in Mauritania Lixi oppidi æſtuario, vbi Hesperidū horti fuiſſe produntur, cæpaſ. ab Oceano iuxta delubrum Herculis, antiquius Gaditano, vt ferūt. Ipſa altitudinis pedes xx, crassitudinis, quam circumplecti nemo poſſit. Hanc Galenus *ἀνὰ δένδρον μαλάχην* dixit, id est arboreſcentem maluam.

Pingui ſolo delectatur & humido, gaudetq; latamine, ex Palladio. Omne Solum.  
ſolum in quo ſeratur, pinguius facere dicitur.

40 Columella ſeri poſſe vere ait. Palladius Februario, & Martio, & Iulio loſatio.  
cis, vbi poſſit rigari. Octobri autē ſerendam eſſe, quæ occuſu hyemis ab



incrementi longitudine reprimatur. Transfertur planta, quum coeperit quatuor folia habere, vel quinque. Melius comprehendit eius planta, quæ tenera est, maior enim translata languebit. Sapor illis est melior, si nō transferantur. Sed ne citō erigantur in caulem, in medio earum glebularum constitues, aut lapillos. Rara ponenda est. Surculo deletatur assiduo. Sic liberanda est herbis, ne motum sentiat in radice.

De rumice. CAP. LXIII.

**R**ECENSETUR & inter olera, quæ coqui exigunt, rumex à Theophrasto, Dioscoride, Plinio, & cæteris. Et si nostra ætas olera hæc aboleuerit, non excludemus tamen à nostro hortulo. Plinius ceram apes ex omnibus floribus conficere, excepta rumice tradit, eiusq; vsum cum ptisana tantum in cibis leuiorem, gratioremq; saporem præstare.

**Nomen.** Græci λάπαθον, ab effectu nomē indiderunt, etenim λαπάζειν vacuare est: omnium siquidē generū decoctis foliis aluus exinanitur. Theocritus λάπαθα vocauit. Latinis nomine à Græcis mutuato lapathum, & rumex dicitur. Columella,

*Lubrica seu lapathos.*

**Genera.**

Varroni antiquo vocabulo manna ruris dicitur, vt opinor. Itali lampazzo. Theophrastus generum diuersitatem tollit, contentus scilicet satiuo & syluestris discrimine. Dioscorides quinque recenset. Oxylapathum primum, cuius anceps videtur significatio, num scilicet ab acido sapore, vel ab acuta figura, nempe à foliis, quæ in mucronē desinunt, nomē acceperit, aliud secundum, tertium syluestre, quartum oxalida dictum, quod in acetarum nominauimus, quintum hippolapathum, quasi grande lapathum dicas.

**Descriptio.**

Oxylapathum Dioscorides vocat, quod in acutum tendat, prædura habens extrema, nō nisi palustribus nascens. Plinius: Est & alterum genus, ferè oxylapathon vocant, satiuo item similis, & acutiora habens folia, ac rubriora: non nisi in palustribus nascens. Sunt qui hydrolapathon tradant in aqua natum. Surgit apud nos caule cubitum, & sesquicubitum alto, rotundo, striato, purpurascēte, flore muscoso, semine triquetro in folliculis. Radix illi subest pedem longa, digiti crassitudine, flaua. Aliud genus Dioscorides priori non dissimile dicit. Hoc foliis superne magis retusis, breuioribus, rotundioribus, vere à superiori vix discernendum. Tertium syluestre paruum, plantagini proximum, humile, & tenerum à Dioscoride pingitur. Plinius: Solum ex omnibus lapathū syluestre melius. Hoc in satiuo rumex vocatur. Theophrastus, Syluestre breuiorem agit radicem, multicaule, atq; ramosum consistit, & tota forma quum perfectum est, betæ proxima sanè cernitur. Quartum hippolapathum, olus magnum in paludibus nascens Dioscoridi. Sed Plinius: Est & aliud hippolapathon, maius satiuo, candidius, ac spissius. Apud nos hoc genus Rhabarbarum monachorum dicunt, inuialis notitiæ in nostris hortis. Surgit caule trium, vel quatuor cubitorū, radice



radice adultiore, flauiore, gustu, & facultate, rhabarbarum imitante, folio hydrolapatho pari, vel latiori, minus acuto, rigidoque. Hoc describere videtur Theophrastus: Satiuo radix lignosa: vnistirpē maximē omnium putaueris ramicem, nec enim lateribus crassas vllas penitus agit, sed tantum prætenues, nititur altissima omnium radice, maiore nanque semipedibus ternis: diuturnitate quoque syluestrem, & in totum, vt ita loquar, omnia olera vincit, perdurat quantum vis temporis, carne plena, atque humecta consistit, qua de causa effossa diu viuere potest.

→ Cuncta genera vbiuis abundē prouenientia.

Calum.

10. i Theophrastus ē secunda satione esse dicit, quæ autumnō seruntur. Nullo pacto locis cultis prouenit, aut vitiosē deteriusque efficitur. Plinius ab eo: Ex iis, quæ autumnō seruntur. Ex omnibus lapathum syluestre melius satiū, hoc in satiuis rumex vocatur, nascitur fortissimum. Traditur semel satum durare, nec vinci vnquam à terra, maxime iuxta aquam.

Satio.

De hortensi solano. CAP. LXIIII.

20. SOLANVM esculentum tantummodo vnum profert Theophrastus, ex duobus alterum somnum, alterū insaniam, & interdum mortem afferre; Dioscorides hortense solanum cibis idoneum dicit. Nihil mali corporibus esse prædicat Xenocrates, cui hoc salutare non sit. A multis hodie nationibus in olerē estur gustu innocens.

Græcis σπύχον dicitur, vt tradit Cornelius Celsus, Plinio referente, acinum videtur significare: acinos quippe quamplures retinet. Galeno vnus literæ mutatione τρύχον. Latinis solanum. Italis solatro.

Nomen.

Hortensis solani duo genera apud Dioscoridē, à fructuū colore distincta.

Theophrastus fructum acinosum afferre dixit Dioscorides, Frutex cibis idoneus, exilis, pusillus, multis cōcauus alis, folio nigro, maiori quā oxi-mi, & latiore, fructu rotundo viridi, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit. Addimus: Flosculis albidis, stellatis, Iunio, & Iulio bacculis succulentis, quasi in corymbum collectis, primo viridibus, post fuscis, nigrisve, 30 aliis rubris purpureis, vel fuluis rutilis. Radice alba, pusilla.

Genera Descriptio.

Septentrionali, & meridionali cælo viuit. In Ægypto familiare cibis, vbi que viis, hortis, cultis incultisque locis, serotibus, marginibus, & arcis proueniens, & opacis locis.

Cal. Soli.

Olim cum hortensibus oleribus serbatur in hortis, quæ edenda erant, nunc sponte, & inuitis cultoribus prouenit.

Satio.

De ferula. CAP. LXV.

40. SEMEN ferulæ in Italia cibis est, inquit Plinius, conditur quippe, duratque anni spatio in vrceis. Duo eius genera, caules, & racemi. corymbiam hanc vocant, corymbosque quos condiunt. Caules eduntur decocti, commendanturque musto ac melle, stomacho utiles: sin plures sumpti, capi-



tis dolores faciunt. Dioscorides, Caules ferulæ si edantur, capitis dolores facere, ac muria cōdiri, scribit. Columella sic docet. Ferulam quū legeris sub tecto exponito, dum flaccescat, dein folia, & corticē omnem folliculorum detrahito. Caules si fuerint pollice crassiores, arundine secato, & in duas partes diuidito, ipsos quoq; flores, ne sint immodici, deduci & partiri oportebit, atq; ita in vasa cōdi, deinde ius, q̄ est mistū duabus partib. aceti, & vna muris infundi, & pauca radículas laseris adiectas in spissamento sceniculi aridi cōtegi, vt ius superueniat. Scribit etiā Plinius, quod antiqui vtebatur coronis ē ferulis, & corymbis. Natura ferularum murenis infestissima: moriuntur ea tacta. Asinis gratissima sunt in pabulo, ceteris iumentis præsen- 10  
taneo veneno, qua de causa id animal Libero patri assignabatur, cui & ferula. Erat enim Baccho, Sileno, & suis comitibus dicata. Virgilius in Gallo.

*Venit & agresti capitis Sylvanus honore,*

*Florentes ferulas, & grandia lilia quassans.*

Baccho dicata, quod ad baculū aptissima sit, & infirmi in ebrietate pedes leui hoc pedamento regantur. Aliā assignat Eusebius rationē libro de præparatione euangelica, quia quū homines merū biberent, & furiosi euaderent, se baculis inuicē feriebat, vnde sæpe mori cōtingebat: vt ergo malum istud euitarēt, ferulis vsi sunt, quarū leuis, & nō lætifer ictus foret. Aliā verò Plutarchus in Symposiacis affert causam, nempe vt significaretur quod si in- 20  
ter pocula aliqua in parte peccatū sit, leuis puerilisq; reprehensio sufficiat: nam & pueri ferula castigantur. *ναὶ ὁ βασιλεὺς* Platoni in Phædone dicuntur Bacchi ministri, quasi feruligeri. Antiquitus ferula Imperij nota fuit. Leuis eius arboris ictus est: idē significabant magis ex seueritate eos, qui ceteris præsumunt, & dignitate, quā fustium atrocitate, & verborū asperitate formidabiles esse debere: regū instar, quibus sceptrā cōceduntur, vt legibus asperiores sed pœna mitiores sint. Fuit & insigne ferula pædagogorum, quod illa manus puerorum percuterentur. Martialis,

*Ferula minaces sceptrā pædagogorum,*

*Et Iuuenalis. Et nos quoq; manus ferula subduximus.* 30

Nulli fruticum maior leuitas, & cum ligni leuitate durities, & rigor firmior. Ob id gestata senectuti & à longa valetudine se recolligētibus facilius baculorum vsus præbet. Lignum omne corticis loco forinsecus, loco veri ligni fungosam intus medullā habet. Quare Clearchus inter lusorias quaestiones, quas scirpos vocamus, Græci gryphos, & ænigmata, Ferulā lignum esse, & non lignum dicebat. Sunt ferulæ cibo, & coronis commendabiles: nobis verò veris initio prima ferulæ germina, quæ oui luteum referunt, sub cineribus excocta, charta prius, vel linteo madefactis inuoluta, mox pipere, sale, & oleo, & aceto cōspersa gratissimo sunt cibo. Author est Plinius salpā obsecnū piscem dici, quod percoqui, nisi ferula verberatus fuerit, nequeat. 40  
Ignē ferula adseruari certū est. Fingūt Poetæ Prometheū in cælos à Minerva subla-



Tublatum, ferulam toris Phœbi admouisse, & accensam in terram deportasse. Veritatis fides est, quod Prometheus primum ignem è silice prouocarit, & in ferula adseruari docuerit, scribente Plinio. Aliam nos docemus rationem, & perpulchram: continuo enim ferularum attritu excitatur ignis, & in eis optimè adseruatur, vt sapius experti sumus.

Græcis *ῥαβδος*. Latinis & Italis ferula non minus à feriendo, quàm ferendo dictum videri facit Hippocrates, qui eam plestinga vocauit; vt Græcis virgulum, & baculum significat, sic Latinis, quod senibus pedes ac scipiones essent, à ferendo ferulæ dicuntur.

- 10 Theophrastus ita describit. Ferula grandis admodum surgit, vnicaulis & geniculata, à genibus cauliculi & folia alternatim exeunt grādia, mollia, capillamenti modo extenuata maximè, vt quæ terræ sunt proxima caule amplectentia, vt harundines. Flores lutei, & semen anethi obscurum. Germinat vtere, primum folio, tum caule, qui annotinus ei est. Radice singulari profunda. Eius teneritudo processu transit in lignum. In fruticum genere est. At in Nerio vna ex insulis fortunatis altitudine tanta, vt arbor existimetur. Dioscorides verò. Ferula caulem affert ternum cubitorum, folia fœniculi longè asperiora, & latiora. Plinius arborum generi ascribit, quoniam lignum corticis loco habet, hoc est forinsecus, ligni autem loco fungosam intus medullam, vt sambucus.
- 20 Geniculatis nodata scapis. A genibus exeuntia folia maxima, vt quæque terræ proxima. Cætero natura eadem, quæ anetho, & fructui similis. Addimus: Apuliæ quinum cubitorum caulis, radix magna, recta, euulsu difficilis, & præcipuè si in saxorum hiantes commissuras descenderit, vt apud nos in præruptis rupium saxi in maris prospectu. Lacteo pingui succo turgida, vehementer odorata. Iunio, & Iulio floret. Semen foliaceum compressum, rotundum, oblongum.

- 30 Ferulaceum genus in plures species distinguit Theophrastus. Sed primum de eo, quod commune omnium constat, dicendum est, scilicet ferula, & ferulagine, seu idem genus ambabus, differens magnitudine tantum; seu alterum sit, vt nonnulli putarunt; magnitudine sane differunt. Ferula enim assurgens in altitudinem finditur cacumine, inque stipites quosdam, haud magnos, dispergitur, quibus flos semenque insidet. Ferulago autem humilis est. Plinius ab eo. Quæ ab vno caule diuiditur in cacumine fœmina putatur. Sed in Apulia tot sunt generum diuersitates, & species, statura, elegantia, formaque differentes, quas ferulagines vocat, vt quæ sit illa Theophrasti, difficile sit inuenire.

- 40 Calidis ferula nascitur, atque transmarinis. Inter fortunatas insulas Notion vocatur, in qua ferulæ tanta crescunt amplitudine, vt arbores fiant. In Ægypto præcellunt. Plinius, In Africa quoque, vt Solinus tradit. Apulia nostra ferularum maximè ferax, quæ æstiuos soles, & feruidos exceptos, totum ferme fouent diem. Apud nos præruptis saxorum crepidinibus, mare aspicientibus, copiosissime fruticat.



**N**ON deerit fragis locus in nostro horto, etsi non inter olera recenseatur, sed inter horti delicias, & gulæ oblectamēta. Sunt enim ex herbis spontè nascentibus, quibus pleræque gentium vtuntur in cibis, tanta est ciborum ex herbis abundantia, vt fraga. Versu Maronis nota:

*Qui legitis flores, & humi nascentia fraga.*

**Nomen.**

Videtur Græcis incognita, fragrat enim maximè fructus purpureus, sanguineus, diluti cruoris, saturus, ob id fragra dicta, & fragrantia. Nobis *fragole*.

**Genera.**

Apud nos duo genera, quorum alterius rubet fructus, alterius albicat.

**Descriptio.**

Humilis herba, folio tereno, viticulis exilibus, enodibus, numerosis, pilosis, ab radice tenui, superficialia, fibrosa, prodeuntibus floribus in summo, albis, rubi minoribus. Vere fert fructum, arbuti fructum æmulantem, & tota æstate maturat.

**Solum.**

Sylvosis familiaris, & viarum marginibus, & montibus. Ovidius,

*Arbutos fætus montanaq; fraga legebant.*

**Satio.**

Pastinatur in hortis solùm, & in sulcos diducitur. Inde è sylvis eruuntur, vbi spontè nascuntur, vt caules plantantur, primis autumnii imbribus, post mensē stercorantur columbarum fimo, nam ipsis peroptimum. Seruntur longo inter se intervallo: nam cauliculi, vbi terram attigerint, radices capiunt.

*De genere cartilagineo, & primū de cucumere sylvestri, & de satino, & obiter de pepone. CAP. LXVII.*

**S**ED iam cucumerarium ingrediamur, ac per eius species euagemur. Diximus enim, quæ in hortis commendantur folio, caule, & semine, nunc quæ radicibus, scilicet capite, bulbo, carne, tunicisq; carnosis. Plinius torū hoc genus cartilagineum vocat. Inquit enim, Aliorum fructus in terra est, aliorū extra, aliorum non nisi extra. Quædam iacēt, crescuntque, vt cucurbitæ & cucumis, eadem & pēdent, quanquam grauiora multo etiam iis, quæ in arboribus gignuntur. Terra conduntur raphani, napiq; & rapa, atq; alio modo inula, sit & pastinaca. Sed cartilaginei generis, extra terram est, cucumis. Ab eo tandem incipiemus. Refert Palladius, Quoties tonat, veluti timore perterritus, cōuertitur. Plenilunio maximè gliscūt in hortis, manifestumq; capessunt incrementum, & more marinorum echinorum implentur, vt tradit Athenæus. Diphilus Carystius cucumerem velut noxium primis mensis damnavit, vt qui raphani modo sursum feratur. Vltimo cibo innocentiorē esse, concoctūque faciliore pollicetur, & venerem arcere. Plinius, Viunt hausti in stomacho in posterum diem, nec perfici queunt, in cibis non insalubres, tamen plurimum natant. A mulis expetuntur, capiunturq; mira huius oleris voluptate, nec non odorem eminus sentiunt: quare munienda sunt cucumeraria, ne irrumpen-



res depopulentur, ac proterant. Tradunt Quintilii, si subrumo infanti, qui febricitet, per longitudinem cucumis accubuerit, ipsum confectum sanari, ad eum nanq; totum caloris feruorem allici. Quærit Aristoteles Problematum libro, Quam ob causam fructuum alii partem radici proximam habent amariorem, ut cucumeres, alii postremâ superiorem ut glandes. An quod aliis pars ista radici proxima crudo vescitur alimento, quoniam escæ confluuium per radicem frequentat, aliis, quia sicci natura sunt, postrema pars succo dulci inconcocto quæ inde absumpto, quâ plenius assiccat, amarescit modo salis: redditur enim vnumquodque amarum, quum amplius exiccatur, ut oliuæ, iuglandes inuenteratæ, efficiuntur amaræ.

Græci *σικυς*, & *σικυς*: nomenq; ex aduerso posuerunt, *ἀπὸ τοῦ σικεῖν καὶ κυεῖν*, quod scilicet appetentiam concumbendi sedet. Hinc Græcis prouerbiū, Athenæo referere, Texens palliū mulier, cucumerē deuoret: textrices enim maxima ex parte, si Aristoteli credim⁹, veneri sunt opportunæ, ut ergo iis impetus elāguescat, cucumeres edendos consulebant. Heraclides Tarentinus *bedygrū* nominat. Latinis cucumer, & cucumis dicitur, ut Varro placet, à concuruatu dictus, quasi curuimer. Accius auguriā vocari dixit, quæ veteribus *σικυα*. Neapolitani *cedrolo*, videturq; dictū à citrii forma, & colore: flauescit nanq; quū inaruerit. Admonent me doctorū virorum authoritates, ut de pepone dicā aliqua. Her-  
molaus pepones à cucumeribus distinguit. Ruellius pepones melones putat. L-  
dēq; Fuchsius. Lusitanus cucumerē vocat Neapolitanorū auguriā, & pepone  
satiūm cucumerem. Suorū peccatorum expiator Robertus Cōstantinus pe-  
pones melones vocat, atq; ex Palladio de peponum genere scribit, quum pe-  
ponis Palladius nusquam meminerit. Matthiolus in tantorum confusione,  
quid proferat, fatetur se nescire. Sed cur in re tam clara tantorum virorū ca-  
citas? Nostram sententiam doctioribus trutinandam exponemus. Pepo tam  
apud Græcos, quā Latinos à cucumere nil differt, nisi ætate, magnitudine, & fi-  
gura, recens enim tenellus natus, vel primū fructus rudimentū cucumis dici-  
tur, quia curuus, caro, cortex, & semē, quod tunc aqueū est, estur; media ætate,  
reiecto cortice, qui tūc amarus, in acetariis subministratur, in senectā verò, vel  
eius maturitate, colore flauus, mollis, magnusq; efficitur, non estur, sed pro se-  
minio hortis relinquitur, apud tamen plerasq; nationes iā maturus, reiectis in-  
testinis seminibus, quæ tunc lignosa sunt, editur, ut apud Græcos Galenus scri-  
bit: sed nostram opinionem authoritatibus comprobemus. Refert Athenæus  
pepones à Cratino vocari cucumeres seminarios. Pollux etiā *αμμουριὰς* vocat.  
Eius magnitudinem expressit Anaxilaus, qui dixit, Calcaneum magis tuetur,  
quā cucumis pepon. Eius molliciem Theopompus, Est mihi visa mollior,  
quā pepon. Homerus etiā à peponis mollicie Achæos peponas vocat.

*ἡ φανίας, καὶ ἡ ἐδδός, ἀχαΐδης, καὶ τ' ἀχαιῶν.*

Phanias item dicit edēdos esse cucumeres teneros, peponas verò sine semi-  
ne. Speusippus etiam cucurbitam peponem vocauit. Sed quid demoror? Ga-



lenus libro de alimentorum facultatibus hæc habet. Hæc vox  $\pi\acute{\iota}\pi\upsilon$  veluti  $\pi\acute{\iota}\pi\upsilon$   $\pi\acute{\iota}\pi\upsilon$  maturum significat, quod aliis quoque, qui maturescunt, conuenit, nam & racemus exactè maturus dici potest  $\pi\acute{\iota}\pi\upsilon$ , sed crudus, & immaturus non potest dici  $\pi\acute{\iota}\pi\upsilon$ . Melopepon verò, qui in se ipso  $\pi\acute{\iota}\pi\upsilon$  est, id est maturus. Malè igitur Medici quidam simplici nomine  $\pi\acute{\iota}\pi\upsilon$ , non totum  $\sigma\upsilon\lambda\upsilon\sigma\pi\acute{\iota}\pi\upsilon$ , id est maturum cucumerem dixere. Et paulo inferius. Differt pepon à melopepone, quia in peponibus homines à carne intima, in qua semen habetur, abstinere, in melopeponibus autem non abstinere. Apud Latinos Plinius id manifestat. Cucumeres quum magnitudine excessere, pepones vocantur. Hæc de pepone obiter pertransisse quid obest?

*Genera.*

Ex his cucumerum genus Theophrastus asserit, quod ex pluribus constat, & primum diuiditur in syluestre, & urbanum. Porro urbani, siue satiui tres differentia, Laconicum, Scythalicum, & Bœoticum. Plinius: sunt in Italia virides, & quamminimi, in prouinciis quammaximi, & citrini, aut nigri. Cucumerum tria genera, Laconicum, Scythalicum, Bœotium.

*Descriptio.*

De satiui hæc habet Theophrastus. Singulis fructibus singulos flores annexos gerit, quippe in postremo fructus flos insidet, & crescētibus fructibus flos huic infixus seruat. Flos triplex, qui in postremis sarmentis emergit, qui velut infertilis à reliquorum consortio, debet explodi. Breui innititur radice, particulatim floret, sibi ipsi superflorescens. Cucumis etsi præ humidus, frigidus quæ sit, attamen germinare ante feruentes dies, at perdurare atque perfici posse minimè valet: causa verò est debilitas: hæc enim tamen scandat viticulis prælongisq; serpat sarmentis, ut ramis, vitisque modo se diffundat, suæ tamen vitæ comes est frigiditas: itaque ante æstatem germinare non potest, sed ad autumnum vsque vitam prorogat. Amplexicaulis est, sed ob infirmitatem humi spargitur, ni propius adsit, cui caducus incumbat. Per extimam superficiem cucumeris amaritudinem sentimus, id quæ dum maturescere cœperit: nanque ab internis, tanquam intrinsecus editum excerni, tanquam alienum, expuiq; foras cōsentaneum est, ut falso in cinere. Parte ampliatæ superna, luxuriatq;: radice tamen hæret pusilla, contra quæ radice cōstant caput pitata, inferiora ampla, superiora tamen tenuia. Plinius, Cartilagine integitur, cortex huic vni maturitate transit in lignum. Particulatim floret, sibi ipsi superflorescens, & sicciore locos patitur, candida lanugine obductus, magisq; quum crescit. Addimus nos: Reprat multis viribus, & clauiculis, proxima quæque implicans, foliis hispidis, scabris, brioniæ similibus, sed maioribus, floribus liliaceis, ex luteo pallentibus, noctu conuiuentibus marcescentibusque, non semper fecundis, fructu tereti oblongo, semipedali, aspero, per longum canaliculato, ex obscuro virore in flauum maturescens. Sed quaerit Aristoteles, cur aliqua fructu vacent, quum florem habeant, ut cucumer, cucurbita, malus punica. an his fructus non deest, sed ipsa pro fructibus habentur, quibus flos insidet? fructus enim id est, quod florem gerit, cucumerem autem florem



florē inharere perspicuum est. Sylvestris cucumis à Theophrasto *σικωρ* *εγγυς* ita describitur. E sylvestris cucumeris semine medicamentum fit elaterium, serotino enim tum germine, tum flore. Nec succo, nec viribus cum urbano cōuenit. Sed penitus incomparabilis aspectus similitudinem gerit. Dioscorides ita describit: Cucumis sylvestris fructu solo distat à satiuo, quem longe minorem parit, oblongis glandibus adsimilem, folia atq; sarmentā satiui refert, radice candida magna: nascitur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totum amaro. Plinius, Cucumis sylvestris, siue asininus, infra magnitudinem satiui, ex eo fit medicamentum vocatum elaterium, succo expresso, & semine, cuius causa nisi maturius incidatur, semen exilit, oculorum etiam periculo. Columella ira eum suo hortulo describit,

— *At cucumis grauida qui nascitur alio*

*Hirtus, & ut coluber nodoso gramine tectus,*

*Ventre cubat flexo, semper collectus in orbem,*

*Noxius exacuit morbos aestatis iniquæ.*

*Fætidus hic succo, pingui quoq; semine farctus.*

Virgilius item,

— *Tortusq; per herbam*

*Cresceret in ventrem cucumis.*

20 Ex his descriptionibus quis cæcus videre non poterit sylvestrem cucumim referre satium, nisi quod hirsutior planta, minor fructus, retro nascens plantæ, serius maturescens? Vnde apud Theophrastum, Dioscoridem, & Plinium nostratē *citrealum*, veterum, & Latinorum cucumim, & Græcorum *σικωρ* esse.

Athenæus ex Dioclis opinione in Antiochia optimos nasci scripsit. Plinius: *Calum*. æquē hyemem odere cum cucurbita. Placent copiosissimi Africæ, grandissimi Mæsiæ.

30 Theophrastus ex cucumerum generibus Laconicum rigatum melius enasci, reliqua non rigata præstantiora fieri. Plinius ex eo: Ex his tantum Laconicum aqua gaudere. Amant rigua & fimum. Columella, Cucumis cum copia est aquæ, minorem curam desiderat, nam humore plurimum iuuatur. Cælo aperto, & humidis arenis magnitudine proficiunt, quales Apuliæ vidimus, & prouerbio fertur,

*Augetur veluti cucumis regione madente.*

40 Theophrastus ex tertia satione esse dixit, quæ æstiuæ sunt. Semen post sationem, quinto, sexto, aliqui dicunt septimo die emicat. Ex recenti semine celerius exit. Columella: Si sicco loco seri debuerint, quo rigationem ministrari non expediat, mense Februario sesquipedali altitudine sulci faciendi sunt, post idus deinde Martias, quasi tertia pars altitudinis sulci, stramentis inditis regenda, mox stercoreata terra vsq; in dimidium sulcum aggeranda, positisque seminibus tandiu est aqua præbenda, donec enascantur, atq; ubi conualescere



cœperint, adiecta humo incrementa eorum prosequenda sunt, donec sulcus coarquetur. Sic exculpta semina sine irrigatione tota astate satis valebunt, fructumq; iucundioris saporis, quàm rigua præbebunt. A quosis autē locis primo quoq; tempore, non tamen ante cal. Mart. semen ponendū est, vt deferri possit æquinoctio confecto. Sed custodiendum est, vt quam minime ad eum locum, in quo cucumis confitus est, mulier admittatur: nam ferè contactu eius languescunt incrementa virentium. Si verò in menstruis fuerit, visu quoq; suo nouellos fœtus necabit. Palladius seri iubet sulcis factis Martio mense, altitudine sesquipedali, latitudine pedum trium, inter sulcos septē pedum spacium crudum relinquant, vbi possit vagari: herbis iuuantur, ideo surculo, & rigatione non indigent. Secunda eius satio quinquatribus ferè obseruatur. Plinius, Seruntur semine in terra, sesquipedali fossura, inter æquinoctium vernū, & solstium. Parilibus tamē aptissimè. Aliqui malunt nonis, & per quinquatrus sere-re. Sed quinquatrus, vel quinquatrua festa vocabant antiqui, quæ quinq; diebus Mineræ fiebant, ita videri potest, quod quinq; diebus post idus Martii celebrabātur: nam dies post idus ater erat: inde quinquatria, quasi quinq; ab atro die. Sed quæ fierent his quinq; diebus, extat Ouidii carmen Fastorum tertio:

*Vna dies media est, & sunt sacra Minerva,  
Nomina quæ a iunctis quinq; diebus habent.  
Sanguine prima vacat, nec fas concurrere ferro:  
Causa, quòd est illo nata Minerva die.  
Altera, tresq; super strata celebrantur arena,  
Ensis exercitis bellica leta Dea est.*

Parilia verò aut palilia festa erant deæ pastorum, quæ Pales dicebatur, quæ fiebant vndecimo cal. Maii. Quærit Aristoteles in Problematis: Quam ob causam cucumeres cognomento pepones optimi palustribus planis, id est, humidis fieri soleant, vt apud Orchomenum, & in Aegypto. Aquarum enim vberem terram esse Aegyptum putamus, cur ergo cucumeres, qui humidi sunt, & ob id hortenses ac rigui minimè laudati, locis palustribus, quæ madida sunt, egregiè fiant? Vtrum quòd ob terræ duritiam aliū coguntur descendere? solum nanq; limosum, ac planum maximè indurascit, qui autem altius innituntur, meliores euadunt: an quod terram siccam esse oporteat? quoniam cucumeres natura humidi sunt, ita enim sequetur, vt per retractum in medium veniant, palustris verò si plana, altaq; sit, alimentum nec exiguum præbet propter soli altitudinem, locumque ipsum, neque nimium, quoniam solum resiccari necesse est.

*Calvus.*

Scribit Theophrastus esse, qui cœlestes aquas cucumeribus prodesse negent, eosdemque pulueratione, lassari. Megarenses enim peponibus cucumeribus, quum venti anniuersarii perflant, puluerem sacculo excitant, atque ita dulciores, melioresque reddunt absque rigatione. Hoc igitur concessum indubie habetur. Libroque de causis reddens rationem ait, cucum-



res puluere occultari, nutrirī, tenerioresque reddi creduntur, quam obrem Megarenſes ita eos tractare conſueuerunt. Sed mirum videtur, quod pulvis qui tam ſiccus eſt, alere queat: ratio tamen eſſe in pluribus poſſit, nam & quia citata humo, vaporati cuiuſdam aëris alimentum reddatur, vt de ſolo vaporoso retulimus, & quia fructus loricatus puluere, defendatur à ſolis feruore, & quia leuiter, molliterque ſiccus, amplius à vite pabulum attrahere poſſit, quippe hæc omnia tum ad copiam alimenti, tum ad facultatem coquendi nimirum adiuuant, quapropter ſolis quoque integere ſolent, quum igitur tegmine & aqua quoad ſatis ſit potiantur, lati, tenerique, vt debent, redduntur. Plinius: Natura oleum odere mirè, nec minus aquas diligunt, deſecti quoque, ad eas modicè diſtantes adrepunt, contrà oleum refugiant: aut ſi quid obest, vel ſi pendeant, curuantur, idque vel vna nocte deprehenditur, ſi vas cum aqua ſubiiciatur, à quatuor digitorum interuallo deſcendentibus ante poſterum diem, aut ſi oleum eodem modo ſit, in hamos curuatis. Nos ſuppoſitis aquis longum, & magnum cucumerem comparauimus. Quintili hi ita eos aquarum auidos eſſe ſcribunt, vt ſi quis longos fieri concupierit, vas aquæ plenum ſubiiciat, & ante poſterum diem à quatuor digitorum interuallo deſcendit, at ſi deficient aquæ retrocedunt, vt in hamos plicentur: ita gaudent humiditate, horrent ſiccitatem. Palladius, Longi & teneri ſunt, ſi aquam in patenti vaſculo ſub eis ponas duobus palmis inferiorem, ad quam feſtinando tales efficiuntur. Oleum ſic metuit, vt ſi iuxta poſueris, velut hamos plicentur.

Præcoquem cucumerem habere docet Theophrastus, ſi quis hiberno Arſi. tempore cucumeris ſemina ſerat in calathis, rigerque aqua tepida, & ſoli exponat, & igni admoueat, ac vbi ſationis tempus aduenit, caniſtros terræ mandet, ſic longè horum fructus alios præuenient. Alibi, Cucumeris ſemen nonnulli, vt celerius exeat, lacte cum aqua præmaceratam ſerunt. Docet & alibi aliam rationem, qua poſſint præcoces fieri. Cucumerum radices, adhibita cura diu viuere poſſunt, ſi quis ſarmentum præciſerit, ſecundum ſoli ſuperficiem, poſtquam fructum tulerit, terra radicibus ſuperiniecta, ruſusque ab radicibus eiſdem ſequenti anno ſerent fructus valdè purpureos, anteuertentes ordinarium prouentum aliorum, qui verno ſatu parati erunt. Quintili diligenter: In cophinos aut inutilia fictilia terram cribratā mittes, ſtercore ammiſto liquidiorē factam, & anticipato tempore, vere videlicet inchoante, ſemine implantabis, & quum ſol fuerit, & calor, & moderata pluvia, cophinos ſub dio expones, circaque ſolis occaſus eos in domum conſectam inferes, atque hoc affiduè facies, aquam irrorabis, quando uſus poſtulauerit. Poſtquam verò ceſſabunt frigora, & glacies, cophinos, ſiue doſia in locum ſubactum, & ex cultum deportatos defodies, ita vt labra æqualia ſint terræ, & deinde reliquam curam adhibebis. Si verò abſtuleris eorum virgula, citius fructus producent. Hæc Græci. Latini verò, vt Columella: Conſecta bruma ſter-



coratam terram inditam cophinis obserat, modicumq; præbeat humorem,  
 dein quum enata fuerint semina, tepidis diebus, & intolatis iuxta ædificium  
 sub dio ponat, ita vt ab omni efflatu protegantur. Caterū frigoribus, ac tem-  
 pestatibus sub rectum referat, idq; tandiu faciat, dum æquinoctium vernum  
 conficiatur, postea totum cophinum dimittat in terram: sic enim præcoquem  
 fructum habebit. Possunt etiam si sit operæ pretium, vasis maioribus rotulæ  
 subiici, quo minori labore producantur, & rursus in recta recipiantur. Sed ni-  
 hilominus integri debebunt, vt etiam frigoribus serenis diebus tuto produ-  
 cantur ad solem. Hac ratione ferè toto anno Tiberio Casari cucumis præbe-  
 batur. Plinius: Cucumis mira Voluptate Tiberio Principi expetitus, nullo 10  
 quippe non die contigit ei, pensiles eorum hortos promouentibus in solem  
 rotis holitoribus: rursusq; hybernis diebus intra specularium munimenta re-  
 uocantibus. Id etiam leuiori opere fieri apud Ægyptiæ gentis Dulum Mende-  
 sium legit Columella, qui præcipit aprico, & stercoreoso loco alternis ordini-  
 bus ferulas, alternis rubos in hortis consitas habere, deinde eas confecto æ-  
 quinoctio paululum infra terram secare, & ligneo stylo laxatis vel rubi, vel fe-  
 rulæ medullis stercus immittere, atq; ita semina cucumeris inserere, quæ sci-  
 licet incremento suo cocant rubis, & ferulis: nam ita non sua, sed quasi ma-  
 terna radice aluntur, sicq; insitam stirpem frigoribus quoq; cucumeris præ-  
 bere fructum. Palladius à Columella excipiens ait. Aprico loco & stercoreoso 15  
 si rubos habemus, aut ferulas, post autumnii æquinoctium his iuxta terram  
 recisis, & excauatis ligneo stylo inter medullas lætamen immittamus, & cu-  
 cumeris semen addamus, hinc nasci fructus, qui possint & inter frigora nō ne-  
 cari. Plinius etiam: Columella suum tradit commentum, vt toto anno con-  
 ringant. Fruticem rubi quàm vastissimum in apricum locum transferre, & re-  
 cidere duum digitorum relicta stirpe, circa vernum æquinoctium, ita in me-  
 dulla rubi semine cucumeris insito, terra minuta, fimoq; circumaggetatas re-  
 sistere frigori radices. Sed quum Columella id fieri circa æquinoctium doceat,  
 quod ex alterutro fuerit, non explicat. Palladius recidendum rubum post au-  
 tumni æquinoctium dicit, Plinius circa vernum, inter Plinium & Palladium 30  
 parum conuenit, sed Plinium errasse potius quàm Palladium ratio docet.  
 Quippe Columellæ videtur circa æquinoctium autumnii id agendum, vt Pal-  
 ladius scripsit: nam ab autumno frigora sequuntur, confecto verò verno æ-  
 quinoctio non amplius à frigoribus vindicari desiderant: nec enim tunc sati  
 cucumeres hyeme præbebunt fœtus, sed potius æstate. Vt virides item ser-  
 uentur in planta, fit, vt quum adoleuerint, in puteum, prope quem sati  
 fuerint, demittantur, atq; puteus operiatur: sic enim sol affluens haud quic-  
 quam siccare potest, & aquæ subditæ vapor ascendens facit vt nullam sentiat  
 siccitatem, sed quasi recenti habitu vireant, ex Theophrasto. Quærit Aristot-  
 eles in problematis, cur si quis cucurbitas aut cucumeres apud puteum sitos 40  
 in ipsum demiserit puteum, beneq; operuerit, tempestiuos & virides per to-  
 tum



rum annum seruabit. An quod vapor aquæ refrigerans efficit, ne assiccentur, seruatque vitides, & vegetiores, & obturatio illa, & spiritus satis alere possunt, quæ iam in plenum creuerunt, permanendi verò facultas propterea datur, quod relictis radicibus suppetit alimentum: nam si quis quum fructificauerit, detractis sarmentis præcisâque planta, terram aggerarit, conculcaritque circum radices, cucumeres faciet præcoques, utpote quum radix valeat conseruari: haud enim cucumer annuam lentit naturam, sed viuere ulterius potest: ferent autem isti fructus maturius, quàm qui semine prodierunt: quoniam radix bona pars scilicet operis præcondita iam naturæ  
10 habetur, quod illis seminatis prius confici necesse est: terræ autem aggeratio, & constipatio teporem inducit, quo radix & seruari, & germen mittere celerius queat. Vnde etiam fit, ut si quis per hyemem cucumeris semen, in quallis situm, aqua irriget tepida, & modo soli exponat, modo collocet apud ignem, præcoques admodum cucumeres faciat, si tempore congruo id ipsum cum quallis in terram dimittet. Ut magni fiant, & molles cucumeres, iubet Theophrastus paruos abscondi, sic enim pars nulla alimenti à sole detrahitur, nec flatibus resiccantur, quibus causis moles augeri non possunt. Aristoteles problematum libro quærit, Cur si quis cucumeres aut cucurbitas protinus paruas condiderit in terram, maiores multo efficiet? An  
20 quia spiritus, & sol exiccando incrementum impediunt, molemq; tum minorem, tum crispiorē reddunt, quemadmodum & arbores, quæ loca vento, solique exposita tenent, quæque in cauis manent, & riguis: alteræ enim magnæ, fungosæque fiunt, alteræ parvæ & spissæ. ast verò in terra occulta, quoniam contra afficiuntur, contra euadant necesse est. Quin ea, quæ vasis includimus, ut cucumeres in ferulis cauis, aut regulis, & mala punica, aut quæuis mala in ollis, ampla redduntur, & fungosa: contra quæ detecta sunt, parua solidaque augescunt nullo ambiente operculo, quod alimoniam faciat largiorem, id etiam obiectum facit, ne pabulum aut euanescat, aut arescat. Cucumeres magnos facies, Quintilius docent, si eorum semen in caput plantabis. Sed si sub ipsis vas aquæ plenum obruatur, & in eo radices absconderis, & dulciores, & maiores fieri nouimus. Cucumeres formam accipient loci, in quo siti fuerint. cuius rationem libro de causis narrat Theophrastus. illi quoque respondent, qui in ferula, vel tubo fictili includuntur, plus enim alimentum præberetur, quoniam nulla pars exhalatur, nec exiccatur, crescunt verò in longitudinem, & quia nutrimentum facilius recto tramite fluit, & quia nil est, quod auocet, aduerseturque. Quod etiam ab Hippocrate narratur in libro de seminis genitalis natura. Ait si quis cucumim, cucurbitamque iam deflorescentem, matrisque pediculo adhaerentem in paruo vasculo mittat, cauo vasi illi par, similisve reciditur, si verò quis eundem in maiore vasculo mittat, quod probè cucumim, cucurbitamve capiat (quod tamen maius, quàm cucumis natura non sit) cucumis par, si-



milisq; cauo huius vasis erit, nam quum crescit cauo illius vasis hæret & inni-  
 ritur. Quintilii: Transfigurabuntur in quam velis figuram, si testacea fece-  
 ris vasa, eaque paruis adhuc circumposueris, & obligaueris, formas enim &  
 characteres implebunt, quare & arundine in longum secta, excauataque &  
 composita, & coarctata, si in eam cucumerem, aut cucurbitam, dum adhuc  
 parua est, immiseris, augescens per omnem longitudinem, arundinem exple-  
 bit. Palladius: Si quis eius flores, sicut in sua vite est, in forma fictili clauferit,  
 ac ligauerit, qualem vultum forma, vel hominis, vel animalis, talem cucumis  
 figuram præstabit. Aliqui florem cucumeris cum viticulæ suæ capite cannis in-  
 ferunt, quibus prius omnes nodos perforauerint, ibi cucumis nascetur in ni- 10.  
 miam longitudinem tensus. Crescunt qua coguntur forma: iidem in fistula  
 flore demisso, mira longitudine crescunt. Nos cucumeris florem cum viticulæ  
 suæ capitulo arundini, cui nodos articulorum omnes perforauimus, inserui-  
 mus, & ibi cucumis natus est, qui in magnam longitudinem protendebatur,  
 namq; quod latitudini per teretem cannæ angustiam demitur, secum paria fa-  
 ciens, longitudine repræsentabit. Sic florem sicut in sua vite erat, in fictili for-  
 ma, quæ hominis vultum exprimebat, clausimus, talem cucumis figuram præ-  
 tulit, tam nouæ formæ audus est, vt vasis, cui indideris, æmula facie repræsen-  
 tet effigiem. Quin & saporum differentiam quandam semina capiunt, si prius  
 macerata & præparata lacte, vel mellicrato serantur, vt cucumis, ex Theophras- 20.  
 to: cuius rationem assignat, libro de causis, mutationem à radice provenire.  
 Sunt enim radices arborum elementa, elementorum conditionem omnibus  
 sectari necesse est. Addo etiam alimentum coctius à radicibus accipi, muta-  
 risq; ipsis fieri, vt tota arbor mutetur: ab his enim omne alimentum transmit-  
 titur, dispensaturq; ita vt aquæ copia, & solum & cultura radices primum at-  
 tingant, atq; hinc initio principio, cætera subinde mutantur. Columella: Cu-  
 cumis tener, & iucundissimus fit, si antequam seras, semen eius lacte maceres.  
 Nonnulli etiā, quo dulcior existat, aqua multa idem faciunt. Palladius: Semi-  
 na si ouillo lacte, & mulso maceres, dulces nascuntur, & candidi Plinius: Quin  
 lacte & mulso semine eorum biduo macerato. Apud antiquos Græciæ autho- 30.  
 res scriptum est seri oportere, vt dulciores fiant. Non habebunt semina cucu-  
 meres hoc modo, vt Quintilii docent: Sarmentum, aut virgultum primum  
 mox vbi increuerit, in terrā defodito, quemadmodum vitis sarmenta solent,  
 vt summa pars tantum virgulti emineat, & postquam auctum fuerit, rursus i-  
 dem, iterum ac tertio defodito, & exortus iuxta medium, & super terram ex-  
 tantes secato, solumque postremum, tertium videlicet relinquito, & habebis  
 cucumeres semine carentes. Similiter sine semine eadem facies, si triduo ante-  
 quam semines semē ipsum oleo sesamino maceraueris. Sine semine nasci Pal-  
 ladius pollicetur, si prius eorum semina oleo sabino perungantur, & herba ea,  
 quæ culix dicitur trita confricetur. Plinius: Sunt qui herba, quæ vocatur cu- 40.  
 lix nomine, trita, semen eorum maceratum seri iubeant, vt sine semine na-  
 scan tur.



ſcantur. Sed herbam hanc culicem, vtrum Theophrastus vocet canopa, veretur Herimolaus, quoniam & cynopa scriptum est. Theodorus canis oculum, & caninum conuertit, quasi cynopa non canopa probarit. Oluſ est Theophrasto, primis post æquinoctium imbribus germinās, & inter ſpicatas herbas apponit. Ruellius conyzam vertit. In aquoſos cucumeres habebis, ſi vbi ſcrobē foderis, in quem cucumeres plātaturus es, dimidium altitudinis eius paleis aut ſarmentis expleueris, & aggeſta terra plantaueris, & rigaueris. Qui etiam alui deiectionem cibo moliri volunt, radices agreſtis cucumeris in aqua potabili per triduum macerant, & diebus quinque plantulas huius liquoris hauſtu ſariant. longeque magis ventrem purgatione ſollicitabunt, qui dum radices ſua germina fundunt, ablaqueatis tenuibus ſibris ellebori potionem adiiciunt, deinde exaggerata terra creſcere patiuntur, ex Quintiliis.

Quintilii: Cucumeres in vini albi feces dulces, & non peruerſas immittes, *Cōditura.* expletum vas oblines, manebuntque recentes. Aſſeruantur etiam & in muria. Seruabis etiam in vigore, ſi vas aceti parum habens ſuſpēderis, ita vt acetū non contringāt, & vas obleueris, vt nō reſpiret. Hoc modo etiā hyeme recentes habebis: Seruātur in muria, vſque ad alios fere prouētus, & virides quoque in fabulo locis opacis, ſceno ſiccō operiēte. Plinius: Salgamarii aceto, ſale, & ſcœniculo, & ſampſuco cōdiunt. Alii trita ſinapi cū aceto: ſed & ſcrobe, opaco in loco, arena ſubſtrato, ſcenoque ſiccō opertos, ac deinde terra, virides ſeruari tradunt.

Quintilii: Non lædentur à pulicibus, ſi origani ramulos, paruis adhuc exiſtentibus, his propè deſixeris, nam & præſentes pulices perdunt, & alios naſci non permittunt. Si ſemina cucumerum ſemperuiui ſucco herbæ rigabis, illæſa permanebunt, ex Florentino. *Inſect. remedia.*

#### De altera cucumis ſpecie. CAP. LXVIII.

**N**UNC ad aliam cucumeris ſpeciem deueniemus, quum admodum à prioris forma diſter.

Videtur draconias Græcis dictus. Refert enim Athenæus Eudemum libro *Nomen.* de oleribus inter cucumerum ſpecies illius meminiffe, ſi de angineo ſive ſylueſtri cucumere non intelligit. Mihi Græcis, & Latinis indiſtus videtur. Neapolitani vulgò *anguria* vocant, deſlexo ab angue nomine, quum intortus ad anguis formam creſcat.

Serpit longis, & viticulosis ſarmentis, folio cucumeris plantæ rotundiori, *Deſcriptio.* pallidiori; minus hirsuto, tempeſtinus fructuat. Iunii principio, floribus luteis, fructu oblongo, duorum cubitorum longitudine, craſſitudine hominis cruris, obtorto, obuoluti anguis figuram imitatur, foris ſtriato, lanuginoſo, & nigro, herbidoque nitore, cute tenui. Putat Matthiolus *anguriam* hanc noſtrā cucumim eſſe ſatium, in hanc formam arriſ mangonio reductum, quippe cucumi in arundinem immiſſo totam explere, & inde ſemina ſata genus eſſe ciſſe. Sed id tam euidenter falſum, vt reſelli non mereatur, tum quod



aliis in locis à nobis probatum est, quòd neglecta in suam naturam commeat, tum quod folio, fructu, magnitudine, colore, ac pariendi tempore longè ab illo distat.

*Cœl. sol.* Cœlum, & solum, ut cucumis, quærît. Nos in Apulia vidimus, tam vastæ magnitudinis, ut duos vix asellus ferret.

*Satio.* Seritur semine Martio in sulcis: qui in ualidi nascuntur, extirpantur: distet alter ab altero oportet passus longitudine. Sed cucumis sesquipedalis, planta enim huius latius euagatur, & maius accipit incrementum, ubi effloruit, cymas incidunt iuxta flores: nam nouæ, & meliores regenerantur, maioraque fructus accipiunt incrementa.

10

*De melone.* CAP. LXIX.

**I**N cucumerario genere sunt etiam melones, siue melopepones, fructus veteribus Græcis, & Latinis incognitus, à Galeni, & Plinii ætate, qui ferè contemporanei, nobis id genus irrepfit. Lusitani Regis Laburniæ inter alia meridianæ illius nauigationis miracula, melones in Æthiopia nobilissimos haberi prædicant, quorum odore elephantes sagacissimi olfactus, animalia de longinquo sentiant, aduolantesque cucumeraria tota depopulatur & prote-runt. Galenus eorum cibum minus improbat, quàm cucumerum, ut minus humidi nec tam parui succi.

*Nomen.* Galenus *μηλοπίπωνας* vocat. Florentinus Græcus eodem modo. Latine, ut *Palladius*, melones vocarunt, quasi *μήλωνας*, id est, pomeos, à malorum figura. Plinius melopeponas vocat, composito ex malo & pepone nomine, quum formam & effigiem mali rotundi referat, & genere & substantia cucumeres, vel maturos pepones. Neapoli *meloni d'acqua*, & *meloni rossi*, aut *meloni di pane*.

*Descriptio.* Plinii tempore in nostra Campania repertum fuit, ut ex eius verbis, quæ subiiciam, patebit. Inquit enim: Ecce quum maximè noua forma in Campania prouenit mali cotonei effigie: forrè primo natum, ut audio, vnum, mox semine ex illo genus factum: melopeponas vocant, non pendent hi, sed humi rotundantur, mirum in his, præter figuram, coloremque, & odorem, quod maturitatem adepti, quamquam non pendent, statim à pediculo recedunt. Nostrum verò *melone de pane* describemus. Vite serpit prælonga, flagellis vltro, citroque reptantibus, frondibus ferè vitigineis, sed minoribus incuturis, scabris hirsutisque, floribus luteis, particularim floret, ut faba, fructu cartilagineo, humani capitis instar, ac longè maiori, orbicularim striato, prominulis puluinorum toris, strigilibus in vertice pomi, & umbilico coeuntibus, ibidemque stellatim decussatis, cute aspera, veluti tuberculis occupata, carne fulua, sapore mellito, vel saccharato, seminibus in vtero lirarim digestis, copiosis, oblongis, flauis, putamine vel si maior corio obductis, intus dulcis nucleus. Melones verò aquei circinata pomi rotunditate, magnitudine, ut vix  
brachiis



brachiis complecti possis, non tamen torulis sulcata, sapore magis peponem, quàm antedicti melonis melleam dulcedinem referente, sed succo saccharato, cortice coloris herbacei, carne alba, friabili dulcissimaque.

In duo potissimum genera diuidemus. Vnum, quod *melon di pane* diximus, *Genus.* alterum quod *melone di aqua*, vel *saracenicum* dicimus. Primum genus in multa & penè infinita diuiditur, color nanq; aliis herbaceus, pallidus, rufus, flauus, albus, cinereus, aliis cutis læuis, aliis textura quadam reticulari, magno Naturæ ingenio prouenit. Pulpa etiam versicolor, aliis alba, aliis rufa, aliis ex albo rufescens, vel herbacea. Aliis dura, aliis friabilis, aliud moschi odorem spirat. Est  
 10 & aliud genus, quod in sua terra non maturefcit, sed laquearibus suspensum, figura ouali & oblonga, hyeme magna cū voluptate comeditur. Alterum genus *saracenicum* dictum, multis etiam scater generibus: nam est & quod succo scatet sanguineo, aliud semine albo, aliud nigro, est quod dulcedinem gustui tantam repræsentat, vt saccharinos vocitant, aliud moschi odorem halat, est etiam quod hyeme suspensum maturatur, & estur.

Cælum poscunt, quale ci cumeribus destinauimus, scilicet calidū, vel tem- *Cælum.* peratum. Locis frigidis meridiei obterantur.

Seritur, ex Palladio, locis subactis, vel pastinatis, maximè arenis. Solum mi- *Solum.* nus pingue & stercoratum, quale cucumeribus dedimus, arboribus nudū, gaudet enim libertate, qua possit vltro citroque vagari. Fimo corrumpitur odor, & sapor, & citius maturefcunt: vt sapidiore nascantur, oportet esse nouale solum, & viribus refertum, quales nobis ex Siliceo ponte in Campania dicto deferuntur, prope Auerfam. In Apuliæ Barulo humidis arenis maximi nascuntur, sed insipidi.

Palladius Martio mēse melones serendos docet. Distēt inter se semina duo- *Satio.* bus pedibus. Seruntur etiam Aprili. Serenda semina ex iis fructibus capiātur, qui potius integri, quàm qui maturitate aperiuntur, corticemq; habent durū, firmum. Semina sint graua, & quæ aquis iniecta, sidant, quæ superfluitant, reiciantur vt inania. Sint recentiora quæ haberi possunt, ea que fructus parte tollantur, quæ heret pediculo. Rigare oportet, vbi pluuiæ deficiēt, sed quando fructus concoqui cœperit, his pluuiæ aduersissimæ sunt: nam ignaui, & insipidi nascuntur. Mirum quòd ex eadem planta perpauci optimi præstant.

Florentinus Græcus: Rosarum fragrantiam spirare facies, si ipsorum semen *Art.* cum aridis rosis deposueris, & mista plantabis. Palladius: Odorati autem fiunt, si eorū semina multis diebus inter rosæ folia sicca sepeliantur. Vt moschi odore spirent, seminibus ex ea parte, qua germinant, apertis, & rosacea stillatitia aqua maceratis, quæ moschi odorem exceperit, pangantur. Fructus dulces efficiet, si ipsorum semen lacte, & melle maceraueris. Semina eius mulso & lacte per triduum maceranda sunt, & tunc iam siccata ponenda: hinc suaves efficiuntur ex Palladio. Vt præcoques melones habeas, super calidi fimi aggeres  
 40 paululum terræ indas, quando è stabulis extrahuntur, in ea terræ parte plan-



tentur semina, quæ fimi caliditate cito nascentur, ea à rore noctu cadente detendas, vbi cadere desierit, transplantentur eodem fimo, & terra, vbi coaluerunt, & citius nascentur. Fiunt & arte melones, vt supra de cucumeribus diximus, quorum semina corio vacant, vt sine labore, & impedimento corticum mandi possint sapidissimè. Hoc genus Neapoli visitur, exoptaturque ad condituram saccharinam. Fiunt & melones, qui in vtero alterum gestent, eodem pediculo dependentem. Fiunt & melones, qui eodem modo cucumeres habent. Faciendi modum in arborum fructibus docuimus.

*De cucurbita.* CAP. LXIX.

**C**UCURBITA etiam cucumerum generi tribuitur. Iacent, crescuntque eadem & pendent, quamuis grauioribus etiam iis, quæ in arboribus gignantur, ex Plinio. Cucurbitarum numerosior vsus, & primus caulis in cibo, cortex viriditener: deraditur nihilominus in cibo. Cibus salubres, ac leues pluribus modis existimant, qui perfici humano ventre non queant, sed non intumescant: cibus quo longiores, tenerioresque, cogratioribus, & ob id salubriores, quæ pendendo creuere, minimumque seminis tales habent, duritia eius in cibus gratiam terminante. Galenus. Cruda insuavis, stomachoque perniciofa, quapropter elixa, sarragine frixa, tollave vescitur, & saporis expers, ideo multos parandi modos asciscit. Sinapis acrimonia, aut salimento aliquo conditur, quorum sibi facile conditionem recipit, & nullo sapore imbuta inter assandum magnam humoris aquosi vim remittit. Non diu persistit in aluo, quod lubricos & parum tenaces efficiat meatus, quibus delapsa facile euadit.

*Nomen.*

Theophrastus *κολοκύνθη*, & *κολοκύνθη*, vt etiam Dioscorides Atticè *κολοκύνθη*. Vocabulumque Græci ex aduerto posuere, quod scilicet et pumili, & breues sint partus, quum ipsa corporis mole omnes herbarum, arborumve fructus videatur superare. Megalopolitani *σικνώνη* dicunt, authore Athenæo, & Hellspondii rotundas *κολοκύνθας*, longas verò *σικνῆς*. Latini cucurbitam à concurua tu haud dubie dixerunt, quod facile, si quid obstitit, quo minus extendatur, concuruescant. ex Varrone. Itali *Zucca*. Neapolitani *Cocuzza*.

*Genera.*

Theophrastus alios esse, qui dicant cucurbitæ genera non esse, alios qui dicant esse scribit, sed in vno eodemque genere, alias meliores, alias deteriores affirmat. Sed primum in satiuam, & syluestrem partiemur. In satiuis duo alia prima genera, Plinio camerarium, & plebeium. Camerarium tenui pediculo, libratur pondus immobile auræ, plebeium verò, quod humi repit. In his sunt vernacula, peregrinaque. Vernacula prima ventrosa est, & rotunda, quæ in ventrem crescit, mira amplitudine turgescens, altera ab obliquo fructu, longam dicimus, & libertate pensili concessa, visa Plinio nouem pedum longitudinis. Est & sessilis pyri forma turbinata, cuius venter in orbem collectus potest



test lagenaria dici, quod sæpius lagenæ officio fungatur. Columella Alexādrinas vocat, ad vsum vasorum idoneas. Plinius: Nuper in balnearum vsum venire vrceorum vice: iam pridem verò etiam cadorum ad vina condenda. Sunt ex peregrinis maioribus nostris indicæ, tanta naturæ varietate, quasi ad sui variationem ludentis, Turcicæ dictæ, subrotundæ, parvæ, & veluti anguina veneratione pluribus in locis per plagulas interlitæ, carne firmiore, pulpaque in qua semina, vt phaseolorum, rubicundissima. Sunt Indicæ. Eudemus Atheniensis libro de cibis, cucurbitam Indicam vocauit, quod eius semen ex India primùm allatum fuerit, ex Athenæo. Est & Neapoli nuper allatum genus vnum cucurbitarum, specie ouata flauum, quarum medullæ pulpæque post corticem in vermiculos, vel funiculorum speciem efformatur, vt funis capite arrepto ferè tota dissoluatur, non paruo naturæ miraculo, nec minus gratioris gustus, quàm formæ gratia exoptantur. Syluestris est duplex, *κολοκύνθις*, quæ folia sarmentæve satiui cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglobarum, vehementer amarum, ex Dioscoride. Hippocrates eam *σικυάνην*, Galenus *σικυωρίαν*, & *κολοκύνθην αγγέλιον*. Altera *σικυωρίς* Græcis dicta ob inanitatem, digitalis crassitudinis: non nisi in saxosis nascens. ex Plinio.

Theophrastus breui radice inniti dixit, & si superna parte ampliatur, luxurieturque. In olærum genere incommutabilis manet. Plinius reptantibus flagellis, scandentes parietum aspera in tectum vsque, natura sublimitatis auida. Vires sine adminiculo standi non sunt, velocitas pernix, leui vmbra cameras & pergulas operiens. Addimus nos: Folio amplo personatæ haud dissimili, flagellis, & viticulis cum cucumere conuenit, caduca sui sorte humi serpit, & nisi sit frutice vicino, perinde quasi adminiculo fultra, fertur per terram, quum verò datur facultas erigendi, in altum se extollit, peculiaribus viticulis, & clauiculis quicquid adepta est, complectitur, & lapsu erratico, & multiplici intricans irretit, flore albo, fructu coloris primùm herbacei, paulo pòst flauo, qui vel in pyri formam turbinatur, aut in longum porrigitur, aut in orbem collectus intumescit, aut breui crassamento cogitur.

Æquè ac cucumeres hyemem odit. Plinius. Apud Athenæum Diocles optimas nasci cucurbitas apud Magnesiā dixit. Calido cælo & loco meridiei opposito latius assurgunt, vel saltem temperato.

Solum pingue cucurbitis Palladius tribuit, stercoreatum, & humidum. Sed sine aquis fructum iucundioris saporis præbere dixit Columella.

Theophrastus ex tertia sementi esse dicit, quam æstiuam appellat: Et mensē Martio fit. Quinto, sexto, vel vt alii volunt septimo à satione emicat die, ex rectiori semine celerius: nam eius semen infirmum, vt cætera æstiuæ. Columella: Cucurbitæ copiam aquæ nactæ, minorem curam desiderant: primo quæque tempore, non tamen ante kalendas Martias semen ponendum est, vt



**I**NTER carilaginea referemus & fungos, nec nisi supra terram totus est. Diocles Caristius inter rusticas dapes recenset, Athenæus. Nunc autem sua iucunditate tam moroso diuitum palato placent, ut eos in mortis discrimina sæpius adducant. Euripides, quum in Icarum insulam adnavigasset, matremq; cum duobus filiis, & virgine fungorum esu mortuos vidisset, hoc epigramma fecisse dicitur apud Athenæum.

*Sol qui perpetuo cælorum tramite curris,*

*An visum facinus huic simile ante tibi est?*

*Parseadem lucis geminos cum virgine fratres*

*Abstulit, & matrem: quatuor urna tegit.*

Libuit Plinio coquendi dare aliquas communes in omni eorum genere observationes, quando ipsæ suis manibus deliciae præparant hunc cibum solum, & cogitatione ante pascuntur, succineis nouaculis, aut argenteo apparatus committæ. Noxii erunt fungi, qui in coquendo duriores fiunt, innocentiores, qui nitro addito coquentur, si utrique percoquantur. Tutiores fiunt cum carne coctâ, aut cum pediculo pyri, prosunt & pyra confestim sumpta. Debellat eos & aceti natura, contraria iis. Diphilus Medicus iis, qui hoc cibo stragulantur, remedio esse dicit aquam mulsum, nitri, & aceti potum, ita ut in vomitione reddatur itaq; parari debet ex acero, aqua mulsa, vel melle, & sale, ex Athenæo. Apitius de fungorum apparatus hæc habet: Fungi farnei elixi, calidi exiccati in garo cum pipere excipiuntur, ita ut piper cum liquamine feratur. Aliter: In fungis farneis, piper, carenum, acetum, & oleum laudantur. Vel fungi farnei elixi ex sale, oleo, mero, & corianno conciso inferuntur. Fungos boletos, carenum, fasciculum corianni viridis ubi ferbuerint, exempto fasciculo inferes. Vel boletorum coliculos, liquamine, vel sale aspersos inferunt: vel boletorum thyrsos concisos in patellâ, ovaq; perfundes addito pipere ligustico, modico melle, & liquamine, temperabis oleo modico. Platina coquendi rationes aliquas affert. Cum succosa illa thyrsi parte, qua terra inheret, in aqua primum cum excavato pane, cumq; pyris, aut pyrorum furculis, ac pediculis coquendi sunt. Allium quidam induunt, quod ob stare venenis putatur. Elixiae saliti in oleo aut liquamine friguntur, fricti moreto viridi, quod salsam vocant, aut alliato suffunduntur. Sunt etiam qui eos ablata pello, aut superiori folliculo, indito sale, atque oleo sursum versum in carbonibus decoquant, pipereque aut cinnamomo aspersos deuorent.

*Nomen.*

Græci *μύκητις* ab ensis capulo, vel summo vertice vaginam occludere, appellarunt. Significat *μύκητις* ensis manubrium, sicuti ex Herodoto liquet, unde & Mycenæ nuncupari credunt, quod ibi à Perseo sint conditæ Mercurii præcepto, ubi excidit gladii manubrium. Poetæ *χρηστὴς* vocant, hoc est terra natos: nam quorum pater ignotus est, filios terræ vocare solent. Quod Cicero ad Atticum in epistola confirmat. Porphyrius *θεοτόκος* deorum filios, quod sine semine provenire videantur. Latini fungos vocant, nomenq; (aliquorum opinione) à funere deducitur, quod suo veneno ad funus vefcentes duant. Italis *fonghi*.

Nunc



Nunc genus, suis verò particulatim tractationibus species subscribemus. *Descriptio.*  
Theophrastus cortice, medulla, nervo, & vena carere dixit, ac radice penitus.  
Sed Athenæus, Theophrasti testimonio fretus, leui cortice esse dicit, sine radi-  
ce, sed principium habere suæ pullulationis caulem in longitudinem proten-  
sum, atq; per ipsum vimen se extrudere. Phantias verò: neq; florem, neq; seminū  
vestigia demonstrare. Quod falsum esse iā alibi diximus, quippe semen afferunt.

*Genera.*

Fungorum perniciosa natura. Nos paucis genera perstringemus. Fungorum  
genus, vel naturæ, vel artis opus. Sunt enim agitari ex industria, ut dicemus.  
Naturalium duplex discrimen, Dioscori se auctore. Ait enim. Qui mandūtur,  
aliquādo perniciales sunt. Letales multifariam virus contrahunt, vel ubi clauus  
ferreus, in quo sit rubigo, vel ubi putridi pāni, vel serpentū latibula, & caua, vel  
si iuxta arbores erūpunt, qui noxios priuatim patiunt fungos. Omnibusq; iis  
colluvies quædā inūdet, & spuma, iudēq; à carptu celeriter cōputrescunt, atq;  
marcore viciantur. Plinius à Dioscoride, & aliis excipiendo hæc habet: Perni-  
cialia prorsus improbanda: Si enim caligatis clauus ferri, & aliqua rubigo, aut  
panni marcor adfuerit nascenti, omnē illicō succū alienum, saporeq; in vene-  
num cōcoquit, deprehenditq; nisi agrestes possunt, atq; qui colligunt. Dicūt  
si alia vitia, nunc quidē si serpentis cauerna iuxta fuerit, si patescens primo  
adhuc aucterit, capaci venenorū cognatione ad virus accipiendū, itaq; eaueri con-  
uemiet, priusquā se condant serpētes. Signa erunt tot herbæ, tot arbores, fruti-  
cosæ ab emerſu earū ad latebrā vsq; vernantes, & vel straxi tantum folia, nec  
postea nascentia, nec antē deficientia. Quorūdam ex his facile noscūtur vene-  
na diluto rubore, rancido aspectu, liuido intus colore, timosa stria, pallido per  
ambitum labro. Non sunt hæc in quibusdā. Sicciq; & nitri similes, veluti gut-  
tas in vertice albas ex tunica sua gerunt. Vnde à peritis regionum legendi sunt:  
arborum verò, quæ varios fungos parere solent, qui cibis abdicantur, sparsim  
auctores meminēre. Nicander in Georgicis suis, Athenæo referente.

*oleis inimica propago,*

*Quercu, & punicea malo tristissima pestis,*

*Illicibusq; vena fungus grauis, humidus, atq;*

*Letifer.*

Plinius, Robur, cupressus, & pinus noxios patiūt, itē fragus. Theophrastus,  
Robur è radicibus, & iuxta radices emittit fungos. Auicenna ex oliua impro-  
bos, Platina noxios emittit. Sed edules autumnali, vel verno tempore nascun-  
tur. Dicemus de autumnalibus, qui primis imbribus nascuntur. Horum genus  
tripliciter partiemur, vel enim in pratis, vel arboribus, vel lapidibus adnascun-  
tur. Dicemus primo de pratensibus, quum sint laudabiliores. Horatius:

*pratensibus optima fungis*

*Natura est, aliis male creditur.*

Pratensium optimi, quiq; principatum tenent, boleti sunt dicti à Latinis, à  
Graecis verò βωλίη, Galeno, & Paulo Aegineta suo assecla. Sunt qui dictum



volunt *ἀπὸ τοῦ βύλου*, quod glebam, & priuatim rubricam illam, vulgò bolos dictam, significat, vnde colos boleti. Neapolitani *ouole*, & *boloccioli* vocant: ita enim ouorum vitellū dicunt, cuius formam præ se ferunt. Quantum olim existimati fuerint, indicat vel illud Martialis,

*Argentum, atque aurum facile est, lanamq̃, togamq̃,*

*Mittere, boletos mittere difficile est.*

Plinius, Inter ea, quæ temere manduntur, boletos merito posuerim: optimū quidē hos cibi, sed immenso exēplo in crimē adductos, veneno Tiberio Claudio Principi per hāc occasionē à coniuge Agrippina dato. Origō talis est. Voluā terra ob hoc prius gignit, ipsum postea in volua, ceu in ouo est luteū: nec tunicæ minor gratia in cibo infantis boleti. Rūpitur hæc primò nascente, mox in pediculo corpus absumitur, raroq̃; vnquā geminis ex vno pede. Origō primæ causæq̃; è limo, & acescente succo madentis terræ, aut radicis fernæ glandiferæ, initioq̃; spuma lentior, dein corpus mēbranæ simile, mox parvus. Ortus occasusq̃; eius omnis intra dies septē est. Robur boletos pducit circa radices. Glauca stomacho vtiles putat boletos. Galenus: omnium fungorum minimē sunt noxii. Sed nequis eis largius vtatur, prauī enim sunt succi, atq̃; interimere possunt, variè coniunguntur, vt ea, quæ nulla insigni qualitate prædita sunt. Eadēq̃; Paulus asserit. Succedunt quos Græci *ἀμανιτῆς* vocāt, Latini suillos, quos adhuc vsq̃; dicit Neapolitani vocant *silla*, & *ammonitæ*. Apicius farneos fungos vocat, vt sunt spicor, à farno, roboris genere. Dixit enim Plinius robora eos, paucere, Proximiā bonitate iā dictis. Galenus: secūdi post hos sunt amanitæ. & Paulus, Colores sunt fuliginoso, pediculo omnium crasso, orbe, vt sæpe humanū caput equiparēt, infra colore nigro, virescente. Quum elixantur sūt mucosi, nascuntur in syluis, vbi solū incultū. Nicander eum non torrerī debere dixit, ex Athenæo. Plinius venenis accommodatissimū. Familias nuper interemere, & tota cōiunia, Annium Serenum præfectum Neronis vigilū, & tribunos, & centuriones. Quæ volupstas tanta ancipitis cibi? Siccantur pendentes sulci iunco transfixi, quales è Bithynia veniunt. Suilli gulæ nouissima iumentamenta. Circa roborum radices gignuntur. Tutissimi, qui rubent callo, minus diluto rubore, quām boleti. Mox candidi, velut apices flaminis insignib. pediculis. Hos Neapolitani *conocchielle* vocant, longo enim prodeunt pediculo, callo corporis in turbinem mucronato, à neto fulorum glomere, *conocchia* vulgò dicto, ita vocāt, placentq̃; moroso diuitū palato. Sunt & in fungorum genere à Græcis dicti *pezica*, qui sine radice, aut pediculo nascuntur, ex Plinio. Nūc aliquos subiūgemus antiquis indictos. Est fungorum species, Neapolitanis *gallinaccia* vulgò dicta, mirabili profectò forma, vt nescias cui assimiles, ad magnā crescit altitudine. vt brachiis diductis vix homo completi possit: pondus sexaginta librarum, non orbiculari forma, vt ceteri, sed veluti manus in digitos plures diducta, vt quercus frondibus assimiletur, albi, callosi, vt vix integro vniuersa familia vesci possit. *Gallinella* verò parua est forma, spongis vel nascentibus porris, peti-

milis,



milis, quatuor digitorum longitudine. Nascuntur autumnō locis vmbrosis. Est & fungus, quem *piperitum* vocant: nam vescendo linguam vellicat, ac si piper vorarem, ac fauces incendit: nascuntur autumnō, coloris albi, vulgò *peperella* dicunt. Est & candidus, odoratissimus, orbem vix vtrāq; manu, diductis pollice & indice cinges, tam esu suavis, vt crudus edatur, præbatur agris innoxie, incolæ *richione* vocant, quasi magnum fungorum regem dicas. Qui vulgò *gallaces* dicuntur, candoris sunt immaculati, binis, aut ternis, ab vno pediculo iunctis, forma non rotundi, sed veluti galli cristæ, vnde nomen sumpsisse suspicor, croci odore, coma velut villosa. Sed ne molesti simus, **¶** Summa est, quod vnaquæq; regio suos populares habet.

Nunc ad aliud genus deueniendum, quod scilicet circa arbores adnascitur. Nicander maximè fungos, qui ficui adnascuntur, laudat, inquit:

*Quum fuerit ficus multo sub stercore tecta,  
Si mox perpetuo fructu conspexeris illam,  
Innocuis surgent radicibus undiq; fungi,  
Quos tu ne veritas, radicem cadito nullam.*

Plinius non solum ex ficus arbore, sed his aberit, inquit, veneni argumentum, quò similior fuerit arborum fici. Quidam discreuere arborum generibus, fico, ferula, & gummi ferentibus. Populus alpina fungis nascentibus laudatissima. Quercus probatissimos, inquit Plinius. Sed apud nos noxii sunt, necleis enī quercus probatissimos ab eo producere dicatur, robur verò noxios, quum eiusdem generis sit, ne dicam idem. Diphilus medicus: Familiares, & innoxii creduntur, recentes, minutissimi, molles, friabiles, qui in vlmis & piceis nascuntur, ex Athenæo. Sed omnium optimi, qui in sambuci radicibus adnascuntur, & hyeme edimus.

Postremum genus è saxis nascitur. Præciditur ad esum, alius subnascitur, semperq; nouos producit, restibili fecunditate, septem diebus perficitur, sexies anno demeritur, terra dodrante operitur. Neapoli afferuntur ex Vesuvio monte lapides, Surrentum ex Fageto altissimo sui tractus monte, Abellini ex **30** Parthenio monte, in Apulia ex Gargano & celsioribus montium partibus: nam saxa, vbi semel produxisse vident, suffodiunt, & venales exportant. Nascuntur aliquando non pileati, sed turiones vt asparagi, & in ramos diuisi.

Nunc & genera indicabimus, quæ verno nascuntur tempore. Plinius. Nec non & carnosa aliqua appellabimus, vt spongas in humore pratorum enascentes. Nascuntur Martio mense, eisq; vescimur quadragesimalibus ieiuniis. A spongiarum similitudine *spongiolas* dicimus. Sirobilos magnitudine, & forma præferunt, vt trium librarum pondus sæpe expleant. foraminibus peruiæ, & vacuæ sunt. Simul & cum his nascuntur, quas vulgò *monacelle* vocamus, colore nigro, cauli sex foliis rotundis per centrum annexis hærentibus, sed **40** sapore inferiores. Sunt & omnium fungorum optimi, qui vulgò *virni* dicuntur, quod verno tempore nascantur, Romanis *prignoli* dicuntur, primis Apri-



si imbribus erumpunt, odorati, gustui suaves, & innocui, nascuntur in sylvis, sub arborum umbris: ubi semel nascuntur, quorannis repullulant. Aliquando ex his arboribus è loco evanescent. Solum, in quo nascuntur, cinerei coloris. Hermolaus innocentissimos dixit, qui è rubis vere nascuntur, rotunditate clusili, quos inde *prunello*, & *spinulos* vocat, & è carduis, quos inde *carduales* vocat.

Art.

Postremo eos prosequemur, quos ars reperit. Dioscorides tradit esse qui dicant, utriusq; populi, albę nigraęq; cortices in minutias confisos, & segetibus stercoratis in parvos, fungos viles, innocentesq; parere toto anno retribiles. Ait Tarentinus: Fermento in ipsis populi nigra truncis, iuxta terram recisis aqua diluto, protinus coalescunt & gerunt. Additq; si montanum aruum, multis calamis, stipulis, & fruticibus scatens, quum cœlum imbres parturit incendatur, permulti sponte naturæ prorumpent fungi: si tamen aruum iam ignem expertum, non subsequitur imber, qui impendere videbatur, aqua linteolato stillatim imbris imitatione conspergenda, his incensis locis nascunturq; fungi quidem, sed aliquando deteriores, si quidem meliores in hoc genere sunt, qui imbre aluntur.

*De tuberibus. CAP. LXXI.*

**P**ost fungorum aggrediemur tuberum tractationem. Ferè eodem genere sunt, eodemq; ferè malo placent. Iuxta illud Martialis,

*Rumpimus altricem tenero de vertice terram,*

*Tubera: boletis poma secunda sumus.*

Decens erat, priusquam genus cartilagineum, quod sub terra occultitur, aggredieremur, de tuberibus alloqueremur, quæ non nisi radices sunt. Galenus radicibus aut bulbis annumeranda dicit, innoxia & insipida esse, proinde, qui ipsis utuntur ad excipienda condimenta utuntur, alimentumq; quod ab ipsis in corpus distribuitur, nullam insignem qualitatem habere. Platina vino lora sub cineribus coquenda dixit, & tale ne pipere aspersa adhuc calida in conviviis post carniem esum commodenda. Apicius, Tuberum elixabis, sale asperges, surgulo infiges, sub assabis, & mittes in caccabum, oleum, liquamen, careum, vinum, piper, & mel, quum ferbuerint, amylo elixabis, tubera exornabis, & inferes. Vel tubera elixabis, & asperso sale in surculis affiges, & sub assabis, & immittes in caccabum liquamen, oleum, carenum, vinum modicè, & piper confractum, & mellis modicum, feruere permittas, quum ferbuerint, amylo obligabis, & tubera compinges, ut combibant, illud exornabis, quum bene ferbuerint, inferes, si volueris eadem tubera omento porcino inuolues, assabis, & sic inferes, & alia. Credidit antiquitas cognationem illius aliquam eum cœlo esse, nec nisi tonante Ioue nasci, ut in Satyra Aquinas Poëta:

*Et faciunt laetas optata tonitrua cœni.*

Cuius causam symposiorum quarto Plutarchus peruestigar, aitq; complures asseuerare tonitruum perinde quasi in solatione, vel aëris impulsu terram hinc & illuc, sic rimis solo fathiscente solere coniici, quapropter tubera latitant quapropter



- prae tonitru gigni tubera, non ostendi vulgus opinatur, nō secus, quā si quis  
 existimet imbres cochleas creare, potius quā illectas humore ex maceris, &  
 sepibus in lucem euocare. Agemachus rem confirmabat experientia, ac mira-  
 culum quidem censebat, cui tamen fides non debeat derogari, si quidem per-  
 multa tonitrus, & fulminis prodigia conspiciuntur, quae cæcas habent causas,  
 & cognitu difficiles, vel quorum nemo prorsus rationem potest inire: etenim  
 bulbis, inquit, qui derideri solet, ac in proverbium abiit, non exilitate sua ful-  
 men vitat, sed occurrente discordantium vitium miraculo: veluti ficus arbor  
 fulmine non igitur. Sic cœlestibus aquis, tonitru, fulgetro, calore, & ventorum  
 10 impetu, penitus in terræ viscera compulsis humum in se colligi dicebat, & glo-  
 bosas quasdam collectiones, abscessusq; fungosos excitare, quemadmodū in  
 corporibus calor & sanguis sæpe strumosa, glandulosaq; tubercula creant, itaq;  
 tubera non sine calore neq; sine aqua gignuntur, sed à terra pariente, permu-  
 tataq; corporum incrementa capessunt, huius itaq; fermento cœlestis imbris  
 imbuta terra globatur, & caloris adminiculo humor terreus in hæc tubera  
 coalescit. Plinius: De tuberibus hæc traduntur peculiariter, quum fuerint im-  
 bres autūnales, ac tonitrua crebra, tunc nasci, & maximè è tonitribus, nec ultra  
 annū durare. Athenæus autumno, quū imbres & tonitrua inceserint, gigni, ve-  
 re iam vegeta ad vsum promi. Si maxima tonitrua fuerint, maxima erūt, si ma-  
 20 gnā, magna, unde illa præcipua generationis causa videtur. Plinius: Crescāt ne,  
 an vitium id terræ (neq; enim aliud intelligi potest) ea protinus globetur ma-  
 gnitudine, qua futurū est, haud facile arbitror intelligi posse. Patrescēdi etiam  
 ratio communis est ius cum ligno. Laertio Licinio prætorio viro iura reddēti in  
 Hispania, Carthagine, paucis hinc annis scimus accidisse mordēti tuber, ut de-  
 prehensus iurus denarius primos dentes inflecteret: quo manifestū erit terræ  
 naturā in se globari, quod certum est ex iis, quæ nascuntur, & feri non possunt.  
 30 Græcis ὄδρον, & ὄδρον dictum videtur. ὄδρον ab ὀδόν, id est, tumeo. Græci *Nomen.*  
 Ποῦρ, id est, terræ natos dixerunt. Porphyrius Διοτρίων, id est, deorum  
 filios, rationem diximus in fungis. Latini tubera vocant. *Itali tartusi.*  
 30 Phantias, ex Athenæo, neq; florum, neq; seminum, vestigia ostendere dixit. *Descriptio*  
 Dioscorides ita describit: Tubera rotundæ radices sunt, sine foliis flavescentes,  
 vere fodiuntur, cruda & cocta eduntur. Theophrastus: Radix proculdu-  
 bio est, & si radicis nullam habeat formam. Plinius: vndique terrā cit-  
 cumdata, nullis fibris nixa, aut saltem capillamentis, nec vtrique extube-  
 rantem loco, in quo gignuntur, aut rimas agente, neque ipsa terræ coherens,  
 ac cortice tamen includuntur, ut planè nec terram esse possimus dicere, nec al-  
 liud quā terræ callum. Excedit sæpè magnitudinem mali coronei, etiam  
 librali pondere. Miraculum est maximum, aliquid nasci aut vivere sine vl-  
 la radice. Athenæus biennium non absoluerit dicit, quamvis annum vi-  
 40 vant: eorum vigor verno tempore. Sed quæ Plinius habet, (Nec vtrique ex-  
 tuberante loco in quo gignuntur, aut rimas agente) falsa videntur: nam



Maior mense, quum iam ad debitum incrementum venerint & maturitatem, terra in rimas fathiscens foras eiecit. Quod etiam Martialis testatur, dicens:

*Rumpimus altricem tenero de vertice terram.*

Genera.

Plinius duo eorum genera. Arenosa dentibus inimica, altera sincera. Distinguntur colore, rufo, nigroq; & intus candido. Diphilus apud Athenarum inter tuberum genera, quædam lethalia esse dicit, ut in fungis. Apud nos duo eorum genera, alba, quæ extrinsecus lauia, & insipida; & nigra vulgaria: aiunt enim cum locum, qui tubera producere amplius nequit, alba illa producere.

Solum.

Athenæus: In littoribus & arenosis locis nasci vult. Plinius, Sabulosis, sicis, frutectosisq; locis. Asiæ nobilissima circa Lampscum & Alopeconesum, Græciæ verò circa Elim. Athenæus in Acarnidiæ circa Lampscum, & in Alopeconeso, & in Eleorum regione. Hegesander Delphus in Hellesponto. Neapoli, Morono, Cardinali, in Apulia, & Calabria nascuntur, 10

Satio.

Cæterum non desunt, qui seminaria dicant origine nasci. Plinius, Quibusdam locis acceptantur riguis, & seruntur, sicut Mitylenis nasci negant, nisi exundatione fluminum, inuecto semine ab Tiaris. Est autem is locus, in quo plurima nascuntur. Athenæus: Sunt tamen qui etiam seminis principium hæc habere arbitrentur, quando in Mitylenorum littore, non prius nasci comperitum est, quam pluuia aqua semen ex Tiaris detulerit: is enim locus est, in quo plura nascuntur. Herbam, quæ super tubera crescit, quæ ~~reperitur~~ præsertim subesse cognoscuntur, Pamphilus hydnophyllon vocat. Sed id nostro tempore falsum videtur: nam sub omnibus herbis indifferenter nascuntur. Herbarum enim sub quibus nascuntur multa sunt, & sylvestres, quæ sub arborum umbris vivere possunt, ut gramen, trifolium cæteraq;. Sed tubera sues demonstrant: dum enim proni pabulum quærunt, odore forsan illecti, rictu excavant, ac inveniunt, eisq; avidissimè depascuntur. Subulci loca notant, ut altero anno ibidem effodiendo alia inveniunt. Nascuntur autumno, quia copiosius hyeme & vere reperiuntur. Maior mense terram aperiunt, ac foras emergunt, quæ ab auibus, vel suibus deuorantur, si ab hominibus non capiuntur. 20

*De radícula, seu raphano. CAP. LXXII.* 30

Nunc ad alias radicum species descendendum, quæ terra occuluntur, deum ad bulbos, quum radices etiam imitentur, ut rectus hortensium herbarum seruetur ordo. Plinius: Raphano vis mira colligendi spiritum, laxandi q; ructum, ob id cibus illiberalis, utiq; si proxime olus mandatur. Si vero cum oliuis drupis, rarior ructus fiet, minusq; fœtidus. Ægypto mirè celebratur propter olei fertilitatem, quod è semine eius faciunt, hoc maxime cupiunt serere, si liceat, quoniam quum & quantus plusquàm è frumento, & minus tributus est, nullumq; copiosius oleum. Atq; ut est Græca vanitas, feratur in templo Apollinis Delphis adeo cæteris cibus prælatus raphanus, ut ex au- 40



to dicaretur. Scripsit & Moschion Græcus vnum de raphano volumen. Vtilissimi in cibis hyberno tempore existimantur, iidemq; dentibus semper inimici, quoniam atterant: ebora certe poliunt. Odium his cum vite maximum, refugitq; iuxta satos. Palladius, Raphanum sicut brassicam constare esse vitibus inimicum, nam si circa se serantur, natura discordante, refugiunt. Sed vterq; in errorem irrepsit, nam Plinius è Theophrasto transcripsit de brassica loquente, vt superius visum est ex quarto libro, capite vigesimo de historia: & libro de causis de vire loquens ait, Quum germen propinquum est brassicæ, retrorsum parte sua postrema flectitur, quasi odoris vehementia fugiat. Transcripsit Plinius: Lædit odore, aut succi mistura, vt raphanus vitam: olfactrix enim intelligitur, & tangi odore mirum in modum, ideoq; quum iuxta sit averti & recedere, saporem inimicum fugere. Hinc sumpsit Androcides medicinam contra ebrietates raphanum mandi præcipiens: odit & caulem, & olus omne. Florentinus: Si quis perunctas succo raphani manus habuerit, impunè serpentes tractabit, impositi scorpionibus, confestim necant, & si quis prægustans à scorpione feriat, citra aleam vitæ ad integram valetudinem cito redigetur. Galenus urbanos homines dicit ante alios cibos crudum mandere cum garo, vel acetoalui ciendæ gratia: rusticos verò & cum aliis obsoniis, estq; potius obsonium, quàm alimentum. Caules & folia cocti manduntur.

20 Cautis quem vere producit, elixus estur cum oleo, garo, & aceto, vt rapæ caulis, nutritq; magis, quàm eius cruda radix. Sunt enim, qui non solum caules, sed ipsas radices raparum modo elixas esitant.

Theophrasto *ῥαφανίς* Atticè, aliàs *ῥάφανος*, & *ῥάφανον* appellatur, vt tradit *Nomen.* Athenæus, quod facile appareant, siue nascantur: *ἔτι τὸ ῥαφάηλον*. Athenæus etiam, Calliam raphanum dixisse ait. Varro à Græcis raphanon, & crambidion dici scribit. Dioscorides à Romanis radices dici. Raphanus item & radícula à Celso dicitur, nomenque apud Latinos sibi arrogasse radicis videtur, quod ceteras corporis amplitudine superet, vel quia paucissimis cedat. *Italiradice, & rafano.*

30 Raphanum Theophrastus ex eo genere esse dicit, quod ex pluribus constat, & hæretetenset. Radicis genera, Corinthium, Cleonæum, Liothalassium, Bæotium. Amplissimè Corinthia adolescit, quæ vel stirpe detecta constet, hæc enim sursum versus protuditur, non vt ceteræ in terram ampliari solita est. Liothalassia, quam alia Thraciā vocant, hyemis patientissima. Bæotia dulcissima est, & figura rotunda, nec vt Cleonæa prælonga. Tradunt præterea genus vnum erucæ foliis: quò folium læuius, suauior, atq; mitior est: quò scabrius est, acrior est raphanus. Athenæus è Theophrasto quinq; recenset genera, excepto sylvestri erucifolio, scilicet Corinthium, Liothalassium, Cleonæum & Bæotium, addit autem Amoreū, quod in nostris codicibus apud Theophrastum desideratur. Plinius autem dum Theophrasti raphanorum genera interpretari conatur, brassicarū genera recenset, vt diximus in brassica, & quæ

40



Theophrastus de raphanis, ipse erranter naris tribuit. Inquit enim: Græci naporum quinque genera fecere, Corinthium, Cleoneū, Liothasium, Bæoticum; & quod per se viride dixerunt. Ex iis in amplitudinem adolescit Corinthium; nuda ferè radice. Solū epim hoc genus supernè cedit, non ut cetera in terram. Liothasium quidam Thraciū appellant, frigori patientissimum: ab eo Bæoticum dulce est, rotunditate etiam breui notabile, nec ut Cleoneū prælongum: in totum quidem, quorum tenuiora folia, ipsi quoque dulciores: quorū scabra, & angulosa, & horrida, amariore. Est præterea genus sylvestre, cuius folia sunt cruce similia. Nostri alia fecere genera. Algidenſe à loco, longum atque translucentum, alterum rapi figura, quod vocant Syriacum, suauissimum ferè, ac tenerissimum, hiemisque patiens: præcipuum tamē est, quod è Syria non pridem aduectum apparet, quoniam apud authores non reperitur. Id autem tota hyeme durat. Est & sylvestre, in omnibus autem probandis maximè spectantur caules: immitium enim rotundiores, crassioresque, ac longis caulibus: folia ipsa tristiora, & angulis horrida. Nicander duo raphanorum genera tradidit suis in Georgicis, Athenæo referente,

*Ut raphanos duplici cernes consurgere forma,*

*Deinde rapas, hæc longa simul simul aspera gustas,*

*Surgit in areolis.*

Et alibi:

*Duplex raphani species, hæc longa, rotundius*

*Surgit in areolis alter.*

Genus est vnum raphani, quod ab Herodoto narratur. Smyrneæ in Egypto cum cæpis & allio pyramidibus condendis præberi solitum. Iulius Pollux author, confirmat id Diodorus & Plinius, qui scribunt ad id opus, in raphanum, cæpas, & allium talenta mille octingenta erogata. Plinius. Palladius. Feminini generis radices putantur, quæ minus acres sunt & habent folia latiora & leuiora, & cum rotunditate virentia, ex qua iubent folia colligi. Nos ita distinguemus genera à varietate, quæ Neapoli habemus, nostrasque species authorum speciebus accommodabimus: si coniectura, & verisimilibus rationibus aliquid assequi possimus. Est genus primum satiuū dulce, tenerum, translucentum, longum, ceteris tenuius, folio leuiori, latiori, & virēti, & hoc duplici colore, albo & rubeo. Album nostratè dicimus, rubrum Hispanicum, fortasse nobis illinc aduectum. Id genus Theophrasti Cleoneum, quod prælonga radice est, & dulci, nec tam patiens aduersus frigora, & huic nostro adaptari possunt omnes hæ notæ. Plinii enim Algidenſe genus, longum, translucentum, & Palladii genus femininum, quod minus acre, & folium latius, leuiusque sit, & cum iucunditate virenti. Secundum genus magis ferum & inermite est, & si etiam seratur à nobis. Vulgò *rapeste* dicimus, maiori amplitudine, sapore acriori, cortice duriori, validius aduersus frigora, folio hirsutiori, nigriori, cuius plures sunt species. Prima est rotunda, rapæ forma, sapore dulciori, quàm prælonga, & hyeme velluntur à terra.



terra, vulgò *ramoraccie* dicuntur, & vtrumq; genus & albo, & colore nigro vestitur. Quæ orbicularis est formæ, videtur à Theophrasto Bæotica dici, quæ dulcissima & rotunda figura. Nicandria autē rotunda species. Plinii Syriaca. Alterā rapi figura, quod vocant Syriacū, suauissimum, & tenerriimū, hyemisq; patiens, hyeme enim Neāpoli edimus, & tunc crescunt. Longas, quas vulgò *rapeste* dicimus, Liothalias esse coniecimus Theophrasti, validissimas aduersus frigora. Longū Nicandri genus, & simul asperum gustu, Palladii masculinum genus. Vnum Apulię nascitur, paruum, rotundū, album, resipiens piper, cibis experitum, raphanum vulgò vocant. Est & postremum genus, sylvestre, longa radice & tenui, omnibus acutius, cuius caules & cymas vere, & æstate edimus ex iis, quæ sponte nascuntur in aruis expetunturq; ob id magis quā cetera genera, vulgò *rapeste seluaggie*. Aliud sequenti capite sylvestre genus describemus.

Theophr. Radice nititur longa, crassa, rectaq; cuius cortex crassus, & extricabilis. Carnosa nec siccata quidē dulcescit. Semen in siliqua, & latere potius apta est germē parere. Quum indurescit, transit in lignū. Dioscorides sphondilio similem dicit, & astragalo. Plinius. Cortice & cartilagine cōstat raphanus, multisq; eorū crassior cortex, etiam quā quibusdam arborū amaritudo plurima illi est, & pro crassitudine corporis cetera quoq; aliquando lignosa. Nos ita describemus. Assurgit caudice vno tereti, flore purpureo obsoleto, ut rapa sylvestris floret vere, flore rapitio sed angustiore, & scabro, & magis hirtio, siliquis tumētib; pixidatim effigiatis, rapo quadruplo maioribus, in quibus semē rotundū, rufum, superius acutū, nec maius rapo, sed eadē planta sæpius inspicienda est: nam & folia rumici, & erucæ modo diuisa, & similia habet.

Descriptio

Theophrastus: Gaudet raphanus, dulcescitq; frigoribus, quibus incrementum in radices, non in folia vertit, austrinis atq; serenis temporibus, celerius in caulem attollitur semenq; promit. Caro: Nebuloso cælo gaudet feri. Palladius item. Plinius. Frigore adeo gaudet, ut in Germania puerorum magnitudinem æquent. Itemq; nebuloso feri debere.

Colum.

Caro raphanū in loco stercoreato benè, aut loco crasso feri iubet. Columella stercoreata terra, & subacta. Palladius. Amat terrā pingue, solutam, & diu subactā, qualem rapa: tophum, & glaream reformidat. Letamē non est ingerendum, sed potius palea, quia inde fungosē sunt, meliores proueniunt in arenis. Plinius. Seri vult terra soluta, humida. Fimum odit, palea contentus.

Solum.

Theophrastus. Ex prima sementi est. Iulio mense seritur. Ex hybernis ceteris omnium erumpit, die nanq; (ut itaq; loquar) tertio erumpit. Sua radice feri non potest, quum facile exiccet, imbecillisq; ad perdurandum penitus sit. Sed quæ radice seruntur, tunicas habeāt plures oportet, simul & lentitiam quandam, ut bulbus, & scilla. Columella: Raphanum radix bis anno rectè seritur, Februario mense, quum verum fructum expectamus, & Augusto mense circa Vulcanalia, quum maturius. Sed hæc satio sine dubio melior est. Cura est eius, ut terra stercoreata, & subacta obruatur, post ubi ceperit

Satio.



aliquod incrementum subinde aggeretur, nam si super terram emerferit durā & fungosa fiet. Sed ne antiqua priscorum obseruatio lectores neotericos remoretur, explanabimus, quæ Vulcanalia sint tempora. Vulcanalia dicebantur Vulcani festa. Alii dicunt circa calendas Maii, quoniam Flamen Vulcanalis calendis Maii diuinam rē Maiæ faciebat, vt Macrobius in Saturnalibus restatur: quam opinionem refellendam contendūt, vtpote quod circa canis ortum, qui Vulcano fertur sacer, fiebant, aut circa calendas Augusti. Palladius, Augusto mense locis siccis radices seruntur, quæ hyeme suū vsum ministrent, ferendæ sunt spatiis grandibus, & altè fossis. Seruntur post nouam pluuiā, nisi possint fortè rigari: quod satum est, statim debet operiri leui sarculo. Iugerum duo sextarii, vel vt quidam quatuor, quum seruntur implent. Plinius: Seritur post idus Februarias, vt vernus sit, iterumq; circa Vulcanalia, quæ satio melior. Multi & Martio, & Aprili serunt, & Septembri. Incipiente incremento cōfere alterna folia circū obruere, ipsos verò accumulare: nam qui extra terrā emerferit, durus fit, atq; fungosus. Aristomachus detrahi folia per hyemem iubet, & ne lacunę stagnent, accumulare, ita in æstare grandescere. Raphanus sexto nascitur die. Sed coniciō Plinij errasse, quippe quum Theophrastus tertio die dixerit, & omnes cōsentiant, ipse autem sexto dixit. Sed fortè quæ Theophrastus de brassica dixit decimo die prouenire, ipse de raphano prorulit. Plinius: Tertio idus Nouembris Vergilię occidunt, in his temporum interuallis opera rustica, raphanos serere quibus diebus diximus. Apud nostros olitores radix seritur primum Februario seminibus manu depositis, in sulcis scilicet binis, radicibus altero, altero verò cucurbitis, aut cucumeribus: nam post vigesimum diem radix eruitur, & estur, rēmanent cucurbitæ, & spatio, vbi satæ erant, terra repletur, quod Martii calce fit. Secundo seritur Augusto, semine fusim sato. Post decimum diem herbis liberatur, & stercoreatur, post quindecim dies eruitur, serunt simul pastinacas, & spanachia: & si densius nascantur, interpollantur aliqua, vt largius radices se extendant, nam densius satę graciles fiunt, transfertur quæ semini destinatur. idque autumnino fieri debet, vt vere det semen. Quarunt solum benè subactum, vt possint radices profundius extendere, in solo pingui, & pastinato radices magnas, & parua folia edunt: in duro, & sicco, radices paruas, folia magna.

Sed quomodo radices mira capiant incrementa, docet apparatus Theophrastus, ab olitoribus sui temporis factitarum. Ablatis enim per hyemem foliis, quū maximè vigent, de super succreram inspargunt humum, ne imbres possint admitti: non enim regermināt, nec folium remittunt, nisi congestitiā humum submoueas. Cuius rei in libro de causis rationē explicat. Radix enim quū nullum ab iinis vim obtineat germinandi, alimentum, quod sursum transmittant, tunc subtus cohibetur, percrassaturq; cumq; omnis putredo, omnisque corruptio aspersu obiectæ terrę propulsatur, & imbrium, aliarumq; noxarum rerum iniuria vindicatur. Aristoteles autē suis problematis inquit. Cur si quis radicu-



radicularum folia tempore hyberno, quum maximè rigent, absciderit, & terram pedibus complanarit, conculcaritque, vt imbrem vllum admittere possit, radiculæ ipsæ per æstatem amplitudine mira crescunt. An propterea quia ne corrumpantur causa conculcandi soliditas est, quæ tumorem patefacere prohibet, alimentum verò quod aliter ad germen sursum transmitteretur, radix sibi ipsa totum dispensat, itaque vel amplior fiat necesse est, vel suo de latereradices alias mittat. germinans modo caparum, has enim multiplices effici nouimus, si quis annuas non euellat, sed tempore hyberno relinquat, at quum vim istam procreandi vt laseri caparum natura dedit, sic radicularum negarit, necesse profectò est ipsas illas crassescere, nimiam ob copiam alimentum. Palladius idem docet: Maiores fieri creduntur, si sublati omnibus foliis, & solo tenui, caule dimisso sæpè terris operiatur. Plinius. Caule reciso ferè omnia regerminant, exceptis quæ non scabrum caulem habent. Est in vsu verò ocimum, raphanus, lactuca: hanc etiam suauiores putat à regerminatione. Raphanus utiq; iucundior detrahit foliis, antequam decaulescat, hoc & in rapis, nam & eadem direptis foliis cooperta terra crescunt, durantq; in æstate. Quæ omnia ex Theophrasto de brassica loquente transtulit, ne aliqua quæ Theophrastus brassicæ tribuisset, ipse raphano non ascriberet. Theophrastus: porrorum, radicumque magnitudo ex translatione. Plinius, Omnia translata meliora, grandiora que fiunt. In translatione & medicina est, desinuntq; sentire iniurias, vt raphani. Sed puto Theophrastum de vniuersalibus herbarum radicibus locutum, non de raphanis, & quæ Plinius scripserit de raphanis à Theophrasto de brassica loquente transtulisse: nam raphani hinc Neapoli non transferuntur. Plinius: Præcipuè salis aluntur, itaq; etià talibus aquis irrigantur, vt in Ægypto nitro sparguntur, vbi sunt suauitate præcipui: in totum quoq; salugine amaritudo eorum eruitur, fiuntq; coctis similes: namq; & cocti dulcescunt, & in vaporum vicem transeunt. Itemq; peculiaris medicina raphano in salis aquis, quæ & alioqui plurimum suauitati, & fertilitati conferunt: quæ omnia è Theophrasto transtulit, vt vidimus capite brassicæ dicato. Ex quo Palladius, Suauiores fiunt, si eas aqua salsa frequenter aspergas, fuitq; in causa, vt Palladius quoq; erraret. Plinius: Prodidere, si palo adacto cauerna palea insternatur sex digitorum altitudine, deinde in semine, simumq; & terra cogeratur, ad magnitudinem scrobis crescere. Palladius: si ex nimis acra dulcè fieri velis, semina die ac nocte melle macerabis, aut passo. Florentinus: Raphani dulces erunt, quorum semen vino mulso, aut vuarum passarum succo fuerit maceratum.

Pulices appellatur bestiola raphanis innascentes, dicit Theophrastus, qui- *Inf. rem.*  
bus ne noceant, eruum interserere remedium est. Sed ne nascantur, nullum adhuc remedium repertum putat. Plinius: Raphano innascuntur erucæ. Sed item erranter interpretatus est à Theophrasto, quippe qui brassicis erucas innasci dixit, non raphanis.



**A**lt a raphani sylvestris species nunc describitur. Dioscorides huius tam folia, quam radicem in olera recipi dixit. Columella ita condit. Armoraciorum cymas salice oportet, diemq; vnum, & noctem sinere, dum muriam remittant, deinde muriam eluere, & expressas in cratibus pandere, dum assiccescant, sic conditis superinfundi ius, quod sit aceti duarum partium atque vtriusque muria, deinde arido spissamento fœniculi sic comprimari, ut ius supernatet: inde oportet sæpius ius suffundere, nec pati sitire salgama, idq; verno tempore faciendum.

Nomen.

Græcis *ραφανίς ἀγρία*, id est raphanus sylvestris. Theophrasto videtur *ραφανίς*, ut videbitur inferius. Dioscorides Romanis ramoraciam dici fateretur, Sed admonendum agrioraphanon differre à raphano agria, nam aliud est sylvestris raphanus, & aliud raphanus sylvestris, quemadmodum leucacantha ab acanthaleuce, & alba spina à spina alba. De agrioraphano Dioscorides libro quarto egit, de raphano agria, siue de raphano sylvestri nunc ageretur. Columella armoracium vocat. Plinius armoraciam, & Pōrici armon, & alii leucem. Palladius: ramoracea agrestis est raphanus. Romæ adhuc *armoracia* dicitur. Neapolitanis ab armoracia corrupto satis nomine *racecotena* dicitur.

Descriptio.

Theophrastus ita describit. Amplissime Corinthia radix adolescit, quæ vel stirpe constat defecta, hæc enim sursum versus producitur, non ut cetera in terram ampliari solita est. Dioscorides verò, Folia satiuo similia, sed magis lappanam imitantia. Radix tenera, gracilis, subæris, similisq; radici, seu tragii. Plinius: Fronde copiosius quam corpore. Folia longa, & acuta, sinapi instar acerrima, adeo ut caput teneat, & lachrymas cieat.

Genus.

Plinius: Est satiuæ usus in Italia, & armoraciam satiuam vocant.

Colum.

Plinius Arcadicum prætulit omnibus, & si alibi nascatur.

Solum.

In hortis habetur, sic è sylvis translatus ad culta edomita feritate miscet, meliorque fiet. Crescit aliàs circa margines itinerum, & loca arenosa, inque pratis, nonnunquam sua sponte copiosa provenit. Quærit solum solum, pingue, & profundè pastinatum, ut omnia olera, ut radices longiores inuiciat.

Satio.

Palladius Martio seri posse, & transferri dixit. Locis siccioribus Octobri transferri ad culta, ut melior fiat. Seri etiam Nouembri. Seri semine apud nos non vidi, seritur tamen agnatis propaginibus, helenii, vel arimodo, integris, aut dissectis, aut radicibus in multas partes recisis, Nouembri, Decembri, Ianuario, Februatio, & Martio, tam viuaci est natura, quod ubi semel seueris, vix eo possis liberare loca: nam & si radices integras exirpaueris, illius fiber, vel potius capillamenta rediuuam nanciscuntur naturam, eundemq; locum raphanis replebunt.

Derapis. CAP. LXXIII.



**A**B his ratio habenda est raporum, naporumque: nam vtraque rusticos implent, magis tamen vtilia rapa sunt, quia & maiore incremento proueniunt, & non homines solum, verum etiam bones pascunt. nam hyberna ci-  
 baria pecudibus id olus præbet, ex Columella. Plinius. Latini in transcurso de-  
 rapis attigere, paulò diligentius Græci, & ipsi tamen inter hortensia: si iustus  
 ordo fiat, à frumento protinus ei locus assignandus, quando aliis præstantior  
 usus ab his non est. Ante omnia nanque cunctis animantibus nascuntur, nec  
 in nouissimis satiant ruris alitum quoque genera, magisque si decoquatur a-  
 qua, quadrupedes & fronde earum gaudent, & homini nō minor rapaciorum  
 10 suis horis gratia, quàm cymarum flaccidorum quoque, & in horreis enecatorū,  
 vel maior quàm virentium. Ipsa verò durat, & in sua terra seruatur, & postea  
 passa, penè ad alium prouentum, famemque sentiri prohibent. A vino atque  
 messe tertius hic Transpadanis fructus: in cibis quidem nostris pluribus modis  
 commendantur, durantque ad alia, sinapis acrimonia domita, etiam coloribus  
 picta præter suum sex aliis, purpureo quoque, neque aliud in cibis tingi debet. Atque  
 ut est Græca vanitas, fertur in templo Apollinis Delphis adeò cibis prælatus, ut  
 rapum dicaretur è plumbo. Scires non ibi genitum Manium Curium Impera-  
 torem, quē Samnitium legatis aurum repudiaturo afferentibus, rapū torren-  
 tem in foco inuentum, annales nostri prodidere. Galenus. Olerum omnium ra-  
 20 dicū aduersissimæ sunt rapæ. Nisi coquatur dura est, nec esculenta, cocta om-  
 niū minus nutrit. Vnde conditur muria, & aceto & in totū annū ipsa vtuntur,  
 coctionē diuturniorem postulat, eaque laudatissima, quæ cocta bis fuerit. Cru-  
 dior sumpta concoctu difficilis, flatulenta, stomachoque noxia est. Plinius. De-  
 mocris in totū abdicauit eā à cibis propter inflationes. Diocles magnis laudi-  
 bus extulit, etiā Venerem stimulari ab ea professus. Itē Dionysius, magisque si e-  
 ruca condiretur. Sed ad eius condituras accedamus. Varro seruati rapa cōsecta  
 in sinapi dixit. Columella ita docet: Raporū quamrotundissima sumito, eaque si  
 sunt lutosa detergito, & summā eū nonafula decerpito, demū sicut consue-  
 30 uerunt salgamarii decussatim ferramento lunato incidito. Sed caueto ne usque  
 ad imum præcidas rapū. Tum salem inter ineisuras raporum non nimium mi-  
 nutum aspergito, & rapa in alueo, aut seria cōponito, & sale plusculo aspersa  
 triduo finito, dum exudent. Post terriam diem mediam fibram rapi gustato, si  
 receperit salem. Deinde quum videbitur satis recepisse, exemptis omnibus,  
 singula suo sibi iure eluito. Vel si non multum liquoris fuerit, muriam duram  
 adicito, & ita eluito. Et postea in quadratam cistam vimineam, quæ neque spisse,  
 solide tamē, & crassis viminibus cōtexa sit, rapa cōponito. Deinde sic aptatam  
 tabulam superponito, ut usque ad fundū, si res exigat, intra cistam deprimi pos-  
 sit. Quum autem tabulam sic aptaueris, grauiora pondera superponito, & fi-  
 40 nito nocte tota, & vno die siccari. Tum in dolio, picato fictili, vel in vitreo  
 componito, & sic infundito sinapi, & acetum, & à iure contegantur. Sed cu-  
 randum, ut antequam caulem, aut cymam faciant, dum sunt tenera cōponant.



tur. Apicius, Rapæ sic apparantur. Rapos elixatos exprimes, deinde teres cumini quamplurimū, rutæ verò minus, laſerpitium item Particum adde, vel acetum, liquamen, defrutum, & oleum, quæ modice feruere facies, & inferes. Alia ad delicias præparato. Rapas elixatas inferes, oleum subinſtillabis, quibus ſi voles acetum addis. Platina: Non erit inſalubre, ſi prima abiecta decoctione, ſecundo elixaueris, additis aromatibus, quæ eius inflationem tollant. Palladius aliam docet: Decembri rapa in partes minutas reciſa, & leniter cocta, tota die diligentius exiccata, ne quid reſeruet humoris, & ſinapi ex aceto (ſicut mos eſt) temperato immerſa condire curabimus, & repleta vaſa claudemus, ac poſt aliquos dies guſtibus explorata proferemus uſuri, quam Ianuario quoque, & Nouembri menſe poterimus efficere. Nicander etiam docet aceto condire, & ſinapi, vt quando comederentur, aperirentur venæ.

*Vt raphanos duplici cernes conſurgere forma,  
Deinde rapas, hæc longa ſimul, ſimul aſpera guſtu  
Surgit in areolis, hanc tu concidito, ventis  
Extenuans gratamq; hyemi, & cuſtodibus aptam.  
Otia longa domi qui carpunt, fluctibus ipſum  
Si calidis ſpargas, vitam renouare videbis.  
Radicem concide rapis, pellemq; virentem,  
Purgato paulum ſumptas, ſoliq; reponens  
Siccato paulum, quum feruida protinus unda  
Fecerit hæc tumidas, tingens ſalſugine multa  
Mergito, ponderibus aquis inſundito acetum,  
Albaq; muſta, tegas intus ſtringens ſale multo,  
Mox aquare tibi ſtudio ſit fundito ſæpe  
His vnâ paſſam, & mordenti a grana ſinapis,  
Vtraq; pars face ſi profundatur aceti,  
Iucunda ſalſamentum lacerare parabit  
His quibus haud aderunt menſe conuiuia laute.*

Nomen.

Græcis ραπῶν, & ραπῶν ab eius figura, quæ plerunque rotunda eſſe ſolet, vocabulum detorſerunt: nam apud eos ραπῶνιον dicitur, quod in rotunditatem coactum ſit. Apellas in ciuitatibus Peloponneſi ſcribit à Lacedæmoniis gaſteras appellari. Nicæder apud Bæotas zeceltidas appellari ex Athenæo. Latinis rapum, & rapa eſt, quod extra terrâ ruat, quaſi ruapa nomenclat, Varrone teſte. Alii quod paſſim rapiatur, rapi nomen de flexum eſſe cenſent. Columella cum gongilida vocat in hortulo:

*Gongilis illuſtri mittit quam Nurſia campo.*

Italici dicitur rapa.

Genera.

Alios rapæ eſſe, alios non eſſe generis diuerſitatem putant, ſed vtrumque ſexum ex hoc genere intelligunt, ex eodem genere prouenientem: effœmina-



si nanque rarius collocatas, masculiscere densius compositas, & in terra difficili, Theophrastus dixit. Nicander rotundæ, & longæ gentis dixit, vt raphani:

*Vt raphanos duplici cernes consurgere forma.*

*De inderapas, hac longa simul, simul aspera gustu.*

Græci duo prima fecere genera, ex Plinio, masculinū, fœmininumq;: & ea serendi modo ex eodem semine. Dēsiore enim satu masculiscere item in terra difficili. Sæpius satam transire in marem. Cassianus Græcus in Augusto: Rapum capitatum, & rapū præcox, & gongila asparagos nominant, & rapum sylvestre. Plinius: Species omnium tres, aut enim in latitudinem fundi, aut in rotunditatem globari: tertiam speciem appellauere sylvestrem. Medici masculini generis in his faciunt rotunda, latiora verò, & concaua fœminini, præstatio-  
 10 ra suauitate, & ad condiendum faciliora. Possidonius rapas etiam sylvestres esse ait. Apud nos in duo genera diuiduntur, alba rotunda, capitata & longa.

Rapa constat radice longa ex Theophrasto, velut raphanus, & breui caule, radice carnosa, & cortice & carne, sed cortice carni adhærente. Semen includitur siliqua, & fœcundum est. E latere apta est fructum parere. Plinius sylvestrem describit: Radice in longitudinem procurrēte raphani similitudine, folio anguloso scabroq; , succo acri: in aruis maxime nascitur fruticosum, semine candido, duplo maiore, quàm papaueris. Nos verò, Satiuum rapum caule & foliis raphano simile est, floribus verò & siliquis, in quibus semē profert, rapis, aut brassicis. Floret æstate, ac siliquatur. Subinde sylvestrem ita depingit Dioscorides. Sylvestre rapum in aruis nascitur; frutex est in cubiti altitudinem as-  
 20 surgens, ramosus, læuis in cacumine, folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora, & fructum in siliquis calyculatis, cumq; eorum inuolucra apetiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem præbet, in qua semina parua conspiciuntur. Foris nigra, intus alba.

Dulcescit algoribus ex Theophrasto, per quos in radicem, non in folia in-  
 30 crementum capeffit. Pollux ex Athenæo: E Mantinea maximè commendantur. Columella ex Nursina ciuitate Italiæ, vt diximus. Cato calo nebuloso lætari dixit. Plinius: Nebulis & pruinis aluntur amplitudine mirabili. Vidi quadraginta libras excedentia. Frigore dulciora fieri existimantur, & grandiora. Tepore in folia exeunt. Palma in Nursino agro nascentibus. Taxatio in libras sextertii singuli, & in penuria bini, proxima in Algido natis. Possidonius sylvestres in Dalmatia frequenter nasci dicit, ex Athenæo.

Cato agrum latum & crassum optate dixit. Alibi: Rapinam & coles rapitii  
 40 unde fiant, & raphanum in loco stercoreato benè, aut in loco crasso serito. Columella: Solum putre & solutum desiderat, nec densa nascitur humo. Campis humidisque locis lætatur. Loci proprietates semen commutat: nanque in alio solo rapa biennio sata, conuertuntur in napum, in alio napus raporum accipit  
 50 speciem. Solum subactum pluribus iterationibus aratri, vel rastri, largoque stercore satiatum postulant: nam id plurimum refert, non solum quod melius



ea proueniunt, sed quia etiam post fructum eorum sic tractatum, solum segetes optimas facit. Palladius. Solo putri, soluto, nec spisso, locis humidis latatur, & campis. Loci proprietates rapi, & napi semen mutat in alterum; nam rapa in alio solo per biennium sata, mutantur in napos, alio vero napus transit in rapum. Plinius: Terram non morose eligit, penè ubi nil aliud feri possit. Ali-  
bi: Nisi in stercoreato non latatur.

*Satis:*

Ex prima sementi Theophrastus dixit, post æstiuum solstitium mense Iulio. Refert enim & tempus, sata enim diebus calidis, celerius excaulescit, & ocyus siliquatur. Semen præstantius, quo subtilius, crassum vitio non caret. Semine sata transferunt, ne densius satu mascullescere possint. Varro: Tantum valet vetus semē, ut naturam commutet, nam ex veterum semine brassicæ nasci aiunt rapa, & contra ex raporum brassicam. Plinius ab eo: Ex semine brassicæ veteris rapa fiunt, atque inuicem. Florentinus: Rapæ semen post annos tres brassicam producit, & vice versa. Palladius: Semen brassicæ vetustum mutatur in rapa. Columella: Riguis locis recte ab solstitio seritur, siccis vltima parte mensis Augusti, vel prima Septembris. Iugerum agri non amplius quatuor sextariis raporum seminis obserendum est. Duas habet sationes, & eandem culturam, quam raphanus. Melior tamen satio mensis Augusti. Seruant adhuc antiquorum consuetudinem religiosiores agricolæ, qui quum ea serunt, precantur ut sibi, & vicinis nascatur. Locis frigidis, ubi timor est, ne autumnalis satio hyemis gelicidiis peruratur, harundinibus humiles canterii fiunt, iisque virgæ transtuersæ imponuntur, & virgis stramenta supra iaciuntur, & sic à pruinis semina defenduntur. Palladius, Iugero raporum quatuor sextarii sufficiunt. Si spissa sunt, interuelles aliqua ut cætera roboventur. Plinius: Seruntur ante Calen Martias. In Iugero sextarii quatuor. Diligentiores quarto sulco feri iubent, stercoreato. Serere nudum volunt, precantem sibi & vicinis serere se. Satus iustus inter duorum numinum dies festos, Neptuni, atque Vulcani. Feruntque subtili obseruatione, quota luna præcedente hyeme nix prima ceciderit, si totidem luminum die intra prædictum temporis spatium serantur, mirè prouenire. Seruntur & vere in calidis, atque humidis. Vulgus agreste post ciconiæ discessum malè seri rapam putant, nos omnino post Vulcanalia & præcocia cum panico. Apud nos primis Augusti imbris spargitur semen in aruis iam duris, ac aratro operitur, eisque videsimur Nouembri, ac Decembri. Serunt iterum Maio pro bobus. Seritur dum adhuc in area sunt stipulæ: quæ semini destinantur, transponuntur, & sequenti æstate semen proferunt. Theophrastus feri radice non posse dicit, quum non nimium durer eruta, utpote tenui & diluto cortice intacta. Id enim genus facillè exiccatur, imbecilleque ad perdurandum est. Sed tunicas habeat plures oportet, simul & lentitiam, ut scilla. Cassianus: Augusto mense seritur capitatum rapum, præcox, Septembri rapum syluestre. Transplantatur autem capitatum, & rapum transiens in gon-  
gale alparagon. Octobri transplantatur capitatum, Octobri syluestre.

Th eo-



Theophrastus tellure accumulata condi ab olitoribus tradit, ut in sequen- Ar.  
 tem annum regerminet. Plinius: Rapa demptis foliis non crescit, duratque in  
 aestate. Theophrastus: Sunt quæ vi temporis quo feruntur, diuersam speciem  
 capiant, ceu rapa. Si quis protinus ab area ferit, ampla efficitur, quod ideo fit,  
 quia plenius radicatur, dilataturque amplius. Columella: Rapa femina Higi-  
 nius putat post trituram, iacentibus adhuc in area paleis inspergi debere, quo-  
 niam sunt vastiora capita, quam subiaccens soli duritia non patitur in altum  
 descendere. Nos istud sæpe frustra tentauimus, itaque rapum melius existi-  
 mamus subacta terra obrui. Palladius: ut verò semina maiora redigantur, eru-  
 20 ta rapa, foliis omnibus purgabis, & ad dimidii digiti crassitudinem in caule suc-  
 cides, tunc in sulcis diligenter subactis, octonis digitis separata obrues, & ini-  
 cies terram, & calcabis, ita magnæ nascentur. Plinius, Latiora fieri, si cum pa-  
 lea ferantur, dicit.

Columella: Qui aestate ista feret, caueat, ne propter siccitatis culex adhuc Inf. rom.  
 tenera folia prorepentia consumat. Id quoque ut videretur, puluis etiam, qui  
 supratameram inuenitur, vel etiam fuligo, quæ supra focos rectis inhæret,  
 colligi debet, deinde pridie, quam satio fiat, commisceri cum seminibus, & a-  
 quâ conspergi, ut rota nocte succum trahant, ac sic macerata postero die rectè  
 feruntur.

20 *De buniade, siue napo. CAP. LXXV.*

**S**VNT RAPARUM genere napi, siue buniades, sed bunias à bunio differt:  
 de bunio enim Dioscorides libro secundo inter oleracea loquitur, & Ga-  
 lenus inter raparum species bunium locat, nihilque referre dicit siue gon-  
 30 gilis, id est rapa, siue bunium, id est napus dicatur. At bunii Dioscorides li-  
 bro quarto meminit, apii folia ei tribuens, ubi etiam de pseudobunio loqui-  
 unt. Plinius verò erranter vtrumque confundit, quum vtrumque diuersas  
 possideat facultates, quod etiam Dioscorides indicauit, rapi speciem esse  
 subinueniens, quod post caput de rapis napos subiunxit, eandemque faculta-  
 tem eis tribuit. Diphilus Siphnius Medicus, Napus rapa melior est, dulcior e-  
 nim, & facilius digeritur, stomacho magis confert, magisque nutrit. Napos  
 antiquitas condiebat, nunc conditura profus exoleuit. Dioscorides sale con-  
 diti scripsit, sed cui cordi scire erit, adeat Columellam in rapis iam describen-  
 tem eius modum, & nos superiori capite descripsimus. Apitius etiam napos  
 condit, & rapos.

60 Maris nomine rapum buniada Theophrastum intellexisse Athenæus con- Nomen.  
 tendit, præsertim quum alibi nunquam buniados meminerit. Sed nescio ubi  
 Theophrastus maris rapi meminerit, nisi in iis quæ superius recitauimus, quod  
 densius satus masculiscat, quod nostris aruis sæpe visitur, quum densius feri-  
 tur, sterilique solo, raphani longi speciem accipere. Græcis *Bouia* à tumente



figura, quam præ se fert. Vocantur enim cliui, & colles, verrucosaq; loca *Βουνί*, quæ napus adamat, ut videbimus in suo loco. Nicander buniadis mentionem facit, Athenæo referente,

*Mox fere in areolis rapas, aquare cylindro*

*Cura sit, ut platanis aequè: depressa virescat*

*Bunias ipsa magis.*

Latinis napus. Itali *nacone*, Neapoli vulgò *rape di catalogna*. Galenus nullam inter rapum, & napum differentiam facit. Huius plantæ, inquit, quam gongilida, aut buniada appelles licet.

**Genera.** Andromachus senior duplicis napi meminit, *γλυκερῆς βουνιάδος*. Andromachus verò iunior sylvestris bunii in theriaca descriptione, sed iunior Andromachus, & Galenus videntur potius de sylvestri rapo, quàm napo locuti. Plinius quinque genera fecit, Corinthium, Cleoneum, Liorhasium, Bæoticum, & quod per se viride dixerūt; quæ genera, ut vidimus superiori capite ex Theophrasto, raphanis dicato capite, erranter transtulit. A libitamen duorum raporum mentionem facit, quos Græci in medicina servant. Angulosi foliorum caulibus, florens vnum, quod bunion vocant, alterum genus buniada appellant, & raphano, & rapo simile: quæ verba ut diximus ex Dioscoride falsò transtulit, quum de diuersis bunii generibus sit loquutus.

**Description.** Athenæus: nil rapis simile magis, nisi quæ bunias dicitur. Plinius cum fraxino florere dixit. Apud nos longa & tumentis figura, colore flauo, sapore rapis dulciore, ac ructus minus illiberales mouet.

**Colum.** Athenæus Thebaicos Græcos laudare dixit. Latini præcipuum bonitatis gradum Amiterninis dant. Columella in hortulo:

*Quaq; Amiterninis desertur bunias aruis.*

Martialis huius iudicio subscribit:

*Hos Amiternus ager felicibus educat hortis.*

*Nursinas poteris parcius esse pilas.*

Plinius æque cum rapo frigidis gaudere scripsit, palmam Amiterninis dant. Est Amiternum Campaniæ nostræ vrbs, hodie Aquilam dicimus.

**Solum.** Columella solum putre, & solum de siderare dixit, nec densa nascitur humo. Terram deuexam amat, & siccam tenui propiorem, itaque glareosis, sabulosisque aruis melior exit, locique proprietas vtriusque semen commutat, nam in alio loco rapa biennio sata conuertitur in napum, in alio napus raporum accipit speciem. Subactum solum pluribus iterationibus aratri, vel rastro, largoque stercore satiatum postulat: nam id plurimum refert, non solum quod melius ea proueniunt, sed etiam post fructum eorum. sic tractatum solum segetes optimas facit. Palladius, Napus in sicco, & propè tenui, atque deuexo, & sabuloso melior nascitur, loci proprietas vtriusque semen in alterum mutat: nam rapa in alio solo per biennium sata mutatur in na-  
pos, alio verò napus mutatur in rapum. Subactum solum, stercoreatum, ver-

facum-



fatumque conquirunt, & quod & ipsis, & segetibus proderit, quæ ibi anno eodem feruntur.

Columellæ riguis locis rectè à solstitio feritur, siccis vltima parte mensis Augusti, vel prima Septembris. Iugerum agri non amplius quinque sextariis naporum seminis obferendū est. Duas sationes habet, & eandem culturā, quam raphanus. Melior satio mensis Augusti. Palladius: Iugero naporum quinque sextarii sufficiunt: si spissa sunt, interuelles aliqua, vt cætera roborentur. Plinius: Seruntur & ante cal. Martias, diligentiores quinto sulco napos feri iubent, & stercoreato, satus iustus inter duorum numinum festos Neptunni, atque Vulcani. Seruntur & vere in calidis, & humidis. Terrio die à satione nasci dicuntur. Translata omnia meliora, grandioraque fieri, maximè porri, napique. Sed quod dixit Plinius ferendos napos inter duorum numinum festos, Neptunni atque Vulcani, id est, ferendos esse in mense Februario, qui Neptunno sacer est, usque ad Septembrem, qui Vulcano, vel circa Augusti finem.

Columella: Qui æstate seret, caueat ne propter siccitates culex eius folia prærodar. Cuius remedium in rapis diximus. Plinius rapo culices innasci dicit. Naporum medicina est, siliquas vnà feri, sicut olerum cicer, arcet enim erucas. Quo si omissio iam nata sit, remedium absinthii succus decocti inspersus, & sedi, quam aizoum vocant, genus hoc herbarum diximus.

#### 10 Depastinaca. CAP. LXXVI.

**E**RAPINA, & napina egressis se offert pastinaca, è cartilagineo genere est, & quæ terra occultitur, annicula utilis esse incipit, bima utilis, gravior autumno, patinisque; maximè, ex Plinio. Orpheus amatorium inesse staphilino dixit, fortasse quoniam Venerem stimulari hoc cibo certum est, ideo conceptus adiuuari aliqui prodiderunt. Quod & testatur Athenæus ex Diphili autoritate, vnde philcrum eam vocant. Columella condire docet: vt sæpius diximus in aliis oleribus. Apitius ita condit. Pastinacæ, seu carotæ, frictæ cum ænogaro inferuntur. Vel carotas sale, oleo puro, & aceto inferes. Vel carotas elixatas & concisas cum cumino & oleo decoques, & inferes, indeque; cuminatum colicorum facies. Platina: Bis elixanda est pastinaca, prima decoctio abiicitur, secunda cum lactuca coquitur, inde in patinam translata cum sale, aceto conditur. Piperi condita esui peraccommodè datur. Frigi etiam excauata post primam concoctionem in oleo, & liquamine farina inuoluta solet. Conditur cariota eo modo, quo & pastinaca, sed suauior habetur, quæ sub calido cinere, & carbonibus coquitur. Subtracta vbi paululum refrixerit, depilanda est, & omnino abstergendus cinis, tessellatim concidenda, in patinamque; transferenda, addendum sal, irrorandum oleum, atque; acetum, ex defruto, vel sapa non nihil addendum, inspergenda aromata dulcia.

Dioscorides παρλινον vocat. Theophrastus videtur δαυκον vocare, quippe Athenæus Theophrastum pastinacæ meminisse dicit. Nec de ea verbum apud Theophrastum extare vidimus, nisi libro nono, capite quintodecimo. Daucus



Spartensi agro præstatiores ceteris. Huic vis calefactoria est, & radix nigra, quod idē capite vigesimo secundo retulit. Daucos agro Spartēsi Achaiæ laudatissimū referunt, natura calefacere, radice nigra. Cassianus daucū vocat. Diocles solus staphilinum dixit, ex Athenæo. Staphilinū vocauit Columel. in suo hortulo:

— Mollemq; sinum staphilinū in umbret.

Idē Columella tā feræ, quā edomitæ pastinacæ nomen esse staphilinum à Græcis impositū his verbis indicat: Tum agrestis pastinaca & eiusedē nominis edomita, quā Græci *καυκίον* vocant. Latinis pastinaca, nomen ei à pascendo datū videtur. Natura ei calens, sapor vehemens, corpus alit, & cit venerē. Idēq; nomē Italīs, vel *carote*, quod nomē etiā ab Apitio scriptore antiquo vsurpatur. 10

Genera.

Pastinacæ duo genera Græci tradunt, satium vnum, erraticum alterum. meminit Dioscorides sylvestris pastinacæ, & satiaæ. Plinius ex his: Pastinacæ vnum genus agreste, sponte provenit, staphilinas Græcè dicitur: alterum seritur radice vel semine: tertium genus hibiscum, quartum daucos, cuius generā quatuor fecere. Apud nos trium est generum. Sylvestre vnum, satia duos, album & rubrum, siue nigrum, & tertium croceum.

Descriptio.

Sylvestrē Dioscorides describit: Folia gingidii habet, latiora, subamara, caulē rectū, scabrū, umbellā similē anethi, in qua flores insunt, cādidi, & in medio purpureū quoddam, fermē croceū habentes. Radix digiti crassitudine dodratāli, odorata, quæ cocta mādatur. Satia ita depingit: Cibo aptior. Muscario tertii dauci. Addimus nos. Sylvestri per omnia similis, sed flores in medio purpureū quoddā non habet, radice lōga, brachiali crassitudine, longitudineq; colore tū albo, tū purpureo, vel sanguineo. Iulio & Augusto floret. Semē daucos simile producit. Hoc genus rubrū videtur Theophr. descripsisse in suo daucos 20

Calam.

Theophrastus in Spartensi Achaiæ agro præstantiores nasci scripsit.

Solum.

Columella altē pastinatū, & stercoreatum solū optare dixit. Palladius solum pingue, & altius pastinatum. Plinius: Solum quā altissimē refossum.

Satio.

Columella autumnō & vere feri posse, vel circa calendas Septēbris, vel melius ante calendas Martias Februario feri. Sed locis siccis tepidisq; possunt citius ca idus Ianuarias terre cōmitti: quā rarissimē ponēdē sunt, vt maiora capiāt incrementa, nec est alius cultus, nisi vt sarritionibus herbę tollantur. Cōmodissimē autē deponentur prima parte Septembris, vel vltima Augusti. Plinius: Pastinaca seritur vere, & autumnō, magnis seritur intervallis, nullōve minus, quā ternorum pedum, quoniam spatiosē fruticat. Seritur radice, vel semine primo vere, vel autumnō, vt Higino placet, Februario, Augusto, Septembri & Octobri. Palladius ex his: Februario ē semine ponetur, & plantis rarā stauies, vt robur accipiat. Apud nos serūtur, vbi primum Augusto terra imbribus madefit vsq; ad Decembrem, sed quas Augusto seueris, velluntur Decembri, quas verō Decembri seueris, Martio ieiuniis quadragesimalibus explendis. Spargi- 40  
ent fusim semen in porcis, & transfertur, optimē provenit, alius labor superfluous est, quum solo altē pastinato, & large satō proveniat optimē.



## De sifere. CAP. LXXVII.

**T**ERRA etiam conditur sifer, vt pastinaca, ex Plinio. Ipsum Tiberius Princeps nobilitauit, flagitans omnibus annis è Germania. Inest longitudine neruus, qui decoctis extrahitur, amaritudinis tamen magna parte relictâ, quâ mulso in cibis reperata, etiâ in gratiâ vertitur. Neruus idē & pastinacę maiori, duntaxat annicula. Dioscorides radicē decoctâ, ori gratam, & stomacho vtilem, & appetentiam inuitare scribit. Columella eius condituram docet. Ianuario, & Februario siferis radicem eadem ratione, qua olusatrum condiebamus. Conditur & quum exegerit vsus, eximes de fidelia, & oxymelli cum exiguo oleo superfundes. Varro apes ex siferis flore liquidum mel facere scripsit.

Græci *σίσαρον*, Latini sifer.

Nomen.

Plinius duum generum esse dicit, satium & erraticum.

Genera.

Dioscorides eius formam, vt pote notam describere dedignatus est, ob id nostro æuo ignota. Est apud nos planta pastinacę similis domesticę, sed gravior, radices verò dissimiles, nam multę sunt pendulę, bulbosę, teretes, & oblongę asphodeli modo, & vesicę sunt.

Descriptio.

Tyberius Cæsar è Germania flagitans omnibus annis. Gelduba appellant castellum Rheno impositum, vbi generositas præcipua, ex quo apparet frigidis locis conuenire, ex Plinio.

Culm.

**20** Stercorato & alte pastinato solo conualescit, ex Columella.

Solum.

Columella duobus temporibus feri posse scripsit, autumno & vere, vel circa calend. Septembris, vel melius ante calend. Martias Februario, locis siccis, aut tepidis. Circa idus Ianuariæ terræ committi potest, sed quam rarissimè ponatur, vt maiora capiat incrementa: nec est alius eius cultus, nisi vt sarritionibus herbę tollantur. Commodissimè autem deponitur prima parte Septēbris, vel vltima Augusti parte. Plinius: Siferis satus mensibus Februario, Martio, & Aprili, Augusto, Septembri, Octobri. Seritur vtroque tempore, vere & autumno, magnis seminum intervalhs, nullòve minus, quàm ternorum pedum, quoniã spatiosè fruticat, transferre melius. Sed in siferis satione Ruellius doctissimus, & Matthiolus lapsi sunt, putâtes scri posse oculis radice excisis, quod Plinius de elenio dixerat, excipiens à Dioscoride & Columella, vt diximus.

Satio.

## De arō. CAP. LXXVIII.

**P**RIVS QVAM radicibus finem imponamus, de arō nobis dicendum videtur. Dixit Theophrastus cibo quoq; idoneum esse; & folia eiusdem decocta in aceto mandi posse, suauia profecto. Dioscorides item ait: Radix decocta estur, quum nimis acris sit, folia ad esum conduntur, & acida per se decocta manduntur in totum: ob miorē eius acrimoniam in cibis expetitur. Plinius: Aron miris laudibus extulere, in cibis fœminā preferentes, quoniã mas durior esset & in coquēdo lētior. Galenus, Ari radix, rapi modo manditur.

**40** In quibusdam autē regionibus acrior quodammodo nascitur, vt dracontio fe-



rè similis sit. Dum recte parare voles, prioris decoctionis aqua effusa, repente in alteram calidam iniicere conuenit. Cyrenis contrà quam in nostra regione arum se habet, illic nimirum medicamentosum, minimumq; acrimoniæ possidens, adedò vt vel rapis sit vtilius, iccirco radicem quoq; in Italiam comportant, vt quæ non putrescat, aut regerminet, ac longo tempore perdurare possit. In aqua elixa estur cū sinapi, & aceto, & oleo garo, quin etiã cum obsoniis, & sale & iis, quæ caseo constant, sumitur. Aquæ nos in Asia aridæ radices aciores sunt. Neapoli adedò acres sunt, vt linguam, palatum & fauces incendunt. Cæsar de bello ciuili tradens. Est etiam genus radicis inuentum ab iis, qui fuerant cum Valerio, quod appellatur chara, quod admistum lacte multum inopiam leuabat, & similitudinem panis efficiebat, eius erat magna copia, ex hoc effectos panes, quum in colloquiis Pompeiani famem nostris obiecerent, vulgò in eos iaciebant, vt spem eorum minuerent: & paulò post, Exercitus optima valetudine utebatur.

## Nomen.

Græcis ἄρον, Theophrasto ἄρρον, apud Syros iupha vocatur. Dioscoride auctore. Phantias scribit dracunculum iam arum dici, ex Athenæo. Galenus charum vocat. Latini arum. Itali iaro,

## Descriptio.

Theophrastus. Radix fungosa, mollis, & cortice nuda. Folio item cauo, & cucumeraceo, caulem multum reddens. Radix inferius crassa. Quamobrem dubitabit sane quispiam, an debeat inter radices connumerari: nam radix, quæ sub tellure coheret, quare postrema non tenuior est, & in acutius assidue tendit, sed è contrario crescit. Caules & supernæ partes breues, pusilleq; sunt, inferiores verò valdè crassæ, & prægrandes. Dioscorides: Folia emittit dracunculi ferè longiora, & paucioribus sugillata lituris, caulem subpurpureum dodrantalem pusilli specie, è quo croceum semen exit, radice dracunculi alba. Plinius: Aron magnæ cum dracontio litis, quidam enim eandem dixerunt. Radicem nigram, in latitudinem rotundam habet, multoq; maiorem, ex qua manus impletur. Addimus nos: Ante seminis partum sagacis naturæ artificio, dignum erumpit in uolucrum pedali longitudine, quod mucronata in turbinem vaginula puluillis complectitur, & suo fouet sinu, tam est diligens seruandis rerum seminibus Natura. Sed vbi fructu prægnans fathiscit in hiatum, solida pistilli facies dilutiori purpura, rutilans emergit, & anfractu penitus patente crocea semina spectantur, quæ in coronæ modum concinnè contexta imam eius partem ambiunt.

## Genera.

Theophrastus aron duplex demonstrat, vnum arum dictum, alterum dracunculum, à mensis abdicatum, solum Medicis natum. Phantias idem arum & dracunculum existimauit, ex Athenæo. Plinius Græcorum opinione in marem, & fœminam diuidit, in cibis fœminam præferens, quod mas durior esset, & in coquendo lentior.

## Satio.

Theophrastus radice feri dixit, vt omnia, quæ capitatorum generis eius modi sunt.



Theophrastus, Arorum radices fiunt atiles inhibita germinatione, fo- *Ars.*  
 liis videlicet terra obrutis. Quum enim frondibus luxuriat, perquam am-  
 plæ funduntur, sed vt radix maiore proficiat incremento, folia deflectentes  
 ipsa circum obruere solent, quo minus planta in germē suscitetur, alimen-  
 tumq; in suum resiliat caput. Vaporis etiam attractio, qua nutrimentum,  
 profectusq; accedit, ratione minime caret.

## De habaziz. CAP. LXXIX.

**P**OSTQVAM in radicum mentionem incidimus, priusquā ab his disce-  
 damus, de radice illa dicendum proposuimus, quam vulgus *habaziz* vo-  
 10 cat, quæ ab omnibus estur, maxima iucunditate, & præsertim hyeme.

Sunt qui existiment ab Hippocrate *ὀλοκωνίπδα* dici, à Tralliano cæteris- *Nomen.*  
 que recentioribus Græcis *βολβαγάζανον*, quum bulbum, & castaneam men-  
 tiri videatur, composita nomenclatione. Aegineta manicam, Mauritani  
 sua voce habaziz vocant, qua etiam voce in Sicilia & Neapoli dicitur. ab a-  
 liis Italiæ locis audio *Trasi*, & *dulcichini* dici.

Folio exit oblongo, & mucronato, caule cubitali, & anguloso, in cuius *Descri-*  
 cacumine frondes, & flores aperti videntur. Radicibus numerosis, & tenui- *prio.*  
 bus, à quibus radiculæ illæ, vt in cypero dependent, ac tandem cyperū idem  
 esse diceres, seu radices, seu totam plantam spectes, nec natalia differunt, so-  
 20 lum radicum sapore differt, qui gratus vescendo, & radix resiccata per trās-  
 uersum striata est, vt harundinum radices.

Calidum cœlum videtur exoptare, quale illud Mauritanix: nam Siciliæ *Cœlum.*  
 maritima pars Austrum versus vergens affatim producit, & si à Matthiolo  
 nuspiam in Italia spontè oriri dicatur præterquam amœnissimo Veronen-  
 si agro. In Sicilia sponte nascitur, & Neapolim venū exportant plenos qua-  
 fillos, & apud nos plantata etiam optimè producit.

Solum arenosum, quale Mauritanix, & Siciliæ maritima pars, exoptat. *Solum.*

Seruntur radiculæ illæ mense Martio. Augusto excrescunt folia, cui an- *Satio.*  
 nua sunt, radiculæ autumnò eruūtur è terra. Vbi semel seueris, restibili fœ-  
 30 cunditate procreantur è radicularum reliquiis.

## De capæ. CAP. LXXX.

**S**ED cæpinam ingrediamur. Id primo mirandum occurrit, quod Plutar-  
 chus recôditioris literaturæ author refert commentariolo illo de Iside,  
 & Osiride, quod cæpe reuiuiscit, & congerminat decedente Luna, contra  
 autem marcescit adolescente. Solumq; olerum omnium contra syderis in-  
 crementa damnaq; vices minuendi, & augendi habet contrarias. Siquidem  
 omnia crescente Luna gliscunt, & senescente tabescunt, vt in ostreis apertè  
 cognoscitur, quas syderis iuuenta complet, & vberiores facit, seniū deplet,  
 & maceriores reddit, eamq; ob causam sacerdotes Ægyptij Pelusitæ cæpe



non edebant, & id olus auersabantur, eoq; cibo simul, & feriatis, & castè degentibus interdicebant, his, quòd sitim inuitaret, illis quòd lachrymas reuocans feriarum celebritatem interpellaret, quibus Ægyptia superstitione imbutis ex ridiculæ rationes satisfaciebant. Agellius ad cæcas rerum discordias reuocare videtur. Sed capæ natiuus calor iuuenescētis Lunæ intus feruore glutinosum humorem concoquit, & terrenum cum aqueo acrioque constantius permiscet, quod munus obiri nequit, quum magna fiat aquei iactura: nam glutinosus lentor non facilè discutitur, quo fit, vt partes caparum, quæ prius humore distendebantur, eo nunc exutæ flaccescant, & velut passæ, & in rugas contractæ tabescant. Sed quum sydus orbe toto iam refulsit, & ad intermenstruum spectat, prægnans humorem parit aqueum, quem velut alimentum ex aëre perinde, atque terra, quum hærent exutæ, auidius hauriunt, quo vernaculum lentorem ieiunæ foueant prioremq; iacturam illo liquoris raptu refarciant, quo velut satiata surgunt, & ferè reuiuiscunt. Siquidem erutæ solo, diutius humi, vel in laquearibus peniles in aëre viuunt, quasi ancipitis vitæ modo è terra, modo ex aëre nutrimentum capebant: nam extra terram germinare, & humoris illectu gessere certum est. Sed acto colicolo statim euanescere, tunc, quum non sitis suppetat crassioris alimonie, quo scapus excitetur, depactæ cartilago in ceruicem abit, quin & incrementum saliuæ capis declaratur hoc illi in poris curriculo, quum edomita paululum acrimonia subdulcescat, quæ tunc aliquantum ascito humore diluitur. Sed peruestigandum, vt Aristoteles in problematibus inquit, cur capæ vnum tam acriter mordere oculos potest: vnde nomen quoque à Græcis erommyon impositum putant, perinde quasi pupillam comprimere cogeret. Origanum verò nihil eiusmodi facit, nec aliud quodpiam ex cæteris, quamquam acre. neq; enim nasturtium, quod mordacius est oblatum oculis officit æquè, vt lachrymæ profluant, vt capæ, & quum oculis admoventur, & quum comeditur lachrymas mouet. An quod acriū genus discrimine euariat numerofo, quod sua cuiq; vis consistit, rataq; habetur: nasturtium ergo quia calidius est, resiccare quod colligauerit amplius potest: nam extrudere lachrymā, quum editur, potest. ad motum tamen ad oculos, nihil propterea mouet, quia nullū mittit vaporem, est enim id & siccius, & calidius: origanum, cæteraq; id genus calida sunt leniter & sicca: quod lachrymas autem moueat, mordax esse debet, & humidum & lentum, quam obrem oleū quoq; lachrymas excutit, quamuis leniter mordeat, subiens enim, irreptansq; suam ob lentitiam & tenuitatem dolorem mouet, ac perinde humorem tabificat. At capæ vim eiusmodi sanè habet, vt quod & humore & vapore sit calido, tenui, & lento, itaque oculis admotum, eo quod vapor eiusmodi est, humorque tenuis com meat, lachrymas mouet, quumq; editur, itidem trāsmissa respiratione facere potest, Allium quidem calidum est, & acre, & humoris aliquid continens, sed

lentum



lentum non est: itaque lachrymam mouere non potest. Immo quærit etiam cur allia, & cæpe solæ ex plantis reconditæ germinari possint: an quod humore alimentoque sunt refertæ? copia igitur alimenti est, quæ germen efficere queat, idque constat argumento tum squillarum, tum etiam bulborum qui idem facere possunt. crescere autem quodque solet, quum tempus venerit. Aristoteles etiam solstitio laquearibus appensas florere dixit. Ægyptiæ gentes antiquitus per cæpe & allia iurabant. Ad id Plinius: Allium, cæpaque inter deos iureiurando habet Ægyptus. Athenæus dixit, antiquos & conuiuiis cæpam apposuisse, ut plus biberent, atque prouerbiū prorepsisse, Cæpa in potu obsonium. Porro iuxta coronarias herbas, acria, ut cæpas, allia & id genus serenda præcipit Theophrastus. Id enim multum conferre ad creandum odoris suauitatem affirmat, quod si verum fuerit, ad alteram harum causarum referre conuenit, aut quod quantum inibi mali odoris adfuerit, ea ad se alliciunt, alitur enim vnum quodque re sibi consimili, attrahens cognatum, vicinumque, quo summo residuum purius, odoratiūque relinquitur, aut quod locum suo edaci calore resiccent, siccis enim locis omnia proueniunt odoratiōra. Columella eius docet condituram. Hanc prius sole siccata, deinde sub vmbra refrigerata, substrato thymo, vel cunila composito in fidelia, iure, quod sit acetitrium partium, & vnius muricæ, fasciculum cunilæ superposito, ita ut cæpa deprimatur, quæ quum ius combiberit, simili mistura vas suppleatur.

Græcis *κεφάλιον*, quod oculorum tunicam, pupillamque compriui cogat, mordaci vapore lancinando cōnuere, cōtrahiūque cogat, lachrymas eliciendo, ut superius ex Aristotele diximus in problematis. Latinis cæpa, & neutro genere cæpe, à capitis magnitudine dicta. Itali *cepolla*.

Differunt & cæpæ genere ex Theophrasto: pleræque sunt, ut quæ à locis nomina acceperint, Gardiæ, Cnidia, Samothraciæ. Item Setaniæ, fissiles, & Ascaloniæ. Ex his Setaniæ minimæ, sed largæ, dulces. Fissiles verò & Ascaloniæ tum cultu, tum natura inter se differunt. (ideo nos de illis separatè dicemus) Colore etiam differunt nonnullæ, etenim apud Ism cætera quidem candidis similes constant, sed colore candidæ admodum proueniunt, Sardinisque similes ferè affirmant. Cretensium peculiaris maximè natura notatur. Sed Ascaloniis quodammodo proxima. ni fortè vel eadè dici debet. Plinius. Cæpe genera apud Græcos, Sardia, Samothracia, Alsidena, Setania, Schista. Ascalonia ab oppido Iudææ nominata. Est & colorū differentia. Sammo enim, & Sardibus candidissimæ proueniunt. Sunt in honore Creticæ, de quibus dubitant an eadem sint, quæ Ascaloniæ. Distant sapore tantum dulci. Apud nos duo prima genera, vnum condimentarium, quod illi *ge-thyon*, nostri *pallacanā* vocant, alterum capitatum. Genera eius austeritatis ordine, Africana, Gallica, Tusculana, Amiternina. Columella tria recenset genera, Pompeianam, Ascaloniam, & Marficam simplicem, quam rustici



vocant vnionem, ea est autem, quæ non fruticat, nec habet soboles adhz-  
rentes. Plinius cæpas, non esse syluestres dixit. Apud nos duo sunt genera:  
Augustiniana, quæ Decembri feritur, transplantatur Martio, & Augusto  
eruitur, editurque. Si verò relinquitur, iterum Septembri eruitur, diuidi-  
turq; in plura capita, ac plantatur, Martio eruitur, editurque. Si verò relin-  
quitur, iterum Septembri eruitur, diuiditurq; in plura capita, ac plantatur,  
Martio eruitur, nam porri instar longa est ceruice, ac editur. Hæc Columel-  
læ dici potest Marisca cæpa. Si relinquitur Augusto semen affert, ac illico  
obarescit. Est & alia communis, quæ Octobri feritur.

*Descri-  
ptio.*

Capitatorum corpus ferè carne, & cortice tutum est, tenui folliculo to-  
tum vestiente, quapropter non immerito in dubium venit, si hæc in radi-  
cum numerum ascisci debeant, etenim quod subter terræ cohæret, radix  
esse creditur, quod è diuerso promitur, nullam radice conditionem puta-  
mus. Si quidem radice is est habitus, vt parte posteriore semper extenua-  
ta in gracilitatem, quasi in mucronem minuatur, radix cæpe contra crescit,  
vt in latus tendens inoleseat, nam cæteræ radicales de suo latere mittunt.  
Cæpæ corpus tunicatum est, quum semper aliquid eximi potest, quod du-  
plex genus radice quodammodo exhibere videtur, habet enim carnosam il-  
lam, & corticosam, & eas, quæ ex illa proueniunt. Folio illico à radice ex-  
eunt, pediculo carentia, & concava. Ex caulibus laterales surculos non e-  
dit, quia secaulis est. Fœcundissima seminis. Quum feritur, & nucleus in-  
tumesceat, tota intorquetur, & hinc aucta rursus in nucleos discernitur, at-  
que ex vno plura efficiuntur, dum caput consummatur, & continuo ab ra-  
dice aliud atque aliud obducit, & si non euellantur, plura in dies fiunt. Su-  
per fistula capitari posse affirmant. Germen ab imis educere potest. Omnia  
capitata, partem superiorem tenuem, imbecillemque, radices amplas, car-  
nosasque gerunt: prorsus in quibus acredo inest, vel alia eiusmodi vis, ra-  
dicibus potius inest, quod ratione optima euenit, quum natura eò potius  
tendat. Hæc omnia ex Theophrasto. Addimus. Cæpa caulem vacuum pro-  
mit, florem iucundum villosum, purpurascentem, semē copiosum nigrum. 30  
Caulis à ceruice sensim comprimitur in latiore, & à lateribus reductam  
vtrinque circumferentiam, bulbi vmboni numerosa fibrarum coma apta-  
ta subest.

*Cæpum.  
Solum.*

Iulius Pollux Samothraciam commendat, ex Athenæo.

Columella. Cæpina magis subactam postulat terram, quàm altius con-  
uersam, itaque ex Calendis Nouembris proscindi solum debet, vt hyemis  
frigoribus & gelicidiis putrescat, intermissisq; quadraginta diebus, tum de-  
mum iterari, & interpositis vno, ac viginti diebus tertiari, ac protinus ster-  
corari, mox bidentibus æqualiter perfossum in areas disponi, deletis radi-  
cibus omnibus. Palladius. Terram pinguem vehementer subactam irri-  
guam stercoreari. Cassianus, in terra rubra lætari. 40

Theo-



Theophrastus semine prouenire dicit, qui prouentus omnibus commu- *Satio.*  
nis est. Seritur etiam radice, vt omnia capitata, quum tunicas habeat plures,  
& lentitiam quandam, vnde diuidunt eas in fibras, tegumenta que detra-  
hunt, deinde omne nō viuum à vitalibus semouendum censent: quum ne-  
que partes istæ viuant, nec primatum obtineant. Omnes post autumnum  
proueniunt, tepido adhuc solo, vt depositas imbres occupent. Seruntur &  
toto capite, & circumciso, sed generationes haud similes fieri solent: parte  
nanque inferiore capæ nascuntur, superiore herba tantum erumpit. Sectæ  
in rectum germinare omnino nequeunt, sed vtra sit radix, bulbus an fibræ  
10 diximus iam ex Theophrasto. Sed constat bulbum radice rationem obti-  
nere, siquidem & sub terra est, & sine fibris etiam vtuntur vice radicum: si  
verò fibræ subsunt, erit fibra bulbi radix, aut vtraque fuerit radice pars, sed  
potior bulbus, quoniam mortuis fibris viget nihilominus. Aliqui tunicas  
& fibras abscindunt, quod neutrum impediat generationem, argumen-  
tumque est, quod capullæ in cellis suspensæ germinant, tolluntur fibræ, &  
nouellas submitunt, tunica non prohibet generationem, sed defendit pu-  
trefactionem. Diligit aquam, quamquam nōnulli negent, si principio bis,  
aut ter imber incesserit: non desunt tamen, qui pluias aquas prodesse mi-  
nimè putent. Columella: Ad Calendas Februarias sereno die conuenit se-  
20 mina spargi, quibus aliquid Satureiæ seminis intermiscendum erit, vt eam  
quoque habeamus. Sed capina certè non minus debet, quàm quater sarri-  
ri. Palladius: Februario mense cepullas serimus, sed cōstat vere, & autumnō  
esse seminandas. Si tamen eas seueris, in caput crescit, & minus reddit in se-  
mine. Si capitulum ponas, ipsum inarescit, & multū semen educit. Vbi ter-  
ram parauimus, ibi areas faciemus, omnibus herbis, & radice purgatas. Se-  
remus placido, & sereno die, maximè Austro, vel Euro flantibus. Si minu-  
ente Luna serantur, tenues & aridiores prouenient, si crescente, robustæ &  
saporis humecti. Rarius sunt ponendæ, runcandæ ac sarculandæ sunt sæ-  
pius. De quibus semina colligenda sunt, iuuentur amminiculis, vbi caulem  
30 cœperint excitare. Quum niger color seminis fuerit, præferunt maturita-  
tis indicia. Vellendi sunt thalli adhuc semisicci cum semine, & sic in Sole  
siccandi. Martio locis frigidis: Octobri semine seruntur, & Nouembri.  
Martio mense cepullas seremus, & Aprili. Iulio mense serimus irriguis, &  
frigidis locis. Plinius: Seritur Amiternina frigidis, & humidis locis, & sola  
allij modo capite, reliquæ semine, proximaque æstate nullum semen emit-  
tunt. sed caput tantum, quod inarescit. Sequenti autem anno permutata  
ratione semen gignitur, caput ipsum corrumpitur. Ergo omnibus annis  
separatim semen, capæ causa seritur, separatim capæ, seminis. Cætero ca-  
pas ter fosso solo seri iubent, extirpatis radicibus herbarum. In iugera de-  
40 nas libras. Intermisceri satureiam, quoniā melius proueniat. Runcari præ-  
terea, & sarri, si non sæpius quater. Querit Aristoteles in problematis:



Cur cæpæ & allia, quò sicciora serantur, eò meliora possint euadere, exterâ autem deteriora? An quòd omnia istiusmodi maximè plena humoris cõficiuntur? Itaque terræ commissa sicciora temperamento commodo germinare incipient. Adde quod minus putrent, quum sicciora seruntur.

An.

Theophrastus folia his vere detrahenda censet, vt vina suam in imo cõtineant, neque effusa seminescant. Sotion: Capita, vt maiora reddantur; si quum transfertur, fibras, omnemque comam auferas. longè maiores cæpæ nascentur, si quum translationi locus est, in terra viginî diebus ante subacta, & tantisper reficcata, dum omnis exhauriatur humor, deponatur. Magis in capita crescēt, si detractis tunicis, nudæ pangētur. Palladius: Si capitata his voluerimus esse maiora, folia omnia debemus auferre, & sic succus ad inferiora cogetur.

Cõditura

Incorrupta durabunt, inquit Sotion, si in calidam aquam demersæ, mox insolatæ, donec penitus siccescant, paleis ordeaceis recõdantur: ita compositæ, vt nulla parte se contingant.

## De ascaloniis. C A P. LXXXI.

Nomen.

**Q**UIA ascalonias cæpas tum natura, tum cultu ab alijs Theophr. differre dixit, ideo illarû separatim meminerimus. Plin. ascaloniâ condi dixit. Græcis ἀσκαλῶνια κρόμμυα, Latinis Ascalonia cæpa. Plinius: à Iudææ oppido nominata. Alij Ascalonitides siue Palæstinas vocant gentili nomine dictas. Nos retentis pristini vocabuli rudimentis vulgò *scalogne* dicimus.

Descriptio.

Peculiarem quandam figuram, vel naturam habent, vt rectè meminisse Theophrastus, quippe ancipitem inter cæpam, allium, & porrum, similiores cæpis, sed minores, multæ, & simul coaceruatæ.

Genera.

Theophrastus: Cretensium peculiaris natura notatur, sed Ascaloniis quodammodo proxima, ni forte vel eadem dici debeat. Est in Creta genus quoddam quod semine quidem satum, ni radices crassatur, depositum verò in caulem semenque totum funditur sine capite, saporeque dulce est: id enim contrarium quasi cæpis habet, omnes namque depositæ, melius celeriusque proficiunt. Plinius: sunt in honore & Creticæ, de quibus dubitant an eadem sint quæ Ascaloniæ, quoniâ satis capita crassescunt, depositis caules, & semina. Dissât sapore tantùm dulci. Hoc genus nobis ex Caietâ affertur, vocanturque *scalogne capece*, nam maiores fiunt, aliæ acrioris saporis.

Cæl. Sol.

Cælum, quale Iudææ, & solum vt cæpæ reliquæ desiderant.

Satio.

Quia solæ fissiles, & veluti steriles ab radice cõsistunt, ideo iubet Theophrastus quum neq; ab radice crassescāt, semine seri, nō deponi. Præterea circa ver, quum germinant trāsferri. Maturę celeriter putrescūt. Si deponātur, caule adunt, & semē fundunt, tū ipsæ euanescūt. Columella: Si cæpæ semen excipere velis, capita maxima generis Ascalonij, q̃ est optimū mense Februario, deponito, quaternorum vel etiam quinūm digitorum spatiis distantia, & quum



& quum cœperint virere, nec minus ter confarrito, deinde quum fecerint caulem, humilioribus, quasi canteriolis interpositis rigorem stylosū conseruato: nam nisi arundines transuersas in modū iugataz vineaz crebras disposueris, thalli cæparum ventis prosternuntur, tantumque semen exentietur, quod scilicet nō antè legendum est, quàm quū maturescere cœperint, coloremq; nigrū habere. Sed nec patiendum est, vt perarescat, aut totū decidat. Verū integri thalli vellēdi sunt, & sole siccandi. Plinius. Ascaloniarum propria natura: etenim velut steriles sunt ab radice, & ob id semine seri illas, non deponi iussere Græci: præterea serius circa ver, quum germinant transferri, ita crassescere, & tunc properare præteriti temporis pensatione. Festinandum autem in his est, quoniam maturæ celeriter putrescunt. Si deponantur & caulem emittunt, & semen, ipsæq; euanescent. Ascaloniam mense Februario serunt nostri. Neapolitani Martio mense serunt, vt allij spicas. Primò pastinantur Maio, secundò Iunio, Augusto terra eruantur, laquearibus appensæ seruantur ad vernam sationem.

Nostri olitores inquirunt, si quis allij spicas in perforatā cæpam indiderit, ac plantauerit, in Ascalonias cæpas mutari. Ara.

*De cæpa fissili. CAP. LXXXII.*

**D**IFFERT etiam à cæteris cæpa fissilis cultu, & natura, vt scribitur à Theophrasto: ideo post Ascalonias de eis dicemus, vt clarius, quæ scribimus, elucescant. Fissilis etiam conditur, Plinio auctore.

Theophrastus *οχιρά κρημύνα*, Theodorus vertendo Theophrastū fissiles vocat, idq; quia detractis prioribus foliis altero germinat, simulq; inferius finduntur, vnde fissiles appellataz. Plinius à Græcis schista vocat. Itali *repolle maligie*.

Theophrastus. Fissilem hyeme cum sua coma relinquunt inertem, vere externa folia detrahunt, & reliqua colunt, detractis his foliis altero germinat, simulq; inferius finduntur. Quidam vel omnibus detrahenda folia censent, vt vim suā imò contineant, neq; effusæ seminescant. Plinius. Schistam cum sua coma hyeme relinquunt, vere folia detrahunt & alia subnascuntur in eisdem diuisuris: vnde & nomen. Hoc exemplo reliquis quoque generibus detrahi iubent, vt in capita crescant potius, quàm in semina. Apud nos, vt porri plantantur, vt pede distet altera ab altera, & suum vnaquæq; impleat foramen. Cespitem magnum faciunt. Æstate post Pascha eduntur. Satio.

*De gethyo. CAP. LXXXIII.*

**D**VBITATVR à nōnullis gethyū an inter cæpæ genera, vel porri reponendum fuerit. Nos inter vtrumq; locauimus, post cæpā, & ante porrum. Theophrastus inter cæpæ genera recenset. Plinius cæpam in duo genera diuidit, in capitatū, quod cæpā diximus, & condimentariū, q̃ gethyon vocat. Theop. *γέθυον* vocat. Sed sunt ex Græcis, Athenæo referēte, qui eū gethyllida, & epithillida vocat. Sed Epænetus gethyllida capitatū porrū appellari

Nomen.



tradit. Latini pallacanam vocant, authore Plinio. Ait enim. Condimentarium genus, quod Græci gethyon vocant, nostri pallacanum, sed inuenitur plerunq; gethyon, getion dici, sine y, & aspiratione. Neapolitani *porrone* vocant, quod magnum porrum præ se ferat. Sed non est à capis separatum genus. Nascitur enim in cæpinis, quum strictius satum est, aut solo minus pingui, & mascullescere dicunt.

*Descriptio.*

Ita cum depingit Theophrastus. Gethyon penè sine capite est, ceruicis tantum longæ, & ideo totum in fronde, sæpiusq; refecant, vt porrum. Singulari capite est, vt cæpa, allium, porrum. Germinat suo latere. Subtus veluti quoddam caput bulbaceum suo latere promit, vt porrum, quod folia, 16 semine etiam sublato, & arefacto prorsus caule creat. Caput multistunicis constat, vt bulbi, cæpæ, & similibus: folio cōcauo, semine ad perdurandum infirmo. Didymus gethyum simile fecit ampelopraso. Aristophanes gethyum naturam radicem alij habere dicit, Athenæo authore. Plinius: Gethyum penè sine capite est, ceruicis tantum longæ, & ideo totum in fronde refecatur, vt porrum, folio concauo. Semen infirmum ad perdurandum.

*Satio.*

E secunda sementi est, inquit Theophrastus. Post brumam Ianuario mense incipit, tunc seminant, defiguntq; gethyum, decimo, aut duodecimo die prosilit, ex recenti semine maturius. Non annicaule modo, sed à bimatu etiam fructificat, nec annum dici debet. Semine seritur nō deponitur, quia 20 germinatio tota in fronde, sæpiusq; retondetur. Diligit aquam, quamquam nonnulli negent, si principio bis, aut ter imber inceserit. Fimum cupit. Difficile germinat: humorem enim habeat aptum & non minus, sed fortitan magis temperiem ad augendum, ac patendum, oportet, quod germinaturum facile, beneq; sit. Plinius. Seritur mensibus Martio, Aprili, Maio, non deponitur. Ex recentiori semine maturius gignitur. Radix diuturna: quia ex ea nascitur.

#### De porro. CAP. LXXXIIII.

**E**T in hac cognatione de porro dicendum, inquit Plinius: præsertim quum sectiuo nuper authoritatem dederit princeps Nero vocis gratia, ex oleo statis mensium omnibus diebus, nihilque aliud, ac ne pane quidem vescendo. Fama est Melam equestris ordinis reum ex procuratione à Tiberio principe accersitum in summa desperatione succo porri ad trium denariorum argenteorum pondus hausto, confestim expirasse sine cruciatu. Ampliorem modum negant noxium esse. Sed cur porrum prosit ad vocem sonoram quærit Aristoteles libro problematum. nam & perdici commodum eadem in re nouimus. An quod allium quoq; elixum delinit, & quidem porrum lentitiam quandam obtinet, quæ fauces detergere possit. Porrum non olere scribit Sotion, qui cum inu prægustarint: hoc enim esu grauis odor extinguatur. Capitatos porros, vt Athenæus est author, Latonæ sa- 40 cros



eros esse narrant: nam quum Apollinem in vtero gestans, prægnantiū malacia laboraret, hoc cibo fertur elanguentem appetentiam inuitasse: quare Polemon vetustus Aristophanis enarrator, quum id olus Latona concupisset, latam fuisse Delphis legem tradit in Theoxeniis; Qui maximum attulisset porrum huic deæ, sportulam è mensa sacerdotum acciperet. Scque vidisse fatetur Athenæus gethyllidem in rapi magnitudinem excreuisse. Diphylus obsonia commendare dixit. Esus in olere, vbiuis frequens.

Græcis *παράσας* dicitur à colore, Latinis porrum, à callosa porri capitis simillima in ossibus ferruminatis concretione, vt coniecimus. Alij porrum  
10 volunt dictum, quod porrò eat, & longè lateq; grassetur. Itali *porro*.

Porrorum duo genera, syluestre & satiuū, agreste ampeloprason dictū, de quo dicturi sumus mox in sequenti. Satiui duo genera signauit antiquitas, capitatū & sectiuū. Capitatū Dioscorides *κεφαλῶδες* vocauit, quod eius radix in caput crescat. Athenæus gethyllidas dici testatur ab Epæneto. Alterum genus sectiuum vocant, quod frondenti coma super terrā eminens auferatur. Videtur id genus Martialis Tarentinum vocare ob grauem halitum quem eructat: Genera.

*Et Tarentini grauius redolentia porri*

*Edisti quotiens, oscula clausa dato.*

10 Sectiui Plinius duo genera facit. Herbaceū folio incisuris eius euentibus, quo vtuntur medicamentarij. Aliud genus rotundioris folij, suauiorisque, incisuris lenioribus. Sed miror antiquos porrum in duo genera diuisisse, quod vnum naturale, alterum artis mangonio confectum sit.

Theophrastus annuo folio non dici debere autumat, quippe nō annuo folio, sed à bimatu fructificare. Vnicaule esse, nec è lateribus laterales surculos emittere. Semine foecūdisimo. Semine ad perdurandum firmo. Plinius ait, nō annum tantū, sed sæpius parere: renasci enim à radice: semine firmo. Addim' nos. Porrū radice est cartilaginea, crassa, multis fibris capillata, tunicis quibusdā vestita, ex albæ ceruicis angustis extuberans, fronde  
30 super terram carinata, & in angulum oblonga, colore adeo viridi, vt pro herbaceo porraceus color vsurpetur, bimum profilit in caulem longum, cauum, multis floribus acervatim collectis, & in speciem absolutæ pilæ cōglomeratis. Vbi sementem protulit, intermoritur.

Palladius loco lato, & campestri latari ait. Nos omne cœlum sustinere  
vidimus. Columella aricinum laudat. C. am.

— *Qua mittit Aricia porri.*

Martialis: *Mittit præcipuos nemoralis Aricia porros,*

*In niueo virides stipite cerne comas.*

Plinius laudatissimos in Ægypto, mox Orchix, atque Aricix.

40 Palladius plana, alte pastinata, diu subacta, & stercorata terra latari. Plinius: Insigne quod infimo, latoq; solo gaudeat, rigua odit, & tamen proprietate quadam soli constat. Solum.



*Satio.*

Theophrasto è secunda semēti est. Post brumā Ianuario mense defigitur porrum, duodeuigesimo die, & vigesimo à satu prorumpit, è recentiori semine celerius prouenit. Cuius causam in libro de causis disquirat. Quia omne calidum facillè germinat, & calida sunt, quæ acria, porrū verò, gethyū, satureia, origanum acria sunt, & tamen non cito germinant, sed humorem habeant aptum, temperatumq; ad augendū, pariendumq; oportet, quod cito breuiq; germinaturū est. Columella: Mense Februario porri semen ponitur; locis apricis circa Calendas Martias licet porrū (si iam ingranduit) transferre. Circa Calendas Aprilis æquè transferes. Porri caput circa idus Maias tolerabiliter adhuc trāsfertur. Sotion admonet, post sationē porrū, statim cōculcādos esse sulcos, & nō irrigādos, sed neglectos relinquēdos per tres dies, quarta verò rigari debere, ita enim pulcherrimos prouētu- 16

*Ars.*

Theophrastus porro recisionē conferre dixit, tōsumq; re tōsumq; tenerius, dulcius, albidius, & omnino melius euadere: rationēq; reddit libro de causis, quippe q̄ diminuuntur, eo magis vere cōcipiunt, & si validiores fiunt, plus pabuli trahūt, meliusq; incoquere possunt. Germinatio enim prima, vt debilis, deterior etiā: præterea frondibus illis ablatis, vtpote impedimento ablato plus proficit. Columella: Si sectiuū facere velis, densius satū præceperūt priores relinqui, & ita quū increuerint secari. Sed nos docuit vsus longè melius fieri, si differas, & eodem modo quo capitātū modicis spaciis, id est inter quaternos digitos depangas, & quum conualuerit deseces. In eo autē, quod magni capitis efficere voles, seruandum sit, vt antequā translatum deponas, omnes radículas amputes, & fibrarū summas partes intondeas: tum testulæ, vel conchulæ, quasi sedes in singulis subiectæ seminibus adobruuntur, vt fiant capita latioris incrementi. Cultus autem porri capitati assidua sarritio, & stercoreatio est, nec alius tamen sectiui, nisi quod toties rigari & stercoreari, sarririq; debet, quoties demetitur. Palladius: Si porrum sectiuum facere velis, post duos menses, qui satus est, poteris disseccare, & mandare in arcis suis: quamuis asserat Columella etiam sectiuum diutius duraturum, melioremq; si transferatur, & quoties secabitur, aqua iuuetur, & stercore. Apud nos qui temperatis degimus locis, seritur Decembri, Ianuario, Februario, & Martio, semine fuso, Martio deinde transfertur, pangiturq; in sulcis: diutet alter ab altero quatuor digitorum latitudine, quum rectè accommodaueris, dum secundus ducitur sulcus, effossa humo cooperitur, atq; pedibus leuiter calcatur. Primo secatur Iunio, stercoreanturq; & irrigantur, secundo Augusto, tertio Septembri, eandem semper operā imponendo. Post mensem eruuntur, exponunturq; vāno. Alij serunt palo foramine adactō, pedem profundo, radículas amputant Aprili, Maio, & Iunio. Seruntur etiam Iulio, Augusto, Septembri, & Octobri. Inde eruuntur Martio, & Aprili. Poteris etiam inter capas serere. 40  
Palladius: Si capitātū facere velis, quod vere scueris, Octobri mense trans-  
ferre



ferre debebis; sed rarius seras, sarculo frequentandus est, & herbis liberandus, quum digiti crassitudinem habuerit à media parte præcisus foliis, & truncatis radicibus transferatur. Oblitus fimo liquido quaternis, vel quinis digitis separetur: quum radices aget, modicè comprehendendus, & aluendus est sarculo, vt suspensus à terra, quod spacij vacuum subter inuenit, capitis vastitate cogatur implere. Columella. Quo porri incrementum maius fiat. raris linteolis complura grana illigantur, atq; ita obruuntur. Enatum autem in his locis, quibus aqua subministrari non potest, deferri debet circa æquinoctiū autumnī, at quibus possis humorē præbere, 10 mense Maio rectè transfertur. Palladius: Item plura semina in vnum ligata si deposueris, grandis porrus nascetur ex omnibus. Item si capiti eius rapæ semen immittas sine ferro, & pangas, multum fertur incrementum, melius si frequenter hoc facias. Theophrastus, Porrorū magnitudo ex transhalatione fit. Et semina plura linteolo deligata terræ mandari iubet, sic radices, & germina faciet ampliora. Plus enim valent quæ plura, & illa omnia in vnam naturam coalescunt. Sotion Græcus laudat statim, atq; satum fuerit, pulu- uos arearum pedibus proculcari, triduumque velut habitū neglectui mi- nimè rigari, quarto die aquæ respersu iuari, ita probatissimum nasci pu- tat. Si inter serendum arena terræ misceatur, vberimum prodibit, si dum 20 transfertur, capiti stilo vel arundine citra feriū puncto cucumeris semē in mediū inseras, mirum in modū fertur grandescere, quando seminiis coalescentibus in magnū tumorem extuberabit. Sunt qui nō cucumeris, sed rapæ semen ventri potius insinuent, hoc in vnitatem coiens, turgidam capiti molem adfert. Item si quanta tribus digitis carpi possunt, oblita fimo semina vetere linteo ligata deposueris, grādis porrus nascetur ex omnibus, si protinus irrigetur. Hoc falsum esse iam supra declarauimus.

Vermiculos paruos porros insectantes Theophra. *πρασσονειδαι* vocat, *Inf. rem.* quasi porricidas dicas, hos humor collectus interimit, & fimus acruatim iniectus: industria enim bestiola condit sese, & vt in stramento, quiescit in 30 stercore: quamobrem venari facile est, aliter nulla venandi datur facultas.

*De ampelopraso. CAP. LXXXV.*

**A**MPELOPRASON Galenus inter porrum, & aliū medium quoddam esse dicit. Nos post porrū locauimus, dicturi mox de allio. Ipse syluestre porrum esse testatur, & tantum à porro dissidere, quantum in congeneribus syluestre à satiuo. Syluestria enim omnia maiori acrimonia, sicciorique natura pollent. Salgamarij cæparum modo in aceto condiunt, & vsque ad sequentem annum recondunt, & sic innocentius redditur.

Dioscorides *ἀμπελόπρασον* vocat, quasi vineale, vel vitigineum porrum *Nomen.* dicas, nomen à natalibus inditum. Plinius ampeloprason vocat. Neapoli- 40 tani porriui, & porri seluaggi.

Plinius ita describit: Folij porri, ructu grauis. Addimus: Caule profilit *Descr.*



cubitali, foliis porraceis, sed angustioribus, flore candido, radice bulbosa.

*Solum.*

Plinius, Prouenit in vinetis.

*De allio.* CAP. LXXXVI.

**A**LLIUM Plinius ad multa ruris medicamenta prodesse credit, tædium huic quoq; halitu, vt cæpis, nullū tamen coctis. Menander è Græcis author est, alliū edentibus si radicem betæ in pruna tostā superederint, odorē extingui. Sotion, Allium edentibus halitus tædium dixit aboleri, si crudam fabam supermanducauerint. Plinius: Ferrum ad se trahente magnetē lapide, & allio rursus abigente à se. Cassianus: Magnes attrahit ferrum: expirat si illi alliū affricetur: reuiuiscit sanguine hircino ipsi infuso. Plutar- 10 chus: Magnus alij cum magnetē dissensus, quam vocant antipathiam, tantumque inter has res surdas, & sensu carentes odium, vt ferrum abigat à se, si affricetur allio lapis. Idem confirmat Ptolemæus, magnetem non trahere ferrum, si linatur allio. Quærit Aristoteles in problematis, cur allia quum exaulescunt plenius quàm recens edita oleant. An quod recētia humoris multum adhuc extranei continent? quo fit, vt vim suam integrā habere nequeant, quum autem decocta iam sunt, secreto humore illo inutili tum suum odorem sincerè adipiscuntur, qui scilicet acer est. Quin etiam cæteri nuper æditi fructus dilutiores sunt, & cæpas recentiores ob eam causam minus acres sentimus. Si iuxta coronarias herbas seratur, magis eas 20 olere facit, cuius rationē ex Theophrasto reddidimus in cæpis. Panthæra, leonesque non attingunt perunctos allio, præcipuè si & allium fuerit incoctum. Allium cæpasque inter deos iureiurando habet Ægyptus, ex Plinio. Nominant Græci σκρόδον, vt nonnullis placet quasi σκῆδον ῥόδον, id est rādem rosam, quòd aspere supra modū redoleat & nares offendat. Alij quòd pandiculationes moueat, quas Græci σκροδισμὸν vocant, scorodon vocatum dixere. Latini allium dicunt à Græco fortasse verbo ἄλλωδω, id est exilire, quòd nimium exiliendo crescat. Itali aglio.

*Nomen.*

*Genera.*

Theophrastus. Discrimen eorum quod aliud præcox, aliud serotinum: est enim genus quoddam eiusmodi, vt sexaginta diebus perfici possit. differunt præterea magnitudine singulari, vt Cyprium vocatum maxime tale est, quod non decoquunt, sed in myrtotis vtuntur, & quū tunditur mirum quàm spuma increseat. Quin & illud differentiam facit, quod quædam non nucleis coagmentantur. Dioscorides in duo etiam diuidit, in satium hortense vnum, alterum sylvestre. Satium aliud Ægyptium, singulari constans capite: aliud ex pluribus coagmentatum nucleis, sylvestre ophioscorodon dictum. Plinius à Theophrasto. Generum differentia in tempore: præcox maturescit sexaginta diebus. Tum in magnitudine. Vlpicum quoque in hoc genere Græci appellauere allium cypriū, alij antiscoridon, præcipuè Africæ celebratum inter pulmentaria ruris, grandius alio, tritum in 40 oleo & aceto, mirum quantum increseat spuma.

Theo-



Theophrastus. Folia illico ab radice exeunt, vnicaule. Plinius: Tenuis. Descri-  
simis, & quæ separantur in vniuersum velatur membranis, mox pluribus ptia.  
coagmentatur nucleis, & his separatim vestitis: asperi saporis: & quo plures  
nuclei fuere, hoc est asperius. Addimus: Fronde viret capacea vel grami-  
nea, caule tereti, & inani. In cacumine flores in globum circumaguntur, in  
quo semen emicat. Bulbis è multis nucleis vna spicatim congestis, mem-  
braneis cuticulis inuolutis, è quorum medio fibrillæ tortiles porriguntur.

Sotio optimè alba terra prouenire ait. Palladius idem. Terra maximè Solum.  
alba feritur, fossa, & subacta sine stercore.

10 Substinet quodcunque cælum. Vniuersale enim olus est. Cælum.

Theophrastus hæc de allij satione: Allium ante solstitia, aut paulo post Satio.  
solstitia, feritur, nucleatim diuisum: perfici enim semine potest sed tardè.

Primo anno caput accipit porri, sequenti discerni in nucleos incipit, tertio  
redditur perfectum, nec quicquā deterius. Sed etiam quidam vel deposito  
melius id existimant. Radicis autem allij, aut capæ, haud similis ortus fie-  
ri solet. Allij namque quum nucleus extumuerit, tota intorquetur, & hinc  
aucta in nucleos rursus discernitur, atque ex vno plura efficiuntur, dum  
caput consumatur. Etenim si non euellantur, plura in dies fiunt. Super fi-  
stula quoque & allium capitari posse affirmant. Neapoli continuè visitur,

20 vt mihi multoties videre contingit, in allij flore, quem diximus, orbicula-  
tos bulbillos paruos prouenire, vt quot fuerint flores tot bulbos producat.

Quando feruntur allia, diuidere bulbos in nucleum solent, & caparum  
fibras, tegumenta q; detrahunt: denique omne non viuum à vitalibus se-  
mouendum censent, vt etiam arboribus partes, quæ obarescunt, abscinde-  
re solent. Columella: Autumno conseri debet allium. Et vltima temporis  
positio allij est Februario mense. Circa calendas Octobris antequam depo-  
nantur allia, ex vna capite in plura diuiduntur, habent enim plures cohæ-  
rentes spicas, exque quum sint diuisæ, liratim seri debent, vt in puluinis po-  
sitæ, minus infestentur hyemis aquis. Est autem lira similis ei porcæ, quam

30 in sationibus campestribus rustici faciunt, vt viginem vitet. Sed hæc in hor-  
tis minor est facièda, & per summam partem eius, id est in dorso, inter pal-  
maria spacia, spicæ allij disponendæ sunt. Sulci lirarum inter se distent se-  
mipedali spacio, deinde quum ternas fibras emisserunt spicæ, sarriantur: nam  
quò sæpius id factum est, maius semina capiunt incrementum. Regionibus  
pruinosis per autumnum non seri debet: nam brumali tempore corrum-  
puntur, quod ferè mense Ianuario mitescit, & ideo frigidis locis tempus  
optimum, est allium ponendi circa idus prædicti mensis. Multa tamè ante  
calendas Ianuarias medijs diebus serunt mense Decembri, si cæli tepor &  
situs terræ permittit. Palladius ab eo: Nouèbri mense sulcos in areis facies

40 & semina in locis altioribus pones quatuor digitis separata, neq; altius pres-  
sa, sarculabis frequenter, inde plus crescunt. Plinius: quidam allium in pla-



no feri vetant, castellatimq; grumulis imponi distātib; inter se pedesternos. Inter grana quatuor digiti interesse debent: simul atque tria folia eruperint, sarriri. Grandescunt quo sapius sarriuntur. In frigidis vtilius vere feri, quā autumno. Sunt qui allium inter compitalia, ac saturnalia feri aptissimè putent. Allium & semine prouenit, sed tardè. Primo enim anno porri crassitudine capite efficitur, sequenti diuiditur, tertio consummatur, pulchriusq; tale existimant quidam. In semen exire non debet, sed intorqueri caulis sationis gratia, vt caput validius fiat. Apud nos ponuntur spicæ Septembri, vbi quatuor foliorum fuerit, primo foditur Octobri, secundo Decembri, tertio Ianuario, quarto Febuario. Si spicas quæris eruuntur 10 Maio: si reliquis, erit Decembri tenerrimum.

*Ars.*

Quo vassiora capita fiant, docet Columella, Antequam caulem faciant, omnem viridem superficiem intorquere & in terram sternere conueniet. Sed quandocunq; vel conferemus, vel iam matura in tabulatum reponeamus, seruabimus in iis locis, quibus aut obruentur, aut eruentur, vt Luna infra terrā sit: nam sic sata, & rursus sic recondita existimantur, neq; acerrimi saporis existere, neque mandentium halitus inodorare. Palladius ab eo: si capitatum facere volueris, vbi cœperit caulis prodire, proculca, succus reuertetur ad spicas. Fertur si Luna sub terris posita seratur, & item sub terris Luna latente vellatur, odoris fœditate cariturum. Plinius: Caterum 20 vt odore careant, omnia hæc iubentur feri quum Luna sub terris sit, colligi quum in coitu. Allia tradit Sotion dulcescere, quorum fractæ leniter spicæ serantur, dulciorem contrahere saporem, quæ in pangendo olearum fraces admiserit. Idem asserit, allium, si Luna sub terris posita seratur, & item sub terris Luna latente vellatur, odoris fœditate cariturum. Meliora nascuntur omnia acervatim sato semine, quā sparsa, ita certè allium serunt in laciniis colligatum.

*Cōditura*

Plinius: Quod si diutius allium, cæpamq; inueterari libeat, aqua salsa tepida capita intingenda sunt, ita diuturniora fient, melioraq; vsui, sed in satū sterilia. Alij contenti sunt primo super prunas suspendisse, abundeque 30 ita profici arbitrantur, ne germinet, quod facere allium cæpamq; extra terram certum est, & cauliculo actō euanesce. Aliqui & allium palea seruari optimè putant. Palladius: Vel paleis condita allia, vel fumo suspensa durabunt.

*De alio cyprio, siue vlpico. CAP. LXXXVII.*

**N**UNC alteram allij speciem ab hortensi dicamus, scilicet cypriū. Theophrastus id nō decoqui dicit, sed in myrtotis vsurpari. Myrtora dicebantur ab odoris fœditate, in quo caseum quoq; addebant. Plinius ruris pulmentaria vocauit.

Theophrastus κύπειον σκόπον vocat, id est cyprium allium, Columella à 40 Græcis ἀποσκόπον appellari dixit, ab aliquibus allium punicū, & vlpicum. Plinius



Plinius à Græcis ἀντισκόροdon, & allium cyprium à Latinis vlpicū dici. In Plinij verbis mendum subesse suspicor. quippe nō ἀντισκόροdon, sed ἀφροσκορόdon legendum, quippe à Theophrasto χίπειον, & à Columellæ penu ἀφροσκορόdon desumpsit, vt eius mos vniuerso suo opere perpetuus, præsertim quum in aliis authoribus nil de antischorodo tractetur. Et ἀφρο vocabulum vel ab Aphrorum gente nomenclaturam sibi vendicauit, cum Columella aphroscorodon punicum allium vocari dixit, & Plinius vlpicum præcipuè Africæ celebratum prodidit inter pulmentaria ruris: vel à spuma quam Græci ἀφρον dicunt, ad quod satis accedit Theophrastus, qui dixit, Cyprium, quum tunditur, mirum quàm spuma increseat. Et Plinius ab eo verbotenus detorquens, Trito mirum quantum increseat spuma. Hodie Neapoli *aglio di India* dicitur. Theophr. ab aliis differre magnitudine singulari dicit, nec decoquūt, inquit, sed in myttotis vtuntur, & quū tundūtur mirū quàm increseat spuma. Columella dicit vlpicū esse longè maioris incrementi, quàm alliū, habetenim velut alliū multas coherentes spicas. Addimus nos: Caule adolefcit multo proceriore, glabro, & tereti, foliis lōge vulgari latioribus, in cuius fastigio semen in eumulū congeritur, capite ex grandioribus spicis cōglomerato, quæ veluti fœdere quodā inito cōiunctæ confertim hæret, & ptenuibus teguntur mēbranis, grandiore folliculo omnes simul ambiēte: ceruice breui tunicata. Radix primū extumescit in spicas, deinde curuatur, vbi succreuerit, iterū in numeros diducitur. Odore graui Colum. in hortos:

— & olentia latè

*Vlpica.*

Calido cœlo fruitur, proinde à Plinio dictum Africæ celebratum. Nōbis ex Aprilia affertur. *Colum.*

Terra alba, fossa, & subacta sine stercore delectatur, vt allium. Palladius. *Solum.*

Quomodo à Columella seratur, diximus capite de allio.

*Satio.*

*De allio Aegyptio.*

CAP. LXXXVIII.

INTER hortensis allij species, Aegyptij meminimus ex Diosc. & Theophr.

30 Dioscorides Aegyptium vocat. Itali *aglio maschio*.

*Nomen.*

Theophrastus. Quiddam & illud differētiam facit, quod quædam nō in nucleis coagmentatur. Dioscorides: singulari constat capite, dulce, in pureum vergens parum. Negant olitores nostri Aegyptium allium, genere ab aliis diuersum, sed vulgare allium densius satum, vel tenuiori solo caput vnum accipere, quod mascullescere dicunt. *Descriptio.*

*De allio anguino.* CAP. LXXXIX.

40 DIXIMVS hortensia allij genera, accedendū ad syluestria. Huius meminere Dioscorides & Plinius, aduersus improbitatē alitum depascētium semina coctū, ne renasci possit, abiicitur: statimq; quæ deuorauere aues stupentes manu capiuntur, & si paulum commorentur consopitæ.

Diosc. itē & Sotion ἀφροσκορόdon nominant, quasi anguinū alliū dicas. Plinius illud sponte nascens in aruis, alium vocari dixit. Itali *aglio serpentina*. *Nomen.*



Descri-  
ptio.  
Solum.

Nos ita describemus: Caule foliisq; serpētariæ modo maculosis, radicis ceruice longiore, rimosa cute obsita, proximè vrsinum allium delineans. Nascitur in montosis.

*De allio vrsino. CAP. XC.*

Nomen.

INTER allij species, Plinius vrsini meminit, & nostro huic horto inferimus. Plinius vrsinum nominat.

Descri-  
ptio.

Plinius, odore molli, capite prætenui, foliis grandibus. Addimus: foliis ephemeris non lætali similibus, floribus in summo candidis. Floret Aprili, & Maio. Bulbus aliquot nucleolis oblongis sparsis, candicans: allij ædio-  
sum spirans odorem, sapore acri, sed non ingrato, magis odore, quàm ha-  
bitu allium referens. 10

Solum.

Syluis & vmbrosis, vel vdis pratensibus quibusuis obuium.

*De scorodopraso. CAP. XCI.*

POST allij & porri tractatum scorodoprason aggrediemur, quū vtriuf-  
que naturam participet. Dioscorides scorodoprason autumat quali-  
tatem habere porri, & allij, quòd coctum pari modo dulcescat, & in olerum  
vicem transeat. Galenus item: scorodoprason mistum ex gustu & odore,  
virtutem obtinens ex allio nempe & porro: sic & Paulus: Sunt qui olito-  
rum diligentia olera hæc duo in vnum veluti monstrum aliquod coaluisse  
suspicientur, quum habitu porrum simul, & allium æmulentur, vtrumque  
exprimens olus, ita & medias vires retinere. 20

Nomen.

Dioscorides: *σκοροδόπρασον*, quasi alliporrum dicas, mutuatur ab utroque parente nomen. Itali *aglioporro*, aut *porrone*.

Descri-  
ptio.

Dioscorides. Magnitudine porrum æquat: natura ei promiscua, temperans in eo allij porriq; parentum proprietates, effectus vtriusq; præbens.

*De bulbis. CAP. XCII.*

SUNT etiam bulbi è genere cartilagineo, atq; iam dictis proximi. Cato in  
horto suburbano, coronamenti omne genus è bulbo Megarico seri o-  
portere scribit. De bulborū conditura hæc à Philemone docta leguntur,  
apud Athenzū: Caseo indiget, melle, sesamo, oleo, cæpa, aceto, lasere: nam  
suapte natura, malus est, & asper. Heraclides Tarentinus ait, quod sperma  
generare videtur, tum quod multi sit nutrimenti, tum quod primam natu-  
ram in spermate & vires vniformes habeat. Vnde prouerbium, Nil profue-  
rint bulbi, nisi neruus adesset. Martialis ad illud, 30

*Cum sit anus coniux, cum sint tibi mortua membra,*

*Nil aliud bulbis quàm satur esse potes.*

Prouerbio sunt obnoxij, qui obstipo capite terrā spectant, & oculos hu-  
mi defigūt, quasi bulbos querāt, ut est apud Aristophanē. Libidinosos quo-  
que taxauit, quos ait bulborū ollā deuorasse, quasi mulierosos esse dixisset.  
Apitius de bulborū apparatu hæc habet, Bulbos oleo, liquamine, & aceto  
infe- 40



inferes, modico cumino hæc super disperso. Vel bulbos aqua tundes, & ex aqua coques, dein oleo friges. His sic facies: Accipe piper, pulegiū, organū, mel, acetum, defrutum, careotam, liquamen, & olei modicum asperges & inferes. Vel bulbos elixos in pultarium pressos mittes, thymum, organum, mel, acetum, defrutum, careotam, liquamen, oleum modice aspergas, & inferes. Varro hæc de bulbis dixit, Aqua decoque bulbos, qui Veneris vltum querunt, deinde legitimis nuptiis in cœna ponantur, sed & cum nucleis pineis, aut cum erucæ succo, & pipere, vel bulbos frictos cum garo inferes. Paulus Ægineta bulbos cibi appetentiam proritare, ac stomachum roborare dixit, si bis decoquantur, 10 vberius enutrire, ipsorumq; propulsari amarorem, semen producant, & libidinem accendunt, comedunturq; cum oleo, garo, & aceto. Plutarchus memoriam prodidit bulbos nunquam de cœlo tangi, quod non exiguitati corporis, sed cæcis rerum discordiis refert acceptū. Hercules vt est in Amalthia Euboli bulbis abstinuit, feruorem eorum causatus, & grauem halitum.

Græcis βολβός, Latinis bulbus, Italis *cepolle seluaggie*.

Nomen.

Bulborum genera plura esse descripsit Theophrastus. Differunt namq; magnitudine, colore, figura, & suauitate. Quippe quum adeo dulces quibusdam in locis prodeant, vt crudi facillimè mandi possint, vt in Chersoneso Taurica. Sed peculiaris natura lanigerorum. Est enim bulbi genus circa littora nascens, 20 cuius inter summum corticem, eamq; partem, qua vescuntur, lanea continetur natura, ex qua mappæ, aliæq; vestes quondam conficerentur, ob id lanigerum appellarunt. Indis non lanati, sed criniti nascuntur. Plinius ab eo. Theophrastus est author, esse bulbi genus circa ripas amnium nascens, cuius inter summum corticem, eamq; partem qua vescuntur, esse laneam naturam, ex qua mappæ vestesq; conficiantur. Eadem Phantias retulit, authore Athenæo. Reliqua bulborum genera differunt colore, magnitudine, & suauitate. Post eos, qui dulces in Taurica Chersoneso nascuntur, sunt qui in Africa nati maximè laudantur, mox Appuli. Genera Græci hæc fecere, bulbinem, fetanion, pythion, acrocoriō, ægilopa, sisyrrinchion. In hoc mirū, imas eius radices crescere 30 hyeme, verno autem quū apparuerit viola, minui & contrahi, tum deinde bulbum pinguescere, ex Plinio. Apud Theophrastum: Sisyrrinchion redigi ad genus bulborum desideratur, quod radice orbiculetur. Peculiare sisyrrinchio datum est, vt vna radix primò augeatur hyeme, tum ineunte vere, quod in imo excreuit, contrahatur, supernumq; crescat quod manditur. Apud Athenæum regii sunt, qui Venerem accersant, cæteris præstantiores, hos sequuntur fului, scillæ naturam æmulantes, deterrimi omnium Ægyptii. Quæ bulbinæ dicuntur, meliorem habent succum, quàm bulbi: non tamen stomacho confecerunt, quia dulcedinem cum crassitie habent. Plinius, Bulbinem Græci vocant herbam porraceis foliis, rubicundo bulbo.

40 Theophrastus. Folio valdè angusto, caulis nimirum assurgit, germen è semine laterale producit, sed ei peculiare datur, quod non simul ex omnibus se-

Descriptio.



minibus exit, sed partim anno primo, partim secundo. Tunicas habet plures, simul & lentitiam quandam. Radice pusilla inhaeret, ut omnes bulbi, qui radice sunt capitata, contra partem superiorem tenuem, imbecillemq; radicem amplam, carnosamque gerit. Antiquis bulborum facies notior visa est, quam quæ deberet representari: nostris verò temporibus usus obsoleuit, ut vix dignoscatur. Nos ita describemus: Bulbi caput ex pluribus nucleis coagmentatur, qui simul in capillitio coeunt, factis sensim eorum diuertiis, ita ut in latus pateant, vertice fibris crispato, medio torosiore, cortice tenui, foris squamosis membranis tunicata, nullo tamen folliculo omnes partes amplectente, fronde cepitria, terete, inani, angusta, in mucronē desinente, cauliculo dodrantali, in cuius fastigio flos purpureus. Mucosi aliqui, sapore insulsi, ut magis accipiendo condimenta, quam condiendo apti.

Calum.

Nicander Megarenses bulbos laudat, ex Athenæo, eisdem antiquus Caton & Marcialis,

*Quæq; viros acunt, armantq; puellas,*

*Iam Megaris veniant genitalia semina bulbi.*

Plinius è Taurica Chersoneso bulbos laudat, post hos in Africa natos, mox Appulos. Vnde Ovidius hos enumerans, ait:

*Dannius, aut Libycis bulbis tibi missus ab oris,*

*Aut veniat Megaris, noxius omnis erit.*

Bulbo.

Theophrastus radice feri dixit. E semine partim primo, partim altero puenit anno. Anatolius à cal. Nouēbris ad Februarias ferendi tēpus indicat. Plinius: Bulbos non nasci nisi ex semine priores tradiderunt. Sed & Prænestinis campis spontè nascitur, ac sine modo etiam in Remorum aruis. Effodiuntur bulbi ante ver, at deteriores illico fiunt, si finduntur. Signum maturitatis folia inarescentia ab imo: Improbant vetustiores, item paruos & longos, contra rubicundis, rotundioribusq; laus, & grandissimis.

Art.

Ut bulbi in caput crescant, & grandiore corporis callo protuberent, Anatolius testam valorum radicibus sub sterni præcipit.

### De scilla. CAP. XCIII.

**S**CILLA è genere capitatorum, siue bulborum est: et si non tamen omnis estur, nostro seremus horto, ob multiplices, quas in villa retinet utilitates, & maximas. Tradit enim Theophrastus, scyllam ante portam satam contra veneficiorum noxam amuletum esse. Fructus contentos seruat, præsertim punica mala, pediculo prius exempto. Si ficus iuxta eam seratur, ocyus crescit, minusque à vermibus infestatur: & in summa quicquid scillæ fuerit confitum, facilius germinat, & celerius gliscit. Habet enim lentorē, caloremq; insitum, ob id proficiens, in arborum putationibus, ne plagis intrudatur imber, aut sol; nam facilè morbi contrahendi periculū imminet: plagis scillam apponunt, ut eas foueat. Democritus filum sarmentum, ut citius caulescat, scyllæ infertum.



Infertum terræ mandat. Pamphilus, Scyllæ contra *Aulopus* conuellitur, vnde vulpes propter lupos latebris suis scillas apponunt. Plinius, Nobilissima est Scylla, & medicamentis nata, acetoq; exacuendo: vnde de his Pythagoras volumen condidit, atq; scyllam in ianua limine suspensam, malorum iniuriam propellere dixit, quod non subtrixit etiam Dioscorides. Scyllæ flos, vt Beritius est author, virgata specio proficiens, modo celeriter non emarcescat, largos fructuum prouentus, ac vberem annonam nobis promittit.

Græcis *scilla*, Hippocrati scellæ, & schœnum vocari Galenus est author. *Nomen.* Nomen inditum putant à squilla pisce testaceo, à tunica squamarum compactili serie composita. Tanta inter eas similitudo intercessit. Latini scylla, Varroni squilla: vnde puto nomen Neapolitanis deriuatum, *Cepolla squilla*.

Theophrastus, Caulis prius per se profilit, vt in croco, & narcisso, tamē flos *Descriptio.* ex eo emergens insidit, particulatim floret, ab ima sui parte incipiens, floret ter, singulis suis floribus singulas semētes, quæ ternæ sunt, denuntiat. Primus enim florum prouentus, arandi primum tempus ostendit, secundus medium, tertius nouissimum, quum flos lenuerit, folia demum multis post diebus emicant. Prorsus pediculo vidua, ab radice pullulat. Aliud, atq; aliud producit. Radix multiplicibus tunicis contexta, in rectum agitur. Itaque duplex radicis genus exhibere videtur: habet enim capitatam illam, & carnosam, & eas, quæ ex illa proueniunt. Quapropter dubitabit sanè quispiā, an hæc in radicem numero ascisci debeant: siquidem radicis is est habitus, vt parte posteriore semper extenuata, in gracilitatem semper acuminetur. Scillæ radix contorta crescit, ita vt latus tendens inoleseat, item cæteræ lateribus foras iaciunt, illa glabra, & medio capite capillamenta quædam fundit, quibus pars extruberans alitur, quo dubitari posset, fructus ne, an radix sit. Id tamen peculiare sortitur, quod omnium maximè viuax sit, quippe solo eruta, ac pensilis viuere plurimum temporis possit. Immo ad germen excitandum valet. Plinius hæc habet de scylla: Nobilis & scyllæ natura, quod omnes herbar folium primum emittunt, mox in caulem rotundantur. In ea caulis primum intelligitur, quàm folium: caulis exit, deinde flos ex eo emergit, eademq; ter floret, tria tempora sationum ostendens. Primo flore primam arationem ostendit, medio secundam, tertio nouissimam. Nulli amplitudo maior, nec vis asperior.

Theophrastus: Vescenda est scillæ radix, non tamen omnis sed *ἡ ἀνδρική* *Genera.* vocata, quæ ab usu nuncupationem sortita est. Hæc angustiori folio, leuiorq; quàm reliqua constat. Plinius, duo genera medica. Masculus foliis albis, fœmina nigris, tertium genus cibus gratum epimenidium vocatum, angustius folio, ac minus aspero, candidissima, vtilissimaque.



# IOAN. BAPTISTAE

## PORTÆ NEAPOLITANI

### VILLAE

#### LIBER VNDECIMVS

SIVE

S E G E S.

PROOEMIUM.



**N**am ad reliqua herbatæ veniendum nobis est, unde in aruo fecundæ segetes, & lata pascua nostris sese offerant oculis: hæc enim duo superset fastigia ex iis, in quæ herbariam familiam ab initio diuiseramus, quæ cognatione, & herbatæ naturæ consequuntione sibi mutuò coharebant. Nos primum fruges, post pabula prosequemur. Cato sextum locū agro frumentatio in prædii existimatione tribuit. M. Varro tertio loco Cere-  
 rem, & Liberum veneratur, quod horum fructus maximè necessarij ad victum sint: ab his enim cibis, & potio venit è fundo. Ex frugibus primum de tritico loquemur, quum sit stirpium omnium vtilissimum, præstantissimum-  
 que, & necessarium, ex quo animantium princeps homo victum trahit. Ob id quum exactius hanc doctrinam tradere constituissemus, ad Laborias no-  
 stras, & Apuliam nos contulimus, quarum latifundia, & vastæ æquoræ planities restibili, nec intermissa fecunditate frugibus semper abundant, ut non solum cupidi agricolæ votis potiantur, sed eò opum progrediantur, ut cum principibus ferè contendere audeant. Ibi enim, quæ ab antiquioribus tradita sunt præcepta, cum recentioribus contulimus, ut quicquid boni ex utrisque esset, colligeremus, addisceremus, doceremus. Frumenti prima, & maxima duo genera sunt, auctore Theophrasto, frumentacea, & *χίσπερα*, id est, legumina. Frumentacea vocamus triticum, ordeum, zeam, typham, & cætera, quæ tritici, ordeive specimen gerunt. Legumina verò fabam, pisum, & cætera. Addit & præterea tertium genus, veluti milium, panicum, sesamum, & ad summum quæ in æstiuis sementibus communicarent appellatione. Ex quo Plinius: Sunt autem duo frugum prima genera, frumenta, ut triticum, ordeum: & legumina, ut faba, cicer: differentia notior, quàm ut indicari debeat.

Frumenti



Frumenti ipsius totidem genera, per tempora sata diuisa. Hyberna, quæ circa Vergiliarum occasum sata terra per hyemem nutriuntur, vt triticum, far, ordeum. Æstiuæ, quæ æstate ante Vergiliarum exortum feruntur, vt miliū, panicum, sesama, horminum, irio, Italiæ duntaxat ritu. Alioqui in Græcia, & Asia omnia Vergiliarum occasu feruntur. Quædam autem utroque tempore in Italia. Ex his quædam & tertio, veris scilicet. Aliqui verna, milium, panicum, lentem, cicer, alicam appellant. Sementina autem triticum, ordeum, fabam, napum, rapam. Nos dictam diuisionem sequemur. Primò triticea, post leguminea, postremò æstiuæ pertractabimus.

10 *Quid seges, & de Segetia dea, & Cerere. CAP. I.*

SEGES, auctore Varrone, pro ipsa terra accipitur iam arata, & sata. Columella de leguminibus loquens, etiam segetem vsurpauit, inquit, Quod prædictorū leguminum segetibus fatiscit, Valla fruges vocat propriè eorum seminum, ex quibus conficitur panis, nondum demessas. Per translationem Poetæ telorum, & stimulorum segetem dicunt. Cicero gloriæ segetem dixit. Hinc Segesta dicitur dea Plinio à segetibus, quibus præesse putabatur, & vt aliis placet, Segetia, Sciaq; à serendo, quarum simulachra in circo erant. Ceres dea frugum dicitur, à creando, Saturni & Opis filia, quæ peculiari epitheto alma dicitur, quia nos alit, vel, vt Cicero libro de natura Deorum scribit, dicta Ceres, tanquam getes, à gerendis frugibus. A Græcis *δημήτηρ*, quasi *μημήτηρ*, id est terræ mater, quod fructuum creatrix, & alitrix sit. Hanc etiam Thesmophoram vocant, id est legum laticem, quia antiquitus homines nulla lege vivebant, postea quum ipsa Agricultura vsum & frugum docuisset, cœptum est de agrorum finibus disceptari: ob id eam legum, & iuris originem fuisse primam volunt. Virgilius,

*Legifera Cereri, Phæboq; patriq; Lyco.*

02 Hæc quandoque pro Luna dicitur, vt Liber pro Sole. Virgilius Georgicorum primo,

— vos ô clarissima mundi

30 *Lumina, labentem cælo qua ducitis annum,*

*Liber, & alma Ceres.*

Vatrosux agriculturæ libri initio statim Cererem inuocat, quasi frugum inuentricem: erant enim homines primò *βελαρροφάγοι*, id est glandium comedones. Quod etiam ex Virgilio elicitur,

— alma Ceres, vestro si munere tellus

*(chaonicam pingui glandem mutauit arista.*

Et in Cereris sacris querna corona messoribus tribuebatur, quod frugum inuentione glandium victum aboleuerit. Virgilius,

*Et Cererem clamore vocant in tecta, neque ante*

40 *Falcem materis quisquam supponit aristas,*



*Quam Cereri tortare dimitus tempora quercus,  
Det motus incompósitos, & carmina dicat.*

Theodosius verò Cererem ait Siculi Siciliæ Regis vxorem fuisse, & priamam, quæ vsum tritici demonstrasset populis: vnde ansam Poetæ fabulandi sumpsit. Hesiodus,

*Plutanem in primis venerare, atq; annua sacra  
Vota refer Cereri, quum stius innixus agendo  
Incipis exercere boues, stimuloq; fatigas.*

*De cælo frumentis apto. CAP. II.*

**M**Axima Naturæ benignitate factum est, vt triticeum genus, ex quo in toto ferè terrarum orbe homo victum trahit, eiq; immensæ utilitatis est, vbiq; quouis cælo, & solo luxuriet, eoq; nihil sit fecundius, vt pote, quum è modio, si sit aptum solum, quale in Byzantio Africæ campo, centeni, quinquageni modii reddantur. Misit ex eo loco, inquit Plinius, Diuo Augusto procurator eius ex vno grano (vix credibile dictu) quadringenta paucis minus germina, extantq; de earepistola. Misit & Neroni similiter cccxxx stipulas ex vno grano. Cum centesimo quidem & Leontini Siciliæ campi fundunt, aliq; & tota Bætica, & in primis Ægyptus. Plurima, & ferè infinita sunt eius genera, vt quibusuis locis feri possit. Plurimis tunicis Thracium vestitur, ob nimia frigora illi plagæ exquisitum. Eadem de causa & trimestria inuenit, detinentibus terras niuib; quod tertio ferè à satumense, & in reliquo orbe metitur: totis hoc Alpibus notum, & hyemalibus prouinciis, nullum hoc frumento latius. Est & bimestre circa Thracium sinum quod quadragesimo die, quum satumense est, maturescit: mirumq; nulli frumento plus esse ponderis, & furfuribus carere. Vtitur eo & Sicilia, & Achaia, montosis vtraque partibus. Eubœa quoque circa Carystum. Tradunt in Bactris grana tantæ magnitudinis fieri, vt singula spicas nostras æquent. Sed cæli qualitates ad agrum à summo agricolarum præceptore Theophrasto petamus. Libro enim de causis quærit, quid fiat, vt & frigida loca, & calida sint fertilissima? vt in septentrione Thracia, & Pontus, in Austro Africa, & Ægyptus. Etenim supra cetera frigus, æstusq; aliquid conferunt, & aer circumfusus. Omnino ager bonæ frugis, frigora quoque multa desiderat, serenitates enim & austrini flatus vitia afferunt sæpè, æruginosasq; segetes efficiunt: frigus verò constipatis, canceratisq; radicibus magnitudinem modicam verno tempore facit, terramq; si occupauerit, cultam, rariorem, & solutiorem reddit. Si aliquod genus tunicis multis contegitur, ceu Thracium, solo hyberno cõuenientius dabitur: frigus enim nil officere potest, rarum, solutumq; ceu canchrydias vocitatum, agro pluuiosum serendum profectò est, quippe quum alimenticopiam id quoque desiderat, quamobrem & culmo crasso exurgit.

Er



Et in historiis. Differt terra à terra, & cœlum à cœlo: quædam enim loca proferre intra pauciores dies videntur, vt conspicuè in Ægypto: illic enim ordeum sexto à satumense, triticum septimo metitur, quod apud plurimos octauo. Quin & Sicilia apud Milas vocatas, agri Mesani celerem quandam fieri con summationem serorum affirmant, esse nanque sementem eorum menses sex, sed tamen cum primis vnà metere posse, qui mense nouissimo seuerit. Sed mirabilius quod in Melio fieri aiunt, sata enim intra triginta, aut quadra ginta dies metere incipiunt. Sed omnibus mirabilius, quod in Chalcia Rho diorum insula fieri solet: illic enim locum præcoquem fertilemque adeò  
 10 narrant, vt ordeum satum in eo, quum cæteris sereretur locis, metere, iterum que serere, atque cum reliquis vnà frugibus rursus metere possint. Atque in totum loca maritima tam ad hæc ipsa, quàm ad reliquos fructus festina tiora intelliguntur. Ob id fingunt poetæ Saturnum genitori Cœlo genitalia detruncasse, & in mare proiexisse, falcemque non procul à promontorio Lilybeo cecidisse, vnde loco Drepanum inditum nomen, quum falx Græ cis *σπίρην* dicatur. Quo inuolucro Poëtæ illius loci vbertatem designant. Sed à falcis forma, cui litus assimilatur, nomen Drepani inditum nemini me legisse. Columella verò dicit: Omne autem frumentum maximè campo patente, & ad solem prout, apricoque lætatur. Collis enim quamuis gra  
 20 num robustius aliquanto, minus tamen triticum reddit. Ideo fertilissimi A puliæ campi, vbi immensa planities patenti Soli obiecta. Terrarum enim  
 30 frum memorat Theophrastus plus afferre momenti, quàm ipsius arui qua litates, si ad flatum, solemque optimum vergant. Enimvero plerique agri graciles, & viciati feraces sunt, quod commodam ad hæc ipsa positionem habeant.

*De solo framenti apto. CAP. III.*

ET si varia tritici genera varias exposcant soli qualitates, vnum tamen  
 & quamplurimis commune. Vnde multum refert inspicere in ea regio ne in qua segetem instituere voles, an solum habile sit frumentis: docente  
 30 Virgilio,

*Ventos, & varium cœli perdiscere morem*

*Cura sit: ac patrios cultusq; habitusq; locorum:*

*Et quid quæq; ferat regio, & quid quæq; recuset.*

*Hic segetes, illic veniunt felicius vna.*

Sed Theophrastus pingue solum segetibus tribuit, quod alimentum illud exugant, quod summa tellure suppeditatur, neque id exiguum, neque ex uctile esse debet. Sed cur frumentum pingui terra non lædatur, ait, quia frugum omnium stipula exucta, strigosa natura est, & quæ humoris indiga, sunt auida pinguioris alimenti, hominum exemplo, qui macilentii  
 40 leiuni que sunt, ex pingui cibo summum attrahunt alimentum, & in colore



& viribus maximos progressus faciunt. Sicca corpora pingui indiga sunt cibo; quia defectus emendatur supplemento, sicciori non inuatur, quia humor non adsit, quo perflui valent, immò in periculum adducit agrotandi, & præcipuè qui ventriculo tentari solent. Solum igitur rarum & tenue, si altum siccumq; sit, frumento incommodum est; laxum enim transmittit hybernos sùmbres in profundum, quo ex loco sibi haurire nequeunt fruges, ob radicum superficialium situm. Humectum frumentis habile, quia humorem ad alendum fruges habet: siccum verò minimè bonum, quia pabulo careat, quod sufficiat. Cato agrum crassum, & letum & sine arboribus frumētis tribuit, Virgilius nigrum, putre, & densum probat,

*Nigra ferè, & presso pinguis sub vomere terra,  
Et cui putre solum (nanque hoc imitamur arando)  
Optima frumentis.*

*Nunc quo quamq; modo possis cognoscere dicam.  
Rara sit, an supra morem si densa requiras,  
Altera frumentis quoniam fauet, altera Baccho,  
Densa magis Cereri, rarissima quæq; Lyæo:  
Antè locum capies oculis, atq; inbebis  
In solido puteum demitti, omnemq; repones  
Rursus humum, & pedibus summas aquabis arenas.  
Si deerunt, rarum, pecori, & vitibus almis  
Aptius vber erit, sin in sua posse negabunt  
Ire loca, & scrobibus superabit terra repletis,  
Spissus ager.*

*Salsa autem tellus, & qua perhibetur amara,  
Frugibus infelix: ea nec mansuescit arando,  
Tale dabit specimen. Tu spisso vimine qualos  
Collaq; prælorum fumosis deripe tectis.  
Huc ager ille malus, dulcesq; à fontibus unde  
Ad plenum calcentur, aqua eluctabitur omnis,  
Scilicet & grandes ibunt per vimina gutta.  
At sapor indicium faciet manifestus, & ora  
Tristia tentantum sensu torquebit amaror.  
Pinguis item qua sit tellus, hoc deniq; pacto  
Discimus: haud unquam manibus tactata fathiscit,  
Sed picis in morem ad digitos lentescit habendo.*

Columella quæ à Virgilio excepit habet: Frumentarius ager pinguis, & dulcis sit oportet, vtrumque hoc expedita ratione contingit discere. Per exigua conspergitur aqua gleba, manuq; subigitur. ac si glutinosa est, leuissimo quouis tactu pressa inharescit picis in morem, eademque illisa humo non dissipatur, ea res admonet nos tali materiae naturalem succum, & pinguedinem. Sed  
si ve-



si velis scrobibus egestam humum recondere, & abundauerit, certum erit esse pinguem, quum defuerit, exilem, quum æquauerit, mediocrē. Sapore sic quoque dignoscemus: si ex ea parte agri, quæ maximè displicebit, effossa gleba, & in fictili vase madefacta, dulci aqua permisceantur, ac more faculenti vini colata gustu explorentur: nam qualem retulerit humor saporem, talem eius soli dicemus. Significant frumentis habilem terram iuncus, calamus, gramen, trifolium, ebulum, rubi, pruni sylvestres, & alia complura, quæ aquilegis nota, non nisi dulcibus terræ venis educantur. Nec contentos nos esse oportet, prima specie summi soli, sed exploranda est inferioris terræ qualitas, terrena nec  
 10 ne sit: frumentis bona erit bipedanea humus. Plinius, quæ Cato habet, recenset: Ebulum, vel prunus sylvestris, vel rubus, bulbus minutus, trifolium, herba pratensis, quercus sylvestris, pyrus, malusque frumentarii soli notæ. Item terra nigra, & cinerei coloris. Omnis terra, inquit, nisi permacra. Sabulum etiam, nisi id prætenue est, & multo campestribus, quàm cliuosis respondet eadem. Tarentinus, In profunda terra seminare melius est frumentum. Leontius in lutosam, & humidam terram seminandum, quia in tali magis augescit. Appuli frumentariam terram eligunt, vbi coronopus, ferula, vel sylvestris carduus nascitur, quem *sclaream* vocant, vulgò nimirum à scolymo detorto nomine. Campani ex ebulo, & herba, quam *ursinam* vocant, ruta capraria. Hæc  
 20 numerosis constat radicibus, foliis oblongis, quæ foliolis oliuæ similibus, hinc inde distinctis constant, vt in bibinella, caule alto, flore cæruleo, semine in siliquis. Hoc signum præferunt, quum à Maio mense herba solum amicitur viridi decore, quum in cæteris à Martio, & Aprili.

*De segetum cultura, & primò de aratione.* CAP. IIII.

**N** V N c de semente agitur, & de agri subactione, quæ alia est, prius, quàm seratur, alia quum seritur. Ante sationem curadum, vt terra optimè proscindatur in rectum, & per transversum, & quæ porca fuit, sit sulcus, & è contrario: postea agendū, quo tempore, hyeme, æstate, vel vere, pinguis, macra, vda, sicca, vel saxosa terra aretur, quæ omnia sigillatim nos perpèdemus. Theophrastus soli agitationem præcipit, tempus sementis indicat, & sarritionem post satum monet, in quorum tractatione non desunt, quæ iudicium prudentis coloni desiderant. Humidam terram, grauem, pinguem, & solidam æstate vertendam dicit, siccam, resolutam, leuem, tenuem hyeme. Causa est, quòd tali cultu vtrique tribuitur quod opus habet. Æstiuæ enim aratio siccatur, & attenuat, hyberna crassitudinem addit, & humectat. Cura noualium vtroque tempore suscipitur, incumbendum autem est sub frigore, & sub calore arationi, vt terra solem, & frigora sentiat; terra enim mora, & subacta, peruia redditur, & libera ab obsidione plantarum, à quibus absimitur alimentum. Nives hybernis noualibus commendantur, pruina obest, exodit  
 30 enim, & rarefacit. Post primas arationes secunda erit aratio verna, vt cespitem  
 40



inuertat ad herbas extirpandas. Tertio etiam æstate arant, quarto quum serere volunt leniter proscindendo, utpote quum solum bene præagitarum, præparatumque est: quapropter ad hoc opus præstant aratro ligones, & ligoni pastinum, maius ferramentum, quod aliis descendit, & terram inuertit. Hæc agricultura est. Vnde si qui de hac diligentia per ignauiam omiserint, id quod semel non bene fecerunt, coguntur sæpè facere, propterea quod herbarum radices non sunt per initia reuulsæ: sic anticipat herba segetum quia validior, tum quia præerat. Sed si vicissim anteuertit herbis seges, herba necantur: nam quæ suboriuntur herba, imbecilliores sunt. Catonis sententia hæc est. Vbi locus aquosissimus, frigidissimusque erit, ibi primum serito, in calidissimis postremo. Terram caue cariosam tractes. Ager rubricosus, & terra pulla, atterina rudeta, & arenosa. Quid est agrum bene colere: bene arare. Quid secundum arare. Quid tertium? Stercorare. Agrum frumentarium quum ares, bene & tempestiuè ares. Sulco vario ne ares. Varro arationes docendo, earum vocabula declarat. Terram quum primum arant, proscindere appellant, quum iterum, offringere dicunt, quod prima aratione glebæ grandes solent excitari, quum iteratur offringere vocant, tertio quum arant, iacto semine, boues lirare dicuntur, id est cum tabellis additis ad vomerem simul, & satum frumentum operiunt in porcis, & sulcant fossas, quod pluuia aqua dilabatur, nonnulli postea, qui segetes non tam latas habent, (ut in Apulia) id genus prædii per sarritores occupare solent, si quæ in porcis grandiores glebæ relictæ sunt. Quæ aratrum vomere lacunam stiriam fecit, sulcus vocatur. Quod est inter duos sulcos elata terra, dicitur porca, quod ea seges frumentum porrigit. Hesiodus Græcus arationis tempus ita præfiniuit,

— sed sydus quum deficit Orionis,  
 Pleiadesque, Hyadesque, cadunt, meminisse iuuabit  
 Protinus impresso subuertere vomere terram.  
 Contemplare etiam quum grui è nubibus altis  
 Assiduos agitat clangores, inuocat imbrem,  
 Venturamque, hyemem, tempusque, inducit arandi.  
 Præterea, quum tempus adest rescindere campum,  
 Fortius instantes opere exercere ministros,  
 Nam vertenda duplex sibi sicca, atque humida tellus.  
 Vere nono veniunt celebres ad aratra iuueni.

A quo Virgilius:

Vere nouo gelidus canis quum montibus humor  
 Liquitur, & Zephyro putris se gleba resoluit,  
 Depresso incipiat iam tum mihi taurus aratro  
 Ingemere, & sulco attritus splendescere vomer.  
 Illa seges demum votis responderet auari  
 Agricola, bis qua solem, bis frigora sensit.



— ergo age terra.

*Pingue solum primis extemplo à mensibus anni*

*Fortes innertant tauri; glebasq; iacentes*

*Puluer lenta coquat maturis solibus aestas.*

*At si non fuerit tellus fecunda; sub ipsum*

*Arcturum, tenni sat erit suspendere sulco.*

*Illic officiant latis ne frugibus herba,*

*Hic sterilem exiguus ne deserat humor arenam.*

*Alternis idem tonsas cessare non alos,*

*Et segnem patiēre suū durescere campum.*

Sed inter agricolas nemo exactius, quā ipse Columella docet: nos eius verba perstringentes, quā breuiter poterimus repetemus. Pingues cāpi, & vliginosi, post idus Aprilis proscindendi sunt, anni tēpore incalescēte, quū herbas ediderint, nec semina maturuerint, sed tā frequētibus sulcis arādi, vt vix digno scatur in vtrā partem vomer actus sit, quoniā sic radices herbarū perruptæ necantur. Sed & compluribus iterationibus sic resoluetur veruactum, vt nullam desideret occasionem, quum seminauerimus: nam veteres Romani dixerunt, malè subactum agrum, qui satis frugibus occandus sit; eum an rectè aretur ita exploret agricola. Pertica trāsuerſis sulcis inseritur, quæ si sine offensione penetrauerit, solū esse motum manifestabit, & hoc quū bubulci viderint, scamna non facient. Hoc igitur tempore quum campi arati fuerint, diebus interpositis circa solstitiū, quod est nouo, vel octauo kalendarum Iuliarū, iteratos esse oportebit, ac deinde circa Septembris kalendas tertiātos, quū id tēpus ab æstiuo solstitio cōuenit inter peritos rei rusticæ nō esse arandū, nisi magnis imbribus terra permaduerit. Quod quū accidit, nihil prohibet, quò minus mēse Iulio veruacta subigantur. Sed obseruandū ne lutosus ager aretur, quia toto anno desinit posse tractari, nec est habilis sementi, occasionē, aut sarritioni, néve semimadidus, id est quū post longas siccitates leuis plauia superiorē partē glebarum madefecerit, quā terram cariosam appellant, quia cōtinuo triennio sterilitate afficitur. Igitur in arandis agris, neq; succo careant, neq; abundant vligine. Itaq; siccitatis, quod iam proscissum est, iteratē pluuiamq; operiri, quæ madefacta terra, facilem nobis culturam præbeat. Sed iugerum talis agri quatuor operis expeditur: nam cōmodè proscinditur duabus, vna iteratur, tertia tur dodrante, in lirā statim redgitur quadrāte operæ. Liras rustici vocant porticas, quum sic aratum est, vt inter duos sulcos medius cumulus siccā sedem frumentis præbeat. Colles pinguis soli mēse Martio, si repositi celi, siccitasque regionis suadebit, Februario proscindendi sunt. De Aprili medio vsque in solstitium iterandi, tertiādiq; Septembris verò circa æquinoctium, ac totidem operis, quot vliginosi campi excolitur iugerum talis agri. Sed in arando maximè obseruandum semper, vt transuersus mons sulcetur. Paulum tamen quotiescunque iterabitur modo in elatiora, modo in depressiora cliui



obliquum agi sulcum oportebit, ut in utramque partem rescindamus, nec eodem vestigio terram moliamur. Exilis ager, planus, vliginosus primum aratur ultima in parte mensis Augusti, subinde Septembri, sic iteratus, paratusque sementi circa æquinoctium, operæ tres in iugero sufficiunt. Graciles clui non sunt in astate arandi, sed circa Calendas Septembres, quoniam ante hoc tempus æstivo sole peruruntur. Itaque optimè inter Calendas, & idus Septembris aratur, ac subinde iteratur, ut primis æquinoctialibus pluuiis conferi possit, nec in lira, sed sub sulco talis ager seminandus est. Hesiodus negat sub æstu arandam esse terram,

*Es sterilis tellus medio versata sub æstu.*

Plinius Catonis placita refert, aliqua addit. Tepidioribus locis à bruma proscindi arua oportet, frigidioribus ab æquinoctio verno, & maturius sicca regione, quàm humida. Maturius densa terra, quàm soluta; pingui, quàm macra. Vbi sicca, & graues æstates, terra cretosa, aut gracilis: vtilius inter solstitium, & autumnii æquinoctium aratur. Vbi leues æstus, frequentes imbres, pingue herbosumque solum, ibi melius caloribus. Altum & grave solum etiam hyeme moueri placet, tenue valdè & aridum paulò ante sationis tempus. Sunt & hic suæ leges. Lutosam terram ne tangito. Vi omni arato: prius quàm ares proscindito. Hoc vtilitatem habet, quod inuerso cespere herbarum radices necantur. Quidam ab æquinoctio verno proscindi volūt. Quod vere semel aratum est, à temporis argumento veruactum vocatur. Hoc in nouali, atque requieto necessarium est. Nouale est quod alternis annis seritur. Iustum est proscindi sulco dodrantali iugerum vno die, iterari sesqui iugerum, si sit facilitas soli; si minus, proscindi sensilem, iterari a sem. Palladius ea habet, quæ ab his exceptæ.

*Arationis inuentor, & instrumenta. CAP. V.*

**D**IODORVS ait Dionysium secundum ex Ioue & Proserpina genitum; vel, ut alii dicunt, ex Cerere; boues ad aratrum primum iunxisse, quum terra prius hominum manibus coleretur. Baccho cornua ascribi, quoniam iudicarunt, quod prius coniungendorum bouum author fuerit. Plinius ait: Aratrum Biges Atheniensis inuenit, ut alii tradunt Triptolemus, de quo etiam Virgilius intellexit,

*— vnciq; puer monstrator aratri.*

Seruius & Tibullus Osyrim inuentorem fuisse dicunt: nam Triptolemus frumenta diuisit, & ob id Virgilium nomen racuisse, quia non vnus in orbe monstrator aratri fuerit, sed diuersi in diuersis locis. Trogus dixit Habidem Hispaniæ Regem barbarum populum docuisse primo boues aratro domare, frumenta que sulco serere. Caterum omnia rustica ferramenta, quibus terra vertitur simul cum aratro Cererem comperisse, Virgilius dixit hoc



*Prima Ceres ferro mortales vertere terram  
Instituit.*

Varinus Herculem Buzygem dixit, quod bubus iunctis terram arauerit, à quo familia Buzygia. Iugarius deus colebatur, quod coniuges coniungeret, vel quod iuga committebat. Augustinus tradit libro de ciuitate Dei. Minerva Βοαρμία ἢ τὸ συναρμύσας, καὶ ζεύγας, quod coniunxerit in iugum & aratrum boves. Colitur autem hoc nomine apud Boetos. Pallas Πύθια cognominatur, quia humana excogitatum prudentia est bouum opera terram colere. Sed Eusebii ac Lactantii testimonio constat, ante multas tempestates, quàm esset Ceres, frumenti vsum apud mortales fuisse, præsertim apud Hebræos, & Ægyptios, vtrex Iosepho colligere licet. Aratrum quibus lignis confici debeat, docet Hesiodus:

*Temonem ex ulmo, viridi seu confice lauro,  
Stiua sit ex pino, dura dentalia quercu.*

Virgilius ex eo:

*Continuo in syluis magna vi flexa domatur  
In burim, & curui formam accipit ulmus aratri.  
Huic à stirpe pedes temo protensus in octo,  
Bina aures, duplici aptantur dentalia dorso.  
(ceditur & tilia ante, iugo leuis, altaq; fagus,  
Stiuaq; qua currus à tergo torqueat imos,  
Et suspensa focis exploret robora fumus.*

Flagellum est stimulus, quo punguntur boues: est autem prælonga arundo, vel hastile cuspidè quapiam acuminatum, quo & hodie vtimur.

*Arationis regula & utilitates. CAP. VI.*

**A**LIVÆ supersunt arationis regulæ, & utilitates, quas à Columella recensēbimus. In opere boues arctè iunctos habere conuenit, quo elatis capitibus ingrediantur, ac minus colla labefactentur. Nam si cornibus illigetur iugum (vt quibusdam prouinciis vsurpatur) resupinis capitibus excruciantur, & leui vomere terram sauciant: at hoc modo tota corporis mole nituntur, & qui altè terram proscindunt, plurimum virentibus conferunt, & segetum incremento. In Italia vbi arbustis, atq; oleis consitus est ager, altius resolui desiderat, vt summæ radices virium, olearumq; rescindantur, quæ si maneant, frugibus obsunt. Celsus exiguis vomeribus terram subigit, sed sua ratio Ægypto, & Numidiæ conuenit, vbi arboribus viduum solum, & terram pinguibus arenis putrem dente moueri satis est. Bubulcum per proscissum ingredi oportet, alternisq; versibus obliquum tenere aratrum, & alternis recto sulcare, necubi crudum solum relinquat. Boues quum ad arbores venerint retinere, ne in radicem vomis impactus colla commoueat, nève cornu ad stipitem offendat, aut extremo iugo truncum delibret. Voce potius quàm verbe-



ribusterreat, vltimaque sint opus recusantibus remedia plagæ. Nunquam stimulo laceſſat iumentum, quod calcitroſum cum reddit, ſed admoneat flagello. Nec in media parte verſuræ conſiſtat, detq; requiem in ſumma, vt ſpeceſſandi totum ſpatium, bos agilius enitatur. Sulcum non ducat longiorẽ, quàm pedum centum viginti: vbi hunc modum exceſſerit, plus æquo fatigatur. Quum ventum erit ad verſuram, boues inhibeat: & in priorem partem iugum propellat, vt eorum colla refrigeſcant, ne ex eo tumor, & vlcera inuadant. Dolabra & vomere bubulcus vtatur, vt ſummas radices, & petſectas ſtirpes refodiat, & perſequatur. Quum boues ab opere diſiunxerit, ſubſtrictos confricat, colla ſubigat, merumque faucibus iufundat, ſi æſt uauerint: antequam ſudare, & anhelare deſierint, ad præſepia ne religentur, & quum tempeſtiue potuerint veſci, paulatim cibum præbere conuenit: quem quum aſſumpſerint, ad aquam ducantur, tum reducti largiori pabulo ſatientur. Plinius præterea quæ Columella, hæc habet. Si inter arbores, vitesq; aretur, fiſcellis capiſtrari, ne germinum tenera præcerpant. Purget vomerem ſubinde ſtimulus cuſpidatus rulla.

*De occatione. C A P. VII.*

**A**RATIONEM occatio ſequitur. Eſt enim occare glebas confringere. Varro ad hanc ſignificationem accepit, inquiens: Arare, & poſtea occare, id eſt comminuere, ne ſit gleba: quod ita occidunt, occare dicunt. Feſtus occare dictum putat ab occidendo, quod cadant grandes globos terræ. Plinius, Aratione per tranſuerſum iterata occatio ſequitur, vbi res poſcit, crate, vel raſtro, & ſato ſemine iteratio. Columella: frigidioribus regionibus Septembri puluationem faciunt, quam vocant ruſtici occationem, quum omnis gleba in vineis refringitur, & reſoluitur in puluerem. Eſt & occare ſemen operire. Cicero de ſenectute: Quæ quum gremio mollito, ac ſubactò ſparſum ſemen excipit, primum id occatum cohibet, ex quo occatio, quæ hoc efficit, nominata eſt. Palladius: Arbores, quæ ablaqueatæ fuerunt, occare, id eſt operire iam conuenit. In hoc ſignificatu etiam Columella: Nam quod ſicco ſolo ingeſtum & in occatum eſt, perinde ac ſi repoſitum in horreo non corrumpitur. Sunt qui dicant occatio, quaſi occacatio quædam.

*De arui ſtercoratione. C A P. VIII.*

**S**E D ſi terra exilis fuerit, ſtercorandam eſſe poſt arationem præcipiunt veteres agricolæ. Theophraſtus ſecundo loco ante ſationem ſtercorandam eſſe terram dicit, ſed macram largius, pinguem parcius, tunc propter ſoli viturem, tum quia ſimus plus aſfert ſucci, quàm quantum percoqui poſſit: ſuperfluus enim ſuccus additus, abit in cruditatem. Addit & præceptum ſimile ſtercorationi, intermiſcendo terrenum diuerſi habitus, ſicut graui leuem, macro pinguem, ſic albo rubrum, & ſi qua contrarietas alia ſit, quippe non ſolum



lūm muruis beneficiis vtrinque; afferri quantum deest supplementi, sed etiam vim addi quandam, veluti si effœta terra fertilis permisceatur, recentabitur, & ferre vegeta facta incipiet. Argilla sterilis est, si aliis admisceatur, iuuat fertilitatem, est enim alteri altera fimi vice. Megarensium consuetudo est permiscere eas quinquennio, aut sexennio, eandem è profundo perunt, vt terraima, quæ succum retinet, in summo sit, pro ea quæ amittit in fruge succum. Intimus enim locus, quasi gremium est, in quod aqua resedit ad alendum idonea. Cato: Quid est agrum benè colere? Primum bene arare. Quid secundum? Arare. Quid tertium? Stercorare. Præcepitque columbinum finimum agro spargendum. Columella autem satis diffusè: Prius quàm exilem terram iteremus, stercore conueniet: nam eo, quasi pabulo, gliscit. In campo rarius, in colle spissius. Acerui stercoris instar quinque modiorum disponentur, atque in plano pedes interualli quoquouerſus octo, in cliuo duobus minus. Sed id decreſcente Luna fieri placet, nam ea res herbis liberat segetes. Iugerum, quod spissius stercoretur, desiderat vehes quatuor, & viginti, quod rarius, duodeviginti. Disiectum deinde fimum inarari, & obrui conuenit, ne solis halitu vires amittat, vt permista humus hoc alimento pingueſcat. Itaque quum in hoc agro disponentur acerui stercoris, non debet maior modus eorum dissipari, quàm quem bubulci eodem die possint obruere. Secunda ratio est, antequam sarrias, more seminantis, ex auariis puluerem stercoris per segetem spargere, si is non erit, caprinum, atq; terram sarculis permiscere. Scito refrigerescere agrum, qui non stercoretur, ita peruri, si nimium: magisque conducit frequenter, quàm immodicè facere. Aquosus ager maiorem eius copiam, siccus minorem desiderat: alter, quòd humore rigens, hoc adhibito regelatur, alter quòd hoc largiore assumpto torretur. Si stercus non suppetet, è sabulosis locis cretam ingerat, cretosis sabulonem, & si his omnibus destituatur agricola, ad lupini præsidium confugiendum, quod cum exili loco circa idus Septembris sparſerit, & inarauert, idque tempestiuè vomere succiderit, vim stercorationis exhibebit. Sed sabulosis locis lupinū succidi oportet, quum secundum florem: rubricosus, quum tertium egerit: illic dum tenerum est, celeriter putrescit, permisceturque solo: hic iam robustius solidiores glebas diutius sustinet, vt ex solibus vaporata resoluantur. Præterea stercus, quod tempestiuè repositum anno requieuerit, segetibus maximè est vtile: nam & adhuc vires solidas habet, & herbas non creat. Plinius aliqua habet ab his prætermiſsa: Autumno aliquid saturus, Septembri mense fimum inaret post imbrem. Vrique si verno erit saturus, per hyemem fimum disponat. Iustum est vehes xv i i i ingero tribui, dispergere autem priusquam areſcat, aut iactato semine. Si hæc omiſſa ſit sterco ratio, sequens est priusquàm seriat, ante puluerem. Quod vt hanc quoque curam determinemus, iustum est singulas vehes fimi, denario ire, in singulas pecudes minores, in maiores denas, nisi contingat hoc, male substrauisse pecori colonum appareat. Sunt qui



optimè stercoreari putent, sub dio retibus inclusa pecorum mansione. Sed minori & labore, & impensa nos optimè agrum stercoreare solemus. Sed oportet in eo prius pratum sit satum, & densè suis radicibus solum irretitum, vt summa terræ cutis aptis ligonibus, vel pastinis decorticetur, idq; Aprili, vel Maio faciendum, si tempus serenum fuerit. Sit terræ cortex euulsus longitudine quinque pedum, latitudine quatuor, altitudo verò binum digitorum. Primum à solo ex vna parte decorticetur, post à contraria leuibus, & crebris ictibus, vt maxima diligentia integra ex humo diuellatur. Pars quæ solo hæserit obliqua, obuertatur soli meridiano, vt optimè resiccetur quinque dierum spatio. Erit pastini commoda longitudo duorum pedum, latitudo vnus, acies acuta valdè, vt secet, non conuellat cutim: nam sic commodius opus absoluent. Hæ cutes in clibani modum componantur, alteram alteri superimponendo, vt aptè per eas ignis euagetur. Sit diameter duorum cubitorum, eademq; altitudo: ostium vnus pedis, in summo foramen apertum, per quod exhalet fumus, intus paleas, & sarmenta iniicienda, vt facilius ignem concipiant. Vbi omnia benè accensa cognoueris, superius os operies: sic & ora, quæ vis ignis effecerit. Quum optimè omnia combusta videbis, & in cinerem versa, quod diei curriculo eueniet, benè erit, si aliqua in combusta remanent, aliis clibanis accommodetur, vt omnia in cinerem resoluantur, quo maiores, & spissiores clibani erunt, & meliores, & spissior cinis, vbi solum ab igne crudum remansit, & pastino, & ligonibus permiscetur, idq; fiat ante sationem quinque diebus.

*De seminum electione in serendo. C A P. IX.*

**T**H E O P H R A S T V S de seminum electu hæc habet. Ad exortum autem, vniuersamq; sementem semen anniculum optimum putatur, bimum deterius & trimum, quod autem vltra acceperis, sterile fermè est, quamquam ad vsum cibarium idoneum constat. Omnibus ad generandum data est vita definita, & inter sese differunt, locorum causa, quibus cõdantur. In petra Cappadociae vel quadragenos annos fœcunda, sexagenos autem, & septuagenos ad vsum cibarium idonea. Locum hunc cum aliàs excelsum, tum flatibus esse apertum, & ab exortu, occasu, meridieque auris editum. Columella præcepit, de messis segetibus iam in area, futuro semini consulamus. Ait Celsus, Vbi mediocris est fructus, optimam quamq; spicam legere oportet, separatimque ex ea semen reponere, quum amplior messis prouenerit, quicquid exteretur, capisterio expurgandum erit, & quod propter magnitudinem ac pondus in imo subsederit, id semen reseruandum: nam nisi cura talis adhibeatur, frumenta degenerant, & ex robusto fit non robustum. Ideoque Virgilius de seminibus præclare sic disserit,

*Vidi ego lecta diu & multo spectata labore,  
Degenerare tamen, ni vis humana quotannis*

*Maxima*



*Maximaqueq; manu legeret, sic omnia satis  
In peius ruere, ac retro sublapsa referri.*

Granum rutilum, si quum diffusum est, eundem colorem interiore habet, integrum esse non dubitamus. Quod extrinsecus albidum, intus etiam conspicitur candidum, leue, ac vanum intelligi debet. Plinius quæ ii scripsere habet. Vindanionius Græcus ad id. Frumentum, quod seremus, eligendum est generosum, plenum, solidum, colore ad aurum inclinante, & quod gratissimum est, ex panificio cognoscitur. Fugiendum contrà contusum, & rugosum. Quidam pleniores spicas eligunt, quæ grana habent solida, & perfecta, 10 caq; in sementem referuant, præstantiorem fructum ex his capientes. Didymus ad fertilitatem conferre tradit, vt semina in contrarios locos serantur, velut ex montanis in campestres, ex humidis in squallidos, & vice versa. Esse enim contrariorum appetentiam æqualiter & in seminibus, & in terra. Quod tamen si fiat, oportet vt ex deterioribus regionibus in meliores transferamus, non ex præstantioribus in peiores.

*De tempore sationis. C A P. X.*

SEd satus tempora dicamus, & primum Theophrasti placita demonstramus. Inquit enim: Sementis duo tempora notantur, sed primum atq; potissimum, quod circa Vergiliarum occasum accipitur, quod & Hesiodus & 20 maxima ferè pars authorum sequuta est,

*Quum cælo emergunt sublimi ab Atlantide nata  
Pleiades, truncanda Ceres. Morientibus illis  
Mitte in drastra boues.*

Quamobrem id tempus per excellentiam satum appellarunt. Secundum quod vere incipit, post brumam, sed non eisdem datur vtrumq;. Alia maturè feri desiderant, alia serò, quod hyemem nequeant tolerare: non desunt quæ vtrumq; tempus satis aptè contingant. Maturè scribitur triticum. Alii iubet Vergiliis orientibus, tunc enim semina in terra sicca, & irroscida incolumbia seruari arbitrantur. Alii illarum occasu, ex Cleodemi sententia, quod septimo die im- 30 bres subsequi consueuerint. Sed ipse optimam iudicat eo anni tēpore quo terra turget ad conceptionem, esse mandandum. Ad id addit receptum sententiam, in lutum non esse ponendum semen, nec in semimadentem terram, nec insolatam: dilutum enim in lacteum pulcem dissolui dixit, & postquam maduerit, si siccetur oblitit, nec transmeandi libertatem concedit. Semimadidum facile putrescit, quia neq; humor, neque calor satis est ad operis perfectionem. Caloris quidem generationis apparatus auspicatur, sed germinationem non absoluit, quare hanc omnium mentem pessimam esse. Quæ in sicco facta est tempestiuè, non corrumpit semen. Aliam addunt Cleodemi opinionem, aduersusq; brumalem satum. Terra enim per id temporis vda, ponderosa, vapo- 40 rosa, ac similis lanis malè carptis, nec potest vapores attrahere, ac in altū trans-



mittere calore destituta, qui vtriusq; author est. Sed quia sunt quædam fruges serotinæ, ideo melius ad brumam seruntur, & cœli fauor seminibus in satum prodest, & post satum si tepor fuerit, vt semina valeant pullulare, qui superuentente frigore utilis est, nil enim iam confirmatis & stabilitis obest, sed cōstipando fecundiora reddit: quippe quum radice robustiore plus alimenti trahatur, & incrementum pōst festinantius veniat. Quæ nanq; præcipitant incrementa, & præmaturè erumpunt, de facili pereunt, immò intēpestiua educatio fluxa est, vnde effusionem illam cohibent alii, secando, aut carpendo. Conferunt etiam niues, quod iis fermentatur ager, & rarefit, & pabulum præbet, & constipato calore radices augetur roborenturq;. Alibi verò præcepta tradit seminandi tum siccum, tum humidum solum. Ante imbres in sicco serere, vt imbriū iuuetur superuentu, & in humido eodem modo, vt imbres præueniantur, vt adhuc humo tepida semina pullulare possint, & imbres validius sufferre. Frumentacea maturè seri debent, vt fortius radicientur, nam sua natura protinus sursum feruntur, hyemis autem superuentu cohibentur, sic verò deorsum retento alimento radices plus fundant, & multiplici culmo se attollere possunt. Sed Democritus Græcus naturali quadam obseruatione tradit, circa Coronæ occasum seminandū esse, tunc enim non solū multi imbres emitti solent, sed terra ipsa naturalem quendam motum suscipiendi, & ad ea, quæ sata sunt, fecunda efficienda habet. Incipit Coronæ occasus circa Phœnicē ad septimum cal. Decembres. Oportet fatorem boreales dies, vel frigidos euitare, in his enim terram conclusam, & velut horrētem semina non suscipere manifestum est. In serenis enim diebus remitte calidis, semina tum suscipere, tū ad radicem agendā concitari, & plenos fructus facere. Alioqui sementē augete Luna, à quarta vsq; ad plenā, hoc est quindecim dieū spacio facere cōsulunt. Quidam tutius operantes, non omnē seminationē præcocem faciunt, sed in bina, terna, vel quatuor tēpora partiuntur, temporis incertitudinē deuittantes. Leontius dicit: Satio præcox omnibus præstat, profundam terram anticipare oportet, si parum aëris pluuiosū nacta fuerit. Quibusdam videtur frigidioribus locis autūno per totam hyemem rectè seminationem fieri ad idus vsq; Martii, vel æquinoctium vernū. Diligentiores sementis tempora hoc modo distribuunt. Frumenti sationē incipiunt à Pleiadum occasu, qui ad quartū nonas Nouembres cōtingit: cessant à satione solstitio hyemali, hoc est ad nonū cal. Ianuarias. Cato è Latinis primus ita docet: Vbi quisq; locus frigidissimus, aquosissimusq; erit, ibi primū serito, in calidissimis locis sementē postremo fieri oportet. Varro ab æquinoctio autūnali incipere scribit oportere serere vsq; ad diem xci post brumam, nisi quæ necessaria causa coegerit non serere, quod tantum intersit, vt ante brumam sata, septimo die, quæ à bruma sata xli die viu exeant, neq; ante æquinoctium incipi oportere putant, quòd si minus idoneæ tempestates sint consequantur, putrescere semina soleant. Nec tadeat elegantiſſima Virgilii carmina recitare primo Georgicorum libro:



*At si triticeam in messem, robustaq; farra  
 Exercebis humum, solisq; instabis aristas,  
 Ante tibi Eoæ Atlantides abscondantur,  
 Gnossiaq; ardens decedat stella corona,  
 Debita quam sulcis committas semina, quamq;  
 Inuita properes anni spem credere terra.  
 Multi ante occasum Maia cœpere, sed illos  
 Expectata seges vanis elusit auenis.*

Columella Virgilii placita sequitur, in occasu Vergiliarum feri debere. Ab-  
 10 sconduntur altero & vigesimo die post autumnale æquinoctium, quod ferè  
 conficitur nono cal. Octobris. Erit ergo tritici satio dierum sex & quadragin-  
 ta ab occasu Vergiliarum, quod fit ante diē nonum cal. Nouembris ad brumę  
 tempora. Sic vt quindecim diebus prius, quàm conficiatur bruma, totidemq;  
 post eam confectā non arent. Nec ambigendum tēperato agro sementem sic  
 fieri. Locis verò vliginosis, exilibus, frigidis, & opacis circa cal. Octobris semi-  
 nare conuenire, sicca tellure, dum nubila pendent, vt prius radices frumento-  
 rum conualescant, quàm hybernis imbribus infestentur. Quidam præcepere,  
 ne seminarentur agri, nisi quum terra pluuiis permaduerit, quod si tempesti-  
 uè contigerit, proderit: sed si feri sunt imbres, quamuis sitienti solo, rectè se-  
 20 men committitur: nam quod sicco solo ingestum, & inoccatum est, perinde  
 ac si repositum in horreo non corrumpitur. Atq; vbi venit imber, vno die se-  
 men surgit. Plinius multa antiquorum dicta adducit, quæ nec adducere pige-  
 bit: Accius in Praxidico dicit feri debere quum Luna est in Ariete, Gemi-  
 nis, Leone, Libra, Aquario. Zoroastres sole x i partes scorpionis transgres-  
 so, quum Luna esset in Tauro. Sequitur huc dilata, & maxima indigens cura  
 de tempore ferendi fruges quæstio, magnaq; ex parte ratione syderum con-  
 nexa. Quamobrem sententias omnium in primis ad id pertinentes expone-  
 mus. Hesiodus qui omnium princeps de agricultura præce- pit, vnum tempus  
 ferendi tradidit à Vergiliarum occasu. Scribebat enim in Bœotia Helladis, v-  
 30 bi ita feri diximus. Inter diligentissimos conuenit, vt in alicum, quadrupedūq;  
 genitura, esse quosdam ad conceptus impetus terræ. Hos Græci ita definiunt,  
 quum sit calida & humida. Virgilius à Vergiliarum occasu feri iubet, quo fit,  
 vt horum syderum exortus, & occasus digerendi sint in suos dies. Sunt qui  
 properent, atq; ita pronuncient, festinatam sementem sape decipere, seroti-  
 nam semper. E contratio alii, vel vere potius ferendum, quàm male in autu-  
 mno, atq; vbi fuerit necesse inter Fauonium, & vernum æquinoctium. Palla-  
 dius eadem habet.

*De modo ferendi. C A P. X I.*

40 **N** V N c præcepta ferendi describemus, vt pro agri qualitate, & tem-  
 poris, seminis mensura prouiciatur, quod accuratius despiciendum.



Theophrastus quod ante pluuiam seritur, iubet rarum seri: quod post, spissum: quod hoc multum radicetur, illud parcè. Quod enim maturè seritur, si spissum seritur, non radicatur, quia terra siccior: quod serò seritur, quia terra mader, frequentius serendum: suppetit enim humor, fit ergo quæ crebro seritur seges multistipula. Plinius ab eo: Festinata satione densum spargi semen, quia tardè concipiat, serotina rarum, quia densitate nimia necetur. Artis etiam cuiusdam est æqualiter spargere. Manus utiq; cōgruere debet cum gradu, semperq; cum dextro pede. Fit quoq; quorundam occultatione, quod sors genialis atq; fœcunda est. Serere in agro temperati soli iustum est tritici modios quinq;, pingui solo plus, gracili minus. Est & alia distinctio: In denso, aut creto- 10  
so, aut vliginoso solo tritici modios sex. In soluta terra & nuda, & sicca, & lata quatuor: macies enim soli maior, nisi rarum culmum habeat, spicam minuram facit, & inanem. Pingua arua ex vna seminis radice fruticem numerosum fundunt, densamq; segetem è raro semine emittunt. Ergo inter quatuor & sex modios pro natura soli alii quinq; non minus seri, pluresve præcipiunt. Item in consito, aut cliuoso, ut in macro. Pamphilus Græcus mensuram ita præfinit. Diducito digitos manus, eosq; imprimito in terram, & sublata deinde manu, multitudinem seminum in impresso digitorum typo considerato. In frumēto numerum septenarium summum esse oportet, minimū quinarium. Cæterum in terram, quæ assiduas niues perpetitur, semina crassius iacienda sunt, pro- 20  
pterea quod aliqua glacie corrumpantur. Columella etiam quantum frumenti iugerum agri recipiat, refert. Iugerum agri recipit tritici modios quatuor, vel quinq;. Heliodus post sationem cooperiendum semen docet,

*Semina quum terra committis, ponè sequatur*

*Serunlus, atq; anibus retro fata lata recondat.*

Plinius: Sato semine sequitur iteratio. Hæc quoq; vbi consuetudo paritur, etate dentata, vel tabula aratro annexa: quod vocant lirare, operientes semina, vnde primum appellata deliratio est.

#### *De sarritione, & truncatione. CAP. XII.*

**M**EMINIT Theophrastus in segetum cura post satum sarritionis, & ad 30  
frugum suauitatem plurimum conferre dixit. Significat enim sarrire sarculis fodere, vel purgare, quod fit, quum segetes leniter scalpendo rastris à noxiis herbis purgamus. Plautus,

*Semper occant prius, quàm sarriunt rustici.*

Varro segetem sarriri iubet primo interuallo inter Fauonium, & æquinoctium vernum. Columella exactam sarritionis disciplinam tradit, ideo ipse audiendus. Peracta sementi, sequens cura est sarritionis, de qua non conuenit inter authores. Quidam negant eam quicquam proficere, quod frumenti radices sarculo detegantur, aliquæ etiam succidantur, ac si frigora incesse- 40  
rint, post sarritionem gelu frumenta enecentur. Satiùs autem  
esse



esse ea tempestiuè runcari, & purgari. Pluribus tamen sarriri placet, sed neque eodem modo, neque iisdem temporibus vsquequaq; fieri: nam in agris siccis, simulac sarritionem pati queant segetes, debere eas permota terra adobruï, vt fruticare possint, quod ante hyemem fieri oportet, & post hyemem iterari. In palustri transacta hyeme sarriri, nec adobruï, sed plana sarritione terram promoueri. Multis regionibus aptam esse hyemalem sarritionem comperimus, vbi scilicet cœli tepores permittunt, sed incolarum consuetudinem sequi debemus. Sunt enim regionum propria munera, vt Ægypti, & Africæ, quibus agricola post sementem ante messem segetem non attingit, quoniam ea cœli  
 10 conditio & terræ est, vt vix vlla herba exeat, nisi ex semine iactò, siue quia rari imbres, siue quòd ea sit humi qualitas. Iis locis vbi sarritio desideratur, nō sunt attingendæ segetes, etiam si cœli status permittit, nisi quum sata sulcos contexerint. Triticum autem cū quatuor fibras habere cœperit, rectè sarrietur. Plinius: Sarculatio induratum hyberno rigore soli tristitiam laxat temporibus vernis, nouosque soles admittit. Qui sarriet, caueat, ne frumenti radices suffodiat. Triticum bis sarrire melius. Sarritur diebus viginti. Ab æquinoctio nocere satura segeti existimatur. Leontius Græcus de sarritione hæc habet: Optimum est sata per homines sarriri, & adobruï, vt optimè omnia contegantur. Quod si fieri non potest, per boues sarriantur. Quando verò iam glebam &  
 20 sulcum occultare, & contegere cœperint, id fiat, quo & agrestes herbe dissipentur, & nudatæ ab aquis radices obruantur. Bis quoque si sarritio fiat, geminata erit vtilitas. Runcatio est inutilium herbarum, fruticumque euulsio, inquit Columella. Subiungenda est deinde sarritioni runcatio, curandumque ne florentem segetem tangamus, sed vt antea, aut mox quū defloruerit. Varro, Secundo interuallo inter vernum æquinoctium, & Vergiliarum exortum hæc fieri debent, segetè runcari, herbam ex segetib⁹ expurgari. Plinius: Quum seges in articulo est, euulsis inutilibus herbis, frugum radicem vindicat, segetemque discernit à cespite. Leontius Græcus: Quando iam frumenta spicam emiserint, runcetur. Sic etiam fructus puri, & multæ commoditatis perficien-  
 30 tur, quum non amet terra herbas peregrinas iugiter coalere.

*De vitiis segetum & remediis* CAP. XIII.

**S**VNT & permulta segetum vitia, morbi que, quorum etsi cuique in sua tractatione remedium demonstrabitur, lubet tamen aliqua generatim præfari, quum præsertim & à nostris antiquioribus geoponica pertractantibus, describantur. Sed qui fuerint hi morbi, à Theophrasto perdiscamus. Seminum vitia quædam omnibus communia, vt rubigo, quædam propria quibusdam dantur, vt tabitudo radici ciceris, & erucarum infestatio. Aliis etiam publicum, bestiolarum erosio: nonnulla scabie, & falsugine pereunt, vt cuminum. Animalia vel in iis gignuntur, vel extrinsecus veniunt, quæ non æquè efficiunt.  
 40 Nascitur in tritico cantharis, & in eruo phalangiū, & in aliis alia genera. Mor-



bi autem, ut in summa dixerim, omnibus seminibus ob alimenti, cœlique intemperiem eueniunt, videlicet, quum plus, minúsve alimenti præberetur, aut aër immodicè humidus siccúsve est, vel quum non tempestiue humescit. Sed incipiamus primo à rubigine, à qua aliæ fruges vastantur, aliæ immunes sunt. Rubigo in frumentaceis magis, quam in leguminibus, & inter frumenta ordeum magis, quàm triticum sentit, & inter ordea aliud plus, aliud minus. Rubiginem nullam sentiunt tractus excelsi perflatique; caui, depressi; & flatribus nullis expositi frequentissimè habent. Gignitur hæc plenilunio. Rubigo putrefactio quædam est, quum exceptus in spica humor non defluit, sed solis superuentu calefactus, putrescit. Aufugiunt hoc vitium quæ inclinatam habent spicam, non porrectam, quia ab ea non excipitur humor. Longiores stipulæ spicis grauatur incuruescunt, quia sub illis flectuntur, breues verò subiectas gerunt, ob id ærugini obnoxia. Prodest quum à foliis suspensa spica est, quia longius humor abest, qui in foliis continetur. Ordeum achilleis vocatum æruginosum est, quia porrectam gerit spicam, etcocritum verò, quia incuruatur, ab ærugine innoxium est. Sic & ventis perflata segetes minus rubigine infestantur, quia humor vento deicitur, & post imbres sequente flatu mox compluta spica resiccatur prius, quàm solis calore ferueat. Pleniluniis potissimum gignitur, quia Luna plena caloris plena est, quo putrefacit. M. Varro in limine sui de re rustica libri, Robigum, & Floram inuocat, quibus propitiis rubigo neque frumenta, neque arbores corrumpat, neque non tempestiue floreat. Namque publica Robigo feriæ robigalia, Floræ ludi floralia instituti sunt. A quibus Plinius: Cœleste frugum malum, nullo minus noxium est rubigo. Frequentissima hæc in roscido tractu, conuallibusque, ac per flatum non habentibus. E diuerso carent ea ventosa, & excelsa. Triâ tēpora fructibus metuebāt Romani, propter quod instituerunt ferias, diesque festos, Robigalia, Floralia, Vinalia. Robigalia Numa constituit, anno regni sui vndecimo, quæ (Plinii tempore) agebantur ad vii Calen. Maii, quoniam tunc ferè segetes rubigo occupat. Hoc tempus Varro determinauit sole tauri partem decimam obtinente, sicut tunc ferebat ratio. Sed vera causa est, quod post dies vndeiginti ab æquinoctio verno per id quadriduum varia gentium obseruatione in iii cal. Maii Canis occidit, sydus & per se vehemens, & cui præoccidere caniculam necesse sit. Idem itaque floralia iii cal. eiusdem instituerunt urbis anno quingentesimo sextodecimo ex oraculis Sibyllæ, ut omnia benè deflorescerent. Hunc diem Varro determinat, sole tauri partem quattamdecimam obtinente. Ergo si in hoc quadriduum incidit plenilunium, fruges & omnia, quæ florebunt, lædi necesse erit. Ex his canis in sacris Robigi victimam fuit. Ouidius Fastorum libro:

*Est canis, (Icarium dicunt) quo sydere moto*

*Tota sitit tellus præripiturque seges.*

*Pro cane sydereo, canis hic imponitur ara,*

*Et quare fiat nil nisi nomen habet.*



Pro cuius remediis Plinius hæc recitat: Rubigo quidem maxima segetum pestis, lauri ramulis in aruo defixis, transit in earum folia ex aruis. Sarmenta, aut palearum acervos, & euulsas herbas, fruticesq; per vineas, camposque, quum timebis incendio, fumus medebitur. Hic è paleis, & contra nebulas auxiliatur, vbi nebulæ nocēt. Ab eo Palladius: Contra nebulas, & rubiginem, paleas & purgamenta pluribus locis disposita, simul omnia, & quum nebulas instare videris, combures. Sed ad Theophrastum redeamus: Triticum vermiculienecant, alii protinus nascentes, radicitus erodentes, alii quum squallentes absolui nequeant, tunc enim vermiculus culmum vsque ad spicam erodit, deinde alimento consumpto, emoritur, & si totum erosit, triticum ipsum interit, si verò alteram tantummodo culmi partem frugemque fundendam eatenus violauit, id quidem spicæ pereat necesse est, reliquum autem incolume extat. Idq; in Thessalia maximè, minus verò in Africa, & in Lelanto Eubœæ. Libro de causis rationem assignat. Nam vbiq; animal gignitur, quum calor cum humiditate debita ratione coit, humiditas enim, ceu materia subiacet calori ad excoctionem conficiendam, quod in tritico euenire videmus. Vermes enim in eius radice creantur, quum post sementem flatus austrini crebro incesserint. Tunc enim radice humescente, & aere calido, radicem caliditas putrefaciens, animal procreat, vermis inde natus radicem erodit. Singulis enim ex eisdem rebus generationem, & alimentum Natura præscripsit. A quo Plinius: Nascuntur & vermiculi in radice, quum sementem imbribus sequutis inclusit repentinus calor humorem. Gignuntur & in grano, quum spicæ pluuiis calor inferuescit.

Est & cantharus dictus scarabeus, paruus frumenta erodens. Omnia ea animalia cum cibo deficiunt. Sed hæc eorum remedia. Semina cupressi foliis rufis si misceantur, non esse vermiculis obnoxia, nec si interlunio serantur. Democritus succo herbæ, quæ appellatur ἀνίζων, in tegulis nascens, tabulisve, Latine verò sedum, aut digitellum, medicata feri iubet omnia semina. Vulgò verò, si dulcedo noceat, & vermes radicibus inhæreant, remedium est amurca pura, ac sine sale spargere, deinde sarrire. Maximè intereunt afflatis triticum, atque hordeum, inquit Theophrastus, quum aut florentia perflantur, aut flore demisso protinus infirma concutiuntur. Sed ordeum magis ita perire certum est, sæpè enim crassescunt, si vehementius diutiusque flatus inuaserint, exiccantur, & penitus inarescunt, quod quidam euentari dixerunt. Plinius: Venti autem tribus temporibus nocent, frumento, & ordeo. In flore, aut protinus quum defloruere, aut maturescere incipientibus. Tum enim exinaniunt grana, prioribus causis nasci prohibent. Sol quoque ex nube, inquit Theophrastus, ambo ista interimit, sed triticum magis, quàm ordeum, ita vt quanquam spica exinanita sit, visu tamen percipi minimè possit. Plinius: Nocet & sol è nube creber. Inter vitia segetum luxuria est, quum onerata fertilitate procumbunt.



Luxuria segetum castigatur dente pecoris in herba duntaxat, & depasta quidam, vel sæpius nullam in spica iniuriam sentiunt. Retonsarum etiam semel omnino certum est granum longius fieri. Sed inane, cassumque, ac satum non nasci. Imber in herba utilis tantum. Florentibus autem frumento, & ordeo nocet, leguminibus innocuus, præterquã ciceri. Maturescientia frumenta imbre læduntur, & ordeum magis. Virgilius nitro & amurca perfundi iubet fabam, sic etiam grandescere promittit. Vino ante semina perfusa minus ægrotare existimant. Quin & armo talpæ contacta semina vberiora esse. Apuleius testatur semina vino conspersa minus esse ægrotatura. Aqua etiam & amurca, si irroraueris ipsa maximè iuuabis. Palladius: Quædam animalia subterranea sectis radicibus necant plerunque frumenta. Contra hæc proderit, si herba, quæ sedum dicitur, succus aquæ mistus, vna nocte madefaciat, quæ spargenda sunt semina, vel agrestis cucumeris humor expressus, & eius radix trita, si aqua diluatur, & eodem, quæ serenda sunt, macerentur humore. Plinius: Mures abiguntur cinere mustelæ, vel felis diluto, & semine sparso, vel decoctarum aqua. Sed redolet virus animalium eorum in pane. Ob id felle bubulo semina attingi vtilius putant. Apuleius: Si post sationem, & vbi terram obruta fuerint semina, modicum frumentum veratro ammistum propè seminaueris, quæcunque aues gustauerint, morientur. Auiculas ipsas mortuas arundini affixas ex pedibus suspendito, & de cætero auicula nulla accedet. Vel si modicum frumentum veratro ammistum foris per ambitum seminaueris, sata ab auium iniuria vindicabis. Si caneros fluuiales, aut marinos in aquam coniectos ad dies octo siueris, & hac aqua foris sata ipsa consperseris, neque semina, neque plantæ ab auibus læduntur. Quidam cerui cornu, aut elephantis siccum aspergunt, alii aqua madefaciunt, atque ita semina irrorant. Si in mensuram, qua semina metiri solemus, serenda semina iniiciuntur, & hyænæ pelle contegantur, post aliquot dies transumpta ab animali, naturali potentia erodere, à nemine facile læduntur. Incorrota manent, quæ Luna semiplena seminata sunt. Priusquam aruum fodiatur, rubeta noctu circum ipsum gestanda est, & in vase fictili concludenda, atque in medio aruo adobruenda. Verùm sationis tempore instante, refodienda est, & extra aruum eiicienda, vt ne fructus amarus fiat. Quin veteri vrina, ac canino stercore simul solutis si semina madefeceris, aut arbores, aut vites, illa sa omnia conseruabis.

*Prænotio segetum fertilitatis. C A P. XIV.*

**F** V T V R Æ vbertatis prognostica segetum aliqua à syderibus, vel ab aeris qualitatibus, vel ex arboribus cognosci possunt. Nos primo ea manifestabimus signa, quæ etiam agricolis innotescere possunt, postremo quæ accuratiorem astrologiæ scientiam exposcunt. Et primò si optimè floruerit seges, optimam præbere potest spem vbertatis. Ouidius in Fastis,

*Si bene floruerint segetes, erit area diues.*



Virgilius ex amygdalæ floribus futuræ frugum copię iudicia desumit.

*Contemplator item, cum se nux plurima syluis*

*Induet in florem, & ramos curuabit olentes.*

*Si superant fœtus, pariter frumenta sequentur,*

*Magnaq; cum magno veniet tritura calore,*

*At si luxuria foliorum exuberat umbra,*

*Nequicquam pingues palea teret area culmos.*

Sed Appuli ex asphodelo iudicium vbertatis desumunt, quippe si optimè  
florescentem cōspexerint, & deflorescentē, & seminum copiam, eandem fru-  
gum vbertatem sibi promittunt. Legitur apud Græcos Zoroastræ prænotio,  
qualia semina fertilia futura sint. Paucis diebus ante caniculę exortum in quo-  
piam loco de vnoquoque semine paululum experimenti gratia ferunt. Quum  
igitur exoritur Canicula, quædam ex satis, vt verisimile est, lædit, quædam ne-  
quaquam. Hoc igitur signum statuentes, ea, quæ in eius ortu illæsa manent,  
ferunt, relinquunt incuruata. Est autē Canis exortus decima nona Iulii men-  
sis. Cæterū quæ sic feremus, ea triginta diebus ante rigabimus, quò videlicet  
eò commodius nasci possint. Vel post Canis ortum primum tonitru obser-  
uant, & in quâ Zodiaci domo existat Luna. Si in Tauro, frumenti & ordei cor-  
ruptionem portendit. Si in Geminis, frumenti corruptelam. In Cancro ordei  
corruptionē. In Leone, frumenti, ac ordei perniciem in montana regione. In  
Sagittario, in montana regione frumenti fertilitatem, in campestri corruptio-  
nem. In Aquario, leguminum perniciem. In Piscibus, frumenti corruptionem  
modicā. Ex Caniculæ etiam ortu, qui fit illucescente vigesima Iulii mensis, ob-  
seruantes in qua domo existat Luna, prædicunt. Si in Leone fuerit Luna, fru-  
menti fertilitas magna. In Virgine, frumenti corruptela. In Sagittario, frumē-  
ti abundantia. In Capricorno, fertilitas. In Aquario, carentia. In Piscibus, vber-  
tas. In Ariete, copia exigua. In Geminis, multa fertilitas. A quibus Palladius:  
Græci asserūt Ægyptios homines prouentum futuri cuiusq; seminis experiri.  
Arcam breuem loco subactō, & humido nunc excolunt, & in ea diuersis spa-  
tiis omnia framenti, vel leguminum semina spargunt. Deinde in ortu Cani-  
culæ, qui apud Romanos quattodecimo Calendarum Augustarum die tene-  
tur, explorant, quæ semina ortum sydus exurat, quæ illæsa custodiat. His ab-  
stinent, illa procurant, quia iudicium noxæ, aut beneficii per annum futurum  
generi vnique sydus aridum præsentī exitio, vel salutē præmisit.

*De frumenti generibus, & primo de tritico. CAP. XV.*

**E**T quia iam vniuersis frumenti generibus agrum præparauimus, nunc  
ea diuidamus. Diximus frumenti genera pro tempore satus diuisa, hyber-  
na, & æstiuæ. Dicemus de hybernis, & primum à tritico incipiemus.

Græcis *πυρρός* dicitur, ab acutie, aut à similitudine, quam habet cum non-  
nullorum fructuum granis, vel gygarris, quæ *πυρίαι* dicuntur. Dicitur enim



græcè, quasi cibus, quæ vox vniuersis cerealibus conuenit. Latini, triticum dicunt, quod molis teratur, sic etiam frumenta à fruendo dixere prisca. Italo grano.

Genera.

Triticum omnes agriculturæ consulti in quamplurimas differentias distinxerunt, etsi specie, & natura reapse vnum sit, cælum, regio, satus, cultus, & hominum industria varium fecerunt. Tritici diuisionem à Theophrasto desumemus, doctrina & tempore omnium primo. Triticum & urbanum, & syluestre dicit, sed temporis spatio cultum, mitigatumque & loci mutatione mutatum. Urbanum Columella in plures species diuisit. Prima, inquit, & vtilissima sunt hominibus frumenta, triticum, & semen adonideum. Dicemus nos de tritico primum, dein de adonidei generibus. Tritici genera complura sunt, & tempus differentiam in his primo facit: nam genus est, quod trimestre dicitur, quod tribus mensibus absoluitur, de quo posterius loquemur. Ex reliquis generibus vnum maximè ferendum genus dicit, quod robus dicitur, quum & pondere & nitore præstet. Secunda species est siliginis, reliquas tritici species, nisi si quos multiplex varietas frugum, & inanis gloria delectet, superfluas dicit. Hoc genus Apulia, & Campania *brondella* vocat, quod ad flauum colorem inclinat, estque primæ dotis inter cætera præstantissimum. Granum non ita tumidum, sed solidum, graue, flauum, vel rubellum, siccum, mansuè minimè muscidum, & nitidum. Apuli præterea suis generibus vernaculis à folliculorum, & aristarum colore nomina imposuerunt. Primum genus albo folliculo, & nigra arista est. Secundum nigro folliculo, & alba arista. Tertium folliculo & arista albis, quartum nigris. Apulo tritico multum Varro contulit. Urbani plura genera apud Theophrastum notantur, cognomina ex locis sortita, vt Africum, Ponticum, Thracium, Assyrium, Egyptium, & Siculum, quæ colore, magnitudine, specie, & proprietate inter se differunt. Quædam cognomina sortiuntur, ex viribus, tum vel aliis, tum maximè quæ ad cibum pertinent, vt Cachrias, Selengis, Alexandrinus. Nec ab re fuerit, si pro differentiis capies, quod aliud præcox, aliud serum, aliud auctu amplum, multumque reddens, aliud ieiunum parum reddens, aliud spica grandiore, aliud paruam effundens, aliud diu in folliculo manens, aliud aptum breui assolui, vt Africum, aliud culmo tenui constans, aliud crasse, vt Africum, & Canchrydias. Item aliud tunicis paucis, aliud multis vestitur, vt Thracium, & aliud vnicalamum, aliud multicalamum. Ponticum breuissimū est, ponderosius Siculum, sed eo ponderosius, quod Bœotia ferr. In Asia ultra Bactra, quodam in loco adeò grande frumentum fieri tradunt, vt nucleis oliuæ suæ æquiparent magnitudine grana singula. In Pistoris adeò firmum nasci affirmant, vt si quis plus comederit disrumpatur. Nuper genus illud, quod ultra Bactra nasci scripsit Theophrastus, nobis à Constantinopoli exportatur, cuius granum oblongum, & amplum est, cætera valde superans, *alicam* vulgò vocat. Hodie Bactra in Turcarum ditione sunt, vnde Constantinopolim delata nobis deinde adue-



- addehantur, et si oleæ nuclei magnitudinem non attingunt, soli, velle eme-  
ratione degenerasse putamus. Ponticum facillimum, & durissimum est. No-  
bis familiare est genus vnum, profectò admirabile visu, cuius spica alias & late-  
ribus spicas fundit, vulgò *grano à racemi* vocant, vt spica spicata sit, & inaximè  
fecundum, quod serimus & colimus, vt cætera genera. Plinius à Theophras-  
to hæc habet: Tritici genera plura, quæ fecere gentes. Italico nullum equidem  
comparauerim, candore, & pondere, quò maximè decernitur. Montanis mo-  
do comparatur Italiæ agris externum, in quo principatum tenuit Bæotia, de-  
inde Sicilia, mox Africa. Tertiū pòdus erat Thracio, Syrioq; , deinde Ægyptiq;  
athletatum cū decreto, quorū capacitas iumentis similis, quæ diximus ordinè  
fecerat. Græcia Ponticū laudauit, quod in Italiam non peruenit. Ex omni co-  
dem genere graui prætulit draconiam, strangiam, & selensium, argumento  
tassissimi calami. Hæ fuere sententiæ, Alexandro Magno regnante, quum cla-  
rissima fuit Græcia, atq; in toto terrarum orbe potentissima ita tamen vt an-  
te mortem eius annis ferè cxxxv Sophocles Poeta in fabula Triptolemo  
frumentum Italicum ante cuncta laudauerit ad verbum translata sententiâ,  
*Et fortunatam Italiam frumento canescere candido.*  
Quæ laus peculiaris hodieque Italico est, quò magis admittor posteros Græ-  
corum nullam mentionem fecisse huius frumenti.
- Theophrastus ita describit: Assurgit triticum leuiori calamo, quàm ordeum,  
lenticiori, nec perinde fragili, & erecto, follo arundineo, angustiori, vt pote quod  
neruò tantum còstet. Sed ramis brachiari nequit, præter genus, quod frumen-  
tiginem vocant. Spica in cacumine incondita, & æqualis vâdiq; còstet. Granū  
muleis regitur runicis, palea suauior, mollior, & succulentior, radicebus multis,  
& prærenuibus. E frumentaceis solū de radicibus anno sequente regerminat.  
Quin & anno primo retulum regerminat. culmū ē latere subnascente. Ratio  
quod solūm radicis copiam, vimq; obtinet. Adde etiā id, quod & oniculcatum  
ab exercitu, adeo vt nil perspicui possit, restibile tamen efficitur. Sed huius exigua  
spica, imperfecta quæ funditur, vt pote quæ secunda emetterit. Varro vocabu-  
la explicat. Spica quæ mutica non est, tria habet continentia. Granū, glumam,  
aristam, & etiam primitus spica quum oritur, vaginam. Granum dictum, quod  
est intima solidum. Gluma, quæ est folliculus eius. Aristæ, quæ vt acus tenuis  
longa eminet è gluma. Proinde vt granitheca sit gluma, & apex aristæ. Aristæ  
& granum omnibus ferè notum, gluma paucis. Itaque id apud Ennium solūm  
scriptum scio esse in Euhemeri libris versis. Videtur vocabulū etymon habere  
à globendo, quòd eo folliculo deglubitur granū. Itaq; eodem vocabulò appel-  
lant fici eius, quam edimus, folliculum. Aristæ dicta quòd arefcit prima, granū  
à getendo. Id enim scribitur, vti spica gerat frumentū, non vt glumā, aut aristam  
gerat, vt vitis feritur, non vt pampinum ferat, sed vnam. Spica autem, quam  
rustici, vt acceperunt antiquitus, vocant specam, à spe videtur nominata:  
nam enim, quòd sperant fore, ferunt. Spica mutica dicitur, quæ non habet

Descriptio.



aristam. Aristæ autem quasi cornua sunt spicarum, quæ primitus, quum oriuntur, neque planè apparent: quæ sublatent herba, ea vocatur vagina, ut in qua latet conditus gladius. Illud autem summa in spica iam matura, quod est minus, quàm granum, vocatur frit; quod in infima spica ad culmum stramenti summum, item minus, quàm granum est, appellatur verruncum. Plinius ex Theophrasto excepit: Frumenta multis radicanur fibris, sine ramis. Triticum genicula quaterna. Folium arundinaceum. Grana in stipula crinito textu spicantur. Tunica frumento plures. Culmus altior, quàm ordeo.

*Cal. Sol.*

Diximus communiter cælum, quod tritico convenit: nunc variis tritici speciebus quæ variæ cæli qualitates tribuantur, videamus. Africum, & Dracontias appellatum, & Strangias, & Selenusium, latum exigunt agrum: hæc enim vberius succos hauriunt. Argumento calamus est, quem crassum gerunt. Solo hyberno conveniētius Thraciū dabitur, quod tunicis multis contegitur, (ipsa forma ostendit) frigus enim huic nil officere potest. Rarum solumq; ceu Canchrydias vocitatum, agro pluvio ferendum, quippe alimenti copiam desiderat, quam obrem & culmo crasso consurgit. Thracicum solo pluvio vberius, quàm ordeum feritur, & omnino contra imbres validius ex Theophrasto. Varro in pingui rectius feri, quæ succi sunt maioris, ut triticum. Cassianus, Martio mense ferere convenire ait frumentum album sitanum cognominatum, & nigrius, & oblongum Alexandrinum appellatum in leuem terram, & apricam, & montanam, & lacubus plenam, arenosam, & aquis carentem usq; ad Calendas Aprilis.

*Satur.*

In Apulia Nouembri, & Octobri mensibus arua proscindunt, vulgò *rompere* dicunt, Decembri iterant, vulgò *recotere*, & Februario tertio arant, quod *tertiare* dicunt, quarto Augusto quod *inquartare* vulgò nominant. Aliqua verò occasione impediti, Ianuario, & Februario proscindunt, Martio iterant, Aprilis tertio arant, quarto Augusti medio, & Octobri mense; si aruum herbosum inveniunt, denuò arant, sic liberum semen fundunt, & aratro cooperiunt, sed prius quàm ferant aruum, in porcas diuidunt, viginti, aut triginta pedum latitudinis, si sarritor longimanus erit, triginta pedum porcae latitudo erit, si breuimanus, viginti, ut hinc inde iactando semen, equaliter porcas compleat. Nouembri mense ubi ià triticū germinare cœperit, sarritur rastris. Ob id vulgò iactari solet. *Quando l'orgio nasce, il grano si pasce.* Maio runcant maiores herbas, ut ferulas, & similes, nā eiusmodi relcendo minores strangulant. Februario mense si nix, vel frigus incesserit, radices constipato calore sobolescunt, maximāq; spicarum copiam fundunt. Post satū, si cælum roscidū erit, septem diebus pullulat triticū, si siccum, viginti. Theophrastus ad hæc: Quū sata conceperint, atq; adulta fuerint, aqua omnibus prodest, florēti obest, facit enim, ut intereat: in plenū crassato noxia est, & ordeo magis quàm tritico: Septimo à satū die exit. Germen ex utraq; parte effundit, quippe quod parte ima, crassūq; radicem, cui superna herbam propellit, sit tamen unum, atque cōtinuum ex ambobus;

radice,



radice, & caule. Exit vno folio, prætenuibus, & permultis radicibus innititur, qua de causa numeroſo caule ſe attollit, ſed quod brachiari ramis omnino nequeat. Hyeme in herba manet, tempore miteſcente, caulem de medio mittit, atq; geniculatur, vt protinus quarto geniculo incipiat ſpicam, ſed nondum aliqua mole conſpicuam, & quidem per totum culmum ſpica digeritur, vt ferme quum culmari inceperit, mox eam conſpici ſit, ſed later ante quam adulta in folliculo fuerit, tum etiam ſæctus ſuæ craſſitudine molis euidentis exiſtat, mox folliculo abſoluto, quarto, aut quinto die florere incipit, totidemq; diebus ſerè florer, qui verò plus temporis referunt, ſeptimo die reſſoreſcere notant: poſtquam deſloruit craſſatur, perficiturq;, quum plurimum intra dies quadraginta. Quædam enim loca proferre intra pauciores dies videntur. In Ægypto triticum ſeptimo menſe metitur. Ex quo Plinius: Frumenta quædam in quarto geniculo ſpicam incipiunt concipere, ſed etiam num occultam. Gemacula ſunt tritico quaterna, ſed non ante prædictum geniculorum numerum conceptuſe ſt ſpicæ, qui, vt ſpem ſui fecit, quatuor aut quinque tardiſſimè diebus florere incipiunt totidemq; aut paulo pluribus deſſoreſcunt. Varro quater nouenis diebus fruges abſoluit tradit, & menſe nono meti. Frumenta enim quum deſloruere, craſſeſcunt, maturanturq;, quum plurimum diebus quadraginta. In Ægypto ſeptimo à ſatu menſe metitur. Hæc omnia in Catone  
 20 maiore Cicero mira verborum elegantia refert: Quamquam non modo fructus quidem me, ſed etiam ipſius terræ vis, ac natura delectat, quæ quum gremio mollito ac ſubactò ſemen ſparſum exceperit, primum id occatum cohibet, ex quo occatio (quæ hoc efficit) nominata eſt, deinde reſeſactum vapore, & complexu ſuo diffundit, & elicit herbeſcentem ex eo viriditatem, quæ nixa ſtbris ſtirpium ſenſim adoleſcit, culmoq; erèctageniculato vaginis iam quaſi pubeſcens includitur, è quibus quum emerſerit, ſundit frugem ſpicæ ordine ſtructam, & contra anium minorum morſus munſtur vallo ariſtarum. Columella: Omne autem frumentum, & ordeum, & quicquid non duplici ſemine eſt, ſpicam à tertio, ad quartum nodum emittit, & quum totam edidit,  
 30 octo diebus deſſoreſcit, ac deinde grandeſcit diebus quadraginta, quibus poſt florem ad maturitatem deuenit. Palladius ex his: Frumenta octo diebus floreant, & deinde per dies quadraginta flore depoſito vſque ad maturitatis euentum.

Meſſis, authore Varrone, proprio nomine dicitur in iis, quæ metuntur, Meſſis. maxime in frumento, & ab eo vocabulo eſt declinata. Frumenti tria genera ſunt meſſionis, vnum, vt in Vmbria, vbi falce ſecundum terram ſuccidunt ſtramentum, & manipulum, vt quæq; ſubſecuerint, ponunt in terra, vbi multos eos fecerunt, iterum eos percuſent, ac de ſingulis ſecant inter ſpicas, & ſtramentum, ſpicas coniiciunt in corbem, atq; in aream mittunt. Stramenta re-  
 40 linquunt in ſegete, vnde tollantur in acernū. Altero modo metunt, vt in Piceno, vbi ligneum habent incuruum batillum, in quo ſit extremo ſerrula ferrea.



Hec quum comprehendit fascem spicarum defecat, & stramenta stantia in fegete relinquit, ut postea subsecentur. Tertium modo metitur, ut sub vi be Roma & locis plerisque, ut stramentum mediū subsecent, quod manu sinistra summumprehendunt, à quo medio messem dictam puto. Infra manum stramentū, quod terræ haret, postea subsecatur. Contrā, quod cum spica stramentum heret, corbis in areā deferrur, ibi discedit in aperto loco palam, à quo nominata esse potest palea. Alii stramentū à stando, ut stamen dictum putant. Alii ab stratu, quod id substernatur pecori. Quum est matura segēs, metendum, cum in ea iugerum ferè vna opera, propemodū in facili agro satis esse dicatur, ut messas spicas in aream corbis deferre debeant. Quæ segēs grandissima, atq; optima fuerit, seorsum in areā secerni oportet spicas, ut lemen optimū habeas. E spicis in areā excuti grana: quod fit apud alios iumentis iunctis, ac tribulo id fit, è tabula lapidibus, aut ferro exasperata, quo imposito auriga, aut pondere grādi, trahitur iumentis iunctis, ut discutiat è spica grana, aut ex assibondentatis cum orbiculis, quod vocant plostellū pœnicum. In eo quis sedet, ut agitet, quæ trahunt, iumenta, ut in Hispania citeriore, & aliis locis faciunt. Apud alios exteritur grege iumentorum inacto, & ibi agitato perticis, quod vngulis è spica exteruntur grana. His tritis, oportet è terra subiciatari vallis, aut ventilabris, quum ventus spirat levis. Ita fit, ut quod leuissimum est in eo, atq; appellatur acus, euannatur foras extra aream, ac frumentum, quod est ponderosum, purum veniat ad corbem. Melle facta, specilegium venire oportet, aut domi legere stipulam, aut si sunt spicæ raræ, & operæ caræ, compositi. Summa enim spectanda, ne in ea re sumptus fructum superet. Hesiodus tempus messim incidendi ita eleganter describit:

*Quum cælo emergunt sublimi ab Atlantide nata*

*Pleiades, truncanda Ceres, morientibus illis*

*Acute in aratri boues, latitare ea sidera dicunt*

*Viginti, totidemq; dies, annosq; voluto*

*Apparent iterum: maturam incidere messem*

*Rursus & incipiunt dentata falce coloni.*

Columella Varroni multa addit per necessaria. Quum matura fuerit segēs, antequam torreatur vaporibus æstiu sideris, qui sunt vastissimi per orrum Caniculæ, celeriter demetatur. Nam dispendiosa est cunctatio. Primum quod aubus prædam, cæterisque animalibus præbet. Deinde quod grana, & ipsa spicæ culmis arentibus, & aristis celeriter decidunt, si verò procellæ ventorum, aut turbines inceserint, maior pars ad terram defluit, propter quæ recastinari non debet. Quum rubicundum colorem traxerunt, messi faciendā est, ut potius in areā, & in acerno, quā in agro grandescant frumenta. Constat enim, si tempestiuè decisa sint, postea capere incrementum. Sunt autem metendi genera complura. Multi falcibus vericulatis, atq; iis, vel rostratis, vel detriculatis medium culmum secant, multi mergis, alii pectinibus spicam ipsam legunt,



gunt, idq; in rara segete facillimū, in dēsa difficillimum est. Quod si falcibus seges cum parte culmi demessa sit, protinus in aceruū, vel in nubilarium congeritur, & subinde opportunis solibus correfacta proteritur, sin autē spicæ tantūmodo recisę sint, possunt in horreū conferri, & deinde per hyemē, vel baculis excuti, vel exteri pecudibus, at si cōpetit, vt in area teratur frumentum, nihil dubium est, quin equis melius, quā bubusea res conficiatur, & si pauca iuga sunt, adicere tribulam & traham possis, quę res vtraq; culmos facillimē comminuit. Ipsę autem spicę melius fustibus rudentur, vannisq; expurgātur. At vbi paleis immista sunt frumēta, vento separētur, ad eā rem Fauonius habetur  
 10 eximius, qui lenis, æqualisq; æstiuis mensibus perflat, quē tamen operiri lentū est agricolę, quia dum expectatur, sæua nos hyems deprehendit. Itaq; in area detrita frumenta sic sunt aggerāda, vt omni flatu possint excerni. At si cōpluribus diebus silebit aura, vannis expurgētur, ne post nimia ventorū segnitiam vastatēpestas irritū faciat totius anni laborem. Palladius nil noui habet, neq; Florentinus Gręcus. Plinius non spernenda describit. Messis ipsius ratio varia. Galliarum latifundiis valli prægrādes dentibus in margine infestis, duabus rotis per segetem impelluntur, iumento in contrarium iuncto, ita direptæ in vallum cadunt spicę, stipulę alibi medię falce præciduntur, atq; inter duas mergites spica dstringitur. Alibi ab radice euellunt. Quod qui faciunt, proscindē  
 10 ab se opiter agrum interpretantur, quum extrahant succum. Differentia hæc, vbi stipulę domos contegunt, quam longissimam seruant: vbi scēni inopia est, stramento paleam quatunt. Messis ipsa alibi tribulis in area, alibi equarum grossibus extergitur, alibi perticis flagellatur. Triticum quō serius meritur, copiosius inuenitur, quo celerius verō, hoc speciosius, ac robustius. Lex aptissima, antequam granum indurescat, & quum iam traxerit colorem. Oraculum verō: Biduum celerius messem facere, quā biduo serius.

Nil egimus, si seuiamus & collegimus, nisi optimē cōdamus, & seruemus, cōditura.  
 ea quod non segnis agricolarum cura fuit. Theophrastus dixit: seminibus non vis eadem ad reseruandum vtiq; datur. Quædam reseruati egregiē possunt, vt  
 20 milium, quædam celerrimē pereunt, vt aphaca, & siliqua, & ordeum celerius, quā triticum, & puluerulentum celerius, quā purgatum, & quod in horreis calce lauigatis conditum est, quā quod in non ita lauigatis. Triticum non penitus exiccati patiuntur, quod ad reddendam farinam melius minus arefactum putatur, qua de causa in acervos componere assolent: videtur enim in acervo crassescere potius, quā attenuari. In spica nondum messem durare maximē potest. Quærit etiam in causis, cur triticum si post messem expandatur, peius habeat, quā si cumuletur acervatim? Alii asperisionem aquę instituant? Ratio est, quia expansum ab aëre humectatum, sole superueniente cum humiditate illa proprius succus exhauritur & exilius semen fit, at in metas coacervatum, vapor terrę præternis atque animalis semen subit, & superpondium auget. Idem etiam



venire contingit, quum in horreis fusum repositum est, ascendētem enim vaporem retinet, vt non abeat. Immo in foueas mittunt, vt magis crescat. Argumento etiam est, quod admissa terra cōseruat, ne laboret vitio villo, & magnificat illud, & habitius facit. Addit etiam, quod semina trahere sibi alimentā sine radicibus possunt. Iccirco non ab re dictum esse, ab aere, & à ventis quoque ali posse. Sed cur puluerulentum triticum putrescit, & reconditum horreis deterioro opere laugatis? causa est calor extraneus, qui in puluere reperitur, & calcis illimento: intus enim calor proprius obsidetur, suffocaturq; feruē facit, ac putrescit, & plus caloris exditur. Ordeum celerius, quàm triticum peritunditur, quia triticum magis solidum, & magis vestitum tunicis. Cuius remedio est protinus area illita, & triticum ventilatum, Columella: Pura frumenta si in annos reconduntur, repurgati debent, nam quanto sunt expoliora, minus à curculionibus exeduntur: sin protinus vsui destinantur, nihil attinet repoliri, satisq; est in vmbra refrigerari, & ita granario inferri. Horreum, & remedia ad condituram frumentiam primo libro docuimus.

*De panificio. CAP. XVI.*

**S**EQVITVR triticum panificium. Panis vocabulum à pāno dici Varro putat. Messapios redundanciam & saturitatem appellasse paniam testis est Athenæus, vnde Latini nomen deflexerunt. Nauticum panem intelligimus, qui verus, & siccus sit, dictus hic coctus, quem Græci *σύνκομις* vocant. Syncomistos, vel autopyros panis, Galeno auctor est, qui ex omnibus suæ farinae partibus citra vllam detractionem constat, inter fufuraceum, & similagineum medius. Syncomistos quasi confusaneus dictus, quod omnes simul tulerit furfures, vtriculos, & similam. Vtriculos volunt id, quod furfure melius est, & simila deterius. Autopyri panes, qui furfure tantum leuiter succreto fiunt, qualis ferè secundarius est. Fieri autem solet, vt Galenus ait, quoties triticum generosum non est: generosum, inquit, vocatur, quod similaginis plus habet, quàm fufuris. Præfertur omnibus sanitatis vsu à Galeno clibanites, à clibano, Varroni testaceus dicitur, quod in testeo calido coqueretur, nam quod clibanum Græci, Latini testum dicunt. Diphilus Siphnius panem ordeaceum tradit vberius alere vires, faciliusq; in membra distribui, quapropter ii primatum tenent, secundas partes sibi vendicant similaginei, quos triticei sequuntur, & hos ii qui ex noua farina subacti sunt. Philistion Locrus ex similagine confectos panes plus corporis robur firmare prodidit, post hos ex alica, deinde ex farina triticea coactos. Ex pollige facti minus alunt, ventos creant, nec agrè membratim digeruntur, siccati opplent, & difficilius in corpus permeant. Subcineritius stomacho grauis, & quod inæqualiter torreatur, & gruius membra subit. Clibanites longè magis viribus pollet, & sanitatis vsu prælatus, pròbum creat succum. Stomacho placet, facillè coquitur, nec ventrem coarctat, nec spiritus distendit, Andréas Medicus ex sicu Egyptia panem fieri



hæsi scriptum reliquit, quem vocant sycaminitem, quo qui vescuntur, capil-  
lorum sentiunt defluvia. Aristoteles libro problematum inquit, quod triti-  
ceus panis maximè corporibus nostris vescentior est, quod mediocre lenti-  
tiam habeat, quam cibus habeat oportet, quippe adhærere, conglutinarique  
corpori debeat. Præterea non salitos panes plus ponderare, quàm salitos, quia  
sals exiccat: absimitur enim à sale humor, qui ex calore putrescit. In pane igi-  
tur humor à sale consumitur, extraq; afflatur, & qui sale vacat, humor largius  
insidens efficit grauiorem. Iucundissimum panem citra fermentum docet pa-  
rare Didymus, nitrum adiiciendo, etenim nitrum panes friabiles facit, velut  
etiam carnem. Alii panem absq; fermento sic faciunt: Vuas pridie quàm pa-  
nem faciant, in aquam comiciunt, & sequenti die ubi panem facere volunt, in-  
matantes tollunt, ac exprimunt, effluenteq; humiditate pro fermento vtun-  
tur, & panes faciunt iucundiores. Si verò in totum annum fermentum habe-  
re velis, quum in dolis mustum ebullierit, spumofum illud, quod efferbuit, ac-  
ceptum cum farina milii commiscero, diligenterq; trita, in massas cogito, quas  
ad solem siccatas in humido loco repones, inde sufficienti accepta quantitate  
pro fermento vteris. Panes sine fermento efficacissimi sunt ad venerem. Flo-  
rentinus ait, clibanitem panem graciliter efformatum, & in sole arefactum  
concoctilem esse, in furnis coctum, grauius concoqui.

*Mutationis tritici in lolium & contra, cause, & dis-  
quisitiones. CAP. XVII.*

NON parum maximi Theophrasti animum anxio causæ disquisitio egres-  
sionis è natura speciei, non solum in affines, & congeneres, vt tritici in  
lolium, sed in alienigenas, vt lini in lolium, quum naturæ conueniens non sit,  
quod species quæpiam se ipsam amittat, & in aliam commet. Mirandum sanè  
tum ob eam ipsam mutationem, tum ob eius peculiarem euentum. Alia etiam  
subest admirationis ratio, quod vt robusta mutantur in debiliora, sic & imbe-  
cilla nunc in robustiora mutantur, quum lolium in triticum, & ordeum mutetur:  
est enim lolium quasi ferum triticum, & omnia agrestia sunt mitibus suis spe-  
ciebus robustiora. Præterea mutatio & corruptio est seminis, vel plântæ, si plan-  
tæ, id peractis radicibus contingit, sed radices mutari absurdum penitus est,  
quia non videmus segetem mutari, remanet ergo radix ab initio. Semen est  
ergo quod mutatur, seminis igitur erit lactatio, putrefactio, aut in totum re-  
solutio. His de causis nonnulli negarunt omnino has degenerationes, sed e-  
uenire sine vilo tritici, vel ordeï satu, & lolium sponte nasci in aruis multis im-  
bribus oppletis, ab imbribus ergo gigni lolium, non autem è primordiis tritici  
seminis deprauari. Sed his hæc aduersantur obiectiones. Quòd à multis acce-  
ptum est, facta tritici, ordeïve semente lolii messem habuisse, ergo ab radice  
mutationem illam fieri posse docebimus: nam radices mutatas esse necesse  
est, si sint mutata folia, & ob id seminum mutationem fieri, sed non à so-



mine corrupto : à semine nanque corrupto nil prodire certum est ; nec radix corrupta nutriendi posset officio fungi. Sed seminis corruptionem aut putrefactionem, aut lactationem esse non intelligimus, sed aliam, quæ præ nimia nutriendi copia seminibus deliquescentibus euenit, quæ non ex toto semina perdit, sed victo naturali principio, in aliud genus traduct, exemplo sumpto ab animalibus : nam si foemina robustior sit mare, foeminam pariet, vel si aliqua mutatio accidit, monstrum : terram nanque foeminam capi debere, & reliqua ad proportionem. Quum igitur terra imbrium frequentialatgiorem alimenti copiam præstat, tunc degenerandi occasio euenit, quæ generandi vis non penitus aboletur, sed fit alia. Quod autem natura seminum viuax sit, ac sanè viuacior, quàm animalium natura, plus quoque durare ratio est : nam & sine seminum origine pleræque plantæ tum grandes, tum humiles sponte naturæ consistunt. Ob id liquido fit, non herbar, sed seminis alteratione mutationem illam oriri, donec portiois seruetur existimatio. Si animalium mutationem intuebimur, mutato semine, videmus mutari animalia : nam asini semen ab equi semine alteratum, conformatur in mulum, tunc quum semen imbecille est : tunc ergo mutari arbitrandum, quum imbecilla planta est, ac in primo ipsius vestibulo generationis, quum enim est in eo traiectu vnus status in alterum, facile potest alio sum impelli, quia in motu est, postquam verò nata est, talis esse pergit, qualis exitit, nec fit amplius plantæ mutatio, sed diminutio tantum, & augmentum. Et rei rusticæ consulti, ex primis ortus rudimentis lolium existere, non fore dicunt, cognosci que id ex folii colore, & magis saturata viriditate, & quod pinguis & strictius sit, non autem prodire frumenti folio, quod postea fiat lolium. His rationibus semen causam habere apparet, nec aspernandam esse sententiam iudicamus, quæ radici assignat causam, vt ab ea ortum habeat vitium mutationis. Siquidem vnumquodque ortum à sua origine secunda incipit, est enim semen principium primum, radix secundum, vt in arboribus videre est, quæ fructus suos cultura immutat, ex acidis, amarisque in dulces, vel ex nucleosis in enucleatos. Ratio huius quoque mutationis in alimenti copia est, quum imbres crebrè incesserint, & potissimum verno tempore, & si simul sole incanderint, quasi vtraque ex causa mutationem illam oriri necesse sit : locis vdis id omnino euenit, & folium immutatur, vt palam est, quod si non imbres accesserint, largam tritici copiam præstari aurumant. Hoc itaque vtraque ratione fieri posse ratio est, sed quamuis vtraque eueniat, absurdum fortè non est, differentiam aliquam esse tum soli, tum aëris oportere : nam & quum fata fuere, statim copiosè pluuiam incessisse damnosum est, nam fit, vt radices infirmiores agantur, quod autem infirmum est, affici facilius potest : mutatio illa generis hac de causa est. Sed quum zea, quum robustissima sit, mutetur, scilicet in arenam, ratio est hæc, propter



per radicem robur, & numerum, ob id resistere infirmius possunt: cætera vero, quæ imbecillia sunt, penitus pereunt: tempus enim satus maximis, plurimisq; imbris afficitur, & diu in terra detinetur, obsideturq;. Cætera verò, quæ tempore verno seruntur, blando cæli tepore, germinare confestim incipiunt. Cæterum fabæ, quæ cum tritico seruntur, cur non mutantur in lolium, causa est, quia mutationes fiunt in propinqua genera, quare quum legumina non habeant, in quod mutantur, pereunt in aditu ipso corruptionis. Sed triticum ob affinitatem in lolium mutatur. Mutationes quæ inter genera frumenti eueniunt, quum ex tali, tale triticum, vel ordeum vel aliquid ex cæteris prouenit, haudquaquam mirandæ sunt: tempus enim, & alimentum, & cæli alterationes efficiunt animalium pariter, & plantarum, quæ quidem ratione omnino ad genus mutandum qualitatem quantitatemque alimenti conuenienter statuendum censemus.

## De siligine. CAP. XVIII.

**D**iligens uero de siligine post triticum, quum inter tritici genera secunda conditio habenda sit siliginis, ut Columella admonet. Cuius species inquit, in pondere præcipua, pondere deficitur, virtutumque esse ait tritici, nec eam longè aut magna difficultate requirendam esse: nam triticum omne vliginoso solo per tertiam sationem conuerteri in siliginem. Plinius siliginem proprie tritici delicias dixit, non vitium, ac biennio verti in triticum. Sed sunt qui partem de siligine inter Columellam & Plinium conuenire censeant. Nam Columella vitium tritici esse contendit, nec magnopere requirendum esse: quum triticum omne vliginoso solo creditur post tertiam sationem in siliginem conuertatur. Præterea pondere à tritico deficere, ac breui in triticum desciscere, nonnullam vitii labem, & infirmitatis argumentum ostendit. Plinius verò delicias tritici vocat, ac vitii delicatam molliuens pondere defectam, quum & semen nullum auidius esse tradat, nec quod plus alimentum trabat, candore præstare, laudatissimum è siligine panem, operaq; pristinorum laudatissima. Sed hi auctores non nisi de urbanitate, & feritate tritici differunt: ostendit quippe siligo urbanum habitum, quod præstat candore & miti spina, sed virtute & pondere deficiat, quum triticum pondere, virtute, & aristis præcellat, quæ omnia syluestrem habitum in stirpem physiognomoniam demonstrare iam ostendimus. Ob id Plinius tritici delicias, quasi tritici delicatationem, & suauiore panem, & urbanum ostenderet, & siligo neglecta in triticum degenerat, quasi triticum siliginis vitium sit: unde nil controuersæ & dissensionis inter hos præclaros auctores competient, qui hæc sana mente diiudicabunt.

Siligo frumenti genus videtur Galeno, & *siligine* vocat. Apud Romanos *Nomen.* quidem, ut etiam apud alios propemodum omnes, quibus ipsi imperant, panis quidem purissimus *siliginis*, id est, siliginis vocatur, qui autem huic proximus *similaceus*, id est, similaceus nuncupatur. Verum *similaceus*, Græcum



quidem nomen est, & antiquum: ~~maxime~~ verò neq; Græcum est, neq; ipsam aliter possum exprimere. Putant Hermolaus, Manardus, & Ruellius, similaginem olyram dici à Græcia, sed aperto errore labuntur, ut ex his paulo post videbimus. Latini Catone, Varrone, Columella, & Plinio authoribus, siliginem vocant. Neapolitani *grano cacosella*, quod muticam spinam ferat, nam *cariosum* vulgò vocant caput glabrum & capillis vacuum. Aliis Italiae locis *calusium* vocari audio à grani caluitie, quod aristis vacet.

Descriptio.

Plinius ita describit. Siligo nunquam pariter maturefcit, nec vlla segetum minus dilationem patitur propter teneritatem, iis, quæ maturuere protinus granum dimittentibus; sed minus quàm cætera frumenta in stipula periclitantur, quoniam semper rectam habet spicam, nec rorem continet, qui rubiginem creet. Far sine arista est, item siligo, excepta quæ laconica appellatur. Campana siligo rufior, Pisana candidior. Siligo sine pondere est, & sine virtute est. Apud nos triticum, quod *grano carosella* vocari diximus, ut reliquum triticum surgit, sed non tam multiplici stipula, nec tam crasso culmo, spicam sine arista fundit. In spica granum ferè rubellum, alibi album, sed farinam omnino candidissimam & leuem facit, cuius modius quindecim ferè libris minus pendet, quàm reliquum triticum. Panis primæ dotis, & præstantissimus pistorum sub fragio receptus, magnatum mensis apponitur, ob id cæteris carius venditur.

Colum.

Cato, Siliginem in loco aperto, & celso, ubi sol quamdiutissimè siccet, feri oportet. Columella verò: densa, etetosa, & vliginosa humus siliginem non incommode alit, & locis manantibus magis apta est, nec tamen ea longè nobis, aut magna difficultate requirèda est: nam omne triticum solo vliginoso post tertiam sationem conuertitur in siliginem. Plinius ab his. Siligo conueniens humidis tractibus, qualis Italiae sunt, & Galliae comata, sed & trans Alpes in Allobrogum tantum, Aruernorumq; agro pertinax. In cæteris ibi partibus biennio in triticum transit. Remedium, ut grauissima quæq; grana eius serantur. Præcellit in Italia, si Campana Pisis nata misceatur. Rufior illa, at Pisana candidior, ponderosior verò cretacea. Siliginem in loco aperto, & edito quæque sole quamdiutissimè torreatur, serito. Sed sibi Plinius planè aduersatur, qui modo aprico loco, & edito, & torrefacto siliginem scripserat præcipit ex Catone, quum prius ex Columella dixerit vliginoso, & humidis tractibus. Sed id fuit in causa, ut opinor, quod alia est tritici species, siligo Catonis à communi nostro, & Columelle. Sed Matthiolus increpat prisci seculi vecordiã tam excellentis frumentis speciem, & propagationem sic neglectui habuisse, ut non solum in Italia, ubi maxima sedulitate & diligentia circa gulæ cupidias fatigentur homines, sed & in Europa desideretur. Sed immeritò, quum in tota Capania nostra, & locis finitimis amplissimæ segetes huius frumenti ad præstantissimi cibi vsum diligentissimè colantur. Nos in Venustimis vliginosis, & depressis aruis, ubi reses aqua, satã vidimus: nec incolæ adduci possunt, ut credant siliginem tritici vitium ex loci vligine, vel ex siccitate in triticum verti, quum per se proprium genus prædicent.



**M.** Matro in pingui solo rectius feri dixit, quæ succi sunt maioris, vt siligo. Columella locis manantibus magis aptam esse. Plinius, cretosum & vliginosum solum fortiter in pingui ferenda, quæ tibi sunt maioris, vt siligo.

Solum.

**Columella** si mediocriter cretosus, & vliginosus ager est, etiam paulo plus, quam vt prius dixi, quinque modis ad sationem opus est, at si siccus, & resolutus locus, idemque vel pinguis, vel exilis est, quatuor, quoniam & è contrario macer tantundem seminis poscit: nam nisi rare conferitur, vanam & minutam spicam facit, at vbi ex vno semine pluribus culmis fruticauit, etiam ex rara segete densam facit. Siliginis modii quinque bubulcorum operas occupant

Satio.

**29** quatuor, occatoris vnam, sarritoris duas primum, & vnam quum iterum sarriuntur, runcatoris vnam, messoris vnam & dimidiam, in totum summa operarum decem, & dimidia, quot erunt tritici. Plinius: Siligo nunquam maturescit pariter, nec vlla segetum minus dilationem patitur propter teneritatem, iis, quæ maturare prorinus granum dimittentibus. In denso, aut cretoso, aut vliginoso solo, tritici aut siliginis modios sex serito: in soluta terra, & nuda, & sicca, & lata quatuor. Macies enim soli maior, nisi rarum culmum habeat, spicam minutam facit, & inanem. Pinguis arua ex vna seminis radice fruticem numerosum fundunt, densamque segetem è raro semine emittunt. Serunt siliginem Nouembri mense. Siliginem occato, sarrito, runcato quibus dictum

**30** est diebus: singula opera cuique generi in iugero sufficient. Seritur apud nos eodem modo, eademque cura, vt triticum.

**Plinius:** Siliginis & tritici eadem ratio in area, horreoque

Mess.com.

**Galenus,** vt diximus, ait. Purillimus panis siligineus, huic proximus similaceus. Siligineus plurimum alimenti praestat, post ipsum similaceus, tertio loco medius. Plinius: E siligine laudatissimus panis, pistrinarumque opera laudatissima. Iustum est è grano Campaniæ, quam vocant castratam, è modio reddere sextarios quatuor siliginis, vel è gregali sine castratura sextarios quinque. Præterea floris semodum. Et cibarii, quod secundarium vocat, sextarios quatuor, surfuris sextarios totidem. E Pisana autem siliginis sextarios quinque, cetera paria sunt. Panis summa laus siliginis bonitate, & cribri tenuitate constat. Amylum ex siligine facere ita docet Cato. Siliginem purgato bene, postea in alueum indas, eò aquam addas bis in die, die decimo aquam exiccato, exurge bene, in alueo puro misce bene, facitoque tanquam fex fiat. Id in lintem nouum indito, exprimito cremore in patinā nouam, aut in mortarium, id omne ita facito, & refricato denovo. Eam patinam in sole ponito, vt areseat, vbi arebit, in ollam nouam indito, inde facito cum lacte coquat. Plinius amy-

Panific.

De trimestri tritico. CAP. XIX.

**40** **P** O s t siliginem de trimestri, siue bimestri tritico agemus. Est enim, vt Columella inquit, siliginis species, & tertium tritici genus, cuius vlus agrico-



his gratissimus: nā ubi propter aquas, aliamve causam matura satio est omīssa, p̄ asidium ab hoc petitur. Sed diuersum genus est Theophrasto. Inquit enim, Sua illorum satio est, quæ genere discrepant, vt tritici genus quoddam, quod trimestre appellant, quoniam per tantum temporis perfici possit. Et alibi genera frumenti enumerās, ait, Quibus & trimestrium annumerari genus par est, & bimestriū, & si quid intra pauciores dies valeat cōsummari. Et libro de causis quærit, cur congenera non pari tempore omnia perficiātur, sed triticum aliud bimestre, aliud trimestre sit, & si quid aliud sit, quod festinantius perfici possit. & sic multis alijs in locis, trimestribus à tritico separatā esse formā innuit, quemadmodū & ipsa quoq; trimestria diuersis locis differre videmus, nec eiusdē succi, ponderis, & formæ esse. Sed id est cōtra Columellæ sententiam, ipse nanq; nullum putat trimestre genus: nā etsi sic appellatur, cū tritico satum nihilominus prouenire. Neq; enim est vllū, inquit, (vt multi crediderunt) natura trimestre semen, quippe idē iactum autumno melius respondet. Plinius Columellam falli dixit, qui ne trimestre quidem proprium genus existimauit esse, quum sit antiquissimum: *τημνωται* vocant. Nos autem quod sentimus in modum afferemus. Verum est quod Columella tradit, agricolæ si quando malè cessit autumnus commentos hanc sationem pro subsidio, ac optimè prouenire. Et apud Samnites, quia triticum hyemis rigores, & iures perferre neuiquam pote sit, satio in vernum tempus differtur, non quod autument, si alibi, ubi cœlum indulgens sit seratur, non prouenire, vel quod proprium genus sit, sed solum quod omīssa tempestiua autumnī sementis occasione, vel per imbres, vel niues, aliave incommoda, huius serotina satione vtuntur, quod felicius longè proueniret, si eodem, quo reliqua genera tempore humo mandarentur, et si quæ verno tempore serunt, alibi autumno serantur, vberius proueniunt. A nobis commune triticum vere satum tulit, sed minima radice, imbecillo trunco, & spica, sed nos serimus ante brumam vt firmius radicaretur, & plures culmos ferat; nam semper, & vbiuis gentium satum prouenit & fert, dummodo nimio calore, vel frigore non intereat. Sed genus trimestre Theophrasti, vel Italiæ incognitum, vel triticum pluribus annis vere satum quoddam genus constituisse, vt vberius vere satum iisdem in locis proferat, alibi verò satum degenerabit in vernaculum. Nā, vt idem Theophrastus ait, continuatio vnius rei mutat naturam eius, vt genus diuersum videri possit: vnde non specie differre, sed imbecilliore quadam constitutione hoc trimestre triticum à vernaculo differre putarem.

Nomen.

Græci *τημνωται* vocant, vt apud Theophrastum, quod tertio à satumense metatur. Dioscorides, & Galenus sitanium vocant. Sitanium dicit Galenus est triticum instantis anni, quod vere seritur. Setanium Articē, quasi purum, vt Phocioni placet. Plinius Græci trimenon vocāt. Latini trimestre, Itali & Neapolitani *grano marzolino*, quod Martio mense terris mandetur iis locis, in quibus vsque ad id temporis niues supra terram detinentur.

Est



Est genus trimestre, & bimestre, Theophrastus inquit, & in Eubœa genus Genus  
quoddam intra quadraginta dies crassum, perficiq; posse affirmat, idēq; firmū  
esse, ac ponderosum, nec modo trimestris leue, nec multū in hoc furfuris esse  
volunt. Et bimestria quædam habentur, quæ ex Sicilia, & in Achaia aduecta  
sunt, sed hæc paucū reddunt, parumq; fecunda habentur, quamq; cibo facilia  
& iucunda sunt. Nascuntur & alia quædam genera in Eubœa, & præcipue apud  
Caristum. Trimestria verò permulta, & ubiq; habentur. Vernū etiam durum  
admodū est, hybernū autem molle. A quo Plinius. Est & bimestre circa Thra-  
cium sinum, quod quadragesimo die, quam satum est maturescit: mirumque  
nulli frumento plus esse ponderis, & furfuribus carere: vitur eo Sicilia, & A-  
chaia, montosis vtraque partibus. Eubœa quoque circa Caristum.

Theophrastus ita describit. Trimestre triticum leue est, & parū fecundum, Descriptio  
ynicalamum, atq; in totum infirmum, paucis radicibus paucisq; culmis consi-  
stit; qua de causa sursum continuo nititur, atq; celeriter consummatur, nam  
quod minus est, perfici facilius potest. Hinc etiam alterum largè frutificat, al-  
terum parce, alterum facile, alterum grane, quum plus alimenti & turbulen-  
tius trahat. Excursus quoq; præpropere agitur, quum in condendis radicibus  
haud multū temporis consumat. Si vere obseratur, velocius nascetur, & in cul-  
mos pauciores spargetur, & spicam parua, & parum fertilem geret. Si matu-  
re seratur, frigus tolerare non poterit, suæ causa imbecillitatis. Sic enim vete-  
ra minus radices agunt, sed sursum protinus tendunt, atq; ita celerius se perfici-  
unt, quod in omnibus ferè vitam breuem agentibus constat.

Columella: Trimestre locis pragelidis, ac niuosis, vbi æstas est humida, & Colum.  
sine vaporibus recte committitur, cæteris admodum raro respōdet, quam ta-  
men ipsam celeriter & vtriq; ante æquinoctium vernum conuenienter peragere.  
Si verò locorum, & cæli conditio patieretur, quanto maturius seuerimus, tan-  
to commodius proueniet. Plinius: Totis Alpibus hoc notum, & hyemalibus  
provinciis nullum hoc frumēto lætius. Est & bimestre circa Thracium sinum,  
quod quadragesimo die, quam satum est, maturescit. Mirumq; nulli frumen-  
to plus esse ponderis, & furfuribus carere. Vitur eo Sicilia & Achaia monto-  
sis vtraq; partibus. Eubœa quoq; circa Caristum. Dicimus nos quod trimestre  
triticum non frigida & niuosa querit, nam eius nuda forma non tale admittit,  
sed frigidis locis, vbi triticum seri autumnō non potest, serunt trimestre vere,  
gelicidiis iam exactis. Id confirmat Theophrastus: Trimestre si maturè sera-  
tur, frigus tolerare non poterit, suæ causa imbecillitatis.

Theophrastus triticum trimestre solo tenui melius fieri tradidit, libro de Solum.  
causis. Alimentū enim subministrari modicū eo potest, hoc est leue leui. Caro,  
Trimestrem quo in loco sementem maturā facere nō poteris, & qui locus re-  
stabilis crassitudine fieri poterit, seri oportet. Plinius montosis paribus, dixit.

Columella Februariō trimestrium sationem non esse alienā dicit, quāuis te- Satio.  
pidis regionibus melius administretur per mensem Ianuar. Plinius. Februariō



trimestria ferantur. Si trimestria bruma ferantur, non ferunt frigoris incommoda, quippe necessario deberi vernum tempus trimestribus propter imbecillitatem, non autem seruari ad deficientis prouentus subsidia, ut Columella sentiebat, ex Theophrasti opinione.

Trimestre triticum facile est, quasi minus terræ in seminibus sit propter temporis breuitatem: quæ enim non multum terræ attrahunt, sed leuiori pabulo vegetantur, vsum quoque cibariorum faciunt leniorem.

*De tipha cereali. CAP. XX.*

**D**E cereali tipha agendum nobis est: ea enim duplex est, palustris, & cerealis. meminit vtriusque Theophrastus: palustris libro quinto, capite tertio, & primo capite octauo, Dioscorides tertio. Cerealem impræsentiarum describemus. Theophrastus è genere tritici, triticoque simillimum aspectu scribit, tantamque affinitatem inter ea esse, ut nullum offendi frumenti genus possit, quod in aliud transire tam facile queat, quam tipha, & zea, siue semen. Sed paratu quodam, atque fieri ait, si pinsita, hoc est tusa ferantur, in triticum transire, idque non protinus sed anno tertio. Quod simile ferè fit, atque quum semina ratione locorum permutantur: nam ea quoque singulis in locis, temporis spatio ferè pari, atque tipha mutantur, cuius rationem libro de causis reddidit: quale nanque semen redditur, tale generat, vnde si alteratum committitur, facile commutatur: si pars aliqua tiphæ semini desit, affici oportet, vnde mutari necesse est, nec eandem paleæ altitudinem retinet, præterea sua imbecillitate semen nil tolerare potest.

*Nomen.*

Genus hoc vnum tiphæ duplici nomine insignitum putat Mnesitheus, scilicet quod aliis *τύφη*, aliis *ζέα* dicatur. Sed nos Mnesitheum falli putamus, quum aliud tipha, aliud sit olyra, ut suo capite videbimus. Theophrasto *τύφη* est, & alijs Græcis: Latinis tipha dicitur. Hermolaus differre putat typham à tipha cereali, quod illa per y græcum scribatur. Briza Macedonum simillima fuit Græcorum tiphæ Galeni iudicio. Sed quid apud nostrates sit, maxima est inter aucthores discordia, & fortasse quia hæc ab illis pertractantur, quibus hæc genera nec inquirere nec serere curæ fuit. Nos Græcorum tipham vulgare *germanum* nostrum vulgò dictum non dubitamus proferre, quod reliquæ Italiæ *secale* dicitur, quum descriptio, quæ apud Theophrastum extat, nulli melius, quam *germano* vocato quadret, & quæ Latini de secale descripserunt, eadem omnia eidem *germano* conueniant. Vtrumque genus separauimus, non quod diuersas res putaremus, sed ut unicuique liberum iudicium relinquatur perquirendi, scribendi que, & vtriusque historia perlegatur. Maior pars authorum, qui apud me alicuius sunt authoritatis, tipham zeæ speciem faciunt. Sed Theophrasti zeæ à tipha valdè differt, & vtriusque ipse meminit, nec abhorret *germanum* nostrum zeæ speciem esse. Plinius, Tipha apud Græcos est zeæ.

*Descriptio.*

Tipha tritici specimen gerit, ei que simillima, frumentorum omnium leuissima.



missima constat. Simplici proliens culmo, sed folliculo multiplici, radix numerosa. Nullum autem genus, quod totum transire in triticum aptum sit, præter tipham & semen comperies, quia ob imbecillitatem nil penitus quic tolerare, & in proximū degenerat, quæ mutatio & sponte, & arte naturæ euenit. Plinius: Tradunt zeam, & tiphem, quum sint degeneres, redire ad frumentum, si pista serantur, nec protinus, sed anno tertio. Adiciuntur his genera, bromos, siligo excepticia, & tragos, externa omnia ab oriente inuecta, oryza similia, tiphera & ipsa eiusdem generis, ex qua fit in nostro orbe oryza. Apud nos surgit *germanum* vocatum fecunda, sed gracili stipula, triticea, & proceriore, spica erecta rubigini obnoxia, innocentioribus aristis, in versus spicatis, radice & culmo multiplici, grano tristi, strigoso, nigricante, glumis implicito, tam cognata res tritico, ut facile alterum in alterum mutetur soli mutatione, & minimi ponderis grano. Mihi syluestre triticum videtur. Sed Galenus colore tritico flauiores, corpore strigosiore, exiliori quæ, ut exile triticum appellant, vespere esse. Hector, Homero teste, suis equis obtulit, eoque innoxie depascuntur, quum tritici esu noxam contrahant.

Plinius, Aegypto ac Syria, Ciliciæ quæ, & Asia, ac Græciæ peculiari tipheræ. Galenus in Asia nasci, regione, quæ supra Pergamum sita est.

Theophrastus tenui solo contentam esse dixit, quia omnium leuissima, & simplici culmo assurgit, nec vti semen, pingue, & latum desiderat.

Mature fertur tiphera, Vergiliarum occasu, ut triticum, & zea, ex Theophrasto. Postquam defloruerit, crassatur perficitur quæ, cum pluribus intra dies quadraginta. Germen ex utroque latere effundit, quippe quæ parte ima, crassa quæ, radicem, tenet super na herbam propellat. Fit tamen vnum, atque continuum radice, & caule. Cassianus. In propriis locis Maio mense ferenda est tiphera, quum satis in spicas abierit, tuncabis ipsam.

Theophrastus paratū quodam triticū in tipham, & tipham in triticum transire dicit, id est si tiphera pista seratur, nec protinus, sed anno tertio: sicut ea, quæ præmacerata fructus afferunt dulciores. Nostri agricola inquit, si grana illa imperfecta, quæ in acumine, & spicæ calce nascuntur, serantur, mutari in *germanum*. Et etiam ieiuno, & squalido solo semina commissa mutari.

Moesithetus tertiam à tritico, & ordeo sedem assignauit tipheræ, quum satis alac, nec magno negotio conficiatur, præponit quæ, zea. Idem quæ, Diocles libro, quem Plinarcho dicauit de arborum facultatibus, confirmat. Caldu quæ, expectitur non solū rusticis, sed politioribus, & moroso palato laborantibus. Sed reseruatū panis deterior euadit, quippe qui triduo, aut biduo vescatur, lutum in ventre concretum residere putet, tam ipsius massa tenax est, & lentitior sequacis, ut densetur, occalescat quæ, & ipsis etiam rusticis insuauior, & difficile concoquatur. Panis apud nos, qui ex *germano* conficitur, ad arcendum tantum pauperum famem utilis, quum viscosæ & tenacis substantiæ sit, unde rusticus in panificio milium admiscet, ut eius friabilitati huius viscositate consula-



rum. Plinius farri admisceri tradit, ut eius amaritudinem mitiget, & quoq; sit ingratiſſimus est ventri. Noster amarus valde, & ventri admodum ingratus, sed citò de ventre labitur, totius familiæ & laborantium rusticorum famem explet tritico admisto.

*De secale. C A P. XXI.*

**H**ERMOLAVS non ambigit vulgarem hanc segalam veterum esse siliginem, quum ab ea toto cœlo discrepet. Illa granum candidum, leue, multiplici tunica contectum habet, spina mutica, ex qua panis candidus fit, & primarum tenens, ut ex Columellæ & Plinii placitis iam diximus: hæc granum nigrum, striatum, angustum, spicam aristis armatam habet: panis ad explendam famem plebeculæ, quem iuuita comedit.

*Nomen.* Diximus ex Theophrasto *πρωή*, Latinis secalem esse, vel saltem eius speciem. Taurini, Plinio auctore, asiam vocant sub Alpibus. Neapolitani *germano*, quam tritico affinitate, & germanitate diximus coherere.

*Descriptio.* Plinius sic eam describit. Nascitur fecunda, & gracili stipula, nigritia triste, sed pondere præcipuum.

*Cœlum.* Cœlum subſtinet frigidum, ex Plinio, ob id sub Alpibus seritur. Et apud nos frigidis etiam locis.

*Solum.* Plinius qualicunq; solo nasci dixit, cum centesimo grano, ipsumq; prolatamine est. Nos sicco, sabuloso, & effæto serimus.

*Sæſ.* Plinius. Occari tantum desiderat. Apud nos seritur ante triticum. Aprilis calce ſibret locis temperatis, quo tempore tangi non debet, vnde quadraginta diebus ad maturitatem peruenit, ante triticum.

*Ratio.* Deterrimū, & tantum ad arcendam famem utile. Admiscetur huic far, ut mitiget amaritudinem eius, & tamen sic quoq; ingratiſſimū ventri est, ex Plinio.

*De adoreo, sive farre. C A P. XXII.*

**D**IXIMVS de generibus tritici ex Columellæ opinione: nunc ex eiusdem ſententia farri genera proſequemur: nam diximus vulgarissima frumenti genera, triticum & far. Plinius inquit: Primus antiquis Latio cibus magno argumento in adorea donis. Præponitur zea, quia qui non habent far, zea utuntur.

Antiquitus far *ζα* appellabatur, restis est Dionysius Halicarnasens, dicens: Vocabant prisci sacras nuptias *ζαππύσια*, quia coninges *ζαππύ* vescebantur, quod nos Græci zeam dicimus. Et Asclepiades apud Galenum libro nono *ζαππύ*. Far veteres, Latini adorem appellauere, Plinio auctore: Dictumq; far à ferendo, quod in terra proferatur. Est far duplex, facticium, & naturale. Facticium, ut Varroni placer, à faciendo dicebatur, quod in pistrino fieret, id est, præpararetur, & contunderetur. Hinc triticeum far, & hordeaceum far pro hordeo dicebant. Columella. Cauca cum matre claudendi sunt, & farro ordeaceo cum aqua in cocto alendi. Idemque, Labrusca de vepribus lecta cum 40  
farre



Farre triticeo minuto obicitur esurientibus. Sed naturali proprie farris nomine certum quoddam frumenti genus intelligitur, quod primum ab edendo edor, deinde literæ primæ in mutatione ador appellatum fuit, auctore Festo, quod far adorem dicebatur. Populum Romanum ex omnibus frumenti generibus trecentis annis farre tantum usum ex Verrio Plinius tradit. Cloriam deniq; ipsam à farris honore Adorem appellabant. Minutius Augurinus farris pretium in trinis nudinis ad assem redegit vndecimus plebis tribunus, qua de causa statua ei extra portam trigeminam à populo stipe collata statuta est. Alii sunt, qui ab adurendo dictum putant, quod torrerisoleret, ut inquit Festus, antequam ex eo mola salsa conficeretur in usu sacrorum. Nobis vulgò *farro* dicitur, aliquibus *spelta*.

Columella quatuor genera facit adorei. Far, quod appellatur clusinum *Genera.* candoris nitidi, quod vocatur vennuculum rutilum, atq; alterum candidum, sed utrumq; maioris ponderis, quàm clusinum. Semen trimestire, quod dicitur halic astrum, idq; pondere & bonitate est præcipuum. Plinius. Gallia quoque suum genus farris dedere, quod illic brance vocant, apud nos sandalum, nitidissimi grani. Et alia differentia est, quod ferè quaternis libris plus reddit panis, quàm far aliud.

Farrigenicula sena, sed non ante geniculorum numerum conceptus est *Descriptio.* spica, qui ut spem sui fecit, quatuor, aut quinque tardissime diebus florere incipiunt, toridemq; aut paulo pluribus deflorescunt. Varro quaternonens diebus fruges absolui tradidit, & mense nono meti. Ordeo ponderosius est. Far sine arista est in Ægypto. Nobis spelta simile videtur, sed herba crassior, spica maior, rigidior, noxioque aristarum cingitur vallo, agre è suis glumis educitur, quibus nisi euolueretur, & vsui, & panificio, sit incommodum.

Varro demonstrans in Italia vtenstile non modo nasci, sed etiam egregium *Calum.* esse ait. Quod far conferam Campano? Plinius: Ex omnium genere durissimum far, & contra hyemes firmissimum. Paritur frigidissima loca, & minus *30* subacta, vel æstuosa, siccioraque.

*30* In creta, & vligine, & rubrica, & agro, qui aquosus erit, semen adorem *Solum.* potius ferunt, quàm triticum. Contra in aridiore ordeum potius quàm far, in medio-cri utrumq;. Columella, Adorei genera propterea custodienda sunt agricolis, quod raro quisquã ager ita situs est, ut vno semine contenti esse possimus, inperueniente parte aliqua, vel vliginosa, vel arida. Densa, cretosaq; humus & vliginosa non incommodè adorem alit. Triticum in sicco loco coalescit, adorem minus infestatur humore. Magis apud in pluvio agro adorem, quàm triticum seritur, quoniam folliculum, quo continetur, firmiter & durabilè aduersus longioris temporis humorem habet. Plinius à Catone habet: In creta, & rubrica, & aquosiore agro adorem, in loco humili far adorem, potius quàm



triticeum feretur. Cretosum & vliginosum locum sortitur. In Campania campus est, subiacens montibus nimbo sistotis quidem x x x x m. pass. planitie. Gratia terræ eius (ut protinus soli natura dicatur) puluerea summa, inferior bibula, & pumicis vice fistulans, montium quoque culpa in bonum cedit. Crebros enim imbres percolat, atque transmittit, nec dilui aut madere voluit, propter facilitatem culturæ. Eadem acceptum humorem nullis fontibus reddit, sed temperat, & concoquens intra se vice succi continet. Seritur toto anno panico semel, bis farre.

Satis.

Columella. Placet nostro Poetæ adorem non antè seminare, quàm occiderint Vergiliæ, quod ipsum numeris sic edisserit,

*At si triticeam in messem, robustaq; farra  
Exercebis humum, solisq; instabis aristis,  
Ante tibi Eoa Atlantides abscondantur.*

Absconduntur autem altero & trigésimo die post autumnale æquinoctium, quod ferè conficitur nono Calendas Octobris. Virgilius serenam hyemem, humidam æstatem farri optat.

*Humida solstitia, atq; hyemes optate serenas  
Agricola, hyberno latissima pulvere farra.*

Et fertur rusticum hoc vetus canticum, ut ex Macrobio habetur, Hyberno pulvere, verno luto, grandia farra Camille metes: ex quo Virgilium id traxisse existimant. Columella, Iugerum agri pinguis, adorei modios novem postulat, si mediocre, decem desiderat. Quum quatuor fibras habere cœperit, rectè farrientur. Virgilius à Vergiliarum occasu far seri iubet. Quidam omittæ cælesti cura far Septembri extremo usque ad idus Octobris serunt. Farra purgatæ non nisi tosta possunt, itaque hæc cum suis folliculis seruntur cruda, & far in vaginulis suis servant ad satus, atque non torrent. Occato, sarrito, runcato quibus dictum est diebus de tritico. Singulæ operæ cuique generi in iugero sufficient. Varro etiam seri farris modios decem in iugero dixit. Palladius autem ex his colligens exactius præcipit huius frumenti serendi disciplinam. Octobri mense adorem seremus. Iusta satio est à decimo Calendarum Nouembrium usque ad sextum idus Decembris regionibus temperatis. Nouembri far seritur satione legitima ac semente solenni. Iugerum seminis modiis quinque tenebitur. Septembri mense vliginosi locis, aut exilibus, aut frigidis, aut opacis circa æquinoctium adorem seritur, dū serenitas constat, ut radices ante hyemem conualescant. Sarritur, quum quatuor foliorum est, Ianuario.

Panis.

Numa instituit far torrere, quoniam tostum cibo salubrius esset, ex Plinio. Farinam à farre dictam nomine ipso apparet.

*De zea siue semine. C A P. XXIII.*

**E** FARRIS genere zea est, multique far ipsum zeam esse opinati sunt. non tamē dubito inter genera farris à Columella enumerata esse zeam, eiusque speciem



speciem è tritici genere esse, eiq; aspectu persimilem, immò, authore Theophrasto, nullum genus aptius in triticum transire est, quàm zea, siue semen dicas: pistamq; serunt, qui mutari eam volunt in triticum, idq; anno demum tertio. Cuius causam in tipha reddidimus. Rationem Theophrastus libro de causis recitat, cur faciliè in auenam mutetur. Facilitas transmutationis, quia genere auenæ proxima est. Sed mirandum profectò, quod quum robustissimum sit semen, in eam degenerat. Sed quia validissimum est, radiceq; numerosa cohæret, iccirco resistere penitus potest, reliqua verò corrumpuntur penitus, non in aliam mutantur speciem. Sed tempore quo seritur, maximis plurimisq; imbribus afficitur, diuque in terra obseisum perperitur multa. Pinito semine mutatur in triticum, terræ commisso: pars enim aliqua decst, quæ si detrahatur principio, generationem minus impedit, sed si exempta penitus sit, & velut penitus semen dispolietur, atq; affici opportunius relinquatur, tum in qualitate mutatur, nec eandem multitudinem paleæ retinet. Plinius. Tradunt zeam, ac tiphen, quum sint degeneres, redire ad frumentum, si pinitæ serantur, nec protinus, sed anno tertio. Homerus commendans aruum zeam producens, *ἑίδωπον ἀργεῖον* dixit, non vt aliqui arbitrantur, quoniam vitam donaret. Commendauit & Hesiodus à magna eius excellentia.

20 *Zea* apud Græcos olim vagum nomen fuit, & perplexæ notionis: nostra *Nomen.* *zeas* id nomen vni duntaxat frumento largitur, quod speltam, vel spentriam dicit vulgò. Latini à frugis præstantia semen vocant. Plinius. Est & hæc Italiæ, in Campania maximè, semenq; appellatur. Hoc habet nomen res præclara.

Dioscorides duas species tradidit, alteram simplicis grani, alteram duobus *Genera.* armamentis inuoluti, ob id Græcis appellata *σινωκος*. Plinius adulterinam Africæ, latioribus spicis, nigrioribusque, & breui stipula esse dicit.

Theophrastus suam zeam ita depingit. Zea quam simillima tritico, & oryze, *Descriptio.* culmo allurgit numeroso, grano multiplici tunicatecto. Fructu facillimo, & cunctis animantibus gratissimo. Radice multiplici, altaq; Speciem circa Capuam satam obseruauimus, quæ erat culmo, geniculis, & spica tritico simillima, duobus vtriculis iunctis duo grana simul ferebat, duplici ordine distinctis, quam à Dioscoride notatam diximus. Granum erat tritico fuscus, & minus, & glumosum.

Plinius: Ægypto autem ac Syriæ, Ciliciæq; & Asiæ, ac Græciæ peculiatis *Colum.* zea. Qui zea vtuntur non habent far. Est & hæc Italiæ, in Campania maximè. Est apud nos zea frigidi soli alumna: nam quum gelicidiis, & frigoribus minus sit obnoxia, horumq; minus iniurias, quàm reliqua frumenta reformident, eam inibi serere coguntur, qui hybernis regionibus, & gelido cœli statu zea victitant. Galenus tamen, qui regiones omnes hybernas peragravit, & ab iis sciscitatus diligenter, qui eas perlustrassent, nusquam audiuit aliquod adesse frumenti genus, quod incolæ zeam appellent. Sed in Bithyniæ tractibus *zeopyron* inuenit.



Solum.

Quam nil ea robustius, & maximè terram exinaniens sit, pingue & solum latum desiderat, ex Theophrasto. Nos apud Capuanos, nigro & argilloso, albo latoq; satam vidimus solo, locis frigidissimis, & glacie diutina oblitis.

Satio.

Maturè seri Theophrastus dixit, circa Vergiliarum occasum. Germen ex vna grani parte effundit, ex crassa radicem, ex tenui herbam pellit, vt cætera frumenta. Plinius iugero modios decem seminat. Nos hic Martio serimus, non autumno.

Panis.

Diocles zeam tiphæ in ciborum ratione postposuit. Mnesitheus panem ex ea factum caput aggrauare, & difficulter egeri dixit, ex Athenæo. Galenus vim habere inter ordeum, & triticum mediam, tantum in cibo tritico cedit, quantum ordeo præfertur in panificio. Alimonia maiore est, quàm ordeum, minore quàm triticum. Panes zea confecto nemo diutius inoffensa valetudine vescens degit, præsertim si abundè estur: quod si quispiam insolens eo vitur, paucos esu noxam contrahet: nam & agrè coquitur, & stomacho negotium exhibet. Panis parum è zea per initia, quod magno sit odore, deuorari potest, assueris tamen familiaris redditur cibus, & qui facile conficiatur. In summa grauis concoctu, & pertinax est, sed valens & membranosa. Zea minus quàm tiphæ nutrit. Plinius, Alica fit ex zea. Tonditur graminis eius in pila lignea: nam lapidis duritia conteritur. Nobilius, vt notum est, pilo victorem pœnali opera. Primori inest pyxis ferrea: excussis inde tunicis, iterum indom armamentis nudata coneiditur medulla. Ita fiunt alicæ tria genera, minimulus ac secundarium, grandissimum verò apharema appellant. Alica adukerina fit ex zea, quæ in Africa degenerat.

## De olyra. CAP. XXIIII.

**D**IO SCORIDUS olyram ex zea semine esse existimat, ideo nos post zeam eius descriptionem apposuimus.

Nomen.

Græcis ὀλυρα. Latinis Herimolao, Ruellio, exterisq; authoribus siligo; authorumq; talis ineptia Plinium faciunt, quod nusquam dixit. Theodorus in Theophrasti versione satis ineptè etiam siliginem vertit. Turannius eandem esse olyram, & oryzam existimat. Aincam ab Homero vocati dixit Plinius, ab Herodoto zeam. Audio ab Italia scandellam vocari.

Descriptio.

Theophrastus ex iis, quæ tritico simillima sunt, olyram esse dicit, zea molliorem infirmiolemq; grano multipliciter tunicato. Plinius, Spissior, quàm far, & minor spica, eadem & ponderosior. Raro modius grani non xvi libras implet. Facilis, fertilisq; Galenus. Tiphæ semen extrinsecus corticem habet, veluti olyra, & ordeum, verùm decorticatum in panes congeritur. Et alibi. Color in ordeis, & olyris est albus, in triticeis autem subflauus.

Cælum.

In Græciâ nasci difficilem, in Ægypto verò facilem, fertilemq; Plinius dixit. Atinca Galliarum propria, copiosa & Italia est. Ægypto autem, ac Syria, Ciliciæq; & Asia, ac Græciæ peculiariis olyra.



Theophrastus olyram maturè seri dixit, idemq; tempus serendi, vt tritico Sol. Satio.  
statuit. Solum vt zea ei daretur, quum maiori spica, & ponderosiori grano con-  
stet, terram enim exinair, ob id latam constituerem. Seritur vt zea.

Plinius, Ex arinca dulcissimus panis, ex teritur in Græcia difficulter, ob id Panis.  
iumentis dari ab Homero dicta. Galenus inter triticum & ordeum medium  
tenere temperamentum dixit. Præterea olyrini panes sunt præstantissimi, si ex  
bona olyra fiant, post triticeos. Quod si olyrini ex vitioso semine sint facti,  
tiphinis erunt inferiores. Mnesitheus panem qui ex olyra fit, multum nutrire  
dixit, quia sine magno labore digeritur, ex Athenæo. Cassianus tragum ex o-  
lyra generosa facere docet. Olyra maceratur, & decorticatur, & in sole calido  
siccatur. Deinde idem rursus fit, donec & pellicula, & quicquid fibrosum est  
in frumeto dilabatur. Plinius far ex olyra fieri dixit. Dioscorides olyram minus  
aliquanto nutrire, quàm zeam, & in panes, vt zeam, cogi dixit.

De tritico Indico. Cap. XXV.

**N**unc ad alia tritici genera transeamus, fortasse veteribus incognita,  
quorum primum se offert Indicum.

Nos Indicum triticum dicimus, quod ex occidentalibus Indiis nobis pri- Nomen.  
mum aduocatum sit. Incolæ vernacula lingua *maiz* vocant, quod & nos quoq;  
ita vocare solemus. Sunt qui ruscicum vocent, quod ex Turcica Asia primum  
adlatum dicant, atq; ab Plinio sub milii nomine memoratum, non quidem re-  
ctè, vt in milio dicemus.

Granorū color, & spicarū varietas genera faciunt, nam sunt punicea, buxea, Genus.  
subcandicantia, vel etiā mixta ex croceis & subpurpureis. Addit & tēporis dis-  
crimē differentiā, est enim genus trimestre, bimestre, vel sex hebdomadarū.

Calamū assurgit procero, septenum, octonūve pedum, crasso, rotundo, Descriptio.  
geniculato, medulla farcto candida, cuiusmodi saccharinæ arundinis. Folio mi-  
liaceo. Flores summo nutant culmo, non fœtura destinati, non vmbra, sed  
spectatores ornatu oblectantes, naturaq; luxum ostentantes, quod rarò in a-  
liis ostendit. Medio foliorum, geniculorumq; sinu, spicam pandit muticam,  
cylindracea effigie, tiphæ clauæ simili, tenui vagina foliacea operta, in qua  
grana pisi magnitudine penitissimè stipata conduntur, denis duodenisve ver-  
sibus ordinata, qualia in punicorum acinis, colore purpurea, interdum fulua,  
nonnunquam fusca, vel rubra. E vaginularum verticibus paniculacea, vel ca-  
pillacea filamenta dependent, concolora granis. Inferior caudicis pars purpu-  
rascit. Radicibus multis, densis, ac minimè crassis.

Mediocrè terra, & cœli fert temperiem. Apud nos satum optimè prouenit. Cul. Sol.

Indi hoc modo serunt. Descendunt Aprili, vel Maio in complurum agrum Satio.  
satores, recta linea aequaliter dispositi, ac deinde palo effossis scrobibus dextra  
manu, statim grana quatuor, vel quinque triduo macerata, sinistra in singulis  
coniiciunt, ac pede scrobes operiētes, ne pſittaci semina depascantur, ac ita se-



riatim suo passu distantias metientes, agrum totum semine complent retrocedentes. Nasceitur paucis diebus, metunt Augusto, vel Septembri. Dicunt Peruvianis toto ferme anno meti, & feri posse.

*Panis.*

Indi ex granis candidissimam farinam moluntur, quæ in panificium cogitur. Nostri & in pane, & placentis vtuntur. Substantia magis crassa, & viscida, ob id grauis, & ingratus ventriculo.

*De ordeo.* CAP. XXVI.

**N**unc ad aliud frumenti genus deuentum est, scilicet ordeum. Duo namque videntur antiquis fuisse frumentorum fastigia, tritici & ordei, præ cæteris quidem cerealibus vtilissima, & quorum cætera sint quasi abortus, & degeneres partus, mixtaq; naturæ ex tritico, & ordeo. Quin nonnullis videtur ordeum siligo spuria. Antiquissimum, inquit Plinius, in cibis ordeum, sicut Atheniensium ritu, Menandro authore, apparet, & gladiatorum cognomine, qui ordearii vocabantur.

*Nomen.*

Græcis *orizon* nomen est, quasi dicerent secretum, & separatum, quum ei multa opera essent secernendæ glumæ. Latini hordeum ab horrore dixere, quod eius arista tritici arista mordacior sit. Vel ab oriendi celeritate, quod ante omnia frumenta sit aridum. Vel ab antiquo verbo hordus, quod apud vetustissimos significabat grauidum. *Italis orzo.*

*Descriptio.*

Ordeum, ex Theophrasto, triticeo, & multiplici attollitur culmo, sed qui non fundatur in brachia, sed quàm triticum horridiori, fragiliori quæ, breviori quæ. Simplici in stipula folio, neruoso, vt arundineo, & latiori. Cæcumine fert spicam, vt cætera frumentacea, sed minus à foliis discreta. Granum crinito textu spicatur, sed longè paucioribus tunicis contentum, quàm triticum: siquidem propè nudum extat, & omnium maximè tegumento caret, mordaciori arista, Radice tenui, frequenti coma fibrata. Palea durior, & insuauior, utpote, quæ minus succi retineat. Ex Plinio, Breuiori, quàm triticum assurgit calamo, cui octona genicula. Cæcumine folium vnum habet, sed scabrum, arundinaceum, cæteris laue. Granum maximè nudum, muniturq; aristarum quadruplici vallo, & arista mordacior.

*Genera.*

Apud Theophrastum plura ordeï discrimina visuntur, fructibus, spicis, formis, viribus & effectibus differentia. Est enim aliud quod binos spicarum versus, aliud ternos, quaternosq; continet, item quinos, nullum tamen plures senis. Quod verò pluribus construitur versibus, spissius hoc, posituq; semper arctius constat. Magnam & Indicum differentiam facit, quod fundatur in brachia. Et spicæ aliis grandiores, rarioresq; constant, aliis mitiores, frequentioresq;, & aliis distantiores à foliis, aliis proximiores, vt Achilleis cognomine. Sunt & complura grani discrimina. Aliis rotundius, & breuius, aliis maius & oblongius, & rarius, aliud candicat, aliud vergit in purpuram, copiosius farina, validiusq; quàm candidum, & contra cœli mutationes contumacius. In

India



India syluestre nascitur ordeum, iucundum in panis esu, hoc equis oblatum Alexandri, vt manderent, necabat eos primo, dein in palea exhibitum, paulatim desit esse noxium. Est genus ordei achilleis vocatum, propensius obnoxium rubigini, tam atrum, quàm candidum, quod spicam erectam gerat. Est & genus trimestre dictum, quod per dictum tempus perfici valet. Ex eo Plinius: Ordeum Indisatiuum & syluestre, ex quo panis apud eos præcipuus. Spicæ quædam binos ordines habent, quædam plures vsque ad senos. Grano ipsi aliquot differentiæ, longius, laxiusque, aut breuius, aut rotundius, candidius, nigrius, vel cui purpura est. Vltimo ad polentam, contra tempestates candido maxima infirmitas. Sunt & Columellæ sua genera: Exastichum, siue cantherinum, & distichum, siue Galaticum, vt suo loco dicemus.

Solum pluuium, & frigidum conuenit ad ordei fructificationem, cæterorumq; frumentorum, quum soluta hæc sint, sed minus ordeum geritur, & omnino contra imbres inualidius. Sed vere hybernis locis triticum potius, quàm ordeum datur. Sed differt cælum à cælo, & solum à solo ad fructuum productionem. Quædam enim loca proferre intra pauciores dies videntur. In Ægypto sexto à satu mense metitur. In Chalcita Rhodiorum insula, tam præcocem, tamque feracis naturæ locum esse prodidit Theophrastus, vt ordeum inibi cum cæteris satum, iterum referi, & vnà cum cæteris frugibus rursus demeti valeat.

Et si fruatur terra ordeum, gracili etiam solo proficere satis potest. Et alibi. Gracile solum ordeum melius præstat, quia minus & lenius alimentum desiderat. Lutosum solum commodius siccis, & paruo alimento contentis, vt achilleidi, quippe hoc succos melius digerens facit candidiora. Ex Theophrasto. Sed Plinius: Ordeum omnium frugum mollissimum est, seri non vult nisi sicca, & soluta terra, ac nili lata. ordeum in inquali, & aruo, quod restibile possit fieri, seritur. Subtilis & illa sententia, serenda ea in tenuiore terra, quæ non multo indigent succo, in pingui autem, quæ sunt cibi maioris. Sic ergo tenue solum ordeo dabitur, minus enim alimenti radix poscit. In humili loco far seritur, in temperato ordenm.

Sationem à tempore exordiemur. Theophrastus serit Vergiliarum orcasu, & maturius quàm triticum. Cassianus ordei sationem inchoat ab æquinoctio autumnali, quod est ad octauum calendas Octobres, cessat à satione solsticio hyemali, quod est ad nonas calendas Ianuarii. Virgilius,

*Libra dies, somniq; pares ubi fecerit horas,  
Et medium luci, atq; umbris iam diuidit orbem:  
Exercete viri tauros, serite ordeum campis,  
Vsq; sub extremum brumæ intractabilis imbrem.*

Plinius à Virgilio excipiendo, ait, Virgilius ordenm inter æquinoctium au-



sumni & brumam ferit. Sed Vindanionius eligendum iubet ordeum plenum,  
 recens, album, & quam grauiſſimum, & non cotuſum. Sicco ſolo committeren-  
 dum præcipit Theophrastus, ut pote quod maximè valeat perdurare, ubi non  
 auib, aut aliis beſtiis tellus obnoxia ſit. Haud enim commodum ſeminado-  
 factum ſolum putatur: quippe quum ſemina in eo facile lateſcant, atq; in-  
 tereant, ſimul accidit, ut frequens herba naſcatur. Ambrem ſuperuenire  
 poſt ſationem prodeſt. Denſum, aut rarum ſpargere ſemen terrarum ratio-  
 ne conuenit: plus enim craſſa, lataq; tolerare poteſt, quàm arenosa, & tenuis.  
 A quo Varro, Ordei ſeruntur quinque modi in iugero. Sed nonnullis locis  
 paulo amplius, aut minus. Si enim locus craſſus, plus: ſi macer, minus: qua-  
 re obſeruabis, quantum in ea regione conſuetudo eſt ſerendi, ut tantum fa-  
 cias, quantum valet regio, ac genus terræ. Sed Pamphilus Græcus præciſi-  
 ſus monendo docet, ut ſata iuſtam ſymmetriam habeant, digitos manus di-  
 ducendos, eosq; imprimendos in terram, & ſublata deinde manu, multitu-  
 dinem ſeminum in impreſſo digitorum typo conſiderandam: eronium in or-  
 deo nouenarium ſummum eſſe oportet, minimum ſeptenarium. Plinius,  
 In iugero temperati ſoli iuſtum eſt ordei modios ſex; pingui plus, gracili  
 minus. Sarculo ſeritur, propterea celerrimè reddit, fertiliffimumque quod  
 in Hispania Carthagine Aprili menſe collectum eſt. Hoc ſeritur eodem men-  
 ſe in Celtiberia, eodemque anno bis naſcitur. Ordeum niſi ſit ſiccum ne  
 ſerito. Et ſi in tritico dixerimus de radice, ortu, herba, flore, ſpica, di-  
 camus iterum de ordeo. Erumpit, Theophrasto auctore, à primo ſatu or-  
 deum die ſeptimo, magisque quàm triticum feſtinat. Ex utroque extremo  
 radicem, & folium emittit, caput alterum grani in radicem exit, alterum  
 in herbam, quæ prior floret. Radicem craſſior pars grani fundit, tenuior  
 florem, cæteris ſeminibus eadem pars radicem & folium. Exit vno folio,  
 hyeme in herba eſt, tempore miſceſcente caulem de medio mittit, & ter-  
 tio, vel quarto geniculo ſpicam, ſed nondum aliqua mole conſpicuam, &  
 quidem per totum cultum ſpica digeritur, ut ſermè quum culmari incepe-  
 rit, mox eam conſpici ſit, ſed latet, antequam adulta in folliculo fuerit: tum  
 enim ſætuſ ſuæ craſſitudine molis euident exat, mox folliculo abſoluta,  
 quarto aut quinto die florere incipit, totidemque diebus ſerè floret. qui  
 verò plus temporis referunt, ſeptimo die deſtoreſcere notant. Poſtquam de-  
 floruit craſſatur, perficiturque quum primum intra dies quadraginta. A quo  
 Plinius. Erumpit à primo ſatu ordeum die ſeptimo, alterum caput grani in  
 radicem exit, alterum in herbam, quæ & prior floret. Radicem craſſior pars  
 grani fundit, tenuior florem, cæteris ſeminibus eadem pars & radicem &  
 florem. Hyeme in herba eſt, verno tempore ſaſtigiatur in ſtipulam. In octa-  
 uo geniculo ſpicam incipit concipere, ſed etiamnum occultam. Sed non an-  
 te ſupradictum geniculorum numerum conceptus eſt ſpica, qui ut ſpem ſui  
 facit, quatuor aut quinque diebus florere incipit, totidemque aut paulo plu-  
 ribus



Tribus de florere, & quum tardissimè, septem. Quum de floruit et asseseit, maturaturq; quum plurimum diebus quadraginta. Varro septimo à sato die exire dixit. Theophrastus nasci à radicibus anno sequente dixit, quin & anno primo pratensum regerminat culmo à latere subnascente. Ratio, quod id radicis copiam, vimq; obtinet. Columella, Ordei modii quinque bubulci operas tres exigunt, occatoris vnam, sarritoriam vnam & dimidiam, messoriam vnam, summa operarum sex, & dimidia.

Aqua nuper sato, & adolescenti prodest, florenti obest, facit enim, ut ro- Cultus  
tum intereat, in plenum crassato maximè noxia esse putatur. A Theophrasto

- Plinius, Imber in herba utilis tantum, florenti nocet, maturescens imbre magis laeditur, Ordem post florem, si adhuc humidum, tenellumq; afflatu vehementer vexetur, facile perit, educitur enim quod in his tenuissimum est, & conflictatum inter se euanesceit, quum euauerit, pluvia sequuta nocet, qui nudum est, & omnino tritico debilius est. Ordem plus attrahit pabuli, quia rari natura est, idque excoquere nequit, quoniam inualidum est, & quum rigum imbre fuerit, sol vna cum aduentitio humore internum quoq; & proprium educit. Et à floribus quoq; concussu magis hoc perditur, ut pote quod imbecillum est. Rubigines in frumentaceis magis quam leguminibus, & inter frumentacea ordem magis quam triticum sentit, & inter ordeas aliud plus, aliud minus, sed precipuè dixerim achilleis. Facile afficitur ordem e-rugine, quod nudum est, & folium spica gerit proximius, unde suam frugem effundit, residet enim in eo humor putrefactus, qui euginem creat. Audo quod spicam gerat erectam, densioremq; hinc enim humor minus potest destinerè: quare causa spicam aliquantulum inclinari melius est, sic enim quod continuum est, dissolui atq; decidere celerius potest. Plinius: Ordem ex omni frumento minimè calamitosum, quia tollitur antequam triticum occupet rubigo. Eteocritum genus ordeis est tutum à rubigine, quoniam incuruum nascatur. Ordem necat festuca, quæ vocatur argilops. Theophrastus, Lolium & auena in ordeo prouenientes, pabulum tollunt, tanquod terra mi-nistrat, quum quod à sole, & aëre venit.

- Nudum ex seminibus corruptum mutatum aliud aptius est, quam triticum, Mutatio  
ordei in  
lolium.  
& ordem, quod degenerat in lolium, idque in imbribus infestis, aut vliginosis locis, & longiore pluvia dilutum. Degenerant penitus fruges illæ poriffi-  
cunt, quæ viribus præstant, ut ordem, & triticum, quæ in lolium transeunt, præsertim quum lolium ordeo validius sit, quorum rationes in tritico reddi-  
dimus ex Theophrasto. Plinius, Ordem in auenam degenerat.

- In Agypto sexto à sato mense ordem metitur, inquit Theophrastus. Pl-  
nius autem, Rapitur omne à populo statim maturitate festinanti, quum Messis  
cætera à fragili enim stipula, & tenuissima palea granum continetur. Pal-  
ladius: lunio ordeis mollis incipitur, quæ consummanda est, antequam grana  
ætatis spicis lapsa decurrant, quia nullis, siue triticum folliculis vestitur.



Quinq; modios recidere potest pleni agri opera vna melloris experti, medio-  
cris verò tres, vltimietiam minus. Sed ordeï culmos iacere in agris aliquantū-  
lum sinamus, quia fertur hoc more grandescere. Theophrastus: Quoddam  
ordeï genus non patitur exiccari, quod ad reddendam farinam melius minus  
arefactum putatur. Quae de causa in aceruos componere assolent: videtur e-  
nim in aceruo crassescere potius quàm attenuari.

*Conditura.*

Perit celeriter hordeum, & puluerulentum celerius, quàm purgatum, &  
quod in horreis calce leuigatis conditum est, quàm quod in non ita leuigatis.  
Ordeum multo celerius, quàm triticum runditur, quia solutius ac nudius est.  
Singula pro suo humore peculiare animal creant, vt ordeū curculionem. Tri-  
ticū magis ordeo durat, quia calidius sit, & tunicis pluribus tegatur. Ordeum  
enim nudum propemodum est. Non omittā quod loco medelæ aliquādo or-  
deum plantis vitium interferatur, aut aliquid siccum, vt immodicū humorem  
absumeret. Damageron incolume in horreis seruat lauri fertilis foliis siccis, &  
omnis ciuis, præsertim à lauri ligno impositus. Similiter seruat ordeum sem-  
peruiū herba siccata, tū calamintha, & vna cum gypso ordeo ammixta. Qui-  
dam vas acetoplenum, & coniectum operculo in medio ordeï pōunt. Ve-  
rū nolle oportet, ordeum veterascens amarum fieri. Florentinus, Ventila-  
tum & cribratum ordeum, ynam, aut alteram diem, aut noctem in arē relin-  
quere oportet, & deportare ante solis exortum, vt adhuc refrigeratus fructus  
in horreum deportetur, ad diuturnitatem confert.

*Panis.*

Panem ex hordeo veteribus vsitatum vira damnauit, quadrupedumq; tra-  
didit refectibus: eoq; Romani ignauos milites ignominiae causa pascabant.  
Æthiopes non aliam frugem, quàm milii, ordeïve nouere. Panis hordeaceus,  
præter id, quod ventriculo laborem inferat, frigidos lentosq; succos generat,  
parum nutrit, & flatu gignit, & spodagricis peridoneum esse dicant. Diph-  
lus Syluius ordeaceos panes meliores esse, magis nutrire, & melius digeri di-  
xit. Ex Athenæo.

*De ordeo hexastichio, siue cantherino.* CAP. XXVII.

**P**RÆTERMISSA illa vaga, & confusa ordeï generum recensione, quippe  
non specificas, sed accidentarias, & aduentitias, nempe magnitudinis, co-  
loris, glumarū & allarum affectionum differentias efficiebant, nunc ad magis  
proprias, paucis accedamus, & perspicuas ad historiam: nam Columella du-  
plex affert hordei genus, hexastichum, siue cantherinum, & distichum, siue  
galaticum. Nos de priori dicemus.

*Nomen.*

Columella rusticorum more *ἑξάστικον* vocat: nam spicam fert, quæ sex ordi-  
nes habet, reliquum nomen à glabritie, & grani nuditate affert. Siquidem vel  
oritur ordeum follicello pertinaci hæsu granum sepiente, aut leuiore gluma,  
& facili exuru, cuiusmodi est id genus, quod nudum nos vocamus. Canthe-  
rinum vocat, quod folliculo castratum nascatur, sponteque granum gluma  
concidat.



concidat. Cantherii dicuntur equi, qui castrati sunt; Catone auctore. Nos  
*oreo mondarolo* vulgò dicimus, quòd facile mundetur.

Columella, Fragili culmo, & nulla vestitum palea granum eius, & ideo cele- Descriptio.  
 riter decidens.

Seritur sicca, & soluta terra, & vel p̄enalida, vel exili, quia constat arua eius Cal. Sol.  
 fegetibus macescere, propter quod pinguiſſimo agro, cuius hiniis viribus no-  
 ceto non possit, aut macro cui nihil aliud committitur. Nullam mediocrita-  
 tem postulat: nam vel pinguiſſima, vel macetrima humo iacitur: quod si lu-  
 toſo commiseris, emoritur. A quo Plinius: Seri non vult, nisi sicca, & solu-  
 ta terra, ac nisi laeta. Palladius etiam: Seritur macra, & sicca terra, vel mul-  
 tum pingui: nam quia hoc semine macescunt arua, pingui vincitur agro, al-  
 tero nō habet, quod amplius nocere possit, quū propter macritatem semen  
 aliud ferre non valet.

Columella. Altero sulco seminari debet, post æquinoctium ferè media se- Sat. mēf.  
 menti, si læto solo: si gracili maturius. Iugerum quinque modii occupabunt, idq;  
 ubi paulum maturuerit, festinantius quā vllum aliud frumentum demeten-  
 dum erit. Nam & fragili culmo, & nulla vestitum palea granum eius celeriter  
 decidit, iisdēq; de caulis facilius teritur, quā cetera. Sed quum eius messem  
 substuleris, optimum est noualia patri anno cessare, si minus, stercore saturare,  
 & omne virus, quod adhuc inest terræ propulsare. Palladius: Octobri mense  
 feri ordem cantherinum. Gracili solo Septembri, modis quinque per iuge-  
 rum. Post hoc genus agros cessare patieris, nisi fortè lætamen aspergas.

Columella. Proximus est frumentis vsus, ordeis hexastichis, quoniam & a- Pan.  
 lia animalia, quæ ruri sunt, melius quā triticum, & hominem salubrius,  
 quā malum triticum pascit. Nec aliud in egenis rebus magis inopiam de-  
 fendit.

### De oryza. CAP. XXVIII.

**A**LTERVM genus ordeis Columella distichum erat, siue galaticum.  
 Theophrastus oryzam vocat, Indiæ inquilinā, & indidem exportatam.  
 Theophrastus *ὀρυζα* vocat, & Dioscorides. Latini oryzam appellant. Colu- Nomen.  
 mella ordem distichum, quod binis versibus ordinatum sit, & galaticum,  
 quod eximii candoris sit. Et ab eo etiam Palladius ita vocat. Itali ex oryza  
 truncato nomine *rysa* dicunt.

Theophrastus oryzam zeæ similem dicit, & aspectu lolii. Effundit non spi- Descriptio.  
 cam, sed milii, atq; panici modo iubam. Magna temporis parte residens in a-  
 quis, pista, tanquam alica concoctu facilis, redditur. Strabo apud Bos moros,  
 oryze genus religiosum tradit, tritico minus. Inter omnes proueniēs, excussum  
 areis torretur protinus, & iure iurando adiguntur messorēs non asportaturos.  
 id prius inde, quā coxerint: veriti ne semen in aliis retris communicetur.

Plinius, Oryza quidem folia carnosā, porro similia, sed latiora, altitudo cubi-



alis, flos purpureus, radix gemmeæ rotunditatis. Colamella, Ordeo similis, binis ordinibus distincta spica. Granum ponderis, & candoris eximii. Nos autem: Culmo exurgit ordeaceo, cubitali, vel sesquicubitali. In arista flexuosa, & rigidula grana visuntur, spicata alterno situ subflano folliculo, acutis seu angulosis liris per longum striata. Grano candido, pellucido, & duro. Radice tritici, folio arundineo, carnosio, porro simili.

Cel. Sol.

Theophrastus. Magna ex parte in aquis residens. Strabo in omnibus provenire. Dioscorides virginoso, & palustri loco. Columella feri quam pingui-  
ssimis, & frigidis locis. Theophrastus in India nasci scripsit. Italicos, Plinius ait, maxime oryza gaudere. Strabo in India. Hodie in Bactrianis, Suside, atq;  
Syria inferiore uberrime nascitur, ex Strabone. Apud nos in Salernitano agro, & alibi maximo proventu, patenti, vda planitie, quam tamen euripis, & illicibus, & fluviis ductis, quoties opus est, rigamus, alioquin nullam, aut cas-  
sam segetem latura.

Satio.

Columella; Quam pingui-  
ssimis & frigidis locis circa Martium mensem se-  
ritur. Melius tamen responder, si clementia hyemis permittit, quum sem-  
natur circa idus Ianuarias. Iugerum sex modios postulat. Palladius: Si de-  
mens fuerit hyems, ordeum gallaticum, quod grave & candidum est, circa  
idus Ianuarias seremus locis temperatis. Octo modis iugerum complebitur.  
Locis frigidis seretur circa Martias calendas. Messis serotina est circa æquino-  
ctium autumnale. Mature scit enim æstivis solibus.

Uenis.

Columella: Ordeum galaticum tritico mistum egregia cibaria familie pre-  
bet. Plinius, Indos oleum ex oryza conficere, scripsit. Indipistum, tanquam  
alica, reddunt concoctum per facile, dixit Theophrastus. Bonum alimentum, &  
lautum suggerit, etiamq; valerudini prodest. Plinius: Italici ex oryza ptisanam  
conficiunt, quam reliqui mortales ex ordeo. Sunt qui hodie in lacte parant,  
ut sanguinem alant, & genituram adaugeant.

#### De auena. C A P. XXIX.

**D**iximus de tritico & ordeo: nunc de eius viriis, scilicet de auena. Est  
enim vulgaris notitia, in quam triticum, & ordeum, & semen faci-  
le mutatur.

Nomen.

Theophrasto *αἰνός*, Dioscoridi *βρόμος*, vel ei consimile genus, sed alia est  
*αἰνός* Dioscoridis, de qua libro quarto differit. Latini auenam dicunt, Poetæ  
bromum, vel bromium. Sunt qui festuca nomen adeptum putent, quod esse  
men ante messem deciduum sit, & spica granis orba spicæ legi tempore repe-  
riatur, in arescente adhuc in festuca. Italis *auena* dicitur.

Descriptio.

Theophrastus ita suam argilopen describit. Inter ea, quæ tritico & ordeo si-  
milia sunt, auena est, sed aspectu quodam sylvestri, & immidi. Numerosa ra-  
dice attollitur, ex qua frequens culmus spargitur, folio piloso, lolio simil, non  
tamen ut illi pingne. Semine multipliciter tunicato: immò eius granum o-  
mnium maxime natura operuit. Matura illicò granum proiicit, ut culmus re-  
stet



Ster inanis. Plinius: Ipsa frumenti sit instar, granum maxime nudum. Assurgit apud nos procero, crassoque culmo, ut triticum. Semen *germano* iam dicto simile, sed arctius, longius, acutius, & nigrius, sæpe albicans, & admodum per mesles caducum.

Satiuam auenam dicimus, syluestrem bromum Theophrasti, ut dicemus in *Genui* sequenti. Hæc tamen quum seritur, & colitur, frugifera est, si neglecta & inculta, semine vidua. Ob id Virgilius,

*Steriles dominantur auena.*

Est & auena Græca, cui non cadit semen. Plinius, Sunt qui bromum ferilem auenam, agilopem verò dicant sterilem, quasi festucam sine semine.

Quia radice, culmoq; multiplici nascitur, solū emaciat, ob id Theophrasti *solum* præcepto frugale ei damus. Alii sicco solo letari dicunt. Virgilius solū emaciare dixit: *Vrit lini campum seges, vrit auena.*

Hoc semen, Galenus inquit, in Asia frequens est, & potissimum in Mysia, *Calum* quæ est supra Pergamum, vbi & tithæ, & olyra vberimus est prouentus. Plinius: Germaniæ populi serunt eam, nec alia pulre viuunt. In oriente & Oonis insulis. Ex hoc auguror, quod utroq; cælo fruitur, calido ut Asia, & Apuliæ: & frigido, ut Germaniæ, atq; tritici naturam sortitur.

Theophrastus in cultis erumpere dixit, nonnunquam quum prius germinis infœcunda esset, diligenter culta germinauit, & copiosa reddita est. Et peculiari vel illo à cæteris frumentaceis discerni putatur, quod annis alternis semen aptum sit prouenire. Quamobrem qui eam delere penitus volunt (nam delesi percontumax est) segetes annos duos laxant à satu, quumq; plenè diffusa in herbam est, pecus sæpe impellunt, usq; dum penitus depascatur, idque planissimū eius exitium fit, quod simul & alternatam eius germinationem restatut. Cuius rationē libro de causis vestigat, & varia opinione fluctuat, numeratio in radice, ex qua postquā vnus prodierit stipes, prodit alter anno sequente, & intercepta iterū instaretur germinatio: vel collapsa prioris anni semine procreetur: ob id ut eam deleant, rudetū primum faciunt, biennio supersedendo arationi: & altero anno subpullulat, quod reliquum est, ut quod prioris anno præstitū est, & quod sequenti pollicebatur, exeat non amplius rediturum. Vel semen totum annum incorruptum permanere sub terra, quoad tempus appetat idoneum ipsum ciens ad germina, & tunica plures, quibus vestitur, ei vsu veniunt. Vel bipartiti seminis pars abit in stipulam, pars manet sequente anno germinatura. Columella: Auena autumnō seritur, partim caditur in fœnum, vel pabulum dum adhuc viret, partim semini custoditur. In Apulia omni solo serunt, tempore quo seritur ordeum. Quæ sata nascitur, crassiori & proceriori culmo est, quæ sponte, tenui stipula, & ieiuna spica sterilis est. Caducum præcedentis anni semen in agris restibili fœcunditate regerminat, re-  
 40 Equamq; frugem præcoci maturitate præueniens, tæbe conficit, ei subripiens alimentum, ita seges suo decoquit domino.



*Messis.* Properanda messis est: nam ut diximus, illicò matura semen proicit, ut spica granis viduata appareat, ex Theophrasto. Multo enim ordeum antecedit auena, ut culmus remaneat inanis.

*Coditura.* Percunditur etiam auena, & si mulcrum vestita sit, sponte suæ naturæ. In-  
tus enim incipit vitium, nempe si vetulam auenam consideres integro co-  
rio, optimam iudicabis, si conteres digitis, cassam inuenies, nec nisi acus, aut  
glumus est.

*Panis.* Germaniæ populi serunt auenam, nec alia pulte viuunt. Plinius. Et in O-  
rientis partibus gentes esse, quæ ibi sponte nascenti auena vescantur, &  
in Oonis insulis. Et si apud nos equorum, iumentorumque pabulo ser-  
tur. Sunt gentes etiam, quæ alimoniam caritate, confecto ex auena pane, fa-  
mem arceant.

*Mutatio.* Mutatur zea, triticum, & hordeum in auenam. Theophrastus auenam in  
ordeo nasci scripsit, & esse, quæ non singulis frugibus oriantur, ut auena triti-  
co, & ordeo: eaque interimat, quia pabulum tollit, tam quod terra ministrat,  
quàm quod à sole & aëre venit. Mutatio in formam alienigenam miranda sa-  
nè est: ut ex semine in auenam suam permutat naturam, sed vere transit in  
proximam. Plinius, Proximum omnium frumenti vitium auena est, & or-  
deum in eam degenerat. Soli maxime, cœlique humore hoc euenit vitium.  
Sequentem causam habet imbecillitas seminis, quum diutius retentum est  
terra, priusquam erumpat. Eadem est ratio si cariosum fuerit, quum serere-  
tur. Prima autem statim eruptione agnoscitur, ex quo apparet, in radice esse  
causam. Est & aliud ex vicino auenæ vitium, quum amplitudine inchoata  
granum, sed nondum matura priusquam roboretur corpus, afflatu noxio  
cassum, & inane in spica euanescit quodam abortiuo. Ægilopem ordeï viti-  
o fieri testis est Galenus ex nimia vligine, quum prima generatio vel incremen-  
tum ipsis non rectè successerint. Porro ut Galeni pater ætate iam declinante,  
quum agricultura delectaretur, descripsit, triticum ac ordeum aliquando se-  
minauit, omnibus diuersi generis seminibus, quæ ipsis erant admista, dili-  
genter selectis, quo certo cognosceret, num ex ipsorum mutatione lolium, &  
ægilops nasceretur, an hæc propriè semina naturam haberent. Enatis semini-  
bus in tritico frequens lolium, in ordeo parum, sed magnum ægilopis vim e-  
natam conspexit.

### De bromo. CAP. XXX.

**S** V B I V N X I M V S auenæ de bromo caput, quum vel eadem res multis exi-  
stimeretur, vel ab ea parum diuersa. Theophrastus de utraque seorsum egit,  
& inter se similia dixit: quod fuit in causa, ut nos diuersum caput cōderemus.  
Plinius externum semen esse, & ab oriente inuectum nobis dixit, & inter vi-  
tia segetum esse, & ex auenæ genere.

*Nomen.* Græcis βρόμος, non à fœtore, sed quia veterina ea vescantur, vel à fragore, quem



quem natura seges flatu edit. Latinis auena, quod ad fructum non veniat. Italis *auena galatro*.

Theophrastus ita describit. Auena radice numerosiore, quàm *agilops*, ex qua culmus frequens spargitur: aspectu veluti sylvestri, & immiti, multiplici tunica loritur. Semen ut *zea*. Mea sententia *galatrum* vulgò vocatùm esse dicerem. Nascitur auena inter ordeum solum. *Galatrum* inter ordeum & triticum, & aspectu sylvestrius quàm auena, stipula surgit crassiori, & nigriori folio, grana in spica bino ordine, in auena singulari, gluma foras binas profert aristas, granum strigosius, longius, & pilosius, avidius à bestiis deuoratur: gluma pistola est, & nigra, è cuius dorso arista intorta nascitur. Dioscorides bromum suum ita pingit: Genicula quadam habet, folio & stipula triticum imitatur, & in cacuminibus pendentes paruas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur. Plinius à Dioscoride eadem refert. Herba est spicam ferens, folio & stipula triticum imitatur, in cacuminibus dependentes paruas veluti locustas habet. Auicenna *agilopem* depingit. Est herba cuius folia sunt singula folia tritici, sed sunt leuiora, & fructus eius habet velamina duo, aut tria, & super ipsa sunt quadam similia pilis. *Galatrum* tria habet velamina, duo, quæ diximus, tertium cito cadit maturescens.

Plinius. Genera bromos, siligo, & tragos, extetna omnia ab oriente inue-  
sta, bryzae similia. Nascitur inter vitia segetum, ex auenæ genere. Gallia, Ger-  
mania & Italia laudatissimum, equis pabulum eius granum. In Calabria au-  
ditius panes fieri non respuendos, & pulres, & potus.

De lolio. CAP. XXXI.

Est & inter segetum vitia lolium, cuius etiam semen scribitur in pani-  
ficium.

Græci *ῥίζα* vocant, *ῥίζα τῆς ἀραιᾶς*, quod est sursum efferre: effertur enim in  
cerebrum vapida aura, atq; dementiæ affinis, tenebrosa vertigo ex lolio etu,  
ut remulentos efficiat vescentes, ut torpido veterno cerebrum opprimat, re-  
liquaq; membra torpore afficiat. Vocant etiam & *ῥίζα*. Latini verò lolium.

Itali *gioglio* & *zizia*.

Ordei, cuius mentitur effigie, vitium est, sed foliū angustius, pinguius, & hirsutius. Sed pinguitudo ei peculiare notatur: nam pilositas auenæ datur. Semen non multis intestinū tunicis affert, ut auena, sed nudū, aspectu penitus sylvestre, ideo & tritico validius est. Hec ex Theophrasto. Dioscorides spicā ferre scripsit capite de phœnice. Describimus nos: Spica nulli similior, quàm phœnici, granum in dura tunica, stipula, codice, & reliquis, ut tritici, flore subpurpureo.

Aquam vehementissimè amare Theophrastus scripsit, ob id vliginosos tractus diligere existimarem, quum & huiusmodi in locis triticum, vel ordeum corruptis vligine seminibus, aut nimio imbre dilutis, nasci dicant.

Negat Theophrastus lolium vernam esse frugem, quemadmodum reliqua satia.



herba: nam confestim hyeme ineunte id exortum patescit. Nascitur partim anno primo, partim secundo.

*Mutatio.*

Triticum, ordeum, & linum mutatur in lolium, & è contra. De lolii origine, tanquam cæca, ambigitur. Mirandum profectò arbitratur Theophrastus, triticum, & lolium mutatas inter se habere vicissitudines: nam & triticum in lolium, & rursus lolium in triticum, quum nullum ex frumentis istis validius reperiatur, & tam magnam mutationem recipiant. Permulti enim quum ordeum & triticum seruissent, lolium messuerunt. Mirum quoque si linum in lolium transeat: nam inter se plurimum distant, quarum rationes superius capite de tritico diximus. Degenerant fruges, quæ potissimum viribus præstant, ut triticum atq; ordeum, hæc enim in lolium transeunt, sed magis triticum, quia validius. At si lolium in triticum transeat, hoc certe admirabilius est, ceu imbecillitatem quandam, vel morbum feminis intelligere licet, quam alimèri, cæliq; mutatio tollere possit. Ad hæc in genere frumentorum aliud purum lolii nascitur, ut Ponticum, atq; Ægyptium, purum & siculum satis, & præcipuè Agri-  
gentinum sine lolio exit. Sed hæc quidem locorum naturæ ascribi licet. Plinius lolium inter frugum morbos potius, quàm inter ipsius terræ pestes connumerat. A Virgilio infelix dictum in Georgicis.

*Infelix lolium, & steriles dominantur avenæ.*

*Janis.*

Aristoteles libro de somno & vigilia inter ea, quæ grauedinem capitis efficiunt, lolium commemorat. Theophrastus graue lolium dixit, & caput tentans. In poru enim inebriat, & celerrimè vertiginem mouet. Aiunt Græciæ & Asiæ balneatores ad pellendum turbam solitos carbonibus id semen obiacere. Ouidius ad id in Fastis,

*Et careant lolis oculos visitantibus agri.*

Hinc natum prouerbiū, quo Plautus utitur in milite, contra eum, qui nihil videat,

*Mirum est lolio visitare te, tam vili tritico.*

*Quid iam? Quia lusciosus.*

Monere solebat Galeni pater, ut cerealia semina priusquam in sationis sum venirent, diligentissimè iis frugum vitis liberarentur, etenim triticū, nisi lolium à re frumentaria operosè idoneis ad hoc incerniculis expiatur, vel centibus noxam inferet, nam capitis dolores continuo mouentur, vertigines obuersantur, postmodum sequens æstas cutem fædis obsidet vlceribus, aliaq; emergunt incōmoda, quæ nutrimenti huius improbitatē satis ostendunt. Præcepit igitur Galenus non fastidiendum tritice repurgamèri præceptū: nam si grassantem sensim noxā inter initia propter exiguitatē vespentes non sentiāt, gliscente multo pluribus diebus vitio impunè non effugient, quū tandem ea non sine magna vitæ alea, manifestius eruptura prodeat. Frumentū, ut Paxamus est author, lolium necat, panibusq; mixtū vertigines edentibus adducit.

*Cōditio.*

Sponte naturæ tunditur, & si acerbi sit saporis, ex Theophrasto.



## De melampyro. CAP. XXXII.

**C**ONNUMERATUR etiam melampyron à Theophrasto inter ea, quæ tritico conuascuntur, quasi etiam frugum pestis.

Theophrasto *μελάμπυρον* est, quasi nigrum triticum dicas: nobis uero pseu- Nomen.  
domelanthium dictum. Plinius git vocat.

Theophrastus de suo melampyro hæc pauca habet, Melampyron siculo Descriptio.  
tritico peculiare, granum eius innocens, nec sicut lolium graue, ac caput ten-  
tans: nascitur inter triticum, & præcipue apulum, quum siculum conferrem, se-  
men nigerrimum, farina alba, nec noxia capiti, ut Theophrastus dicit, pa-  
nem candidissimum facit tritico immistum: nec curant pistores à tritico se-  
cernere, quum res innocua sit. Caules producit rectos, quinque vel quatuor  
pedum longitudine, folia lata, ut leucolii, pilosa, in summo flores profert pur-  
pureos, maluz effigie, radix alba, multum fibrata. Semen nigrum, cuius fa-  
rina tritico permista vesca est. Dixit Plinius: git pistrinis nascitur.

## De milio. CAP. XXXIII.

**N**ON ad alia frumenti genera deueniendum, quæ æstiuæ dicuntur, quum  
ante Vergiliarum exortum seratur. Theophrastus tertium genus appel-  
lat, atq; comuni appellatione carere ait. Nos miliacea frumenta dicemus.  
Columella inter frumenta reponendum cæset, quamuis id leguminibus con-  
tribuerit, nam multis regionibus cibariis eorum coloni substinentur.

Græcis *κίχρις* à minutis ficuum granis, seu gigartis numerosissimis, quæ Nomen.  
*κίχραμίδι* vocantur, dictum existimo. Straboni *κίχρις*, Latini milium vo-  
cant, à miliaria summa, authore Festo, quasi millesimum ferat granum: est e-  
nim tantæ feracitatis, ut singula grana ternos reddere sextarios ferantur. Var-  
ro erymon à Græcis deducit, quod communi nomenclatura tum panicum,  
tum milium *μυλινον* vocant. Itali *miglio*.

Theophrastus ita describit. Ex alta numerosa, & valida radice fruticat mi- Descriptio.  
lium multiplici, & valida stipula geniculata, arundinacea, flore lanuginoso,  
quem circa spicam gerit. Semen in iubam profert, effusam illam arundinace-  
am comam iubam appellat, similem ei, quam oryza fundit, semine feraci, plu-  
rimis folliculis concluso. Plinius, Surgit milium in culmum geniculatum, &  
concauum. Semen tantum pro indiuiso, & paruis auibus expositum, inde-  
fensum quippe membranis continetur. Comæ granum complexæ fimbriato  
capillo curuantur. Apud nos fibrosa radice ternos, quaternosve culmos, bi-  
num triumve cubitorum altos, hirsutos, arundinaceos exerit, iubata fœtura,  
comam harundinaceam imitante, grauida pusillis numerosisq; acinis, lauiore  
tunica tectis, rotundis, lubricisque.

Cato nebuloso solo feri iussit. Plinius eadem ex Catone. Columella humi- Colum.  
do cœlo gaudere dixit. A quo Palladius etiam humidum cœlum ei tribuit.



Milio Campania præcipue gaudere dixit. Plinius, Sarmatarum quoq; gentes, non aliam frugem nouille: seri que debere in humidis. Apud nos aërem tepidiorem amat.

*Solum.*

Theophrastus quia multiplici culmo, numerosa, validaq; radice præditum sit, proinde maximè terram extenuare dicit, ob id facile lætum, & crassum agrum tribuendum censuerim. Cato ei agrum crassum, lætum, & sine arboribus conuenire dixit. Columella leuem, solutamq; humum desiderare. Nec in sabuloso solo, sed in arena quoq; prouenire, modò humido cælo, vel riguo solo: nam siccum, cretosumq; reformidat. Plinius vetat inter vites arboresq; frugiferas milium seri, terram hoc satum emacrari existimans, nec nisi in sterco- 10  
rato seri. A Columella Palladius eadem habet. Florentinus Græcus, Limosa & humida terra gaudet milium, arenosa etiam, si frequentius rigeretur. Nos limoso, pingui, & glutinoso solo serimus.

*Satio.*

Verno tempore seritur, quod æstiuis seminibus attributum est, quum ob suam imbecillitatē hyemem perferre nequeat. A flore intra dies quadraginta absolui dixit Theophrastus, idq; inter omnes constare, non tamen deesse, qui vel pauciores prodiderint. Minus aquarum indiget, nam si plus habuerit, folia dimittit. A quo Plinius: Æstiuæ ante Vergiliatum exoritur seruntur, Italiæ duntaxat ritu, alioquin in Græcia & Asia omnia Vergiliarum occasu seruntur. Alii 1  
vernū milium appellant. Quadraginta diebus maturatur à flore, & quia 20  
purgari nisi tostum non potest, cum suis folliculis crudum seritur. Extremū vere milii satio est. Iustum est hoc maturato hordeo, atque etiam in eodem aruo, estq; signum illius maturitatis, & horum sationis commune lucentes vespere per arua cicindelæ. Ita appellant rustici stellantes volatus, Græci verò lampyrides, incredibili benignitate naturæ. Serere in iugero temperati soli iustum est milii sextarios quatuor. Varro: Exit è terra milium quatrīduo, aut 3  
quinque diebus. Columella: Ante ver feri non potest, quoniam reporibus maximè lætatur. Vltima tamen parte Martii mensis commodissimè terræ committitur. Nec impensa graui satione cultores onerat, quippe sextariis ferè quatuor iugerum implet. Frequentem tamen exigit sarritionem, & runca- 30  
tionem, vt herbis liberetur. Milii sextarii quatuor bubulcorum operas occupant quatuor, occantur operibus tribus, sarriuntur tribus, quot operis carpantur incertum est. Palladius calidis & siccis regionibus Martio mense milium serit, herbis iubet assiduè liberari, quinque sextariis spatium iugeri compleri. Maio mense locis frigidis, & humidis. Florentinus Græcus, Seminis pauxillum omnem implet agrum, sarriri, & runcari continuo desiderat. Seritur ab æquinoctio, quod ante octauum Aprilium calendarum diem peragitur. Quod si densius seratur, noxam trahit, quando vix iugerum recipiat, quantum plena manus continet, etiam si inter sarrīendum quippiam euellatur. Itaq; satum diligenter iugerum modios quadraginta proculdubio perfert. 40

*Messur.*

Semina quo minora sunt, eo fertiliora sunt, & quæ minima, maximè fru-

ctificare



edificare videmus, vt milium. Rationem assignat Theophrastus libro de causis, quod minora facilius effici possunt, copia autem facilitati adiudicanda est, quod eiusmodi omnia facilius augetur, celeriusq; aëris qualitati obtemperant. Argumento quoque temporis breuitas accipi potest: nam & semina ipsa hac eadem causa fertilia, quàm arbores sunt. Item eorum caules validi sunt, nec ligno constant, & multiplices, & in ramos diffusi prosiliunt. Et alibi: Æstiuæ semina, quia imbecillia sunt, perfici celeriter possunt, & ob id æstiuo tempore feruntur.

- Columella: Panis ex milio conficitur, qui antequam refrigeret, sine fastidio potest absumi. Pultem quamuis in copia, maximè cum lacte non fastidiendam præbet. Plinius, Campania pultem candidam ex eo facit. Fit & panis prædulcis. Sarmatarum gentes hac maximè pulte aluntur, & arida etiam farina, equino lacte, vel sanguine è cruris venis admisto. Æthiopes non aliam frugem, quàm milii nouere. Panis multifariam è milio fit, sed nullum frumentum ponderosius est, aut quod coquendo magis crescat. x x x x enim pondopanis è modio reducunt, modiumque pulvis ex tribus sextariis madidis. Fit quoque vinum è milii semine maturo. Galenus de alimentorum facultatibus: Milio item in panes nonnunquam abutuntur, vrgente frugum penuria. Panis tamen ex eo exigui est alimenti, & refrigerans. Constat insuper peraridum & instar arenæ & cineris friabilem esse, nihil enim in se habet pinguedinis, & lentoris. Agricola huius farina cocta, admisto adipe suillo & oleo vescuntur. Ad omnia panico præfert: nam & gratius estur, & facilius concoquitur, ventremq; minus cohibet, ac magis nutrit. Huius farinam lacti incoctam, veluti triticeam, agricola mandunt. Lacte præstantius redditur edulium, vt in edendo iucundam voluptatem conciliet, deiectionem ventris facilius molitur, eoq; duce facilius membratim digeratur. Nos panes, laganas, & placentas ex eo conflat, in mandendo glutinosas, & ingratas, nisi mox, quum cocta fuerint, edantur.

- Milium et fracerbi saporis, sponte tamen suæ naturæ tunditur, omnium tamen optimè reponitur milium, quia tunica multiplici integitur, & sicca est. Plus centum manet annos, si condatur, quo venti non perueniant. Cōditura.

Multi ad milii remedia, rubetam noctu aruo circumferri iubet prius, quàm sarrantur, defodiq; in medio inclusam vase fictili, ita nec passerē, nec vermem nocere, sed eruendā priusquā metatur, alioqui amarum fieri. Pestem à milio sturnorū passerūve agmina scit Plinius abigi herba, cuius nomen ignotū est, in quatuor angulis segetum defossa, mirum dictu, vt omnino nulla avis intret. Infir. rem.

### Depanico. CAP. XXXIII.

- DE panico eadem est tractatio cum milio, eodemq; capite vtrumq; absolui poterat, nisi nos clarioris doctrinæ gratia seiungeremus. Columella inter frumenta reponendum arbitratur.



Nomen.

Theophrasto nunc *ἰλμας*, nunc *μαλινος* dicitur, unde & milium etiam dicebatur, auctore Varrone. Fuit enim milii, & panici propter communes naturas, & usus promiscua nomenclatio, est quippe milii species. Latinis panicum dictum à glomerosis tuberosisq; racemis in paniculam nutantem, & longam aggestis: nam Plinius panicum à paniculis dictum dicit. Apud nos Latinum nomen retinet, *panico*.

Genera.

Plinius: Sunt & panico genera. Mammoso, è pano paruis racemato paniculis, & cacumine gemino. Quin & colore distinguuntur, candido, nigro, rufescente, etiam purpureo. Apud nos sativum & sylvestre.

Descriptio.

A Theophrasto ei calamus tribuitur arundinis ut milio rectus flos lanuginis, semen circa spicam, multiplici tunica contextum, & radice valida, & caule valido, & multiplici. Plinius, Cacumine languido, nutante, paulatim extenuato culmo penè in surculum, prædens aceruatur grans cum longissimo pedali, semper tamen pro indiviso, & paruis aubus expositum, indefensus quippe membranis continetur, culmo geniculato, & concauo. Panicum milio per omnia simile, nisi in paniculis, siquidem ea pedali longitudine profert ad terram versa, prædens racemis compacta, non ut in milio diuisa, grans miliaceis exilioribus, numerosioribusq; multistunicis obsitis, & hirsutis. Sylvestre stipula, folio, culmo, internodiis, & radice omnia panico non dissimilia profert, longè tamen minora, sed spica peculiari non in umbonem collecta, sed minore, & alterno situ summo cauli hærente.

Cul. Sol.

Cælum, & solum idem, quod in milio diximus.

Eandem quoq; panico tribuemus diligentiam, quam milio tribuimus.

Diocles Medicus, auctore Plinio, mel frugū appellavit. Panico Gallia quedam, præcipuè Aquitania utitur. Sed & Circumpadana Italia, addita faba, sine qua nihil conficiunt. Pontica gentes nullum panico præferunt cibum. E panico panis rarius fit, quàm è milio. Columella, Panicum pinsum, & euolutum furfure pulrem, quavis inopia, maximè cum lacte non fastidiendam præbet. Dioscorides miliaceo panem minus nutrire & stringere dicit. Galenus paucioris alimenti dixit. Nulla gratia, aut iucunditate commendatur, maximè quod in Asia nascitur: nam apud alias gentes, ut in Italia longè melius inuenitur. Panis, qui ex eo defingitur, persictus, & cineris aut anenè modo friabilis, lentoris foedere, aut humoris vinculo carens. Quapropter iure optimo coeuntem in aluo resiccat humorè, atq; exhaustiès exugit. Rustici haud ferè aliter, quàm ad misto pingui suillo, & oleo ad domandam ariditatem farina vescuntur. Panicum in omnibus milio cedit, insuavius esu, cōcoctu difficilior, ventremq; multo magis firmas, quare in eduliis rustici nō sine lacte utuntur, ad tollendas eiusmodi noxas, sic faciliorem concoctionem, suauitatem, ac in corpus distributionem à lacte sibi asciscit. Sed agreste panicum molitur in farinam, & in agrestem cogitur panem, ubi premit caritas tritici. Apud nos verò ad columbarum, gallinarumq; saginam potius, quàm ad hominum alimentum fertur.



## De milio Indico. CAP. XXXV.

**I**NTER frugum genera melicam annumerabimus, & fortasse milium Indicum Plinii ex India in Italiam allatum Neronis principatu, intra decem annos omnium frugum fertilissimum: nam ex vno grano terni sextarii gignuntur.

Latini (si Plinianum Indicum milium est) Indicum milium vocant, Itali *Nomen* *saginam*, & *melicam*, vel *surgam* à proceritate, qua surgit inter suas cognatas fruges, scilicet milium, & panicum.

Plinius ita describit: Amplum grano, arundineum culmo, adolescit ad pe- *Descriptio*  
des altitudine septem, praegrandibus culmis: lobas vocant. Ferraria nos hanc segetem vidimus, harundineis consurgere culmis ad hominis proceritatem, medulla intus farctis, fuscis, geniculis tuberosis, superioribus foliis mucronatis, spicatis in summitatibus fastigiis, panico maioribus, floribus luteis, granis oblonga rotunditatis, subrubris, cannabis aut milii duplo maioribus, duplici tunica involutis. Petioli, quasi filamenta sunt, è quibus, excussis granis, scopas concinnant, vestibus, & capiri detergendis, verrendisq;, & arefactis summis viticulis rigidioribus, & exilibus.

Apud Ferrarienses genera sunt, rufiora, nigrioraq;, & quæ cito, & quæ se- *Genera*  
ro maturitatem sentiunt.

Plinius feri debere in humidis scribit. Optat & latum solum: nam multi- *Solum*  
plici culmo, & radice emaciat solum.

Apud eos ita feritur. Octava corbæ pars bubulcam replet, solum exposcit *Satie*  
optimè pastinatum. Si nimia loci pinguedine perit, sarculatione adiuuetur. Locis temperatis, Martii fine, calidis citius, frigidis ferius cum milio feritur. Viginti diebus sub terra latitat. Maii initio ablaqueatur, ut latius à radice pululet. Iunio occatur, ut se solis ardore tueri possit. Augusti fine, vel Septem- bri metitur, & in fasces colligitur, & ubi sole inaruit, area tritatur.

Miscelli illic coloni pertæsi operæ, & longioris moræ, qua ceteræ fruges e- *Panif.*  
gent, melicam ferunt ad panificia, alibi columbis, & pullis alendis, & suum, & boum, & equarum pabulo.

## De milio Æthiopico. CAP. XXXVI.

**E**ST & apud nos planta, superiori multum affinis, ut oblectationi magis, quam panificio sata, & culta. Dicunt ex Æthiopia aduectam, ob id Æthiopicum milium multis vocatum, & nostro orbi iam inquilinum, ad frugum magnitudinem, & speciositatem adolescit. Folio & calamo cōsurgit similis tritico indico iam dicto, intus alba medulla infarcto, saccariferarum arundinum modo, in summo spicata fastigia milio maiora insunt, quæ post delapsos flores è capillaceis filamentis exiguis, rigidisq; grana dependent, albo folliculo occlusa, candido colore, ut niuea videantur, minus exactæ rotunditatis, sed cōpreste, lenticularis, durissimum fractu, nigro puncto, quo spicæ, vel petiolo hærent, ut



agrè diuellantur. Spica est semipedis longitudine. Tepidum cœlum, & pingue solum desiderat. Seritur Martio cum milio. Fleret Iunii fine. quindenis diebus singulas radices profert è nodis siue geniculis, primo è tertiæ proximioribus, & gradatim ad superiora tendens, vsque ad quartum. Radices terram à summo petunt, eique infunduntur, ut plantæ moles firmius contra ventorum impetum firmetur. Grana candidissima, candidissimam farinam promunt, panificiis aptam.

*De sesamo. CAP. XXXVII.*

**E**T si veteribus ferè omnibus, ut pleraq; alia cerealium seminum, notissimus erat vsus sesamæ, nostris tamen temporibus intercidit: nam multis in locis non solum frugem ipsam, sed nomen ignorant, sed medico tantum vsui inseruit. Columella inter legumina reposuit, Plinius inter æstiuæ frumenta. Theophrastus tertium genus dixit, quæ in æstiuis sementibus carent communi appellatione. Nostra leges in vtriusq; medio habet, & frumentorum fine, & leguminum principio, vtrius modo accipito. Sed æstiuæ semine aliqua spicis, aliqua vasculis claudabantur: diximus quæ spicis, par est, quæ clauduntur vasculis subiungere.

*Nomen.*

Græcis & Latinis idem nomen fuit, quippe illis *σάμμιον*, vel *σάμιν*, his sesamum, & sesama. Varro sesima. Palladius *siâmû*. Italis *gingnilea* vulgò dicitur.

*Descriptio.*

Theophrastus ita efformat illud. Attollitur caule crassiori, & multipliciori, & numerosiori radice, quàm miliû. Alibi verò simpliciiori radice & culmo quàm miliû, caule ferulaceo, recto, flore lanugineo, sed foliis conformato. Grana fert in siliquis, distincta ut lupini, sed peculiari quodam in modo sepra, & pinguiuscula. Viride nullû animal attingit propter amaritudinẽ, & grauitatẽ saporis, siccû acceptius, & suauius fit, quàm quicquid amaritudinis in eo fuerit, percoctum excretumq; sit solis opera. Inter æstiuæ feracior, & in totum ferè simile iriono. Plinius verò ita depingit, Sesama fastigiatur in culmum ferulaceum, folio sanguineo, semen includitur vasculis, nullum animal vescitur. Adimus: Surgit caule sesquicubitum alto, foliis amygdali, siliquis cylindræis, præsepiolis distinctis, semine flauescente, oblongo, radice simplici, & alta.

*Genera.*

Generum differentiam ex colore, & sapore Theophrastus accipit. Ex eo candidum præfertur dulcedine, quod & in cæteris leguminibus accidit. Plinius, Color eius candidus.

*Calum.*

Columella in Syriæ, & Cilicię regionibus, & Pamphilię Chalcide vidit. Plinius, Sesama ex Indis venit. Ob id existimarem calidum cœlum exoptare.

*Solum.*

Nihil ita emacrat solum ex æstiuis sementibus, utpote cui crassior, & multiplicior sit arundo, quàm milio, & radix quoq; numerosior, ex Theophrasto. Ob id Columella dixit, Putre solum, quod Campani pullum vocant, plerunq; desiderat, nõ deterius tamen pinguibus arenis, vel congestitia humo prouenit. Palladius ab eo: Seritur putri solo, vel pinguibus arenis, vel terra congestitia.

Æstate



Æstate seri sesamum monet Theophrastus, tum imbecillitate, vt à tem- *Satio.*  
 pore petat opem, tum quod natura propensa sit ad celerem fructificatio-  
 nem. Neq; est terrestris substantiæ, vt illa leguminum, neque penitus le-  
 uis, vt illa hordei, sed pinguiuscula est, atq; opus habet coctionis, ob id cun-  
 ctabundum it ad maturitatem. Constat radice vnice, ob id æstatis molli-  
 tiem appetit, nec habet aduersus hyemem præsidia. Non moratur ergo na-  
 turæ operam ad superiora conficienda, quin sese expediat, nisi pinguedo  
 illa nonnihil exigeret operæ. Postquam de floruit quadragesimo die absol-  
 uitur, vt omnia æstiuæ, & si non desint qui intra pauciores dicant: ei post  
 10 sationem imber officit, quæ cæteris omnibus superueniens frugibus pro-  
 fit. Plinius: Quadraginta diebus maturatur à flore sesama. Varro: quin-  
 que diebus sesima exit è terra, præterquam si quid regio, aut tempestas vi-  
 tij attulit, quominus ita fiat. Columella eius sationem docet sic: Sesama,  
 quæ rigantur, maturius, quæ carent humore ab æquinoctio autumnali se-  
 renda sunt in Idus Octobris. Tantumq; seminis, quantum milium, pani-  
 cumque, interdum etiam duobus sextariis amplius in iugerum spargitur.  
 Sed Ciliciæ, & Syriæ regionibus Iunio, Iulioq; cõseritur, & per autumnum  
 quum permaturuerit, tollitur. Sesami modij nouem, vel decem totidem  
 operas, quot tritici modij quinque postulant. Sesami sextarij sex tribus iu-  
 20 gis à proscissione coluntur, occantur operis quatuor, sarriuntur quatuor,  
 & sarriuntur iterum duabus, metuntur duabus. Summa fit operarum quin-  
 decim. Alibi: Quibusdam regionibus, sicut in Cilicia & Pamphylia Augu-  
 sto mense sesama seruntur. Italiæ autem regionibus humidis possunt vlti-  
 mo mense Iunio seri. Plinius, Æstate ante Vergiliarum exortum seritur, vt  
 cætera æstiuæ Italiæ duntaxat ritu. Palladius, Septembri seritur. Iugero  
 quatuor, vel sex sextarios seuisse conueniet, seriturque vsque ad idus Octo-  
 bres etiã lato agro. Ex Quintiliis. Februario seritur, vt trimestre triticum,  
 & Martio.

Optime reponitur, inquit Theophrastus, quia pingue est, sui que succi *Cõditura*  
 30 natura se tutari potest. Acerbi saporis est, & sponte suæ naturæ tunditur.

Alexis in lebe in condimentorum catalogo sesamam recensuit ex A- *Oleum.*  
 thenæo. Plinius, Indi ex ea oleum conficiunt. Sic pinsi iubet Mago. Sesa-  
 mam in calidam maceratam exporrigi, deinde cõfricari, frigidæ immergi,  
 vt palea fluat, iterumq; exporrigi in sole super linthea. Quod nisi festi-  
 nato peragatur, liuido colore mucescere. Dioscorides oleum Ægyptios ex  
 eo conficere, vt nunc apud Græcos, & Turcas in maxima copia paratur in  
 cibum, secundum locorum bonitatem. Nunc condiendis panibus in spar-  
 gitur, & præsertim buccellatis, qui ex Cypro Venetias afferuntur. Nullus o-  
 40 rientis frequentior cibus, quàm sesami, quamuis sequacis sit lentitiæ, &  
 oleaginei liquoris.



**P**ost sesama de crysmo, siue maioris de irione dicendum, quum sesama maximè assimilet Theophrastus, & cognatum faciat, & In æstiuarū frugum censu connumeret. Meminit alterius crysimi Dioscorides inter oleraceas plantas, à prædicto admodum dissimilis, sed vtriusque meminit Galenus, & Theophrastus inter frumenta, & Dioscorides inter medicamenta. Plinius vtrumque confundit; vt videbimus.

**Nomen.** Græci ἐρύσιμον vocant, Latini irionem, Dioscoride teste, sed suum irionem oleraceum intelligit. Plinius etiam cereale irionem vocari dicit, sesamæ simile, in Asia, Græciāq; erysimum, quod apud nos vocant irionem. Videtur mihi *formetone* dictum esse, vel ei non admodum dissimile, vel *faracenicum*, quum nulla planta eruditorum sententia ei affinium videatur.

**Descriptio.** Theophrastus ita depingit: Caule consurgit ferulaceo. Folio constat, quod ab aliis sua proprietate discernitur. Flore foliaceo, vt sesamū. Prosum idem erat, nisi pinguiusculum esset, quo virente nullum animal vescitur, quod amarum sit, sed siccum cibo idoneum, quum quantū in eo amaritudinis & difficultatis erat, percoctum excoctumq; sit solis opera. Feracissimum est, semenq; minimum affert, ideo ex seminis exiguitate fecunditas arguitur. Plinius, Folium sanguineum irioni & sesamæ. Erysimum erat, nisi pinguius esset, quod apud nos vocant irionem, medicaminibus annumerandum potius quàm frugibus. Irione nullum animal vescitur virente. Sed apud nos cubitali caule assurgit, striato, folio non frumentaceo, sed leguminoso, smilacis, aut atriplicis, flore candido, semine glumis contento triquetris, nigris, maturescens planta purpurascit. Contritum semen albam farinam ostendit.

**Calum.** Calidum cœlum exoptare videtur: nam Plinius in Asia, & Græcia nasci scripsit. Apud Belgas & Antuerpianos nasci audiui: & in Italia ferax.

**Satio.** Theophrastus, Recens satio irioni pluuius imber nocet, quam quā reliquis frugibus prodesse videatur. Æstatis tempore seritur, quo panicum, & sesamum. A quo Plinius. Fruges sunt æstiuæ, quæ ante Vergiliarum exitum seruntur, vt sesama, irio, Italiæ duntaxat ritu, alioqui in Græcia & Asia omnia Vergiliarū occasu seruntur. Seritur & in Italia Aprili, & metitur Iunio mense. Addunt calidis in locis bis in anno eodem agro prouenire.

**Pan is.** Galenus primo de alimentorum facultatibus inter fruges eum referens, dixit, vt milio panicum ad simile est quodammodo, sed ad omnia deterius, ita & sesamo erysimum corporis substantia non nihil affine, sed prorsum insuauius est, & tenuioris alimenti, adeo quod in omnibus deterius existit. Rustici non solum panem conficiunt, sed etiam pulmenta, quibus hyeme victitant. Vel granam incoquant rustici, vt bubus, iumentis, pecudibusque cedat in pabulum, cuius vsu vehementer gliscit sagina.



**I**am ad alterum frugum genus deuentum est: diximus enim de triticeis, nunc de leguminibus dicendum. illa enim spicantur glumis & aristis, hæc grauidantur siliquis, & vaginulis, & quemadmodum illa à terendo triticea dicebantur, sic hæc à legendo legamina Latini dixerunt. Legumina etiam Varro dicuntur, quod vellantur à terra, non autem subsecentur, vt fruges. Gallicani quidam legaria appellant. Græci *χερσπορά*, sicut etiam *ὄσπρεα*, quasi ferenda, quod semina multo fœnore reddant, quum legumina triticeis feraciora sint, & multo prouentu minore labore, & tempore colantur.

**10** Ea clarissimis Romanis cognomina dederunt, sicut Fabij, Cicerones, Lentuli, & Pisones, à faba, cicere, lente, & piso cognomina retulere. Nos à fabis incipiemus, quod inter legumina maximus sit honos fabæ, inquit Plinius, sola certè frugum etiam exesa repletur crescente Luna. Faba maximè delectantur apes, vbi pabulum autumnale deest, duplexq; ex ea ministerium præbetur, cæra, & cibus, vt inquit Varro, & Palladius. Et Plinius, Apum causa fabam ferere oportet.

Græcis *κίω* vocatur, à maxima earum feracitate, vt Galenus annotauit. Antiqui ferè cuncta legumina fabas, quasi prægnantes, & fœcundas vocarunt à verbo *κίω*, id est prægnans sum, & *κίαιοι* testiculi dicti olim. Sed

**20** faba postea leguminum omnium notissima, vt quæ plebi in annonæ caritate non vulgare præsidium afferat, speciatim nomen sibi soli usurpauit. *Κίω* etiam vocarunt, vnde *κίω* Atheniensium festa Apollini sacra, quibus *κίω*, id est fabæ & legumina ferebantur, a quibus mensis, in quo celebrabantur, *κίω* dictus, is Aprilis est, qui & Octobri conuenit. Latini fabam dicunt, & fabulum Festo, & Gellio authoribus. Itali *faua*.

Theophrastus colore & sapore discrepare dixit, cãdida dulcedine præstant. Plinius nasci in Mauritania dixit, syluestrem passim, sed præduram, & quæ percoqui non possit. Columella trimestris meminit, quæ mense Februatio feritur, sed exiguas paleas, nec multam siliquam facit. Apud nos

**30** variæ sunt magnitudine, colore, effigie latiore, compressiore, tereti, rotunda. Est enim magna, quæ pollicis iuncturâ superat, *ischiæ* vocata. Sunt & minimæ, mediæque, quas *canzanellas* vulgò vocant. Sunt & rubro colore aspersæ, veluti cruore, & magnæ, quæ pro deliciis feruntur.

Theophrastus ita depingit: Faba sola ferè leguminum erecto scapo cõsurgit, & sine adminiculo nititur, mira interdum proceritate post cicer, geniculato, & fistuloso, sine ramis, folio rotundo, vt leguminum pars magna. Fructum fert siliquis, qui siliquis adhæret, & veluti quoddam principium inde obtinet eminens. Quum recentes sunt, mandipossunt, propter commissionem aquosi humoris: aridiores verò humoris temperie

**40** sublata, minus commendantur. Radice singulari, lignosa, & capillata fibris,

Nomen

Genera.

Descriptio.



vt cætera legumina. A quo Plinius: Legumina omnia singulas habent radices, præter fabam. Leguminum vnicaulis faba sola, sed fistulosus caulis, folia multiplicia habet, vt cicer, & pisum, rotunda, vt magna leguminum pars. In eius flore literæ lugubres reperiuntur, alternis lateribus siliquatur. Sunt qui putent nostram fabam non esse antiquorum illam, quum nostras maior, eorum fabula, vel fabella sit, nunc enim loto, & terebintho pares comparantur, nunc taxi baccis apud Dioscoridem. Galenus verò rotundas, iuxta & equales a fellis subter hydriis delitescantibus *χράμους* vocatis comparat. Aristoteles pulli decimi incubitus diei oculos faba maiores dicit. Ex his cognoscimus eorū fabam fuisse minorem, quàm hodierna, nec tamen specie diuersam, sed congenerem. Addimus nos: Folia ab extremo in fastigium rotundantur, carnosæ, portulacæ similia, exortu alterno in ramis, quæ e caule dispari exortu prodeunt. Flore cristato versicolore, partim albo, partim purpureo, atris quibusdam maculis notato, vel nigricantibus lituris, quas rati lugubres literas illi Romani Flamines non mandebant, vt tradit Varro. Plures racematim ex vno pediculo exeunt, non vtrinque, sed vno tantum latere seriatim appensi. E ramusculorum cacuminibus capreoli exeunt singulares, adeo tenues, vt faciliè perdantur. Siliqua semipedalis, fructu intus lato, humani vnguis effigie, vnusquisq; suis inhærens valvulis, perinde quasi peculiaribus cellulis clausi, basi, qua hæret, cernitur vestigiū nigrū illud, quod hilum vocabant antiqui, quasi germinis vmbilicellum.

*Cælum.*

Calidum videntur cælum expostulare, quippe calidis in locis, soli q; expositis Theophrastus, coctiles fabas euenire dixit, vt in Ægypto, solis & æris causa. Calor enim coctilitati, & digestionis pernecessarius est. Contra verò frigido cælo incoctiles. Apud Philippos ob frigidos flatus incoctiles nascuntur, vt latius in sequentibus dicemus. Augur id verum esse, quod latis Apuliz campis, & calidissimis optimæ proueniunt. Plinius nasci scripsit sua sponte plerisque in locis, sicut septentrionalis Oceani insulis, quas ob id fabarias dicunt. Columella nebulosum locum non pati dixit.

*Solum.*

Theophrastus leue solum melius fabam ferre dixit, sic enim modicè alimentum offertur, idemq; optimū præstare nouale dixit, quamuis frequens pangatur, & fructum largiorem ferat. Minime enim molesta est terræ, tum raritatis suæ causa, tum etiam quod solum, in quo sata sit, lætificet stercoris vice. Ob id circa Thessaliam, & Macedoniam, quum florere incipit, arua moris est inuertere, quia legumen id solum pro stercore proficit. Cato: fabam in locis validis non calamitosus serito. Columella: Fabæ pinguiissimus locus, vel stercoreatus destinatur, nec macrum locum patitur, densa tamen humo commodè respondet. Sunt & qui putent in aruis hanc eandem vice stercoris fungi, quod sic ego interpretor, vt existimem non sationibus eius pinguescere humum, sed minus hanc quàm cætera semina vim terræ consumere. Nam certum habeo frumentis vtiliorem agrum esse, qui nihil

quàm



quàm qui istam siliquam proximo anno tulerit. Plinius: In solo valido fabam serito. Solum, in quo sata est, latificat stercoreis vice. Ideo circa Macedoniam Thessaliamque, quū florere incipit, vertunt arua. Didymus gaudere lutosa terra dixit. Rationem addit Leontius. In arida enim cōcidunt, antequam enascantur, & percunt, quæ verò non concidunt, degeneres fiunt. Quintilij fabam humectis locis, & humorem continentibus gaudere. Palladius à Columella: Faba pinguißimum, vel stercoreatum desiderat locum, vel vallem, quam succus veniens à summitate fœcundet. Satione eius generis non fœcundatur terra, sed minus læditur, & agrum vtiliorem  
 10 frumentis probari, qui anno superiore vacuus fuerit, quàm qui calamos fabaceæ messis eduxit. Nos autem magnas & latas fabas in planis & validis terris serimus, vt Apuliæ, paruas autem tenui solo, & collibus.

Theophrastus maturè seri præcipit: nam suæ imbecillitatis gratia ad radicem firmitatem consequendam, desiderat anteuertere hyemem. Faba ante hyemem seritur, simul & quia imbrem in flore amat, diuque refloreat, nam si serò seratur, imbrem haud assequi possit. Prodest fabæ imber, quum floret, quia raro opere constat. Aded enim detrimentis multis frequenter obnoxia est, vt quamuis maturè prouenerit, tamen perfici plerumque non possit. Eius imbecillitatem, sensui manifestam, percipere licet: Est enim  
 20 corpore soluto, & valido, nec radice numerosa subnititur. quamobrem à quauis causa offensa transigi facile potest. Dicit etiam esse, qui sero eam serere audeant, si minus primis imbribus expedire potuerint. Fabas optimè seri putat Varro in Vergiliarum occasu. Columella: Media sementi pars seri, & pars vltima debet, quæ septimuncialis satio (à sacrificiis) dicitur. Tempestiua frequentius, nonnunquam tamen sera, melior est. Post brumam parum rectè seritur, pessimè vere, quamuis sit etiam trimestris faba, quæ mense Februario seratur, quinta parte amplius, quàm matura, sed exiguas paleas, nec multam siliquam facit. Veteres itaque rusticos plerumque dicentes audio, malle se matura fabalia, quàm fructum trimestrem. Sed  
 30 quocunque tempore anni seratur, opera danda erit, vt quantum destinauerimus in sationem, tantum quintadecima Luna, si tamen ea non transcurrat eo die solis radios, quod Græci ἀπὸ καυσίου vocant. Si minus, quartadecima vtique adhuc crescente lumine, spargatur, etiam si cōfestim totum semen operiri non poterit. Nihil enim nocebitur ei nocturnis roribus, aliisve causis: dum à pecore, & auibz vindicetur. Virgilius vere serit.

*Vere fabis satio.*

Ab his Plinius: Seritur ante Vergiliarum occasum leguminum prima, vt antecedit hyemem. Virgilius eam per ver seri iubet Circumpadanæ Italiæ ritu. Sed maior pars malunt fabalia maturæ sationis, quàm trimestrem fructum eius. Varro in fabæ vtique sata hanc obseruationem custodiri  
 40 præcepit, allij plena Luna serendam. Didymus: Oportet fabas serotinas



plantare. Palladius Nouembri mense spargit semen, & Decembri circa septimum idus. nam post exactam brumam male seminatur. Nos hic magnas Octobriserimus, quia præcoces sunt, minimas verò serius.

*Elect. sc.*

Virgilius priusquam semina proiciat in terram, vititur aliquibus medicaminibus, ut grandior nascatur, & coctilis euadat :

*Semina vidi equidem multas medicata ferentes,*

*Et nitro prius, & nigra profundere amurca,*

*Grandior ut scetus filiquis fallacibus esset :*

*Et quamuis igni exiguo properata maderent.*

Eadem Columella à Virgilio refert. Plinius: Si vino antè semina perfusa, minus ægrotare existimant. Quidam verò: si triduo ante satum, vrina & aqua macerentur, præcipue adollescere putant. Græci asserunt fabæ semina galli sanguine macerata ab aduersantibus herbis liberari. Putat enim satiationem, quod quemadmodum gallus leoni aduersatur, sic orbanchæ, quæ necat fabas, osproleon à Græcis dicta, vel herba leo, sanguine galli perfusa semina timeat, ob id eis non officiat. Didymus: Et nitrata aqua resperfas cocturam non habere difficilem. Aqua pridie infusa, citius nasci. Nostri, qui fabas in serobibus paxillo depressas infodiunt, longè maiores producant. Sed quantitas in seminio proiciendo, ab his ita determinatur. Varro: Seruntur fabæ modis quatuor in iugero. Si locus crassus plus, si macer minus. Columella ex Tremellij opinione & sua, ita serendâ mensuram præscribit fabarum in iugero: Iugerum agri quatuor, ut Tremellio, sex verò, ut ei videtur, occupant modij, si solum pingue sit, si mediocre paulo amplius. Plinius, Serere in iugero temperati soli iustum est tritici modios quinque, fabæ quintam partem amplius quàm tritici, pingui solo plus, gracili minus. Pamphilus Græcus præcilius docet, deducit digitos manus, eosque imprimit in terram, & seminum numerum in manus vestigio considerat. In fabis senarium, & quaternarium esse debet. Satiationis modum ita docent. Columella: Et si vernactum erit in valle situm, quod à superiore parte succum accipiat, prius tamen iaciemus semina, deinde proscindemus terram, proscissamque in lyram reuocabimus, occabimusque, quo largiore humo altius contegatur: nam id plurimum refert, ut radices enatorum seminum penitus demersæ sint: sin autem proximæ messis occupandum erit restibile, defectis stramentis, quatuor & viginti vches stercore in iugerum disponemus, dissipabimusque: & similiter quum semen crudo solo ingesserimus, inarabimus, imporcatumque occabimus, quamuis scio, quod locis frigidis negent oportere occari fabam, quia extantes glebæ à gelicidiis adhuc teneram vindicent, & aliquem teporem frigore laboranti præbeant. Post saturationem, ut Theophrastus refert, quibusdam in laeis, vel quintodecimo, aliis vigesimo difficillimè omnium leguminum proue-



prouenit, & si quum sata fuerit, imbres plus æquo inceserint, prouentu difficilis redditur. Eadem parte scapus & radix funditur, idque in omnium leguminum genere, non in diuersa ut in frumento, qua siliquarum nexus consistit, inque ea, veluti principium quoddam germinandi haudquaquam obscurum, quod vel ad mentulae formam effigiatum sanè inspicere possis. Radix deorsum versus, folium verò & caulis sursum. Exit primum multis foliis, ut pisum, atque cicer, non singulis ut triticum unde caulem emittit. Diebus quadraginta floret, non vniuersim ut frumentum, sed particulatim. Caulis pars infera primum florem promit, quo excusso proxima, atque ita ad supremum itur, successu continuo. Post florem diebus totidem perficitur, ita tamen, ut citra tantumdem spacium temporis hæc florere, atque perfici nata sit, quum cætera intra dies pauciores consummentur. Aquas in flore maxime concupiscit, quum verò defloruerit, exiguas desiderat, ob id serò eam serere volunt, consummatio enim iam in vicino est. Causa est, quia legumina diutius florent, ex quo sit, ut pluuiam desiderent, & adepta benè succedant, sed hoc forsitan per accidens est, quod tota planta humorem adepta, melius vegetetur, quum fructus, quo perficiatur, iuuari desiderat, & præcipue faba, quia cara, & fertilis flore fructuque omnium maxime sit. M. Varro: Legumina serè quattuordecim aut quindecim diebus, præterquam faba, ea enim serius aliquando prodit seges. Plinius à Theophrasto: Fabæ in totum exeunt, deinde caulem emittunt, nullis distinctum internodiis. Erumpit faba à sata primo à decimoquinto ad vigesimum. Diutissime faba floret quadraginta diebus, non autem singulæ scapi tandiu, quoniam alio desinente alius incipit, nec tota seges, sicut frumenti pariter. Siliquantur ab ima primum parte, parlatim flore subeunte. Quum defloruerunt crassescunt, maturanturque cum plurimum diebus quadraginta. Aquas in flore maxime concupiscunt, quum verò defloruerunt, exiguas desiderant. Palladius: Fabæ quadraginta diebus florent, simulque grandescunt.

30 Columella: Fabam multi ne sarriendam quidem putant, quod & manibus, quum maturuerit, ducta secernatur à cætera runcatione, & internata herba sceno reseruentur. Cuius opinionis etiam Cornelius Celsus est, qui inter cæteras dotes eius leguminis hanc quoque enumerat, quod sublata faba scenum ex eodem loco secari posse dicat. Sed mihi videtur, inquit, esse pessimi agricolæ committere, ut satis herba proueniat. Frugibus enim plurimum detrahitur, si relinquitur runcatio. Neque enim est rustici prudentis magis pabulis studere pecudum, quam cibis hominum, quum præsertim liceat illa quoque cultu pratorum consequi, adeoque fabam sarriendam consilio, ut existimem debere etiam ter sarri: nam sic cultam comperimus non solum multiplicare fructum, sed exiguam portionem in valvulis habere. Hyberna sarritio plurimum iuuat diebus serenis

Cultus.



ac siccis post brumam confectam mense Ianuario, si gelicidia non sint: ea porrò sic debet fieri, ne radices satorum lædantur, & ut potius adobruantur, cumulisq; exaggerentur, ut latius se frutex humi diffundat, id prima sarritione fecisse proderit, secunda oberit: quia quum pullulare desit frumentum putrescit, si obrutum est. Nihil itaque amplius in iteratione, quàm remoliri terra debet æqualiter, eamque transacto æquinoctio verno statim peragi oportet intra dies viginti, antequam seges in articulū eat, quoniam serius sarrita corrumpitur, in sequentibus æstiuis siccitatibus, & caloribus. Subiungenda deinde est sarritioni runcatio, curandumq; ne florentem segetem tangamus, sed aut antea, aut mox, quum defloruerit. Fabæ modij 10 quatuor, vel sex in veruacto duas operas bubulcorum detinent, at in restibili vnam. Occantur sesquiopera. Sarriuntur sesquiopera, iterum sarriuntur vna opera, & tertio vna, metuntur vna, summa fit operarum octo, vel septem. Plinius. Ter quidem sarritam modium fractæ è modio solidæ reddere dicunt. Fabam non proscisso serere sine damno compendium operæ est, bis sarrire melius, runcari non gestit, quoniam euincit herbas. Faba ante quàm trium foliorū esse cœperit, leui sarculo purgare, verius quàm fodere conuenit. Florentem vtique xv primis diebus non attingere. Palladius. Faba si bis sarculetur, proficiet, & multum fructum, & maximum afferet, ut ad mensuram modij complendi fresa propemodum sicut integra 10 respondeat. Nos Maio mense sarrimus, quum floruerit, ne luxuriet in frondem, cymam decerpimus, vbi solidum est non fistulosum, nam per fistulam ingrediens aqua, corrumpit eam. Iterum foditur Maij sine, ac Februario adobruitur, ut pullulationes terræ aggere adiuuentur.

*Messu.*

Columella: Faba & sine iumentis teri, & sine vento purgari expeditissime sic poterit: Modicus fasciculorum numerus resolutus in extrema parte areæ collocetur, quem per longissimum eius mediumq; spacium tres, vel quatuor homines promoueant pedibus, & baculis, furcillisve cōtundant. Deinde quum ad alteram partem areæ peruenerint, in acruum culmos regerant. Nam semina excussa in area iacebunt, superque ea paulatim eodem modo reliqui fasciculi excutientur. Ac durissimæ quidem acus reiectæ, separatæque erunt à cudentibus, minutæ verò, quæ de siliquis cum faba resederunt, aliter secernentur. Nam quum acruus paleis, granisque mistus in vnum fuerit cōgestus, paulatim ex eo ventilabris per longius spacium iactetur, quo pacto, palea quæ leuior est, citra decidet, faba, quæ longius emittetur, pura eo perueniet, quò ventilator eam iaculabitur. Plinius. Octauo Calend. Iulij faba teritur, deinde concutitur. 30

*Cōditura*

Theophrastus. Celerrimè faba tunditur sua natura, sed dici fortasse verissimè potest, hæc perinde ac locis valent, posse perdurare. Quippe quum apud Apolloniam maris Ionij fabas multos perdurare annos confirmet, 40 multos etiam apud Cyzicum. Sic apud Tarentum & contusam reparari posse



posse affirmant, cinere quoque tosta plurimum ad diuturnitatem sanè facit: sic enim humoris minus relinquitur. Columella: Silente Luna fabam vellito ante lucem, deinde quum in area exaruit, cōfestim prius quàm Luna incrementum capiat, excussam refrigeratamq; in granarium conferto, sic condita à curculionibus erit innoxia. M. Varro: Faba in oleariis vasis oblita cinere, per diu incolumis seruatur. Didymus: Fabæ marina aqua rigatæ & resperstæ, integræ & illasæ permanebunt. Plinius fabam in oleariis cadis oblitam cinere longo tempore seruari dixit. Item fabam à Pyrrhi Regis ætate in quodam specu Ambraciæ vsque ad piraticum Pompeij Magni bellum durasse annis cireiter cxv. Faba crassioribus tunicis operitur, ob hoc efferuescit. Palladius à Columella: Faba Luna minuente velletur, ante lucem sanè, & antequam Luna procedat, excussa & refrigerata ponetur, ita gurguliones non patietur infestos.

Ex faba etiam tentatus est panis: lomentum appellatur farina ea: aggrauaturque pondus illa ex omni legumine. Frumento etiam miscetur apud plerasque gentes, & maximè panico solida, ac delicatius fracta. Quin & prisco ritu fabaciæ suæ religionis diis in sacro est, præualens pulmentari cibo. Aqua marina, aliæve salsa non percoquitur, Plinius. Galenus, Qui corporis halitum inani sagina mentiuntur, vti solent, pariunt enim fabæ non solidam, vti suillæ carnes, aut densam corpulentiam, sed quandam fungosam, lenem, ac flatulentam saginam. Porro fabis abstinendum Amphiaræus primus præcepit, quod vaticinationibus, quæ somnio colliguntur, obesse non parum credidit, quod suo flatu placidam interpellat quietem, ac mentem in somnis conturbet. Orpheus vates fabarum cibum nobis interdixit, ita canens,

*A fabulo miseri, miseri subducite dextras,*

*Par fuit hoc fabulum, caput ac exesse parentis.*

Quoniam vt Magi tradidere, mortuorum animæ sint in ea. Callimachus Poëta ex hac opinione, ita dixit,

30 *A cyamo dextram tristante amouit edentis,*

*Hoc, vt Pythagoras iusserat, ipse loquor.*

Sed A. Gellius hoc loco, Pythagorico more testatur loquutum fuisse, atque aperte cyamos testiculos appellare voluisse, quod sint τὰ κύβητ' αἰντοί, id est paricendi authores, vel οἱ τὸ κύβητ' δεινοί, hoc est ferendo vtero valentes: sed vetus opinio est Pythagoram philosophum fabam non esitasse, quum in eo verbo non cyamum, id est fabam, sed rei veneræ proluuium detestetur. Quum Philoxenus, Aristotelis auditor, scriptum reliquerit, nullo sæpius legumine Pythagoram vsum fuisse quàm fabis, quoniam & is cibus subduceret sensum alium, & læuigaret. Cicero in ea opinione est, interdixit esse Pythagoreis, ne faba vescerentur, quod animi perturbationem tranquillitatem quærentibus afferat, quibus is cibus quum magnam ha-



beat inflationem, contrarius esse constat. Plutarchus in commentario de educandis liberis hoc ænigmate abstinendum à fabis interpretatur, id est, à tractandis reipublicæ muneribus, propterea quod antiquitus in creandis magistratibus suffragia per fabas calculorum vice ferebantur. Nempe qui negotiorum securus, & animi in silentio ac tranquillitate vivere cupit, is vacare debet perturbationibus, quæ in obeundis magistratibus frequentissimè sese offerunt. Ex his Plinius: Faba hebetare sensus existimata, insomnia quoque facere. Ob hæc Pythagorica sententia damnata: velut (vt alij tradidere) quoniam mortuorum animæ sint in ea. Qua de causa parentando vtique assumitur. Varro & ob hæc flaminè ea non vesci tradidit, quoniā in flore eius literæ lugubres reperiantur. In eadē peculiaris religio: namq; fabam vtique; è frugibus referre mos est auspicij causa, quæ ideo refri-  
na appellatur. Et auctionibus eam adhiberi lucrosam putant. Didymus ex his. Physici aiunt fabas hebetare corda eorum, qui eis vescuntur. Quare rectè somnia impedire eas putant, sunt enim flatuosæ. Aiunt & domesticas gallinas ex assiduo earum esu steriles fieri, & cætera quæ retulimus.

*Coß. Inc.* Nunc de incoctilibus, & coctilibus fabis loquemur. Hesiodus canit, Fabarum semina quæ bubulorum cornuum occurso conciderint, non optimam nacta conditionem, sed veluti errantia & prolabantia, flabellatis potius, quàm satis proximè accedunt. Inde conceptum frigore ea corrumpit, & exucca, & lignosa reddit, adeò vt liquari nō possint. Hoc genus seminis cerasbolon nominatur à Platone, superstitiosa satis origine, quasi sterilia, & irrita proueniant, quæ per boum cornua serendo cecidissent in terram. Sotion ait. Seminantem obseruare oportet, ne semina boum cornibus incidant. hæc enim semina quidam cerasbola ab ipso facto vocant, aiuntque & sterilia, & imperfecta, ac inutilia talia generari, adeo vt neque per ignis vim edomari possint. Plutarchus in Sympotiacis hac de re abunde disserit, tradens euidentius esse, quàm vt dici debeat, semina quæ inter iactandum inter boum cornua ceciderint, fructum ateramona, quasi rebellem nec coctiuū dixeris, producere. Sic ex lepida translatione, duræ cervicis hominem apprimè contumacem, cerasbolon, & ateramona appellare Græci consueuere. Verùm rei tam cæcæ nō facilè ratio iniri potest. Plutarchus amicis sæpè causam disquirentibus planè sic irrita & cassa fieri semina cornibus bubulis procidua inficiatus est, quū permulta sint euidentia, quorum omnino cæca sit causa, nec ratio quouis modo possit iniri. Tandem leguminū, seminūq; contumaciā frigori acceptā refert, quod premens & cogens habitū ad duritiā perducit, sicut calor in molliē obsequiosam laxet, sed à Theophrasto causa protinus dilucidatur. Ipse nanq; insaniā putat, referre causam ad aratorū boum cornua, quorū occurso dum iactantur semina percussa obduruissent: nam si in lapidē impeerint, nō ideo lapidescunt, quū lapis quouis cornu durior sit. Præterea si ad cornua non offenderint, vt qui equis, & mula-



- mulabuntur, etiam robustæ, & incoctiles nascuntur. Neque solas ex leguminibus fabas lentesq; pati hoc, sed alia legumina, & frumenta. Sed videri hæc sola pati, propter eorum vsum frequentiore. Præterea aliis fœsis uti solemus, non integris, & ex farina, nec facile deprehendi potest importuna hæc cruditas, quæ vi ignis domari non potest. Existimat igitur id vel à solo, aut cœlo euenire. Fit enim ut ager vnus, cultus idem, aliquando coctilia, aliquando incoctilia ferat, & aliquando sulco discriminante, semina ut hîc facilia, illic obstumacia nascantur. Eueniunt etiam ex seminibus coctilibus incoctilia, & vicissim ex his illa. Vocat coctile, quod facile elixari ad nostri
- 10 vsus rationem potest, contra vitium in tarditate coquendi, vel quod laxari non potest, incoctile. Tandem aditum totius vestigationis alimentum esse dicit, & ab eo procedere. Scilicet eius qualitate, & quantitate: nam quæ tepidis locis, stercoretis, tenuibus, & apricis sunt, alimentum leue, & facile habent, itaque fructum rarum, mollemq; præstant. Exemplum in terra Lemnia, vbi quia terra lenis, similia alimenta porrigit, ob id coctilia. Ægyptus etiam soli, & aëris causa coctilia affert. author enim coctilitatis, & digestionis est calor: quapropter stercoreta antecedunt vixenis ferè diebus ea, quæ nõ stercoreta. Quæ igitur agro feruenti leuiq; proueniunt, his de causis coctilia sunt. Contra quæ terra frigida, lenta, & viscida, & quæ
- 20 nimio abundet humore, & stagnanti, & cui subsunt scatebræ, exurgunt, incoctilia sunt, nimia alimenti copia, ex permissione frigida partis, & terrestris, congelatio namq; & condensatio ex iis fiunt, quibus induratio. Vnde palustria nulli vsui humano procreant idonea, & non nisi pecori abdicata, ut ne macerata quidem obsequantur. Quum dixerit de solo, transit ad causam aëris, & ad eius peregrinas conditiones, nempe pluuias, quia alimenti pars est, vnde quum plus alimenti, & crudius subministretur, eandem sequi deprauationem. Vnde si incessator imbribus, perinde esse, ac si sua natura terra sit vda. Si causæ digerantur in hæc, nil vetat si ager vnus, aliàs coctilia, aliàs incoctilia ferat, nihilq; vetat si eodem sulco diuersa semina procreentur, quum in terris etiam venæ diffformes sint, & ut in metallis, sic & in ar-
- 30 uis putandum est. Ex his rationibus sequitur, quod partium quoq; partes diuersentur, ut ex eodem caule diuersis naturis prodeant semina, & ex eadem siliqua, vbi scilicet aër suam impeggerit qualitatem. Accedit ad hæc imbecillitas fabacei generis, ut eius partes etiam imbecilliores sint. Argumentum illud est quod faba sui coloris non sit compos perpetuò, sed interdum nigrescat. A frigore etiam concretionem, & densitatem fieri ostendit regio apud Philippos, in qua nascuntur incoctiles fabæ, quod regio illa frigida sit: aliud argumentum, quod si in area relinquatur in valuulis, iam estu torrefactis, non mutantur, sed manent coctiles,
- 40 tum quia teguntur siliqua, tum quia sese mutuo stipant, tum etiam quod terra affecta est calore, muniuntur aduersus illam refractionem,



sic è contrario ablatæ ab area, positæq; in tabulatis flatus subit, & cōdensat, propter imbecillitatem, quippe tum primum exutas domiciliis suis. Sed si vbi perfectè fuerint valentur, nil tum à ventis patiuntur, quia iam durius corium præsidio est. Adhuc si diutius sub diuo relinquantur, contrahunt vitium incoctilitatis, quia ex refrigeratione durefcunt. Et post sationem si imbres incesferint, incoctiles etiam euadunt: non est igitur mirum, ærem, aquam, & solum, cogere posse in sua iura semen ipsum. Sunt & qui dicant incoctilia fieri, quando putamine duriori vestiantur, quippe nō videntur admittere calorem, quo perficiantur: quod si corticis contumacia remiserit, admissio calore coctilia fieri. Qui verò putant hoc vitium fieri, dum in 10 area sunt, non est verisimile, quippe solis vis si dempserit de succo aliquid, ac de suauitate, tamen addit aliquid facilitatis ad coctionem, & si hoc verum sit, non tamen aduersatur iis, quæ diximus: nam hæc siccitas non affert duritiem sicut illa, quæ provenit à condensatione: nam hæc exiccatio solis potius rarefacit. Coctilia etiam facile perforantur, quia sunt dulciora, facilius in eis bestiolæ generantur, & concocta magis sunt, ob id etiam celerius immutantur. Plinius: Circa Philippos ateramnon nominant in pingui solo herbam, qua faba necatur: teramnon, quia in macro, quum vdam quidam ventus afflauit. In qua translatione aperto errore Plinius falsus est, quippe Græci non herbam inter fabas nascentem, sed ateramnon 20 vocant legumina inobsequiosa, & contumacia.

*Inf. rem.*

Faba, Theophrastus inquit, magis æ rugine infestatur, quia vndique foliis stipatur, & foliorum sinibus insidet humor, densiusq; obferitur, & sua raritate plus trahit humoris. Adde quod fructus haud procul abest à terra: inferiores ob id putrescunt partes, quia minus perflabiles, hæret humor, nec excutitur, ob id facilius putrescit: rubigo enim putrefactio quædam est residui humoris, quapropter ex largioribus imbribus rubigo non provenit, qui eluunt se ipsi, sed ex minutis pluuiis, atque roribus siue flatu, siue solis superuentu. Nec omittit fabarum putamina, quæ non solum radicibus, sed etiam germinibus arborum apposita sunt, nocere, & præsertim iis, 30 quæ nuper prosiluerunt, utpote imbecillioribus: idque duritia, & siccitate sua operantur, alimentum tum trahendo tum accendo, alimento enim destituta omnia moriuntur. Didymus: Caue ne ponas circa arboris radicem fabæ semen, ne arbor arescat. Arbores omnes iuuari dicuntur fabarum palcis, aut aliorum leguminum, aut frumentacei generis, iuxta cuius radices inditæ fuerint arefactæ. Quintilij: Quæcunque arbores flores abiciunt, aut defluos habent, sic curabis: Circumfossis radicibus palcarum fabacearum aqua temperatarum, magne quidem arbori octo congiorum mensuram, parvæ vesp. non minus, quam duos congios circumiice, sic i 40 z grotantes curabuntur, & de cætero à morbo liberæ erunt.

De pise.



## De pifo. CAP. XL.

**P**OST fabam de pifo dicemus, quod nullum vel hoc nomine à faba nobilius. Varro: Si pabulum naturale defit, seratur, quòd maximè sequantur apes pifum, quod valentibus vtilissimum est.

Græcis *πιδος* dicitur, à Písa, loco, in quo olim copiosissimè nascebatur, Nomen.  
inter Ossam, & Olympum montes sito, vnde adlatum prædicant. Dicitur etiam Græcè *λεξιδος*, quasi dicas oui vitellum, quem colore & similitudine exprimit, quum per maturitatem ex viridi flauescit. Dicitur & *ωχρος*, id est pallidum, à medullæ colore. Latinis pariter pifum, pifus. & pisa, vni tantum  
10 Palladio dicitur in genere sceminino. Vocant etiam cruiliam propter similitudinem, quam cum pisis habent. Itali *pifello* dicunt.

Theophrastus, quando è terra nascitur, inquit, frequenti exit folio, oblongiusculo, caule humi sparso, siliqua cylindracea, granis non interseptis, Descriptio.  
sed quasi inuicem se contingentibus, amplum vagumque, sed radice imbecilla. Plinius: Quorundam caules sparguntur in terram, si non habeant adminiculum, vt pisorum, quod si nō habuere, deteriora sunt. Folia multiplicia, granū inæquale, & angulosum veluti cicercula. Prolixè admodum hæc seges serpit, humi semper sparsa, nisi ridicas sit nacta. Folio oblongo. Prælongis, gracilibus, & fistulosis caulibus, per media folia euntibus perforatæ modo, supernè in clauiculas eminentibus. Flore papilionis effigie, al-  
20 bicante, sui medio purpureo. Febuario, & Martio mensibus floret, & subinde semina in vaginulis cylindraceis affert.

Duo sunt apud nos pisi genera; vnum minus, fulcris non indigens, alterum arbores scandens, quibus accubet affixum, omnia capreolis vinciens Genera.  
illigat. Discrepant & colore grana, alba, & cinerea, quæ nōnulli cruilia vocant. Minus in cibus gratum. Vidimus & vnum genus angulosa corporatura, quod existimauius Plinianum. Syluestre copiosum est, apud nos nascens, figura non absimili, radice multis fibrillis capillata, adultiore, florè coloris obsoletioris, folio nigriori.

30 Columella tepidum locum exoptare scripsit, & cælum frequenter humidum. Plinius in apricis feri dixit, frigorū impatientissimum. Ideo in Italia, & austeriore cælo non nisi verno tempore. Cælum.

Serendum soluta, & facili terra. Stercorari agros pifo Saserna putauit. Solum.  
Subdit Columella. Si confestim aratrum sequatur, & quod falx reliquerit, prius quàm inarescat, vomis rescindat, atque obruat, id cedit pro stercore. Plinius in Italia feri terra facili ac soluta. Leontius, pifum, dicit lutosa terra serere conuenit, in arida enim conciditur, priusquam enascatur, & perit. Quæ verò non conciduntur, degeneres fiunt.

Sera, Theophrastus ait, satione gaudere. Columella, Tribus modis inge- Satio.  
40 rum obseritur, licet obserere primò tempore sementis, ab æquinoctio autumnali, Plinius: Nouembri mense seritur in Græcia pifum, at in Italia, &



austriore celo non nisi verno tempore. Iugerum pisi tres modios recipit. Palladius Septembri mense postremo, & ad idus vsque Octobris pisum ferit. Iugero quatuor modios, vel tres sparsisse sufficit. Nos Nouembri, & Decembri, Ianuario, & Febuario serimus. Ridicas iuxta affigimus quo sequacireptatu per ramos scandant, nec humi serpant, & corrumpantur. Colliguntur quum persica fuerint, nec Luna minuente.

*Inf. rem.* Theophrastus fragilissimum pisum putat, quippe æruginem vehementissimè sentit, quia frequenti folio est, terrenum, amplum, vagumque. Implet enim locum torum, etiam si amplo interuallo positum sit. Frigoribus, atque gelationibus id obnoxium maximè, quia radice imbecilla cohæreat. Vermes etiam in piso nascuntur, quum aer modicè humidus, siccusque, vel quum tempestiuè non humescit.

*Cibit.* Diocles in leguminum censu ei secundas à faba tribuit partes. Galenus fabis non dissimilem retulisse naturam dicit, nec diuerso ab illis modo mandit. Apud nos commendatio in iurulentis, quia facile elixantur, & manduntur in patinis cū suis thecis, & in opiparis cœnis nullū legumen sæpius se offert.

*Cōditura* Exucto solibus humore, diutius à putrilaginis labe vindicatur, suis val-  
uulis explicitum.

De cicere. CAP. XL I.

POST pisum, cicer describetur, cuius exactam historiam, à Theophrasto  
desumemus.

*Nomen.* Græcis ἐπίκυρος, Latinis cicer, Italis cece, & cecere dicitur.

*Descri-  
ptio.* Theophrastus ita effigiat. Caule surgit omnium firmissimo, lignosissimo, sed obliquo, parua siliqua, pauciora continet, cum cæteris leguminibus seminum multitudo pro eius magnitudine sequatur. Principium vnde siliquis adhæret, eminens est, quo germinat, & radicatur. Summam foliorum partem falsilago quædam obducit. Altissima radice cohæret, quum legumina ferè cuncta singulari nitantur radice, eademque lignosa, & prætenuibus surculis capillamentorum fibrata, & nonnunquā ex latere emittit. Plinius ex eo: Altissimas cicer radices habet, ramosa que est, folio multiplici, siliquis  
rotundis. Culmo apud nos surgit, sesquipedali, lateratim ramoso, quasi in obliquum flexo, fistuloso, compluribus in eo hærentibus foliolis rotundis. Iuxta summos alarum ramulos, confertim siliquulæ proueniunt, vno exortu nixæ cylindraceæ, in quibus semina particulatim distincta protuberantibus torulis conspicitur, nulla intersepiente membranula.

*Genera.* Cicer, apud Theophrastum, tum magnitudine, tum sapore, odore, & forma plures differentias sortitur: vt arietinum, & columbinum. Candida inter omnia dulcedine præstant. Nigrum, & rufum firmitus est, quàm album. Dioscorides syluestris, & satiui meminit. Syluestre foliis satiui simile, odore acris, & figura seminis discrepans. Columella arietini, & punici meminit.



Plinius dicit arietinum esse arietino capiti simile, vnde ita appellatur album, nigrumque. Columbinum, quod alij venetium vocant, candidum, rotundum, leue, arietino minus, quod religio peruigiliis adhibet. Syluestre foliis satiuo simile, odore graui. Auicenna nominat album, rubrum, nigrum, & orobinum. Apud nos arietinum videtur frontata arietum effigie, & angulo mucronem æmulante, colore album, rubrū, obsoletè nigricans, vel ex fusco purpurascens. Græcis *αρίων* dicitur. Columella videtur punicum vocare illud erui similitudine, ob id aliquibus orobium appellatum, subamarum vt eruum.

19 Columella humido gaudere cœlo dixit. Palladius amare loca maritima, atque humido cœlo feri. Athenæus in agro Milesio optimum prouenire. *Calum.*

Breui agrum emaciare dixit Theophrastus, quamobrem solum nouale non facit, nec solo quolibet, sed bono proficit. Edax legumen esse, maxime terra potiri, etsi in ea minus temporis maneat, solum solo pullo, crassoque lætari, vel terram nigram melius cicer ferre. Breui agri succum depulsi. Cicer ob id solum nouale non facit, nec quolibet vulgari solo, sed optimo proficit, quod contra rationem esse videtur, quia non solum celeriter exit, sed celerrimè perficitur, quum quadraginta diebus, vel paulo pluribus perficiatur, cuius rei causa robur est, quo & alta superare, & sibi sufficere potest: nam & aqua minima indiget, & hac tantum ad primum germinandum, inde quod reliquum est, se ipsum nutrit, nisi virium momenta afferat sal, exiccans quod nimis est: nam & in generatione iuuat, & priuata ciceris natura talis est. Argumento: ea, quæ secundum mare sata sunt, lætius proueniunt. Et diluta pluuiis salislagine corrumpitur, & vermiculatur. Sed cur id in sabuletis eueniat, quærendum, nisi ab ipsius substantiæ proprietate eueniat. Sed videamus quid ceteri agricolæ de eo statuant. Cato, Cariosam terram faciet, si acias cicer, & quia vellitur, & quod salsum est, comalium est. Columella loco feri debere dicit quam lætissimo, nam terram lædit, atque ideo improbatur à calidioribus agricolis. Tremellius maxime obesse ait solo virus ciceris, quia sit salis naturæ. Plinius: Natura ciceris est gigni cum salislagine, ideo solum vrit. Serendum in tenuiori terra, quæ non multo indiget succo. Palladius latissimo loco serit à Columella edoctus. *Solum.*

Theophrastus tempori vtrique datum dicit, & locis dilutioribus serò serendū censet. Eadem ex parte radicem fundit, & caulem, qua annexus siliquarū consistit, inq; ea velut principium quoddā germinandi haudquaquam obscurum, ad mentulæ formam effigiatum, inspicere possis. Radix deorsum versus, folium & caulis sursum tendunt. Floris productio diuturnissima est, sed perficere diebus paucissimis potest, siquidem post sementem diebus quadraginta absolui possit: nam in totum celerrimè genus id leguminis colummarj nulli dubium est. Herbam enecat omnē, & maxime. *Satiū.*

40 tem diebus quadraginta absolui possit: nam in totum celerrimè genus id leguminis colummarj nulli dubium est. Herbam enecat omnē, & maxime.



ac celerrimè tribulum. Florenti pluvia obest, id enim abluta falsugine radice tabescens interit, & ab crucis protinus erosum perit. Cicer nigrum, atque rufum firmitus est, quam album, enim uero iactura illa falsuginis, veluti sphacelismus est. Columella. Cicer, quod arietinum vocatur, itemque alterius generis, quod punicum vocatur, feri mense Martio toto potest. Iugero modij tres abundè sunt, operis totidem seminantur, occantur duabus, sari iuntur vna, runcantur vna, velluntur tribus. Summa fit vndecim operarum. Plinius: Paucissimis diebus post florè maturatur cicer, id enim à semente diebus xxx perfitur, nec nisi madefactum pridie feri debet. Imber florenti nocuus. Commune omnium satorum vitium vrica, etiam ciceris, quum falsilaginem eius abluendo, imber dulcius id facit. Serere in iugero temperati soli iustum est ciceris modios tres. Palladius Maio mense ferit. Iugerum tribus modiis conferitur.

*Cultus.*

Certo mangonum commēto cicer præmature exire monet Theophrastus, si iam suis thecis prius aqua maceratum seratur. Primo quia minus putrescit, quia arcetur siliquarum obiectu humidioris terræ noxa. Præterea ex putaminibus ipsis putrefactis plus alimenti accedit, sic ante illa exeunt, quæ sine thecis nata fuerint. Ne florenti ciceri pluuius aer obsit, nam abluta falsugine, tanquam ei ingenta & connaturalis tabescit illico, & exeditur crucis, ab ea noxa liberat vinum, si semen in eo præmaceretur, nec ratio deest, quia vinum acrimonia non caret, qua falsugo illa fouetur, ne tam facile imbribus diluatur, & erucæ à vino cauent. Columella vt celerius enascatur, macerandum pridie iubet. Florentinus: Si pridie quàm seminaturus es cicer aqua tepida maceraueris, maius nascetur. Quorundam superuacua cura est, qui maius cicer esse volentes, vnà cum corticibus ipsum similiter præmaceratum, addito nitro in aquam ferunt. Quod si præcox cicer facere velis, ipsum circa hordei tempus seminato. Quo verò vigoris tempore nemo ipsum comedere possit, cucumeris sylvestris, & absinthij semine ex aqua tritis per dies quinque sub diluculum irrorato: etenim ros per quinque dies eluit omnem ex ipso amaritudinem. Palladius: Macerandum est pridie, vt possit citius nasci. Cicer grande nasci Græci dicunt, si aqua tepida pridie infundatur.

*Inf. rem.*

Vermes ciceri innascuntur, & erucæ, ob alimentum, cœlique intemperiem, videlicet quum plus minusve alimenti præbetur: aer enim immodicè humidus siccusve est, vel etiam quum non tempestiuè humescit. Ciceri verò, quum falsugine ablata dulcedinem ceperit, vermes innascuntur, quippe natura vbique animal gignit, modo calor cum humiditate ratione debita coeat. Tabitudo propria radicis ciceris est, & vricarum infestatio. Vermes gignuntur, quum sequutis imbribus calor repentinus humorem incluse-rit, sic & nasci vricæ solent. Cicer circumplicando necat se. Paxamus, Oleum medicina est cicer, si vnà seratur, arcet enim erucas. Plinius. Cicer in-



era olera propter multa portenta ferendum esse tradidit Palladius. Theophrastus refert in Media, reliquisque excelsis tractibus conditum diu perdurare posse. Corruptis seminibus animal semper gignitur, cicere excepto, id solum gignere animal nullum potest, ob id cicer omnium maximè durat. Cicer diu perdurare potest, quod acredinem, & amaritudinem habeat succi, quod & nigrescit, quum corrumpitur. Omnium optimè reponitur cicer, quia amaritudinem quandam & acredinem habet, quæ quidem qualitates seruare impune possunt, quamobrem & corruptum nullas generat bestiolas, quemadmodum nec semina olerum. Nonnunquam sponte naturæ tunditur cicer, & omnino quæ acerbi saporis sunt. Plinius. Ciceri in horreis nullæ bestię innascuntur.

## De cicercula. CAP. XLII.

POST cicer de cicercula, quum non minus eo apud nos feratur colaturque, nomine & figura affinis.

Quæ Theophrasto *λάδυρον*, & *λάδυρον*, Theodoro interpreti, & Latinis *Nomen*, cicercula est. Neapolitanus *cicercchia* corrupto à cicercula nomine.

Caule humi prociduo, & folio, vt pisum, oblongiori exiri dixit Theophrastus. Sed Plinius: Est & cicercula minuti ciceris, inæquales angulos habens, veluti pisum. Columella. Cicercula, quæ piso similis est, sapore certe nihilo differt à cicera, sed colore tantum discernitur: nam albedini propior, frequens apud nos feritur, quaternos & inæquales granum habet angulos, pisi magnitudine in siliqua compressiori, ramuli in tortiles capillaceas clauiculas desinunt.

Columella, & Pallad. ab eo, cælum humidum cicerculam exoptare dixerunt. *Calum.*

Iidemque locum lætum ei ascripserunt, nec vllum leguminum minus agro nocere. Immo Salserna iuuari agros & stercoreari cicercula putauit. *Solum.*

Inter solstitium, & caniculam Varro ferendam cicerculam putat. Columella Ianuario, & Februario feri debere, quamobrem in Italiæ locis ante Calendas Nouemb. feritur. Tres modij iugerum implent. Rarò respondet, quia nec siccitates nec austros in flore substat, quæ vtræque incommoda ferè eo tempore anni sunt, quo deflorescit. Cicerculæ modij quatuor, operas bubulcorum tres postulant. Occantur opera vna, runcantur vna, velluntur vna. Summa fit sex operarum. Eadem habet Palladius in Ianuario. Iugerum cicerculæ modios tres recipit. *Satio.*

Vermiculis obnoxia. In ipsis enim gignuntur, sequutis post imbres calidibus, vel si prius quàm fuerit resiccata, dies feruidi accesserint, & aer modicè humescens, ex Theophrasto. *Inf. rem.*

Galenus ochris, & phaselis non longè dissimili natura lathyron consistare prodidit, Asiaticos suos eo cibo maximè in Mysia & Phrygia plurimum vti: nec eo tantum modo, quo in Alexandria, aliisque pluribus oppidis ochris, & phaselis, sed in modum phacoptisanæ etiam, id est freforum cremoris. *Esus.*



**V**T congeneralegumina describamus, post cicerculam ciceram descri-  
bemus. Columella non tam leguminibus, quam pabuli generibus an-  
numerat, ut dicemus in pascuis, sed eadē in cibis nō inutilis, nec iniucunda.

**Nomen.** Theophrastus ἀγρός, Theodorus ciceram vertit, modo eruiliam. Varro  
& plerique eruiliæ sapius meminere, & videntur per eruiliam ciceram in-  
tellexisse. Galenus eruiliam genus leguminis dicit, folio quam faba lon-  
giore, quum eruiliæ nusquam meminerit. Neapolitani *doliche* vocant.

**Descri-  
ptio.** Folio oblongiore constare eruiliam Theophrastus dixit. Columella à  
cicercula solo colore differre, nam est obsoletior, & nigro propior, quum  
sapore nihilo certe differat. Palladius ab eo. Cicera distat à cicercula solo  
colore, quia sordet, & nigrior est. Plinius oblongiore folio eruiliam constare  
dixit: & quæ Theophrastus de ochro dixit, de eruilia conuertit.

**Solum.** Columella lato solo serit, sic ab eo Palladius.

**Satio.** Seritur ab eodem, primo, vel altero sulco, mense Martio, ita ut postulat  
soli latitia, quod eadem quatuor modis, nonnunquam & tribus, interdum  
etiā duobus, ac semodio iugerū occupat. Cicerae modij quatuor operas bu-  
bulcorum tres postulant, occantur opera vna, runcantur vna, velluntur vna.  
Summa fit sex operarum. Palladius à Columella: Cicera Martio seritur, pri-  
mo, vel secundo sulco. Iugerum quatuor, vel tribus, vel etiam duobus mo-  
dis implebimus.

**Cibus.** Columella. Cicera bobus erui loco fresa datur in Hispania Bætica, quæ  
quum suspensa mola diuisa est, paulum aqua maceratur, dum lentescat, at-  
que ita mista paleis subtritis pecori præbetur. Cicerae libræ sexdecim satis-  
faciunt vni iugo, eadem hominibus non inutilis, neq; iniucunda est. Plinius  
torrere docet. Quum fieret panis hordeaceus, eruiliæ admixtione fermen-  
tabantur, iustumq; erat duæ libræ in sex semodios.

**Coditura.** Theophrastus seruari optimè posse dixit, quoniam id habet, quod arce-  
re, tutariq; possit. Hæc tamen calida, & sicca est. Celerrimè tunditur sua  
natura. Plinius: sua amaritudine cicercula se facile tueri potest, ex Theo-  
phraſto, qui ut vidimus, de cicera, non de cicercula dixit.

**E**ST aracus lentis vitium, post cicerculam apponemus, quum non pau-  
ci sint non infimæ literaturæ viri, qui cicerculam à Galeno aracum vo-  
cari velint, nos distinximus, quia Theophrastus, quem in hoc opere sequi-  
mur, eiusq; valde doctrinam admiramur, utriusque meminerit, & si Galeni  
aracum non sit cicercula, tamen ex leguminibus fortasse ei valdè affine est.

**Nomen.** Theophrasto ἀρακός, siue ἀρακίς est. Galenus ἀρακός per χ scripsit, ultimā  
syllabam, in Aristophanis comœdia, quæ Holcades inscribitur, ubi inquit,  
aracón, triticum, pusanam, zeiam, lolium, simillam, & id semen cicerculæ af-



hinc, sed suis regionibus nasci ait syluestre quoddam rotundum, ac durum, eruo exilius in cerealibus granis, quod arachum adiecto in vltima syllaba spiritu nominant. Latini aracum dicunt.

Theophrastus nasci ait in lente, rem duram, & scabram. Galenus araci semen cicerculæ proximū prodit, eamq; reliqua facie tam emulari, vt multi idem esse genus existiment, quandoquidem tam vsu, quam viribus consentiunt. Sed aliquando duriores sentiuntur araci, coctiui quoque difficilius in ventre conficiuntur, sed Galeni pater Agriculturæ studiosus, quum per senectam ruri degeret, inuenit aracum quodam degenerationis argumento, durum ac rotundum in nasci lenti, cibo tamen damnatum. Apud nos legumen exoritur, ab indole sua cognoscitur eicerculam in hanc spem abiisse, est ei prorsus cognatum & simile, vt altera cicercula dici possit, quum eius grana sordibus nigricent inter pisa, orobos & cicerculas, vt Columella affirmare videtur. Folii cicerculæ, ramulis peruoluitur flexilibus, quasi teniolis circa frutices, vel calamos, inter legumina nascitur, vt vitium, & exitium lentium sit verè.

Descri-  
ptio.

De lente. C. A. P. XLV.

**L**ENTICVLÆ laudes apud Græcos authores maximas leges, & præsertim apud Athenienses. Pythagorici maximò honore prosequuti sunt. Varro pro apibus ferendā censet, præcipuè vbi naturale pabulum abfuerit.

Dicebatur quædæ Græcis ab rure, qui fuit ἀρών, vnus elementi imputatione, quia eius siliqua granis compressis, circinatā lagenulam effigiare videtur. Latinis lens est, & lenticula, quod lenes, æquanimisq; vefcentes efficiat. Apud Italos nomen retinet, nam *lentecchia* vocant.

Nomen.

Fertilissimum leguminum Theophrastus prædicat, quum pusillum semen afferat, caulis in latus spectat, siliquæ in latitudinem molliter funduntur, minor siliqua pauciora fert. Plinius: Ramosa lens. Apud nos lentis segēs humi fusa, & reptatrix est, foliis vicæ, sed minoribus, floribus exiguis in candido purpurascens, siliquis paucis, vbi dux, aut plurimum tres insunt. Floret Iulio mense, & deinceps in siliquis fert grana.

Descri-  
ptio.

Theophrastus quo ad colorem, saporemq; differentiam facit. Sed candida sapore præstantior. Nascitur & Indiæ lens, visu scænu-græco similis, quæ circa Vergiliarum occasum metitur. Plinius, Duo eius genera in Ægypto, alterum rotundius, nigriusq; alterū sua figura. Vnde vario vsu translatus est in lenticulas nomen.

Genera.

Plinius siccum cœlum exoptare scripsit. Laudatur maximè lens Pelusiaca, est enim Pelusium oppidum vnum ex sex ostiis Nili in Ægypto. Apud nos sicco, vdoque cœlo gaudet, vbi humor, latior. Martialis:

Calum.

Accipe Niliacam Pelusia munera lentem,

Vilior est alica, carior illo faba.



Solum.

Cato lentem in rudeto, & rubricoso loco, qui herbosus non sit, serit. Columella: Solo tenui, & resolutio, vel pingui, & sicco maxime loco seri debere: nam in flore facile luxuriat, & humore corrumpitur. Salsena lente solum stercoreari putat, si post eam viridē defectam statim aratrum subsequatur, & quod falx reliquerit, priusquam inarescat, vomis rescindat, atque obruat. Plinius: Lens amat solum tenue magis, quam pingue. Lentem in frutectoso, & rubricoso, qui non sit herbidus, serit, ex Catone. Palladius eadem habet, quæ Columella.

Satio.

Theophrastus lentem tertiæ sationis esse dixit. Varro lentem intervallo serit inter caniculā, & solstitiū. Virgil. occidente Boote seri debere scribit.

*Nec Pelusiace curam aspernabere lentis,*

*Haud obscura cadens mitter tibi signa Bootes.*

*Incipe & ad medias sementem extende pruinas.*

Columella sementi media, crescente Luna vsque in duodecimam serit. sationesque eius duas seruat, alteram maturam per mediam sementem, seriore alteram mense Februario. Iugerum agri paulo plus, quam modius occupat. Lentis sesquimodius occatur vna opera, sarritur duabus, rutur vna, vellitur vna. Summa sit operarū octo. Plinius: Virgilius lentem seri iubet Boote occidente. Nouembri seritur. Serere iugero temperati solstitium est lentis modios tres. Serendum à vigesima quinta Luna, vsque ad xxx. ita demum sine limacibus fore. Palladius eadem, quæ Columella recitat.

Ar.

Theophrastus retulit lentem, quæ ante satum bubulo simo fuerit obuoluta, longè præstantiorem fructum producturam. Ratio est, quia inuac calor, & siccitas stercoreis. Ac paxillo demissam crassescere. Columella: Lens vt celeriter prodeat, atque grandescat, antequam seratur simo arido permisceri debet, & quum ita quatuor, aut quinque diebus requieverit, spargi. Palladius eadem à Columella. Florentinus, Lentem, quæ ante satum bubulo stercore fuerit obuoluta, longè præstantiorem emicare fructum prodidit. Celeriusque demeti pollicetur, additque proceriorem eundem, quæ in aqua tepida cum nitro prius maduerit, quam seratur.

Dis. rem.

In lente exit aracus res dura, & scabra, dicit Theophrastus. Adnascitur lappa (ἀπαείν) lenti, & interimit, quæ alimoniam subripit, tam quam terra ministrat, quam quæ à sole, & aëre venit. Plinius: Lentem herba securidica, quam Græci à similitudine peleciton vocant, & quidem complexu necat. Paxamus: Lentem securidica herba, Græci pelection appellant, necat. Reperitur & in eis coctibilitas, & incoctibilitas. Sed eius rationes in faba diximus. Apuleius tradit seminibus lentem modicam ammiscendam esse, dum seruntur. Natura enim resistit aduersus impetus, atque molestias ventorum.

Cibus.

Plinius inuenit apud authores æquanimitem fieri vescentibus ea, &

opti-



optimam esse, quæ facillimè coquatur, & quæ maximè aquam absorbet. Florentinus Egyptiam lentem in cibo acceptam lætitiā afferre, & conciliare dixit. Ex lente intentatus est panis, quum per arida citra pingue possit friari.

Columella. Lens ne curculionibus absumatur (nam etiam dum est in siliqua estur) curandum erit, ut quum extrita sit, in aquam demittatur, & ab inani, quæ protinus ignatat, separetur solida, tum in sole siccetur, & radice silphij trita cum aceto aspergatur, defriceturque, atque ita rursus in sole siccata, & mox refrigerata, recondatur, si maior est modus, in horreo, si minor, in vasis oleariis, salsamentariisque, quæ repleta, quum statim gypsata sint, quando cunque in usus promiserimus, integram lentem reperiemus. Potest tamen etiam citra istam medicationem cineri mista commodè seruari. Florentinus nullum semen corruptionis labem sentire promittit, quod laerpitiato aceto conspersum sit.

Cōditura

## De aphaca. CAP. XLVI.

Nunc de segetali aphaca sermonem habebimus, quum de oleracea in horto abundè dixerimus. Dubitat Hermolaus apud Theophrastum, num aphaca segetalis vnum & idem sit cum oleracea, an diuersum. Quum sanè clarè constet Theophrastū in leguminum censu segetalē aphacam ab oleracea distinxisse, inquentē, In leguminū genere, lens, aphaca, & pisum.

Græcis ἀφάκη est, unde si Græcum etymon respiciemus, poterit esse inficiale, & ἀφάκη lens, quasi non lens. Potest & illud a similitudinem significare, quod quadantenus lenti simile, ut ἀλωχὼ vxor est quod eiusdem cum vitrothori. Latinis aphaca. Italis veccione, quia viciæ species videtur. Neapolitani apice vocant, corrupto ab aphaca nomine.

Nomen.

Theophrastus scribit aphacæ esse siliquas leniter latas, ut lenti. Nascitur in aphacis securina, securi similis, atque in omnibus ferè inest, quod simul alatur, intermisceaturque, seu ratione telluris, quod non ineptè putaueris, seu ob aliam aliquam causam. Dioscorides: Altior lente, tenuibus foliis, siliquas lenticula maiores fert, in quibus terna, quaternave semina nigra, lente minora continentur. A quo Plinius: Aphaca tenuia admodum folia habet, pusillo altior lenticula est, siliquas maiores fert, in quibus terna, aut quaterna semina sunt nigriora, & madidiora, & minora lenticula. Galenus: Aphacæ seminum figura non rotunda velut fabarum, sed aliquando latiuscula, similis lenti. Apud nos quadrangulari caule exit, flore subrubro, siliquis pisi, lenticulæ maioribus, in quibus semen viciæ maius, aut nigrius, foliis ex aduerso binis, pisi capreolis. Semen maculosum, vipereis maculis depictum, viticulis exilibus, optat pedamenta circum, quibus surrigi possit.

Descriptio.

Dioscorides & Plinius in aruis nasci dixerunt, vel intra segetes spontè: Theophrastus. Sera illarū satio est. Apud nos seritur mense Septembri.

Cult. Soll.



*Usum.*

Seritur multis Italiae locis ad columbarum saginam. Galenus: Aphacam cum planta & valvulis integram rustici reponunt, ut brutis pecudibus pabulo sit. Per famem tamen quosdam inueni, qui hanc quoque comederint, potissimum vere, quum etiamnum viret, quemadmodum fabas, & cicera esitare consuecunt. Sunt non solum insuauia, sed concoctu difficilia: alimonia, quæ ex ipsis in corpus permeat, improbi & crassi succi esse dicitur.

*Coditura.*

Celerrimè perit. nam corruptis animalia propria gignuntur, ex Theophrasto.

## De eru. CAP. XLVII.

**E**RRVM medicaminis vim obtinet, quippe per eruum Diuum Augustum curatum in epistolis ipsius memoria extat, ut ex Plinio habetur, eiusque farina theriacam subintrat. Leguminibus etiam adnumerandum.

*Nomen.*

Græcis ὀρόβο, Latinis eruum, nec multum à Græco Latinum vocabulum, distat ab eruendo, quod manu capiatur, & eruatur. Italis orobo.

*Descriptio.*

Theophrastus caule obliquo exire scripsit, siliqua cylindræa, granain siliquis sine septo, quæ se inuicem ut pisum tangant, sed minora, quam paludapij, vel sambuci acini. Dioscorides, Eruum est frutex tenuis, angusto folio, semine in vasculis habens, simile tithymali paralij, aut catanances, magnitudine seminis ethiopidis, aut lithospermatis. Plinius, Ramosum, diutius floret.

*Genera.*

Saporem, & colorem, generum differentiam facere scripsit Theophrastus, sed candidum dulcedine præstat. Galenus addit: Pallidum inter candidum, & rufum medium: laudatque flauum & pallidum, utpote medicamento haberi, & alterum inter segetes spontè nascens.

*Solum.*

Lætari loco macro, nec humido Columella dicit, quia luxuria plerumque corrumpitur. Palladius: loco sicco, macroque.

*Satio.*

Theophrastus utrique temporari scripsit. Seri maturo satum, sui roboris causa, quum possit hyemis algores sufferre. Temporis ratione semina mutari, ut leuiora, facilioraque reddantur, nam si eruum quis verè serat, facile gratumque exit, non graue, quemadmodum si autumno seratur. Florum productio diutina est: nam & flos cæterorum leguminum more par-ticulatim erumpit, ab ima parte flore lubeunte, siliquaturque diuersis diebus. Primum pars infera floret, quæ quum desierit, proxima incipit, atque ita ad supernam itur successu assiduo, qua de causa multa ex eruis euulsa parte ima defluxisse cernuntur, superna verò penitus esse viridia. Columella: Potest & autumno seri, nec minus post brumam, Ianuarij parte nouissima, vel toto Februario, dum ante Calendas Martias, quæ mensem vniuersum negant agricolæ huic legumini cōuenire, quod eo tempore satum pecori sit noxium, & præcipuè bubus, quos pabulo suo cerebriferos reddit. Quinq; modiis iugerum obseritur. Erui modij quinq; totidem operis conferuntur, occantur vna, item singulis satriuntur, ruscantur, metuunturque, cuncta



cuncta sex operas occupant, stercoreari aruum ex eo Salserna putauit. Plinius: Nec eius operosa cura est. hoc amplius quàm vicia runcatur. Sufficiunt singulis bouum iugis modij quini sati. Martio mense satum noxium esse bobus aiunt, item autumnò grauedinosum. Innoxium fieri primo vere satum. In iugero erui modios sex ferere iustum est. Palladius Ianuario eruum feri nouitimo loco siccò, & macro. In iugero quinque modij sufficiunt. Octobri in lato agro.

Dioscorides ad bouum saginam satum dixit coctum appositum. Virgilius idem annuit,

10 *Eheu quam pingui macer est mihi taurus in eruo.*

61 Galenus iniucundum, & insuauè prorsus fatetur, & hominum cibus abdicandum, sed bobus in pabulo gratissimum, si prius aqua madescat. Porro grassante famis iniuria, vt Hippocrates scriptum reliquit, in expugnabili necessitate pressi homines, hoc sese saturant.

81 Serieruum inter radices cōsuevit, vt tradit Theophrastus, remedio contra papiliones, & brassicis associatur, vt ab erucis defendatur, & quicquid eiusdem generis sit. Pestis eius est orobanche, quæ scapum, & comas aggreditur, vt imbecillitatem suam fulciat, & tanquam brachiorum complexu vinciens, angit, & obstrangulat. Plinius: Est herba, quæ cicer enecat, & eruum circumligando se, vocatur orobanche.

65 Nascitur in eruo phalangium. Patientissimum omnium vetustatis est. Cōditaria Plinius à Theophrasto. Nascitur in eruo bestiola aranei generis, si hyems aquosa sit.

#### De orobanche. CAP. XLVIII.

POST eruum vitium erui prosequemur, vel anguinam erui, imò herbarum omnium, quibus adhæserit. Dicemus primo de Theophrasti orobanche, mox Dioscoridis, quæ satis inter se diuersæ sunt.

Græcis ὀροβάνχη, quasi erui anginam dicas, suo enim amplexu, complexu, quæ angit, & strangulat eruum. Theodorus erhanga venit apud Theophrastum, quam ita describit. Erui pestis est orobanche, ciceris & fabæ, quæ scapum & comam aggreditur, vt imbecillitatem suam fulciat, & tanquam brachiorum complexu vinciens enecat. Huius speciē esse dicerem, quam idem Theophrastus cadytam vocat. Est Syriaca illa herbula cadytas vocata, quæ arboribus, vepribus, atq; aliis quibusdam innascitur. A quo Plinius: Est & Syriaca herba, quæ vocatur cadytas, non tantum arboribus, sed ipsis etiā spinis circūuoluens se. Recentioribus Græcis videtur hæc ῥαοῦδα, literay in u transeunte, cassuta, & posterioribus euscuta. Vulgò apud nos podagra lini dicitur, quod quasi compedibus id, cui inciderit, illigat, vt vinctu eo facile non possit extricari. Hæc thymum aggrediens, & circumplectens epithymū à Dioscoride dicitur, sic etiam hyssopo, serpillò, aliisq; non paucis congeneribus clauiculis inhæret, vt in Gargano monte sæpius vidi.



& attrēctauit: nam postquam suapte adoleuit radice, finitimis plantis surre-  
 ctā sese implicat, & alimentum nacta, suis radicibus destitutis, quasi sui mu-  
 neris oblitis, aliena vescitur quadra, earum succum depopulando: omni-  
 bus nanque his oriendi, & aucupandi conditio par. ramulis enim suis se  
 circumuoluendo summa sensim fruticum fastigia scandit, crebrisque cla-  
 uicularum voluminibus prorepens, tam stricto, tenaciūque complexu, vt  
 velut strictis laqueis strangulet, vt nonnunquam stirpes humi deturbet,  
 foliis orbata, flore albo, semine tenui, cirri diluta rutilant purpura, & non-  
 nunquam rufescunt. Theophrastus etiam, Eruanga erui, & lappa lentis  
 proprium vitium putatur, quod altera eruū potissimo vincat causa im- 10  
 becillitatis, altera inter lentem maximē coalescat, quæ quidem eruanga  
 proxima est: etenim pari modo aggreditur, & herbam totam veluti bra-  
 chijs, nec secus angit, atque obstrangulat. Altera est orobanche Dioscori-  
 dis, etiam leguminum pestis, & ab eruō nomen trahens. Cauliculus est ses-  
 quipedalis, aut pusillo excelsior, subrubens sine foliis, hirsutulus, pinguis,  
 tener, flore subalbido in luteum vergente, radix illi subest, digiti crassitu-  
 dine, quæ dum ariditate flaccescit, scapus dehiscens in rimas dissilit. A re-  
 centi Græcia *δερπολέων*, quasi leonis legumen, aut leonteos botane, quasi  
 herba leonina, ex Paxamo. Neapolitanis vulgò *neca*, quasi fabas necans  
 dicitur. Ab aliquibus lupa, quod plantas deuorare videatur. Aliqui toram, 20  
 quod vbi vaccæ degustarint, statim tauros adeant. Plinius à canini geni-  
 talis similitudine cynomorion aliquibus nominari dicit, non inepta, nec  
 inconcinna similitudine, si planè contempleris. A radice singulari surgens,  
 caule glabro, aliquot foliis conferto, & inter ea emergentes flores habet,  
 quasi in glomerem omnes collectos, tumens circa radicem, quæ omnia  
 caninum genitale effigiant. Hæc non amplexicaulis est, sed sola præsen-  
 tia maleficium affert, radicibus alimentum omne subripiens, vt apparet  
 ex eo, quod succiplenula est. Sotion, & cæteri agriculturæ authores re-  
 media aduersus natales eius exortus condiderunt. In aruis non prodibit,  
 si in quatuor eorum angulis, & medio rhododaphnæ ramuli pangantur. 30  
 Hoc eodem remedio putant legumen omne à noxa vindicari. Qui volunt  
 hanc frugum pestem prorsus aboleri, quinq; testas creta depingunt, Her-  
 culis effigiem leonem strangulantis referentes, & in quatuor agrorum an-  
 gulis, atque in medio collocant. Sunt qui delineatam eo modo testam in  
 area tantum media, vt hanc amoliantur perniciem iubeant obrui. Demo-  
 critus affirmat orobanchem herbam cōfestim abigi, si mulier quæ in men-  
 struis est, solutis crinibus & nudo corpore gallum in manibus tenens, a-  
 reā circumbeat. Sunt è Græcia, qui longa probarūt experientia, quæ serenda  
 sunt legumina galli cruore respersa, nulla ab hac aduersante herba sentire  
 penitus iniuriam, eoque rotatu à nocumentis tuta esse asserunt. Plinius 40  
 scribit: Legumentis addita coctionem accelerat.



*De phaseolo.* CAP. XLIX.

**E**ST & phaseolus ex leguminum genere; huius Theophrastus non meminit, nisi sub dolichorum nomine, nos hunc segetalem, alterum hortensem dicemus, sed nunc segetalem, intelligendo de illis minimis candidis.

Græcis φασιολος. Galenus discrimen inter φασιολον, & φασιολον facit, ac diuersa esse legumina scribit libro de alimentorum facultatibus, & videtur hunc vilem nostrum & minimum φασιολον, & similacem & hortensem φασιολον dicere. Latini Græcorum imitatione pluribus nominibus nominant. Columella phaseolus, phaselus, Palladius faselus, Plinius faseolus. Itali *faggioli*.

**P**linius venosa folia habere dixit, cuius siliquæ cum ipsis manduntur granis. Surgunt apud nos phaseoli sine pedamento subsistentes, ramos in latum pandunt, foliis hederaceis, minoribus, mollioribus venosis, ternis ex vno pediculo prodeuntibus, floribus purpureis, albicantibus, siliquis pedalibus, primo exortu viridibus, & teneris, vt cum granis simul mandantur elixæ, grana alba, circa nexus, quibus herent siliquis, nigricantia.

Apud nos plura genera sunt, maiora, media, minima, albaq;

Columella. Veruaucto, vel melius pingui, & restibili agro seruntur. Ab eo eadem Palladius. Serere eos qua velis terra licet.

Virgilius ad occasum Bootes serendum phaseolum præcipit in Georgicis,

*Si verò vitiamq; seres, vilemq; faselum,*

*Haud obscura cadens mittet tibi signa Bootes.*

Columella. Faselum ad escam vindemiis serito, ad percipiendum semen vltimo mense Octobris, circa cal. Nouembres melius obruitur. Septembri mense oportius a calendis Octobris phaselus rectè terra mandatur, nec amplius quatuor modis iogerum obseritur. Phaseoli modis quatuor obruuntur totidem operis, olcantur vna, metuntur vna. Palladius eadem, quæ Columella. Plinius à Virgilio feri iubet Bootæ occidente. à Columella. Ab idibus Octobris ad calendas Nouembres. A fidicula occasu, occari tantum de siderat.

*De dolichis, siliquis, siue phaseolis.* CAP. L.

**N**UNC ad alteram phasioli speciem, siue de hortensi, quam supra describendam proposueramus.

Theophrastus δολυχος, ac λοβος à siliquarum magnitudine. Dioscoridi σμίλαξ, siue hortensis similax, Theodorus Theophrastum vertendo, vbi dolichos, siliquam vertit. Galenus libro de alimentorum facultatibus ex Theophrasti autoritate hos dolichos appellat. Itali *faggioli turcheschi*.

Theophrastus ita suum dolichum describit. Siliqua speciali nomine appellatur, scandit pedamento, cui accumbit, prælongo, propter eos adfixo, ita enim reddi eos putant frugi, contrahit enim eruginem, nisi adminiculo fulciatur, perit facillimè siliqua. Corpore laxi graciliq; constat, facile



arbores scandit, offensatque. Dioscorides horrensem similacem suam ita depingit. Frutex est, folio hederæ, molliori tamen, tenui caule, capreolis vicinis fruticibus circumuolutis, qui tantum adolescunt, ut topiarias scenas representare videantur. Siliquas scænigræci profert, longiores, & torosiores, in quibus semina renum similia, sed in æquali colore recluduntur, quæ quadam ex parte fuluescunt. Galenus ex Theophrasto: Dolichus adacta palo confurgit, & fructum gerit: sin hoc adminiculo careat, vitiosus fit, & rubigine tæturatur. Apud nos prolixissimis viticulis serpit, ad topiariorum ornamenta, atregia & umbracula efformans.

*Genera.*

Ex fructus varietate distinguuntur genera. Fructus enim perquam amœno aspectu sunt, non flauescunt, interdum aut proflus rubescentes, plerumque bicolores, & unicolores, maculis atris, giluis, rotundis granis, teniatim aspersis, obliquis, renunculi effigiem referentes.

*Col. Sol.*

Cælum, solumque; ut patricum exoptat, & milium, quum plerumque in ea ferantur, & inter ciceres, capas, & caules. Macro, & soluto etiam optimè provenit: quod pinguius solum, eò rarius spargatur: etenim pensilibus hortulis mulieres nostræ ferunt in fenestris, ut æstivis solibus liberentur. In segetibus nemo veterum agricolarum meminit, quum solius horti munus esset.

*Gerio.*

Iisdem temporibus, quibus panicum, & milium à nascentibus herbis liberentur. Colliguntur ubi siliquæ albescunt, sole assiccantur, reponunturque.

*Giliv.*

Diocles in leguminum censu post fabam, pisum, post pisum dolicham apponit. Nos horum valuulas cum granis ipsis asparagorum more mandimus. ancipiti edulio, inter bonum malumque succum ambigente.

### *De lupino.* C. A. P. L. I.

**D**IXIMVS de sativis leguminibus, nunc de sylvestribus, vel quæ pro sylvestribus habentur. Lupino multum tribuit Columella, quod & minimum operarum absomit, & vilissimè emitur, & maximè ex iis, quæ feruntur, iuvat agrum. Nam & vineis iam emaciat, & arvis optimum stercus præbet, ac vel effæto solo provenit, vel repositum in granario, patitur ævum, bonæ per hyemem alit, & famem hominibus propulsat in annonis. Subscribit huic Plinius. Nullius, quæ feruntur natura assensu terræ mirabilior est. Primum omnium cum sole quotidie circumagitur, horasque agricolis etiam núbilo die demonstrat. Arboribus agris lupinum circa radices earum feri convenit, aqua lupini vsti circumfusa pomis prodest. Lupino trito cum oleo radicibus linunt, contra formicas. Apuleius Græcus addit quoque cum sole quotidie circumagi, & ruralibus diei horas indicare, etiam aère núbiloso.

Græcis *ῥῆμνος* dicitur, quod calidior sit cæteris leguminibus, vel quod aqua calida lauetur, quo molestum, & tristem amarorem exuit. Apuleius *ῥῆμνος* vocat, montanum lupinum, & sylvestre. Legitur aqua Athenarum *Πολεμονία*



lemonis testimonio lupinos apud Laconas Lysidas nos nominari. Latinis & Italis lupinus.

Omnibus utpote notus à Theophrasto non describitur. Siliqua magnopere circumscripta. Principium, quo siliquis adheret concavum, habet. Plinius: Caule singulari, fistuloso, ter florens. Nos ita describimus: Culmum edit perinde ac faba, rectum & suapte natura stantem, rotundum, nonnihil tomentosum, radice singulari, & multum fibrosa, à qua ferè per totum caulem, rami alternò situ exeruntur. In pediculis folia sena, vel septena diuisura, digitata, aduersa, virentia, subtus incaua, hirsuta, siliquæ fabaceis minores, per ambitum crenatæ, fructus durus, rotundus, compressus, albidus foris, subluteus intus, perquam amarus. Flos ter æstate spectandus: nam initio ex imo emicant albi, postea è cauliculis effœta æstate, & autumno exeunte.

Et si sylvestris penitus sit, ut Theophrastus de eo retulit, est tamen satius & sponte nascens. Satiui apud nos tria genera: maior, qui *ischiano* dicitur, medijs *nostrate*, minimus *canzanella*. Sylvestris Plinius meminit. Lupini quoque sylvestres sunt, omnimodo minores satiuis, præterquam amaritudine. Apud nos passim nascuntur, satium per omnia refert, nisi quia grandior multo est caule, pedali folio, quinque fariam dissecto, angustiore, flore purpureo puniceo, fructu rotundo minore, guttatis maculis, pullis, cinereis veluti viperinis.

Frigida, niuosaque amare dixit Theophrastus, ut sylvestre.

Idem etiam arenas, sabulū, & terræ vitia sequi, horrere culta, & frugale solo aspernari, & exile solum amare. Causam adde, quia in hoc sentire calorē & celerius perfici possit: nam in cultis & aquosis syluescens, & luxurians, infecundum redditur. Catō: in agro rubricoso, terra pulla arterina, rudera, & arenosa, item quæ aquosa non erit, ibi lupinū bonū erit. Columella: Effœto prouenit solo, terram amat exilem, & rubricosam præcipuè, vel cretā reformidat, limosoque non exit agro. Plinius à Catone, In solo autem rubricoso, vel pullo, vel arenoso, si non sit aquosum, lupinū feri. A Columella verò: In terra maxime sabulosa, & sicca, atque etiam arenosa. Ex densiore terra, rubricam maxime amat, cretosam terrā, limosamque odit, & in iis non prouenit. A Columella Paladius, Qualicumque terra seritur, limoso agro non nascitur, cretam reformidat, amat exilem terram, atque rubricosam. Florentinus: In terra imbecilli serendum.

Lupinus duplici causa seritur, semine recipiendo, vel stercorando agro, ut loca fecundentur exilia. Dicemus primo quando seritur ad semen. Theophrastus lupinum maturius, & protinus post aream serendum censeat, licet robustissimum, aliter malè proueniet. Rationem affert libro de causis, quia terram calentem desiderat, quum eius natura difficilis, & contumax sit, argumento est nimia eius amaritudo, ob id caloris multum exigit. In matura enim eius sarione, agri calorem nactus, & macerari, & optimè suum ostendere germen potest, sin minus & prauè germinabit, & simile eueniet, ut si quis exiguò igne validissimum quicquam coquere veller, ob id bonum



solum aspernatur, & strigosum desiderat, & sabuleta, quia calidius & expeditius ad negotium conficiendum. Petit etiam abunde ab agricola sibi parari, ut haud profundo abscondatur sulco, ut insolati, fruiq; possit aëris tepore. In totum condi sub terram recusat, qua de causa subarantes id ferunt, & saepe si in materiem, aut herbam prædensam quampiam aliè incidat, eam vi summa impellendo nititur, radiceq; terram contingit, & germinat. Ostendit etiam robur, quod aliè à terra conditum, deducit radicem, & in sua se feri valet & abscondit. Primus omnium feritur, nouissimus omnium tollitur. Columella. Id solum omnium leguminū non desiderat requiem in horreo, à Septembri mense ante æquinoctium crudis noualibus ingeras, & qualitercunque ob-  
10 ruas, sustinet coloni negligentiam. Teporem autem autumnī desiderat, ut celeriter confirmetur: nam si non ante hyemem conualuerit, frigoribus affligitur. Iugerum decem modii occupant. Lupini modii decem obruntur vana opera, occantur vna, metuntur vna. Plinius: Terram amat, terraq; optetiri non vult. Et vnum hoc feritur non aratro. Coli non vult. Tellurem aded amat, ut quamuis fructuoso solo coniectum inter folia vepresq;, ad terram tamen radice perueniat. Nihilq; aliud nullo impendio constat, ut quod ne ferendi quidem gratia opus sit afferre. Protinus feritur ex aruo, ac nec spargi quidem postulat, decidens sponte. Primumq; omnium feritur, nouissimumque  
20 tollitur. Vtrunq; Septembri mense, quia si non antecessit hyemem, frigoribus obnoxium est. Impunè præterea iacet, vel derelictum etiam, si non protinus sequuti obruant imbres, ab omnibus animalibus amaritudine sua tutum. Plerunq; tamen leni sulco inregunt. Palladius à Columella: Septembri mense vel maturius aliquanto lupinus feritur, decem modiiis ingeri mensura complebitur. Florentinus Græcus, Lupinum præ cæteris aliis ferere oportet post æquinoctium autumnī, non expectatis imbribus. Pro soli stercoreatione, M. Varro quædam ferenda non tam propter præsentem fructum, quam in annum proficientem, quod ibi subiecta atq; relictæ terram faciunt meliorem. Itaq; lupinum, quum nec dum siliculam cepit, si ager mactior est, pro stercore inaratæ solent. Columella, Lupinum nisi in florem verteris, nihil agrum  
30 stercoreaueris, sed nec vlla res magis vacui operis, aut feritur, aut conditur. Nam & primis temporibus ante aliam sementem potest id obrui, & nouissimis post cunctos fructus tolli. Sementi facta in occare oportet, quod spartaris. Duo iugera tres operæ commodè occubunt, arboresq; quæ intereunt, ablaqueabunt, quamuis antiqui singulis operis singula iugera sarriri, & occari velint. Plinius: octauo calen. Iulii lupinum stercoreandi causa vertitur. Ad terram alendam post tertium florem verti debet, in sabuloso post secundum. Palladius: mense Septembri circa idus, ut loca fecundentur exilia, lupinus feritur, & ubi creuerit, vertitur vomere, ut putre fiat excisus. Si quis lupinum stercoreandi agi causa seminabit, aratio illud tunc debebit euertere. Cassianus  
40 Græcus: Maio mense lupinum fodere conuenit, quod stercoreandi, aut purgandi.



gandæ terræ gratia seminatum est. Deinde ante idus, antequam vitis floret, secare, quum adhuc humidum existat, & demessum sinere, vt paululum putrescat, & postea arare, donec defectum adobruatur, atq; sic radices omnes corrumpantur.

Theophrastus confestim post imbrem rapiendum monet. Siccatus enim *Messis.* à siliquis exilit, interitq; quum decidit. Post dies feruentes, aëre humefacto mane demeritur, quoniam si prius tangatur, decidit, & capi non potest. Plinius, Remedium eius ne metētes fugiat exiliendo, vt ab imbre tollatur, quum cœpit maturescere, rapiendus est, quoniam cito exilit, laterq; quum decidit. *o* Florentinus, Cōfestim post imbrem rapiendum, siccatum enim è siliquis exilit, & latenter decidit.

1. Quoniam sylvestre quidem est, cura ei officit, inquit Theophrastus. *Cultus.* Columella: Lupino contraria est sarritio, quoniam vnā radicem habet, quæ si fuerit lauciata, seu vulnerata, totus frutex emoritur. Quod etiam si non fieret, superuacuum tamen esset cultus, quum sola hæc res adeo non infestetur herbis, vt ipsa herbas perimat. Plinius: Colivtiq; non vult. Pinguescunt hoc satuarua, iuuariq; diximus: adeo non eget fimo, vt optimi vicem repræsentet. Lupinus runcatur tantum. Palladius, Lupinus si sarculetur, quia vnā radicem, extinguitur, quod nec desiderat, quia herbas præter auxilium cultoris affligit. Florentini Græci hæc sententia de eorum cultura: Antequam flores edant, boues immittantur, quippe quum omnem aliam herbam depascent, solum lupinum ob amaritudinem intactum relinquunt: nec eget fimo, quum pinguescant hoc satuarua, optimiq; fimi vicem repræsentet, telluremq; in futurum feraciorem redjat. Si coloni sentiat operam, relicta sede fugit, culturam enim reformidat.

Theophrastus lupinum diuturnius eruo & cicere contineri dicit. Amaritudinem quidem, & acridinem habet, nigrescitq; quum corrumpitur, sponte quoq; suæ naturæ tunditur, & omnino quæ acerbi saporis sunt. *Cōditura.* Columella: Repositum in granarium patitur æuum. Reliquum, quod seminis superest, *o* in tabulatum, quo fumus peruenit, optime reponitur, quod si humor inuasit, vermes gignit, qui simulatq; oscilla lupinorum aderunt, reliqua pars enasci non potest. Plinius, Condi in fumo maximè conuenit, quoniam in humido vermiculi eius in sterilitatem castrantur. Amaritudo facit, vt diutius dureret. Palladius: Iunio mense lupinus colligitur, & si placuerit, statim separatur ex area. Sed longè ab humore est ponendus in horreis: sic enim diutissimè custoditur, maxime si grana eius afflauerit fumus assiduus.

Columella: Bouem per hyemem coctum, maceratumq; probè alit. *Panir.* Fa- mem quoq; si annonæ sterilitas incessit, hominibus commodè propulsat. Plinius: Lupino est vsus proximus, quum sit & homini, & quadrupedum generi *o* ungulas habenti communis. Maceratum calida aqua homini cibo est, nam bouem vnum modii singuli satiant, validumq; præstant. Florentinus: macera-



tur in aqua marina, vel fluminali triduo, dulcescere, & ita siccatū ad vsum recō-  
di; homini & quadrupedū generi in cibo esse. Boues cum paleis sariare, homi-  
nibus commodē cum triticea, aut ordeacea farina in panes digeri. Diphilus Si-  
phnius lupinos tradit, qui macerati dulcescūt, corporis viresalore. Quomodo  
enim ex eis optimus panis fiat, iam docuimus in nostra naturali Magia. Zeno  
Cittieus vir morosus seueritatis, in suos familiares ac nōtos prāter modum ira-  
cundia percitus exandescēbat, verum quum plusculum vini haussisset, blan-  
dior factus & suauior mansuescebat. Rogantibus horum morum discrimen,  
respondere solebat, sese idem cum lupinis pari, siquidem illi antequā madue-  
riat, amarissimi sentiuntur, dulcescunt verō potu satiati, & mitescunt.

*De lino. CAP. LII.*

**D**E lino dicemus, quod tundimus in lanæ mollitiem ad linteorum textu-  
ras. Columella inter legumina connumerat. Plinius neq; inter horten-  
sia, neq; inter fruges asserit dici posse linum: sed miraculum ait, Herbam esse,  
quæ admoueāt Aegyptum Italiæ septimo die: herbam esse, quæ Gadis ab Her-  
culis columnis septimo die Ostiam afferat, & citeriorem Hispaniam quarto,  
provinciam Narbonensem tertio, Africam altero. Aliquid feri, quod ventos  
procellasq; recipiat: deniq; tam paruo semine nasci, quod orbem terrarum ul-  
tro, citroq; porret, gracili auena, tam non altē à terra tolli, neq; id viribus suis  
necti. Aiunt linum & retia Arachnem reperisse.

*Nomen.*

Tam Græcis, quā Latinis, Italisq; *linum* dictum volunt propter corticis recta  
stamina in recta filamenta scindi solita, quæ etiam lina dicuntur, à quo etiam  
linæ & libella, quæ directiones, & parietum structuræ librantur. Fabri ligna-  
rii directorium filum etiam lineam vocant. Sic piscatores filum, quod an-  
nexum est hamulis,

*Descriptio.*

Herba tam frequens est, & vulgaris notitiæ, ut superuacuum sit plura linea-  
menta afferre, quam sequentia. Tenuicaulis, angustifolia, in summo acumi-  
nata, floribus cæruleis speciosis, semine strigoso, tuluo.

*Genera.*

Duo apud nos genera videntur, sariuum, & sylvestre, vernum sariuum, hy-  
bernū rustici vocant sylvestre, quia hyemis gelicidia sustinet.

*Celum.*

Cæli, quo fruatur linū, auctores non meminere, mihi tepido frui videtur.

*Solum.*

Theophrastus solum amare dicit succosum, quum id pabulum immodicē  
trahat. Varro, In pingui rectius solo feritur, quia maioris est succi. Tremellius  
apud Columellam maximē dicit obesse terræ virus lini, quia feruida sit nau-  
ræ: quod etiam Virgilius significauit Georgicorum libro.

*Vrit enim lini campam seges, rit auena,  
Vrunt letheo perfusa papauera somno.*

Columella, Lini semen, nisi magnus est in ea regione, quam colis, prouen-  
tus & pretium procidat, ferendum non est, agris enim præcipue noxium est,  
atq;



atq; pinguiſſimum, lætū, & modicè humidum poſet. Sed omni ſolo, quod prædictis ſeminis ſegetibus ſatisfacit, vna præſens medicina eſt, vt ſtercore adiuues, & abſumptas vires hoc velut pabulo refoueas. Plinius: ſeritur ſabuloſis maximè. Quintili limoſis tractibus gaudere dixerunt, & vliginoſis.

Virgilius ſerendi lini tempus præſcribit Georgicorum primo.

Satio.

*Libra dies, ſomniq; pares ubi fecerit horas,*

*Et medium luci, atq; umbris iam diuidet orbem,*

*Exercete viri tauros, ſerite ordea campis,*

*Vſq; ſub extremum brumæ intraëtabilis imbrem.*

*Nec non & lini ſegetem, & cerale papeer*

*Tempus humo tegere.*

10

61

20

62

30

63

Columella, ſeritur à calendis Octobris in ortū aquilæ, qui eſt ſeptimo idus Decembris. Iugerum agri octo modiis obſeritur, nonnullis placet macro ſolo quāſpiſſiſſimum ſemen vetus committi, quo tenue linū proueniat. Idem etiam ſi læto ſolo ſeratur, menſe Februario, decem modios in iugerum iaci oportere dicunt. Lini decem modii vel octo, quatuor iugis conferuntur, occantur operibus tribus, runcantur vna, velluntur tribus. Summa ſit vndecim operarum. Plinius, ſeritur vno ſulco, nec magis feſtinat aliud. Vere ſatum aſtare vellitur. Vere ſeritur. Palladius: Octobri menſe lini ſemen ſeremus, ſi placeat, quod pro malitia ſui ſerendum non eſt, nam terræ vber exhaurit, ſed ſi velis loco pinguiſſimo & modice humido, ſeretur in iugero v i i i modiis. Aliqui macro ſolo ſpiſſum ſerunt, ita aſſequuntur, vt linum ſubtile naſcatur. Quinili ab æquinoctio autumnali vſq; ad exortum Arcturi, quod ſit pridie nonas Ianuarii. Nos autem linum ſerimus maxima diligentia & labore. Solum ante hyemem proſcindimus, vt glebæ gelu in puluerem redigantur. Poſt hyemem quinquies, aut ſexies aratur, vt optimè tellus pulueretur, ſed eo pacto, vt aratrum primo profundius immittatur, ac deinde minus, poſtremo, quā ſublime fieri poterit. Inde à medio Aprilis vſq; ad calcem optimum eſt ſarritionis tempus, ſpargatur ſemen, ac aratro cooperiatur. Proſciet ſi poſt ſationem ager herpiciſ obſeratur, ſi tēpus ſiccus, optimum eſſet, ſi tellus maſcere poſſet. Locis calidis poteſt & ante hyemem ſeri, vt adueniente frigore ſit firmiuſculum, vt ab eo ſe tueri poſſit. Cretola humo etiam tunc optimè prouenit. Conducibilius erit ab hominum manibus, quā bubus herpica trahi, ob vrinæ incommodum. Ab herbis liberandum lolio, & caſſutha, nam caulem amplexantes angunt, & ſtrangulant, idque prius quā creſcant: nam ſi increuerint, & amplexantes linum ſuis cincinnis ledunt, & ægrius diuelluntur. Qui incedunt per ſegetem caueant, ne proculcent & obterant pullulantem.

40

Plinius de eius meſſi hæc habet. Maturitas eius duobus argumentis intelligitur, intumeſcente ſemine, aut calore ſtaueſcente. Tunc euulſum & in faſciculos manuales colligatum, ſiccet in ſole pendens conuerſis ſupernè radicibus vno die, mox quinque aliis in contrariū inter ſe verſis faſcium: acuminibus,

Meſſu.



ut semen in medio cadat, deinde post messem triticeam virgæ ipsæ mergantur in aquam, solibus tepidatam, pondere aliquo depressæ. Nulli enim leuitas maior. Maceratas indicio est membrana laxatior. Iterumque inuersæ ut prius, sole siccantur, mox arefactæ in saxo tunduntur stupario malleo. Quod proximum cortici fuit, stupa appellatur, deterioris lini, lucernarum ferè luminibus aptior. Et ipsa tamen pectitur ferreis hamis, donec omnis membrana decorticetur. Medullæ numerosior distinctio, candore, mollitia. Cortices quoque decussi clibanis, & furnis præbent usum. Ars depectendi, digerendiq; iustum est è quinquagenis fascium libris quinas denas carminari. Iterum deinde in filo politus, illisum crebro in silice ex aqua, textumq; rursus tunditur clavis, semper iniuria melius.

Cibus.

Theophrastus semen habere quandam pinguedinem, & lenticiam dicit. Plinius. Exprimitur è semine oleum, quod non solum medicis, sed etiam pictoribus, lapicidis, lignariis, cementariis, ac fabris ferrariis vsui est. Præstat & ad lucernarum usum, quod diutius igni resistat, quàm quod ex oliuis.

Inf. rem.

Vnum hoc maximè rationem desiderare dicit Theophrastus, si lolium transit in linum: nam inter se plurimum distant, nisi fortè pabulum id etiam immodicè trahat, ut ex ista nimietate mutatio accidat. Sed nostri agricolæ credere non possunt, quod linum in lolium abeat.

## Decannabo. CAP. LIII.

**L**EGVMINVM complura genera Columella dicit, inter quæ cannabis maximè grata, & in hominis usum.

Nomen.

Græcis κάναβος. Sparsæ sunt aquarum scaturigines, quo loci cannabis sara, vel sponte nata luxuriat, ob id videtur id nominis inditum. Latinis ut Varro cannabis, Palladio cannabus. Itali canape.

Genera.

Meminit Dioscorides satiui, & sylvestris. Plinius tria eius genera facit. Optima Alabandica, secunda Milasea, tertia rosea agri Sabini, quæ quod ad proceritatem quidem attinet, arborum altitudinem æquat. Apud nos in marem & fœminam duntaxat distinguitur, mas ex flos, fœmina sterilitatem cõpensat.

Descriptio.

Dioscorides satiuiam ita delineat. Foliis fraxini, graui odore, caulibus proceris, semine rotundo. Gliscit verò apud nos rectis culmis, quadratis, striatis, horridis, foliis nigricantibus serratis, septenis, & nouenis è lingulo pediculo, diuisuris ricini, crebrisq; geniculatur nodis. Sylvestrem Dioscorides ita depingit. Virgas fert altheæ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes, folio satiua nigriore, & asperiore, flore lichnidis, subrubro semine, & radice altheæ, cuius cortex torquendis funibus accommodatus.

Solum.

Columella, Pingue solum, stercoratum, & riguum, vel planum, atq; humidum, & alrè subactum deposcit. Palladius eadem, quæ Columella habet. Quintilii, Umbrosis lacunis, vdisq; marginibus delectatur.

Satio.

Columella, Arcturo exoriente, quod est ultimo mense Februario, circa sextum



Sexum aut quintum calendarum Martii feri debet, nec tamen vsque in æquinoctium vernal. In quadratum pedem seruntur grana sex eius seminis. Sic pluuius cœli status, improbè feretur. Incertum est quantam impensam curamque desideret. Plinius, Seritur à Fauonio, quò densior est, eo tenerior. Quintili, Cannabis seritur ab arcturi exortu, qui est ad quintum calendas Aprilis. Cassianus ex veterum Græcorum placitis Februario serendum censet. Palladius eadem, quæ Columella habet. Apud nos, qui cannabina segeti dant curam, pro restibus conficiendis latissimo solo semina committunt: nam robustiorem cultum, crassiorémq; corticem, ac rudiorem stupam creabit, rudensibus & capistris apta, & quanto rarior feretur, eò pinguior fruticabit. Situ muscoso & puluerulento, florum seminumq; spes perit. Qui verò locis mediocriter latis, densiusve semen sparget, graciliorem calamum, & sine ramis, & delatiori cortice producet, aptiorem ad nendum, & ad texturas. Vbi facta est, herbis manibus solum purgabis.

Plinius. Semen eius, quum est maturum, ab æquinoctio autumnali distinguitur, & sole, aut vento, aut fumo siccatur. Ipsa cannabis vellitur post vindemiâ, ac lucubrationibus decorticata, purgatur. Improbatur cortici proximum, aut medullæ, laudatissimum est è medio, quæ mesa vocatur. Nostri maturato semine in manipulos colligunt, ac simul obseruantes seminarios culmos vna componunt, radices verò ex altera parte. Deinde semina in culmis straminibus, vel herbis cooperiuntur, vt perfectam maturitatem concipiant per hebdomadam: inde sublatis straminibus in substratis linteis decutiunt semen, & condunt. Collecto semine, manipuli lacunis aquæ plenis merguntur, vbi macerantur diu, deinde insolantur, ac tunduntur, ac deinde cortices staminei velluntur, vt fit in lino.

Plinius, Vfus funibus vtilissimus: iis enim vtuntur in fabricis ad sustinenda trahendaq; ingentia pondera, ad nauigia regenda, & ad lintea texenda, quibus infima plebs vtitur. Inuisa admodum funibus, qua subiinde ii pendeant, aut laqueo suffocentur. Necessaria piscatorum retibus, quum funes & retia ex ea confecta diutius in aqua commorentur, quàm ex lino. Plagarum etiam vñbus præcipua. Apud nos ad vestium stragula, velorum, & quamlibet denique supellectilem.

Plinius. Saturandis hyeme gallinis, quo tempore raro oua parere solent, hoc cibo frequenti vtuntur. Nos multum alimentum ex eo gallinis cohortalibus suggerimus, vt hyeme fecundiores sint, sed steriles postea, quasi pinguedinis mole obrutæ redduntur. Auiculis etiam in cibum porrigimus, ac tantum saginæ affert, vt aut enecet, aut cantillandi alacritatem adimat, vt carduelibus & linottis. Præterea lucernis alit ellychnia & lucem, & ex ea oleum exprimitur.



**I**NTER lini genera sunt qui gossipium a numerent, & cuius fructu candi-  
nissimū vellus netur ad multa velle, nec est aliud lini genus, quod hanc mol-  
litiē & candore præferri possit.

*Nomen.*

Græcis *ζώνη* dicitur, Polluce auctore, Theophrasto *ιενπόα* dicitur, Suida  
*βίβλας* & *μυρενός*, Nicolao Myrepsio *βομβάκιον*. Plinio, ceterisque Latinis gos-  
sipium & xylon, unde ligna xylina, Arabes *cottonem* vocant, à mali coronici for-  
tasse effigie, quod cum eo gignitur. Itali ab his nomina mutuantes, *bombace*,  
& *cottone* vulgò vocant.

*Descriptio.*

Theophrastus ita suam lanigeram depingit. In Tylo insula, in sinu Arabico  
est lanigera arbor, folio virigineo fruticans, verum minori, fructu nullo, sed in  
quo lana continetur, nulli magnitudine cernitur, verum nascens compressum,  
quum tempestiva maturitas sit, aperiri, lanas eximi, quæ telas texunt: alias vi-  
les; alias pretiosas. Plinius ab eo: Tylos insula est in sinu Persico: Eius excel-  
siorē suggestu lanigeræ arbores alio modo quàm serum. His folia infæcun-  
da, quæ nimia minora essent, vitium poterant videri. Ferunt coronici mali am-  
plitudine cucurbitas, quæ maturitate ruptæ, ostendunt lanuginis pilas, ex qui-  
bus vestes pretioso lintea faciunt. Sed ex se hanc eandem alibi describit. Fru-  
tex est parvus, similemque barbaræ nucis defert fructum, cuius ex interiore  
bombice lanugo netur. Nec vlla sunt in candore, mollioriave præferenda. Hæc  
descriptio commodè, & concionè nostro gossipio quadrat: nam fruticulus est,  
in quo vitis folia, sed minora, molliora, incana, flores lutei non nihil purpura-  
scentes in medio, nuculasq; ferunt, aut potius mala exigua pulso lot re, dum  
maturuerint diuina, lanosum floccum, aut glomum ostendunt, semen ob-  
longum cubebæ, copiosum, alba farctum medulla, oleaginosa, lanugine inuo-  
lutum, ut difficillimè extrices.

*Solum.*

Cælum exoptare calidum videtur: nam Theophrastus in Arabico sinu ad  
orientem verso, & Tylo insula nasci dixit. Plinius in superiore Ægypti parte,  
in Arabiam vergente. Apud nos aprieis maritimis ad Austrum versus provenit,  
ut in Apulia, sic Creta, Cypro, Sicilia, & Mælia Italiae provenit uberrimè.

*Solum.*

Solum pingue, latum, & profundum amat, & si macrum erit, latissime  
satiatur. Sed melius erit per se pingue: nam sole incalcescente solum plantas  
interimit.

*Satio.*

Satis rationem ita apud Appulos observauimus, ubi copiosissimè feritur.  
Solum primò Ianuario proscinditur, Februatio secundo, ac tertio Martio. A-  
prili demum quando feritur, iterum aratur. Semen separatur vnum ab alto-  
ro, & spargitur ut triticum. Iugerum soli quarta pars modij complet, spatium  
aperitur pastino, nascitur post mensem, quum tria folia emerferint foras, ma-  
nibus herbis liberatur, vel farculis, & si denuò nascentur, denuò idem opus  
obendum. Si in solstitio luxuriat in germina & frondes, summa decerpun-  
tur. Floret Iulio, nec desinit florere, fructificareq; ne, donec hyemis asperi-  
tate cohibetur. Aiunt Candiota olivæ semen Iulio stercore & vaccino



macerati, sic vberius, & felicius enasci, nempe colorius emergit, & vberius fert, antequamque frigoris tyrannidem, & siccitiam. Sic etiam nostri oli-  
tores in minus commodo celo, vel morosissimas plantas vernaculas fa-  
ciunt.

Nullum lini genus huic candore, & molliæ præfertur, quanquam firmi-  
tatis in copiarum.

*De fenugræco. CAP. LV.*

**S**ERITVA fenugræcum ad messem, & ad pabulum, ad pabulum quo-  
modo seratur dicemus in prato.

**B**IXAPUS Theophrastus illi nomen imposuit, à bubuli cornu similitudine, & Nomen  
ma. Pholus *αἰχμή* à capri cornu similitudine: sic etiam *αἰχμή*, nam *αἰχμή*

Græcis cornu est, magna que Græcarum nomenclationum pars à siliquis, quæ  
corniculis similes existunt, desumpta est. Hippocrates *αἰχμή*. Varro siliculam  
vocat. Columella ab insdem siliquis siliq. iam vocat, inquit: Siliquam, quam  
rustici fenugræcum appellant. Plinius siliciam, Palladius fenugræcum.  
*Itali fenogreco.*

Theophrastus ait eius semen viride inolidum esse, sicrum vero odoratum. Descriptio

**E**x Dioscoride. Siliquas profert similacis, sed minus longas, & torosas, semen  
longiusculis, sed multo minus, vel myagro simile. Emicat fenugræcum  
cauliculis parum striatis, foliis ternis, loto & nullis, & trenatis, flore paruo al-  
bicanti, semine anguloso, fuluo in corniculis.

Theophrastus fenugræcum solo tenui nascere, nec pingui producere, Solus  
quod nulliè reliquis accidere dixit. Vt in Eubœa apud Lelantum nasci quidem  
omnino nequit, & apud Canethum.

Columella ita serit. Duo tempora sationum habet, vnum quæ pabuli cau- Saties  
la seritur, alterum mensis Ianuarij ultimo, vel primo Februarij, quum in mes-  
sem seminatur. Hac ratione iugerum sex modis occupamus, cruda terra non  
incommodè sit, daturque opera, vt spissè atetur, nec tam altè, nam si plus qua-  
tuor digitis obrutum est semen eius non facile prodit, propter quod nonnul-  
li priusquam serant, minimis aratris proscindunt, atque ita iaciunt semina, &  
sarculis adobruunt. Siliquæ modij sex, vel septem totidem operis obrountur,  
metuntur vna. Plinius non aratione, sed scarificatione feri dixit, quantum-  
que penus tractetur, eò lætius provenire, ratumque dictu, esse aliquid, cui  
prosit negligentia. O citur tantum. Palladius ea, quæ Columella habet.

Theophrastus scribit subnasci huic statim ab radice, quod hæmodorum Inf. rem,  
vocat Græci, singulari caule, nec ab simili confurgens, verum longè breuior-  
i, in culmine quippiam capitis instar gerit, radice subrotunda nititur. Statim  
adnascens interit, quia pabulum tollit, tum quod terra ministratur, tum quod  
sole & aere venit.



## De herbatinctorum. CAP. LVI.

**S**ERITVR in Campania herbatinctorum, officinis maxime expetita. Latet me an fuerit antiquis cognita.

*Nomen.* Aluz, vel tinctorum herba vulgo nominatur.

*Description.* Assurgit grandicaule, & tereti, auenæ crassitie, altitudine cubitali, in longum spicata, spica à medio caule incipit, in quo flores & semen, folio oblongo, vt linaria, sed latiusculo, in viridi clarescente, flore herbaceo, vel croceo, radice tenui, alba, sapore rapisti.

*Calum.* Aperto, & calido cœlo gaudet, obladitur frigore.

*Solum.* Solo verò macro, & cliuoso.

*Ratio.* Præparatur solum, vt in linæ diximus. Seritur Ianuario, vel Februario, modium seminis duodecim iugera complet. Nascitur à satusexto, vel octauo die, floret initio Maii, semine elicit, excipiturq; deussio semine.

## De arundine saccharifera. CAP. LVII.

**N**OSTRÆ segeti coronidem imponet calamus saccharatus, quum apud nos seratur, colatur, nec mediocrem quaestum inde extorqueant mercatores, dum saccharum diuersis in locis venum exportant, & præsertim quum nemo adhuc eius sationem, & vsum conscripserit, quoniam maiores nostri auditione potius, quàm oculata fide & exploratione aliqua nobis tradiderunt. Aristoteles enim & Theophrastus eius discipulus mel arundinibus Indicis excipi dixerunt. Dioscorides, Est & aliud concreti mellis genus, quod saccharum nominant, in India, & felici Arabia in arundinibus inuenitur, salis modo concretum, & dentibus, vt sal, fragile. Galenus oriri ait in Indicis arundinibus mel, saccharum nominatum. Strabo in sua Geographia non solum radicibus, sed arundinibus mel extrahere in India, sine apibus. Varro è Latinis huius rei meminit.

*Indica non magna nimis arbore crescit arundo,*

*Illius & lentis premitur radicibus humor,*

*Dulcia cui nequeant succo contendere mella.*

Plinius s. Saccharum Arabia fert, sed laudarius India; est autem mel harundinibus collectum, candidum, dentibus fragile, amplissimum, nutis auellanae magnitudine. Et Seneca memorat cannas, quarum humor pinguis, dulcis quæ in mel abeat.

*Nomen.* Recentioribus Grecis saccharon, Latinis saccharum, Arriano vel calaminum, vel indicum: Ital's Zuccaro.

*Description.* Non magnitudine solum, sed effigie saccharatus calamus harundines & milium Indicum, & Ethiopieum dicta amulatur, vt pedum in er milticeas, & arundinaceas plantas, septemnum, octonumve pedum altitudine calamos profert, pollice crassiores, densis geniculis, albidis, succulentisq; & perquam



quàm dulci farctus medulla, folio bitubitali, per longitudinem striato, composito flore, quadantenus *forge*, radice harundinacea. Quam harundines anula factæ sunt, præ senio turgida fiunt, excluduntq; è rimis, quibus hiascunt, succum saccharatum, sed solidum salis aspectu.

Calidi, vel tepidi aëris amastæ sunt, utpote Ægypti, Rhodi, Cypri, Indiæ, *Calami* Africa, vel Arabiæ, quæ fœlix cognominatur, sed aëre blandiori allecæ, Italiæ, Hispaniæ, Galliæ tandem & orbi Europeo inquilinæ factæ sunt, ut v/q; ad Canariæ transuectæ sint.

Humentis soli, & palustris amica.

10 Apud Brutios & Siculos tali arte præparatur ager. Ianuario aratur, in fine *Solio*

20 iteratur, dicunt vulgo *duplare*, medio Februario tertio aratur, dicunt *tertiare*: Martio deinde postremo ager in areolas efformatur, dicunt vulgo *incasellare*:

sint areæ viginti pedum longitudinis, octo latitudinis, in extremitatibus erigatur sulcus, in medio lacunæ fiant, in quibus immissæ resident aquæ, omnes aquariorum sulco hærent, ob id declinatorio seruntur, qui flumini subiaceat, ut quum decurrit aqua per apertum vadum recipiat aquam, inde harundines sacchariferas iam adseruatas in metas in taleolas scindunt semipedis longitudinis, in quibus genicula intercipientur, sulco hinc inde figuntur semipedis interuallo distantes, quæ Aprili concipientes germinant. Maio mense, ubi calor inualefcit, rigantur, ut singulis hebdomadibus areæ semel irrigentur, aliis diebus aliis partiuntur, idq; v/q; ad Octobrem. Nouembri mense inciduntur

30 iuxta radicem, & in fasciculos colligantur in metas, quæ sub dio efformantur, decem pedum altitudinis, & ita seruantur ad saccharum conficiendum, vel ad

serendum Martio, & nunc ager hortus dicitur. Secundo anno Martio mense, herba euelluntur, & stercoreantur sulci, & Maio irrigantur, ut diximus, &

Nouembri secantur calami, diciturque *cannamela* vulgo. Tertio anno eadem cura. Nouembri eruntur radicibus, ut per triennium requiescat ager. Hic apud Brutios serendi modus. Possunt etiam stolones euulli, & depacti concipere, sic etiam oculi è radicibus satis, ut in harundinibus. Si solum imbecille

40 erit, per biennium fatigant solum.

50 Saccharum paratur arte tali. Euulsi è radicibus calami ad trapetum deferuntur, emundantur primo frondibus, incidunturq; ad palmares taleolas, sub

trapeto contunduntur, ac sub prælo elicitur incomparabilis utilitatis latex. In

cortinam, seu abanum conicitur, ac per diem naturalem efferuere sinunt, aquam imiciendo ebullitioni suffecturam, & vicissim despumando. Si verò

solum fuit imbecille, per diem & quadrantem ebulliat, ubi verò iam aqua in vaporem expirauit, excoctum saccharum instar salis coalescit, & in nolas,

seu figlina vasa infunditur, in metæ formam effigiata, quibus in angustiori loco foraminulum est, suis paleis obturatum, ita quadraginta dierum spatio

40 relinquunt, & referato foraminulo, quo sordidius crassamentum facilius exeat, eodem dierum interuallo quiescere sinunt, inde luto ex figlina terra, &



aqua subiecto diluore, metala tam habim inducunt, & loricam latam, duorum, triumve digitorum faciunt, quae crusta ubi aruerit, demum & noua superinducitur, bis rerve repetunt, quousq. probe cooperitam cognouerint.

Vfus.

Sacchari multiplex vsus. Praeber enim suas delicias tum culinae, tum pharmaciae, multa enim e saccharo conflantur, loricantur, conduntur, & conuoluuntur, dulciaria, & tragemata, & alia gula blandimenta.

# IOAN. BAPTISTAE

PORTAE NEAPOLITANI

## VILLAE

LIBER DVODECIMVS ET VLTIMVS,

PRAEFATIO

PRAEFATIO

PRAEFATIO

**N**am ad operis finem deuentum est, scilicet ad reliqua herbacea, ubi de pratorum, siue de pascuis loquemur. Ex his enim villicus facit copiam habet, quod armentis tuteantur, siue quibus terra commodè coli non poterit. Cato summus in villa pratorum quintum locum tribuit. Interrogansq. inquit Plinius, quis esset uetillimus questus? respondit si bene pascatur: quis proximus? si mediocriter pascatur. Summa omnium in hoc spectanda fuit, ut fructus is maxime probaretur, qui quantum minimo impendio costatus esset. Sed serosa, ex Varronis sententia, de hoc non consentit quod alii dant primarium bonis pratis, ut & Varro quoque, à quo antiqui prata quasi parata appellarunt. Columella ab his, Necessarius est pratorum cultus, eum teretes Romani primas in agnitione tribuerunt. Nomen quoque indiderunt ab eo, quod protinus esset paratum, nec magnum laborem dediderit. M. quidem Porcius & illa commemorauit, quod nec tempestatibus affugeretur, ut alia partes turis, minimiq. sumptus e gens, per omnes annos praebere reditum, neque eum simplicem, qui etiam in pabulo non minus redderet, quam in foeno. Vlpianus de verborum significatione pratorum vocat, in quo ad fructum percipiendum salce duntaxat opus est. Caesar Vo-

pilcus



piscus quum causam apud censes ageret, campos Roseæ dixit salubrem fumen esse, in quibus peritias pridie relictas gramen operiret. Pratum summa Dei benignitate productum est, ut summa terræ curis ubique nuda restitili feracitate, perenni; proveniunt, virore decoraretur ætæno, & vltro pecori vescendo obiceretur. Ex varia enim partium terræ commistione, cæli habitu, rore, imbribus variz herbæ produuntur; ut variis quoque animalium generibus pabulo esse possint.

*Quot pratorum genera, & de aëre solo, & aquis pratis convenientibus. C A P. I.*

- 10 **C**A T O duplicis prati meminit, rigui, & sicci. Pratum si irriguum habebis, fœnum non deficiet: si non, & erit siccum, summittito. Prata irrigua, si aquam habebis, id potissimum facito: si aquam non habebis, sic ut habes quamplurimum facito. A quo Columella. Prati duo animaduertimus genera, quorum alterum est siccaneum, alterum riguum. Sed potum pratio idoneum eligamus. Columella: Nec campus concava positionis esse, nec collis prærupti debet, ille ne collectam diutius contineat aquam, hic ne statim præcipitem fundat. Potest tamen mediocriter accliuus, si aut pinguis est, aut riguus ager, pratum fieri. At planities maximè talis probatur, quæ exigentè prona non patitur diutius imbres, aut influentes riuos
- 10 immorari, aut si quis eam superuenit humor, lentè prorepit. Itaque si palus in aliqua parte subsidens restagnat, sulcis deriuanda est: quippe aquarum abundantia aut penuria graminibus æquè est exitio. Ab eo Palladius: Pratio locum pinguem, leniter inclinatum, vel huiusmodi vallem deputabimus, ubi humor nec statim præcipitari cogitur, nec diu debet inhaerere. Varro etiam campestram positionem probauit, quia ibi semper prata herbosa. Nunc solum eligamus. Columella: Læto, pinguique campo non desideratur influens riuus, meliusque habetur fœnum, quod suapte natura suffragino gignitur solo, quàm quod irrigatum aquis elicitur, quæ tamen sunt necessaria, si macies terræ postulat: nam & in densa, & resoluta humo quamvis exili, pratum fieri potest, quum facultas irrigandi datur. Palladius ab eo eligit solum pingue roscidum. Potest quidem & soluto, & gracili solo pratio fortuna, si rigeret, imponi. Cælum tamen optate temperatum nos dicimus, & si id non assequimur, frigido tamen proximum, humidoque: nam si frigidum fuerit, solum continuè nubibus obscellum herbarum virore orbabitur. Nimis calidum herbas exures, calidum exiccabit, nisi propinquus adsit humor.

*Quomodo fiant prata. C A P. II.*

**P**RATA vel naturæ sponte nascuntur, vel arte fiunt. Quæ arte fiunt, vel noua instituenda sunt, vel antiqua renouanda (nam multa sunt, ut dixi,



quæ negligentia exoleſcunt, & ſiunt ſterilia) ea expedit interdum etiam frummenti cauſa exarare, quia talis ager poſt longam deſidiam, latas ſegetes affert. Igitur cum locum, quem prato deſtinauerimus, æſtate proſciſſum, ſubactumque ſæpius per autumnum rapis, vel naris, vel etiam faba conſeremus, inſequentem deinde anno, frumento, tertio diligenter arabis, omnesq; validiores herbas, & rubos, & arbores, quæ interueniunt, radicibus extirpabimus, niſi, ſi fructus arbuſti id facere nos prohibuerit. Ab eo Palladius: Septembri tempore extirpandus eſt locus, & liberandus omnibus impedimentis, vel herbis latioribus, & ſolidis, atq; virgultis. Deinde quum frequenter exercitatus fuerit, ac multa aratione ſolutus, ſubmotis lapidibus, & glebis ubiq; confractis, ſtercoretur Luna creſcente recentilætamine. Ab ungulis iumentorum ſumma intentione ſeruetur intractus, præcipuè quoties humeſcit, ne inæquale ſolum reddant mollibus locis impreſſa veſtigia. Vtiliſſimum ſimul & hec be arare, deinde cratire. Nec primo anno rigari nec paſci ante ſcœniſecia, ne herbx vellantur, obtrituq; hebetentur. ex Plinio.

*Quomodo facta prata colantur.* CAP. III.

**C**VLTVS autem pratorum magis curæ, quàm laboris eſt. Primum ne ſtirpes aut ſpinas, validiorisq; incrementi herbas ineſſe patiamur, atque alias ante hyemem, & per autumnum extirpemus, ut rubos, virgulta, iuncos, alias per ver euellamus, ut iuruba, ac ſolſtitiales ſpinas, ac neq; ſuam velimus impaſci, quoniam roſtro ſuffodiat, & ceſpites excitet, neq; pecora, maiora, niſi quum ſicciffimum ſolum eſt, quoniam demergunt ungulas, & atterunt, ſcinduntq; radices herbarum. Tum deinde macriora & pendula loca menſe Februario, Luna creſcente ſimo iuuâda ſunt, omnesq; lapides, & ſi qua obiacent falcibus obnoxia colligi debent, ac longius exportari, ſummittiq; pro natura locorum, aut temporis aut ſerius. Sunt etiam quædam prata ſitu, veruſtatis obducta veteri, vel craſſo muſco, quibus mederi ſolent agricolæ ſeminibus de tabulato ſuperiectis, vel ingeſto ſtercore, quorum neutrum tantum prodeſt, quantum ſi cinerem ſæpius ingeras, ea res muſcum enecat. Attamen pigriora ſunt iſta remedia, quum ſit efficaciffimum de integro locum exarare. Quum herba permatuerit, tum ſcœniſecam meſſorem oportet inducere, & deſectam herbam religare, & exportare, deinde locum rigare ſi fuerit facultas aquæ, ſi tamen terra denſior eſt: nam in reſoluta humo non expedit inducere maiorem vim riuorum, priuſquam conſpiſſatum, & herbis colligatum ſit ſolum, quoniam impetus aquarum proluit terram, nudatisq; radicibus gramina non paritur coaleſcere, propter quod nec pecora quidem oportet teneri adhuc, & ſubſidentibus pratis immittere, ſed quoties herba proſiluerit, falcibus deſecare. Nam pecudes, ut ante dixi, molli ſolo inſigunt ungulas, atque interruptas non ſinunt herbarum radices ſerpere, & condensare. Altero tamen anno minora pecora poſt ſcœniſecia permittemus admitti, ſi modo ſicci



tas, & conditio loci patietur. Tertio deinde, quum pratum solidius, ac durius erit, poterit etiam maiores recipere pecudes, sed in totum curandum est, ut secundum Fauonii exortum, mense Februario circa idus, immittis seminibus fœni, macriora loca, & vtiq; celsiora, stercorentur: nam editior clius præbet etiam subiectis alimentum, quum superueniens imber, aut manu riuus perductus, succum stercoris in inferiorem partem secum trahit, atque ideo ferè prudentes agricolæ etiam in aratis collem magis, quàm vallem stercorant, quoniam pluuiæ semper pinguiorem materiam in ima deducunt. Ab eo Palladius: Sed si prata vetera muscus obduxerit, abradendus est, & scalptis  
 10 eisdem locis fœni spargenda sunt semina, & quod ad necandum muscum prodest, cinis sæpius ingerendus. Quod si sterilis factus est locus carie, incuria, vetustate, exaretur, ac de nouo rursus æquetur. Nam prata sterilia plerunque arare conueniet. Sed in nouo prato rapa conferere possumus, quorum messe finita, cætera quæ dicta sunt, exequemur. Plinius: Senescunt prata, restituiq; debent faba in his sata, vel rapis, vel milio: mox insequente anno frumento, rursusque in prata tertio relinqui. Præterea quotiens secta sint, sicilire, hoc est, quæ fœnifeces prætereunt secari.

*Succisum fœnum quomodo tractari & condi debeat.*

C A P. II I I.

20 **E**XACTISSIME Columella docet, quomodo succisum fœnum tractari, & condi debeat. Fœnum antequam inarescat, optimè demetitur: nam & largius percipitur, & iucundior cibum pecudibus præbet. Est autem modus in siccando, ut neq; peraridum, neque viride colligatur: alterum, quod omnem succum si amisit, stramenti vicem obrinet: alterum quod si nimium retinuit, in tabulato putrescit, ac sæpe, quum concaluit, ignem creat, & incendium, nonnunquam etiam quum fœnum cecidimus imber oppressit, quod si permaduit, inutile est vñ mouere: patiemur igitur superiorem partem sole siccari, tum demum conuertemus, & vtrumq; siccatum coarctabimus in striam, atq; ita manipulos vinciemus, nec omnino cunctabimur, quominus sub lectum congeratur, vel si non competit, ut, aut in villam fœnum  
 30 portetur, aut in manipulos colligatur. Quum igitur ad eum modum siccatum erit, in metas extrui conueniet, easque ipsas in angustissimos vertices exacui: nam sic defenditur à pluuiis, quæ etsi non erunt, non alienum tamen est prædictas metas facere, ut si quis humor herbis inest, exudet, atq; excoquatur in aceruis. Quapropter prudentes agricolæ, illatum lecto, non ante componunt, quàm per paucos dies congestum in se concoqui & deferuescere patiuntur. Plinius verò: Secandi tempus quum spica deflorescere cœperit, atq; roborari, secandumq; antequam inarescat. Cato fœnum, inquit, ne serò seces, prius quàm semen maturum sit, secato. Quidam pridie rigant, vbi sunt  
 40 rigua. Noctibus roscidis secari melius. Quadam partes Italiæ post messem



secant. Fuit hoc quoque maioris impendii apud priores, Creticis tantum, transmarinisque cotibus notis, nec nisi oleo falcis aciem excitantibus. Igitur cornu propter oleum ad crus ligato fœnifex incedebat. Italia aquarias cotes dedit, limæ vice imperantes ferro. Sed aquaria protinus viret. Falcium ipsarum duo genera: Italicum brevius, ac vel inter vepres quoque tractabile. Galliarum latifundia maioris compendii, quippe medias cædunt herbas, brevioresque prætereunt. Italus fœnifex dextera vna manu secat. Iustum est vna opera iugerum in die defecari, alligarique manipulos mille ducentos quaternorum pondo. Sectum verti ad solem, nec nisi siccum constitui oportet. Nisi fuerit hoc observatum diligenter, exhalare matutino nebulam quandam, metasque mox sole accendi, & conflagrare certum est. Rursus rigari defecta oportet, ut secetur autumnale fœnum, quod vocant cordum. Interamnæ in Umbria quater anno secantur, etiam non rigua. Ter verò plerisque in locis, & postea in ipso pabulo non minus emolumentum est, quàm à fœno. Varro: Primum de pratis summissis, quum herba crescere desit, & artibus arefcit, subsecari falcibus debet, & quoad perarefcit, furcillis versari, quum peraruit, de ea manipulos fieri, ac vehi ad villam, tum de pratis stipulam rastellis eradi, atque addere fœnificiæ cumulum. Quo facto sicilienda prata, id est, falcibus consecranda, quæ fœnifex præterierunt, ac quasi tuberosum reliquerunt campum. A qua sectione arbitror dictum sicilire pratum.

*De medica.* C A P. V.

**P** A B U L O R V M genera complura esse scribit Columella, sicut medicam, viciam, sarraginem quoque ordeaceam, & auenam, fœnum græcum nec minus eruum, & ciceram: nam cætera neque enumerare, ac minus scribere dignamur, excepta cyrifo. Sed ex iis, quæ placent, eximia est herba medica, quod quum semel seritur, decem annis durat, quod per annum deinde rectè quater, interdum etiam sexies demetitur, quod agrum stercoreat, quod omne emaciatum armentum ex ea pinguescit, quod agrotanti pecori remedium est, quod iugerum eius toto anno tribus equis abunde sufficit. Plinius: Medica vel in primis dicenda. Tanta dos eius est, quum vno sat amplius, quàm tricenis annis duret. Vnum de ea, & cyrifo volumen fecit Amphiloehus confusum. Medicam maximè sequi apes dixit Varro.

*Nomen.* Græcis *μῆδική* dicitur. Plinius: Medica externa etiam Græciæ, ut à Medis aduecta per bella Persarum, quæ Darius intulit. Sic nos etiam è Mediæ regionis hortis aduectum citrium, malum medicum dicimus. Latinis medica. Neapolitanis *farfara*.

Dioscorides ita describit. Medica quum recenter prodiit, foliis & caule trifoliorum pratensi similis est, procedens verò folia contrahit, caules edens trifolii, & uliquas coliculorum intortas, in quibus semen lentis magnitudine dependet.



dependet. Id siccatur iucundi saporis gratia conditaneo sali admiscetur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt. Ab eo Plinius: Similis est trifolio, caule, foliisque geniculata, quicquid in caule assurgit, in folio contrahitur. Ex Hispaniis aduecta, nobis inquilina facta est. Trifolium pratense æmulatur, prolixioribus caulibus, follicum orbiculatum, volutæ figuram exprimens, semina genistæ.

Iubet Varro, ne in terram nimium aridam, aut variam, sed temperatam de- Solum.  
mittas. Plinius. Poscit siccum, succisumq; , vel riguum solum.

Medicam diximus nomine suo natales suos fateri, locumque vbi fertificat, Calum.

10 vocabulum indicat: nam à Medis Græciæ, & Italiæ aduenit.

93 37 Varro. In iugerum vnum, si est natura temperata terra, scribunt opus esse Satis.  
medicæ sesquimodum, id feritur ita, vt semen iactatur, quemadmodum sci-  
licet quum pabulum, & frumentum feritur. Columella: Locum, in quo pro-  
ximo vere medicam saturus es, proscindito circa calendas Octobris, & eum  
tota hyeme putrescere finito. Deinde calendis Februarii diligenter iterato, &  
lapides omnes egerito, glebasque offringito. Postea circa Martium mensura  
tertiato, & occato. Quum sic terram subegeris, in morem horri areas latas pe-  
dum denum, longas pedum quinquagenum facito, vt per semitas aqua mini-  
strari possit, aditusq; vtraq; parte runcantibus pateat, deinde verus ster-  
20 cito, atq; ira mense vltimo Aprilis serito tantum, quantum vt singuli cyathi  
seminis locum occupent decem pedum longum, & quinque latum, quod vbi  
feceris ligneis rastris (id enim multum confert) statim iacta semina obruan-  
tur, nam celerrimè sole aduruntur. Post sationem tangi ferro locus non de-  
bet, atq; vt dixi, ligneis rastris sarriendus, & identidem runcandus est, ne al-  
terius generis herba inualidam medicam perimat. Tardius messem primam eius  
facere oportebit, quum iam seminum aliquam partem eiecerit. Posteaquam  
voles teneram, quum profilierit, defeces licet, & iumentis præbeas. Sed in-  
ter initia parcius, dum consuescant, ne nouitas pabuli noceat: inflat enim  
& multum creat sanguinem. Quum secueris autem, sæpius eam rigato:  
30 paucos deinde post dies, vbi cœperit fruticare omnes alterius generis herbas  
eruncato. Sic culta, sexies in anno demeri poterit, & permanebit annis de-  
cem. Ab eo Plinius: Solum, in quo feratur, elapidatum, purgatumque sub-  
igitur autumno, mox aratum & occatum, integitur crare iterum, & tertium,  
quinis diebus interpositis, & fimo addito. Ita præparatū feritur mense Maio,  
alias pruinis obnoxia. Opus est densitate seminis omnia occupari, interna-  
scentesq; herbas excludi: id præstant in iugera modia vicena. Cauendum ne  
adurat, terraque protinus integri debet. Si sit humidum solum, herbosumve,  
vincitur & desciscit in pratum. Ideo protinus altitudine vnciali, herbis omni-  
bus liberanda est, manu potius quam sarculo. Secatur incipiens florere,  
40 & quoties defloruit, id sexies euenit per annos, quum minimum qua-  
ter. In semen maturescere prohibenda est, quia pabulum vtilius est vsque



ad trinitatum. Verno feri debet, liberariq; cæteris herbis, ad trinitatum maris ad solum radi: ita reliquæ herbæ intereunt sine ipsius damno, propter altitudinem radicum. Si euicerint herbæ, remedium vnicum est aratio, sapius vertendo, donec omnes aliæ radices intereant. Dari non ad satietatem debet, ne deplere sanguinem necesse sit. Et viridis utilior est, arefcit surculosè, ac postremo in puluerem inutilem extenuatur. Palladius eadem, quæ Columella recitat. Virgilius vere ferendam dixit,

*Vere fabis satio: tunc te quoque medica putres.*

*Accipiunt sulci.*

Theophrastus medicam nimio stercore & vrina perire dixit aliorum relatione..

### *De cythiso. CAP. VI.*

**F**RUTEX est & cythisus, ab Aristomacho Atheniensi miris laudibus prædicatus pabulo ouium, aridus verò etiam suum: spondetq; iugero ejus annua II-S M M. vel mediocri solo redditus. Utilitas quæ eruo, sed ocyor satietas, perquam modico pinguescente quadrupede, ita ut iumenta hordeum spernant. Non ex alio pabulo lactis maior copia, aut melior, super omnia pecorum medicina à morbis omni vsu præstante. Quin & nutricibus in defectu lactis aridum, atq; in aqua decoctum, potui cum vino dari iubet, firmiores celsioresq; infantes fore. Viridem etiam gallinis, aut si aruerit madefactum. Appos quoq; nunquam de fore cythisi pabulo contingente, promittunt Democritus, & Aristomachus, nec aliud minoris impendi est. Hæc Plinius, quæ ex Columella excepit. Cythisum in agro esse quamplurimum maximè refert, quod gallinis, apibus, capris, bubus quoq;, & omni generi pecudum utilissimus est, quod ex eo citò pinguescit, & lactis plurimū præbet ouibus, tum etiam quod octo mensibus viridi eo pabulo uti, & postea arido possis. Mulieres quidem si lactis inopia premuntur, cythisum aridum in aquā macerari oportet, & quum tota nocte permaduerit, postero die expressi succi ternas heminas permisceri modico vino, atque ita potandum dari, sic & ipsæ valebunt, & pueri abundantia lactis confirmabuntur. Varro è cythiso bonum fieri mel dixit. Et si à Theocriti & Virgilii versibus sit maximè celebratus, hodie ferè apud nos abolitus est vsus.

*Nomen:*

Græcis κύπρος dicitur. Plinius è loco nomē desumpsisse indicat, dum inquit, Inuentus hic frutex in Cythno insula, inde translatus est in omnes Cycladas, mox in vrbes Græcas. Ego potius Cynthisæ insula, quæ vna è Cycladibus est, nomen ferre dixerim. Qui κύθιον in Poëtis legunt, secundum stœnum dicunt, quod veneri multum feminis ministrer. Latinis cythisus.

Theophrastus hebenum cythisi modo fruticosam dicit. Molestus est iuxta nascens, alimentis rapina, nam omnia ferè necat, sed eo valentior halimus est, hic enim vel cythisum ipsum interimit. Dioscorides: Frutex cythisus est albus.



albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubito longiores, in quibus folia scænuigræci, aut loti trifoliæ minora, dorso medio prominente, ea digitis trita erucam olent, gustataque cicer sapiunt. Plinius: Canus aspectu, breuiterque si quis exprimere similitudinem velit, angustioris trifolij frutex. Ramulosa ei folia. Nec alimenti rapina. Galenus, Fruticosa planta cytissus est, eam altitudinē attingens, ad quam myrtus crescit. Apud nos viret cytissus frutice candido, foliis singulis pediculis ternis, & ramulosis, quæ si digitis terantur, odorem erucæ proximum habent, gustatuque cicer recens representat, flore in cacuminibus saturatè luteo, pulcherrimoque. Siliquis contortis, seminibus paruis, vix ineunte æstate maturefcentibus.

Columella in apibus vtriusque cytissi meminit; satiuæ, & suæ spontis.

Genus.

Plinius in insula Cythno nasci dixit: non æstuum, non frigorum, non grandinum, aut niuis iniuriam expauescit. Vnde maximè miratur rarum esse in Italia. Apud nos frequens obuia, in Neside insula, Puteolis, Pausilipo, maritimis collibus.

Calum.

Varro rectius in tenui terra seri cytissum dicit, propterea quod non multo indiget succo. Columella in quolibet agro, quamuis macerrimo celeriter comprehendere.

Solum.

Cytissus seritur in terra bene subacta tanquam semen brassicæ, inde differatur, & in sesquipedem ponitur. Aut etiam de cytisso duriore virgulæ deplantantur, & ita panguntur in serendo. Varro. At Columella: Satio autem cytissi, vel autumno circa idus Octobris, vel vere fieri potest. Quum terram benè subegeris, arcolas facito, ibique velut ocymi semen cytissi autumno serito, plantas inde vere disponito, ita ut inter se quoquouerfus quatuor pedum spatia distent. Si semen non habueris, cacumina cytissorum vere disponito, & stercoreatam terram circumaggerato. Si pluuia non inceserit, rigato quindecim proximis diebus, simul atque nouam frondem agere cœperit, sarrito, & post triennium deinde cædito, & pecori præbeto. Potest etiam ante Septembrem satis commodè ramis cytissus feri, quoniam facile comprehendit, & iniuriam substinet. Plinius: Seritur cum hordeo, aut vere, semine ut porrum, vel caule autumno ante brumam. Si semine, madidum, & si desint imbres, satum spargitur. Plantæ cubitales seruntur scrobe pedali. Seritur post æquinoctia tenebro frutice. Perficitur triennio: demetitur verno æquinoctio, quum florere desinit, vel pueri, vel anus vilissima opera. Obiterque inter ordines allium, & cepe feri, fertile est.

Omni inuiriā sine noxa patitur.

Cultus.

Cytisso nigra materies ex Theophrasto: & spissa, & proximè ad ebenum accedere videtur. Ab eo Plinius: Nigricans color cytisso, quæ proximè accedere ebenum videtur. Alibi autem: Adicit Hyginus, ne hostium quidem, propter nullam gratiam ligni, iniuriam expauescit. Sed nos quum nigram cytissi medullam inuenire quæreremus, frustrabamur voto, attamen inueteratis,

Materies.



caudicemque crassissimum habentibus mediam partem nigram reperimus, in adolescente vero nequaquam.

*Pabulum.* Equo abunde est viridis pondo, x v bubus pondo vicena, cæterisque pecoribus proportionem virium. Aridum si dabis, parcius præbeto, quoniam vires maiores habet. Prius aqua macerato, & exemptum paleis permisceto. Cytisum quum aridum facere voles, circa mensem Septembrem, ubi semen eius grandescere incipiet, cædito, paucisque horis, dum flaccescat, in sole habeto, deinde in umbra siccato, & ita condito. Plinius. Datur animalibus post biduum semper. Hyeme verò quod inaruit, madidum. Satiant equos denæ libræ, & portione minora animalia.

*De trifolio pratensi, CAP. VII.*

**O**PTIMAM esse in prato trifolij herbam dicit Plinius, omnesque ab eiusmodi præstantia pratense trifolium vocant. Idemque trifolium inhortescere, & folia contra tempestatem subrigere, quod in omni trifolio observauimus.

*Nomen.*

Græcè *τρίφυλλον*, Latinè trifolium. Neapolitani *prato*.

*Genus.*

Trifariam distinctum à floris colore, quippe purpureum, est flore purpureo, album, albicante, & maioribus foliis alterum. Sunt & guttatis, & falcatis superficie foliorum maculis.

Caulem rotundum erigit, cubitalem, ramos exiles, folia per intervalla tria, 10 florem in summo, radicem longam, & lignosam habet. Plinius: vtilissimum simul & herbarum arare, deinde gratire, serere florem ex scænilibus, atque ex præsepibus scæno dilapsum spargere, priusquam gratiantur. Nec primo anno rigari, & cætera.

*De vicia. CAP. VIII.*

**E**PABULORUM genere vicia est, authore Columella, atque agrum sterco- rat, in quo seratur, nec ipsis agricolis operosa. Sed oportet ubi viridem viciam desecueris, aratrum subsequatur, & quod falx reliquerit prius, quam inarescat, vomis rescindat, atque obruat. Id enim cedit pro stercore: nam si radices eius defecto pabulo relictæ inaruerint, succum omnem solo auferent, 30 vimque terræ absument.

*Nomen.*

Græci *βίνα* dicunt, quod semen fortasse lagenulæ effigiem referat, Latini viciam, ut Varroni placet, à vinciendo, quod item capreolos habeat, ut vitis, quibus sursumuersum serpit, ad scapum lupini, aliūve calamum, ad quem ut hæreat, eum solet vincire. Itali *veccia*.

*Descriptio.*

Cubitali assurgit altitudine, foliis aphaces, angustioribus tantum, flore pisii, nigricantibus in siliquis seminibus, vel fuscis, quorum figura lenticularis. Iunio mense floribus, & seminibus prægnans est, humi funditur, & repit. Galenus viciæ semini figuram assignauit non orbiculatæ, sed lenti similem, & fabarum modo longiusculam.



Plinius siccitatem ex omnibus, quæ feruntur, maximè amare, nec aspernari *Calum.*  
 vmbrosa. Cato quam minimè herbosis locis feri iubet.

- Viciæ duæ sationes sunt. Prima quam pabuli causa circa æquinoctium au- *Satio.*  
 tumnale serimus, septem modios eius in vnũ iugerum. Secunda qua sex mo-  
 dios mense Ianuario, vel etiam serius iacimus semini progenerando. Vtraque  
 satio potest cruda terra fieri, sed melius proscissa, idque genus præcipuè non  
 amat rores, quum feritur. Itaque post secundam diei horam, vel tertiam spar-  
 gendum est, quum iam omnis humor sole, ventove, deterfus est, neque am-  
 pliùs proiici debet, quàm quod eodem die possit operiri: nam si nox ince-  
 10 sit, quantulocunque humore, priusquam obruatur, corrumpitur. Obser-  
 nandum erit ne ante quintam, & vigesimam lunam terræ manderetur. Aliter  
 satis ferè limacem nocere comperimus. Hæc Columella. Sed Plinius tria eius  
 sationis tempora dicit, Circa occasum Arcturi, vt Decembri mense pascat,  
 tunc optimè feritur in semen. Æquè nanq; fert depasta. Secunda satio mense  
 Ianuario est: nouissima Martio, tum ad frondè vtilissima. Vno sulco sata, non  
 sarritur, non stercoratur, nec aliud quàm deocatur. Ex semine eius, si lecta  
 matura est, palea cæteris præfertur. Vitibus præripit succum, languescuntq;  
 si in arbusto feratur. Limaces nascuntur in vicia, mirum in modum eroden-  
 tes eam. Viciam non proscisso serere sine damno, compendium operæ est.  
 20 Serere in iugero temperati soli iustum est tritici modios quinque, viciæ duo-  
 decimam partem amplius quàm tritici. Viciam à x x v, ad x x x lunæ diebus  
 ferendam, ita demũ sine limacibus fore. Quidam pabuli causa sic feri iubent,  
 feminis autem vere. Virgilius viciæ tempus sationis docet.

*Si verò viciamq; seres, vilemq; faselum,  
 Haud obscura cadens mittet tibi signa Bootes.*

*De ocymo. CAP. IX.*

- D**IXIMVS simplicia pabulorum genera, nunc mista prosequemur. Erat  
 apud antiquos pabuli genus, quod Cato pabulum vocauit, eoque siste-  
 bant aluum bobus: id erat è pabulis, segete viridi desecta, antequam gelaret.  
 30 Sura Manilius id aliter interpretatur, & tradit fabæ modios decē, viciæ duos,  
 tantundem & eruilæ in iugero autumno misceri & feri solitos. Melius & a-  
 uenagræca, cui non cadit semen, admista. Hoc vocitatum ocymum, boumq;  
 causa feri solitum. Varro appellatum à celeritate proueniendi, à Græco, quod  
 οκνός dicunt. Hæc Plinius. Sed Varro. Ocymum dictum à Græco verbo οκνός,  
 quod valet cito. Similiter quoque ocymum in horto. Hoc amplius dictum e-  
 cymum quod citat aluum bubus, & ideo iis datur, vt purgentur, id ex pabuli  
 segete viride sectum, antequam gerat siliquas.

*De farragine. CAP. X.*

- V**ARRO, Ex segete, vbi satu admista ordeũ & vicia, & legumina pabuli cau-  
 40 sa viridia, quod, far, & ferro cæsa, farrago dicta, aut quod primũ in farra-



cia segete feri cœpta. Ea equi, & iumenta cætera verno tempore purgantur, & saginantur. Columella: Farraginem in restibili stercoreatissimo loco, & altero sulco serere conuenit. Ea fit optima cum cantherini ordeï x modiis iugum, obseritur circa æquinoctium autumnale, sed impendentibus pluuiis, vt confita rigataque imbribus celeriter prodeat, & confirmetur ante hyemis violentiam: nam frigoribus, quum alia pabula defecerint, ea bubus cæterisq; pecudibus, optimè defecta præbetur. Et si depascere sapius voles, vsque in mensem Maiũ sufficit, quod si etiam semen voles ex ea percipere, à Cal. Martiis pecora depellenda & ab omni noxa defendenda est, vt sit idonea frugibus. Plinius. Farrago ex recrementis farris prædensa seritur, admista aliquando & vicia. Eadem in Africa fit ex ordeo. Omnia hæc pabularia: degeneratq; è leguminibus, quæ vocatur cracca: in tantum columbis grata, vt pastas ea negent fugitiuas illius loci fieri. Palladius: Farrago etiam loco restibili stercoreato seritur. Ordeï cantherini in iugero x spargimus circa æquinoctium: & cætera quæ Columella.

*F I N I S.*

INDEX



# VILLAE LIBRORVM XII:

QVI VT PROBA SERIE DIGE-

STVS EST, ITA ET MAXIME GENERA NO-

ratu digniora complectitur.



**A**D DOMINVS, stirpis regia,  
ruri agit pag. 12, verl. 31  
abies, arbor conifera resini-  
feraq, 74, 20 unde dicta  
74, 22 uti describatur à Theophrasto  
74, 28 quot specierū sit 76, 35 qui-  
bus gaudeat locis 77, 12 qua aliā me-  
lior 77, 30 eius satio 78, 4 eius mate-  
ries 78, 12 abies admirationis preci-  
pua 79, 4 abies ab Hercule enulsa 80,  
15 abietis resina 80, 19  
ablaqueatio fossionis species 227, 22 quid  
sit 227, 23 ablaqueatio olineto neces-  
saria 465, 29  
Abrotonos, femina 620, 32  
abrotonum quam vim habeat 620, 17  
unde denominetur 620, 21 quot ge-  
nerum 621, 6 quale solum appetat  
621, 8  
Absyrtus Medea 447, 5  
Academia Athen. situs 9, 31  
Acdestis, qui Aryn adamat 87, 11  
acer, siue aceris, arbor 127, 15 acer ope-  
rum elegantia cedro secunda 128, 9  
acetaria hiemalia 659, 40 acetaria her-  
ba 653, 37. 654, 1  
acetum cōficiendi modi 572, 32 acetum  
quid 572, 38 acetum an aquam ha-  
beat 573, 9 acetum dulce 573, 10  
acetum duplicatum 573, 15 acetum  
commentitium ex non vino 573, 21  
acharnica rigua 636, 16  
Acheron inferorum fluxus 134, 23  
Achillis hasta fraxinea 123, 39

Achilles corona oleaginea donatus  
440, 28  
Achillis sepulcrum 609, 23. 614, 33  
Acilius Sthenelus 5, 36  
acropolis quid 114, 11  
acus moscata 679, 7  
Adamo protoplasta terra cultura à Deo  
mandata 2, 7  
Adamus in deliciarū horto posu<sup>9</sup> 6, 36  
Adami pomum 270, 8  
adolescētia negligentē quem reddit 21, 27  
Adonis Veneri dilectus 584, 37 & 41 à  
Marte casus 585, 1 Myrrha filius  
654, 37 à Venerē lugetur 737, 15  
Adonidis cruor in anemones flore mu-  
tatus 612, 14 Adonidis fabula quid  
denotet 612, 31 Adonidis hortuli ut  
pangebantur 624, 19  
Adorea dea qua 845, 6  
adoreum quid 844, 35  
ador & adoreum 845, 3  
edificiorum rusticorum situs 45, 19  
agilops 160, 14 & eius figuratio 160,  
15  
agilopis descriptio 856, 37  
agis quid 95, 38 agis mellei coloris 100,  
28  
Egypti lanificium 4, 25  
Egyptiana navigatio 14, 13  
Egypti cœlū, caliginosum & rosci-  
dum 582, 38. 587, 39  
Egyptiorum mos in designando sano  
homine 614, 39  
Egyptus qualis terra 752, 28



- Egyptij sacerdotes capis abstinere* 787, 39
- Ælij Spartiani hortus* 12, 4
- enigmata & gryphi, Latinis scirpi & questiones lusoria* 680, 24
- equinoctiū autumnale* 821, 10. 846, 14
- Æsculapij caput lauro redimitū* 114, 2
- æstus adurit olivas* 474, 29
- Æthiopes, Rhiſophagi dicti* 2, 34
- Æthiopie lanifera arbores* 4, 21
- in Æthiopia melones nobilissimi* 758,
- Ætolus Oenei filius* 494, 15 (15)
- Ætolus pastor, Staphylus nomine* 494, 20
- Africa Massyli* 3, 27
- Africanus oleas seuit* 448, 17
- Agamemnonis manu platani consista* 12, 38. 135, 26. 132, 7
- agaricū in glandiferis nascens arboribus* 158, 13
- ager arbutis idoneus quis* 540, 16 *ager bone frugis frigora quoque desiderat* 808, 31
- agri sub ælia duplicis generis* 811, 25
- agrum bene colere quid* 812, 12. 817, 8
- agricola felices* 8, 2 *agricola boni viri* 14, 24
- agricolarum dua meta; utilitas, & voluptas.* 15, 23
- agricola qui liberi, qui serui* 21, 14
- agricultura generi humano per necessaria* 1, 25 *ceterisq; animalibus* 2, 2 *agricultura praefertur mercatura* 5, 5 & *ſænerationi* 5, 6 *agricultura a regibus exulta* 12, 13 *agricultura, ars generosa* 14, 36 *ars ingenua* 14, 39
- agricultura etiam monachis inter honestas artes* 15, 8 *agricultura quid* 15, 18. 16, 8 *agricultura sub Nili simulo* 16, 37
- agricultura laudes & necessitas* 1, 7
- utilitas* 1, 15. 5, 1 *voluptas dignitate commista* 1, 16. 6, 8. *agricultura dignitas* 10, 5 *antiquitas* 10, 7 *agricultura inuectores* 16, 23 *agricultura principia; terra, aqua, animus sol* 17, 31
- agrielaæ, & agrippus* 449, 24
- agrioraphanos alius araphano agria* 776, 12
- Agrippina coniugi venenū offert* 766, 8
- Aiax a Græcis oleaginea corona donatus* 440, 28
- Aiacis cruor in hyacinthum conuersus* 606, 8
- Aiax, regia stirpe ſatus* 607, 20
- alaternus, arbor perpetua fronde* 108, 2
- vi depingatur* 108, 7
- Alcibiades Athenienſium dux* 13, 10
- Alexander Magnus perſea arbore ornatus* 10, 33 *agriculturam docet*, 12, 35
- Alexander ex India hedera coronatus* 638, 20 & 27
- Alexandri ſtatua apud Coos* 591, 10
- Alexandro Seuero victoriam laurus pramonſtrat* 115, 24 *laurus mortem prænunciat* 115, 35
- Alexandrini ſupplīces à Romanis pacem rogant* 441, 20
- alica ſit ex Zea* 848, 18 *trium generum* 848, 21
- alliporum* 802, 22
- allij historia* 798, 3 *allij ſatio* 799, 11
- culius* 800, 12 *allij condimentū* 800, 28 *allium cypriū, ſive vlpicū* 800, 35
- allium punicum* 800, 41 *allium Ægyptium* 801, 28 *allium anguinum* 801, 36 *allium urſinum* 802, 4
- Allobij, inter Sarmatas* 4, 15
- Allobiorum veſtes* 4, 15
- almus, ſylueſtris arbor* 142, 5, *eiſq; hiſtoria* 142, 11
- Alpheus amnis olcaſtris frequens* 449, 2
- altera*



# I N D E X.

- alterationis causa; cœlum, alimentum,*  
*tempus* 837, 10  
*alucaria optima ex subere* 151, 28  
*alui deiectio brassica iuuatur* 716, 10  
*aluus lapathio exinanitur* 744, 14  
*aluꝝ, herba tinctorum* 902, 4  
*amamelis* 167, 3  
*amaraci umbra* 626, 19 *amaraci appel-*  
*lationes* 626, 32 *amaraci & sampsu-*  
*ci non eadem ratio* 626, 37 *ama-*  
*raci descriptio* 627, 8 *amaraci cœlū*  
*627, 19 satio* 627, 25  
*Amaracus Cynara regis Cypri filius, in*  
*sampsum versus* 626, 25. 627, 21  
*amaranthus aut luteus, aut purpureus*  
*609, 11 unde dictus* 609, 27 *ama-*  
*ranthus purpureus* 614, 29  
*amaranthi purpurei nomina* 615, 3  
*delineatio* 615, 11 *species* 615, 16  
*cultus* ibid. 21  
*amarum quidque ex siccitate redditur*  
*749, 9*  
*amasi quomodo ut redamarētur cogno-*  
*scerent* 737, 2  
*ambugia, herba intubacea* 662, 11  
*aminea vites* 499, 29  
*Aminei populi* 500, 34  
*ampeloprasen* 795, 11 *ampeloprafi de-*  
*scriptio* 797, 31  
*Amphiarau fabis primus interdixit* 875,  
*21*  
*amuletū horti, asini caluaria est* 642, 24  
*amurca commentatio* 486, 19  
*Amyclensium ager deuastatus* 502, 31  
*Amycus Bebrycum rex* 117, 11 *cuius*  
*inimulus lauro tegitur* 117, 12 *ē qua*  
*decerptum quid nauibusq; illatū iur-*  
*gia suscitāt* 117, 13  
*amygdali tractatio* 420, 15 *amygdali*  
*forma* 421, 30  
*amygdalorum differentia* 422, 31 *sa-*  
*tionēs* 424, 3 *culturatio* 426, 12 &  
*21 amygdalorum morbi & remedia*  
*427, 26 amygdalarum conditura*  
*428, 20*  
*anacacabea arbor* 168, 35  
*anacacabos loti fructus* 168, 35  
*anchusa nomen unde descendat* 13, 10  
*Androcides sapientia clarus* 562, 12  
*anemones flos* 612, 13 *ex Adonidis cruo-*  
*renatus* 612, 14 *ex Veneris lacrimis*  
*satus* 612, 25 *anemones flore Egy-*  
*ptij quando pingant* 612, 33  
*anemone unde dicatur* 612, 40 *qui-*  
*bus nominibus indigitetur* 613, 2 *quot*  
*generum sit* 613, 11 *ubi proueniat* 613,  
*38*  
*anesum, āmēu* 693, 4  
*anethum unde nuncupetur* 691, 40 *a-*  
*nehi descriptio* 692, 3 *satio ibid.* 20  
*anguria cucumis species* 757, 31 *angu-*  
*ria quadam vaste magnitudinis* 758,  
*4 anguria satio* 758, 6  
*anguilla quando sine aquis duret* 30, 1  
*anicetum* 693, 1  
*anima hominis imperans* 21, 9  
*anima mortuorum in fabis includun-*  
*tur* 875, 28. 876, 9  
*animalia post plantas nata* 2, 3 & 5 *ani-*  
*malia venenosa* 556, 7  
*animantium mutatio* 836, 15  
*animum menta recreat* 705, 7 *item &*  
*nepita* ibid.  
*anisi vsus* 692, 30 *satio* 693, 16  
*anni non semper eadem facies* 18, 36  
*annus non tellus fructificat* 254, 7  
*anithedonis descriptio* 386, 21  
*antidoton contra omnia venena* 628, 20  
*& 32*  
*antiscoridon* 798, 49  
*Antoninus Pius* 12, 40 *tiliaceis tabu-*  
*lis fasciatus* 127, 10



anularis insitionis modus	211, 20	aquifolia ilex coccifera	149, 30
apes hyacintho gaudent	605, 20	Aquila ortus	254, 27
lo pabulantur	621, 36	Aquila, Vestinorum urbs	604, 25
rumicem refugunt	744, 10	Aquilo non omnibus utilis	255, 41
apum ducis officium	25, 4	aquus, olim pro acus	107, 15
apibus thymi flores gratissimi	623, 25	Arabes arbores pro tuguriis habent	3, 31
apibus gratissima satureia	695, 18	Arabum vestes	4, 14
apibus gratum origanon	698, 23	Arabes annuathuris vectigalia pendunt	6, 1
apibus duplex ministeriū prabet papauer	737, 12	Arachosij populi unde agriculturā didicerunt	12, 36
aphaca Theophrasti	663, 23	Aracis fluij accolae plantarum fructus ad cibum reponere	2, 21
aphaca segetalis historia	887, 15	aracus, lentis vitium	884, 33
aphrodes	739, 5	arare, & bene arare	465, 10
aphron	739, 10	aratio	811, 24
utrumque unū idemq, papaueris genus ibid.		in iuxta terre qualitates exercenda	811, 32
apiastrum	633, 10 & 16	aratio prima, quae ante sationem	811, 26
apij historia	682, 23	secunda	811, 40
apium palustre	685, 39	tertia	812, 1
apiū capitatum	686, 14	aratio quarta, quae sementis tempore	812, 1
Apollini ludia Theseo instituta	11, 5	arationū vocabula declarata	812, 14
Apollini laurus dicata	13, 28	arationis ratio exactior per Columellam	813, 11
Apollo myriceus unde cognominatus	121, 5	arationis inuentor	814, 27
quare imberbis fingatur	605, 25	arationis regula	815, 25
apomelis, pyri genus	167, 3	aratrum remoratur vlmus	539, 39
Appulus pastor nymphas irridet	449, 6	aratri inuentores	814, 31
in oleastrum conuertitur	ibid.	aratrum ex qua materia fiat	815, 11
Aprilis Veneri sacer	389, 10	arbor quid	65, 18
apris medicina, hedera	635, 37	arbor paradisi	170, 34
Apulia plurimum thymi profert	624, 21	arbor arbori ut copuletur	219, 16
Apuliae campi fertilissimi	809, 20	arbor sterilis ut fructum ferat	253, 1
aqua villa qua eligenda	37, 37	arbor ut copiosorem fructum reddat	253, 8
aquam inuestigandi ars	37, 12	ne flores aut folia abiciat	253, 9
aquarum fugiendarū signa	42, 18	ne fructū amittat	253, 12
aquarum vitia ut emendentur	43, 15	arbor ut a vitis & vermibus vindicetur	253, 24
aqua vino immista deprehenditur	570, 1 & seq.	arboris cultura perpetua	542, 32
aquosum omne in fundo sedit	566, 25	arbori ut maritentur vites	543, 5
aquifolia arboris nomē	107, 10	arbores terra antiquiores Sardis	2, 8
delineatio	107, 17	arbores & cibos & habitacula praebent	3, 15
insitio ibid.	27	arbores laniferae	4, 17
materies	107, 29	arbores caducae aut resiniferae aut non resiniferae	62, 12
aquifolia	148, 35	arbores pomiferae	



- ferre aut virentes aut frondē remittētes*  
 147, 28 *arbores pomifera sylvestres*  
 164, 35 *arbores arbutinae quae sint*  
 539, 1 § 11  
*arborum herbarumq; fructibus ani-*  
*malia vescuntur & victitant*, 2, 1 §  
 39 *arborum usus ex Cicerone* 4, 34  
*arborum vectigalia* 5, 41. 6, 1 *arbo-*  
*rum sylvestrium genitura, natura,*  
*morbi, physiognomonica* 65, 37 *ar-*  
*borum peculiare morbi* 238, 37 *ar-*  
*borum corruptiones violentae* 245, 35  
*arborum pomiferarum remedia* 252,  
 28 *arborum plantandarū ratio* 541, 1  
*arbutinae arboris formatio* 542, 1  
*arbutinae vitis vide vitis arbutinae*  
*arbutum veteris* 537, 21 *arbuti com-*  
*moda* 538, 1 & c. *arbutū fundo sub-*  
*urbano conuenit* 538, 14 *arbutum*  
*quid* 538, 29 *arbutū quae terra ac-*  
*commoda* 540, 16 *arbutum densum*  
*commendabile; senio confectum, in-*  
*uenustum* 546, 4 *arbutū Gallicum*  
 546, 31 *arbutum Italicum* 547, 3  
*arbuti, arboris sylvestris tractatio* 166,  
 16  
*arbutus & vnedo diuersae* 166, 26  
*arbutus, arbor: arbutum, fructus* 166  
 38  
*arbuti descriptio* 167, 10 *arbuti ma-*  
*teries* 168, 14 *arbuti pomorum con-*  
*dimentum* 168, 17  
*Arcades Balanophagi vocati* 2, 36. 152  
 32 *Arcades primi ex terra homines*  
 152, 24 *ante lunam & astra* ibid.  
 25. & 3, 37  
*Arcadia satyriam & origanum non*  
*fert* 624, 9  
*Archelaus* 13, 3  
*arena humida mustū conseruat* 569, 13  
*argilla alba multum vaporis flatuq; con-*  
*tinet* 454, 17  
*argilla sterilis* 817, 3 *aliis admixta*  
*fertilitatem inuat* ibid.  
*Argippae sub arboribus incubant* 3, 25  
*Arginorum cibus* 2, 28  
*Argus olea Io alligat* 448, 17  
*Aricina vallis* 719, 33  
*arietum cornua contusa asparagum pa-*  
*riunt* 731, 23  
*Arimphaeorum alimentum* 2, 31  
*Arimphaei Asia populi in nemoribus*  
*degunt* 3, 27  
*arinca Homeri* 848, 30  
*Aristeus Apollinis filius* 13, 19. 440, 5  
*deus* 13, 20 *olea inuentor* 440, 6  
*armoracia historia* 776, 1  
*Artaxerxes Sidonem obsidet* 441, 15  
*Artemisia reginae* 13, 12  
*artemisia nomen unde* 13, 13  
*artes omnes agricultura famulantur* 1, 18  
*ars humana urbes aedificat* 10, 14  
*artis & naturae discrepantia* 249, 12  
*artes lucubrationibus perdiscuntur*  
 438, 23  
*arti natura succedit* 555, 19  
*articulatio vitium morbus* 557, 14 *tri-*  
*bui de causis accidit* 557, 27  
*arui stercoratio* 816, 32  
*Arule apud Campanos* 541, 34  
*ari tractatus* 785, 32 *arius cibo idoneus*  
 785, 34 *ari descriptio* 786, 18 *arius*  
*arte ut pertractetur* 787, 1  
*arundo saccharifera* 902, 14  
*ascaloniae capae* 792, 16  
*Asia Arimphaei* 3, 27  
*asia, frumenti genus* 844, 13  
*asini claua, lili probrum* 590, 33 *asini*  
*caluaria alexicaco hortorum* 642, 24  
*asinus Priapo latibilis victima* 642,  
 14 *Liberopatri assignatur* 680, 27  
*asinus cur Baccho assignatus* 746, 11



*asparagus Gallica sativa* 672, 15  
*asparagi percunctatio* 727, 12 *aspara-*  
*ragi condiendi ratio* 727, 23 *aspara-*  
*gi genera* 728, 19 *eorumq; descriptio*  
728, 27 *locus & satio* 729, 1 & 13  
*qua arte asparagi producatur* 731, 23  
*asphaltion* 628, 18 & 19 *quare ita no-*  
*minatum* 628, 22  
*Affyria stella* 564, 19  
*Astomi, India gens, solo odore viuunt* 2,  
24  
*Astomorum vestimenta* 4, 13  
*astrion, inter intubacea* 675, 17  
*astrologia non inutilis ruricolis* 254, 1  
*atabulus Apulia ventus* 475, 9  
*Athene unde nomen traxerint* 438, 32.  
439, 2, 22  
*Athenis in arcem vix capra admissa*  
475, 29  
*Athenienses oleam primi coluere* 439,  
41 *magno in honore habuerunt ole-*  
*am* 440, 17. 442, 11  
*Atheniensium alimenta* 2, 28 *Athe-*  
*nienfium ludi* 11, 15 *Athenienfium*  
*terra à Neptuno inūdata* 439, 32 *A-*  
*thenienfium celebritas* *επισκοπή* dicta  
442, 27  
*athleta oleo se perungunt* 444, 14  
*atinia, ulmi genus* 138, 25. 139, 4  
*Atlantis horti* 257, 27  
*Atlas mons* 4, 28. 257, 23  
*Atlas nouus in agricultura* 1, 24  
*atrplexum veteribus, quod modo atri-*  
*plex* 740, 6  
*atriplex in cibum uti veniat* 739, 34  
*atriplicis nomen* 739, 41 *atriplicis*  
*genera* 740, 8 *delineatio* 740, 12  
*satio* *ibid.* 32  
*Attalis regis horti* 9, 33  
*Attalus Asia rex* 13, 3  
*Atticus ager* 439, 3 & 38

*Attico in solo fructus præter thyntum*  
*omnes dulces* 623, 39  
*Atys fabula* 86, 30. 87, 3, 8  
*aucupii voluptas* 7155  
*auellana descriptio* 428, 34  
*aucna, ordeii vitium* 856, 29 *eiusq; hysto-*  
*ria* *ibid.*  
*aues ne vinas attingant* 562, 2 *aues ve-*  
*castigentur* 801, 40 *quo medio ab*  
*frumentis probibeantur* 826, 19  
*auium modulatio, non minima dele-*  
*ctatio* 7, 27  
*Augustus lactuca conseruatus* 654, 13  
*aurea mala* 267, 29  
*aurelia quid* 609, 35  
*aurum habere præclarum non est, sed iis*  
*qui aurum habent imperare* 12, 22  
*auri apyri unguentum* 609, 22. 610, 8  
*Auster omnibus infestus* 256, 1. *precipue*  
*florentibus arboribus* *ibid.*  
*austrini flatus frumētis damnosi* 808,  
32  
*autumnus & ver sese imitantur* 464, 40  
*autumnus calorem retinet ex pristinis*  
*solibus* 464, 41  
*autumnalis aëris qualitas non dissimi-*  
*lis verna* 547, 39  
*axes querni cum asculeis non miscendi*  
155, 37  
*azadarat arbor* 170, 29 *azadarat qui*  
*seratur* 170, 41

B

**B** *Abylonico agro Isme vulgaris* 598,  
25  
*bacca olearum ne abiciantur* 473, 28  
*baccharis, fascini depulsoria* 631, 21  
*somni conciliatrix* 631, 24 *baccha-*  
*ris etiam τάρχαρι cur vocata* 631, 32  
*baccharis vii describatur* 631, 37 *quo*  
*solo proueniat* 632, 5  
*Bacchus cur inter deos numeretur* 13, 23  
*aquana*



# I N D E X.

- aquam vino primum miscuit* 494, 17  
*Bacchus semper iuuenis* 494, 24 *vi-*  
*ni repertor* 494, 26 & 28 *Bacchus*  
*in Graciam vitem transfert* 494, 33  
*Baccho prior Noe vitem coluit* 495,  
 28 *Bacchus Limneus, a Limnis* 495,  
 31 *Bacchus insanus, ab effectu* 496,  
 2 & *cornutus depictus* *ibid.* *Bacchus*  
*εαφινος* 680, 30 *Baccho assignata*  
*ferula, hedera, picea* 13, 32 *Baccho*  
*cur sacra hedera vide in hedera.* *Bac-*  
*cho hircus immolatur* 494, 30 *smi-*  
*lax dicatur* 618, 28 *asinus assigna-*  
*tus* 746, 11 *Baccho ferula dicata* 746  
 12 *Baccho cur cornua apposita* 814,  
 29  
*Bacoti ilicis similes* 149, 24  
*Balanophagorum nominis origo* 2, 36  
*Balsami tributum* 6, 3  
*Barolum Apulia* 600, 10  
*Basan quercus* 155, 13  
*basilicon, herba* 705, 22  
*batis seu crithmos* 671, 25. 672, 7  
*batuere, idem quod cadere* 106, 21  
*beatior vita rustica nulla* 10, 24  
*belli inter coronarios flores nomen* 610,  
 20 *species* *ibid.* 23 *descriptio* 610, 27  
*solum* 610, 40 *cultus* 611, 1  
*benenoletia obsequetes parit operas* 21, 30  
*Berecynthius, Phrygia mons* 111, 18 *bu-*  
*xo abundat* *ibid.*  
*Beroë anus* 495, 1  
*bestiola horto innascentes* 649, 6  
*beta commentatio* 724, 10 *beta condi-*  
*tura* 724, 23 *beta genera* 725, 3  
 & *delineatio* 725, 20 *beta satio* 726,  
 7 *beta radix allii extinguit odorem*  
 798, 6  
*betici, molles Cynico* 724, 27  
*betizare, pro languere & effæminari*  
 724, 30  
*betula, arbor* 106, 17 *betula arboris ma-*  
*teries ad quæ usum adhibeatur* 106, 34  
*Biges Atheniensis, aratri inuentor* 814, 13  
*bipennula, herba* 669, 31  
*Bislingua, lauri species* 120, 5  
*Bithyni ut arboribus vitem maritare so-*  
*leant* 544, 8  
*bitumen ex arbore betula* 106, 41  
*blattas necandi experimenta* 651, 8  
*blichon, blechon, βανχον* 704, 26  
*bluti denominatio* 741, 7 *species* 741, 10  
*ac satio* *ibid.* 23 *bluti historia* 741, 49  
*Boarmia cur Minerva nuncupata* 815, 6  
*Bœotorum cyathi* 76, 41  
*boleti, fungorum species* 765, 40. 766, 7  
*bombyces unde & ubi nascantur* 4, 30  
*Bona dea myrtum refugit* 389, 12  
*bono viro indecens non est agricultura o-*  
*pus* 10, 18  
*boni viri ex agro solum requisiti* 14, 29  
*bonos viros esse agricolas* 14, 24  
*bonus vir Catoni quis* 14, 33  
*Boreas, Celtarum rex* 81, 37  
*Borea Zelotypia in Pana* 86, 19  
*Boreas Hyacinthum extinguit* 606, 23  
*borrago vetus* 671, 1  
*Bos moris oryza religiosa* 855, 36  
*botryones albi nigriq; ex eadem vite* 553,  
 15  
*bonæ frondium fasciculis pascuntur hye-*  
*me* 2, 7 *boni cibus, glans* 3, 12 *bonum*  
*cornu anum seminibus suam vim ad-*  
*imant* 876, 18  
*Brachmanes sacerdotes* 3, 29  
*brance Gallorum* 845, 16  
*brassica viti inimica* 562, 9. 698, 25.  
 715, 21 *brassica, herba escaria, histo-*  
*ria* 715, 9 *brassica genera* 717, 4  
*brassica qualem cæli statum toleret*  
 720, 37  
*quali solo gaudeat* 721, 2



<i>Brassica confitio</i> 721, 10	<i>brassica cultura</i> 723, 4	<i>apparatus artificiosus</i> ibid. 36	<i>de brassica qua dixerit Theophrastus, Plinius raphano assignavit</i> 771, 6	<i>brenthis Cypriorum lactuca</i> 655, 12	<i>brionia</i> 731, 40. 732, 6	<i>Briza Macedonum</i> 842, 27	<i>bromos, vel bromios</i> 856, 34	<i>bromos sylvestris</i> 857, 5	<i>bromos fertilis</i> 857, 9	<i>bromi tractatus</i> 858, 34	<i>bruma nonnunquam vitem comprehendere</i> 547, 31	<i>bruma vitis non putanda</i> 547, 33	<i>bruscum acerinum</i> 128, 10	<i>brya sylvestris</i> 121, 17	<i>bubula carnes breui ut coquantur</i> 171, 36	<i>bubula lingua</i> 670, 35	<i>bubulci arantis regula</i> 815, 36. 816, 8	<i>Budia cur Pallas appellata</i> 815, 7	<i>buglosson, buglossa</i> 670, 21	<i>bulbi e genere cartilagineo</i> 802, 27	<i>bulbi nil prosunt nisi neruus adsit</i> 802, 33	<i>bulborum conditura</i> 802, 29	<i>bulborum ollam deuorasse: prouerb.</i> 802, 39	<i>bulborum apparatus</i> 802, 40	<i>bulborum genera</i> 803, 16	<i>bulbos ferendi ratio &amp; ars</i> 804, 21 & 28	<i>bulbos querere, prouerb.</i> 802, 38	<i>bumamma Varronis</i> 498, 18	<i>bumasti</i> 498, 15, 20 & 24	<i>bumelia quid</i> 122, 32 & 37	<i>buniadis materia &amp; tractatio</i> 781, 20	<i>buphthalmos</i> 611, 15, & 30	<i>Buxentum, Italiae oppidum</i> 12, 9	<i>abuxo desumpsit nomen</i> 110, 27	<i>buxus, arbor silvestris</i> 110, 22	<i>siluis crepta ibi d. 23</i>	<i>triplici genere</i> 110, 31	<i>quibus locis vigeat</i> 111, 4	<i>quomodo feratur</i> 111, 22	<i>quam producat materiam</i> ibid. 34	<i>Buzigia familia</i> 815, 4	<i>Achryllii efficacia</i> 685, 16	<i>cachrylli significatum</i> 685, 19	<i>cachrys quid</i> 76, 30. 158, 5. 159, 14	<i>Cadusiorum cibi</i> 2, 27	<i>cadenda vii &amp; quando materies</i> 67, 13	<i>caelum cum terra maritatur</i> 16, 10 & 19	<i>caeli electio pro villa comparanda</i> 28, 5	<i>caeli vitia emendandi ratio</i> 30, 26	<i>caelum frumentis habile</i> 808, 9	<i>caelum a caelo differt</i> 809, 1	<i>Caelum Saturni genitor</i> 809, 13	<i>capa suspensa floret</i> 704, 5	<i>capa historia</i> 787, 31	<i>capa genere differunt</i> 789, 26	<i>capas producendi ratio</i> 791, 1 & deinceps	<i>incorruptas seruandi modus</i> 792, 13	<i>capa ascalonia</i> 792, 17	<i>capa Palestina</i> 792, 20	<i>capa fissilis</i> 793, 19	<i>uti feri debeat</i> 793, 26	<i>capa conditura</i> 800, 28	<i>carephillum, cerefolium</i> 668, 33	<i>Casaris imago lauro coronata</i> 10, 36	<i>Casaris triumphus Gallicus</i> 11, 4	<i>Casaris stella</i> 564, 19	<i>Casarum progenies sub Nerone deficit</i> 115, 34	<i>C. Seruilius Hala</i> 12, 15	<i>calabricis historia</i> 174, 30	<i>calaminta, pulegii genus</i> 704, 38	<i>calaminta historia</i> 706, 40	<i>calculos pellendi remedium</i> 687, 21	<i>callidiores sinapi esse</i> 709, 9	<i>calor digestionis autor</i> 877, 16	<i>caltha flos</i> 611, 5	<i>eius nomina</i> 611, 14	<i>descriptio</i> 611, 23	<i>caltha duplex, satina &amp; sylvestris</i> 612, 7	<i>caltha culina</i> 612, 9	<i>campe, eruca</i> 649, 20	<i>Campania solum felix</i> 640, 33	<i>Campania</i> 116
----------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---	--	---------------------------------	--------------------------------	---	------------------------------	---	--	------------------------------------	--	--	-----------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------	--	---	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------	--	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--	---	-------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	---	-----------------------------------	---	---------------------------------------	--	---------------------------	----------------------------	---------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------



# I N D E X.

- nie campus* 846, 1  
*campi Elisi* 4, 9  
*cancris fluminales, sine palupoi, arborum*  
*fructus à lapsu præservant* 253, 16 &  
 25 *cancris sata & arbores à quibus-*  
*cunque bestiis servant illasa* 653, 31  
*Canicula ortus ubertatem quando prædi-*  
*cat* 254, 11  
*Canis æstum umbra arborum leniunt*  
 7, 8 *Canis occasus* 824, 31 *Canis or-*  
*tus* 827, 15  
*Canopus gubernator* 629, 25  
*cantharis in tritico nascens* 823, 40 *can-*  
*tharis frumenta erodens* 825, 24 *ut*  
*prohibeatur* *ibid.* 25  
*capitis dolores lenat pulegiū* 703, 41. 704,  
 1 *capitis dolor ex ferula caulium esu*  
 746, 1  
*Cappadocii Magi Pyrethi appellati* 121, 12  
*capparidis usus & descriptio* 672, 33 *cap-*  
*paris genera quæ vitanda* 673, 25  
*capparidis satio* 674, 7  
*capra fraxineis frondibus nutriuntur* 3, 11  
*capra hominibus diisq; inuisa* 473, 25  
*capra novella sata carpando corrup-*  
*pit* 475, 19 *eius salina fructui vene-*  
*nū* 475, 21 *capra unde nomen sortita*  
 475, 23 *capra Minervæ immolatur*  
*capreolus quid* 504, 4 (642, 22  
*capreoli cur vitibus dati* 538, 35  
*caprisici historia* 171, 6 *caprisicus alba*  
*& nigra* 172, 16 *bifera & trifera*  
 172, 20 *caprisicus nullis obnoxia vi-*  
*tiis* 173, 3  
*caprinum pecus quibus maxime pascatur*  
 108, 11 *caprino morsu infecta vitæ*  
*mendentur* 475, 31  
*Caprotina Romanorum* 171, 23  
*caraba, arbor* 165, 7  
*carbones optimi* 159, 1  
*cardiaca syncoper remediū nasturtiū* 667  
*cardui origo* 732, 14 *cardui sylvestris de-*  
*lineatio* 732, 34 *species duæ* 733, 13  
*cardui efficacia* 732, 20  
*carduus sativus, altilis, aut hortensis*  
 733, 25 *carduus sylvestris, sclarea*  
*nuncupatur* 811, 18  
*caria quid* 106, 25  
*caritatis euentura præsagia* 254, 1  
*Carmani palmis aluntur* 2, 30  
*caro incorrupta æstate corianno servatur*  
 707, 29  
*carpinum, è genere aceris* 127, 11 & 29  
*carpinus ab acere distat* 128, 31 *car-*  
*pinus, Græcis Lysia* 128, 33 *carpini*  
*materies* 129, 10  
*carpophyllos, laurigenus* 120, 22  
*Carthaginenses à Scipione pacem depre-*  
*cantur* 441, 17  
*Carthago Hispania* 587, 36  
*cartilagineum genus quid* 748, 24  
*caryophylli* 599, 4 *unde dicti* 599, 5, 14  
*describuntur* 599, 26 *quotuplices* 599  
 33 *quo cælo gaudeant* 600, 12 *quo solo*  
 600, 14  
*caryophyllorum satio* 600, 16 *culius*  
 600, 28 *ars* 600, 32 (455, 32  
*Cassianus ager olei quā frumenti feracior*  
*Castana Magnesia oppidum* 433, 24  
*castanearum enarratio* 433, 14 *genera*  
 434, 9 *castanearum plantatio* 435,  
 7 *conditura* 437, 1  
*castitatis & sterilitatis symbolū salix* 143  
 25 *castitatē olea præfulē esse* 438, 22  
*casule tam veterum quam nostrorum*  
*populorum* 3, 21 & d.  
*Catiuulcus taxo se exanimavit* 109, 23  
*Catonis spectaculum in theatro* 449, 16  
*caupones caseum & nuces cur apponant*  
 568, 28 (26  
*causidicis absq; artibus felices vrbes* 14,  
*causa caca complurium* 876, 35



<i>Cecrops Atheniensium rex</i>	439, 23	<i>chamacerasus</i>	380, 17
<i>Cedros insula</i>	12, 7	<i>chamadaphne</i>	618, 2 & 10
<i>cedrium Syris quid</i>	95, 6	<i>chamaleon animal innoxium</i>	171, 37
<i>cedrus magna</i>	71, 1	<i>circa caprificos ferum</i>	ibid.
<i>cedri minores</i> 73, 19 <i>ut à maioribus</i>		<i>chamaplatanus</i>	132, 19
<i>differant</i> 73, 22 <i>quot generum sint</i>		<i>Charion, Chremili seruus</i>	14, 30
73, 24 <i>earundem descriptiones</i> 73, 31		<i>Charites, Eteoclis filia</i>	80, 25. 82, 11
<i>quale solum quarant</i>	74, 17	<i>chenosiris Egyptiorum</i>	635, 3
<i>celastrus Theophrasti</i>	119, 36	<i>Chii primò vitem colere discunt</i>	494, 31
<i>cella vinaria</i> 53, 22 <i>cella olearia eiusq,</i>		<i>chondrilla, ex intubacis</i> 662, 36 <i>eius</i>	
<i>torcular</i>	55, 26	<i>descriptio</i>	663, 5
<i>celtis Afrorum, arbor</i>	168, 39	<i>Chremilus, vir iustus</i>	14, 30
<i>Cepheus amnis</i>	601, 6	<i>chreston, ex intubi genere</i>	662, 10
<i>Cephisus &amp; Melas, flumini Bœotia</i> 552, 35		<i>Christi gratia trans Tyberim Roma per</i>	
<i>cerasbalon, seminis genus</i>	876, 21	<i>oleam indicata</i>	446, 24
<i>cerasi historia</i> 357, 7 <i>cerasi species</i> 358,		<i>sibi potusq, variis variarum gentium</i> 2,	
21 <i>cerasi cultus &amp; insitio</i> 360, 9 & 14		5 & d. <i>cibus nomen quibusdam po-</i>	
<i>cerasi morbi &amp; remedia</i> 379, 23 <i>ce-</i>		<i>pulis indidit</i> 2, 32 <i>cibus pinguis siccio</i>	
<i>rasorum conditura</i>	379, 38	<i>corporibus conueniens</i>	810, 1
<i>cerasus pumila</i>	380, 6	<i>cicera, legumen</i>	884, 2
<i>Cerasus, Ponti ciuitas</i>	12, 10	<i>cicerbita Calumella</i>	665, 20
<i>ceratitis, papauarea species</i>	738, 41	<i>cicercula historia</i>	883, 12
<i>cera Tyrrenica</i>	106, 12	<i>ciceris historia</i>	880, 20
<i>ceramnia Ionum</i>	165, 17	<i>Ciceronis exilium</i> 9, 27 <i>Ciceronis aca-</i>	
<i>Ceres terra appellata</i> 10, 15 <i>Ceres inter</i>		<i>demia</i> 9, 40 <i>Cicero lux doctrinarum</i>	
<i>deas currelata</i> 13, 22 <i>Ceres, siue Geres</i>		<i>altera</i>	33, 18
16, 27 <i>Ceres dea frugum</i> 807, 17		<i>Cicerones, à cicere</i>	869, 10
<i>Saturni &amp; Opis filia</i> 807, 18 <i>unde</i>		<i>cichorium Egyptium</i> 660, 14 <i>cichori-</i>	
<i>nomen indepta</i> 807, 20 <i>Cereris sacra</i>		<i>um, intubus siluestris</i> 662, 9 <i>cichori-</i>	
807, 37 <i>Ceres Siculi Sicilia regis u-</i>		<i>um, duum generum</i> 662, 13 <i>cichori-</i>	
<i>xor</i> 808, 3 <i>Ceres aratri &amp; ferramen-</i>		<i>um, seu chondrilla</i>	663, 1
<i>torum rusticorum inuentrix</i> 814, 39		<i>cicla unde deuocetur</i>	724, 40. 725, 1
<i>ante Cererem frumenti usum morta-</i>		<i>ciconia austris se non committit</i> 29, 40	
<i>lubus innotuisse</i>	815, 9	<i>ciconie noctuas platani foliis abigunt</i>	
<i>cerenisia Germanorum</i>	731, 37	130, 35 <i>item &amp; vespertiliones</i> 131, 1	
<i>ceruus roboris species</i> 160, 12 <i>cerri mate-</i>		<i>ciconia origano aduersum venenosa</i>	
<i>ries</i> 160, 35 <i>celeriter marcescit</i> 161, 6		<i>munitur animalia</i>	698, 27
<i>ceruis phalangium exitiale, ceruis saluta-</i>		<i>Cimon academiam exornat</i>	9, 31
<i>re</i> 635, 35 (ualefcit 443, 25		<i>cinara, seu carduus hortensis</i> 733, 25 <i>ci-</i>	
<i>ceruus agrotas, olea ramis mansis con-</i>		<i>nara ut in cibum veniat</i> 733, 30. 734, 3	
<i>charephyllon, charesfolium</i>	668, 21	<i>cinara nuncupatio</i> 734, 6 <i>descriptio</i>	



# I N D E X.

734, 27 cinare genera	735, 12 satio	Commodus Imp.	14, 17
735, 32 cultus	736, 13	concordia per malum punicum demon-	
Cinesias poeta Græcus	127, 7	straito	397, 33
Circe, solis filia	13, 24	condimentaria herbe	682, 22
circos, accipitris genus	655, 25	conditina mala qua Varroni	450, 17
Cithonia festa	606, 22	confinem vicini fundum, olea refert	
citrigo 633, 17 à melissophyllo distincta		463, 35	
ibid. 25		Conilos, herbe cunila inuentor	699, 17
citreolus modernus, veterum cucumis		coniuratorum nomina in tabulis tiliaceis	
751, 23		scribi solita	125, 23
citrus, citrius, citreum	259, 28	Constantinopolitani climatis frigus ma-	
Citrus puer saltans	636, 1	ximum	722, 23
cinica corona	152, 36	continuatione nature qualitates mutari	
ciuitates in Iouis tutela	153, 2	840, 33	
clana, an idem quod talea	189, 15	contrariarum appetentia & in terra &	
clauicula vitium	538, 36	in seminibus	819, 13
clauum olea patitur	474, 15	conuiuantium corona	11, 26 & 27
Clearcus Heracleota, Ponti tyrannus		conuoluolus ne fiat in vinca	561, 6
259, 4		conuoluolus, herba	591, 26
clematis daphnoides 617, 37 eius nomina		corianni enarratio 707, 28	
68, 1 descriptio 618, 11 solum ibi. 20		tio & cultus	708, 10
Cloria dea	845, 5	Cornelius Cethegus mustum rutatum po-	
Cloris nymphea	582, 9	pulo dedit	710, 19
Clymenus rex	13, 9	cornu ceruinum, herba	675, 19
clymenus unde nomen indipiscatur	13, 9	corollaria	580, 24
cœna nasturtio inchoatur	667, 6	corollarum usus & inuentores	580, 17
ex Cocco tributum qui soluant	6, 4	corona laurea 10, 36. myrtea 11, 3 ci-	
Codiculi qui sint	538, 36	treea 11, 4 Deliaca 11, 6 oleaginea	
cognomina ex arboribus imposita	11, 34	11, 10. 12, 15 pinea 11, 16 corona	
Co, insula bombycibus clara	4, 30	ex apio 11, 17 ex lauro, & hedera 11,	
coitum stimulat satureia	696, 25	18 frondea 11, 26 coronahederacea	
collimida quid	451, 12	11, 27 coronaroseacea 11, 28 corona	
color hyacinthinus 605, 40 ianthinus		ex philyra 11, 31 corona pinea apud	
606, 2 colossinus	617, 32	Isthmos 87, 39 corona iligna post-	
columba egrotans lauro sibi medetur		ponitur ei quæ ex esculo sit 147, 32.	
113, 28		152, 33 oleaginea 440, 18. 580, 28	
Columella notatur 460, 4 Columella &		obsidionalis 580, 29 cinica 580, 31	
Plinii conciliatio	837, 21	myrtea 580, 34 pardina 580, 38	
colytea arbor 108, 30 eius natura & qua-		corona inuentum	580, 26
litas	ibid. 33	corona myrtina 389, 39 corona unde di-	
comitialis morbus	692, 38	ta 580, 20 corona ludicra & puellarum	



# I N V I L L A M

580,39 corona iudupidis	581,17	Cræsus Lampsacenis ut pinum se eos ex-	
Corona occasus	820,20	cisurum interminatus	88,8
coronamentis cur flores inserti	581,14	crotona, olea infesta	442,12
coronarum sola varietate placentium		cucumer annuam non sentit naturam	
duo genera	581,18	755,7	
coronopus, intubacea herba	675,10	cucumerarii ingressus	748,22
corpus hominis ut instrumentum	21,10	cucumerem pracoquem ut habeas	
corporis vita, anima idolum	601,12	753,23	
corruda asparagi genus incultū	727,33	cucumerē toto anno ut habeas	754,10
corruda sylvestris asparagus	728,18	cucumeres aque amantes	753,10
cortex vitis pars vitalis	548,16	cucumeres oleum odere	753,10 & 21
corticis ablatio	247,8	ut maneant illasi	757,23
corylum vitis odit	562,22	cucumerū satio	751,35
corymba, corymbion	616,3 & 5	cultus	752,37
corymbia 636,3 & 16 corymbia & co-		cucumerum artificiosa aliquot expe-	
rymbiferula	745,39	rimenta	753,23 & dein. cucumerum
cosmosandalos, Hermionēsiū flos	606,20	conditura	757,13
cotinos, & cotinodis	449,21,23	cucumeribus solum cōueniens	751,28
Cotinusa Hispania unde deuocata	449,	cucumis in cibum uti veniat	748,33
cotinus, siue oleaster	12,6	cucumis historia	748,29
Cotinusa insula	12,6	cucumistoni- trum conuertitur ibi.	30
cotoneorum malorum historia	270,20	cucumis &	
coturnicibus veratrum noxium	388,2	cucumer unde nuncupatus	749,16
myrtus salubris	ibid.	cucumis satini descriptio	750,16
crambidion Farronis	771,25	cucumis humidus frigidusq;	750,20
crambus, vuarum morbus	558,12	cucumis silvestris	751,1
Crana Arcadie	77,13	asininus	751,8
crapulam sedat brassica	715,38	cucurbitarum sationes	761,37
crapula quid	716,19	ars	762,
diuersa	716,20	23 conditura	763,31
crassiuenum, aceris genus	127,25	culices unde gignantur	565,37
Creta cupresso abundat	83,15	566,	
turiginosa & uliginosa	454,33	16 culices ne oleribus noceant	650,35
crethmos Plinii	672,14	651,1	
crithmi seu batis historia	671,25	culminia bacca	452,1
Crocus iuuenis	603,17	culminiana olea	451,41
603,24 descri-		cultus terra necessarius	223,12
ptio	603,28	terra utilis	223,26
genera	604,1	cuminum, herba condimentaria	693,38
604,10 satio	604,27	cumini genera	694,9
croci conditura	605,	delineatio ibi.	
1 croci color, quolidie acrior	605,5	16 satio & morbi	695,1 & 9
croci probatio	605,9	cunila duo genera	695,32
		cunila quan-	
		do feratur	697,20
		& quomodo cola-	
		tur ibid. cunila quibusdam origanos	
		699,12, & 16	
		Cupidinis delineatio	584,33
		Cupressus	



- cupressus Plutoni consecratur* 13, 32 *cu-*  
*pressus unde originem traxerit* 80, 37  
 81, 3 *Diti ob suā naturā sacra* 81, 7 &  
 20 *in cœmiteriis feritur* 81, 21 *etiā in*  
*patibulo ibi. eiusdē varius usus* 81, 20  
*cupressus feralis & luctuosa* 81, 20 &  
 37 *cupressus quid Vespasiano porten-*  
*derit* 81, 40 *mortis ostentum Imp. Se-*  
*nero* 82, 3 *inimica viti* 82, 6 *cupressi*  
*nomina* 82, 10 *descriptio ibid.* 18  
*genera* 83, 9 *cælum* 83, 15 *satio* 83,  
 41 *insitio* 85, 14 *materies* 85, 19 *cu-*  
*pressi resina* 86, 9 *cupressus Cretica,*  
*seu Sabina.* 120, 30  
*cupressum odit vitis.* 562, 25  
*cupressorū silua quæstuosissima* 5, 33  
*Cyanus flos* 614, 1 *blaptisecula ruribus*  
 614, 9 *delineatur ibid.* 14 *hortensis*  
 & erraticus 614, 20  
*cyathi Bæotici* 76, 41  
*Cybeles currui leones adiuncti* 13, 25.  
 223, 22 *Cybeli pinus sacra* 13, 33 *Cy-*  
*bele deūm mater* 86, 26 *turrita unde*  
*cognominata.* 87, 14  
*cyclaminus* 617, 4 *in omnibus domibus*  
*seruanda* 617, 6 *unde nominetur*  
 617, 12 *cyclamini descriptio* 617, 24  
 solum 617, 35  
*Cyclopus cibi, fructus sponte provenien-*  
*tes.* 2, 18  
*cydoniorum insitio.* 273, 5  
*Cyllenum promontorium.* 77, 21  
*Cymesium terra a rege exculsa* 12, 37  
*Cynæ arboris frondes vestium vice Ara-*  
*bibus.* 4, 14  
*Cynea legati facietē dictū in austeriorem*  
*vinigustum.* 538, 11  
*Cyparissa ciuitas.* 12, 10  
*Cyparissa, Borea filia amissa* 81, 37  
*Cyparissa, ignes prodigiosi* 82, 14  
*Cyparissus, Telephi filius* 80, 29 *eius*  
*historia poetica* *ibid.*  
*Cyrenaicus succus* 555, 13 *Cyrenaicum*  
*lac* 555, 13  
*Cyrenei horti* 9, 33  
*Cyrene nympa* 13, 19 *eius filius Aristeus*  
*ibid.*  
*Cyri Persarum regis solertia* 12, 14  
*Cyffos adolescens in hederam conuersus*  
 634, 13  
*cythisi fruticis historia* 910, 13  
 D  
**D** *Ætoli intervites numerantur* 499,  
 17 *unde dicantur* 499, 20  
*dæmones laurum oderunt* 113, 33  
*Daphne, Asia vrbs, Daphnitis & Da-*  
*phnusa* 12, 11  
*Daphne, palatium Romæ* 114, 8  
*daphnitis, e laurigenere* 120, 22  
*Darius Persarum rex* 10, 33  
*David Palaestinum gigantem interficit*  
 12, 4  
*decacuminatio* 248, 9  
*decussis quid.* 197, 12  
*defectus emendatur supplemento.* 810, 2  
*defrutum coquendi ratio* 570, 26  
*deliratio unde deuocetur* 822, 28  
*Delphica platanus a quo confita* 12, 38  
*Delphica laurus Apollini dicata* 115, 9  
*Delphicum templum e lauri ramulis*  
 115, 3  
*Delum appulit Theseus.* 11, 5  
*Democritus Abderites philos.* 9, 35 *De-*  
*mocritus, agricolarum sapientissimus,*  
*terram cælo maritat* 16, 19  
*Demosthenes plus olei quàm vini absum-*  
*psit* 438, 27  
*dendrogalenum vinum quoddam Bithy-*  
*nia* 497, 26  
*densiora frigori obnoxia.* 474, 26  
*dens leonis* 664, 4 & 21  
*dentium remedium* 676, 4



deorum simulacra ex subere primum cō-	Dodona quernum nemus	153, 21
fecta 151, 26 dein ex palma 151, 27	dolia quo tempore aperienda	568, 29
deorum corona 609, 18 & 28	de dolichis	891, 29
Deucalion 494, 11	doliorū musto cōdendo preparatio	566, 7
Deus tertia die pomiferum lignū, sexta	domini assidui dinitia	5, 13
produxit animalia 2, 4 Deus primo	domus priscorum hominū	3, 21
homini deliciarum hortum destina-	domus patrisfamilias rustica urbana	
vit 6, 16 Deus incrementū dat 6, 23	47, 8 domus villici, servorum & ani-	
deuteria an vina dicenda 565, 38 deu-	malium 48, 34 domus fructuaria	
teriarum tria genera 565, 40	50, 26	
Diana nemorum dea 68, 35	domus ab arboribus tribuuntur 3, 15.	
Diana Ephesia simulacrum an viti-	4, 10	
gineum, an verò ex ebano 579, 6	dos filiarum, plantaria	5, 35
dictator creatur Cincinnatus in agris de-	draco hortensis, herba	681, 39
gens 12, 23	dracōnes, Græcis cucumeris species 757,	
Didymi error 553, 21	28	
dies felicibus operibus apti 18, 20	dracunculus 786, 16 & 35	
dij agrestes 8, 16	Drepani nominis ratio 809, 15	
diligentia inimicissimum vinum 22, 39	Druide Gallorum magi 3, 30	
diminuta, vere crescunt 796, 15	drupa, veterum cibus 2, 23	
Diocletianus ruri agit 8, 1 Diocletianus	drupa quid 446, 39. 478, 13	
in agris consenscit 12, 26 olea ma-	druparū vermiculatio 472, 12 & 23	
nibus suis consita imperio præfert 12,	Drusus Caesar 721, 40. 727, 37	
29	drus Græco Latinum verbum nullum re-	
Diogenes Cynicus 153, 15. 724, 27	spondet 147, 20	
Diomedis delubrum 132, 28	E	
Dionysius hederaceam instituit coronam	Ebori vindicando à carie oleum con-	
11, 27 Dionysij maioris tyranni hor-	ueniens 443, 18	
tus 12, 39	ebrietas saltem semel in mense permissa	
Dionysius, qui & Osiris 16, 24 Dio-	492, 36 ebrietatem arcet crocus 603,	
nysius vitem primus plantavit 494, 37	9 ebrietas absque vino inducitur he-	
Dionysius Semele genitus 494, 38	derà 634, 30 brassicà caneri potest	
Dionysius, Ioue ac Proserpina vel Ce-	715, 32. 716, 36 in ebrietate peccatum	
rere satus 814, 27 boves primum ad	leni reprehensione castigatur 746, 20	
aratrum iunxit 814, 28	ebrii poeta meliores 492, 20	
disciplina lucubrationibus addiscuntur	ebriis myrtea corona convenit 389, 41	
438, 23	echij nomen 13, 10	
Dis mortuorum deus 81, 7 & 13	echini marini plenilunio angētur 748, 32	
divinatio in somnis per lanrum præbetur	elæa callistephanos quid 449, 15	
13, 29	elæm quid 74, 24	
diuturnitatis specimen quercus 153, 6	Electior, solis nomen 137, 36	
	elæo-	



# I N D E X.

*elaostaphylos* 554, 14  
*electrum* quid vocemus 137, 35 unde  
 ortum 138, 4 *electrum* paleosa & le-  
 nia attrahit 138, 10  
*elelispachos* 713, 30. 714, 3  
*eleoselinon* 683, 3. 685, 41  
*elephas* oleastro sibi medetur 449, 19  
*elephantes* odore sagacissimi 758, 16  
*Elico Heluetius* 443, 37  
*Eliochryse* nymphe 609, 37  
*Elisij campi*, deorum sedes 4, 10  
*ἐλμύχιον* quid 615, 28  
*Empedocles* igneam statuebat animam  
 113, 35  
*emplastratio* quid 210, 2 cui arborum  
 generi idonea 210, 17  
*ensis*, floris nomen 608, 1  
*Epaphus* Phaetonti molestus 138, 39  
*epimelides* 167, 5  
*Epimenides* Phaeſtius 442, 21  
 Soloni in multis adiutor 442, 22  
*epithellis* 793, 41  
*epithymbra* quid 697, 27  
*epithymum* florem esse 697, 25  
*equapium*, ἰπποσίλιον 687, 1  
*Equensis* ciuitas 108, 21  
*equi caſtrati*, cantherij appellantur 855, 1  
*Eridanus* amnis Padus dicitur 137, 35  
*erigeron*, sine ſenecio 664, 20  
*Erinon*, Dorica vrbs 171, 41  
*eruca* varium genus 474, 38. 475, 3 a  
 vitibus quibus abigatur 561, 35 eru-  
 cac auertendi modus varius 649, 10  
 & ſeq.  
*ernca*, herba, hiſtoria 665, 34  
*eruilia* 879, 10 *eruilia*, an cicera 884, 5  
*erui* vitium phalangium 823, 40. 889,  
 25 *erui* tractatio 888, 8  
*eryſimon* cereale 868, 1  
*esculus* unde nomen adepta 2, 37. 161,  
 10, 16 Ioni ſacra 161, 12. 13, 26

*esculi hiſtoria* 161, 7 *esculi materiei*  
*uſus* 162, 6  
*escuaprius*, postmodo ernca dicta 666, 16  
*Eteoclis* filia, Charites 80, 25  
*Eubolus* coningem ob appoſita lactucam  
 inceſſit 654, 41  
*euentari* 825, 35  
*euphorbium* à Iuba denominatur 13, 9  
*euphroſynum*, bugloſſon 670, 31  
*Euribiades* oleagineam coronā à Gracis  
 accipit 440, 30  
*Euripidis* mater filiiq; ſungorū eſu mor-  
 tui 764, 4  
*Euriſthenes*, Arginorum rex 258, 7  
*Europa* ſub platano à Ioue compreſſa 131,  
 19 *Europa*, narcifſos carpens 601, 14  
*Eurotas* fl. cur Apollini ſacer 114, 36  
*Eurus* lenis 7, 19  
*exercitatio* ἑκαστοῦ μύης 14, 8  
*exercitus* loti fructibus alitur 169, 8  
*exigua* facilius ſuū arripiunt ſine 694, 19  
*exilij* tolerandi ratio 9, 27

## F

**F** *Aba* Græca 168, 36 *Syriaca* 168,  
 38 *fababaccas* olea a lapſu præſer-  
 uat 473, 28 *fabacru*da alliij fætores  
 tollit 798, 7  
*fabacui*ſque commentatio 869, 1 *fa-  
 ba* conditura 874, 38 *fabaquadam*  
*annorum* cxv. 875, 10 *fabare*ſfri-  
 na dicta 876, 12  
*fabaflo*s lugubribus literis 607, 3  
*fabain* lolium non mutantur 837, 5  
 licet cum tritico ſerantur ibid. *fabæ*  
*coctiles* & incoctiles 876, 17  
*fabarum* cibus interdictus 875, 21  
*fabarum* imbecillitas 877, 34  
*Fabij*, à faba 869, 10  
*fabulum* idem quod faba 869, 25  
*facilitas* propiores habet principiis ſuis ſi-  
 nes 694, 20



- factus quid* 453,4  
*fagus Lydis* *μῶσις* dicta 12,5 *fagus Lati-*  
*norum* 163,15 *viperanocua* 163,19  
*quos generum* 163,23 *ubi proueniat*  
 164,7  
*fagi glandifera duo genera* 159,29  
 & 38 *fagi urbana descriptio* 159,41  
*materies* 160,3 *prouenit in cultis*  
 160,10  
*falx, lani infigne* 16,31 *falcis vineati-*  
*ca figura* 528,7  
*Falernus ubi modo* 500,34  
*far, frumenti genus* 844,29 *Zea prepo-*  
*ponitur* 844,36 *far facticium* & *na-*  
*turale* 844,36 *far triticeum* & *hor-*  
*deaceum* 844,38 *far quid* & *unde*  
*denocetur* 845,1 *far Campanū nulli*  
*simile* 845,28 *far ex olera fit* 849,12  
*farris vsus apud Roman.* 845,5 *satio*  
 845,9 *genera* 845,12 *solū* 845,31  
*farnus glandifera arbor* 163,2 *eius de-*  
*scriptio ibid.* 5 *species* 163,11  
*fascinationis amuletum, ruta* 710,23  
*Fanonius aliis noxius, aliis utilia* 255,41  
*febriles astus coronis arciti* 627,38  
*feculentum omne in fundo fidit* 566,25  
*feles calaminta delectari* 707,7  
*feminarum calceatus* 4,16  
*ferie propter fructus institute* 254,30  
*feriarum vices omnia volunt* 546,27  
*ferramentarustica à Cerere inuenta* 814,  
 38  
*ferrum oleo remollitur* 443,27 *recru-*  
*descit aqua* 443,28 *a magnete tra-*  
*hitur* 798,8  
*fertilitatis olearum prenotiones* 470,28  
*fertilitas nimia oleis nociua* 472,3 *fer-*  
*tilitas olea qua ratione inducenda* 472,  
 40  
*ferulacei generis species* 747,26  
*ferulago* 681,26 & 31. 747,28 & 32  
*ferula Baccho sacra* 13,32 *ferula, lignum*  
*non lignum* 680,26. 746,35 *feru-*  
*la asinis pabulum, ceteris iumentis ve-*  
*nenum* 680,27. 746,10 *ferula impe-*  
*rij nota* 746,23 *quo modo in cibū ve-*  
*niat* 746,36 *unde dicta* 747,6  
*ferula descriptio* 681,11 *ferula semē,*  
*Italia cibus* 745,38 *ferula caules ca-*  
*pitis dolorē gignūt* 746,1 *ferula pra-*  
*paratio* 746,2 *ferula delineatio per*  
*Theophrastum* 747,10 *per Plinium*  
 747,18 *per Portam* 747,21  
*ferula cibo cōmendabiles* 680,2 *quo-*  
*modo condiantur* 680,7  
*ferula ignis asseruatur* 746,41. 747,2  
*ferularū attritu ignis excitatur* 747,4  
*festuca aliquibus, auena* 856,34  
*fici umbra viti infesta* 541,18  
*de ficu, eius inuentione* & *laudibus* 300,  
 1 *ficu natales loci* 312,26 *ficus sa-*  
*tio ex semine* 314,1 *ex viniradice* 314,  
 15 *ficus satio ex propagatione, auni-*  
*fione, ramo* 315,31,37 & 40 *ficus sa-*  
*tio ex talea, ex sarculo* 316,15 & 23  
*ficus insitio* & *culius* 317,12 & 27  
*ficus morbi* & *remedia* 319,38 *ficu-*  
*um conditura* 325,9 *ficus Aegyptia-*  
*ca* 165,10 & 18 *ficus* & *caprificus*  
 differunt 171,9 *ficus fatua* 172,1  
*fides sinapi assimilata* 710,14  
*Filisci adhortatio de tolerando exilio* 9,  
 26  
*simeta ut immunia fiant à serpentibus*  
 156,22  
*simioleribus maximè idonei* 645,28 *o-*  
*leribus incommodi* 646,1 *simorum*  
*optimi qui* 817,9  
*fistula unde reperta* 7,20  
*flagelli descriptio* 815,23  
*flamen Dialus attactu hedera piaculum*  
*committit* 634,20 *flamen faba non*  
*vesci-*



# I N D E X.

- vescitur* 876, 10  
*flatibus* *Stractus* & regio tota infestatur  
 251, 11 *flatus* alij aliis prestant 255,  
 34 *flatus* oleas adurunt 474, 29 *fla-*  
*tus* regionib. quibusdā proprij 475, 8  
*flatus* frumento officiant 825, 30  
*Flora*, dea *florum* 582, 1  
*Floralia* 254, 31. 582, 4, 11 *floralia*  
*feria* *Flora* instituta 824, 22 quando  
 ibid. 32  
*flores* quotuplices 580, 9 *florum* corona-  
 riorum generatio, cultusq. 583, 17 *flo-*  
*rum* excelsitas maxima in lilio 591,  
 21  
*flostiferi* prouentus 600, 7  
*fœcunditatem* oleis adferendi medium  
 473, 7  
*fœmina* quando pariat 836, 6  
*Fœneratio* vilior agriculturâ 5, 6 *illicita*  
 ibid. *fœneratio* cum terra 5, 9  
*fœnerator* quadrupli cōdemnatur 5, 8  
*fœniculi* historia 689, 36 *fœniculum* ut  
 feratur 691, 14 & ut semina dulcio-  
 ra ferat ibid. 30 *fœniculum* Roma-  
 num 693, 4  
*fœnum* *cordum* 672, 13  
*fœnum* *græcum* 901, 7  
*foliis* etiam satio fit 192, 24  
*formica* ne vitem ascendat 561, 23 *uti*  
*fugentur* 651, 19  
*fortitudinis* symbolum *quercus* 153, 6  
*Fortunate* insule 747, 15, 36  
*forum* *Cæsaris* *Roma* 169, 38  
*fossio* terra quid & quotuplex 226, 39  
 & 40  
*fracibus* *olearum* dulcescunt *allia* 800,  
 23  
*fraga* gula oblectamenta 748, 3 *Gracis*  
*incognita* 748, 7 duplicis generis  
 748, 9 quomodo conserantur 748,  
 16  
*fraxinus* 122, 9 qua fabula prisca ibid.  
 11 eius genera 122, 29 ubi nascatur  
 123, 12 qua materie & quam utili  
 123, 32 *fraxinus* florida, donū nu-  
 ptiale 124, 21 *fraxinus* capris omi-  
 busque pergrata 539, 6  
*frigiditas* humorem eximit 452, 27  
*frigoris* vis terrâ excoguit 646, 30 *fri-*  
*goris* effectus 808, 33  
*frigus* densis magis infidet quam raris  
 474, 26  
*frondea* corona in cōiuiis 11, 26  
*frondium* fasciculis hieme pecora pascun-  
 tur 3, 7  
*Frondeus* miles 11, 41  
*fructus* simul miscēdi per insitionem me-  
 dia 220, 30 *fructibus* venenum ca-  
 pra salina 475, 21  
*fructuū* peculiare morbi 240, 8 *fru-*  
*ctuū* quidam partem imam cur supe-  
 riori amariorē habeant 749, 4  
*fructibus* sponte prouenientibus homi-  
 nes quosdam vinere 2, 10 & 18  
*frumentacea* genera 806, 28  
*frumenti* genera 827, 35 *frumenti* con-  
 ditura 833, 27 *frumenti* generum in  
 alia mutationes 837, 8 *frumenti* vul-  
 garissima genera, *tritici* & *far* 844,  
 28  
*frumento* tribus temporibus à ventis  
 nocetur 825, 35  
*frumentorum* alia *frumentacea*, alia  
*χῆδορα* 806, 26 *frumentorum* alia  
*hyberna* 807, 1 alia *astina* ibid. 3 *fru-*  
*mentorum* qua aliud in aliud muten-  
 tur 843, 5 *frumentorum* fastigia duo;  
*tritici* & *ordei* 850, 9  
*frumentis* cœlum conueniens 808, 9  
*frumentis* solum commodum 809, 25  
*frutex* quid 65, 20  
*fuci* occasio in arboribus 473, 25



# I N V I L L A M

fulguris noxam à vino quid dimoneat 571, 29  
fulmen in ilicem frequenter fertur 148, 2  
fulminis miracula per cacas quasdam causas 769, 5  
fulminum pra metu laurea adhibetur 113, 15  
fundus suburbanus arbutum expetit 538, 14  
fungi probatissimi & noxij 156, 16 fungi in roboribus nascentes 157, 20  
illi 766, 19 & 29 farnei 766, 20 amanita 766, 12 piperites 767, 2 circa arbores nascentes 767, 11 fungiverno nascentes genere 767, 33 fungi quos ars reperit 768, 6  
fungum olea patitur 474, 15 fungorum locus & explanatio 764, 1  
fungorum genera 765, 7 fungos coquendi observationes 764, 11  
fur dupli condemnatur 5, 7 fusterna quid 98, 32, 36

## G

**G**ader Hispania ciuitas 449, 21  
quondam Tartessum, & Continusa ibid.  
Galatia Asiatice 621, 13  
Galenus regiones hybernas peragrans omnes 847, 38  
Galerius 12, 28  
galle ad coria utiles 154, 8 galla nigra & candida 156, 37 galla resinosa 157, 2  
galla deterrima 157, 34 galla esculi 161, 2 & 36  
Gallicum arbutum, siue rumpotinum 546, 31  
Galli ceteri in Italiam primo transiuerint 443, 36  
Gallorum magi Druidae 3, 30  
gallinacei ne uinas attingant 562, 3  
gallina fabarum esu steriles euadunt 876, 15

Garganus mons thymo scatet 624, 21  
Garilianus fluvius 632, 2  
gastera, rapa Lacedamoniorum 778, 33  
Gebanitarum regibus Arabes pendunt 6, 2 item Sabaei 6, 3  
gelu facile oleam adurit 474, 24  
genera quae facile transmutentur 842, 14  
generosa animalia 14, 38  
Gentiana à Gentio inuenta 13, 6  
Gentius Myricorum rex 13, 7  
Geometria 19, 3  
geranion Plinij 679, 9 & 13  
Dioscorid. 679, 17  
è Germania sifer Romam allatum 785, 3  
Germanorum vestimenta ex plantarum corticibus 4, 15 Germanorum brasisica optima 720, 39  
germinare an quapiam terrâ non contenta possint 520, 57  
germinatio arborum quando conspiciatur 75, 9 germinatio prima ut debilis, ita deterior 796, 17  
Geryon rex 718, 28  
gethyi historiae 793, 35  
gethyllis 793, 40 gethyllis rapi magnitudine 795, 6 gethyllis quid 795, 14  
gethyon quali forma depingatur 794, 7  
quomodo feratur 794, 17  
gladiatores ordearij 850, 13  
gladiolus, flos coronarius 607, 36 eius appellationes 607, 40 descriptio 608, 5  
ubi plurimum nascatur 608, 23  
gladioli vagum nomen 608, 21  
glandaria filua 147, 6  
glandifera arbores an generali aliquo comprehendantur nomine 147, 20  
glandifera arborum inter felices numerata 147, 24  
quadam aeterna coma pubescent 147, 25  
quadam caluescentes ibid. 26  
glandifagi, Arcadium cognomen 152, 39

glans



glans, bonum cibus 3, 12 quercus obsceni-  
zatem refert 153, 13 glans dulcissima  
153, 35. 154, 7 maxima 154, 13 o-  
ptima & grandissima 156, 19 glans  
cerrea 160, 26 fagea 163, 39 omnium  
dulcissima ibid. 40  
glandis honos custoditus 152, 34 glan-  
dis nomine omnium arborum fructus  
contineri 250, 10  
glandes nutritrices inopis ac fera sortis  
147, 11 glandes multarum gentium  
opes 147, 12 panis vice subeunt 147,  
14 secundis mensis in Hispaniis sub-  
eunt ibid.  
glutinum abdicat robur 159, 19  
Gnosiorum cupresseta 83, 29  
gongri oleam infestant 447, 10 quo alio  
indicerentur nomine ibid.  
Gordianus senior 9, 23  
gorphia Syrorum que ligna 457, 39  
gossipium lini genus 900, 1  
Græce vanitatis exemplum 253, 3  
Græcie sterile solum 182, 2  
Græci oleagineam coronam Achilli &  
Aiæci donant 440, 28 Themistocli  
& Euribiadi coronam ex olea largiti  
440, 30  
grandinem quid remoretur 561, 5. 648, 2  
Gratiæ, siue Charites 80, 25. 82, 11 Gra-  
tiæ poetarum tres 584, 24  
gruaria delineatio 679, 29  
gurguliones fabis infesti 875, 13 ut ar-  
ceantur ibid.  
gustus ieiuno hebes 568, 22 gustum que  
immutent 568, 23, 28  
guttus faginus 164, 21  
gypsum musto commodum 566, 27  
gypsi utilitas 571, 19 & 20

H

**H**abis Hispania 814, 36 agricul-  
turam docuit ibid.

habituacula diversi generis 3, 15 & seq.  
habizix radix 787, 9 quo nomine an-  
thoribus indicetur 787, 11 habizix  
cælum calidum exoptat 787, 22 etiam  
nascitur sua sponte 787, 25  
Hamorrhous, αἱμορροῦς, serpens 629, 25  
halicastrum 845, 15  
haliphai enarratio 162, 12 species 162,  
58 delineatio ibid. 22  
Halirrhodius Neptani filius 442, 37  
harpe, avis aquila similis, hederam nidis  
ingerit 635, 36  
Harpocrati perseæ sacra 13, 33. 176, 10  
Hebe, Herculis uxor 134, 13  
Hecale sonchon Theseo apponit 665, 6  
hedera arbores amplexatur 636 hedera  
Cilicia 618, 23 nullo odore 634, 11  
quo figmento Græcis orta ibid. 13 Bac-  
cho sacra 13, 32. 581, 1. 634, 17 &  
37. 635, 2 satis omnibus inimica 635,  
21 hedera Cilicia nomen 618, 35 de-  
lineatio ibid. 39 genera & solum 619,  
22 hedera nominatio 635, 40 hedera  
genera & descriptio 636, 10 hedera  
amplexus arbores infestat 636, 39 he-  
dera cælum 638, 17 solum & satio  
638, 34 & 36 cultus, ars & materies  
639, 10 & d.  
hedygeum Tarētinius quid vocet 749, 15  
hedyosmos, herba 705, 13  
hedypnois Plinij 663, 22. 664, 7 hedy-  
pnois unde nomen capiat 664, 18  
Helena, insula 630, 25. 631, 5  
Helena lachryma herbam producant  
629, 25  
Helenium Helenes inuentum 13, 11  
helenium, herba 629, 23 unde enatum  
629, 25 hilaritatem efficit ibid. 29  
ut condiatur 629, 34 & 39. 630, 7  
eius delineatio 630, 21  
heleoselinum 686, 3



- Heliaides*, Phaetonis sorores 138, 3 in ar-  
bores mutata ibid. & 142, 6  
*helica vitium* 538, 36  
*helice*, è salicis genere 144, 17  
*helichrysos*, sine amarathus 609, 10 unde  
dicatur 609, 27  
*heliocrysi delineatio* 609, 39 *heliocry-*  
*sos* ubi nascatur 610, 14  
*heliostrophos* Apuleio quid 743, 19  
*helix* 636, 13 & 18 *helicis genera* ibid.  
26. 637, 27 & 32 *helix fructum* non  
gignit 638, 12  
*helleborum* scribitur in Thaso 556, 5  
*hemeris* an diversa à quercu 153, 35 *he-*  
*meris* descriptio 154, 5  
*hemerocallis* Dioscoridis 607, 21 Theo-  
phrasti 607, 30  
*Heraclia*, urbs Campania 718, 3 eius  
ortus & interitus ibid.  
*heraclion* papaveris genus 739, 3, & 9  
*herbatinctorum* 902, 1  
*herba* quid 65, 22  
*herba lachrymis quoque nascuntur* 179,  
10 *herba* an insitione admittant 222,  
28 *herba vel odorata vel inodorata*  
580, 13 *herba condimentaria* 682,  
22 *herba segetem anticipantes suffo-*  
*cāt* 812, 7 *anteverfa necantur* ibid. 8  
*herbarum arborumque fructibus ve-*  
*scuntur ac victitant animalia* 2, 2  
*Herculeius* 12, 28  
*Hercules oleastrum unde attulerit* 11, 10  
*abietem euellit* 80, 15 *Innonis serpen-*  
*tem interimit* 257, 25 *ad auferenda*  
*mala medica missus* 258, 7 *ludorum*  
*Olympicorū inuentor* 444, 3 *primus*  
*oleastro coronatus* 449, 18 *Hercu-*  
*les Iouis filius ex Alemena* 590, 23  
*in suam patriam redit* 718, 28 *mili-*  
*tribus suis urbes adificat* 718, 30 & 32  
*Buzyges cur dictus* 815, 3  
*Herculis uxor* 134, 13 *quercus* 13,  
14. 154, 22 *Herculis claua ex olea-*  
*stro fuit* 448, 40 *terra defixa sponte*  
*effloruit* 449, 1 *in Herculis honorem*  
*Olympici ludi inuenti* 449, 12 *Her-*  
*culis delubrum* 743, 35  
*Herculi sacra populus* 13, 33  
*Herodis tristitia & pestis, silue commodo*  
*lenata* 14, 19  
*heroes animū rerusticare relaxarunt* 9, 15  
*Herous sinus* 116, 35  
*Hesperidum horti* 257, 5. 743, 34  
*Heitruvia ut creuerit* 8, 24  
*hiems ab ilice praedicatur* 148, 21 & à  
*quercu* 153, 25 *hiems comoda* 255, 1  
*hieme cæli rigorem non soli probamus*  
560, 15  
*Hierapolis Syria* 621, 15  
*Hiero* 13, 3  
*hilaritas nulla in abstemio* 493, 16 *hi-*  
*laritatis effectrix buglossa* 670, 32  
*hippomelides* 167, 5  
*Hippodamia Pelopi nubis* 389, 25  
*hippoglossus, lauri species* 120, 2 & 11  
*hippolapathum* 744, 24  
*Hippolyti habena* 449, 26 & *currus* ibid.  
*hipposelinon* 683, 3. 686, 26 *hippose-*  
*linon* Dioscoridis, aliud ab eo, quod  
*smyrnion* vocat 688, 30  
*hippuris vitis minus pruinā curat* 560, 24  
*hircinus adeps* 558, 24 *hircinus sanguis*  
*magneti trahendi virtutem restituit*  
798, 10  
*hircus Baccho immolatur* 494, 30.  
642, 23  
*Hispania pauperes tributum solvunt* 6, 4  
*Hispani secundis mensis glandes inse-*  
*runt* 147, 15  
*Homeri Laërtes* 9, 25  
*homines quare ex arboribus nati puten-*  
*tur* 3, 32  
Ha. m.



*hominum alimenta poma & semina* 2,  
*10 hominū primi Arcades* 3, 37 *homi-*  
*num ratio aut imperans, aut audiens*  
*17, 20* (149, 22)  
*Horatius Cocles, Sublicii pontis defensor*  
*hordei enarratio* 850, 7  
*hordus veteribus grauidus* 850, 18  
*horreum* 50, 26  
*Hortensii, ab hortis* 11, 40  
*hortensium sementes tres* 646, 35  
*hortus coronarius quid contineat* 580, 7  
*hortus quid* 641, 7 *hortus olitorius*  
*641, 20 horti locum irriguum esse o-*  
*portere* 644, 2, 13 *horto qui locus, quod*  
*cælum solumq, deputetur* 582, 21 *con-*  
*tra horto innascentes bestiolas media*  
*649, 6*  
*horti Hesperidum ubi sint* 257, 5  
*hortorum deus* 641, 23 *hortorum re-*  
*media contra cæli noxas* 647, 38  
*hortis quis locus deputetur* 642, 25  
*hortis quale cælum solumve conneni-*  
*at* 642, 38  
*hostis nequam qua soli parte euadat* 453,  
*2 hostis quid* 453, 4  
*humani actus omnis aut villa est aut*  
*negotatio* 15, 13  
*humor a gelu eximitur* 452, 27  
*humoris indiga, pinguioris sunt ani-*  
*da alimenti* 809, 38  
*hyacinthinus color* 605, 40  
*hyacinthus in hortis nutriendus* 605, 19  
*duplex, historicus & fabulosus* 605,  
*20 hyacinthus fabulosus, sine poeticus*  
*606, 5*  
*hyacinthi medici nomen* 605, 27 *de-*  
*scriptio* 605, 29 *species* 605, 37 *ubi*  
*maximè proveniat* 605, 39 *non feri-*  
*tur* 606, 3; (scriptio 606, 36)  
*hyacinthi poetici nomina* 606, 33 *de-*  
*Hyacinthus puer in florem conuersus*

606, 22 *regis filius* 207, 20  
*Hyacinthus quare puerum fingant*  
*poeta* 605, 25 (28 & 38)  
*hydrolapathō, rumex in aqua natus* 744  
*hydrophantica* 37, 13  
*Hyperboreorum cibi* 2, 20  
*hyphear, & stelis* 76, 4  
*hyssopus, hortensis herba* 697, 32 *unde*  
*nomen nata* 697, 36 *duūm gene-*  
*rum* 697, 39 *hyssopus vulgaris* 698,  
*4 hyssopus Dioscoridis ibid. hyssopus*  
*Hebraorum* 698, 5

I

**I***acintus* 593, 31, 32  
*Iaculum ex aquifolio* 107, 30  
*Iani insigne, falx* 16, 31 *Ianus corollarum*  
*inuentor* 580, 26  
*Iannariis calendis cur lauri folia & cari-*  
*ca donata* 113, 40  
*iasme frutex* 598, 1 *eiusq, nomen* 598, 11  
*descriptio* 598, 16 *genera* 598, 22  
*cælum* 598, 28 *solum* 598, 29 *satio*  
*598, 31 insitio* 598, 39  
*Iasonis nauis in Colchidem vecti* 80, 2  
*Icarus insula* 764, 4  
*icteroscaliha arcetur* 611, 11  
*Idea spelunca aditus* 135, 18  
*Ida, mons Phrygiae pini refertissimus* 87,  
*28. 93, 5*  
*ieiuniorum alimentum ex pingui succo*  
*809, 40*  
*ignis qua ligna non ladat* 101, 19 *ignis è*  
*silice a Prometheo primam exceptus*  
*680, 21. 747, 2 ignis ferula asseruatur*  
*746, 41 ignis continuo ferularum at-*  
*ritum elicitur* 747, 4  
*ilex, arbor glandifera aeterna virens cesa-*  
*rie* 147, 31 *Ioui sacra ibi* 33 *ilex mi-*  
*nor* 148, 2 *ilex frequenti citatur fulmi-*  
*ne* 148, 2 *arbor infausti ominis* 148, 8  
*ubertatis indicia prabet* 148, 18 *dua-*



- ram specierum* 148, 30 *ilex nigra* à *Poe-*  
*is* appellata 148, 41 *ilex in Vaticano*  
 149, 12 *ilex aquifolia coccifera* 149,  
 30 *milex* *Plinio*, sed *perperam* 149, 32  
*ilex foemina* 151, 34. 152, 12 & 18 *ilex*  
*aquifolia*, vel *sterilis* vel *fructifera*  
 149, 36 *ilicis aquifolia descriptio* 149  
 38 *quo loco maximè nascatur* 150, 27  
*qualem producat materiem* 150, 32  
*ilicis materia* 149, 11  
*iligna corona* 147, 32. 152, 33  
*Illicet*, novissimum verbum 81, 36  
*Ilum*, *Ilitumulus* 154, 20  
*imbecillia paratiora ad opus sunt* 694, 22  
*ab externis facilius patiuntur ibi.* 23  
*imber viti florenti noxius* 558, 27 *im-*  
*bres tempestivi* 255, 11 *inopportuni*  
*floribus qui* 583, 30 *imbrium pra-*  
*nuncia oxys* 678, 8  
*imperandi prudentia* 21, 36  
*imperij nota, ferula* 746, 23  
*imprecationibus feritur cuminum* 695, 1  
*imprudencia plus, quam scientia prodest,*  
*incommodat* 23, 23  
*Indie venenosa animalia* 3, 29 *Indie oc-*  
*cidentales* 849, 17  
*Indi arundinibus nutriuntur* 2, 29 *Indi*  
*lectos in arboribus sternunt* 3, 29  
*Indorum cibi* 2, 19 *habitatio* 3, 28  
*Indorum Seres* 4, 19  
*Indus fluvijs* 2, 19  
*inertibus nasturtium mandendum* 667, 15  
*infantis subrumi febricitantis remedium*  
 749, 1  
*infoliatio* 212, 21  
*inguinum tumor* 388, 20  
*inoculatio, inferendi modus* 208, 33 *et-*  
*iam satio dici meretur* 209, 31  
*Ino Dionysij nutrix* 495, 8  
*inopia à rege perfertur* 12, 33  
*insitio, agricultura pars nobilissima* 178,  
 21 *insitio quid* 206, 35 *insitio, qua*  
*truncus finditur* 213, 20 *insitio an*  
*herbis conveniat* 222, 28 *insitio per re-*  
*scissionem* 548, 10 *per contactum*  
 550, 22 *per terebrationem* 550, 37  
*insitionis necessitas, utilitas, voluptas*  
 204, 34 *insitionis modi* 208, 32 *insi-*  
*tionis novus modus, annularis nuncu-*  
*patus* 211, 20 *insitionis, qua refecta ar-*  
*bore fit, ratio* 212, 6 *insitionis praecepti-*  
*ones* 214, 34 *insitionis temporum ra-*  
*tio* 216, 21  
*insitione meliores redduntur fructus*  
 181, 40 *insitiones vitis tres* 548, 9  
*insurculatio* 212, 6. 213, 22  
*intubacea Theophrasto qua* 659, 35  
*intubi quid* 659, 37 *intubi paratus &*  
*conditura* 661, 24 *intubus silvestris*  
 662, 1 *intubus erraticus* 662, 9  
*inula conditura* 629, 39. 630, 7  
*Ioan. Baptista Porta in eloquentiae studiis*  
*non admodum exercitatus* 1, 20 *agri-*  
*cultura studiosus* 1, 24 *novus Atlas*  
*ibid. arbores confert* 540, 38  
*Ione, nymphe* 595, 39. 596, 1  
*Iones per brassicam iurabant* 714, 15  
*Io in vaccam commutata* 448, 17. 593,  
 4 *olea alligata* 448, 17  
*Ionis sceptrum ex acere* 128, 23 *in Iouis*  
*intela ciuitates* 153, 2 *Iouis stella, anni*  
*qualitatum index* 254, 19 *Iouis Stra-*  
*tij are* 154, 22 *Iouis simulacrum è vi-*  
*te* 579, 1  
*irion, siue erysimon* 868, 2  
*iris, flos coronarius* 607, 39  
*irrigatio, cultui maximè necessaria* 232,  
 18  
*Isthmia in Melicerta honorem instituta*  
 87, 40  
*Italia querno folio assimilata* 154, 25  
*omnium terrarum alumna* 154, 27



*enclavā gentiū patria* 154, 31 *Ita-*  
*lia toto orbe potior olimetis* 453, 14 *Ita-*  
*lia soli concessa arbuti ratio* 538, 18  
*iteratio sato semine sequitur* 822, 36  
*Iuba Mauritanie rex* 13, 9  
*Iudaei Romanorum tributarii* 6, 4  
*Jugarius deus* 815, 4  
*inglans a coronamentis abdicata* 581, 4  
*ingum an cornibus illigandum* 815, 28  
*iniube* 381, 40 (629, 39)  
*Julia Augusta quotidianus cibus, beleniū*  
*Julii Caesaris imago lauro coronata* 115,  
 12 *Julii Caesaris cades laureoramulo*  
*pramonstratur* 115, 31  
*Julius Vindex adsertor libertatis* 694, 3  
*iuniperus, arbor resinifera bacciferaq;*  
 103, 17 *somnū affert* 103, 18 *eius no-*  
*mina* 103, 30 *descriptio ibi.* 34 *genera*  
 104, 9 *cælū & solū* 104, 21 & 26, *ma-*  
*teries ad quid utilis ibi.* 28 *eius resi-*  
*na* 104, 40 *iuniperus a pecore respui-*  
*tur* 148, 33  
*Inonis simulacro caprifici ramus susse-*  
*pus* 171, 22 *Inonis hortorū custos ser-*  
*pēs* 257, 24 *Inonis lac* 190, 23  
*iupha Syrorum* 786, 15 (442, 36)  
*Iupiter fagytalis* 163, 18 *Iupiter Morios*  
*iureiurandum per brassicam conceptum*  
 714, 15 *per allium capaq;* 798, 23  
*iuris origo Cereri attribuitur* 807, 24  
*iuvenum officia, seniorum imperia* 23, 32

K

*καρπία, inglans* 71, 14  
*καρπία, inglans* 581, 5  
*καταεινός, pronerib.* 83, 4

L

**L** *Abor à peccato profluit* 6, 18  
*Lacedaemonis ut mustum emendent*  
 566, 28 (13)  
*lac cyrenaicum* 555, 13 *lac Inonis* 590,  
*laelea via* 590, 27

*laetluca in acetariis optima* 654, 7 *laetlu-*  
*ce genera* 655, 17 *laetluca satio* 657,  
 35 *laetluca quas artes admittat* 658,  
 14 *ab erucis & vermiculis ut vindi-*  
*cetur* 659, 29 *laetluca leporaria* 665,  
 18 *laetluca sine eruca non ededa* 666, 1  
*laetlucina unde dicta* 665, 29  
*Laetlucini, è familia Valeria* 655, 6  
*lacus Lucrinus* 9, 41  
*lacus acrem inficit & fructum* 251, 20  
*lacturres, è brassica genere* 719, 31  
*Laertes Homeri* 9, 25  
*latitia efficiens causa vinum* 493, 2  
*Lampsaceni Cræsiminas explorant* 88, 9  
*Lampsacus, Hellepontivrbis, qui olim ap-*  
*pellata* 88, 28  
*lanarum tinctura* 154, 39  
*lanificium ex arboribus* 4, 17  
*lanigera arbores* 4, 17  
*Lanoni fluvii filia* 113, 18  
*lapathi nomen ab effectu* 744, 13 *lapathi*  
*& rumicis discrimē* 744, 35. 745, 12  
*lapillus puniceus in robore genitus* 157, 15  
*Larignum, castellum a D. Casare debel-*  
*latum* 101, 5  
*Larissa solum frigidius factum* 453, 12  
*larix, arbor conifera, resinifera, per diso-*  
*lia* 99, 15 *laricis descriptio* 99, 28.  
 100, 7 *larix quo cælo oblectetur* 100,  
 17 *larix celebris, à Tiberio Cas. in*  
*ponte nannachario exposita* 100, 21  
*laricis materies* 100, 21  
*latifolia arbor* 161, 14 (14)  
*Latinus Latij rex, Circe filius* 114, 9 &  
*Latona, Apollinem & Dianam enixa*  
 440, 6 *Latona porri capitati dicantur*  
 794, 40  
*lanandula & lananda* 633, 36  
*Laninium, Ital. oppidum* 114, 13 *item*  
*& Laninia* ibid.  
*Laurentum, Italia vrbis* 12, 11 *Lauren-*



# I N V I L L A M

*rum, crebris lauri filius* 14, 17 *nomen eius originem unde traxerit* 114, 9  
*Laurea, libertus Tiberonis* 12, 2  
*laurea corona* 10, 36. 115, 12 *laurea Poetarum in signe* 115, 2 *laurea usus in decorum coronis & sacrificijs* 116, 13  
*laureum scipionem gestare: prouerb.* 113, 31  
*laurus Apollinis sacra, fulmine non ictur, diuinationem in somnis prabet* 13, 29 *arbor siluestris* 112, 36 *triumphis dicata* 112, 38 *pacifera ibid.* 40 *usu laudabili* 113, 1 & d. 114, 4 & seq. 115, 3 *laurus Delphica tribus radicibus* 115, 9 *laurus triumphantium propria* 115, 29 *bonigenii planta* 118, 22 *laurus Alexandria* 120, 7 *laurus uitem offendit* 562, 9  
*lauri miracula* 115, 20 & d. *lauri ramulus in Luiae gremium dimissus* 115, 20 *lauri nomina, ac genera* 116, 32 *lauri delineatio* 117, 15 *quo caelo proueniat* 117, 34 *quo solo* 118, 3 *lauri satio & plantatio* 118, 4 *lauri insitio* 119, 8 *lauri materies cuius usus* 119, 10 *lauri species* 119, 22  
*Laydis Cyreni in hortis schola* 9, 33  
*lege antiquitus homines nulla vinebant* 807, 22  
*legumina quid* 806, 29 *leguminum historia* 869, 3  
*legum origo penes Cererem* 807, 24  
*Lemnia terra* 877, 14  
*lens & leticula* 885, 17 *eiusq; historia ibi.*  
*lentiscus, arbor resinifera, baccifera* 105, 8 *eius nomen* 105, 11 *descriptio ibid.* 16 *lentisci satio* 106, 1 *insitio ibid.* 3 *materies & resina* 106, 5, 10  
*Lentuli, a lente* 869, 10  
*leones cur Cybeles currui adiuncti* 13, 25  
*leo ilicis foliis calcatis torpore corripit*

*aur* 148, 1 *leones allio perunctum non attingunt* 798, 22  
*leonis dens, herba* 664, 4 & 21  
*leporaria lactuca* 665, 18 *leporum astus lassorum remedium* ibid.  
*leptophyllon Dioscoridis* 707, 17  
*leptoraga Plinii* 497, 10  
*Lesbi nemus incensum* 89, 27. 97, 12, 22  
*leucoion quid, eiusq; nomen* 593, 10 *descriptio* 594, 1 *leucoion bulbaceum* 595, 9 *leucoion commune* 595, 11 *leucoion Dioscoridenum* 595, 11  
*leucoion genera* 594, 16 *caelum* 594, 32 *solum* 594, 36 *satio* 594, 37 *cultus* 595, 7  
*leuson, quid* 79, 18  
*lex Delphis lata de porro* 795, 4 *lex duodecim tabularum, de glade in alienum procidente fundum* 147, 16  
*libanotis seu rosmarinus* 632, 8 *qua Gracis fabula* 632, 15  
*Liberi patris platanus & laurus* 13, 16  
*librorum appellatione qua contineantur* 125, 21  
*licinia oliua* 451, 32 (121, 38  
*lienens antipathia mirabilis in tamarice*  
*ligneus canis* 732, 15  
*lignum suberis non fluitat* 151, 32  
*lilium rose nobilitate proximum* 590, 21  
*Iunonis lacte natum* 590, 23 *pulchritudinis symbolum* 590, 28 *Veneri inusum* 590, 32 *lilium rubrum* 606, 34  
*lilii nomen* 591, 3 *descriptio* 591, 14  
*lilii genera* 591, 34 *caelum* 591, 37  
*solum* 591, 39 *satio* 591, 40 *cultus* 592, 18 *ars* 592, 20 *conditura* 592, 37  
*de limone, mali medica specie* 269, 24  
*limonia mala* 266, 30  
*lingua cordi coniuncta* 176, 10 *lingua bubula* 670, 35  
*lini in lolium transgressio* 835, 24  
*linum*



- linum*, & eius enarratio 896, 10  
*liquores humanis corporibus duo gratissi-*  
*mi* 443, 14  
*lira*, & *liratim* serere 799, 28 & 29  
*lirare bonum est* 812, 17 *lirare quid ibid.*  
 18. & 822, 27  
*liras rustici quas porcas vocant* 813, 34  
*Liriopenympha* 601, 6  
*Lisias orator* 127, 7  
*lucra lugubres in faba* 876, 11  
*Linie Drusilla laurea* 115, 20. 118, 36  
*Lixum Mauritanie oppidum* 743, 34  
*ubi Hesperidum horti* ibid.  
*locorum propria vitia* 474, 36  
*Locrensiū origo* 732, 16  
*Locrus urbem condidit* 732, 16  
*locusta ab agritudine per olea folia libe-*  
*rantur* 443, 26 *locustarum arcenda-*  
*rum media* 651, 35. 652, 3  
*lolij mutationes in triticum* 835, 20 *lo-*  
*lij origo & transmutatio* 860, 3  
*lolium, segetum vitium* 859, 23 *eius-*  
*que historia* ibid.  
*Lomentum, farina fabacea* 875, 14  
*lora quomodo paretur* 565, 19  
*Lotis pudicitie insidiatus Priapus* 642,  
 15  
*Lotophagi* 2, 33. 168, 31. 169, 5 *Libya*  
*populi* 2, 33 *Lotophagorum regio* 170,  
 12 & 17  
*lotos arbor* 2, 33 *vinax & longana* 169,  
 30  
*loti arboris fructus in cibū ut veniat*  
 170, 3 *materies* 170, 17  
*lotos, herba laudata* 629, 5 *aquinoco no-*  
*mine* 629, 10 *unde dicatur* ibid. 12  
*ut à Dioscoride depingatur* 629, 17  
*è semine nascitur* 629, 21  
*Lotos nympa in arborem conuersa* 168,  
 22  
*lotus, arbor siluestris* 168, 20  
*Lucina dea* 155, 41 *Lucina arca Romæ*  
 169, 31 *Lucina unde nomen sortita*  
 169, 33  
*Lucina augurum in abiete* 76, 10  
*L. Quintius Cincinnatus agrum colens,*  
*dictator creatur* 12, 23  
*Lucullus in villa vitam finivit* 9, 20  
*Iudi Olympici* 11, 10 *nauales* 11, 12 *A-*  
*theniensium* 11, 15  
*Luna Diana vocitata* 68, 34 *quando ca-*  
*lidissima* 560, 41 *quando fructus pu-*  
*trifaciat* 561, 1 *luna crescente omnia*  
*gliscunt, & senescente tabescunt* 787,  
 37  
*lupini historia* 892, 24  
*lupi salictarij, siue lupuli historia* 731, 33  
*Luscinie modulatio* 7, 30  
*Lusitanorum quercus* 155, 2 *Lusitani*  
*regis nauigatio* 758, 14  
*luxuria segetū inter vitia* 825, 41 *quo-*  
*modo castigetur* 826, 1  
*Lycei platanus* 131, 29 & 34  
*lychnis è Veneris labro nata* 615, 25 *vn-*  
*de appellata* 615, 27 *lychnidis deli-*  
*neatio* 615, 35 *cælum* 616, 6 *cultus*  
 616, 10  
*Lycurgus à Libero patre vitibus alliga-*  
*tus* 715, 18  
*Lydi pūso fagum vocant* 12, 5 *Lydorum*  
*gens libidinosa* 620, 25  
*Lyxander Lacedæmonius* 12, 16  
*lysimachia inuentor* 13, 7  
*Lyfimachus Macedo* 13, 8  

M

**M** *Acilenti homines ex pingui succo*  
*multū trahunt alimenti* 809, 40  
*magnapium unde dictum* 687, 2  
*magnetis ferrum attrahentis virtus allio*  
*tollitur* 798, 8  
*Mago Carthaginensis* 17, 38 (16  
*maiorana delineatio* 627, 10 *genera* 627,  
 AAAA



# I N V I L L A M

<i>malache, è maluateo genere</i>	743, 7	<i>de Materie cadenda &amp; conseruanda</i>	67,
<i>malleolus quid</i>	510, 36		13
<i>malleoli ferendi ratio</i>	514, 8	<i>Mathematica scientia</i>	18, 7
<i>malleoli ponendi modus</i>	515, 17	<i>matrifamilias horti cura mandata</i>	640,
<i>malope, malua species</i>	743, 6		28
<i>malua hortensis, vel rosea</i>	616, 14	<i>Matthiolus Pliniū notans fallitur</i>	608,
<i>eius nomen</i>	616, 18	<i>17 errat, anguriam esse cucumim satium</i>	757, 39
<i>genus</i>	616, 21	<i>Manfolus Caria rex</i>	13, 12
<i>descriptio</i>	ibid. 24	<i>eius uxor</i>	ibid.
<i>sola &amp; satio</i>	616, 35 & 36	<i>Artemisia</i>	
<i>efficacia</i>	742, 29	<i>meconis, lactuca atra</i>	655, 40
<i>genera</i>	743, 5	<i>Medea Absyrtus</i>	447, 5
<i>malua ingentis magnitudinis</i>	743, 33	<i>medica arbor</i>	257, 14
<i>malua satio</i>	743, 40	<i>Medos amygdalis nutriri</i>	2, 29
<i>translatio</i>	744, 1	<i>medulla vitis pars vitalis non est</i>	548,
<i>malum siluestre, nomen generale</i>	173, 11		16
<i>malum citrium</i>	259, 24	<i>Megarenfis oleaster</i>	446, 6
<i>arantium</i>	267, 35	<i>melampyron, iritico conuascens</i>	861, 2
<i>mala montana</i>	173, 12	<i>Melas, fluuius Boetie</i>	552, 35
<i>siluatica</i>	ibid. 13	<i>mel Atticum optimum</i>	624, 12
<i>mala &amp; nuca ut discrepent</i>	250, 18	<i>mellis angurium, thymus</i>	623, 28
<i>mala limonia</i>	266, 30	<i>Melicerta Isthmia instituta</i>	87, 40
<i>conditina</i>	450, 17	<i>meliloton, herba</i>	627, 30
<i>malorum siluestrium historia</i>	173, 8	<i>meliloti descriptio</i>	628, 4
<i>cotoneorum</i>	270, 20	<i>ubi nascatur</i>	628, 12
<i>punicorum</i>	397, 1		15
<i>malus medica</i>	257, 11	<i>meliloton loqueris: prouerb.</i>	627, 33
<i>mali medica vires</i>	258, 26	<i>melissophyllon apibus gratissimum</i>	633, 8
<i>malus aurea</i>	267, 25	<i>quibus nominibus inuicetur</i>	633, 15
<i>verna</i>	285, 28	<i>duplicis generis, hortense &amp; siluestre</i>	633, 23
<i>malus, &amp; malum</i>	275, 10		
<i>mamma, ramen veteribus dicta</i>	677, 28	<i>Melius, Fraxini vir</i>	112, 13
<i>manica</i>	787, 13	<i>Mellona, à melle nuncupata</i>	250, 38
<i>Manius Curius Imperator rapas torrere inuentus</i>	777, 17	<i>melones, veteribus incogniti</i>	758, 12
<i>manna verè melleū ex olea manat</i>	445, 23	<i>bilissimi in Æthiopia</i>	758, 15
<i>mannaruris</i>	744, 18	<i>melones quasi pomci dicti</i>	758, 21
<i>marathron, fœniculum</i>	690, 14	<i>melonum descriptio</i>	758, 26
<i>M. Agrippa septa</i>	100, 26	<i>genera duo</i>	759, 4
<i>M. Varronis studium in villa</i>	10, 3	<i>quo loco &amp; quo modo ferantur</i>	759, 18 & 25
<i>M. Curius</i>	12, 19	<i>melones ut odorati reddantur</i>	759, 33
<i>Mariamna, Herodis uxor, à viro intermissa</i>	14, 20	<i>ut dulces</i>	759, 37
<i>Mariana quercus</i>	10, 1	<i>ut praecoques</i>	759, 40
<i>Marius Maximus</i>	554, 4	<i>ut &amp; alias admittant artes</i>	760, 3
<i>Massageta siluestribus fructibus fruuntur</i>	2, 22		
<i>Scythiae populi, arbore vestiuntur</i>	4, 12		
<i>Massyli Africae per saltum errant</i>	3, 27		



- metopepon* 750,4 à *pepone* differt 750,6  
*metopepones* idem quod *melones* 758,  
 12 ubi & plura.  
*memecylon* arbuti fructus 166,36  
*Memphim* è Perside arbor perseæ transla-  
 ta 10,34  
*mensis* primis cucumis damnatur 748,33  
 ut *Graphanius* ibid.  
*menta* vis ad recreandos animi affectus  
 705,7 *menta* usus in cibis 705,8  
*menta* belli tempore non edenda 705,  
 26 *menta* denominatio 705,30 dua  
 species 705,37 *menta* delineatio 706,  
 1 an semine iuxta *Theophrastum* ca-  
 reat 706,18 ferro tangi non vult  
 706,36  
*mentastrum*, *menta* species 705,38. 706,  
 6 ac 30  
*mercatura* inferior agricultura 3,5  
*Mercurio* sacrum malum punicum 13,33  
*Mercurius* olea inuentor 440,2  
*meretrix* blitea *Plauto* quid 742,3  
*Meroe* Nili insula 2,35  
*Merus*, India mons 638,18 & 26  
*mesphyllum* quid dicatur 633,17  
*mespili* delineatio 383,33 genera 384,  
 20 morbi & remedia 385,33  
*messis* quid 831,34 cuius tria tempora  
 ibid.  
*metus* multum confert ad diligentiam  
 24,17  
*Midas* rex filiam *Aty* despondet 87,11  
*milax* *Plinij* 149,32  
*Miletus*, urbs Caria, *Pityusa* unde nomi-  
 nata 88,24  
*mili* descriptio 861,15 *mili* Indicum  
 865,1 *Æthiopicum* ibid. 31  
*Miltiades* à *Lampsacenis* dimissus 88,12  
*Minerva* olea sacra 13,30. 438,9 *Min-*  
*erva* & *Neptuni* contentio de *Athe-*  
 nis 438,33. 439,6 *Minerva* capram  
 respuit 475,27 *Minerva* festa 752,  
 14 *Minerva* Boarmia dicta 815,5  
*bellidea* 580,29  
*Minotaurus* à *Theseo* vincitur 11,5  
*Minthe*, Achaia mons 705,12  
*Minthe* puella fabula 705,17  
*Minutius* *Augurinus* 845,6 cui statua  
 propter farri pretium posita ibid.  
*minyantes* 628,17 & 21  
*Mithridates* Pontirex 13,8 laurum ha-  
 bere laborat 117,41  
*Mithridaticon* pharmacum 710,33  
*Mnesithe* error 842,24  
*mærum* pro muro veteribus 250,3  
*molluscum* acerinum 128,11  
*monachos* non dedecet agricultura 15,8  
*Monobasia* 503,11  
*mons* transversim sulcandus 813,40  
*montapium*, ὄρεος λίαν 689,11  
*montium* quasi montana ulmus 138,21  
*morbi* plantarum universales 235,28  
 peculiares arborum 238,37 speciales  
 fructuum 240,8 morbi vel intrinse-  
 ci, vel extrinseci 472,1 morbi intrin-  
 seci vel copia vel inopia alimenti pro-  
 veniunt 472,2 morbi extrinseci aut  
 secundum naturam, aut præternatu-  
 ram 472,5 morbi extrinseci veni-  
 entis qui sint 474,23  
*morbus* quid 236,39  
*Morifolia* bombyces alunt 4,32  
*morus* arbor 327,17 qua forma 328,9  
 duplicis generis 329,8 mori cultus ac  
 insitio 330,14 & 21  
*morum* anima fabis continentur 875,  
 28. 876,9  
*moscata* acus 679,8  
*moscum* maioribus ignotum 497,37  
*Moses* autorum verissimus 2,4  
*muceri*, siue amygdala 421,17  
*muli* cucumere delectantur 748,37  
 A A A A 2



*muliebris pilis suffusus* 561,32  
*mulier cur viro imbecillior* 24,13 *cur*  
*timidior* 24,15 *mulier texens palliū*  
*cucumerē deuoret, proverb.* 749,13  
*mutrenis infesta natura ferula.* 681,4.  
 746,9  
*mures ut à vineis auertantur* 561,14  
*mures rurales ne officiant* 652,14 *mu-*  
*res agrestes à serpentibus lasi chondril-*  
*lam edunt* 662,39 *mures à radicibus*  
*arcendi ratio* 736,36 *mures à fru-*  
*mentis abigendi medium.* 826,14  
*Musa medicus.* 654,14  
*muscata acus* 679,8  
*muscus ruber* 453,2  
*mustarda.* 709,6  
*mustelus infestandi modus* 653,12 *mu-*  
*stela ruta, ut venenum defugiat, ve-*  
*sciunt* 710,35  
*mustum quomodo in dolia condendum.*  
 566,6. *quomodo purgandū* 566,12  
*pluuus frequentibus imbecillum, ut*  
*curetur* 566,22. *toto anno dulce ut*  
*haberi queat.* 568,38  
*mustum prochyma quod dicatur.* 569,6  
*mustainiecta origanus, vinum dulce*  
*efficit* 698,31. *mustum rutatum.*  
 710,19  
*myacanthon quid quidam nuncupent.*  
 728,13  
*mycerus quid Ameriadi* 421,17  
*myrice, frutex siluestris perpetuo folio*  
 121,4 *cius descriptio.* 12,24  
*myrrhis descriptio.* 679,27  
*My sine Attica puella.* 388,26  
*myrtatum obsonium.* 388,9  
*myrtidanum.* 388,7  
*myrtus Veneri consecrata.* 13,31  
*myrti commentatio* 388,4 *de myrto fa-*  
*bule* 388,27 *myrtus quibus historiis*  
*nobilicata* 389,10 *myrti nomē & for-*

*ma* 390,29 & 38 *species* 391,41 *myr-*  
*tus quo cælo, quo loco proueniat* 393,  
 11,35 *myrti plantatio* 394,3 *cultu-*  
*ra* 395,10 *insitio ibid.* 22 *conditu-*  
*ra* 396,1 *myrti cum olea familiaritas*  
 448,1

*Myrsorum nomen à fago.* 12,5  
*myrtota quid* 800,37  
*myxorum historia.* 344,12

## N

**N** *Abidi suo Hispani rei rustice in-*  
*uentum tribunt.* 16,28  
*napunculus.* 678,27  
*napus quo solo proueniat.* 782,31  
*napi seu buniadis pertractatio* 781,20  
*napi & rapi Galeno nulla differentia.*  
 782,8 *naporū proba satio* 783,3 & 15  
*Narbonensis provincia.* 569,38  
*Narcissi fabula.* 601,5  
*narcissi nomen* 601,18 *genera* 601,32  
*cælum solumq.* 602,30 *satia* 602,32  
*ars.* 602,39  
*narcissi à lilio differentia.* 602,23  
*nardus suauis odore* 633,32 *nardus ge-*  
*nuina veterum.* 633,34  
*Nasamones palma victitant.* 2,31  
*nasiurtij descriptio.* 667,5  
*natura, rerum parens & nutrix.* 1,26  
*natura agros, ars humana vrbes con-*  
*struit* 10,14 *frustra nil facit* 181,11  
*natura & artis discrepantia* 249,12  
*natura arti succedit* 555,19 *natura*  
*qualitates continuatione permutan-*  
*tur.* 840,33  
*naualium ludorum victores.* 11,12  
*nausfragium omnium animantiū* 442,2  
*necessitas ferius caret.* 23,35  
*Neda fluminis.* 172,3  
*negligens plerumq. adolescens.* 21,27  
*negligentia plus obest, quam prodest scien-*  
*tia.* 23,23  
*nego-*



- negotii omnis caput, nosse quid agendum sit. 19, 11
- Nemeai certaminis victores. 682, 30
- nepita animum exhilarat. 705, 7
- Neptuni & Minerva de Atheniensi urbe contentio. 438, 33. 439, 6
- Neronis amphitheatrum. 100, 23 Neronis ultimo anno Caesarum prosapia desinit 115, 34 Neronis fossa a Baiano lacu Ostiam usque. 502, 29
- nescire se, quenquam intelligere, pretiosissimum. 23, 22
- nihil agendo homines male agere discunt. 22, 30 (16, 37)
- Nili simulacrum agriculturam denotat.
- Nisa, India mons. 13, 16
- nitrum uvas maturat 554, 24. nitrum Alexandrinum. 569, 15
- niuis seruanda inuentum 156, 8 niuis multitudo 255, 22 niues hibernis noualibus commendantur. 811, 39
- Noë arca 441, 2 pacem hominibus redditam significat. 442, 4
- nobilium Rom. cognomina ex arboribus. 11, 34
- noctua platanum refugiunt. 130, 35
- Noë primus vineam plantauit 495, 28
- nona Romanorum Caprotina dicta 171, 23
- Norion, insula fortunata. 681, 17
- nosse quid agendum, omni in negotio caput. 19, 11
- noualium cura & æstiuo & hyemali tempore assumenda 811, 35 nonale quid. 814, 22
- nuciperfici historia. 337, 29
- nucleus alii 799, 16 (153, 5)
- nummis antiquorum quercus inscripta
- nuptiæ sacra veteribus pappæa 844, 33
- nux inglans 414, 1 & dein. eius plantatio 417, 13 nucis inglandis insitio 418, 5 eius morbi, eorumque remedia 419, 5 con-
- ditura ibid. 16 materies 420, 3
- nux Persica 414, 27 Thasia 421, 21
- Græca 421, 23 anellana 429, 13 eius historia 429, 29 anellana satio 430, 29
- nux Heracleotica 429, 14. 433, 32
- Prænestina. 429, 17
- nucis a malis ut distinguantur 250, 18
- Nympha Bacchi nutrices 495, 8 & 33
- Nysiades nympha. 635, 8
- O
- Oblivio à vino inducitur. 22, 39
- Occidere quando opus 812, 20 unde & quid appelletur. 816, 18
- occatio quid 816, 18. (4, 27)
- Oceani insula quedam apud Diodorum
- ocimum quare à plerisque increpetur 700, 24 ocimi anceps nomen 701, 10 ocimi descriptio 701, 26. ocimi regio 702, 14 ocimi satio 702, 28. ocimi cultus vulgaris & artificiosus 703, 14
- ocima serere, prouerb. 702, 37 (& 20
- oculorum caligo æniculi succo tollitur 690, 4. oculis inimica corambe. 716, 31
- ocymum, idem quod ocimum. 701, 25
- odorata aqua ex loto. 629, 16
- odore solo Astomi victitant. 2, 24
- odores oleo seruantur. 444, 21
- odorifica vitis. 557, 6
- œconomus qualis esse debeat 17, 26. 18, 7 & deinceps œconomia tria aduocanda 19, 7
- œconomi officium in religione 19, 17
- œconomus Christianus 19, 26
- œconomum vendacem non emacere oportet 20, 30
- œconomi domus. 47, 8
- in œconomia quid primum, quid secundum, quid tertium. 24, 30
- œnanthe, è floribus coronariis 608, 30
- vago nomine 608, 31 unde denominetur 608, 34 quomodo describatur 608, 37 quo cælo gaudeat 608, 6



*O*eneus Orestei filius 494, 14 unde no-  
men indepius ibid.  
*O*Enei capella 494, 20  
*O*Enopion Chios vinea culturam docuit  
494, 32  
*oenopolarum* fraudes detectae 568, 16  
*offringere* terram 812, 16  
*olea* stirpium nobilissima 437, 28 quando  
in Italiam peruenierit 437, 32. 438, 1  
quamobrem Minerva dicata sit 438, 9.  
13, 30  
*olea* origo fabulosa 438, 31 *olea* inuen-  
tio 440, 2 quo in honore fuerit Athe-  
nienfibus 440, 17. 442, 11 quo Roma-  
nis 440, 36 *olea* supplicantiū & pacis  
symbolum 441, 2 *olea* necessitas & uti-  
litas 443, 10 *olea* rei medica necessaria  
443, 13 *olea* longana vita 444, 40 le-  
ni cultus sustinetur 445, 8 ficu praestā-  
tior 445, 14 *olea* prodigia 445, 30 *olea*  
nomē 446, 28 *olea* & oliua an discre-  
pent 446, 31 *olea* cum myrto amicitia  
448, 1 *olea* descriptio 447, 3. 448, 4  
*olea* ducentos viuit annos 447, 40 lon-  
ge vita est 448, 16 urbana & syluestris  
448, 36 *olea* diuersa ab oleastro 449,  
33  
*olearum* domesticarū genera 450, 7  
*olea* regia 451, 3 & 7 *olea* caelum & si-  
tus qui conueniant 452, 23 *olea* circa  
Larissam desierunt 453, 13 *olea* solum  
debitum 454, 14 quibus modis nasca-  
tur 455, 37. 456, 11 *olea* satio per semē  
456, 12 *olea* plantatio per ingentes ra-  
mos 456, 27 trunco in plures partes per  
longum discisso 457, 15 *olea* vsitatus per  
sobolem ferendi modus 458, 20 *olea*  
quomodo ex radicum oculis exurgat  
459, 30 *oleam* ferendi ratio per taleas  
460, 36 *olearum* seminarium 461, 2  
de *olearum* plantatione praecepta 461, 27

*olea* cum quibusdam arboribus odierit  
464, 1 & 2 *olearū* ferendarū internal-  
lū 464, 6 *olea* plantanda tempus 464,  
24 *olearū* cultus 465, 6 *olearū* sterco-  
ratio 466, 10 irrigatio 466, 36 *olea*  
insitio 468, 18 in *olea* quid arte para-  
tūve fieri possit 470, 8 *olearū* fertili-  
tatis & caritatis prognostica 470, 28  
*olearū* morbi 472, 1 & remedia, ibid.  
*olea* nouella fertilitas, morbida est 472,  
3 *olearū* particulares morbi, ut liche-  
nes 472, 29 arachniū 472, 32 aut ara-  
neum quoque 472, 36 & alii deinceps.  
*olearum* sterilitas ut castigetur 472,  
40. 473, 7 *olearum* morbi extrinsecus  
venientes 474, 23  
*olea* fructus duplex 486, 18 *olea* & o-  
leastro materies 490, 1 *olea* & vitis cō-  
cordia 554, 1  
*oleaster* pecus opimat 2, 11 *oleastrum* at-  
tulit ex Hyperboreis Hercules 11, 10  
*oleastro* origo 448, 38. 449, 5 *oleaster*  
elephanti amuletū 449, 19 *oleaster* ut  
ab *olea* differat 449, 33  
*Oleastrū* oppidi nomē 449, 29 (12, 29  
*olea* imperio a Diocletiano anteponitur  
*olei* utilitas 443, 34. 444, 19 *oleū* infania  
pharmacū 444, 13 *oleū* & oliuū vn-  
de dicatur 446, 40 *oleū* Turditanū  
455, 21 *olei* eliciendi instrumenta  
476, 28 *olei* collectio 478, 15 *olei* a-  
cerbi vel viridis faciendi ratio 479,  
33 *olei* tria genera 479, 34 maturi  
conficiendi modus 481, 29 vitis quē-  
admodum vindicetur 482, 20 *olei* di-  
uersa quadam genera 487, 26 *olei* na-  
tura Philosophorum dogmatibus elu-  
cidata 490, 20  
*olitoria* rei laudes 640, 15  
*oliterius* hortus 641, 20 *olitorii* horti  
remedia contra cæli uoxas 647, 38 ad-  
uersum



- persum bestiolas horto innascentes* 649, 6
- oliva cibum suaviorem efficiunt* 444, 32
- olinarum cōditura* 483, 37 *olinarum albarum* 484, 4 *nigrarum* 485, 11
- oliva colymbades quomodo fiant* 485, 36
- oluitati necessaria vasa uti ordinentur* 475, 36 *ante oluitatem qua prepa-  
randa* 475, 39 *oluitatis tempus* 477, 1 (688, 33)
- olusatrum* 686, 27. 687, 7. 688, 19.
- olus cordum quid* 672, 10 *olus quid vo-  
ceatur* 641, 15 *oleribus quale solum  
conueniat* 643, 1 & d. *quale vitan-  
dum* 643, 32 *oleribus aque conueni-  
entes* 644, 31. 645, 9 *qui simorum  
sint oleribus idonei* 645, 25 *oleribus si-  
mum adhibendi tempus.* 646, 7
- olerum sationes* 646, 19 *olera aceta-  
ria* 654, 5 *eruca vicinitate iuuantur* 666, 11 *olerum fecundissimum, cu-  
minum* 694, 18 *olerum quod dicitur  
nitare potissimum* 745, 6 *olerum duo-  
rum monstrum* 802, 19
- Olympia, Gracia urbis, ludi* 449, 10
- Olympias flatus in Chalcide Eubæe fri-  
gidus* 474, 30. 475, 9
- Olympicorum victorum corona* 11, 10
- Olympicorum ludorū inuentor Hercules* 444, 3 *corona ex oleastro* 449, 11
- olyra Mnesitheci* 842, 24 *olyra historia* 848, 24
- omomelis* 167, 4 (27)
- Omphale mulier dominatur Lydis* 620,
- onitis, origani species* 699, 19
- onopetalium, origani genus* 699, 18
- operariorum qualitas* 26, 17
- operatrices artes binis discriminatae par-  
tibus* 21, 12
- Ophellus Carthaginem petit* 169, 8
- op. of. oriden* 728, 36
- oporothea* 56, 15
- opuli descriptio* 129, 24 & 30 *eiusque  
materiei usus* 130, 6 *opulus vitem a-  
lit* 539, 1
- orchites olea* 450, 19 *eius usus* 450, 23
- orchitis denominatio* 450, 26
- ordenum, seu hordeum* 850, 7 *quot gene-  
rum* 850, 31 *ordeo conueniens cælum* 851, 13 *accommodum solum ibid.* 22
- ordei satio* 851, 32 *cultura* 853, 8 *in  
lolium mutatio* 853, 31 *messis ibi.* 37
- conditura* 854, 7 *ordenum hexastichon  
sive cantherinum* 854, 29 *distichon  
sive galaticum* 855, 28
- oreoselinon* 683, 3
- oreoselinum, herba* 689, 6
- Orestus Dencalionis filius* 494, 11
- origani historia* 698, 20 *species* 699, 20
- descriptio* 699, 30 *satio* 700, 10
- oris suauitas ab apio* 682, 30 *oris odorem  
commendat carduus* 732, 24
- orminum Attici quid vocent* 728, 13
- ornus, eiusq. qualitates & descriptio* 124, 25 *ornus pyrū malumq. recipit* 125, 5
- orobanche, erui vitium* 889, 25
- Orphei simulachrum ex cupresso* 85, 36
- Orpheus fabarum cibum prohibet* 875, 24
- oryza eadem quod olyra* 848, 29 *oryza  
historia* 855, 27
- Osiris qui idem cum Dionysio, agricultu-  
ra inuentor* 16, 24
- Osiris vitifator* 493, 32. 494, 35
- ratri inuentor* 814, 34
- Osiris quid sit* 635, 4
- oues ulmeis frondibus aluntur* 3, 11
- oxalidis historia* 677, 16
- oxalis, erumicis genere* 744, 23
- oxylapathum primum* 744, 20 *secun-  
dum ibi.* 22 *oxylapathi utriusque de-  
lineatio* 744, 25



oxyis, sine oxytriphyllon 678, 12 eiusq;  
descriptio 678, 14  
oximum, ab oza 701, 17

P

**P** Acis insigne olea 439, 9. 441, 12  
Padus, a picea vocatus 96, 37 Eri-  
danus quoque appellatur 137, 35  
pedagogorum insigne ferula 746, 27  
Pales, pastorum dea 752, 24  
Palilia festa 752, 24  
palinurus 381, 21  
Pallas Budia 815, 7  
pallorē inducit cumini 693, 40. 694, 4  
palma multos populos alit 2, 30  
palma historia 345, 4 & d.  
palmam dare, proverbium 11, 9  
palmitū duo genera 545, 6 pampinarium  
& fructuariū 545, 8 palmites precipi-  
tes qui dicantur 545, 24 palmitis genus  
quod materiam vocant 545, 33  
palmes focaneus quis 545, 35  
paludapium, palustre apium 686, 4  
palustria vsui inidonea 877, 23  
pampini ad quid vitibus dati 538, 36  
pampinula seu pimpinella 669, 31  
Panathenaea, Athenis magna sacra 441,  
4 à Theseo in Minerva honorem in-  
stituta 441, 5  
Panathenaei 11, 15  
παρχαεχ herba 631, 32 eius delineatio ibi.  
pancratium, quasi omnia complectens bo-  
na, herba 662, 10  
Pan, deus agrestis 8, 17 Pnyx adamat 86,  
19 Panes è pino comas facilitatas ge-  
runt 87, 32  
panificii tractatio 834, 16  
panis papanereus 737, 16, filigineus & si-  
milaceus 839, 23 tiphinus 843, 32 ex  
germano 843, 39 ex segala 844, 10 &  
24 farraceus 846, 36 ex Zea confectus  
848, 8 ex arinca 849, 4 olyrinus 849,

6, hordeaceus 854, 22 ex oryza 856,  
22 ex auena 858, 11 ex bromo 859,  
21 fabaceus 875, 14  
panici tractatio 861, 37  
panthera allium fugiunt 798, 21  
papaneris historia 736, 40 papaner ex  
Veneris lacrimis natum 737, 15 pa-  
paneris vis soporifera 727, 17 latifera  
737, 18 papaneris specierum descriptio  
737, 26 papaneris satio 739, 19  
Papyrii de Parthis triumphantis corona  
11, 3. 580, 34  
paradisi arbor 170, 34  
Paridis naues ad Helena raptum parata  
79, 40  
Paridius Veterensis filias uti dotaverit  
494, 4  
Parilia festa 752, 24  
Parnassus ob laurum Phæbo sacer 114,  
40. 115, 1  
Parthenius mons 767, 30  
parthenium, pro amaraco 626, 39  
partiū partes quoq; diuersantur 877, 31  
passi acini unde nomen sortiantur 578,  
13  
pastinaca, è cartilagineo genere 783, 21  
duorum generum 784, 11  
pastinatio vitium 512, 8  
Patauinorum vindemia salicem redolēt  
556, 4  
paterfamilias vide œconomus 17, 22 pa-  
terfamilias religiosus 19, 17  
Paulus Æmilius 11, 2  
Pausanias doctissimus & superstitiosus  
448, 38  
pausea, seu posea 451, 16  
peccatum peperit laborem 6, 18  
pecora hyeme fasciculis frondium nutri-  
untur 3, 7 pecorum cibus 3, 8 & 11  
pediti viatori myrti virgis utendum 388,  
19.

Pelasgis



# I N D E X.

- Pelagis regio, à Pelasgo nuncupata* 152, 31  
*Pelasgus vir magnus & sapiens* 152, 30  
*glandium cibum Arcadas docuit ibid.*  
*Pelei & Thetidis nuptia* 124, 19  
*Pelius Thessalia mons* 124, 20  
*Peloponnesus Apia unde dicatur* 12, 6  
*Pelops Hippodamiae potitur* 389, 25  
*peponis enarratio* 749, 19 *an à cucumere differat* 749, 26 *sine semine edendus* 749, 40 *unde nomen sortitur* 750, 1 *à melopepone discriminatur* 750, 6  
*Periclis caput oleaginea corona incinctū* 441, 3  
*Persarum nutrimentum* 2, 30 *reges* 6, 2  
*Persa Romanorū serui* 115, 28 *letalem arborem in Ægyptum transmittunt* 176, 15 *Persarum frugalitas & luxus* 667, 8  
*persea arbor ornamentū Alexandri Magni* 10, 33 *Harpocrati sacra* 13, 33 *de persea peregrina arbore* 176, 3 *Isidi sacra* 176, 8 *de persea diligentiores quid tradant* 177, 8  
*Perseus Macedonia rex* 441, 20  
*persica quatuor generum* 331, 17 *praco-*  
*cia* 331, 21 *Armenica* 332, 24 *du-*  
*racina* 333, 29  
*è Perside primum Memphis arbor per-*  
*sea traducta* 10, 34  
*Pesti, Calabria oppidi, rosaria* 588, 8  
*pestis remedia* 14, 15 *pestis tempore lau-*  
*rea utendum* 116, 24  
*petroselinum nostrum, antiquorum a-*  
*pium* 682, 25 *ut veteres indigitarint*  
*683, 4 petroselinon, in saxis nascens*  
*689, 9 & 26 petroselini Macedonici*  
*descriptio* 689, 21  
*Phaeton Solis & Clymenes filius* 137, 38  
*fulmine ictus in Eridanum labitur*  
*138, 2*  
*phalangium in eruo nascens* 823, 40  
*Phaon inter lactucas absconditus* 655, 4  
*phaseolus eiusque historia* 891, 1  
*phaulia olea species* 451, 10  
*phannos oleastri* 449, 25  
*phellodris delineatio* 152, 10  
*Philomela mille per vocum discrimina*  
*canit* 7, 30  
*Philometrus* 13, 3  
*philosophia commodus locus, villa* 9, 15 &  
*d. philosophia naturalis agricola ne-*  
*cessaria* 17, 34  
*philosophis facile ditari* 5, 26 *philosophi*  
*ruri vitam agunt* 9, 29  
*Philotis ancilla, eiusque facinus* 171, 25  
*Philoxenus, Aristotelis auditor* 875, 37  
*philyra veneri sacra* 13, 32 *philyra Theo-*  
*phrasti* 108, 7 *Dioscoridis* 108, 25, 41  
*Philyra, Oceani filia, à Saturno ada-*  
*mata* 125, 11  
*phoca pellis ad quid conferat* 561, 3  
*phthisicis cōducunt sylva resinosa piceave*  
*14, 11*  
*phthorium vinum* 556, 6  
*Phytognomonici scriptores* 14, 1  
*picea* 96, 15 *Neptuno & Libero patri*  
*consecrata* 96, 21 *arbor feralis* 96,  
*35 eius nominatio* 96, 39  
*picris, unde nomen adepta* 662, 27 *toto*  
*floret anno* 662, 34  
*pimpinella historia* 669, 19  
*pinafter quid* 95, 16 *uti appelletur* 95, 17  
*quot generum sit* 95, 22 *eius descri-*  
*ptio* 95, 26  
*pingui cibo indiga sunt sicca corpora* 810,  
*1*  
*pinus, arbor silvestris* 86, 12 *Cybele deū*  
*matri sacra* 86, 26 *natura imagi-*  
*nem refert* 87, 29 *fraudi dicata* 87,  
*31 mortis symbolum* 88, 3  
*pini denominatio* 88, 13 *descriptio*  
*BBBb*



- 88,32 species 90,8 colum 90,16  
 solum 90,27 satio 90,38 cultus 91,  
 21 morbi & remedia 91,26 condi-  
 tura 92,12 pini materies 92,16 pi-  
 nus ingēs, pulchra cognominata 93,6  
 pini resina 93,10  
 pinustractatio 408,15 fabula de pinu  
 408,21 pinus plantatio 412,3  
 Pinus puella fabulosa historia 86,18  
 piperis vicem supplet myrtus 388,8 fili-  
 quastrum 714,19  
 piperitis 714,25 & 32  
 pisces apio recreantur 682,29  
 pisi historia 879,1  
 Pisones, a piso 869,10  
 pistaceorū descriptio 431,30 satio 432,  
 28  
 pithire quid 738,11  
 pithitis, papaueris genus 738,8  
 Pityodes & Pityusa, maris Balearici in-  
 sula 12,8. 88,27 alia eiusdem nomi-  
 nis in sinu Argolico. ibid.  
 Pitys puella 86,20  
 pix optima & purissima 93,21 quo ma-  
 do vratur 94,12 Plinio quid 94,32  
 pix liquida Europa 95,3 picis duo  
 genera, spissum & liquidum 95,11  
 pix epicca 98,20  
 plantae ante omnia animalia mundo na-  
 te sunt 2,3 plantarum fructus ad  
 byemalem cibum reponuntur 2,21  
 plantae quibus modis exoriantur 179,  
 9 plantarum sponte nascentium gene-  
 rationes 179,28 plantarum generatio  
 ex radice duplex 185,1 plantarum  
 intervalla 193,30 morbi & corru-  
 ptiones 235,31 sua principia partim  
 intus habent, partim extrinsecus 236,  
 14  
 plantationis modos suppeditabit satio 178  
 plantanipracenium 130,2 nominatio, de-  
 lineatio 131,10 & 17 locus & satio  
 132,27 & 38 insitio ac materies 133,  
 14,22  
 plenilunius omnia rubigine afficiuntur  
 560,40 plenilunio incrementum ca-  
 piunt cucumeres 748,31 echini mari-  
 ni ibid. 32  
 Plinij error 74,26 mos vertendi per-  
 uertendiq; Theophrastum 687,15  
 Plinij & Columella conciliatio 837,21  
 Plutonis cupressus 13,32  
 Plutius Aristophanis 14,30  
 podagricis idoneus hordeaceus panis 854,  
 26  
 inter Pocula erratorum deinceps commi-  
 nisci parum conuenit 680,34 sed la-  
 uis reprehensio sufficit ibid. 36  
 poenitentia rei gesta nil agricolis facilius  
 193,39  
 Poeta, unde ex arboribus homines fingant  
 procreatos 3,34 poetarum, insigne  
 10,30. 11,17. 116,2 poeta vino ingur-  
 guandi 492,20 poetis smilax sacra-  
 tur 618,28 hederacea corona 635,  
 23 poetas lacte ac melle pasci 635,31  
 Polemon vetustus Aristophanis enarra-  
 tor 795,3  
 Pollio uti ad magnam aetatem peruenerit  
 443,22  
 polypremni herba succus arboribus ac-  
 commodus 252,39  
 pomarij materia & obiectū 249,21 La-  
 tinis quid 249,33 pomarij positio &  
 locus 251,3 pomario solum quod con-  
 ueniat 251,30 pomarij arbores ut fa-  
 cundiores euadant, media 252,31  
 pometum, seu pomarium 249,37  
 pomifera arbores aut frondem retinent  
 aut dimittunt 147,28  
 pomarium quid notet 250,2  
 Pomona pomorum dea 250,30 a Fer-  
 rumna



# I N D E X.

- ramno adamata* 250, 31  
*Pompeij fascibus laurus alligata* 115, 38  
*Pompeiani Campanie populi* 718, 26  
*unde nomen sortiti* 718, 32 *eorum or-*  
*tus & interitus* ibid.  
*pomum Adami* 270, 8 *pomum folij v-*  
*nus adherescētis* 176, 9 *quid sit* 250,  
 6 *generetam mala quam nuces con-*  
*tinet* 250, 22  
*poncerium, acriū citriorū genus* 269, 38  
*ponsilicis materie structus* 149, 19  
*Pontica arbor, quæ vinūt Arimphæ* 2, 31  
*populi a cibus nomen sortiti* 2, 32  
*populus, Herculi dicata* 13, 33. 134, 11  
*arbor infelix* 134, 2 *populi genera*  
 135, 3 *populi & ulmi differentia*  
 539, 24 *in arbasto recipienda* 539,  
 28 *ad alendam vitem maxime con-*  
*uenit* 540, 6  
*Populonia, vrbs Iouis simulacro celebris*  
 579, 1  
*porricide* 797, 27  
*porra, quid dicatur* 812, 23  
*porri tractatio* 794, 29 *unde nuncupe-*  
*tur* 795, 8 *duorum generum* 795,  
 11 & 22 *quali loco proneniat* 795, 34  
*porrum siluestre* 797, 33 *vineale vel*  
*vitigineum* 797, 38  
*Portius Latio clarus inter dicendi magi-*  
*stros* 694, 1  
*portulaca vitibus putredinē inhibet* 560,  
 7 *portulaca descriptio* 676, 1 & 31  
*portulaca satio* 677, 11  
*posea oliuæ species* 451, 15  
*Posthumius Siluius* 11, 36  
*potus herbidi per montium æstiuæ salu-*  
*bres* 14, 14  
*Praneste Italia vrbs unde nomen indepta*  
 148, 6  
*presentia domini quantum polleat* 19, 37  
*presentia domini, pronentus agri* 20, 2  
*prati percontatio* 904, 12 *prati genera*  
 905, 8 *prato aer, solum, aqua quæ*  
*conueniant* ibid.  
*prata quomodo fiant* 905, 37 *facta quo-*  
*modo colantur* 905, 16  
*premius, olea morbus* 447, 12  
*Priapus salignam falcem curgerat* 143,  
 28 *Loton deperit* 168, 23 *hortorum*  
*deus* 641, 28 *Corinthiis in magna ve-*  
*neratione* 642, 10  
*proditor quis* 24, 2  
*Promethensē filice ignem ferulis exce-*  
*pit* 680, 21 *a Minerva in cælos sub-*  
*latus* 746, 41 *ferulam accensam in*  
*terrā deportat* 747, 1 *primum ignem*  
*ē filice pronocauit* 747, 2 *ignem feru-*  
*la asseruari docuit* ibid.  
*propagatio plantarū* 186, 39 *unde nun-*  
*cupata* 187, 2 *propagatio duplex, ar-*  
*borum, & herbarum* 187, 10  
*propius sata aliis quæ perniciem inferant*  
 245, 16  
*proscindere terram* 812, 15  
*Proserpina a Plutone capta* 601, 15  
*aduersus Pruinam vineas ladentem re-*  
*media* 560, 19 *pruina suauitatē plan-*  
*tis confert* 723, 33 *non alibus officit*  
 811, 39  
*pruni commentatio* 339, 17 *prunorum*  
*genera* 340, 18  
*pseudonardus odore præstantissima* 633,  
 28 *eius species & nomina* 633, 32  
*quemadmodum feratur* 634, 5  
*Ptolemæus Energetes Aristarchi disci-*  
*pulus* 734, 20  
*pubertatem coerces hyacinthus* 605, 23  
*puerilis ætas ad agriculturā apta* 27, 5  
*puerperis petroselinan denitandū* 683, 6  
*pugio, flos* 607, 40. 608, 3  
*pulegium, herba condimentaria* 703, 40  
*capiti salubre* 704, 1 *quid miri de eo*  
 BBBb 2



prodiderint 704,3 unde deuocetur  
704,29  
pulegijspecies 704,38 regio & satio  
705,1  
pulices hortorum abigendi rationes 650,  
24 pulices terra originū enecat 757,  
21 raphanis innascentes erum arcet  
775,37  
pulmentaria ruris 800,39.801,8  
pulueratio oleis prodest 465,25  
pulsis vitibus excitandus 533,24 licet  
siccus nonnunquam alit 753,3  
pumila cerasus 380,6  
punica arboris historia 397,1  
punicum malum Mercurij 13,33 puni-  
corum malorum enarratio 397,1  
purgatoria vitis 556,30  
purpura sarrana 596,7 purpura Tyria  
Laconicaque 614,30  
putatio difficillima cultus vitis pars 544,  
12  
puteus quando effodiendus 644,4  
pyanipsia, festa Apollinis 869,22  
pyra cypresso circumdata 81,33 pyri hi-  
storia 287,35  
Pyrethi, Cappadociae magi 121,12  
Pyrrhaum nemus incensum 89,27.97,  
12,22  
Pythagoras & Pythagorici an faba vescā-  
tur 875,32 Pythagorei cupressino li-  
gno abstinebant 86,4  
Pythia carmina, a Pythone serpente dicta  
114,22 Pythia oraculum 2,36  
pyxacantha Nicandri 732,31

## Q

Q Vastus vinearum 5,30 & 36  
quercus Ioui dicata 13,27.152,35.  
153,1 arborum prima nata 152,24.  
153,3 cibum militibus suppediat  
153,1  
quercus diuturnitas 153,10 quercus

an à hemeri differat 153,35 quercus  
distributio 153,35 qua cæli consti-  
tutione proueniat 154,33 quercus sa-  
tio 155,14 quercus cum olea odinum  
155,21 an pyrum ferat 155,31 quercus  
materies 155,34 infinita aternitatis  
156,1 domestica arbor 156,13  
quercum cum olea complicari prouer.  
155,25

quies in toto natura opere 546,27  
quincuncialis arborum ordo 541,19.196  
3 eius typus 197,24  
quinquatrua Minervæ festa 752,14  
quinquennales ludi 11,16  
quinquennes ulmi transferuntur 541,31

## R

R Adicis plantatio 185,1 radicis ge-  
nera 771,31  
radicis Corinthie descriptio 776,19  
radius maior 450,33 ad escam idone-  
us ibid. 37  
radius minor, sine radiolus 450,40 un-  
de nuncupetur 451,1  
rami quid dicantur 189,5 per ramos se-  
rendi modus ibid.  
ramoracia sine ramoracea, aut etiam ar-  
mon 776,15  
ranarum sanguis viti commodus 558,25  
rapa in sinapi seruat 708,38 rapa-  
rum apparatus 778,1 an generis di-  
uersitatem habeant 778,40.779,5  
quale cælum, & quod solum appetant  
779,27 & 35 raparum cõsilio 780,7  
raphani tractatio 770,30 in delphico  
templo ceteris cibus antelatus 770,40  
raphano assignat Plinius quæ Theo-  
phrastus brassica 771,6 raphani gene-  
ra 771,30 raphanus frigoribus gau-  
det 773,24 raphani satio 773,34  
raphani artificiose producendi ratio  
774,33

raphanus



- raphanus silvestris* 776, 1 & 10 *diser-*  
sum quid a silvestri raphano 776, 12  
Es feri Es transferri potest 776, 31  
*rapius terra* 617, 16  
*raporum tractatio* 777, 1  
*rapum* e plumbo dicatum in tēplo Del-  
phico 777, 16. *rapi* Es *napi* differentia  
nulla 782, 8.  
*rapunculus*, acetariis conueniens 678, 23.  
eius *satio* 679, 4  
*rauca*, vermes in quercus radice nascent-  
es 464, 1  
*Rauenne* omnium operum fundamenta  
alneis palis 143, 6.  
*regalius studio agri colendi nihil* 10, 21  
*reges agricultura dediti* 12, 13 *regibus quā*  
*obrem sceptrā assignentur* 746, 26  
*regionum propria sunt munera* 823, 8.  
*Remi* Es *fratris vita* 8, 24  
*rerum parens ac nutrix, natura* 1, 26  
*resinarum alia candida, alia nigra, alia*  
*mellei coloris* 99, 23 *resina laricis* 101,  
28 *iuniperi* 104, 40  
*Rhabbarum monachorum* 744, 40  
*rhaas papauereum genus* 738, 8, 15 & 27  
*Rhea dea vitis* 494, 35  
*Rhegium* 12, 40  
*Rhemnus Palemon* 5, 37  
*Rhi Zophagi, nominati Ethiopes* 2, 34  
*Rhodiorum tributa* 6, 5 *ludi funebres*  
134, 4 *Rhodii veniam a Romanis de-*  
*precantur* 441, 23  
*ridica radicibus a ventis securitatem*  
*præstat* 550, 10  
*rigandi hora matutina atque vespera*  
703, 15  
*Riphai montes* 2, 20  
*robignalia feria Robigo instituta* 824, 22  
a quo Es quando 824, 26  
*Robigus, deus* 582, 18  
*robosenum pro robore veteres* 156, 25  
*robur, commune glandiferarum arbo-*  
*rum nomen* 147, 23 *robur quid* 153,  
9 a quercu differt 156, 12 unde nomē  
sumat 156, 26 *qua forma* 156, 28  
quando cadatur 159, 5 *roboris fru-*  
*ctus* 157, 1 *materies* 158, 32  
*robusti unde viri præstantes dicti* 153, 8  
*Romanis Iudæi tributum pendunt* 6, 4  
*Romanorum nobiliū cognomina un-*  
*de* 11, 34 *Romani posteriores Tiburti-*  
*bæ* 149, 13 a Romanis pacem rogant  
*Alexandrini* 441, 20 *Rhodii ibi.* 23.  
*Romani farre tantū principio vsi* 845,  
4 *Romanorum clariss. cognomina a*  
*leguminibus* 869, 10  
*Roma pulcherrima facta* 8, 25 *Roma*  
*pons ilicis tantum structus materie*  
149, 19  
*Romana maiestas magnum olea hono-*  
*rem præbuit* 440, 36  
*roratio vitium morbus* 557, 39 *tribus*  
*de causis accidit* ibid.  
*rosa inter flores princeps* 583, 35 *Veneri*  
*sacra* 13, 32. 584, 13 *humane vo-*  
*luptati imago* 584, 29 *Cupidini di-*  
*cata* 584, 32 *rosa multiplex fabula*  
584, 37 *rosa vita humane speculum*  
585, 14 *scarabeum necat* 585, 20  
*scorpionis amuletum* 585, 23 *amule-*  
*tum serpentis* 585, 23 *rosa nomen* 585,  
26 *descriptio* 585, 30 *genera* 586,  
10 *cælum* 587, 34 *rosa solum* 588,  
11 *satio* 588, 15 *cultus* 589, 11 *infi-*  
*tio* 589, 22 *ars* 589, 32 *conditura*  
590, 10  
*rosa rudis* 798, 24 (612, 36  
*Rosam cum anemone conferre: prouerb.*  
*rosmarinus qua natura qualitate* 632,  
8 & d. *quomodo seratur* 632, 36 *cul-*  
*tum exigit* 633, 4  
*Rubignalia* 254, 32



*rubiginis tractatus* 824, 4 *rubigo quid*  
824, 8 *pro rubigine remedia* 825, 1  
*rubrica Lemnia* 253, 30  
*rumen veteribus mamma* 677, 28  
*rumex, seu oxalis* 677, 27 *inter olera*  
*recensitus* 744, 8 *apibus incommo-*  
*dus* 744, 10 *eius usus in cibis* 744, 11  
*quos generum* 744, 19 *rumex quid*  
744, 35 *rumicis & lapathi interstin-*  
*ctio* 744, 35-745, 12  
*Rumopotinū quid vocetur* 539, 3-546, 32  
*rumopotinarum arborum spatia* 547, 1  
*runcatio, qua sarritioni subiungitur* 823,  
23  
*ruri domicilium proborum* 14, 32  
*rustica vita beatos efficit homines* 8, 27  
*urbanā antiquior* 10, 9 *rustica vita*  
*commoduates* 15, 1 & d.  
*rusticum opus sapientie consanguine-*  
*um* 14, 25 (ra 494, 3  
*rusticis nil convenientius vitis cultu-*  
*rusticum de farre canticum* 846, 19  
*ruta simum aspernatur* 645, 28 *ruta v-*  
*sus & conditura* 710, 17 *nomina &*  
*descriptio* 711, 1 & 12 *culcus* 712, 11  
*amicitia cum fico* 712, 35

S

**S** *Abai thure abundant* 6, 3  
*Sabellici populi qui* 719, 22  
*sabina, perpetua coma* 120, 27 *alia ste-*  
*rilis, alia frugifera ibi.* 31 *sabina her-*  
*ba duorum generum* 120, 34 *sabina*  
*non herba sed frutex ibid.* 40 *uti pro-*  
*pagetur* 121, 1  
*Sabinorum veterum vita* 8, 23  
*sacchari historia* 902, 14  
*Sagunti Diana templum* 104, 30  
*sala corruptionis vitio vindicat* 159, 26  
*trahit absque humorem* 773, 14  
*salsa aqua plurimum fertilitati conse-*  
*runt & suavitati* 727, 10

*salsa tellus frugibus infelix* 810, 25  
*Salentinorum regioni oliveta ingentia*  
452, 8  
*salix, arbor necessaria* 143, 19 *salicis*  
*species ac descriptio* 144, 5 & 20 *sa-*  
*lix quo loco, quae ratione proveniat*  
145, 5 & 13 *salicis insitio & materies*  
146, 7 ac 16 *an viti commodet* 539,  
9 & 15  
*salignum lignum vini vitium omne tollit*  
572, 22  
*salinca Virgiliana* 633, 35  
*Salomon sapientiss.* 13, 2  
*Salona Diocletianus ruri agit* 8, 1 *Salona*  
*oleta* 12, 29  
*salpa obscænis piscis* 746, 40 *non nisi fe-*  
*rula vapulans coquitur* ibid.  
*salsicortex* 162, 16  
*salvia historia* 713, 19 *salvia & spha-*  
*celi differentia* 713, 37  
*Samnium aurum repudiatum a M. Cu-*  
*rio* 12, 22  
*sampsucum, herba* 626, 12 *anidem cum*  
*amaraco* 626, 37 *unde appellatum*  
627, 21 *sampsuci descriptio* 627, 1  
*sandition quid nuncupetur* 667, 25  
*sanguisorba, quibusdā pimpinella* 669, 33  
*sanitas ex villa conquiritur* 13, 37. 13, 38  
*sancion quid nominetur* 667, 25  
*scarabeus frumenta rodens* 825, 24  
*scella, sine scilla* 805, 8 126  
*sceptra qua de causa reges usurpent* 746,  
*schoenium Galeni* 805, 8  
*schole in hortis* 9, 33  
*scilla bulbi beneficio sata facilius compre-*  
*hendunt* 555, 24 *scilla, è capitatorū*  
*genere* 804, 31 *scilla delineatio* 805,  
12 *species* 805, 33  
*Scipio Linternum deligit* 9, 24 *Scipio*  
*Africanus* 11, 1  
*scleara unde deriuetur* 811, 18  
*scolo-*



# I N D E X.

- scolopendra gladiolo gaudet* 608, 8  
*scolymi descriptio* 732, 34  
*scordi inuentor* 13, 8  
*scorodoprasi historia* 802, 14  
*scrobes effodiendi praecepta* 198, 20  
*scylla vide scilla*  
*Scytharum Argippai* 3, 29 *Scytharum habitacula* 3, 27 *Scythas arbore vestiri* 4, 12  
*Scythicum frumentum celeriter crescit* 704, 9  
*sapa quo tempore coquenda* 570, 37  
*sapientia rusticum opus affine* 14, 25  
*sapinus, quibusdam inferior abietis pars* 98, 29 *aliis arbor peculiaris* 98, 30  
*pineae species* 98, 38 *Porta picea domestica* 99, 12  
*Sardes in Lydia* 12, 15  
*Sardina per Aristum arboribus consistit* 13, 20  
*Sardorum dementia* 2, 8  
*sarmenta vitium quando colligenda* 511, 27 *qualia ad vitis insitionem accipienda* 549, 25  
*Saron Archadianemius* 153, 33 *Saron rex* 153, 33  
*Saronicus sinus à quercu nomen accepit* 153, 32  
*saronos, antiquis quercus* 153, 32  
*sarrire quid* 822, 31  
*sarritio* 822, 29 & 36. 823, 1  
*sationes plantarum multifaria* 178, 29  
*arborum per truncos* 183, 9 *satio surculi* 191, 15 *sationem etiam foliis fieri posse* 192, 22 *satio per lachrymam* 193, 8 *sationis plantarum stata tempora* 200, 26. 819, 16 *variapraecepta* 203, 1 & deinceps  
*satio umpestes* 245, 18  
*satureia feritur in hortis pro cibis condiendis* 695, 15 *utilior medicina in montibus prouenit* 695, 16 *satureia genera, ac descriptio* 696, 28 & 36  
*locus & satio* 697, 1 & deinceps  
*Saturni vita* 8, 26 *reliquia* 10, 16 *Saturnus rei rustica inuentor* 16, 26  
*Philyram deperit* 125, 11 *genitori Caelo genitalia detruncat* 809, 13 *filios cur fingatur deuorasse* 181, 13  
*satus per excellentiam* 819, 24  
*Satyri factas è pino comas gerunt* 87, 32  
*sauina, idem quod sabina* 120, 29  
*secalis historia* 844, 6  
*segala, veterum siligo* 844, 6  
*Segesta segetum dea* 807, 16  
*segetalis flos* 608, 3  
*Segetia, segetum dea* 807, 17  
*segetis enarratio* 806, 6 *seges quid* 807, 11 *segetum cultura* 811, 24 *vitia & remedia* 823, 31 *segetum fertilitatis praeotio* 826, 34  
*Seia, segeti addicta dea* 807, 17  
*selinum odoratum, urbanum, hortense* 683, 1  
*Semele, Cadmi filia, eiusque fabula* 494, 41  
*semen frumenti genus* 846, 38. 847, 22  
*semen producentia nascuntur omnia semine* 180, 37 *semine nata non omnia degenerant* 181, 31 *semen vetus naturam aliquando immutat* 721, 12  
*semine sata omnia meliora nascuntur* 800, 25 *semina ne depascantur ab alius* 801, 39 *seminum electus in serendo* 818, 23 *seminum vita ad generandum definita* 818, 27 *seminum vitia quaedam communia, quaedam propria* 823, 35 *seminibus morbi ex quibus causis proneniant* 824, 1 *seminis corruptio & putrefactio* 836, 2 *seminum natura viuacior quam animalium* 836, 10



<i>Sementis tempora</i>	819,16	<i>Sernia corolla</i>	180,22
<i>Seminij principium ab aere</i>	180,8	<i>Senero Imp. cupressus mortis ostentum</i>	82,3
<i>Semiramidis Persarum regina horti</i>	61,20	<i>Sesamum, sesama, sesima</i>	866,8
<i>Semnones dii qui</i>	641,29	<i>sentlomalachon, quasi malnacea beta</i>	741,16
<i>senecionis descriptio</i>	664,23	<i>Sextius è Romanis sapientia affectatori-</i>	5,27
<i>senectus pigrum quem reddit</i>	21,28	<i>bus</i>	582,13. 824,34
<i>seniorum sunt imperia</i>	23,32	<i>Sibylla oracula</i>	810,1
<i>senibus</i>		<i>ficca corpora pingui indiga sunt cibo</i>	808,3
<i>conueniens baculus ex ferula</i>	746,32.	<i>Siculus Sicilia rex</i>	237,9
	747,8	<i>sideratio plantarum morbus</i>	669,30. 670,3
<i>serenitates vitia frumentis afferunt</i>	808,32	<i>siderum influxus in pla itis liquido perci-</i>	18,9 sidera tam a nautis quam
<i>Sergia bacca. sine Sergiana</i>	452,4	<i>agricolis obseruanda</i>	18,14
<i>serendi ars diuina</i>	13,21	<i>Sidon ab Artaxerxe obsessa</i>	441,16
<i>serendi tem-</i>		<i>Silago, xopovò μιν</i>	675,15
<i>pora</i>	646,31	<i>silaticum</i>	595,34
<i>praeceptiones</i>	821,39	<i>Sileno smilax sacratum</i>	618,28
<i>Seres, apud Indos, lanificio siluarum nobi-</i>		<i>ferula</i>	746,12
<i>les</i>	4,19	<i>Siliceus pons Campania</i>	759,22
<i>serica indumenta</i>	4,18	<i>silicula, siliqua, silicia</i>	165,5. 901,13
<i>seris herba</i>	659,34. 660,7		14
<i>duum gene-</i>		<i>siligo, tritici vitium</i>	837,17
<i>rum</i>	660,22	<i>tritici deli-</i>	837,20
<i>seris seu chondrilla</i>	663,2	<i>cia</i>	837,30
<i>serpens fraxini succum odit</i>	122,17	<i>olura falso dicitur</i>	848,27
<i>ab</i>		<i>siligo spuria</i>	850,12
<i>Hercule interfectus, inter Arctos rela-</i>		<i>siliqua siluestris arbor</i>	101,39
<i>tus</i>	257,25	<i>siliqua hi-</i>	164,34
<i>quercinis foliis iniectis</i>		<i>storica</i>	891,29
<i>moritur</i>	156,22	<i>siliquarum tractatus</i>	714,19
<i>serpentes punica ar-</i>		<i>siliquastrum piper supplet</i>	714,19
<i>bore non truci contra Africanum</i>		<i>quastri historia</i>	8,17
<i>Plinium</i>	397,10	<i>Siluanus senex</i>	11,35
<i>serpens in vinde-</i>		<i>Siluanus &amp; Siluij unde appellati</i>	3,15 & d.
<i>miis viti implexus acidum praedicat</i>		<i>siluarum habitatio antiquitas</i>	4,5
<i>vinum</i>	567,30	<i>siluae, deorum habitacula</i>	4,7
<i>serpentis virus è vino</i>		<i>silua sanitati confe-</i>	14,11
<i>ferrum elicit</i>	572,22	<i>runt</i>	62,5
<i>serpentes trifol-</i>		<i>silua antiquorum duplex</i>	62,6
<i>lium fugiunt</i>	628,20	<i>silua quid</i>	62,20
<i>quibus depel-</i>		<i>siluarum dii</i>	62,34
<i>luntur</i>	653,16	<i>siluis quae</i>	
<i>nasturtij suffitu fu-</i>		<i>regio-</i>	
<i>gantur</i>	667,16		
<i>serpens senectam ex-</i>			
<i>uens</i>	690,3		
<i>&amp; deinceps, serpentes ex</i>			
<i>hortis abigit ruta</i>	713,20		
<i>accersit sal-</i>			
<i>uia</i>	ibid.		
<i>Serpillu an inter coronarias herbas locum</i>			
<i>sibi vendicare possit</i>	621,28		
<i>unde no-</i>			
<i>men indispiscatur</i>	621,37		
<i>Serta cur stephani dicta</i>	580,27		
<i>Sertula campana, seu melilotum</i>	627,30		



<i>regiones, quæ loca abundant</i>	63, 11	<i>solum idoneum</i>	32, 16. 809, 25	<i>solum</i>	
<i>siluaglandaria</i>	147, 6	<i>fugiendum</i>	36, 7	<i>soli vitia ut emen-</i>	
<i>siluestria satinis priora</i>	61, 27	<i>acriora</i>		<i>dentur</i>	37, 6
<i>Et sicciora omnia</i>	797, 35			<i>ad solum fundi necessa-</i>	
<i>siluestrium arborum natura</i>	65, 37			<i>ria</i>	44, 5
<i>silurus piscis</i>	561, 1			<i>soli qualitates explorandi</i>	
<i>sinapi callidiorem esse</i>	709, 9			<i>ratio</i>	810, 11. 811, 2
<i>sinapios usus</i>	708, 20	<i>derinatio</i>	709, 13	<i>somnia vera videri laurus efficit</i>	113, 38
<i>species</i>	709, 18			<i>somnos allicientes flores</i>	581, 10
<i>Sinus Saronicus</i>	12, 8			<i>hedypnoide conciliatur</i>	664, 19
<i>siferis enarratio</i>	785, 2	<i>quando seripos-</i>		<i>sonchos, σόνχος</i>	665, 5
<i>fit</i>	785, 21			<i>soporifera vis papaueris</i>	737, 17
<i>sifymbrium, odorata planta</i>	624, 35			<i>sorbi genus siluestre</i>	174, 15
<i>quæ eius denominatio</i>	624, 40	<i>quæ</i>		<i>aptius</i>	174, 19
<i>genera</i>	625, 8	<i>eius descriptio</i>	ibid. 11	<i>sorbus, Et sorbum</i>	296, 35
<i>cælum</i>	625, 29	<i>solum Et satio</i>	ibid. 33	<i>forices a vineis abigendi ratio</i>	561, 14
<i>Et 36 semine caret</i>	625, 35	<i>eius cul-</i>		<i>Sospater Paphius quando floruerit</i>	734, 19
<i>tus</i>	626, 1			<i>de Spanachiis percunctatio</i>	741, 3
<i>Sifymbrium, veteribus comædiis mere-</i>				<i>sparagus apheresi, asparagus</i>	728, 17
<i>tricula</i>	625, 1			<i>species alia in aliam naturaliter nõ com-</i>	
<i>sitanium, Et setanium</i>	840, 37			<i>meat</i>	835, 23
<i>situs ville</i>	31, 11			<i>specierum mutationes</i>	
<i>smilaces arbores</i>	148, 35			<i>fiunt in propinqua genera</i>	837, 6
<i>smilax Arcadum</i>	152, 8			<i>spelta siue spentia</i>	847, 19
<i>smilacis flos</i>	618, 23			<i>Spermophagi unde dicti</i>	2, 35
<i>smyrnij Dioscoridei descriptio</i>	687, 26	<i>Et</i>		<i>sphaceli delineatio</i>	713, 38
<i>36</i>				<i>sphacos, salvia species</i>	714, 4
<i>smyrnion agreste</i>	688, 34			<i>spica nardi</i>	633, 32
<i>Socrates per platanum iurat</i>	131, 5	<i>deum</i>		<i>spina alba</i>	174, 37
<i>unum existimat</i>	153, 18	<i>per quercum</i>		<i>spina silvestris</i>	174, 39
<i>deierat</i>	ibid.			<i>spina nuptialis</i>	175, 4
<i>solanum esculentum</i>	745, 16	<i>hortense</i>		<i>spina Æ-</i>	
<i>745, 18 hortense quot generum</i>	745, 24	<i>sponte provenit</i>	745, 34	<i>gyptia</i>	619, 28
<i>sol Elector vocitatus</i>	137, 36			<i>Theophrasto ἀκάρτος</i>	
<i>soles latiores quando sint</i>	8, 1			<i>619, 32 Dioscoridi spina Arabica</i>	
<i>Soloni in multis adiutor Epimenides Pha-</i>				<i>ibid. 33 duarum specierum, candidæ</i>	
<i>stius</i>	442, 22			<i>Et nigra</i>	620, 3
<i>solstitium per oleam indicatur</i>	448, 6	<i>Et</i>		<i>ubi nascatur</i>	620, 8
<i>28 solstitium æstivum quando inci-</i>				<i>spiritus silens sensu perspicuus</i>	453, 30
<i>dat</i>	813, 22			<i>spiritus vegetiores nasturtio reddun-</i>	
				<i>tur</i>	667, 14
				<i>splenetico homini remedium tamarice</i>	
					121, 40
				<i>spleni medetur myrica</i>	122, 7
				<i>sponsa olim asparago in coronis usa</i>	727, 19
				<i>spuma Græcis ἀφρός</i>	801, 9



<i>Sp. Melius</i>	12, 25	<i>suffrutices quid</i> 65, 24 <i>an tolerant infir-</i>	
<i>Squilla Varronis</i>	805, 11	<i>nos</i>	222, 28
<i>Statius sua carmina Silvas vocet</i>	62, 31	<i>sulcus quid vocetur</i>	812, 22
<i>Stelis &amp; hyphear</i>	76, 4	<i>supplicantium symbolum, olea</i>	441, 12
<i>Stephanus, corona auctor</i>	580, 27	<i>surculi plantatio</i> 191, 14 <i>surculus quid</i>	
<i>Sterces, sine Stercentius, agricultura denu</i>		191, 18 <i>surculus an a subiecto trunco</i>	
16, 34		<i>alimentum capiat</i>	207, 10
<i>stercorationis ratio</i> 228, 9 <i>stercoratio</i>		<i>Surrentini colles oliuetis conuestiuntur</i>	
<i>agri</i>	816, 32	455, 35	
<i>stercoris qualitates</i>	228, 28	<i>Suse, Persia vrbs</i>	590, 29
<i>sterilitas salice inducitur</i> 143, 25 & 34		<i>Sybaris, vrbs</i>	154, 9 & 16
<i>sterilitatis symbolum, salix</i>	143, 25	<i>Syria vallis unde nomen acquisierit</i>	12, 3
<i>sterilis arbor fructum ut ferat, experimen-</i>		<i>syriaca arbor</i>	165, 7
<i>tum</i>	253, 1		
<i>stirpium divisio</i>	65, 4		
<i>Stolonum cognomen</i>	11, 40		
<i>stomacho inimica brassica</i> 717, 17 <i>cina-</i>			
<i>ra</i> 733, 28 <i>scolymum salubre</i> 733, 29			
<i>stomachum corroborat portulaca</i> 676, 2			
<i>stomachum recreat oxys</i>	678, 3		
<i>streptos oleaster</i>	449, 26		
<i>strophium quid</i>	580, 21		
<i>struthos auicula</i> 739, 13 <i>struthos herba</i>			
739, 14			
<i>studiis aptissimus locus, villa</i> 9, 15 & d.			
<i>suauiter loquens, melilotum loqui dicitur</i>			
627, 33			
<i>suber arbor glandifera</i> 151, 2 <i>perpetua</i>			
<i>frondis ibid. describitur ibid.</i> 8 <i>mate-</i>			
<i>riam qualem proferat</i> 151, 26 <i>suberi</i>			
<i>falso Plinius tribuit qua phellodri</i>			
<i>Theophrastus</i>	151, 36		
<i>tanquam suber, prouerb.</i>	152, 1		
<i>sues sine liene quando reperiantur</i>	121, 39		
<i>suibus splenis incremento laborantibus</i>			
<i>tamarice succurritur</i> 122, 4 <i>sum-</i>			
<i>caro pinguis &amp; lenis unde reddatur</i>			
163, 7 & 39			
<i>suberiquercus, arbor</i>	152, 4		
<i>Sublicius pons Tyberinus</i>	149, 19		
<i>suffragia per fabas lata</i>	876, 4		
		<i>Talea quid</i> 189, 9 <i>unde taleare, vox</i>	
		<i>rustica</i>	ibid.
		<i>talpas perdendi ratio</i> 652, 41 <i>ut eas-</i>	
		<i>dem Graci persequantur</i> 653, 6 <i>tal-</i>	
		<i>pas abigendi ratio</i>	736, 32
		<i>ta marice, planta per antiqua</i> 121, 3, 6	
		<i>ipsiusq; descriptio ibid.</i>	(682, 3
		<i>tarchon Simeonis Seti unde derinent</i>	
		<i>Tarquin. Priscus papanera decutit</i> 737, 1	
		<i>Tartessum, Hispania ciuitas</i>	449, 21
		<i>tauri feroces caprisico mitigantur</i> 171, 17	
		<i>taurini fellis in arboribus usus</i> 253, 34	
		<i>taxa, lauri species</i>	120, 1
		<i>taxus, arbor perpetuo frondens</i>	109, 6
		<i>in inferni opacis nasci ficta ibid. lati-</i>	
		<i>fera</i> 109, 14 <i>taxus ubi plurimum pro-</i>	
		<i>ueniat</i> 110, 5 <i>qua materie sit ibid.</i>	14
		<i>Toga ciuitas Arcadia</i> 153, 17 <i>unde Te-</i>	
		<i>geates</i>	ibid.
		<i>tegos pro lupanari</i>	153, 17
		<i>Telemachus Pylum nauigat</i>	80, 11
		<i>Telephanes, &amp; rex &amp; agricola</i>	12, 37
		<i>telephium a Telepho appellatur</i>	13, 9
		<i>Telephus Mysia rex</i>	13, 10
		<i>telephyllon, ramus papaneris</i>	737, 10
		<i>tellus non fructificat</i>	254, 7
		<i>Tempe frigida</i>	8, 11
			tempe-



- tempestatis prænunciatio 678,5  
 temporis ratio per populum indicata  
 134,6 tempus per Herculem inter-  
 pretantur physici 134,11  
 temulentiam restinguit hedera 581,4 flo-  
 rum odor 581,7 contra temulentiam  
 brassicam pollere 715,25 & 32 te-  
 mulentia & crapula discrimen 716,20  
 temulentis per commoda baccaris 631,26  
 terebinthus arbor nomen unde sumpserit  
 101,37 terebinthus maris & foemina  
 genere 102,1 terebinthi insitio 103,1  
 resina 103,5 terebinthus Theophra-  
 sti 431,35  
 terebra quibus vites perforantur 551,15  
 terebratione inferendi modus 218,23  
 terra cultura qua qualisq; Adamo de-  
 mandata 2,7 terrâ antiquiores ar-  
 bores 2,8 terra imperium non recu-  
 sat 5,11 sine usura nihil reddit 5,12  
 terra mater & Ceres dicta 10,15 ter-  
 rarum plantis aptiorum optima qua  
 252,14 terra à terra differt 809,1  
 textrices, veneri maxime opportuna 749,  
 14 (471,1  
 Thales Milesius Astrologus 5,19. 18,40.  
 thelyphthoron 620,23  
 thelythamnon 620,23  
 Themis Atlanti quid prædixerit 257,28  
 Themistocles à Græcis oleaginea corona  
 honoratus 440,30  
 Theodori versio notata 82,37  
 Theophrasti hortus 9,34  
 theriaca sine thyriaca vitis 556,10 & 21  
 Thesei, denictio Minotauro, corona 11,5  
 Theseus magna sacra Athenis instituit  
 441,5. 442,28  
 Theseo sonchon apponit Hecale 665,6  
 Thesmophora, latrrix legum Ceres nun-  
 cupata 807,22 (ceta 453,12  
 Thessalia regio, emissio lacu, frigidior sa-
- Thessali ad Achillis tumulum quid insti-  
 tuerint 609,23  
 Thessalus Pisistrati filius 445,32  
 Thetidis cum Peleo nuptia 124,19  
 Thracia montes sisymbrio scatet 625,31  
 Thracius lapis aqua accenditur 443,30  
 oleo restinguitur ibid.  
 Thrasybulus corona oleaginea insignitur  
 440,39  
 thanni, marini porci 155,3  
 thuris ubertas apud Arabes 6,1 apud  
 Sabeos 6,3 thure diis nil gratius 632,  
 20  
 Tharii, olim Sybari 154,23  
 Thurinus ager quercu insignis 154,8 &  
 thyma Galeno quid 695,26 (16  
 thymbra quid 695,24 & 30  
 Thymbra oppidum 696,20 in quo tem-  
 plum Apollinis sacrum ibid.  
 Thymbræus fl. 696,22  
 thymos 623,22 unde distus ibid. 34 cur  
 eius fructus in Attico solo acris 623,  
 Thyna, Thracia locus 624,17 (39  
 Tiberius Cæs. ad villam transmigrauit 9,  
 22 Tiberij Cæs. pons naumacharius  
 100,22 & 32 Tiberio Cæsari toto  
 anno cucumis præbetur 754,9 Tibe-  
 rio Claudio principi venenum à con-  
 inge datum 766,8 Tiberius princeps  
 è Germania quid afferri insit 785,2  
 Tiburtes Romanis antiquiores 149,13  
 Tiburtus Tiburtum conditor 149,15 fi-  
 lius Amphiarai ibid. 16  
 tilia, sine philyra 125,11 ubi proveniat  
 126,26 tilia omnia pomorum genere  
 onusta iuxta Tiburtes 126,30 tilia-  
 ceis tabulis ob imbecillitatem homi-  
 nes circumdari 127,9  
 tinctorum herba 902,1  
 tinus, lauri species 119,24 an sit Theo-  
 phrasti quædam 119,34



- tipha duplex, palustris & cerealis* 842,9  
*tipha cerealis* 842,11 *diversa ab olyra* 842,25  
*tipha quando feratur* 843,21  
*tipha cerealis descriptio* 842,40  
*tirunculus ut senex contemnitur* 21,26  
*Tirynthij pyris siluestribus vescuntur* 2,29  
*Tmolus, Cilicia mons* 604,17  
*aduersus Tonitrua remedium laurus* 116,29  
*tonitru ob ubertatem praecognoscendam observatum dignum* 254,15  
*tonitrus & fulguris noxam a vino quid abigat* 571,29  
*tonitru terram hiare, quasi in solatione ac aeris impulsu* 768,40  
*tonitrus & fulminis prodigia quadam cecis habent causas* 769,5  
*torcular* 53,22  
*toxica unde dicta* 109,15  
*tragum ex olyra faciendi ratio* 849,9  
*tranquillitas animi in villa quaritur* 9,15  
*Transpadana Italia arbuta* 539,13  
*Trebula, solo aequata* 503,3  
*tributa varia* 6,1  
*Trifolius collis* 502,37 *mons Neapolis imminens* 629,2  
*trifoliorum multitudo* 502,38  
*trifolium asphaltites, quorum nominum* 628,19  
*ut describatur* 628,25  
*quo solo producat* 629,1  
*trifolium pratense* 678,9  
*Triptolemus aratri inuentor* 814,31  
*trifolium abies* 75,2.76,33  
*triticeum genus quoniam caelo & solo luxuriat* 808,10  
*triticum omnium stirpium nobilissimum* 806,18  
*triticum ferendi tempus* 821,11  
*triticum omne conuertere in siliginem* 837,18  
*triticum trimestre* 839,39.840,4 & 30  
*bimestre* 840,6 & 8.841,1 & 8  
*triticum trimestre nullum esse* 840,12  
*triticum vere satum* 840,26  
*triticum quadraginta dierum* 841,2  
*siluestre, & exile* 843,13  
*triticum Indicum* 849,14  
*Turcicum* 849,19  
*Indicum quo modo ab Indis feri soleat* 849,37  
*tritici vitium cantharis* 823,40  
*tritici commentatio* 827,38  
*tritici differentiae* 328,4  
*delineatio* 829,20  
*varia caeli qualitates tritico convenientes* 830,9  
*consuetudo ibid.* 23  
*mutationes in lolium* 835,20  
*tritici & tipha transmutatio* 843,27  
*triumphaturi Caesares laureas unde decerpserint* 115,23.119,2  
*triumphantium ministri oleagineis corollis cur vsi* 580,28  
*trobellum quid Pollux dicat* 451,12  
*truncus quid* 188,14  
*trunco feruntur & arbores & herba* 188,16  
*trunci significatio* 45,8.28  
*tubercula corporum ex calore ac sanguine* 769,12  
*tuber terra* 617,14  
*tuber acerinum* 128,11  
*tuberes, e mespilorum genere* 386,10  
*tuberum tractatio* 768,18  
*tuberes nil nisi radices sunt* 768,23  
*tuberum usus* 768,25  
*tuberibus aliqua cum caelo cognatio* 768,36  
*tuberes cur tonante Ioue nascentur* 768,39  
*tuberum forma* 769,30  
*tuberum quaedam arenosa, quaedam sincera* 770,4  
*tuberum seminaria* 770,14  
*urdi myrtum suis nidis ingerunt* 388,24  
*Tusculanus secessus* 10,1  
*Tusculana quaestiones a disputationis loco indigitatae* 10,2  
*Tyli insula lanificium* 4,25  
*typha distinguitur a tipha cereali* 842,26  
*Tzezes Lycophronis interpres* 171,41  
*Vacci-*



# I N D E X.

## V

**V** Accinium, unde dictum § 93, 13  
 quid sit § 93, 31  
 vacerra, clatrorum genus § 6, 14 ex ro-  
 bore, quercu & subere ibid.  
 valetudo inoffensa ut retineatur 443, 20  
 Valentis in patibulo cupressus confita 81,  
 21  
 vappanobilis, vini Surrentinum § 02, 13  
 vappa unde fiat § 66, 17. § 67, 4  
 in Vaticano ilex 149, 12  
 vbertatis futura prognostica 148, 18. 254,  
 1. 826, 35  
 vbolima in Libya § 54, 7  
 vectes ilignei & aquisolij 149, 23  
 vectigalia arborum §, 41  
 Veientana silua 115, 35  
 Venafrani agri oliuetum 453, 14  
 venenosa animalia 3, 29. § 56, 7  
 venenum terra 617, 20 contra venena  
 omnia antidoton 628, 20 & 32 ve-  
 neni antidoton, ruta 710, 32  
 veneris remediis quid conferat 13, 31  
 veneri simulanda nata eruca 666, 3 ve-  
 nerem sedat cucumis 748, 35. 749, 14  
 Venetia arbuta § 39, 15  
 venti optimi 255, 36. 825, 35  
 ventris dolores virgā myrica sedare 122, 1  
 ventris morbis lotophagos immunes  
 169, 5 & 20  
 vennuculum rutilum 845, 15  
 Venus punicum senit 13, 18 Veneri sa-  
 crate arbores 13, 31 cogitationes irre-  
 tit 22, 41 Adonim luget 612, 25.  
 737, 15 hortorum tutrix 641, 26  
 venustas per Adonim figurata 612, 32  
 verba cupressus similia; prouerb. 83, 6  
 Vergiliarum occasus 819, 19 & 21. 820,  
 32 per excellentiam satius appellatur  
 819, 24  
 vere calor exiguus 452, 33 ver & autu-

mnus sese imitantur 464, 40  
 vermiculatio, plantarum morbus 238,  
 10 olca morbus 472, 9  
 vermiculorum plantas infestantium spe-  
 cies 472, 17  
 verni aeris qualitas equalis autumuali  
 § 47, 39  
 Vertumnus Pomonam adamat 250, 31  
 vernaculum quid 814, 21  
 verni iuniperinum 104, 28  
 vespertilionis tactu oua ciconiarum ste-  
 rilesunt 130, 39 vespertilio per pla-  
 tanum torpescit 131, 1 vespertiones  
 hedera suffitu necantur 635, 37  
 Vestalium virginum capillus 169, 35  
 vestes ab arboribus prabentur 4, 10 a  
 plantarum corticibus 4, 15 vestibus  
 prodest amaranthus 609, 19  
 Vesunius mons § 00, 40. 767, 28  
 vicinorum ob iniurias qui suas sedes reli-  
 querint 44, 35  
 victorum insigne 10, 30 & 36. 440, 18  
 & 21  
 vidua & femina & arbores § 37, 23  
 villa illecebra 6, 8 villa operarij quales  
 esse debeant 26, 17 villa cælum 28, 5  
 situs 31, 11 solum idoneum 32, 16  
 villicationis prefectus instituitur 21, 17  
 villica qualis esse debeat 24, 4  
 villici boni officium 21, 17 & d. villi-  
 cus malus, peior, pessimus 23, 37  
 Vinalia 254, 31  
 vincaperuinca 618, 3 & 6  
 vinculi genera ad insitionem § 48, 33  
 vindemia quando agenda § 63, 10. § 64,  
 14 quomodo faciende 464, 29. § 65, 8  
 vindemiarum leges § 64, 23  
 vindemiator, stella § 64, 19  
 vineatica falcis figura § 28, 7  
 vinea nouella fossio § 19, 22 pampina-  
 tio § 20, 7 ablaqueatio ibid. 39 re-



secatio § 21, 20 putatio § 21, 32 plan-  
 ratio & alligatio § 22, 25 vinea per se  
 stantis cultura § 34, 16 itē brachia-  
 ta, accipitata ibid. prostrata & cha-  
 racata § 36, 1 vinea pedamina & vi-  
 mina § 36, 27 vinea species quæ vino  
 innititur pedamento § 37, 20  
 vinearum quaestus § 30 & § 36 gene-  
 ra § 25, 29 ut ab animalibus defen-  
 dantur § 61, 12  
 vinum amineum unde dicatur § 00, 34  
 vinum etiam ab arboribus potatur § 33, 12  
 diis equiparatum 492, 15 remedium  
 senectutis 492, 19 quos producat  
 effectus 492, 32. 493, 1 anon unde  
 dictum 494, 27 vinum dendrogale-  
 num 497, 26 tiarenū 497, 27 tia-  
 num ibid. Heracleoticum ibi. Gra-  
 cum vulgare § 00, 35 Gaurianum,  
 Faustinum, Falernum § 01, 37 Al-  
 banum § 02, 8 Surrentinum § 02, 10  
 Calenum § 02, 22 Cæcubum § 02,  
 27 Mamertinum § 02, 32 Trifo-  
 linum § 02, 37 Trebellium § 03, 2  
 Creticum sine maluaticum § 03, 9  
 monobasitis ibid. 12 Rheticum § 03,  
 18 phthorium § 06, 6 ne superfunda-  
 tur, media § 66, 18 ut elutrietur § 66,  
 38 vinum gustandi modus & tem-  
 pus § 68, 15 dulce quomodo fiat § 68,  
 38 vinum aquam habere cognosce-  
 di experimenta § 70, 1 & d. 639, 21  
 quibusdam locis iterum sponte feruet  
 § 71, 32 diuturnius ut fiat § 72, 6  
 florem ne habeat § 72, 27 citra vnam  
 § 74, 5 album ut fuscum, nigrum  
 ut album euadat § 74, 17 aquam  
 habere, edera non probat § 39, 21  
 vini fabulosa origo 494, 41. 495, 10  
 ubertas, bonitas aut prauitas unde pra-  
 noscatur § 62, 29 in vappam con-  
 uersi signum § 65, 38 acescentis re-  
 media § 71, 10 vini remedia ad-  
 uersus fulgura § 71, 29 in vappam  
 peruersi remedia § 71, 33. § 72, 2  
 turbulentia ut resideat § 72, 11 si-  
 tumolentis remedium § 72, 18 anti-  
 sperginem sentientis ibi. vini, in quod  
 animal cecidit, remedium § 72, 24  
 vina nobilia non nisi at bustis gignuntur  
 § 38, 5 & § 19 non comprehendunt  
 deuterias § 65, 38 operaria quæ § 65,  
 40 quando laborent § 68, 33  
 vinorum prognostica § 67, 12  
 viola § 93, 2 & § 10. § 95, 24 violarum  
 genera § 93, 26 viola flore triplicis  
 coloris § 97, 30 flore duplicis coloris  
 § 97, 38 flammea § 97, 19  
 viole flammea satio § 97, 40  
 vipera fago tacto obstupescit 163, 19 vi-  
 peris noxium allium 710, 34 antido-  
 tus, ruta ibid.  
 virginibus olea colenda 438, 20  
 viridis color visui per commodus 14, 3  
 vir muliere a Deo fortior factus & au-  
 dacior 24, 13  
 viscus ex aquifolio 107, 35  
 visum fouet viridis color 14, 3 ex acuit  
 origanos 699, 3  
 vitapia & utilis eorum, qui terram co-  
 lunt 10, 16  
 vitiarium constituendum uti sit § 23, 7  
 vitis medium quoddam inter fruticem  
 ac suffruticem herbamq. 491, 28 ar-  
 bor Theophrasto 491, 31 vitis laudes  
 492, 7 utilitas 493, 35 vitis & vi-  
 ni inuentum 494, 9 vitis origo fabu-  
 losa ibid. vitis nomen 496, 5 gene-  
 ra 496, 20 vitis genus satinum aut  
 ad escam, aut ad effusionem 497, 1  
 vitis Apiana 497, 11 myrsitis 497, 25  
 vitis figura & descriptio § 03, 22 vi-



# I N D E X.

- is* & malleoli electio § 10, 16 *vitis*  
 formatio § 22, 10 *vitis* ulmi radici-  
 bus non iungitur § 43, 13 *vitis* arbu-  
 stina plantatio § 44, 11 *vitis* insitio  
 duplex § 47, 19 triplex § 48, 9 *vitis*  
 brume temporibus aliquando com-  
 prehendit § 47, 31 *vitis* insitio per  
 terebrationem § 51, 35 per infolia-  
 tionem § 52, 3 per inoculationem § 52,  
 13 *vitis* eadem ut candidas & nigras  
 habeat vnas § 52, 26 *vitis* & oleæ  
 naturalis concordia § 54, 1 *vitis* me-  
 dicata § 56, 2 theriaca § 56, 13, 21  
 contra animalia venenum ei aculan-  
 tia § 56, 10 purgatoria § 56, 30 un-  
 guentaria siue odorifera § 57, 6 *vitis*  
 materies § 78, 36 *vitis* ligno nullum  
 æternius § 79, 5  
*vitis* & brassica odia § 62, 8. 698, 25.  
 715, 21  
*viti* quæ arbores cōueniant § 39, 1 & 11  
*Vites* præcoces 497, 6 dactylides 499, 19  
 trifera, siue insana 499, 7 bifera 499,  
 9 *Thasia* & *Libyca* 499, 23 *venu-*  
*cula* & *nemesiana* ibid. *etesiaca*, con-  
 seminiæ, & *talpana* 499, 24 *staphy-*  
*la*, *nicostratiaq;* ibid. *gracula* § 50, 15  
*vites* arboribus maritantur § 43, 5.  
 § 37, 23. § 38, 1 & 32 natura subli-  
 mitatis auida § 38, 8 & 33 *vites* ar-  
 boreæ omnibus commodiores § 38, 25  
 quem agrum expetant § 40, 16 alie-  
 num in se trahunt saporem § 56, 3 in-  
 fructuose ut fecunda fiant § 59, 30 &  
 39 ne fructum putrefaciant § 60, 7  
 ne algore intereant § 60, 13 ne arubi-  
 gine & pruina ladantur § 60, 19  
*vitium* plantatio § 59, 36 sarmenta § 11,  
 27 pastinatio § 12, 8 satio per malleo-  
 los § 14, 8 celerradicatio § 17, 9 di-  
 versa genera uti plantanda § 18, 7 *vi-*  
*tium* putationis tēpus § 27, 5 *vitium*  
 pampinatio § 31, 7 propagatio § 32, 9  
 physiognomonica § 38, 33 morbi eo-  
 rumq; medela § 57, 11  
*vitibus* cælum conueniens § 44, 24 ac-  
 commodata soli qualitas § 46, 18 *viti-*  
*bus* pulvis excitandus § 33, 24 *viti-*  
*bus* proficuum, singulis resolui annis  
 § 44, 38  
*vitiradix* quid 185, 5  
*vinum* omne cū suo vino sociabile § 52, 31  
*ulmus*, siluestris arbor 138, 13  
*ulmi* generum descriptio 138, 29 *vitem*  
 patitur § 39, 4 *ulmi* & *populi* diffe-  
 rentia § 39, 24 ab arbusto reicitur  
 § 39, 28  
*ulmorum* umbræ nouerca § 39, 33 *ul-*  
*mus* quando in arbusto conferenda  
 § 40, 14 in arbusto uti formetur  
 § 42, 5 & 22 *ulmiradices* *vitem* e-  
 necant § 43, 13 *ulmi* plerumq; tres ra-  
 mi § 46, 37  
*ulmeis* frondibus oues aliæ 3, 11  
*umbilicus* terra 617, 17  
*unedo* & *arbutus* diuersæ 166, 17 *unedo*  
*epimelidis* fructus 166, 32 & 35  
*unguentum* Cyrenaicum, suauissimum  
 § 96, 41. § 97, 2  
*Vocontij*, Gallie Narbonensis § 69, 39  
*volucra* ne pampinos vnasque prærodant  
 § 61, 16  
*voluptate* cum utilitate coniuncta nulla  
 maior 6, 13 *voluptas* primi hominis  
 6, 16 *voluptas* ex agricultura 6, 20  
*urbana* vita serior rustica 10, 9  
*urbes* arte humana ædificantur 10, 14 si-  
 ne ludicris & caussidicis artibus felices  
 14, 26  
*urbs*, domicilium sophistarum, para-  
 sitorum 14, 32  
*uredo* quid 474, 31 *uredine* quæ maxi-



# IN VILLAM INDEX.

<i>me infestentur</i>	474, 33	<i>uxor nimia zelotypia demacrat</i>	540, 5
<i>urina difficultatis remedium</i>	687, 20		X
<i>ursinus adeps viti confert</i>	558, 19	<b>X</b> <i>Erxes platani amore captus</i>	130, 27
<i>uva spina. siue crispa enarratio</i>	396, 19	<b>X</b> <i>Xerxis aduentu platanus Laodicea</i>	
<i>uva staphylis</i>	494, 28	<i>in oleam mutata</i>	131, 6
<i>escaria</i>	497, 2	<b>X</b> <i>litera, antiquis decussis</i>	197, 10
<i>moschatula</i>	497, 36	<i>xylon, &amp; ligna xylinea</i>	900, 6
<i>duracina</i>	498, 3		Z
<i>pergulana</i>	498, 11	<b>Z</b> <i>Ambac Mauritanis, iasme</i>	598, 14
<i>bumamma</i>	498, 19	<i>Zamia quid</i>	89, 36
<i>&amp; bimammia</i>	498, 27	<i>Zea in arenam mutata causa</i>	836, 40
<i>ceraunia</i>	498, 30	<i>zeia</i>	
<i>corneola ibid.</i>		<i>in aliud genus facile transit</i>	842, 14
<i>uncialis</i>	498, 33	<i>zeia Theophrasti</i>	842, 37
<i>tripedanea, cuius</i>		<i>zeia &amp; tiphe</i>	
<i>multae species</i>	498, 35	<i>ad frumentum ut redeunt</i>	843, 5
<i>stephanita</i>	498, 38	<i>zeia</i>	
<i>capnia Theophrasti</i>	499, 4	<i>satio</i>	843, 21
<i>insana ibid.</i>		<i>zeia in farris locum suc-</i>	
<i>zeia complura acinorum ut</i>		<i>cedit</i>	844, 30
<i>genera habeat</i>	552, 24	<i>zeia idem Grecis quod</i>	
<i>zeia myrtea</i>	554, 15	<i>Latinis far</i>	844, 33
<i>zeia praecox ut nascatur</i>	554, 20	<i>zeia tractatio sin-</i>	
<i>ut serotina</i>	554, 28	<i>gularis</i>	846, 39
<i>zeia vinaceis</i>		<i>zeia equinocum no-</i>	
<i>vacua</i>	554, 31	<i>men</i>	847, 19
<i>sex tantum dies matu-</i>		<i>zeia quibus enascatur</i>	
<i>ra perdurat</i>	564, 1	<i>regionibus</i>	847, 33
<i>zeia ad effusionem</i>	499, 26	<i>zeia in cibum ve-</i>	
<i>qua elique-</i>		<i>ni</i>	848, 8
<i>scunt in potum</i>	499, 27	<i>zeia Herodoti</i>	848, 31
<i>aminea ibid.</i>		<i>zeceitidas Boeotia rapas appellant</i>	778, 34
<i>gemina seu gemella</i>	500, 4	<i>zelotypia nimia uxore demacrat</i>	540, 5
<i>lana-</i>		<i>zephyrus refrigerantem inspirat auram</i>	
<i>te ibid.</i>	12		
<i>heluola</i>	501, 5		
<i>oleaginea</i>			
<i>501, 20</i>			
<i>alopeoides</i>	501, 22		
<i>Corin-</i>			
<i>thiaca, pusillis acinis</i>	555, 38		
<i>ut sua</i>			
<i>vite ad ver usque permaneant</i>	574, 35		
<i>variarum morbus, crambus</i>	558, 12		
<i>ma-</i>			
<i>turitas</i>	563, 9		
<i>varia conditura</i>	576, 3		
<i>variarum passarum faciendarum ra-</i>			
<i>tio</i>	578, 12		
<i>Vulcanale Romuli</i>	169, 36		
<i>Vulturinus transnatur</i>	12, 1		

## INDICIS FINIS.



















